









10-1
10-1
68

ENCYCLOPÉDIE
MÉTHODIQUE.

1871

ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE.

CHIMIE, PHARMACIE ET MÉTALLURGIE.

La Chimie, par M. FOURCROY.

La Pharmacie, par M. MARET.

La Métallurgie, par M. DUHAMEL.

*In physicis nil desperandum dace chimia, omnia
bona speranda in medicis.*

BOERHAAVE.

TOME SECOND



A PARIS,

Chez PANCKOUCKE, Libraire, hôtel de Thou, rue des Poitevins;

A LIÈGE,

Chez PLOMTEUX, Imprimeur des États.

M. DCC. XCII.

A V E R T I S S E M E N T.

M. Morveau ayant été obligé de renoncer, il y a près de dix-huit mois, à son travail sur l'Encyclopédie, en raison des nombreuses occupations que ses concitoyens lui ont confiées, M. Fourcroy s'est chargé de continuer ce Dictionnaire.

La métallurgie est traitée par M. Duhamel.

M. Chaussier continue de rédiger les principaux articles pharmaceutiques ; il est aidé par M. Willemet, qui présente un abrégé des propriétés médicinales & des usages pharmaceutiques des plantes.

M. Vauquelin est l'auteur de tous les articles relatifs aux instrumens, à leur description, & à leurs usages ; il soigne en même temps le travail & la description des gravures.

Il y a quelques articles de M. Morveau, qu'il avoit rédigés avant d'abandonner cette entreprise.

AL. (*Pharmacie*) Mot arabe qui répond à notre article indicatif, & signifie *le, la*; mais souvent cet article est lié à un autre mot, & placé au commencement d'un nom, alors il ajoute à l'idée primitive, & sert à marquer la grandeur, la supériorité ou l'excellence de l'objet que l'on indique.

Dans les dénominations pharmaceutiques, l'addition de la particule *al* exprime une préparation faite avec la substance indiquée, & répond au *diu* des Grecs: ainsi, *J. Miste*, désigne sous le nom d'*almeste*, une sorte d'électuaire, dont le gérécœon est la base. Nous faisons ici ces remarques, parce qu'on trouve dans la chimie, la pharmacie, plusieurs mots composés, qui viennent de l'arabe, & qui commencent par *al*; tels sont les mots, *alambic*, *alchimie*, *alcali*, *alcool*, *almandol*, & plusieurs autres que nous aurons soin d'indiquer dans le dictionnaire; l'Encyclopédie méthodique étant spécialement destinée à servir de répertoire universel, à présenter, non-seulement un tableau de l'état actuel des sciences; mais encore à en marquer les variations, les progrès, nous avons cru qu'il étoit important d'y recueillir ces dénominations anciennes, actuellement tombées en désuétude; mais que l'on retrouve si fréquemment dans le plus grand nombre des ouvrages de chimie & de pharmacie qui parurent en Europe au renouvellement des sciences. Ce genre de recherches est d'ailleurs absolument utile pour l'intelligence des anciens écrivains, & ce motif a suffi pour nous déterminer à l'entreprendre.

ALABARI, ALASTROB. (*Pharmacie*.) Dénominations employées par les arabistes pour désigner le plomb. (RULAND.)

ALABARI. Quelques alchimistes se sont servis de ce mot pour désigner le plomb; il étoit aussi synonyme des mots **AABAM** & **ACCIL**. Voyez ces mots, tom. I. pag. 1 & 4.

ALABANDINE, ALABANDIQUE & quelquefois **ALMENDINE**; *lapis Alabandicus*, *Alabandus*, (*Pharmacie*.) Aetius, qui en fait mention au nombre des substances médicinales, dit qu'elle est noirâtre, parsemée de points jaunes & brillans, formant des espèces de stries ou de segmens, & que réduite en poudre elle noircit les cheveux blancs. Pline fait mention de cette espèce de pierre; & d'après ce qu'il dit, il paroît qu'elle étoit ainsi nommée, parce qu'on la tiroit d'Alabanda, ville de l'Asie mineure. Gabr. Fallope, qui parle de la pierre alabandine, prétend que c'est une espèce de verre, d'autres la regardent comme une pierre précieuse; mais aujourd'hui.

Chimie, Tome II,

d'hui on est peu d'accord sur l'espèce de pierre que les anciens nommoient alabandine, & on n'en connoît guère que le nom.

ALACAL, ALCOL, ALFATIDE, ALFOI, ALCOCAB, ALEMZADAR, ALISTELES. (*Pharmacie*.) Dénominations adoptées par les arabistes, pour désigner le sel ammoniac ou muriate d'ammoniaque. (RULAND, JOHNSON.)

ALAFREQ. (*Pharmacie*.) Espèce de céruse, suivant Ruland.

ALAMBIC. C'est un vaisseau qui sert à distiller, qui consiste en général dans une cucurbit surmontée d'un chapiteau en forme de cône ou d'entonnoir renversé, dont les bords intérieurs sont en gouttière pour recueillir les vapeurs condensées sur ses parois, & les porter, par un tuyau oblique, dans une bouteille ou autre vase qu'on nomme récepteur.

On entend communément par alambic l'appareil entier qui sert à la distillation, avec tout ce qui en dépend; mais dans le sens propre ce n'est que la cucurbit garnie de son chapiteau.

Bergman, dans sa dissertation sur les premiers tems de la chimie, remarque que l'alambic a été connu des anciens, puisque Dioscoride, en parlant de la distillation du mercure, dit qu'on mettoit le cinibre dans des tests recouverts d'un autre vaisseau de fer qu'il appelle *apath* (*liv. 15. chap. 110.*) Quelques-uns pensent néanmoins que la racine de ce mot est hébraïque; d'autres le tiennent de l'arabe: il est certain qu'Avicenne en fait mention, & l'article *al* que nous lui avons conservé, indique assez clairement que c'est de-là que nous l'avons reçu.

Les anciens chimistes étoient persuadés que plus les alambics étoient élevés, plus la séparation des matières fixes & des matières volatiles étoit exacte; ils ne connoissoient guère d'autres règles, & d'après cela ils donnoient une forme allongée aux vaisseaux destinés à les contenir, d'où leur est venu le nom de cucurbit. La figure 6 des instrumens & fourneaux, qui représente un alambic de verre d'une seule pièce, tel qu'on la fabrique encore aujourd'hui, peut donner une idée de la forme de ces anciens vaisseaux distillatoires. Dans la suite on s'est éloigné de cette forme primitive, sur-tout pour les alambics de métal; mais toujours préoccupé de la même opinion, on a substitué à la cucurbit une espèce de chaudron surmonté d'une colonne d'un moindre diamètre & très-haute, au-dessus de laquelle on a établi le chapiteau. On trouve dans la chimie de Lavo-

vre un de ces alambics, dont la colonne de 3 à 4 pieds est en zigzag, & qu'il appelle : *vaisseau pour décoller l'esprit-de-vin de la première distillation*. On voit, figure 7 des planches pour les instrumens & fourneaux, un alambic à colonne plus large & plus court, qui est encore en usage dans quelques ateliers. Mais à la fin on a senti que ces formes n'étoient pas indifférentes, qu'il devoit y avoir des règles pour déterminer les dimensions de ces instrumens. M. Baumé est un de ceux qui ont le plus contribué à la perfectionner : voici les principes que l'on peut recueillir de ses recherches & des observations de ceux qui ont donné après lui quelque application à cet objet.

La distillation étant une évaporation en vaisseaux clos pour recueillir séparément les matières susceptibles de vaporisation & de condensation, les instrumens doivent être construits de manière à donner la plus grande quantité de produit, de la meilleure qualité, dans le moins de tems & aux moindres frais possibles.

Les substances que l'on peut porter à l'état de vapeurs sont la plupart sujettes à s'altérer quand on leur fait subir un degré de chaleur plus élevé que celui qui est nécessaire à leur distillation ; d'autre part, les matières que l'on traite à la distillation ne sont pas à beaucoup près composées de parties volatiles & de parties fixes dans un sens absolu, il n'y a le plus souvent qu'une foible différence, & l'affinité de ces parties entr'elles peut décider l'ascension des plus fixes avec les plus volatiles, même à une température qui seroit insuffisante pour mettre en expansion les premières si elles étoient seules. D'où il suit déjà que toute distillation doit se faire à un degré de chaleur égal & déterminé par la nature de son produit.

La pression fait obstacle à l'ébullition des liquides, & si les vaisseaux qui les contiennent sont élevés, la partie inférieure reçoit, outre la pression de l'atmosphère, la pression de l'excès de pesanteur de la colonne même de liquide ; les cucurbites les plus basses sont donc préférables pour avoir une chaleur égale & la plus foible à laquelle la distillation puisse s'opérer.

L'évaporation, toutes choses égales, se fait dans des tems proportionnés aux surfaces des liquides évaporables ; les cucurbites larges auront donc l'avantage.

Pour recueillir les produits de la distillation, il faut condenser les vapeurs, qui sans cela seroient emportées par l'air atmosphérique, si elles trouvoient un passage assez facile hors des vaisseaux ; qui briseroient ces vaisseaux, si elles ne pouvoient s'écouler assez promptement. C'est pour ce la qu'on emploie des réfrigérans & des serpents ; mais leur usage, leur forme, leurs dimensions sont aussi déterminés par des principes que l'observation a confirmés.

Le réfrigérant est un vaisseau rempli d'eau froide qui environne la tête ou le chapiteau de l'alambic.

C'est-là, en effet, que la condensation des vapeurs doit commencer, parce que se déposant en gouttes sur les parois intérieures du chapiteau, elles coulent dans la routière circulaire, qui les porte par le bec de l'alambic dans le récipient. Dans quelques provinces on se sert encore, pour la distillation des eaux-de-vie, de chapiteaux sans gouttière, sans réfrigérant : M. Baumé remarque très-bien que ce sont des espèces de cornues plutôt que des alambics ; il faut alors une chaleur capable de porter la vapeur jusques dans le bec de l'alambic, ce qui ne peut se faire sans augmenter la dépense du combustible, sans diminuer la quantité & la qualité du produit.

Pour obtenir d'un réfrigérant tout l'effet que l'on en attend, il faut qu'il contienne une certaine masse d'eau, que cette eau soit renouvelée dès qu'elle a acquis un certain degré de chaleur, en un mot, qu'elle soit entretenue à une température suffisante pour décider la condensation, ou du moins un commencement de condensation des vapeurs. Cependant il faut être prévenu qu'un trop grand refroidissement en cette partie arrêteroit la distillation au lieu de la favoriser, parce que les vapeurs saisies par le froid en arrivant dans le chapiteau & avant d'atteindre les parois, retomberoient bientôt de manière qu'il n'en résulteroit qu'une circulation inutile, une vraie cohobation.

Les vapeurs qui s'élèvent de la cucurbite étant arrêtées ou seulement retardées dans leur écoulement, pressent par leur élasticité sur la surface de la liqueur & s'opposent à l'ascension de nouvelles vapeurs jusqu'à ce que la chaleur soit portée à un degré capable de vaincre cet obstacle ; il convient donc de donner au bec du chapiteau & au serpent destinés à condenser ces vapeurs un diamètre suffisant.

Les matières une fois parvenues dans le serpent ne peuvent être trop refroidies, ni trop promptement ; le vide qui s'opère instantanément par cette condensation favorise la distillation ; on conçoit que ce ne peut être un vide réel comme quelques-uns l'ont cru, puisque l'intérieur de l'alambic reste en communication avec l'atmosphère, & qu'un air rarifié remplit aussi exactement par son ressort qu'un air condensé rempliroit par sa masse, de sorte qu'il exerce absolument la même pression : mais il n'est pas moins certain que ces vapeurs venant à pénétrer la plus grande partie de leur volume, l'espace qu'elles laissent peut être aussitôt occupé par d'autres vapeurs, & qu'il suffit donc de cas que leur expansibilité puisse faire équilibre à l'air qui tend à rentrer dans le serpent, sans avoir à déplacer à chaque instant celui qui le rempliroit, sans cette succession de raréfactions & de condensations. Cette résistance de l'air doit être comptée pour quelque chose : M. Baumé a remarqué qu'elle retardeoit sensiblement la distillation lorsqu'on em-

ployoit des serpentins trop longs, tels que ceux en usage dans les brûleries qui ont plus de trois circonvolutions & quelquefois jusqu'à fix.

Tels sont les principes généraux d'après lesquels on doit régler la construction des alambics; pour en faire mieux sentir l'application, je donnerai la description de l'alambic, proposé par M. Baume, dans les élémens de pharmacie, qui sert à plusieurs opérations, & qui se trouve aujourd'hui dans tous les laboratoires.

Cet alambic est représenté par son fourneau, & appareil de son serpent, & de son récipient, (fig. 27 des instrumens pour les distillations.) Il est composé de trois pièces. La première, que l'on voit séparément, (fig. 18.) est la cucurbitte de cuivre étamé en dedans. Elle doit avoir onze pouces deux lignes d'A en a, & autant de D en d; quinze pouces de diamètre d'E en e; & douze pouces de profondeur d'A en D. F est un tuyau d'un pouce & demi de long, de quinze lignes de diamètre, que l'on bouche avec un bouchon de liège, & qui sert à mettre de l'eau dans le vaisseau, à mesure qu'elle s'évapore, sans interrompre la distillation. GG font deux anses pour manier commodément cette pièce. L'orifice de ce vaisseau est renforcé à l'extérieur par un collet de cuivre tourné pour supporter la pièce que l'on nomme le bain-marie & qui entre dans la première.

Le bain-marie (fig. 29.) est d'étain, garni à son extrémité extérieure d'un collet d'étain qui pose sur celui de la première pièce; ce vaisseau, de forme cylindrique, a onze pouces de diamètre en dedans, & neuf pouces de profondeur. h h sont deux anses d'étain. L'extrémité intérieure est tournée jusqu'à un pouce & demi, & creusée d'environ une ligne & demie, ce qui forme un petit renfoncement destiné à recevoir le col du chapiteau.

La troisième pièce (fig. 30.) est le chapiteau; on la nomme chapelle lorsqu'elle a une figure conique. Elle est d'étain; elle a neuf pouces de profondeur de L en K, & onze pouces de diamètre dans la partie inférieure. Au bas de cette partie est pratiquée dans l'intérieur une gouttière d'un pouce & demi de profondeur, & qui a une ouverture qui répond à un tuyau d'étain M, de quatorze à quinze pouces de longueur, & de trois à quatre lignes de diamètre pour conduire les vapeurs qui se sont condensées sur les parois du chapiteau & ramassées dans la gouttière. On fait entrer ce tuyau dans un matras N (fig. 27.) Il est une continuation de chapiteau en étain de quatre pouces de longueur, garni d'un fort collet & d'une emboîture d'un pouce & demi, qui entre & pose sur le rebord intérieur du bain-marie ou de la cucurbitte. Ce chapiteau est garni à l'extérieur d'une espèce de chaudière de cuivre renflé par le milieu & soulevé exactement autour du chapiteau d'étain pour contenir un volume d'eau froide, afin de faciliter la condensation des vapeurs qui s'élèvent dans le chapi-

teau: on nomme cette pièce le réfrigérant; elle a seize pouces de diamètre d'O en O, treize pouces de profondeur, & neuf pouces de diamètre en C. On soude en P un robinet de cuivre qui communique à l'intérieur du réfrigérant seulement, & qui sert à faire écouler l'eau lorsqu'elle est échauffée. Ce robinet doit être fort gros, pour qu'on puisse promptement vider le vaisseau & le remplir sans intervalle de nouvelle eau.

Lorsqu'on est à portée de se procurer de la glace on peut en mettre de temps en temps quelques morceaux dans le réfrigérant, & on évite par ce moyen l'embarras de renouveler l'eau, du moins aussi souvent.

Cet alambic doit être fait de manière que l'emboîture du chapiteau entre dans la cucurbitte; afin qu'on puisse distiller, à volonté & suivant le besoin, à feu nud ou au bain-marie. Cette emboîture doit être assez exacte pour ne pas laisser échapper l'air lorsqu'on souffle dans l'intérieur par le bas du chapiteau.

Le réfrigérant ne suffit pas toujours pour amener les vapeurs au degré nécessaire de condensation; & sur-tout pour empêcher qu'en passant par le contact de liqueur elles ne retiennent une portion de calorique capable de rôtir les parties huileuses, & de lui communiquer un goût de feu; pour remplir complètement ces objets on a très-bien imaginé de prolonger le réfrigérant, ce qui se fait en adaptant au bec du chapiteau de l'alambic un long tuyau qui fait plusieurs circonvolutions sur lui-même, & qu'on nomme *serpentin*. Ce tuyau est ordinairement d'étain; il est fixé dans un vaisseau de cuivre ou de bois que l'on remplit d'eau froide avant l'opération. (fig. 27 des instrumens pour les distillations.)

La grosseur de ce tuyau n'est point indifférente, on a remarqué que la meilleure proportion est de 18 à 24 lignes de diamètre.

On conçoit que la masse d'air qui environne de toutes parts les circonvolutions du serpent, doit faire un tout autre effet que celle du réfrigérant pour absorber la chaleur, & maintenir la température au degré qui convient. En projetant, de temps en temps, quelques morceaux de glace dans cette eau, on s'assure encore mieux de l'égalité de cette température.

M. Weigel, dans ses observations chimiques, publiées à Göttingue en 1771, a proposé de substituer au serpent un tuyau garni d'une espèce de fourreau, dans lequel il établit un courant d'eau froide, & au moyen duquel il assure avoir obtenu, sans peine, les acides à un haut degré de concentration; mais comme cet appareil est principalement destiné aux opérations qui se font dans des cornues, la description en sera mieux placée à l'article DISTILLATION. (Voyez ce mot.)

J'ai vu dans quelques fabriques employer avec avantage, au lieu de serpent, pour la distillation ou rectification de l'alcool, l'appareil dont on

voit la coupe, fig. 31, des instrumens pour les distillations. Au tuyau qui reçoit le bec du chapiteau est soudé un entonnoir renversé, dont le bord inférieur est lui-même soudé à celui d'un second entonnoir dans la position naturelle; à la suite de cette pièce on en place une ou deux toutes semblables, dont la dernière est terminée par un tuyau qui porte la liqueur hors du tonneau. Le tout étant plongé dans l'eau froide, on conçoit que la liqueur qui distille doit être d'autant plus refroidie que le vaisseau qui la reçoit présente une plus grande surface au fluide qui doit absorber sa chaleur. La surface est ici d'autant plus grande, que les parois des entonnoirs s'éloignent plus de la perpendiculaire; il est cependant un terme où l'on doit s'arrêter, c'est celui où la liqueur condensée seroit entraînée par son poids, au lieu de se distribuer & de couler lentement sur les côtés, parce qu'alors elle ne resteroit pas assez long-temps en contact avec le corps refroidissant.

M. Bazile a communiqué, en 1788, à l'Académie de Dijon, des expériences qui prouvent que la hauteur de la colonne de liqueur, dans les chaudières distillatoires, influe très-sensiblement sur la qualité des produits & sur la longueur des opérations. Ayant fait distiller sept pieds cubes de vin blanc dans un alambic ordinaire, dans lequel la liqueur formoit une colonne de trois pieds de hauteur, & pareille quantité dans un alambic qu'il avoit fait construire, où la liqueur ne s'élevoit pas à plus de deux pieds, il a observé que dans ce dernier on pouvoit facilement faire deux opérations par jour, c'est-à-dire, que la distillation s'achévoit en moitié moins de temps, d'où résultoit une économie d'un tiers sur le combustible.

L'expérience, d'accord avec le calcul, a démontré à M. Bazile qu'il y avoit un extrême inférieur & un extrême supérieur dans les hauteurs de ces colonnes de liqueur; que dans la distillation du vin l'inférieur étoit de 96 lignes, & le supérieur de 6 pieds; que dans la distillation de l'eau-de-vie, le premier étoit de 48 lignes, & le dernier de 12 pieds, & que la solution du problème se trouvoit ainsi dans la moyenne géométrique.

On ne doit pas être étonné de la différence que ces résultats indiquent pour les deux liqueurs, & qui dépend de leur plus ou moins grande volatilité.

C'est ainsi que les diverses propriétés des substances que l'on traite à l'alambic ont nécessité des changemens dans la forme, les proportions & même la matière de ces vaisseaux, comme il sera dit dans les articles qui traitent de ces distillations particulières. Voyez DISTILLATION, EAU DE MER, &c. (1). (M. M. GUYTON-MORVEAU.)

ALAMBIC. C'est un instrument qui a pris plusieurs formes diverses dans les mains des hommes,

à mesure que leur raisonnement s'est perfectionné; que leurs expériences se sont multipliées, & qu'elles ont reçu quelque degré d'exactitude. L'esprit des hommes, la nature de leur génie influent tellement sur les instrumens des arts & des sciences qu'ils ont cultivés, qu'ils pourroient servir de traces, à l'aide desquelles il seroit facile de suivre les progrès de lumières chez les différens peuples, dont les instrumens aussi-bien que les discours & les lettres sont de vrais monumens.

Dans un temps d'ignorance & les préjugés dirigeoient les opérations de la chimie & de tous les arts, les alambics s'éloignoient, autant qu'il étoit possible, de la structure qu'ils devoient réellement avoir.

Ce vase étant destiné à plusieurs usages, & à opérer sur des substances de nature diverse, il a été nécessaire d'en fabriquer de différentes matières; ainsi ceux de métal sont le plus fréquemment & le plus généralement employés; ceux de terre & de verre, très-peu exclusivement bornés aux laboratoires de chimie, tandis que les alambics de cuivre sont maintenant plus en usage dans les travaux en grand des arts & dans la Pharmacie, qu'en chimie proprement dits. D'après cela, on voit que l'on pourroit, comme dans les végétaux & les minéraux, dans la description des alambics, établir des classes, des genres & des espèces, & même pour pousser plus loin l'analogie des variétés, la classe seroit formée de leur ensemble, le genre de la matière dont ils seroient, & l'espèce seroit tirée de leur forme; la variété s'établirait par quelque différence peu sensible de quelques-unes de leurs parties.

Autrefois, & lorsque l'intérêt ne se mêloit point encore de chimie, que cette science étoit livrée à des hommes occupés d'idées fantastiques, ou simplement curieux, les vaisseaux se sentoient tous de l'esprit qui en dirigeoit l'administration; ils sont passés du laboratoire des alchimistes avec leur structure baroque, dans ceux des pharmacies & des arts; mais ils ont, l'alambic en particulier, subi une heureuse métamorphose.

Lorsque les hommes ne voyoient dans les corps autre chose d'utile, que les esprits, les quintessences, & en général tout ce qui n'étoit que volatil, ils construisoient des alambics, de telle sorte qu'il n'y eût en effet que la partie la plus volatile du corps qu'ils analysaient, qui s'élevât au degré qu'ils avoient fixé en hauteur.

La plupart des alambics sont formés de plusieurs pièces, pour la facilité de leur fabrication & des opérations auxquelles ils servent. Il y

(1) A cet article, joint par M. Guyton, nous joignons un article rédigé par M. Vauquelin; nous prenons ce parti, quoiqu'il y ait ici quelques légères répétitions, pour ne point détruire l'ensemble & le rapport qui existe entre toutes les descriptions des instrumens d'un laboratoire de chimie & leurs usages; dont M. Vauquelin s'est chargé.

en a cependant qui sont d'une seule pièce. Ceux de cuivre sont toujours formés au moins de trois parties; savoir, d'une partie inférieure destinée à recevoir les matières à distiller & l'action du feu, d'une autre supérieure qui doit s'insérer avec la première, recevoir la matière distillée, & la conduire à l'extérieur. La troisième, dont l'usage est de contenir l'eau froide, enveloppe extérieurement la seconde. Il y a une quatrième pièce qui, quoiqu'accessoire, est d'une grande utilité dans plusieurs opérations où il s'agit de refroidir beaucoup la matière distillée; c'est ce qu'on appelle serpent. Nous revenons sur chacune de ces parties; la partie inférieure nommée cucurbite, du mot latin *cucurbita* (courage), parce qu'anciennement on lui avoit donné la forme de ce fruit, est une espèce de chaudière de cuivre étamé, de forme cylindrique & de grandeur différente, suivant les opérations auxquelles on la destine; son diamètre est assez ordinairement égal à sa hauteur; elle porte à sa partie supérieure, près du bord, un bouchon pour la faire entrer dans le fourneau qui doit la recevoir, & deux anses pour la manier & faciliter son transport. Entre les deux anses, & sur le côté qui doit faire face à l'opérateur, doit être pratiquée une ouverture prolongée en dehors par un canal de cuivre; elle est destinée à laisser entrer dans l'intérieur de la cucurbite de nouvelle matière, sans être obligé de démonter l'appareil; on la bouche ordinairement avec un bouchon de liège. C'est-là la pièce de l'alambic la plus essentielle, & celle sur laquelle nous devons fixer un instant notre attention. Le but qu'on se propose toujours dans les opérations où il sert, est de réduire en gaz ou fluides élastiques, le plus promptement & le plus économiquement possible les substances qu'on y expose. Or, pour cela, plusieurs conditions sont nécessaires; 1°. la plus grande surface possible aux molécules du calorique, afin qu'elles puissent se fixer dans la liqueur ou le corps en distillation; & plus il y aura de points de contact entre les deux corps, & moins la perte du calorique sera grande, & plus promptement la distillation aura lieu, &c. 2°. Une épaisseur peu considérable de la paroi inférieure de ce vaisseau, parce que le calorique parviendra plus vite dans le corps capable de le fixer en changeant d'état, & ne sera point enlevé par les corps extérieurs comme il le seroit en partie si la paroi étoit épaisse, & qu'il fût obligé de s'accumuler à sa surface avant d'en pénétrer l'intérieur. Il ne faut cependant pas non plus qu'elle soit trop mince; car alors sa destruction prompte entraîneroit des dépenses que l'économie de la chaleur n'indemnifieroit pas. 3°. La plus petite hauteur possible de ce vaisseau, (c'est qui doit se déterminer par l'expérience) car, par cette construction, le fluide élastique, toujours for-

mé au fond, a une moins grande colonne de liquide ou de toute autre matière à traverser, il est moins comprimé, les couches supérieures du liquide étant moins éloignées du fond sont plus chaudes, & se refroidissant moins, il arrive tout entier à la surface, & sans avoir souffert de déperdition. Il y a cependant des limites à garder au-delà desquelles il n'est pas permis d'aller, parce qu'on seroit obligé d'ajouter trop souvent de la matière, ce qui seroit un inconvénient, & parce qu'il pourroit arriver que par une ébullition forte, il passât quelques portions de la matière dans l'état liquide, & sans avoir été réduite en vapeur. 4°. Une ouverture au moins égale au fond, pour que les substances réduites en gaz ne soient pas comprimées, que le calorique à qui ils doivent leur forme, n'en soit point exprimé, & qu'elles montent jusqu'au lieu destiné à les condenser & à les conduire dehors.

Je pense qu'outre ces qualités requises dans la forme des cucurbites, la ténacité du fond de ce vaisseau en dedans, en donnant plus de surface & au calorique & à la liqueur, sans augmenter les dimensions, augmenteroit beaucoup l'évaporation & abrégeroit les opérations. L'exécution de cette idée pourroit être de quel qu'avantage dans les arts sur-tout, où le temps & le combustible sont des objets de la première importance, & qui par conséquent ne doivent point être négligés: comme ces vases se détruisent assez promptement par l'action du feu & de l'air combinés, & que c'est une dépense considérable pour les personnes qui en emploient beaucoup, on pourroit peut-être retarder cette destruction en les traitant lorsqu'ils sont neufs avec un mélange de poussière fine de charbon, de fer & d'huile. Cette opération, que l'on pourroit répéter, de temps en temps, forme à la surface du cuivre un vernis très-incombustible qu'elle déiend, & qui n'en augmente point l'épaisseur. Il seroit cependant possible qu'il fût un léger obstacle à la libre entrée du calorique; ceci attend l'approbation de l'expérience. Voilà quelles sont en abrégé les qualités que doit avoir une cucurbite bien construite; c'est cependant ce qui manquoit entièrement aux cucurbites anciennes; elles avoient un fond large, une hauteur très-grande, une ouverture fort étroite, enfin elles réunissoient tous les vices qu'il étoit possible de rassembler dans un seul vase. Souvent même pour combler tous ces défauts, les vapeurs étoient forcées de monter par un canal d'un très-petit diamètre, tourné en spirale, jusques dans les chapiteaux.

La seconde partie de l'alambic destinée à recevoir les matières élevées en gaz par le calorique de l'intérieur de la cucurbite; elle porte le nom de chapiteau, ou de tête de mort, parce que dans son origine elle avoit quelque ressemblance avec cette partie de l'homme; mais elle s'en

éloigne beaucoup aujourd'hui, quoiqu'elle ait toujours conservé le même nom. Elle est ordinairement formée d'étain, & non de cuivre, comme les autres parties de l'alambic, afin qu'en y passant, les substances ne se chargent point de quelque chose qui pût nuire aux usages auxquels on les destine, & sur tout à l'économie animale. Sa forme est celle d'un cône renversé. Il porte à sa partie inférieure & intérieure une rigole circulaire pour attréer le gaz devenu liquide sur la surface de ce vase, & le porter au dehors par un tuyau qui s'y prolonge, & dans lequel la rigole se termine. La partie inférieure est une gorge de la même matière qui doit entrer dans l'ouverture de la cucurbite; c'est dans cette jointure que consiste toute la difficulté de sa facture, & dans laquelle les ouvriers doivent apporter la plus grande attention. Il faut qu'elles se joignent de telle manière qu'elles puissent retenir l'air fortement comprimé, & qu'elles se détachent plutôt l'une de l'autre que de donner passage à ce fluide; par ce moyen on n'est pas obligé de lutter les jointures, & on n'éprouve aucune perte dans les distillations.

Le canal orbiculaire doit être proportionné aux dimensions réunies de l'ouverture de la cucurbite & de la surface du chapiteau; il doit avoir une légère pente vers le lieu où il se termine en tuyau à l'extérieur, afin que les liquides en sortent à mesure qu'ils s'y rassemblent. La forme d'un cône renversé qu'on a donnée à ce vaisseau, est la plus avantageuse, & l'emporte par beaucoup de raisons sur celles qu'avoient autrefois ces vases. Ils formoient une portion de sphère; de sorte qu'une goutte des gouttes de liquide y étoit attachée perpendiculairement, & retomboient toujours dans la cucurbite, qu'une partie étoit obligée, pour descendre dans la gouttière, de décrire une courbe; ce qui occasionnoit encore la chute des plus grosses d'entr'elles, en ligne perpendiculaire; c'étoit donc du temps & une grande quantité de calorique entièrement perdus, sans compter que souvent certaines matières exposées aussi continuellement à l'action du calorique, en sont altérées, & ne remplissent point l'objet que l'on desiré; tous ces inconvénients n'existent point dans la forme du nouveau chapiteau: la partie supérieure se termine en un point fort étroit, & qui ne peut tout au plus laisser retomber qu'une goutte de liquide; ses parois descendant sous un angle plus ou moins aigu, facilitent l'écoulement du liquide retenu à leur surface par l'attraction; & dans un alambic dont le chapiteau est convenablement construit, il ne retombe point du tout de liquide dans la cucurbite.

La troisième partie de l'alambic, à cause de son usage qui est de contenir de l'eau froide, est appelée *refrigérant*. Il est fait avec du cuivre, il est attaché à la partie inférieure, & près de

la gorge du chapiteau qu'il enveloppe. Ce vase qui, quand il est isolé, ressemble à un manchon ou à un cylindre creux, doit s'élever quelques pouces au-dessus de la pointe du chapiteau. A mesure qu'il s'éloigne du lieu de son insertion, sa capacité devient plus grande, en raison de la forme du chapiteau. Il porte sur le côté antérieur, & qui forme un angle droit avec le bec du chapiteau, un robinet de cuivre pour vider l'eau contenu dans le vase, quand elle a acquis une température incapable de pouvoir condenser les vapeurs qui s'élèvent dans le chapiteau.

Quoique nous devions faire un article séparé des cuves & des serpents, cependant nous ne pouvons nous dispenser d'en parler ici. Ce seroit une manœuvre bien pénible de laisser couler l'eau dans les ruisseaux, & d'être obligé de la remplacer avec des seaux à bras par l'eau froide. Ces inconvénients qui se font surtout sentir dans les grands ateliers, y ont aussi été adoucis. Pour cet effet, on place au-dessus du réfrigérant une cuve de bois garnie de plomb, vingt fois plus grande que ce vase, & garnie d'un robinet que l'on puisse ouvrir d'en-bas toutes les fois qu'il est nécessaire. Ainsi, après avoir rempli la cuve d'eau froide, on s'en sert pour rafraîchir l'alambic, jusqu'à ce qu'il n'en reste presque plus; celle qui a servi à cet usage est retenue dans un grand baquet ou tonneau, dans lequel est fixé une pompe foulante, dont le tuyau de cuivre doit se rendre dans la cuve: on fait jouer cet instrument lorsqu'il ne reste plus que peu d'eau dans le vase; & en faisant circuler de cette manière l'eau autour de l'alambic, elle perd assez de calorique pour pouvoir servir avec avantage au bout de sa course à rafraîchir le chapiteau. Cette méthode a beaucoup d'avantage sur les autres où l'on laisse aller l'eau chaude, où l'on est obligé d'en puiser de nouvelle à tout instant, & de la verser à bras dans le réfrigérant; avec celle-ci on ne répand point d'eau sur l'alambic, sur le fourneau, ce qui ne retarde point la distillation, & on ne dépense point de calorique inutilement; on évite aussi la difficulté de la température très-basse de l'eau de puits, qui rafraîchit beaucoup plus qu'il ne faut; ce qui est nuisible à la célérité de la distillation. Celle que l'on fait circuler comme on vient de le dire, sans avoir le défaut d'absorber autant de calorique de la cucurbite & du chapiteau, que l'eau de puits dont on se sert ordinairement, a la propriété de condenser la vapeur, & c'est tout ce qu'il faut; dix degrés au-dessous de la vapeur sont suffisants.

Un vaisseau accessoire à la distillation, que l'on emploie quelquefois, & que nous décrirons en son temps, est le serpent; c'est en général un vase de cuivre, plus souvent de bois, dans les

arts, de figure cylindrique, destiné à contenir de l'eau froide, au milieu de laquelle passe un canal d'étain, tourné en spirale, & abouché par sa partie supérieure avec le bec du chapiteau, & par en bas avec un récipient. On doit le considérer comme un second réfrigérant, qui est sur-tout employé dans les distillations de corps très-volatils, & qui contiennent des aromatiques très-fugaces que l'on veut conserver. A la rigueur il pourroit seul suffire, & dans quelques manufactures on n'en a pas d'autres. On prétend que les distillations en vont plus vite; ce serpentin fort dehors à travers la paroi du vase qui contient l'eau. Les liquides obtenus pendant les distillations sont reçus dans des vases, soit de verre, soit de terre, que l'on nomme en général récipients, & sur lesquels nous reviendrons à leur article.

L'on pourroit aussi faire des alambics avec d'autres métaux, tels que le fer, l'étain, le plomb, l'argent, &c., ce qui formeroit autant de genres; mais outre qu'il y a plusieurs inconvénients dans l'emploi de ces métaux, tant par la fusibilité des uns, l'oxidabilité des autres, & la cherté des troisièmes, ils ressembleroient à celui que nous avons décrit & n'auroient pas plus d'avantages, si ce n'est celui qui seroit fait avec de l'argent, qui réuniroit une fusion difficile, une imaltérabilité parfaite par beaucoup de substances, à une bénignité assurée pour l'économie animale; mais cette matière est d'un prix si élevé, que je doute qu'on en ait fabriqué jusqu'à présent, même pour les pharmacies des rois. Il y a un second vaisseau accessoire à l'alambic, & qu'on a improprement nommé *bain-marie*; c'est un vase ordinairement d'étain, de figure analogue à celle de la cucurbitte d'alambic dans laquelle il doit entrer; son ouverture doit être plus haute que celle de la cucurbitte, & être du même diamètre; afin que la gorge du chapiteau puisse y entrer aussi exactement que dans la cucurbitte. Au-dessous de son ouverture, il porte un bourrelet qui le tient suspendu dans la cucurbitte en appuyant sur les bords; il est destiné à contenir des matières très-volatiles que l'on veut distiller à une chaleur au-dessous de celle de l'eau bouillante; & pour cela, on remplit d'eau l'espace qu'il laisse entre lui & les parois de la cucurbitte; ce que l'on doit appeler proprement *bain-marie*, & non le vaisseau qui y est plongé. L'on chauffe l'eau jusqu'à ce qu'elle bouille, alors le calorique se communique à travers des parois de ce vase à la matière qu'il contient; & quand elle est de nature à pouvoir devenir fluide élastique à la température de 60 à 65 degrés, elle s'élève dans le chapiteau où elle est condensée à la manière ordinaire, & conduire de-là dans un récipient: le degré de chaleur que l'on donne aux matières par ce moyen, est toujours relatif à la

nature & à l'épaisseur des vases qui les contiennent. Ainsi il doit être différent dans un vase d'argent & dans un vase d'étain, & chacun d'eux laissera passer moins de chaleur, étant très-épais qu'étant très-minces: les raisons de ces phénomènes seront expliquées dans l'action réciproque des métaux & du calorique; cela tient en général à leur capacité & à leur pesanteur; c'est-à-dire, à la diversité de calorique que chaque matière métallique absorbe pour être élevée à la même température, & qui doit varier encore suivant la masse de chaque métal à chauffer.

L'esprit d'intérêt, qui est souvent celui du génie, n'a pas encore répandu son influence sur les alambics de terre; ils conservent encore les marques de l'ignorance ou des prétentions alchimiques. Ces vaisseaux étant faits la plupart du temps pour réduire les corps en gaz, ou tout simplement distiller, ils devroient avoir les ouvertures les plus favorables à ces opérations, & c'est malheureusement tout le contraire; on en voit que l'on fait même à-présent, dont l'ouverture est tout-au-plus les tiers de la grandeur du fond. Leur forme est aussi semblable à une poire dont la queue est en haut. Ils ne sont formés que de deux pièces, de celle que nous venons de décrire, que l'on appelle cucurbitte, & du chapiteau qui la couvre; celui-ci est ordinairement de verre. Les principes sur lesquels nous avons dit que les alambics de cuivre devoient être construits, doivent aussi présider à la fabrication de ceux-ci: on devroit sur-tout diminuer la hauteur considérable de ces vases, pour augmenter leur surface & leur ouverture. La théorie des chaudronniers pour faire des chapiteaux d'étain, n'a point encore passé dans les verreries dont les chapiteaux ressemblent aux têtes de mort des anciens alambics, & ont les mêmes défauts. Ils portent une rigole qui se termine à l'extérieur par un chal de verre vers un angle plus ou moins aigu. Ils n'ont point un réfrigérant comme les alambics de métal, parce qu'autre qu'il seroit d'une exécution difficile, il ne pourroit point servir, à moins qu'on n'y mit de l'eau peu différente en température au gaz de l'intérieur; sans cela il se feroit une fracture. C'est donc l'air seul qui sert ici de réfrigérant, & dans l'hiver il est même plus que suffisant, car il fait souvent casser le chapiteau, parce que le verre est un mauvais conducteur de chaleur.

C'est l'alumine ou *argile* qui fait la base des cucurbites de terre; elle y est toujours combinée avec une portion de silice plus ou moins grande; il y a aussi quelques atomes d'autres terres & d'oxide de fer; mais c'est fort peu de chose, & leur présence n'est qu'accidentelle: leur bonté dépend de trois choses essentielles; 1°. la division & le mélange exact des matières; 2°. leurs quantités réciproques; 3°. la cuisson. La division des

matières donne une pâte fine & qui fournit un vase compact & sans de grands pores, comme la plupart de ces vaisseaux; leur mélange exact fait une pâte identique dans toutes les parties, & quand elle est cuite, elle est moins sujette à casser. Une juste proportion donne un léger degré de fusibilité, par lequel les molécules de la matière se collent, s'unissent plus intimement, & il en résulte des vases plus denses. Il faut bien prendre garde de pousser cette propriété trop loin, car il se formeroit une espèce de verre qui seroit trop fragile: la cuisson consiste dans un degré moyen; trop forte elle rend les vases cassans, & trop foible elle les laisse poreux: c'est ce dernier défaut qui est le plus commun dans ces vaisseaux.

Ces alambics sont employés à plusieurs usages particuliers, & sur-tout à distiller des matières qui ne s'élèvent point en vapeurs à la chaleur de l'eau bouillante, tels que les acides, &c. C'est toujours ou presque toujours à la chaleur du bain de sable qu'on les expose. Il y a quelquefois de l'avantage à s'en servir en place de cornues, quand ils sont bons, & qu'ils retiennent l'air comprimé, pour faire des acides, & sur-tout de l'ammoniaque, parce qu'elles peuvent servir plusieurs fois, en présentant la facilité de retirer le résidu de l'opération, tandis qu'on est obligé de casser les cornues à chaque distillation. A l'article INSTRUMENTS, on indiquera les moyens de fabriquer des alambics de terre meilleurs que ceux qu'on vend à Paris; car dans de grands travaux chimiques, il y a beaucoup d'avantages à préparer soi-même les instruments.

Les alambics de verre ressemblent parfaitement à ceux que l'on vient de décrire; ils en ont tous les inconvéniens, & ils n'en diffèrent que parce qu'ils sont tout en verre; ils ont cependant un grand inconvénient de plus qu'eux, c'est qu'ils sont extrêmement épais, & qu'ils portent à leur fond quatre ponts qui ne permettent pas d'élever leur température beaucoup au-dessus de l'eau bouillante, aussi est-ce presque toujours au bain-marie qu'on les expose. On s'en sert cependant quelquefois pour faire des sublimations de matières qui demandent pour cela une chaleur plus forte que l'eau bouillante; mais il est bien rare que ces vaisseaux soient conservés. On peut cependant les exposer au bain de sable, en modérant la chaleur. Nous n'insisterons pas davantage sur les usages de chacun de ces vases, ils seront énoncés dans les opérations où ils servent (1). (M. VAUQUELIN.)

ALANA (*Pharmacie.*) Les anciens désignaient sous ce nom, une espèce de terre que l'on tiroit d'Alana, ville d'Egypte. Paul d'Égine, dans son catalogue des substances médicamenteuses, indique

sous le nom d'*alana bolus*, ou *alana terre*, une espèce de bol ou terre bolaire, à laquelle il attribue les mêmes propriétés qu'au bol d'Arménie: on trouve encore aujourd'hui dans le commerce, sous le nom d'alana, mais plus ordinairement sous celui de tripoli, une espèce de pierre légère tendre, tirant sur le rouge, & qui paroit avoir été touchée par le feu des volcans, ou quelque autre feu souterrain.

Des écrivains qui attribuent à toutes les substances de la nature quelques propriétés médicinales, n'ont pas hésité de dire que l'alana ou tripoli étoit désertif, délicat, altringent; mais cette terre n'est d'aucun usage en médecine; plusieurs ouvriers l'emploient pour polir leurs ouvrages, & elle ne peut servir en pharmacie, qu'à nettoyer les mortiers.

ALATERNE. (*Pharmacie.*) *Rhamnus Alaternus* Linnei. C'est un charmant arbrisseau toujours vert, qui est souvent à feuilles joliment panachées, plus propre à décorer les jardins des curieux, qu'à fournir de médicaments les pharmaciens. Les anciens simpliciistes assurent que les feuilles & les jeunes branches de l'alaterne font détersives, rafraichissantes & altringentes; on en prescrit l'infusion en gargarisme pour les inflammations de la bouche & l'angine. Ses baies font modérément altringentes, la décoction de sa racine a été mise en usage par quelques-uns contre la vérole. Le bois peut servir à faire de jolis ouvrages d'ébénisterie. On employe en Portugal la décoction de l'écorce pour colorer les bois: les feuilles & les jeunes branches doivent être recueillies pour l'usage de la médecine, en juin, juillet & août. Nous cultivons l'alaterne à feuilles panachées depuis long-temps dans notre jardin botanique nous ne l'avons vu fleurir qu'une fois, il a donné des baies rouges, solitaires. Il faut encailler cet arbrisseau l'hiver, & le renfermer dans une orangerie; il est indigène à toute l'Europe australe, la culture n'en est pas difficile. (M. WILLEMER.)

ALATION, ou encore mieux **HALATION**, (*Pharmacie.*) mot grec, & adopté par quelques anciens médecins & pharmacologues, pour désigner une espèce de remède composé de sel & de substances aromatiques. (*Voyez* à la lettre H. pour ce mot & quelques autres analogues.

ALAUAT ALGALIC (*Pharmacie.*) Dénomination des arabes pour désigner le nitre ou nitrate de potasse. (RULAND.)

ALBA TTECHA, ALBATECHE, & quelquefois **BATECHA.** (*Pharmacie.*) Dénomina-

(1) On n'a point indiqué de figures dans cet article, parce qu'elles le font déjà dans celui de M. Guyton; & sur-tout parce qu'on en trouvera une explication détaillée dans le volume des planches. Il faut consulter la division des planches de chimie, qui a pour titre: *Instruments & fourneaux.*

nion employée par Mésué, & que l'on retrouve dans un grand nombre d'écrivains Arabes & d'anciens dispensaires, pour désigner une des quatre grandes semences froides c'est selon Joubert, Bauderon, & le plus grand nombre des Pharmacographes, la semence du melon, & suivant Jacques Monard, celle de concombre.

ALBATRE. En considérant chimiquement l'albâtre, on reconnoît que les deux espèces qu'on distingue en minéralogie, sont aussi deux espèces de composés distincts. L'albâtre proprement dit, est du carbonate de chaux; l'albâtre gypseux est du sulfate de chaux. Ces deux sels terreux n'ont de particulier, & ne diffèrent d'avec les autres espèces ou variétés connues & distinguées par les minéralogistes, que par la forme & par le tissu. Souvent l'une & l'autre espèce d'albâtre est mêlée & râchée par des oxydes de fer; le premier donne de la chaux vive & le second du plâtre, cuit par l'action du feu. Les ouvrages, les vases, les statues fabriquées avec ces deux espèces d'albâtre, doivent être soigneusement garantis du contact des acides. Ils sont très-tendres, & se rayent par les pierres dures, les métaux, le frottement réciproque; un coup brusque, une chute ou un choc quelconque les brise facilement. On en fait aisément l'analyse par l'eau qui en sépare quelques sels solubles lorsqu'ils en contiennent, par le feu qui donne dans chacun un produit calciné différent, par le charbon qui réduit l'albâtre gypseux en un sulfure, & qui ne produit rien sur l'albâtre calciné, par les acides qui dissolvent facilement ce dernier avec effervescence & qui ne font ordinairement rien sur l'albâtre gypseux. Voyez les mots CARBONATE DE CHAUX & SULFATE DE CHAUX.

ALBATRE. (Pharm.) Cette pierre dont on distingue aujourd'hui deux espèces, l'une gypseuse, l'autre calcaire, a été employée comme médicament, & est encore inscrite dans quelques dispensaires modernes, au nombre des substances officinales. Les anciens faisoient usage de l'albâtre non-seulement à l'extérieur, mais encore pour l'intérieur, & ils ne l'employoient jamais qu'après l'avoir exposé plus ou moins long-temps à l'action du feu; de sorte que par cette préparation, l'albâtre approchoit plus ou moins de l'état de chaux ou de plâtre, ce qui dépendoit de la nature de ses parties constituantes, & du degré de feu auquel il avoit été exposé; cependant suivant Galien & Paul d'Egine, quelques uns donnoient l'albâtre brûlé & délayé dans une boisson, à ceux qui étoient sujets aux maux d'estomac; Etmmüller, dans ses notes sur la pharmacopée de Schroder, ne craint pas même de dire que l'albâtre brûlé ou calciné, a les mêmes vertus que le plâtre, & que pris à la dose d'une once, il est un remède éprouvé pour arrêter la dysenterie; mais c'est principalement contre les maladies extérieures, & comme to-

Chimie. Tome II.

pique, que l'albâtre a été employé. Dioscoride, & après lui Oribase, disent que l'albâtre brûlé & mêlé avec de la résine ou de la poix, amollit & dissout toutes les duretés; qu'il incorpore avec du cérat & appliqué sur la région de l'estomac, il modère les douleurs de ce viscère, qu'il fortifie les genévives; on a fait aussi avec l'albâtre un onguent qui se trouve décrit dans plusieurs pharmacopées sous le nom d'onguent d'albâtre, ou onguent alabastrin. Jean Langius, qui vanitoit beaucoup cet onguent contre toutes les affections inflammatoires & douloureuses, qui le regardoit sur-tout comme très-efficace dans les maladies des yeux, & qu'il s'en étoit servi avec succès dans une blessure grave de l'œil, donne, d'après l'Isenevenerius, la formule suivante pour la composition de cet onguent.

Prenez albâtre en poudre fine,	2 livres.
Huile rosée de Mésué,	1 livre.
Cire neuve,	2 onces.
Vin blanc odorant,	8 livres.
Fleur de camomille,	1 livre.
Tiges de ronce,	1 poignée & dem.
Rhue,	4 poignées.
Fenouil,	4 onces.

Après avoir pilé les herbes, faites bouillir le tout dans un vase de verre sur un feu doux jusqu'à la consommation du vin; alors versez le tout dans un mortier chaud, ajoutez-y douze blancs d'œufs, & broyez toute cette masse pendant huit heures. Après ce temps exprimez fortement à travers un gros linge, & lorsque l'onguent est refroidi, s'il y est resté quelque humidité, elle s'amassera au bas, & on la séparera.

Langius ne bornoit pas l'usage de cet onguent aux affections extérieures, il le recommandoit aussi en forme de bols, contre la toux, la colique; il s'en servoit encore pour faire des frictions dans les douleurs arthritiques, &c. Cependant malgré tant d'éloges, cet onguent n'est plus employé aujourd'hui.

Lemery & quelques autres pharmacographes, donnent une autre formule pour la composition de l'onguent alabastrin; mais ces préparations ne sont point employées de nos jours, & si l'albâtre pouvoit avoir quelque propriété dans un onguent, il seroit infiniment plus simple de le réduire en poudre très-fine, & de l'incorporer avec un cérat ou quelque autre composition analogue.

Il ne faut pas confondre avec l'onguent alabastrin, une autre composition décrite par Nic. Myrepsus, sous le nom d'onguent alabastrin; dans cet onguent, décrit par Myrepsus, il n'entre point d'albâtre, il se prépare seulement avec une décoction de plusieurs plantes mucilagineuses, amères, astringentes, aromatiques, auxquelles on ajoute des graisses, plusieurs sortes de résines, & que l'on fait bouillir jusqu'à l'évaporation de toute humidité; il est vraisemblable que cet

onguent avoit été nommé *alabastron*, parce qu'on le conservoit dans un vase d'albâtre, que les anciens recommandoient expressément pour les onguens qui contenoient des substances aromatiques.

ALBIR. (*Pharmacie.*) Mot que l'on trouve dans quelques écrivains arabites, & par lequel ils désignent une résine ou baume qu'ils disent découler de l'if.

ALBOTAR, ALBUHAR & ALFITAS. (*Pharmacie.*) Dénominations employées par les arabites pour désigner la céruse.

AUBOTINE, ALBOTAI, ALBOTRA, ALBUHEN, ALTILIBAT. (*Pharmacie.*) Mots synonymes employés par les arabites & les premiers écrivains de pharmacie, pour désigner la térébenthine. (RULAND & JOHNSON.)

ALBUGINE DE CORAIL. (*Pharmacie.*) Quelques écrivains, amateurs du merveilleux, ont donné ce nom au précipité blanc, que l'on obtient en versant, peu-à-peu, une solution de carbonate de potasse (ou huile de tartre par défaillance) dans une dissolution de corail par l'acide acétique ou vinaigre; ce précipité étoit encore désigné sous le nom de *magistère de corail*, & on lui attribuoit de grandes vertus; mais cette préparation, ainsi que beaucoup d'autres de semblable nature, que l'on trouve dans les anciens dispensaires, sous les noms pompeux de *magistère de perles*, d'*yeux d'écrevisse*, de *corne de cerf*, n'est guère qu'une terre calcaire ou carbonate de chaux, qui peut tout au plus être conseillée comme absorbant dans quelques cas, & n'est plus employée de nos jours.

ALBUM. (*Pharmacie.*) Mot latin qui signifie blanc, & qui est souvent employé pour désigner & distinguer plusieurs compositions pharmaceutiques qui ont de la blancheur; ainsi on trouve dans Galien, (lib. 2 de antidotis.) sous le nom d'*album kufili*, la description d'un emplâtre dont on faisoit usage contre les morsures du chien enragé; il étoit composé de cire, de litharge, de céruse, de moelle de cerf, de mirbe, d'encens & d'huile; non-seulement il falloit en appliquer sur la plaie, mais encore il falloit en faire prendre chaque jour au blessé une pilule de la grosseur d'une noisette.

Paul d'Egine décrit, sous le nom d'*album diarrhodon*, un collyre pour les yeux; Celle, ainsi que tous les anciens médecins & pharmacographes, employoient souvent cette épithète pour distinguer différentes espèces de compositions pharmaceutiques, & nous avons encore beaucoup d'onguens, d'emplâtres, de looqs, de décoctions, limimens, &c., désignés sous le nom d'*album*.

La céruse ou oxide de plomb par l'acide acéteux, étoit nommée, par quelques anciens, *album*; ou, comme le veut Fallope, *album hippuricum*.

Nous trouvons encore dans ces anciens dispensaires, sous le nom d'*album*, deux substances d'une nature fort singulière. L'une, désignée sous le nom d'*album gracum*, *album canis*, & quelquefois *nilhil album*, *floodium gracorum*, *cynoporus*, étoit la siente du chien, que l'on recueilloit avec soin, & que l'on conservoit précieusement dans les pharmacies, comme un remède excellent; la superstition, la crédulité, qui avoit fait attribuer à cette substance une infinité de vertus médicales, avoit prescrit des règles pour l'obtenir; il falloit enlever le chien, le nourrir seulement avec des os de jeune veau, lui donner peu de boisons; & enfin, pour que l'*album gracum* eût toutes ses vertus, il falloit le ramasser au mois de juillet, dans le commencement de la canicule, sous le signe du lion; il falloit le laver avec une eau distillée, telle que l'eau de rose, de plantain, comme l'indiquent quelques-uns, ou avec l'eau de bourbe à pisseur, comme le prescrit le codex de Paris, qui met encore l'*album gracum* au nombre des substances officielles; enfin, on le faisoit dessécher en l'exposant au soleil, ou à l'étuve. Ainsi, ramassé & préparé, l'excrément du chien étoit blanc, léger, friable, & sans odeur fétide; ce n'étoit guère autre chose que la terre des os, ou phosphate de chaux mélangé avec quelques parties muqueuses provenant de la digestion, de la sécrétion de la bile, & du mucus intestinal. Quoi qu'il en soit, les anciens employoient cette substance, intérieurement & extérieurement, contre un grand nombre de maladies très-différentes; ils la mettoient avec des huiles, des céras, pour en faire des frictions sur le ventre des hydropiques; ils la faisoient entrer dans des emplâtres pour amollir les tumeurs dures & indolentes. Ils la précipitoient dans des potions, des bols, des décoctions; ils la délayoient dans du lait, dont ils recommandoient l'usage contre la colique, l'épilepsie, la dysenterie, les hémorrhagies utérines, &c. Galien dit avoir éprouvé dans deux cas combien ce remède étoit admirable contre les ulcères extrêmement malins. ! iscoride, Paul d'Égine, Aetius, Cribase, & après eux un grand nombre de médecins de tous les pays, en ont également vanté les vertus pour la guérison des ulcères les plus rebelles. Mais c'est principalement contre les inflammations, & sur-tout celles de la gorge, qu'ils en vantoient l'efficacité.

Ainsi l'*album gracum* étoit alors employé sous toutes les formes; ils en préparoient des gargarismes, des cataplasmes; ils en souffloient la poudre dans le fond de la gorge, & lui attribuoient sur-tout la vertu de faire ouvrir promptement les abcès; & de nos jours un homme

célèbre, le grand Linnéus, dans ses aménités académiques, n'a pas craint de dire que cette substance étoit un excellent maturatif.

La seconde substance, désignée sous le nom plus ridicule encore d'*album ni-ram* ou *muferda*, étoit les crottes de souris; on leur attribuoit aussi beaucoup de vertus; on les regardoit sur-tout comme un remède propre à lâcher le ventre, aussi on les faisoit prendre en forme de pilules, on en faisoit des suppositoires avec le miel, on les faisoit entrer dans les clystères, &c. lorsqu'il s'agissoit de purger les enfans on en mettoit une crotte ou deux en poudre dans leur bouillie, ce qui, suivant *Estmuller*, les purge doucement & bien; mais malgré tant d'éloges, répétés par tant d'écrivains crédules & peu attentifs, toutes ces médecines féroce-ment sont entièrement bannies, &c. avec juste raison, de nos Pharmacies; ce n'est que pour faire connoître l'histoire de l'art & ses progrès, que nous sommes entrés dans ces détails.

ALBUMEN. On a emprunté ce mot du latin, pour désigner la matière du blanc de l'œuf, & il est devenu d'un usage assez général pour le regarder comme français; mais ce n'est pas seulement pour exprimer en particulier le blanc de l'œuf, qu'on l'emploie aujourd'hui. Depuis que l'analyse chimique d'un grand nombre de substances animales a fait reconnoître dans beaucoup de ces substances des propriétés toutes semblables à celles du blanc de l'œuf, on a adopté le mot *albumen*, pour désigner cette matière dans quelque corps qu'on la considère, à quelque humeur ou à quelque partie des animaux qu'elle appartienne. Cependant ce mot est peut-être trop latin; sa terminaison, sa signification propre appliquée de tout temps au blanc d'œuf proprement dit, semblent exiger qu'on ne s'en serve pas pour exprimer toute matière analogue, & sur-tout pour désigner un genre de substance caractérisée par un ensemble de propriétés constantes & particulières; aussi les chimistes modernes ont-ils presque toujours employé l'espèce de périphrase *matière albumineuse*, pour indiquer ce genre de substance; mais dans la marche sévère & méthodique de la nomenclature moderne, il n'est plus permis de se servir de deux mots, l'un vague & indéterminé, l'autre sous forme d'adjectif, pour nommer un corps; nous adopterons donc le mot *albumine*, qui répondra par sa terminaison, à celui de gélatine déjà adopté, pour désigner un des matériaux du corps des animaux. Voyez ALBUMINA.

ALBUMEN. (*Pharmacie.*) Quoique ce mot soit purement latin, & employé par tous ceux qui ont écrit en cette langue pour désigner le blanc d'œuf, cependant aujourd'hui ce mot est généralement adopté dans notre langue pour désigner un fluide d'une nature particulière, & qui paroît propre aux êtres orga- nisés. Ce fluide très-abon-

dant dans les animaux, se trouve aussi dans plusieurs végétaux, & il se présente sous différens états. Quelquefois il est délayé avec différens fluides, ou combiné avec d'autres substances; d'autres fois il est pur & seulement contenu dans un tissu cellulaire très-fin, alors il est diaphane, il a peu de saveur, il a une consistance épaisse, visqueuse, filante, il est soluble dans l'eau, il verdit le syrop de violette, &c. les papiers colorés avec les pétales des fleurs bleues, parce qu'il contient du carbonate de soude. Si on l'expose à une chaleur de quatre-vingt degrés au thermomètre de Reaumur, il devient blanc, opaque, &c. concret; l'affusion de l'alcool & des acides concentrés, lui donne dans l'instant la même opacité, la même consistance; ainsi, concret ou durci, comme on le dit ordinairement, l'albumen n'est plus soluble dans l'eau; mais il se dissout très-bien par les alcalis, &c. sur-tout par l'ammoniaque; l'alun- men passe aussi à la putréfaction, mais sans acidité, &c. lorsqu'il est mélangé ou dissous dans un fluide, il s'en sépare en flocons blanchâtres à la chaleur de l'eau bouillante; enfin, outre toutes ces propriétés si distinctives, il a des affinités particulières avec différentes substances, ce qui le rend d'un usage important dans quelques préparations pharmaceutiques.

C'est dans les œufs des oiseaux que nous trouvons l'albumen en plus grande quantité; il forme la plus grande partie de la masse de l'œuf, &c. en entoure le jaune de tous les côtés; mais quoi- qu'essentiellement le même, ce fluide albumineux, que l'on nomme ordinairement le blanc d'œuf, est partagé en deux couches très-distinctes; l'une, extérieure, placée immédiatement sous l'enveloppe membraneuse commune, est une humeur séreuse, coulante, très-limide; l'autre, intérieure, qui entoure immédiatement le jaune &c. y adhère fortement, a plus de consistance, plus de tenacité que la première, & si on ouvre un œuf avec précaution, si on le place sur une assiette, on voit ces deux couches très-distinctes, l'une coule &c. s'étend presque comme de l'eau; l'autre s'étend peu, conserve en partie sa forme, sa disposition première autour du jaune. Enfin, si on les bat ensemble, on ne réussit pas à les mêler. Ces différences annoncent assez une disposition particulière: en effet, examinant avec attention la couche intérieure de l'albumen, on reconnoît que ce fluide, de même que le corps vitré de l'œil, est parsemé d'une grande quantité de filamens &c. de lames cellulaires, diaphanes, très-fines, &c. dont la disposition lui donne cette forme, cette consistance particulière, cette adhésion qu'il a autour du jaune; il paroît aussi contenir moins d'eau que la couche extérieure. Quoi qu'il en soit, l'albumen des œufs est employé en pharmacie pour clarifier les syrops, les sucres des plantes, &c. (*Voyez CLARIFICATION.*) Il est aussi employé comme excipient de différentes substances

pour former des pâtes, des tablettes, des trochisques, & quelques autres préparations pharmaceutiques. (Voyez Ours.) Les anciens mettoient souvent l'albume de l'œuf avec du bol d'Arménie, de la farine, des poudres de roses, de myrrhe, de sarcocolle, ou quelque autre semblable, pour former des frontaux, des cataplasmes défensifs; ils en imbibotent aussi des étoupes, des compresse, dont ils environnoient les membres fracturés; & ces appareils, en se desséchant, formoient une sorte d'étui, moulé sur la partie, qui maintenoit les pièces fracturées d'une manière ferme & mébranlable.

Ce procédé est encore employé de nos jours dans quelques cas particuliers de fracture, où l'application d'un bandage roulé ne peut avoir lieu.

Plusieurs chirurgiens employent encore l'albume d'œuf, soit seul, soit battu avec de l'eau de roses, ou de l'eau de chaux, dans quelques cas de brûlures; ils trouvent que cette application est un adoucissant, un rafraîchissant, & forme une sorte de vernis qui garantit du contact de l'air la surface des blessures. J. L. Petit se servoit de l'albume de l'œuf pour tremper les sondes, les tenettes, & les autres instrumens qu'il étoit obligé de porter dans une blessure; il le présentoit à l'huile rosée, que les chirurgiens employent ordinairement pour cet objet; Plencq, dans sa pharmacie chirurgicale, décrit, sous le nom d'albume, les deux préparations suivantes.

Albume Alumineux.

Prenez sulfate d'alumine un gros, réduisez-le en poudre fine dans un mortier de marbre, alors ajoutez-y deux blancs d'œufs frais, & versez, peu-à-peu, en triturant une once d'eau de roses; ce mélange devient bientôt opaque, blanc, écumeux, & en continuant la trituration pendant quelques minutes, il forme une sorte de coagulum, & prend la consistance d'un liniment. Quelques-uns, pour faire cette préparation, se contentent de prendre un morceau de sulfate d'alumine, qu'ils agitent dans un blanc d'œuf jusqu'à ce qu'il ait acquis une certaine consistance.

Cette préparation n'est pas une simple mixture déterminée par l'action mécanique de la trituration; mais il y a une décomposition manifeste que nous aurons occasion de faire connoître en exposant la théorie de la clarification des sucs & des syraps. (Voyez CLARIFICATION.)

Quoi qu'il en soit, ce coagulum alumineux étoit fort recommandé par les anciens; ils l'employoient en forme de cataplasme ou de liniment qu'ils étendoient sur du linge, ou sur de la charpie, & qu'ils appliquoient sur les contusions, les blessures; ils regardoient ce topique comme un défensif, un antiphlogistique, un résolutif excellent; ils en vantoient sur-tout l'efficacité dans le traitement des maladies des yeux, contre les ophthalmies humides, les plaies de la cornée,

& à la suite de l'opération de la cataracte. Mais comme ce topique, en se desséchant, a l'inconvénient de coller les cils, de durcir les lèges qui en sont imbibés, on en a entièrement abandonné l'usage, quoique plusieurs écrivains assurent qu'il étoit également efficace contre les fluxions des yeux en l'appliquant aux tempes, & même à la nuque.

Albume Spiritueux.

La seconde préparation que Plencq décrit sous le titre d'*albume spiritueux* & que d'après les principes de la nomenclature méthodique nous nommons *coagulum albumineux par l'alcool*, se fait en prenant deux blancs d'œufs frais que l'on bat & triture dans un mortier de pierre, en y versant peu-à-peu deux onces d'alcool foible; après quelques minutes de trituration le mélange devient blanc, opaque, prend la consistance d'une sorte de liniment; ce coagulum albumineux est fort recommandé pour prévenir les excoriations qui arrivent aux personnes qui restent long-temps couchées & dans la même attitude; on se prescrit de frotter avec ce liniment les parties fatiguées par la pression, & d'appliquer dessus un linge fin trempé dans ce liniment; mais le meilleur moyen de prévenir les excoriations & les ulcérations que la continuité de la pression peut produire, c'est de changer l'attitude de ses malades, de laver les parties fatiguées avec de l'eau fraîche, dans laquelle on ajoute, suivant les circonstances, un peu de vinaigre ou d'alcool, ce qui suffit pour rendre le ton à la peau & y rétablir la transpiration.

Lemery dans sa pharmacopée, donne la formule d'un syrop de blancs d'œufs (*Syraps de albuminibus ovorum*). Pour faire ce syrop on prend l'albume de huit œufs frais que l'on bat dans une bassine avec trois livres d'eau; on y ajoute ensuite deux livres de sucre; après avoir fait bouillir le mélange, on le passe par une chausse & on continue la cuisson jusqu'à consistance de syrop; mais il est évident que par l'ébullition l'albume se coagule entièrement, & s'il reste dans ce syrop quelque partie fournie par les blancs d'œufs, ce ne peut être qu'une très-petite quantité de carbonate de soude.

Nous finissons cet article en observant que l'albume de l'œuf exposé à une chaleur très-douce, perd peu-à-peu l'eau qui lui donnoit la fluidité visqueuse, qu'il se dessèche & forme une sorte de gomme brillante, transparente, & d'une couleur légèrement ambrée. Pendant les beaux jours d'été on obtient facilement cette dessiccation, en mettant sur une assiette de porcelaine ou de fayence l'albume de cinq ou six œufs au plus, que l'on expose aux rayons du soleil; en peu d'heures l'albume est parfaitement desséché, on le détache de l'assiette avec l'extrémité d'une spatule; & on le conserve à l'abri de l'humidité, dans une boîte ou dans un bocal de verre.

Ainsi desséché l'albumen est une sorte de gomme animale qui se dissout facilement dans l'eau fraîche, sur-tout à l'aide de la trituration. Mais quelque exacte qu'ait été la trituration, on voit nager dans cette solution une grande quantité de petits flocons blanchâtres qui en troublent la transparence. Le filtre retient ces flocons qui ne me paraissent autre chose que les débris des filaments vasculaires & des lames cellulaires qui donnoient à la seconde couche de l'albumen cette forme, cette tenacité qui lui est particulière. La liqueur filtrée est diaphane, légèrement colorée ; sa faveur approche de celle du petit-lait ; mais avec cette différence essentielle, qu'elle altère en verd les couleurs bleues des végétaux.

Cette solution de l'albumen de l'œuf peut être employée en pharmacie pour la clarification des sucres & des syrups ; en y ajoutant un peu de sucre & quelque eau aromatique agréable, on pourroit peut-être la prescrire avec avantage dans quelques cas de maladie, lorsqu'il s'agit de donner une boisson adoucissante & nutritive ; elle nous paroît plus propre à cet objet que la simple dilution du blanc d'œuf frais employée par quelques praticiens ; parce que dans cette solution l'albumen est séparé de ces filaments vasculaires, de cette enveloppe cellulaire qui présente quelque fois de la résistance à l'action des sucres digestifs de l'estomac.

L'albumen desséché peut aussi être dissous dans différentes eaux distillées ou décoctions pour les cautères ; on peut en former des poudres nutritives ; on peut s'en servir comme des gommés adragane & arabique, pour la solution du camphre & des résines.

ALBUMINE. (*Article important pour la Chimie & la Physique animales.*) L'albumine, (mot nouveau dont l'adoption est fondée sur les raisons exposées dans un des articles précédens, est une matière composée organique, fort abondante dans les animaux, & qu'il est nécessaire de considérer comme formant un genre bien distinct parmi les composés dits à l'organisation. Le blanc d'œuf nommé *albumen* par les latins, est pour ainsi dire le chef ou la première des espèces de ce genre, celle que l'on a d'abord examinée avec plus de soin, & dont l'analyse a conduit à faire reconnaître l'analogie frappante qui existe entre lui & beaucoup d'autres substances animales. Le liquide fort abondant qui se sépare du sang caillé, & qu'on nomme *serum*, la matière plus ou moins épaisse & même concrète de l'humeur vitrée & de la lentille cristalline, une grande partie de l'humeur blanche qui se meut dans les vaisseaux lymphatiques ou absorbans, l'eau amassée dans les cavités divorcées du corps distendues par l'hydropisie, sont les principales espèces de ce genre, ou pour s'exprimer avec plus d'exactitude, contiennent une très-

grande quantité d'albumine ; la plupart des organes membraneux & blancs, & sur-tout les parois des viscères creux, contiennent plus ou moins d'albumine concrète ; enfin on en trouve jusques dans les fucs des végétaux. Cette abondance doit donc porter à croire que cette substance forme un des matériaux les plus importants à connaître des corps organisés, & engages à en examiner toutes les propriétés avec la plus grande attention. En se livrant à cet examen, il faut se souvenir que, quoiqu'on la considère comme un genre dans cet article, & qu'on doive l'envisager, abstraction faite de telle ou telle substance qui la contient, on peut cependant, pour ne point s'attacher trop strictement à une abstraction, rapporter toutes les propriétés qu'on va décrire, au blanc d'œuf en particulier, celle de toutes les matières animales qui contiennent l'albumine la plus pure & la plus à nud en quelque sorte.

1°. L'albumine est le plus souvent sous la forme d'un liquide plus ou moins visqueux, collant, comme gommeux, d'une couleur blanche, tirant sur le jaune, d'une faveur légèrement salée ou un peu âcre, lorsqu'on la goûte avec beaucoup d'attention.

2°. Elle verdit constamment la teinture & le syrop de violettes ; elle fait repaître au bleu le papier teint avec du tournesol rougi auparavant par le contact des acides. Cette propriété dépend de la soudre qu'elle contient.

3°. La liquidité donnée comme un caractère de l'albumine, tient à ce qu'elle est toujours combinée avec une certaine quantité d'eau, dans les fluides dont elle fait la principale base ; mais lorsque par l'effet de la circulation & des autres fonctions qui constituent la vie, l'albumine est devenue partie intégrante des organes solides, alors elle est sous forme concrète ; elle ne peut plus être reconnue par ses propriétés physiques, sa faveur, sa consistance, &c. ; elle a même un peu changé de nature ; de sorte que pour en déterminer les autres caractères, il faut continuer à l'examiner sous la forme liquide.

4°. L'albumine éprouve de la part du feu, ou plutôt du calorique libre, de la chaleur, une action qui fait son caractère propre & distinctif ; lorsqu'on élève sa température au-dessus de quarante-cinq degrés & jusqu'à quarante-huit au thermomètre à mercure portant quatre-vingt degrés à l'eau bouillante, sa liquidité disparaît avec sa transparence ; elle devient blanche, opaque, concrète, solide ; on dirait qu'elle prend tout-à-coup la forme d'un tissu. En l'examinant pendant qu'elle est ainsi, ou qu'elle durcit, car c'est ainsi qu'on nomme ce phénomène, on voit des espèces de fibres se former ; mais bientôt lorsque la cuisson est complète, toute la masse est homogène, solide, blanche, cassante & fêlée dans sa cassure ; un grand floc en dégage de l'ammoniaque & une huile très-fétide, comme de

toutes les substances animales ; en la séchant lentement , elle devient transparente & caissante.

5°. Cette concrétion de l'albumine par la chaleur , est un des phénomènes les plus remarquables que présentent les matières animales , & a toujours fixé l'attention des sçavans qui se sont occupés du perfectionnement de la physique des animaux ; mais aucun d'eux jusqu'ici n'a connu la cause qui le produit. Je crois y être parvenu soit , par le raisonnement , soit par l'expérience. Voici la suite des raisonnemens qui m'ont guidé dans cette découverte , dans laquelle j'ai été aidé par M. Vanquelin mon élève. Nous observions que les blancs des œufs très-frais cuisent moins vite , & ne deviennent jamais si durs que des œufs pondus depuis quelques jours , que cette propriété de se durcir , croît comme le temps écoulé depuis la ponte , que l'air pénétrant à travers la coquille paroîtroit , en s'accumulant vers une des extrémités de l'œuf , se combiner peu-à-peu avec l'albumine , & augmenter sa disposition à se concréter par la chaleur ; que la fixation de l'oxygène dans cette matière pourroit bien être la cause de sa concrétisibilité ; qu'une élévation de température étoit nécessaire pour favoriser sa concrétion , comme cela a lieu dans beaucoup d'autres combinaisons de l'oxygène ; que des phénomènes très-analogues dans la physique animale , & sur-tout l'épaississement des liquides retenus à la peau , ou dans quelques cavités où l'air extérieur est admis , pourroient bien être dus à la même cause , tels en particulier que la formation du pus , la maturation de l'humeur lacrymale & nasale , &c. Conduits par cette série de conjectures probables , nous nous hâtes de mêler des oxides métalliques , sur-tout ceux qui ne tiennent pas beaucoup à l'oxygène , comme l'oxide de mercure rouge , avec l'albumine presque pure , ou le blanc d'œuf très-frais. En agitant ces deux matières , l'oxide de mercure devint promptement brun , l'albumine s'épaissit , & vingt-quatre heures après elle étoit devenue solide , tandis que l'oxide de mercure avoit pris une couleur presque noire. On voit ici que l'oxygène a quitté le mercure pour s'unir à l'albumine , & que celle-ci a pris la forme concrète , à mesure qu'elle a absorbé la base de l'air vital.

6°. Mais ce n'est pas par une température de quarante-huit degrés que l'albumine prend la forme concrète dans le corps des animaux , puisqu'une pareille température ne peut pas avoir lieu à l'intérieur de leur corps , sans coaguler toute l'humeur albumineuse qu'ils contiennent , & sans leur causer la mort. Cependant la formation & la séparation de la plupart de leurs organes exige la fixation lente de l'oxygène , dont la combinaison dans les liquides animaux paroît avoir lieu dans les poymons. (Voyez le mot RESPIRATION) c'est en circulant dans les vaisseaux sanguins & lymphatiques que l'albumine absorbe peu-à-peu l'oxygène ,

& se charge jusqu'au point de devenir concrète lorsqu'elle arrive dans les dernières ramifications vasculaires qui portent la nourriture aux solides. Ainsi l'albumine solide faisant partie des organes animaux , n'est pas tout-à-fait de la même nature que l'albumine pure ou liquide ; elle y est combinée avec une portion d'oxygène auquel elle doit sa forme concrète ; c'est l'albumine oxygénée.

7°. L'albumine liquide est dissoluble dans l'eau ; elle se dissout bien dans ce liquide froid & peu aéré ; lorsqu'on l'unit à de l'eau aérée , la dissolution ne s'opère qu'imparfaitement , & l'albumine qui étoit d'abord parfaitement transparente , forme quelques stries blanches , ou se trouble en totalité , suivant la quantité d'air contenue dans l'eau , & par la fixation de l'oxygène qui rapproche l'albumine de l'état concret. Cet effet a lieu bien plus promptement à l'aide de la chaleur ; cependant la proportion d'eau ajoutée dans ce cas , diminue la tendance à la concrétion , ou à la solidité , en écartant les molécules de l'albumine , & c'est ainsi qu'en barrant des blancs d'œufs avec près du moitié de leur poids d'eau , & en les cuisant ensuite , on obtient une masse beaucoup moins dure , que si l'on avoit fait cuire le blanc d'œuf tout seul. On peut , en forçant la quantité d'eau chaude , empêcher entièrement la concrétion de l'albumine , & rapprocher sa combinaison de l'état du lait écrémé , car on verra à l'article lait , que cette liqueur animale séparée du beurre , est formée en grande partie d'eau & d'albumine dans un état particulier. L'albumine oxygénée ou solide , n'est pas dissoluble dans l'eau.

8°. L'albumine même oxygénée est dissoluble dans les acides caustiques , comme le sont presque toutes les matières animales ; on ne connoît pas bien la nature de la combinaison formée entre les acides & l'albumine , on n'a même point encore apprécié l'action qui se passe entre ces corps. L'albumine liquide n'éprouve d'altération des acides caustiques liquides , & ne paroît se concréter par le contact des sels , que parce qu'ils développent une partie du calorique en s'y unissant.

9°. Tous les acides coagulent l'albumine ; mais c'est en grande partie en raison de la chaleur développée pendant que ces corps sont mis en contact ; voici quelques expériences que j'ai faites à ce sujet , & qui prouvent ce que je viens d'avancer. J'ai partagé le même blanc d'œuf en deux parties égales , j'ai ajouté à l'une de la dissolution de carbonate de potasse , & à l'autre de la potasse pure ou caustique ; l'acide sulfurique versé dans la première partie , n'a pas produit de coagulation , tandis que versé dans la seconde , il s'est formé un coagulum très-épais & d'une seule pièce. L'acide sulfurique mêlé à l'albumine liquide , en dégage beaucoup de calorique qui , en favorisant la combinaison intime de l'oxygène , en opère tout-à-coup la coagulation ; cet effet est encore augmenté par la potasse caustique qui dé-

veloppe beaucoup plus de calorique que ne seroit l'albumine seule : & d'ailleurs en absorbant l'acide sulfurique & en l'empêchant de se porter sur l'albumine, la potasse prouve bien que c'est la seule impression du calorique qui fait naître la concrétion. Lorsqu'on contraire on a mêlé le blanc d'œuf avec une dissolution de carbonate de potasse, l'acide sulfurique que l'on verse sur le mélange, en se portant sur le sel, en dégage de l'acide carbonique, qui enlève le calorique pour se réduire & se volatiliser à l'état de gaz ; l'albumine ne doit donc éprouver aucune altération, & elle reste en effet sans se coaguler.

10. L'effet de coagulation dont il est question dans le précédent numéro, n'est qu'une action générale dépendante de l'impression relative au calorique ; mais les acides exercent d'autres actions lorsqu'on les présente concentrés à l'albumine une fois coagulée ou oxygénée jusqu'à la concrétion. L'acide sulfurique concentré, la brûle & la charbonne, en lui faisant répandre une odeur infecte. L'acide nitrique en dégage à 15 degrés de température du gaz azote ; en chauffant davantage le mélange, il forme de l'acide prussique qui se volatilise en gaz reconnoissable par son odeur d'amandes amères ; ensuite il en sépare une portion de charbon, qui uni à son oxygène, forme du gaz acide carbonique ; dès que le dégagement de ces deux acides a eu lieu, l'albumine est déjà singulièrement changée de nature ; ses principes constituans ne conservent plus le même ordre, & surtout la même proportion dans leur composition : il résulte de ce changement d'un côté de l'acide oxalique, qui on peut même faire cristalliser, & qui étoit d'abord dissous dans l'acide liquide ; de l'autre une matière grasse ou huileuse, qui nage dans la liqueur, & qui est d'une couleur citrine ; l'acide muriatique ne fait rien sur l'albumine ; l'acide muriatique oxygéné la coagule très-promptement, & confirme par cette action rapide, la propriété épaississante due à l'oxygène.

11. Si après avoir épaissi ou coagulé l'albumine par les acides que l'on vient de citer, on délaye le coagulum dans l'eau, on filtre la liqueur, & on l'évapore, on retire des sels à base de soude, du sulfate, du nitrate, ou du muriate de soude ; c'est ainsi qu'on prouve l'existence de la soude, déjà indiquée dans l'albumine par la couleur verte qu'elle donne aux violettes.

12. C'est encore au même sel, ainsi qu'au phosphate de soude & d'ammoniaque, que l'on trouve par l'analyse dans l'albumine, qu'est due la décomposition & la précipitation des sels neutres, calcaires & métalliques, produite par ce liquide animal. Les précipités métalliques entraînent avec eux une portion de l'albumine oxygénée & concrète.

13. L'eau de chaux opère aussi une précipitation dans l'albumine liquide, & il est facile de reconnoître ce précipité pour du phosphate de

chaux ; c'est en décomposant le phosphate de soude dissous dans l'albumine, que la chaux opère cette précipitation.

14. En évaporant lentement l'eau dans laquelle on délaye de l'albumine, après avoir obtenu cette dernière sous forme concrète par la chaleur, & l'avoir séparée de la lessive, on obtient quelques cristaux de muriate de soude. On observe souvent en traitant ainsi plusieurs espèces d'albumine, & entr'autres celle qui existe dans le sang dont elle constitue le serum, dans la chair musculaire d'où on la fait sortir par la pression, que la liqueur convenablement évaporée pour en séparer les sels cristallisables qu'elle contient, se prend en gelée en refroidissant absolument, comme le fait la décoction des parties molles & blanches des animaux, & sur-tout celle de la peau, des tendons, des ligamens, des parois des viscères creux ; ce phénomène ne doit être qu'indiqué ici, pour montrer que l'albumine liquide est souvent accompagnée d'une autre matière animale, très-importante également à connoître, que l'on extrait en très-grande quantité des substances animales molles, & dont l'histoire détaillée sera faite au mot **GELATINE**.

15. L'albumine paroît être, en dernière analyse, un composé de carbone, d'hydrogène, d'azote & d'une proportion diverse d'oxygène & d'eau, ainsi que de quelques sels phosphoriques. Les quantités variables d'oxygène & d'eau dépendent de l'âge & de l'état de santé des animaux ; elles produisent la concrécibilité ou la fluidité plus ou moins forte, plus ou moins prononcée de l'albumine ; ensuite que suivant l'ordre naturel, la première de ces propriétés est un des principaux agens de la nutrition rapide, & la seconde une cause d'arrêt ou de diminution dans cette fonction ; les vaisseaux absorbans la prennent toute entière dans le second cas, & n'en enlèvent que la partie la plus fluide & la moins concrécible, plastique, dans le premier cas. L'excès de l'une ou de l'autre de ces propriétés devient une cause de maladies chroniques, dont il sera sans doute permis de mieux apprécier les effets, à l'époque où la chimie sera plus avancée qu'elle n'est encore aujourd'hui, & plus répandue parmi les hommes utiles qui s'occupent de l'étude & du traitement des maladies.

16. Quoiqu'il soit certain que c'est par une suite de l'exercice des fonctions animales, & notamment par le travail de l'hématose dans les poulmons, que se forme l'albumine dans le corps des animaux, il paroît cependant que les agens organiques des végétaux peuvent aussi donner naissance à un composé fort analogue, puisque l'on trouve une matière albumineuse dans les suc de plusieurs plantes ; comme on le verra dans l'article suivant. Voyez, au reste, pour le complément des connoissances annoncées dans cet article, les mots, **LYMPHE, SANG, SUBSTANCES ANIMALES**,

ANIMALISATION, NUTRITION, RESPIRATION, TRANSPIRATION, ŒUFS.

ALBUMINE VÉGÉTALE. Les travaux des chimistes modernes sur les substances végétales, offrent aux philosophes qui méditent sur les progrès des sciences, deux résultats généraux également importants ; l'un est la découverte de plusieurs principes qu'on ne reconnoissoit point autrefois dans les plantes ; l'autre est l'analogie de plusieurs de ces principes avec les matières d'un autre règne, & sur-tout avec celles du règne animal. Le glutineux, trouvé par Beccari dans la farine de froment, est la première découverte qui a donné, pour-ainsi-dire, naissance à toutes les autres découvertes succellives ; ce savant avoit fait sentir que cette matière, déjà presque animalisée, annonçoit les plus grands rapports avec les substances animales, & rendoit nécessaire une comparaison chimique plus exacte entre les principes de ces deux règnes, que celle qui avoit été faite jusques-là. Rouelle, en parlant de plantes qui donnent de l'ammoniaque dans leur analyse par le feu, les a nommées plantes animales, & a bien déterminé par-là l'intention où il étoit de comparer les substances végétales à celles du règne animal. L'analogie trouvée & reconnue par un grand nombre de chimistes, entre les huiles végétales & les graisses animales, entre les émulsions & le lait, entre les mucilages fides & les gélées, entre le sucre végétal proprement dit & le sucre de lait, ne pouvoit que porter toutes les idées & tous les efforts vers un travail comparé dans l'analyse de ces deux classes d'êtres organisés. Ainsi, tandis que l'anatomiste & le physiologiste recherchoient & démonstroient de véritables rapports de structure & de fonctions entre les végétaux & les animaux ; pendant qu'une nouvelle espèce d'anatomie comparée découvroit une analogie dans la forme & les usages des organes des plantes avec ceux des animaux, la chimie trouvoit de son côté des analogies dans la nature des matériaux qui composent les corps de ces deux classes d'êtres, & confirmoit à sa manière leur association dans un seul règne connu sous le nom de règne organique ou organisé, opposé à la masse inerte, brute & inorganique des minéraux.

M. Berthollet vient encore d'ajouter à cette analogie entre les principes composans des végétaux & des animaux, en trouvant, il y a quelques années dans plusieurs parties des premiers, l'arote ou la base de l'ammoniaque & de l'acide nitrique, &c. qui est fixée en grande quantité dans les matières animales, & à laquelle ces dernières doivent, comme l'a démontré ce savant, la propriété de fournir de l'ammoniaque par l'action du feu, & de passer promptement à la putréfaction. Aussi les substances végétales, qui contiennent de l'arote, présentent-elles absolument les mêmes caractères ; telles sont le glut-

neux, la féculé verte, les semences cornées. J'ai déjà rassemblé dans un chapitre particulier de la troisième partie de mes Elémens de chimie, les points les plus évidens des analogies de nature & de composition que présentent les végétaux & les minéraux. C'est pour ajouter un trait de plus à ces analogies, que j'exposai ici une suite de faits sur la présence de la matière albumineuse, ou de véritable albumine, dans les végétaux. Je rappellerai d'abord ici les caractères chimiques de l'albumine animale. Une consistance souvent épaisse & filante, la saveur fade, la dissolution dans l'eau froide, la congéscibilité par la chaleur, la dissolubilité par les alcalis, & sur-tout par l'ammoniaque, se séparent de tous les liquides où elle est dissoute par la température de quarante-huit degrés, & à plus forte raison à celle de l'eau bouillante, passer à la putréfaction sans acidité, telles sont les propriétés qui caractérisent l'albumine. Les premières observations qui m'ont fait soupçonner, & bientôt reconnoître la présence dans les végétaux, sont relatives aux phénomènes de la défécation de leurs sucs exprimés. On fait que pour désécher les sucs de cochlearia, de creillon, de raisort, & de toutes les plantes antiscorbutiques, on plonge la bouteille qui les contient dans un bain-marie ; bientôt la féculé verte qui en troubloit la transparence, se prend en petits flocons durs & presque arrondis, qui viennent nager à la surface du liquide, & se séparent très-aïément par la filtration. Il est aisé de concevoir que sans la propriété de se coaguler par la chaleur, propriété qui appartient exclusivement à l'albumine, cette défécation ne s'opéreroit pas par la seule action du bain-marie ; mais ce premier aperçu devoit être confirmé par des expériences plus directes. La matière coagulée dans les sucs par le procédé indiqué, ne pouvoit pas être considérée comme de l'albumine pure, puisqu'elle étoit très-colorée, & entraînée avec elle la partie verte des sucs. Je suis parvenu à séparer ces deux substances, & à obtenir l'albumine végétale pure à l'aide du procédé suivant. J'ai pris deux livres de suc de creillon jeune, je l'ai filtré à froid, & immédiatement après l'avoir exprimé à travers un simple papier ; j'ai eu par ce moyen la féculé verte la plus grossière, & le suc a passé clair & encore d'un beau vert. Je l'ai exposé à l'air dans un vase très-plat ; le thermomètre marquoit ce jour-là vingt-trois degrés ; en deux heures le suc s'est troublé & a changé de couleur ; on y voyoit flotter une féculé, & le suc n'étoit plus alors que d'un vert-pâle. Il a été plongé en cet état dans un bain-marie d'eau bouillante ; après quelques minutes, il s'est troublé par la séparation & la coagulation d'une grande quantité de petits grumeaux blanchâtres. Une seconde partie de ce suc laissée à l'air, a présentée, au bout de deux jours, des flocons gris de la même matière ;

cnnia,

enfin, l'acide sulfurique a séparé d'une troisième portion de ce suc décoloré, des grumeaux assez solides de la même matière. Cette substance coagulée, bien séparée & lavée à l'eau distillée froide, a présenté toutes les propriétés de l'albumine animale. Les alcalis l'ont facilement & promptement dissoute; l'eau bouillante ne l'a point altérée, & lui a, au contraire, donné plus de solidité; elle m'a même offert une des propriétés de la véritable albumine animale, que je ne m'attendois pas à y trouver; c'est la couleur verte qu'elle a fait prendre aux teintures végétales, & spécialement à celle de mauve. J'ai dissillé deux gros de cette substance coagulée, séparée du jus de creffon; elle a fourni une quantité assez notable d'ammoniaque. Laisée avec un peu d'eau au contact de l'air chaud, elle s'y est gonflée, elle a bientôt exhalé une odeur ammoniacale très-fétide, & a donné tous les signes de la putréfaction la plus forte. On fait, d'après ce phénomène, pourquoi les sucs des plantes crucifères le corrompent si promptement, & l'on connoît la source de l'odeur infecte qu'ils répandent en se garant. On a fait sécher une portion de cette substance albumineuse retirée du suc de creffon, en l'exposant à l'air sec & chaud, après l'avoir bien égouttée dans du papier; elle a pris de la ductilité & de la transparence, comme une espèce de colle-forte.

Les sucs de chou & de cochléaria m'ont donné, par la chaleur, un coagulum albumineux, parfaitement semblable à celui du creffon.

La racine de parietaire présente, à l'égard de l'albumine qu'elle contient, un fait très-remarquable. On connoît en pharmacie, l'extract brun-rougeâtre, que fournit assez abondamment la racine de parietaire dans l'état parfait. Ayant eu une fois des racines de cette plante très-jeune pour en préparer l'extract, je les trouvai remplies d'une si grande quantité de suc, que je les fis réduire en pulpe & exprimer; le suc exprimé étoit presque sans couleur, il n'avoit point de saveur amère; en le soumettant à l'évaporation, on n'en obtint pas un atome d'extract; mais au lieu de ce principe, il s'en sépara une grande quantité de flocons blancs, concrets, semblables à ceux du fromage qu'on extrait du petit-lait pendant sa clarification; une partie de cette matière concrète se précipita au fond de la liqueur; une autre portion s'éleva en une écume considérable à la surface du suc, qui prit en même-temps, par les progrès de l'évaporation, la consistance mucilagineuse: ces flocons bien lavés, m'offrirent toutes les propriétés de l'albumine.

Une autre circonstance dans laquelle on observe facilement cette matière dans les végétaux, c'est l'analyse de l'eau du lavage de la farine de froment. On sait que pour extraire la matière glutineuse, on lave la pâte avec une grande quantité d'eau que l'on fait tomber en filet, ce li-

Chimie. Tome II.

quide entraîne avec lui la substance amillée, & laisse le glutineux dans la main de l'opérateur, ou sur le tamis qui sert à l'expérience faite plus en grand; l'eau s'éclaircit à mesure que l'amidon s'en précipite. Lorsque l'eau est bien claire, & filtrée à travers un papier Joseph, si on la fait bouillir, il s'en sépare des flocons blancs d'une matière concrète qui se déposent au fond du vase, & qui forment aussi une écume à la surface de la liqueur. Ces flocons blancs, recueillis avec soin & bien lavés, ont présenté toutes les propriétés de la matière albumineuse: ainsi, voilà deux substances animales contenues dans le froment; l'une, le glutineux analogue à la partie fibreuse des muscles des animaux; l'autre, semblable à l'albumine, qui existe en si grande proportion dans les liquides animaux.

Cette matière que nous avons indiquée déjà dans un assez grand nombre de végétaux, mais dont nous avons trouvé des traces dans un beaucoup plus grand nombre d'autres, existe en général dans toutes les plantes vertes, & dans toutes les parties molles & succulentes; il paroît qu'elle se condense, s'épaissit par le travail de la végétation, & qu'elle contribue à la formation de leurs parties solides. En effet, j'en ai obtenu des quantités notables des bois jeunes, des tiges vertes; mais le bois sec n'en donne plus sensiblement, parce que cette matière y a pris la consistance solide. C'est sans doute à son existence qu'est due l'odeur putride & manifestement ammoniacale que prend l'eau dans laquelle on a laissé infuser un bois quelconque; je suis d'autant plus porté à le croire, que je suis sûr, d'après mes expériences, que le bois flotté ne donne pas autant d'ammoniaque à la cornue que le bois neuf.

En recherchant la matière albumineuse dans tous les végétaux que j'ai eu occasion d'analyser depuis la première découverte, j'ai reconnu que toutes les substances végétales acides, & en particulier les fruits, ne contiennent pas un atome d'albumen, & qu'on y trouve au contraire constamment de la gelée: tels sont les sucs d'orange, de citron & de groseille, qui donnent une grande quantité de matière gélatineuse, & dans lesquels on ne trouve pas de trace de substance albumineuse: d'un autre côté, j'ai vu souvent l'albumine du sang former avec les acides nitrique, muriatique & acéteux, une espèce de gelée soluble dans l'eau, fusible par la chaleur, & coagulable par le refroidissement. Il seroit donc possible que l'albumine qui existe dans toutes les substances végétales jeunes & dépourvues d'acide, se convertit par la combinaison avec les acides, & à mesure que ceux-ci se forment par les progrès de l'âge & de la végétation, en substance gélatineuse.

M. l'houvenel a déjà présenté des idées analogues sur la gelée des matières animales; no-

C

pourroit-on pas croire, d'après cela, que toute gelée est une combinaison d'acide & d'albumine ? N'est-ce pas pour cela que tous les végétaux acides ne donnent point d'albumine, tandis que ceux qui contiennent de l'albumine ne donnent pas d'apparence d'acide ? N'en seroit-il pas de même de la gelée animale ou gélatine ? Si cette substance n'est pas acide, elle a au moins beaucoup de tendance à le devenir, & on sait qu'il suffit qu'elle absorbe une petite portion d'oxygène pour prendre le caractère d'acidité. Enfin, est-il hors de vraisemblance que la gélatine ne diffère de l'albumine, que par une proportion plus grande d'oxygène ?

L'albumine extraite des végétaux & desséchée, donne à la distillation du carbonate ammoniacal, de l'huile rouge ferrée, des gaz hydrogène & acide carbonique ; il laisse dans la cornue un charbon léger, difficile à incinérer, & dont je n'ai pas encore pu obtenir assez de cendre pour en faire l'examen.

Il faudra plus d'expérience qu'il ne m'a encore été permis d'en faire sur l'albumine végétale, pour déterminer positivement les différences spécifiques qui doivent exister entre elle & l'albumine animale.

ALCABRUSY, ou ALCALADIM, (Pharm.) dénominations arabes, adoptées par quelques anciens écrivains, pour désigner l'oxyde de fer rouge par l'acide sulfurique, oxyde que l'on a encore nommé **COLCOTAR** ou **CALCHITIS**. (Voyez ces mots.)

ALCALESCENCE. L'alcaliescence est cette espèce de propriété qu'ont un grand nombre de substances de devenir facilement alcalines, & le mot alcaliescents exprime les substances mêmes, soit comme susceptibles de passer à l'état d'alcalis, soit lorsqu'elles le sont déjà devenues. Cette propriété n'est relative qu'à la formation de l'alcali volatil ou ammoniacque, car on ne l'applique point à la formation des alcalis fixes, qu'on ne connoît pas aussi-bien que la première & qui n'est pas aussi fréquente. Toutes les matières qui contiennent les deux principes de l'ammoniacque, l'hydrogène & l'azote, combinés en même temps avec quelques autres principes, & qui forment des composés compliqués, par cela même plus voisins de la décomposition, sont naturellement alcaliescentes, c'est-à-dire qu'elles sont exposées au développement & à la formation de l'ammoniacque qui y a lieu suivant certaines circonstances. Ainsi la plupart des matières animales & quelques substances végétales sont susceptibles d'alcaliescence, en raison de l'azote qui y est intimement fixé ou combiné comme un de leurs principes. C'est toujours par un mouvement analogue à celui de la putréfaction, c'est par un mouvement de décomposition spontanée que ces matières éprouvent naturellement,

que l'ammoniacque y prend naissance. Ainsi l'histoire de la putréfaction & celle de l'ammoniacque doivent concourir pour faire connoître les causes & les phénomènes de l'alcaliescence. Il ne doit donc être question ici avec quelques détails que de la nature des corps qui sont disposés à éprouver ce mouvement, ou des alcaliescents, puisque l'alcaliescence elle-même est entièrement comprise dans les considérations qui appartiennent aux articles **AMMONIAQUE & PUTRÉFACTION**.

La chimie moderne s'est beaucoup élevée au-dessus de la chimie telle qu'elle étoit jusqu'au milieu & même aux trois quarts de notre siècle, par les découvertes qui se sont succédées sur la nature des acides, de l'ammoniacque, des substances animales, &c. La découverte capitale des fluides élastiques différens, ou des gaz, a conduit vers toutes ces découvertes particulières. C'est l'examen du gaz azote nommé d'abord air phlogistique, air gâté, mophète ; c'est la recherche de ses propriétés distinctives, de sa nature, de ses combinaisons, de son influence dans la composition des corps, qui a ouvert une nouvelle carrière dans l'analyse des substances composées du règne animal ; & par une suite nécessaire cette carrière a naturellement conduit à la connoissance de l'alcali volatil ou ammoniacque. On verra dans l'histoire de cette espèce d'alcali, comment les premières recherches de Bergman & de Scheele, ont été poursuivies par M. Berthollet, & comment elles l'ont mené à faire l'analyse de l'ammoniacque. M. Berthollet a été beaucoup plus loin dans ces découvertes ; il a trouvé que l'azote, ou la base du gaz azote, est un des élémens des matières animales, que c'est sur-tout par ce principe que ces matières diffèrent de celles du règne végétal, & bientôt l'origine & la formation de l'ammoniacque qui étoit déjà reconnue depuis long-temps pour un des caractères distinctifs des substances animales, est devenue pour lui un phénomène très-simple & très-facile à concevoir. Celles des substances végétales qui sont aussi susceptibles de donner de l'ammoniacque, soit par la distillation, soit par la putréfaction, ont présenté la même propriété de contenir de l'azote & de donner du gaz azote par l'action de l'acide nitrique, & ces deux caractères ont toujours jusqu'ici coïncidé l'un avec l'autre. Aussi lorsque les matières contenant plus ou moins d'azote en ont été privées par l'action de l'acide nitrique foible, elles ne fournissent plus d'ammoniacque à la distillation ; j'ai fait voir que par ce procédé on pouvoit en quelque sorte faire passer les substances animales à l'état des matières végétales. Tout cela sera exposé avec les détails convenables aux articles **ANALYSE, SUBSTANCES VÉGÉTALES, SUBSTANCES ANIMALES**. Il faut se borner ici à l'alcaliescence proprement dite après avoir fait connoître la cause générale à laquelle elle est due, & le caractère général des substances qui l'éprouvent.

Il suit de ce qui a été dit, que ce sont les matières animales qui éprouvent le plus facilement & le plus promptement l'alkalescence; que quelques matières végétales en sont aussi susceptibles. Les chairs des animaux, & sur-tout celle des poissons, la lymphe & les humeurs concrécibles par la chaleur, ou l'albomine en général, les bouillons faits avec la chair des animaux adultes, les œufs des oiseaux, l'urine, la bile, le gluten de la farine, sont les principales substances qui jouissent nécessairement de l'alkalescence. Ce phénomène a lieu lorsque l'azote se dégageant peu-à-peu & sans avoir pris encore la forme de gaz, trouve l'hydrogène qui se développe de son côté & qui tend également à devenir fluide élastique; l'eau paroit donc en fournissant l'hydrogène par sa décomposition, contribuer à l'alkalescence. C'est pour cela que cette production de l'ammoniaque n'a lieu que dans les matières animales humides ou molles, car ces matières bien sèches & privées de toute humidité n'éprouvent point d'altération sensible. Il est nécessaire que les deux principes de l'ammoniaque, l'hydrogène & l'azote, se rencontrent dans le moment où chacun se dégage, voisin de l'état gazeux pour se combiner & former l'alcali volatil; s'ils étoient tous deux enveloppés dans leur combinaison solide, ils ne s'uniroient pas, & c'est ce qui leur arrive dans les matières animales ou végétales qui n'ont point éprouvé d'altération, & qui dans leur état naturel ne contiennent point d'ammoniaque toute formée. Si au contraire l'un de ces deux principes se développe sans l'autre & se sépare des matières qui le contiennent seul & sous la forme de fluide élastique, il n'y a pas non plus d'ammoniaque produite; tel est le cas du dégagement du gaz azote des matières animales traitées par l'acide nitrique. L'action du feu augmentée graduellement ou celle de la putréfaction, fait naître au contraire l'union intime de ces deux principes en favorisant leur évolution libre & simultanée, en les portant l'un sur l'autre, & en déterminant leur attraction réciproque. Ainsi l'alkalescence offre deux conditions nécessaires dans les substances qui en sont susceptibles; 1^{re}. l'existence de l'azote intimement combinée; cette première condition est pour-ainsi-dire de rigueur, sans elle il n'y auroit point d'ammoniaque formée ou dégagée; il n'y a que les substances qui contiennent de l'azote qui soient propres à fournir de l'ammoniaque; celles qui ont été privées de ce principe ne peuvent plus donner cette espèce d'alcali dans aucune circonstance; 2^{de}. la séparation simultanée de l'azote & de l'hydrogène, leur dégagement lent & sous la forme liquide; cette manière de dégagement a lieu par l'action d'un feu gradué tel qu'on l'administre dans les distillations, ou par le mouvement de la décomposition spontanée qu'on nomme putréfaction. Voilà ce qu'on apprit les découvertes modernes de la chimie, & ce qu'on ne savoit point il y a même

quelques années; les chimistes avoient depuis long-temps distingué les matières alkalescentes ou susceptibles de donner de l'ammoniaque, d'avec celles qui ne présentent point la même propriété; ils avoient reconnu cette propriété comme un caractère distinctif des matières animales, & ils avoient même désigné par l'épithète de plantes animales ou matières végo-animales, celles des productions végétales qui donnoient de l'ammoniaque dans leur analyse. C'étoit ainsi que Rouelle indiquoit dans ses cours le sinapi & les plantes crucifères comme des plantes qui jouissoient de propriétés semblables à celles des matières animales; mais comme il n'avoit pas pu déterminer la nature de l'alcali volatil, & que la théorie du temps se bornoit à regarder ce sel comme un composé d'alcali fixe & d'huile, il lui avoit été impossible d'apprécier la cause de sa formation ainsi que la véritable différencie des substances animales & des végétales.

En donnant aux productions animales cette propriété distinctive de former de l'ammoniaque ou d'être alkalescentes, la nature en a fait un des principaux moyens de leur décomposition, de leur destruction spontanée; il semble qu'elle les fasse passer à l'état plus simple de compositions végétales avant de les déorganiser entièrement; mais cette espèce de passage rétrograde n'est pas de longue durée; des que l'azote s'en sépare pour s'unir à l'hydrogène, le lien de leur composition intime est relâché & près d'être dissous. Ordinairement la décomposition de ces matières marche des-lors avec une grande rapidité, & la putréfaction complète suit de près le premier mouvement. On conçoit donc que cette formation de l'ammoniaque, cette alkalescence, étant un signe de dissolution ou de déorganisation très-manifeste, il ne peut pas avoir lieu dans les matières animales sans entraîner leur ruine totale. Aussi n'est-ce qu'à la dernière extrémité qu'elle paroit s'établir dans les animaux vivans. Il y a eo sur ce point bien des erreurs en médecine; on a trop long-temps abusé de l'alkalescence des humeurs pour expliquer plusieurs phénomènes des maladies; jamais pendant la vie des animaux il ne peut se développer d'ammoniaque dans leurs fluides, sur-tout dans ceux qui remplissent & qui dissolvent leurs canaux; si le sang ou la lymphe pouvoient éprouver cette décomposition comme on l'a cru, la vie seroit suffoquée dans l'instant même où elle auroit lieu. Une pareille altération pourroit tout au plus exister dans les cavités éloignées du centre de la vie, & où les matières qui y sont reçues éprouvent plus ou moins facilement les changemens spontanés dont elles sont susceptibles; tels sont l'estomac & les intestins. Il paroit que l'alkalescence peut s'y développer dans la bile & les autres humeurs qui y séjourneront; encore cette formation d'ammoniaque n'y a-t-elle pas lieu sans occasionner des maladies. Lors même

qu'une matière alcalinescente, comme de la chair de poisson un peu avancée ou quelque substance animale analogue à celle-là, est reçue dans l'estomac, si la suite est forte, si les organes sont sains & vigoureux, si les humeurs sont dans leur état naturel, l'ammoniaque libre est bientôt détruite & neutralisée. Sans cela elle occasionne des douleurs, des coliques, des rapport hideux, des digestions troubles, des vomissements, ou même des maladies pituites; il faut donc avoir égard à ce caractère d'alcalinescente dans les aliments & dans les humeurs des premières voies. Cet objet a été traité avec les détails qui peuvent instruire les médecins, aux articles **ALCALESCENCE** considérée par rapport à l'hygiène, à la pathologie & à la matière médicale, dans le dictionnaire de médecine. (Voyez ce **DICIONNAIRE**).

ALCALESCENT. Le mot alcalinescent est employé en Chimie pour désigner des matières légèrement alcalines, ou pour indiquer la production d'un alcali dans des matières qui n'en contenoient point auparavant. C'est ainsi qu'on dit liqueurs alcalinescents, ou liquides alcalinescents, pour rendre ou exhaler la chair alcaline que contractent les fluides animaux exposés à une température chaude. L'alcalinescence des substances animales dépend d'un changement de composition qui s'opère dans leurs principes, & qu'on est parvenu à apprécier avec exactitude depuis qu'on connoit la nature de l'alcali volatil ou de l'ammoniaque, & celle qui caractérise les substances animales comparées aux végétales. Cette espèce d'alcali étant un composé d'hydrogène & d'azote, (voyez ces deux mots), on conçoit bien comment ces deux principes qui entrent dans la composition des animaux se portent l'un sur l'autre & se combinent de manière à former de l'ammoniaque. Ces liqueurs une fois combinant cet alcali volatil ont une odeur forte piquante, & la propriété de changer en vert la couleur des violettes, de la mauve, de l'écorce des raves, &c. Telles sont l'urine conservée quelque temps, la chair, & sur-tout celle des poissons, exposée à une température chaude : les corps enfouis en masse dans la terre contractent également ce caractère ; au bout de quelques mois ou de quelques années ils contiennent une grande quantité d'ammoniaque. Il arrive quelquefois que les humeurs animales prennent de l'alcalinescence dans l'intérieur même des animaux vivants ; c'est ainsi que l'urine, qui est acide chez le plus grand nombre des hommes en santé, devient alcalinescente dans l'affection calculieuse, sur-tout lorsque celle-ci se prolonge pendant long-temps.

ALCALIS. C'est le nom d'un genre de substances salines, qui ont les plus grands & les plus importants usages dans les opérations de la chimie, & dont il est indispensable de connoître

toutes les propriétés. Pour acquérir cette connoissance qui constitue une des principales parties de la théorie de la science, en même-temps qu'elle conduit directement à l'art d'en diriger ou d'en pratiquer toutes les opérations, il faut étudier d'abord les propriétés des alcalis, considérées en masse ou comme formant un genre de corps chimiques, & décrire ensuite, avec beaucoup de soin & avec tous les détails nécessaires, les trois espèces d'alcalis que la nature présente, & que l'art emploie sans cesse dans les procédés. Cette division naturelle partagera cet article en deux sections.

P^REMIERE SECTION.

Des alcalis en général, ou des alcalis considérés comme genre.

L'expérience de notre siècle prouve que les méthodes employées, par les naturalistes, pour décrire & faire connoître toutes les productions de la nature, ont de grands avantages sur celles des anciens ; aussi a-t-on déjà adopté cette marche dans l'étude de beaucoup de sciences ; elle peut avoir une égale utilité dans l'étude de la chimie. Toutes les matières qu'on y traite peuvent être disposées entr'elles, comme les végétaux & les animaux le sont dans les méthodes ou les systèmes de botanique & de zoologie. Sous ce point de vue les alcalis forment un genre de substances appartenant à un ordre des minéraux, qu'on désigne par le nom de sels. (Voyez les mots **METHODE CHIMIQUE**, **MINERAUX** & **SELS**.) En examinant d'abord abstraitivement les propriétés des alcalis, il en résultera un tableau de leurs caractères généraux. Cet examen offre quatre principaux points, qui, en fixant successivement notre attention, présenteront une histoire complète de ce genre de corps, & disposeront à bien connoître les trois espèces qui le composent. Ces quatre points, qui feront la matière d'autant de paragraphes, sont : 1°. la dénomination & l'histoire des alcalis ; 2°. l'exposé de leurs propriétés ou caractères généraux ; 3°. leur nature intime ; 4°. leurs usages en général.

§. I. Dénomination & histoire des alcalis en général.

Le mot alcali a manifestement une origine orientale. Comme on écrivait autrefois arabe, on reconnoit ici un des ce mot composés de l'arabe, formé du mot *kali*, & de la particule *al*. Le premier désigne une plante marine, dont la cendre fournit une espèce de sel de ce genre, le *kali* nommé en français *soude* ; & la particule *al* ajoutée à ce mot, sert, suivant les uns, à marquer la bonté, l'excellence, la préférence ; & suivant les autres, n'est qu'une espèce d'article qui équivalait à notre pronom *le*. Il ne paroit pas douteux, d'après cela, que l'un

ait eu connoissance de cette espèce de sel dans l'antiquité, & qu'on ait su le retirer par la combustion des plantes marines; il entroit dans la composition du verre, & dans la formation des lessives; c'est pour cela que Mine donnoit le nom de lessive à la cendre. Sans doute on a employé, sans interruption, les alcalis dans les arts, dans les fabriques & les manufactures; mais la chimie a été pendant bien long-temps sans connoissance exacte sur ces sels. Vers le milieu de ce siècle on ne distinguoit point encore bien les alcalis fixes l'un de l'autre. Pott, Margraf & Duhamel, ont les premiers, depuis 1745 jusqu'en 1760 environ, répandu la lumière sur cet objet. Depuis cette importante découverte, la science, déjà perfectionnée par la connoissance des deux alcalis fixes, est restée encore jusqu'en 1766 dans une erreur qui en a singulièrement retardé les progrès. On ne connoissoit d'autre propriété distinctive & vraiment caractéristique des alcalis, que l'effervescence qu'ils étoient susceptibles de faire avec les acides, & ce caractère étoit justement ce qu'il y avoit de plus faux sur la nature de ces sels. Enfin, la découverte de l'air fixe, de sa qualité d'acide & de son existence dans les alcalis, a porté la plus grande lumière sur ce point, & a fait voir que la propriété de faire effervescence avec les acides, n'existoit point comme caractère des alcalis, mais bien comme caractère de ces sels combinés avec un acide, & dans l'état d'espèces de sels neutres. Ce n'est donc que dans les ouvrages des chimistes modernes, & dans ceux qui sont écrits depuis une quinzaine d'années, que l'on trouve des notions exactes sur les alcalis. Le dictionnaire de Macquer, un des ouvrages qui a le plus contribué à l'enseignement de cette science, & qui a été le plus généralement étudié dans tout le monde savant, n'est point encore entièrement à l'abri de cette erreur, quoique la seconde édition, dont nous parlons, & qu'on peut regarder comme un livre nouveau, tant il offre de différences d'avec la première, ait paru en 1778. On trouve encore dans ce dictionnaire la propriété de faire effervescence comme caractère des alcalis, à la vérité, ajoute l'auteur, quand ils contiennent du gaz; mais malgré cette distinction, qui commençoit à éclaircir cette partie de la théorie de la fermentation, il règne dans tous les détails relatifs aux alcalis, une obscurité qui tient à ce qu'il ne les a pas suffisamment indiqués comme formant des sels neutres avec ce gaz; d'ailleurs, il n'avoit pas des idées assez nettes des gaz en général, & sur-tout de celui qu'on dégage des prétendus alcalis, ou des sels neutres alcalins, par le moyen des acides. Ce n'est donc qu'à la chimie de ces derniers temps, que l'on doit une connoissance exacte des alcalis & de leurs espèces. Il n'est pas même question ici des systèmes, des hypothèses, qu'on avoit présentés sur ces sels au commencement du siècle,

& dans lesquels sont contenus, comme on le verra dans le paragraphe troisième, toutes les preuves de l'ignorance où l'on étoit sur leurs caractères & leurs propriétés.

§. II. *Exposé des propriétés ou caractères généraux des alcalis.*

Si l'on a bien saisi la marche que l'on a intention de suivre dans cet article, on concevra facilement qu'il est nécessaire d'examiner d'abord en quoi consistent les propriétés des alcalis, de réunir l'ensemble de ces propriétés, pour en composer les caractères qui déterminent ce genre de sels, & qui peuvent servir à le distinguer de tous les autres; il faut aussi, dans l'exposé de ces propriétés, ne prendre que celles qui sont communes à toutes les espèces d'alcalis, afin qu'on n'isole point l'un de l'autre, & qu'on ne donne point comme appartenant au genre, quelques caractères qui n'existent que dans les espèces considérées à part.

1°. Tous les alcalis ont une saveur âcre & analogue à celle de l'urine & des matières animales pourries en général; de-là on dérive cette saveur par le nom de *saveur urinale*. Elle est tellement forte, lorsque les alcalis sont bien purs, & tels qu'il faut les considérer pour les connoître comme genre, qu'ils dissolvent & rongent la peau; voilà pourquoi on les nomme souvent caustiques en pharmacie. On ne pourroit pas en goûter la moindre parcelle sur la langue, sans éprouver sur le champ une sensation violente, semblable à celle d'une brûlure, & sans être obligé de la rejeter à l'instant. L'impression que l'alcali a faite en excitant cette sensation, même dans une fraction de seconde, produit une inflammation, une légère escarre qui doit être renouvelée par la formation d'une nouvelle portion d'épiderme; c'est une partie vraiment déformante, que celle qui a été plus ou moins de temps en contact avec un alcali; c'est une partie morte qui se détache & tombe par l'effet de la vie. Cette saveur vive, cette énergie caustique, dépend d'une extrême attraction entre les molécules de l'alcali & celles des matières animales; la tendance à la combinaison qui existe entre ces deux genres de substances est telle, que cette combinaison s'opère dans l'instant du contact, & que la saveur qui en est l'annonce pour les organes sensibles, a lieu pendant l'acte même de cette combinaison. Aussi, après qu'un alcali a exercé cette action sur la peau & les nerfs, il a épuisé son attraction, sa tendance à se combiner, & il ne peut plus l'exercer davantage. Voyez le mot CAUSTICITÉ.

2°. La forme & les qualités extérieures, la couleur, &c. ne peuvent pas être définies dans l'exposé des caractères des alcalis, parce qu'elles varient suivant les espèces. Deux espèces, en effet, peuvent être obtenues sous forme sèche

solide & cristalline, tandis que la troisième espèce est invisible & fluide élastique.

3°. Le feu les fait fondre, les volatilise plus ou moins.

4°. À l'air ils s'humectent, ils en attirent puissamment l'humidité, & prennent la forme de liqueur lorsqu'ils ne l'avoient pas; c'est ce phénomène de la déliquescence qui avoit fait donner à l'une des espèces de ce genre le nom d'alcali déliquescens; cette propriété d'absorber l'eau atmosphérique, est susceptible de variation, suivant que l'air varie plus ou moins dans son humidité; ainsi, l'on pourroit se servir de ce caractère pour construire des hygromètres; mais comme on redouteroit l'influence de cette déliquescence, qui ne fait qu'affaiblir les alcalis, & y reporter l'eau qu'on a séparée avec soin pour avoir ces sels purs, on s'oppose à cet effet en les tenant renfermés dans des vaisseaux de verre bien bouchés. A cette première action de l'air atmosphérique sur les alcalis, il en succède une seconde qui n'est pas moins remarquable; quand les alcalis sont humectés par l'eau, qu'ils enlèvent à l'air en raison de la forte attraction qu'ils exercent sur elle, ils absorbent peu-à-peu un acide qui y est toujours répandu à la dose d'un deux centième ou d'un centième; ils passent bientôt à l'état de sels neutres par cette union de l'acide atmosphérique.

5°. Les alcalis se dissolvent facilement & promptement dans l'eau; ils se dégagent du calorique pendant cette dissolution, & il se développe une odeur de lessive, due sans doute à une portion des alcalis élevée avec la vapeur d'eau. La quantité d'eau nécessaire pour la dissolution des alcalis est très-faible, parce que ces sels sont extrêmement dissolubles; leur dissolution saturée est même avide d'une nouvelle quantité d'eau qu'ils enlèvent à beaucoup de sels; c'est en raison de cette dernière propriété que les alcalis caustiques, liquides & concentrés, précipitent un grand nombre de sels dissous dans l'eau.

6°. Ils convertissent en vert la couleur bleue ou rougeâtre, des violettes, des mauves, des roses, des œillets, de l'écorce de raves, &c. c'est sans doute en changeant la proportion des principes que la conversion de la couleur s'opère; mais on ne peut point encore apprécier cet effet, parce que cette appréciation exigerait la connaissance exacte de la nature des alcalis.

7°. Les alcalis s'unissent à la terre silicee, soit par la voie sèche, soit par la voie humide; la première manière de les combiner, forme les verres en déterminant la fusion de la silice; la seconde forme des dissolutions.

8°. Ils se combinent avec les acides, & forment des sels neutres.

9°. Ils s'unissent à plusieurs oxides métalliques, à ceux même qui ne deviennent point acides, & les rendent dissolubles & cristallisables.

10°. Ils s'unissent au carbone, au soufre, au phosphore, & forment des composés térides, dont la décomposition est promptement opérée par le contact de l'air.

11°. Ils décomposent plus ou moins facilement les sels neutres, terreux & métalliques; quelquefois ils s'unissent en même temps que les terres & les oxides métalliques aux acides, & forment alors des *trifles* ou *sels triples*. (*Voyez ce mot.*)

12°. Ils se combinent facilement avec les extraits & les huiles fixes des végétaux, avec lesquelles ils composent les savons.

13°. L'alcool les dissout promptement, quoiqu'il paroisse en recevoir quelques altérations.

14°. Ils dissolvent avec une grande énergie les matières animales en les désorganisant, sans qu'on puisse compater cet effet à celui que produisent les acides minéraux concentrés.

A tous ces caractères on reconnoît aisément des substances très-actives, qui doivent jouer un grand rôle dans les combinaisons & dans les décompositions dues à la nature ou à l'art. On pourroit leur appliquer la sublime assertion que Newton a présentée sur les acides, elle leur conviendrait autant qu'à ceux-ci; ce sont en effet des corps qui attirent fortement, & qui sont fortement attirés.

§. III. Nature intime des alcalis.

Le principal but que les chimistes se sont toujours proposé dans leurs recherches, a été de connoître & de déterminer avec précision la nature intime des corps, leur composition, en un mot, la quantité proportionnelle des principes qui entrent dans leur formation. C'est là ce qu'ils nomment l'analyse, & on fait qu'ils ne l'opèrent jamais que par les loix de l'attraction. Pendant long-temps les chimistes n'ont eu aucune connaissance de la nature intime des alcalis; car il n'est pas permis de ranger dans l'ordre des connaissances humaines, les hypothèses, les extravagantes idées que l'on s'étoit formées autrefois de ces sels. A voir avec quelle facilité les chimistes ont fait des systèmes avant d'avoir recueilli assez de faits & tenté assez d'expériences pour les étayer, on eût dit que la science étoit le fruit de leur imagination. De ce que les alcalis ont une saveur brûlante & corrosive, on vouloit encore, au commencement de ce siècle, que leurs parties fussent disposées au mouvement, qu'elles fussent armées de pointes comme la tête d'un chardon. Ces petites aiguilles plantées dans une petite boule, comme le disoit Senac, servoient merveilleusement à les faire élever dans la distillation; elles sont comme autant de petites ailerons qu'elles présentent aux parties de feu qui les pousse & à l'air qui les élève. Mais on n'entendoit parler alors que de l'alcali volatil, ou, comme on le disoit, des alcalis

lis volatils. Senac, en tournant, avec raison, cette théorie en ridicule, ajoutoit : « que la formation » de ce sel, suivant ces philosophes à l'imagination, » ne vient que de ce que les parties acides, qui » sont de petites aiguilles, enlèvent les molécules » terreuses ; ils en appellent à l'expérience, qui » fait voir que le sel acide, joint avec quelque » terre, forme un sel acre. Après que ces parties » hérissées se sont formées, il y en a plusieurs » qui s'unissent. Comme leur figure est irrégulière, leurs interstices se remplissent de parties sulfureuses & terreuses ; de-là que s'enlève-t-il ? C'est qu'un sel alcali n'est jamais pur : si les pores sont remplis de parties terreuses, le sel ne pourra point s'élever, il se fondra plutôt ; tel est le sel fixe de tartre & le sel lixiviel. Si ces interstices sont remplis de parties sulfureuses, le sel s'élèvera facilement & sera volatil ; tel est le sel d'urine & de corne de cerf. Voilà, disoit Senac en terminant cet article, des raisonnemens qui demanderoient que quelqu'un qu'expérience les confirmât, avant qu'on les exposât au public ». Toute la chimie, à cette époque, au commencement de notre siècle, étoit gâtée par une physique mécanique qui n'étoit pas meilleure qu'elle. Lemaire ne voyoit dans les acides que des pointes & des aiguilles ; la dissolution n'étoit à ses yeux que le produit de l'introduction de ces aiguilles dans les pores des corps & l'écartement de ceux-ci ; il étoit aussi mauvais physicien, qu'un habile chimiste manipulateur : à la vérité, c'étoit plutôt la faute de l'époque où il vivoit, que la sienne propre. La physique expérimentale n'avoit point encore convenablement éclairé le monde ; des hypothèses sans nombre, des discussions puériles, occupoient presque uniquement les savans. Une partie de cette habitude, de cet amour des hypothèses, a subsisté en chimie jusqu'à l'époque des découvertes des gaz & de la création de la doctrine moderne. Macquer dédaignoit encore l'alcali fixe, une substance saline, qui paroit composée d'acide, de terre, & d'un peu de phlogistique, & dont les principes ont ensemble une moindre adhérence, que n'en ont les uns avec les autres ceux des acides. Fondé sur quelques expériences illusoires ou mal faites, il donnoit encore pour caractère d'un alcali fixe, que lorsqu'on le fait dessécher & qu'on le dissout de nouveau, il s'en sépare toujours une portion de terre ; & c'étoit d'après la séparation de cette terre, par des calcinations & dissolutions successives, qu'il la croyoit unie à un acide & à du phlogistique dans l'alcali. Meyer admettoit, dans ce genre de sel, une terre unie à un principe hypothétique, qu'il nommoit *causticum*, *acidum pingue*, & qu'il regardoit comme la cause de toutes les saveurs. Mais, on verra à l'article CAUSTICUM & CAUSTICUM, ainsi qu'aux articles des acides, que son hypothèse n'étoit appuyée d'aucune expérience probante, & qu'elle étoit

destinée à périr en naissant, par les travaux & les découvertes de l'illustre Black. La plupart des chimistes, même depuis les découvertes modernes, ont continué à croire d'après Stahl, que les alcalis sont des composés de terre & d'eau, dans lesquels la première domine. Cependant l'art des expériences ayant été singulièrement perfectionné depuis quelques années, ceux des chimistes qui ont suivi avec exactitude la marche de la science, ont bientôt renoncé à l'hypothèse de Stahl, & sont convenus entre eux qu'on ne connoissoit point la nature intime des alcalis, qu'ils étoient fort éloignés des acides, que ceux-ci dont la composition a cessé d'être un mystère ne faisoient point un des principes des alcalis ; enfin qu'il falloit attendre pour prononcer sur la nature de ces derniers sels, que l'on eût fait de nouvelles expériences, dont on pouvoit espérer un meilleur succès que des anciennes, pour déterminer la composition des alcalis. Telle étoit l'opinion arrêtée des chimistes François en 1780, lorsque les nouvelles découvertes des physiciens Anglois & François, & sur-tout celles de M. Lavoisier, commençoient à élever une base plus solide à la théorie générale de la chimie. Depuis cette époque on a entrepris plusieurs travaux & fait plusieurs découvertes sur cet objet. M. Berthollet a prouvé que l'ammoniaque est un composé d'hydrogène & d'azote ; j'ai cru d'après cette importante découverte que la formation de l'ammoniaque dans différentes circonstances pourroit jeter du jour sur la nature des autres alcalis. Voici les principaux faits sur lesquels je fonde à cet égard mon opinion. Les alcalis fixes paroissent quelquefois se convertir en ammoniaque ; tous les chimistes enseignoient autrefois que les alcalis fixes donnoient de l'alcali volatil lorsqu'on les distilloit avec de l'huile, & ils pensoient d'après cela que l'alcali volatil étoit un composé d'alcali fixe & d'huile ou de phlogistique. C'étoit ainsi qu'ils expliquoient le produit ammoniacal que l'on obtient en distillant l'acide tartareux ou la crème de tartre, les tartres de potasse & de soude, les acétites des mêmes bases, les sels d'alcalis fixes. Or pour former de l'ammoniaque, outre l'hydrogène qu'on voit manifestement fourni ici par l'huile ou l'eau décomposée à l'aide du charbon, il faut de l'azote, & ce dernier principe paroit être fourni par les alcalis fixes. Quand on laisse long-temps exposé à l'air du sulfure de chaux ou *foie de soufre calciné*, on en retire après son entière décomposition un peu de sulfure de potasse ; cette production d'alcali fixe qui paroit être due à la fixation de l'azote dans la chaux, paroit marcher beaucoup plus rapidement quand on met le sulfure calciné en contact avec du gaz nitreux, qui semble dans ce cas céder l'azote bien plus facilement que l'air atmosphérique. Enfin les expériences de MM. Thouvenel & Chapral sur la potasse, celles de MM. Berjeux,

Behne, Lorgna, & Osburg sur la soude, que nous ferons connoître plus en détail dans l'examen de chacun de ces alcalis fixes en particulier, m'ont fait penser 1°. que tous les alcalis contenoient de l'azote; 2°. que l'azote paroîtroit constituer la nature alcaline comme l'oxygène constitue la nature acide; 3°. qu'en raison de cette influence de l'azote dans la production des alcalis, il seroit peut-être nécessaire de donner à ce principe le nom d'alcaline; 4°. que cet alcaligène uni à des matières différentes constituoit les diverses espèces d'alcalis & même de terres alcalines, dont la différence tenoit alors à celle du radical combiné dans chacune d'elle à l'azote ou alcaligène; 5°. que la chaux unie à l'azote pourroit bien constituer la potasse, la magnésie unie au même principe former la soude, tandis que l'ammoniaque à l'hydrogène pour radical ou base alcalifiable. Telle étoit mon opinion dès 1784; j'en ai fait part alors à MM. Lavoisier, Morveau, Berthollet, Monge, Meusnier, Laplace, avec lesquels je travaillois à l'établissement de la nouvelle nomenclature; je leur ai proposé le mot alcaligène pour désigner le principe que nous nommons azote; ils ont pensé que mon opinion sur les alcalis n'étoit point appuyée sur un assez grand nombre de faits, & sur-tout sur des expériences assez décisives, pour qu'il fût temps encore de prendre un parti décisif sur l'influence de l'azote dans la formation des alcalis. Depuis cette époque, déjà éloignée de sept ans, (& je puis même en mettre dix, puisqu'il y a au moins ce temps que d'après les premières expériences de Përyman & de Priestley, sur le gaz *phlogistique* qui se dégagoit dans des cas où l'ammoniaque étoit manifestement décomposée, je me suis formé ces premières idées sur la nature des alcalis; la science n'a rien acquis de plus, & nous sommes toujours dans la même incertitude, dans la même ignorance à cet égard; aucune découverte, aucun fait nouveau n'est encore venu ou confirmé ou infirmer l'idée que j'ai présentée sur la nature des trois alcalis. M. Chaptal l'a seulement adoptée, en indiquant les expériences déjà annoncées ci-dessus, ainsi que les siennes propres. Sans doute il n'a pas su que la première opinion sur l'azote considéré comme alcaligène, & sur sa combinaison avec la chaux dans la potasse & avec la magnésie dans la soude, étoit venue de moi; car sa justice & son impartialité sont trop connues, pour qu'il ne m'eût pas cité sur cet objet. Mais il en est de cela comme d'une foule d'autres principes de chimie, les ayant répandus & rendus publics dans les leçons multiples que je fais à Paris depuis douze ans, les personnes qui les ont entendues les ont communiqués à un grand nombre d'autres, quelquefois même en oubliant à ce qu'il paroît des rapports à leur véritable source. J'ai fait cette réflexion relativement à la théorie de la formation des alcalis, parce que si mes soupçons se confirment par

de nouvelles expériences, il est juste que l'on sache que j'en suis le premier auteur, & si les découvertes futures font voir que je me suis trompé, il ne l'est pas moins que le reproche ne s'applique pas d'autres Chimistes. Le résultat des détails dans lesquels je viens d'entrer, est qu'on ne connoît point encore avec exactitude la nature générale des alcalis, qu'on ne sait pas si l'azote entre véritablement comme principe alcaligène dans tous les alcalis, qu'on ne connoît pas encore la formation de ces sels de la nature. Quant aux connoissances particulières acquises sur chaque espèce, elles seront présentées à l'article de chacune d'elles.

§. IV. Des usages des alcalis en général.

Les alcalis considérés comme formant un genre de matières salines, ont des usages très étendus dans les opérations de la Chimie. Un des premiers soins qu'on doit avoir dans un laboratoire, c'est de se procurer ces sels bien purs, & on verra aux articles POTASSE & SOUDE, quelles difficultés il faut vaincre pour les obtenir tels. Dans état les alcalis servent à opérer un grand nombre de combinaisons. On les unit aux acides pour avoir des sels neutres parfaits & bien purs; on les emploie pour précipiter les terres & sur-tout la chaux, la magnésie, & l'alumine dans leur pureté; on s'en sert pour séparer la plupart des oxides métalliques d'avec les acides. On les combine avec du soufre pour préparer les sulfures ou *soufres de soufre*, pour se procurer le gaz hydrogène sulfuré ou gaz *hépatique*; on les dissout dans l'alcool pour employer ces dissolutions à divers usages, on les fait agir sur les végétaux pour en tirer différents principes & sur-tout la résine & quelques matières colorantes; on les unit aux huiles qu'ils mettent dans l'état savonneux; on les applique aux matières animales qu'ils rongent & dissolvent avec une grande activité; enfin ils constituent une classe d'agens assez utiles qu'ils sont énergiques pour un grand nombre de procédés chimiques.

En médecine ils servent comme des fondans très-actifs & très-avantageux; on les prescrit très-étendus d'eau dans les obstructions des viscères du bas-ventre, dans l'hydropisie, le calcul de la vessie, le virus vénérien ancien; on les applique à l'extérieur comme crustiques pour ouvrir des squirreuses, fongues, & enlever des tumeurs squirreuses & cancéreuses, des *loupes*, des excroissances contre nature: si on les administre sans précaution, ils peuvent agir trop fortement, & à la manière d'un poison caustique, auquel on oppose, avec succès, à cause de sa nature chimique bien connue, les acides légers & volatils, l'eau fraîche, le lait, les huiles douces, les graisses, les bouillons gras.

Dans les arts rien n'est d'un usage plus fréquent &

& plus nécessaire que les alcalis proprement dits ; ils font en quelque sorte la base des verreries , de l'art de faire le savon , de celui de couler les lessives.

SECTION DEUXIÈME.

Des alcalis en particulier , ou des trois espèces d'alcalis connues.

Ce n'est point assez d'avoir étudié les propriétés générales des alcalis , comme on l'a fait dans la première section ; aux caractères du genre doivent succéder les détails qui comprennent les caractères des espèces ; c'est même en faisant connaître , avec l'étendue & la discussion convenables , ces espèces , qu'on prendra une idée plus exacte & plus claire du genre de ces sels. Depuis environ quarante ans on fait bien distinguer trois espèces d'alcalis ; de ces trois espèces , deux se ressemblent beaucoup plus entr'elles que la troisième.

Cette ressemblance des deux premières espèces les a fait comprendre sous la dénomination générale d'*alcali fixe* ; & comme on a été très-longtemps avant de les bien distinguer , comme même après les travaux de Margraf & Duhamel un grand nombre de chimistes sembloient s'obstiner à confondre ces deux espèces , les mots *alcali fixe* se prenoient toujours au singulier ; mais aujourd'hui que leur nature & leurs propriétés différentes sont généralement reconnues & bien fixées , on ne doit plus dire *alcali fixe* en général comme on le disoit encore il y a quinze ans , ainsi qu'on peut le voir dans le dictionnaire de Macquer ; mais il faut dire *alcalis fixes*.

Sous ce nom on range donc deux espèces d'alcalis qui ont de fortes analogies entr'elles , toutes deux sont sèches & solides , toutes deux cristallisent , toutes deux se fondent sans se sublimer , toutes deux sont acres caustiques ; enfin , à les voir isolées , à les comparer l'une & l'autre dans leur état de pureté , il est très-difficile de les distinguer , & l'on conçoit très-bien comment avant d'avoir bien examiné leurs combinaisons différentes , avant d'avoir bien saisi la différence de leur origine , & sur-tout avant d'avoir su déterminer les attractions particulières à chacune de ces deux espèces , les chimistes ont eu tant de peine à les croire différentes , & à leur donner des noms distinctifs ; il faut donc être prévenu de cette confusion , qui a pendant long-temps régné entre les deux espèces d'alcali fixe , afin d'entendre les ouvrages écrits sur cette science avant le milieu & même presque les deux tiers de notre siècle. L'une de ces espèces est aujourd'hui nommée POTASSE , & la seconde est désignée par le nom de SOUDE. Quant à la troisième espèce , elle diffère tellement des deux autres dans toutes les propriétés , qu'on l'a connue dès les premiers temps sous le nom d'*alcali volatil* en raison de son extrême volatilité compa-

Chimie. Tome II.

rée à la fixité des deux premières espèces ; nous la désignons sous le nom d'AMMONIAQUE , par les raisons que nous exposerons dans son article.

Pour connaître chacune des ces trois espèces d'alcalis , il faut lire les mots , AMMONIAQUE , POTASSE & SOUDE. Voyez ces mots.

ALCALI AÏRÉ. C'est le nom que Bergman avoit donné à la combinaison d'un alcali en général avec l'acide carbonique qu'il nommoit acide aérien , il disoit *alcali végétal aïré* , *alcali minéral aïré* , & *alcali volatil aïré* , ces mêmes sels font tous désignés dans la nouvelle nomenclature par les noms de carbonate de potasse , carbonate de soude , carbonate d'ammoniaque , parce que l'acide est nommé lui-même acide carbonique. Il faut se rappeler , pour bien concevoir les dénominations proposées & adoptées par Bergman , qu'il avoit donné le nom d'acide aérien à l'air fixe , soit parce que cet acide est souvent sous la forme d'air , soit parce qu'il fait toujours partie de l'air atmosphérique. Il croyoit aussi que les sels neutres devoient porter d'abord le nom substantif de la base alcaline , & ensuite celui de l'acide terminé comme un adjectif ; il disoit , suivant cette règle , *alcali végétal vitriolé* , *nitré* , *phosphoré* , *sulfuré* , &c. Voyez les mots CARBONATE DE POTASSE , CARBONATE DE SOUDE , CARBONATE D'AMMONIAQUE.

ALCALI CAUSTIQUE. Lorsqu'on ne connoissoit pas l'acide carbonique , lorsqu'on ne savoit pas que cet acide étoit contenu dans les alcalis fixes , tels qu'on les obtient dans les arts , & qu'on les débite dans le commerce , lorsqu'enfin on croyoit que cette combinaison étoit leur état naturel , on trouvoit nécessaire d'appliquer la dénomination de caustiques à ces alcalis traités par la chaux , & qui paroissent ainsi lui devoir leur causticité. On étoit alors fort éloigné de penser que les alcalis fixes fussent purs lorsqu'on les avoit traités par la chaux ; on pensoit même que cette terre , acre & caustique par elle-même , donnoit aux alcalis le principe de la causticité ; & que c'étoit par l'addition d'un principe que les alcalis prenoient cette propriété. Telle étoit la raison pour laquelle on ne parloit jamais des alcalis dans cet état , sans y ajouter l'épithète de caustiques. Mais aujourd'hui , depuis qu'il est établi par des expériences positives , que les alcalis sont purifiés par la chaux , & que c'est le caractère de ces sels purs d'être bien caustiques , tandis que dans l'état où on les croyoit purs autrefois , ils sont neutralisés plus ou moins par l'acide carbonique , on n'ajoute plus cette épithète de caustiques , on se contente d'employer les expressions qui appartiennent aux alcalis purs ; on dit POTASSE , SOUDE , AMMONIAQUE. (Voyez le mot générique ALCALIS.)

ALCALI DÉLIQUESCENT. C'étoit par ces mots

D

que l'on défilenoit, il n'y a pas encore plus de douze ou quinze ans, l'espèce d'alcali fixe végétal ou de potasse impure que l'on obtenoit, soit en brûlant les végétaux, soit en calcinant le tartre seul ou pur le nitre. Comme cette potasse, outre les corps étrangers qu'elle contient, est elle-même dans deux états, ou composée de deux portions fort variables, l'une caustique & pure, l'autre combinée avec l'acide carbonique, ce mélange est défectueux en raison de la première portion; ainsi lors ce point de vue, cette dénomination est encore exacte; mais ce n'étoit point ainsi qu'on la concevoit dans le tems où elle étoit le plus généralement adoptée par les chimistes. On donnoit ce nom comme un caractère distinctif de l'alcali végétal, & pour ne pas le confondre avec l'alcali minéral, qui étoit nommé efflorescent; mais l'un & l'autre de ces caractères n'est pas plus vrai & plus applicable à la première qu'à la seconde espèce d'alcali fixe. Tous les deux bien purs, sont également susceptibles d'attirer l'humidité de l'air; la soude n'est efflorescente que dans l'état de carbonate de soude; & la potasse impure, en partie à l'état de carbonate de potasse, n'est pas entièrement défectueuse. Ainsi l'on doit abandonner l'expression d'alcali défectueux pour désigner la potasse, puisque ce mot ne la distingue point de la soude, quand toutes les deux sont pures. *Voyez* LA SOUDE, ALCAI, DELIQUESCENT, POTASSE, SOUDE.

ALCALIS DOUX. Quand on eut déterminé l'action de la chaux sur les alcalis ordinaires, quand on eut prouvé que cette terre leur enlève l'acide carbonique en raison de son affinité plus grande pour cet acide, on crut qu'en raison de la causticité des alcalis purs, on devoit caractériser par l'épithète d'alcalis doux, les alcalis combinés avec l'acide carbonique, & tellement adoucis en effet par cette combinaison, qu'ils n'ont plus sur l'organe des sens une impression comparable à leur causticité, & qu'on peut les donner à l'intérieur. Ce fut M. Blak qui, pour frapper l'attention des chimistes sur les phénomènes produits par l'absence ou la présence de l'acide carbonique dans les alcalis, employa cette expression d'alcalis doux, mais aujourd'hui, depuis qu'on a presque généralement adopté la nomenclature méthodique & raisonnée, on ne peut plus conserver une épithète générale & vague, une propriété relative à la saveur, pour désigner une combinaison, & les anciens mots d'alcalis doux sont remplacés par ceux de carbonates alcalins, carbonates de potasse, de soude, d'ammoniaque. (*Voyez* ces mots.)

ALCAI EFFERVESCENT. C'est encore dans les premiers tems de la découverte de l'air fixe ou acide carbonique faite par Black dans les alcalis, que pour mieux caractériser leur différence dans

l'état caustique d'avec l'état ordinaire où ils sont combinés avec cet acide, on les a désignés par le mot effervescent, qui exprime en effet la propriété de faire effervescence due à l'acide carbonique, au moins à cette époque les mots effervescence & effervescent étoient-ils bien compris; on commençoit à bien connoître la cause de l'effervescence dans le dégagement de l'acide carbonique par des acides plus forts, & on ne donnoit dès-lors plus cette propriété comme caractère des alcalis, mais bien de ces sels plus ou moins chargés de l'acide aërien d'alors; car il faut remarquer qu'avant cette découverte, il étoit si généralement convenu que l'effervescence étoit un caractère inhérent aux alcalis, qu'on n'auroit pas pu proposer de faire mention de cela dans leur dénomination, & qu'on n'a dû prendre ce parti que lorsqu'on a bien distingué les alcalis dans deux états. Les alcalis effervescent sont les carbonates alcalins. (*Voyez* ces mots.)

ALCAI EFFLORESCENT. On désignoit quelquefois sous ce nom dans les ouvrages de chimie, le carbonate de soude en cristaux, qu'on nommoit aussi sel de soude, à cause de sa propriété très-remarquable en effet de s'effleurir par le contact de l'air, ou de perdre son eau de cristallisation, en la cédant à l'air; mais ce n'est pas comme alcali minéral que ce sel de soude présente cette propriété, c'est comme formant un sel neutre avec l'acide carbonique, & quand elle est pure, elle est au contraire fortement déliquescente. (*Voyez* les mots EFFLORESCENCE, CARBONATE DE SOUDE, SOUDE.

ALCAI EXTÉMPORANÉ. C'est ainsi qu'on nommoit la potasse qu'on se procuroit promptement & presque sur le champ, en brûlant dans un creuset du tartre à l'aide du nitre; le mot extemporané étoit donné en général à toutes les préparations que l'on faisoit au moment où on en avoit besoin. (*Voyez* le mot POTASSE.)

ALCAI FIXE. C'étoit ainsi qu'on appelloit la potasse il n'y a pas encore plus de vingt ans. Lorsqu'on ne connoissoit presque encore que cette espèce d'alcali, & sur-tout avant qu'on n'eût démontré la véritable différence de la soude, cette dénomination étoit bien légitime, & même exacte; mais depuis la destination de ces deux espèces, le mot alcali fixe est-il devenu le nom du genre, & on ne dit plus guères ces mots qu'au pluriel, alcalis fixes. On voit pourquoi après la découverte de l'alcali de la soude, on dut ajouter à l'expression d'alcali fixe, celle de végétal ou de minéral, pour désigner chacune de ses espèces. (*Voyez* ALCAI.)

ALCAI MARIN. On a souvent désigné la soude par ce nom, parce qu'elle fait la base du sel

marin, & qu'elle existe en grande quantité dans la mer. (Voyez SOUDE.)

ALCALI MINÉRAL. Il en est de même du nom d'alcali minéral donné à la soude, parce qu'on la trouve abondamment dans le règne minéral unie aux acides, & formant des sels neutres cristallisés à la surface ou dans l'intérieur de la terre, ou dissous dans les eaux. (Voyez SOUDE.)

ALCALI PHLOGISTIQUE. On a cru pendant longtemps, qu'en traitant les alcalis fixes avec le sang de bœuf & plusieurs autres matières animales, pour les rendre susceptibles de précipiter le sulfate de fer ou vitriol de fer en bleu de Prusse. On les surchargeoit de phlogistique; de-là l'expression d'alcali phlogistique qu'on avoit adoptée pour désigner l'alcali ainsi traité. On connoit mieux aujourd'hui la nature de cette préparation, & on sait que le phlogistique ne peut pas plus y contribuer qu'à d'autres combinaisons, puisqu'il est bien probable qu'il n'étoit qu'un être de raison. Voyez les mots, **ACIDE PRUSSIQUE & PRUSSIATE**; voyez aussi l'article LITHOLOGISTIQUE.

ALCALI PRUSSIEN. Quand Macquer eut fait la belle découverte de la décoloration du bleu de Prusse par les alcalis, & de la combinaison de sa matière colorante avec ces sels, on adopta l'expression d'alcali prussien, pour désigner la potasse saturée de la partie colorante du bleu de Prusse; on la nomme aujourd'hui prussiate de potasse, parce qu'on a trouvé que cette partie colorante la sature à la manière d'un acide. La dénomination d'alcali prussien rappelloit la potasse tellement chargée de cette partie colorante du bleu de Prusse, qu'elle étoit susceptible d'en reformer sur le champ de pur & beau en l'unissant à la dissolution de sulfate de fer, tandis que l'alcali phlogistique, qui provenoit immédiatement de la potasse traitée avec le sang de bœuf, ne donnoit avec le sulfate de fer qu'un bleu très-impur, & qui avoit besoin d'être animé par les acides. (Voyez les mots **ACIDE PRUSSIQUE & PRUSSIATE**.)

ALCALI DU TARTRE. Avant qu'on eut déterminé l'identité parfaite de l'alcali obtenu par la combustion & l'incinération de la plupart des matières végétales, avec celui que fournissoit le tartre par la calcination, on avoit désigné ce dernier par le nom d'alcali du tartre; aussi à cette époque de la science on donnoit au sel qu'on obtenoit de chaque végétal brûlé le nom de ce végétal; on disoit sel fixe de genêt, sel fixe d'absynthe, &c. En changeant la dénomination d'alcali du tartre à règne long-temps après qu'on eût la preuve expérimentale que cet alcali pouvoit être obtenu de la même nature du plus grand nombre des végétaux brûlés; mais alors cette dénomination n'a été adoptée que pour exprimer que c'étoit du

tartre qu'on retiroit le plus abondamment cet alcali fixe, & qu'on l'obtenoit plus pur que de toutes les autres matières végétales. (Voyez le mot POTASSE.)

ALCALI VÉGÉTAL. C'étoit encore une des dénominations qu'on employoit pour désigner la potasse en raison de son origine. On s'en sert encore quelquefois comme je synonyme du mot potasse, & afin de ne point trop répéter ce dernier mot dans les ouvrages ou les leçons de chimie. (Voyez le mot POTASSE.)

ALCALI VOLATIL. Ces deux mots ont longtemps constitué seuls la dénomination de l'espèce d'alcali que nous avons nommé ammoniacque; & il est certain qu'ils exprimoient bien la différence de cette troisième espèce d'avec les deux premières, qui étoient nommées alcalis fixes par opposition à celle-ci. Au lieu d'être solide, celle-ci est toujours liquide & même fluide élastique ou gazeuse; les alcalis fixes font sans odeur, & l'alcali volatil en a une très-vive & très-énergique; les premiers restent rouges & fondus dans des creusets avant de se volatiliser, & l'alcali volatil se réduit en vapeur avant la température de l'eau bouillante; il est même vaporeux ou gazeux bien avant cette température, lorsque l'air le touche & le dissout. Ainsi la dénomination d'alcali volatil étoit très-bien fondée, surtout en comparaison ou en opposition de celle d'alcalis fixes, qui étoit elle-même très-justement donnée à la potasse & à la soude; mais lorsque nous avons cru, pour la facilité de l'étude de la chimie & pour hâter les progrès de cette science, devoir adopter une nomenclature qui, par ses étymologies simples & la disposition des mots, pût présenter un ensemble, un système méthodique & régulier de dénominations, nous avons pensé qu'une substance, bien caractérisée & bien connue, ne devoit point être nommée par deux mots, l'un générique & l'autre adjectif, qui ne pouvoit en donner qu'une idée vague; nous avons alors substitué au nom d'alcali volatil celui d'ammoniacque; on verra dans l'article placé sous ce mot, & qui contient l'histoire des propriétés de cette espèce d'alcali, les raisons qui nous ont déterminés à adopter cette dénomination. On doit être prévenu que cette nouvelle dénomination n'exclut point entièrement, ne profite point celle d'alcali volatil; on peut employer celle-ci quelquefois comme synonyme. (Voyez le mot AMMONIAQUE.)

ALCALI VOLATIL CONCRET. On nommoit ainsi l'espèce d'alcali volatil, solide & cristallisé, qu'on obtenoit en distillant le sel ammoniac ou muriate ammoniacal avec la craie ou l'alcali fixe effervescent, pour le distinguer de l'alcali volatil fluide que fournissoit le même sel décomposé par

la chaux. Cette dénomination ne peut plus être adoptée depuis que l'on sait que ce sel est une combinaison d'ammoniaque & d'acide carbonique ; c'est le carbonate d'ammoniaque de la nouvelle nomenclature. (*Voyez* ce mot.)

ALCALI VOLATIL FLUOR. Il n'y a pas de mot de Chimie qui ait été plus généralement répandu que celui-ci ; il y a quinze ans qu'un Chimiste très-connu rendit beaucoup plus général qu'il ne l'avait été jusque-là l'usage de l'alcali volatil caustique ou fluor, dans les syncopes, les asphixies ; il étendit cet usage dans la brûlure, la piquure des insectes, &c. Ce remède préservatif devint à la mode ; tout le monde avoit dans sa poche un flacon d'alcali volatil fluor, & cette dénomination devenue elle-même à la mode passoit pour neuve, parce qu'elle l'étoit en effet pour la plupart des hommes qu'on pouvoit accuser alors encore plus qu'aujourd'hui d'une ignorance absolue des sciences ; mais il faut savoir que le mot fluor étoit très-ancien en histoire naturelle & en chimie, & qu'il désignoit, soit la propriété de se fondre, de devenir fluide, comme on le dit du spath fluor, soit la liquidité, comme l'état le plus ordinaire des acides, des *esprits* qu'on nommoit aussi communément fluors. Mais quand ce mot eût été nouveau il n'en eut pas été meilleur pour désigner un alcali dont la fluidité n'étoit rien moins que le plus important des caractères ; aussi est-il généralement abandonné aujourd'hui par tous les hommes instruits. L'alcali volatil fluor est l'ammoniaque pure. Quant aux propriétés trop vantées & presque miraculeuses de l'alcali volatil fluor, on saura ce que l'expérience & le raisonnement apprennent de plus exact & de plus certain sur cet objet, à l'article AMMONIAQUE.

ALCALI URINEUX. A une époque de la chimie, où la marche de cette science étoit encore incertaine, irrégulière, où la nomenclature étoit vague comme la théorie, où, en un mot, ce n'étoit que par quelques propriétés générales souvent mal observées, ou fondées seulement sur les sensations les plus grossières & les plus générales, que l'on connoissoit les corps, on avoit appelé alcali urinaire, l'alcali volatil, impur, en partie concret ou à l'état de carbonate ammoniacal, en partie caustique, liquide ou dissous dans les produits liquides, qu'on obtenoit de toutes les matières animales, & qui ressembloit à celui que donne l'urine, sur-tout par son odeur forte & piquante. Il paroît même que la première dénomination d'alcalis urinaires étoit prise seulement de l'odeur de ces sels analogue à l'odeur de l'urine altérée, & dans laquelle on fait qu'il se forme une grande quantité d'ammoniaque. (*Voyez* les mots URINE, SUBSTANCES ANIMALES.

ALCALICITÉ. On dit quelquefois le mot alcali-

licité pour désigner la naissance de la propriété alcaline ou de l'alcali volatil dans des substances qui n'en contenoient point auparavant, ou pour indiquer la présence d'un alcali dans des matières quelconques. Il exprime pour le genre alcalin ce que le mot acidité exprime pour le genre des acides. Il est moins nécessaire dans la langue chimique, parce qu'il n'y a que trois espèces d'alcali, tandis qu'il y a près de trente espèces d'acides, & parce qu'il y a très-peu de substances qui contiennent assez de quelque espèce d'alcali pour présenter une alcalité sensible, tandis qu'il y en a un très-grand nombre dans lesquelles un acide quelconque est assez abondant pour leur communiquer une acidité très-sensible. C'est pour cela que l'alcalité ne se manifeste guère que par les épreuves des papiers teints avec la fleur de mauve dans les matières qui ne contiennent que quelques atomes d'alcali, tandis que l'acidité est presque toujours sensible au goût.

ALCALIN. Ce mot est l'adjectif d'alcali, qui pendant long-temps a été un nom spécifique, & qui appartient actuellement à un genre de sels. On dit, d'après la valeur de cet adjectif, un sel alcalin, une substance alcaline, le caractère alcalin, la propriété alcaline.

ALCALINITÉ. Le mot alcalinité est synonyme de celui alcalité ; il y a ici deux dénominations équivalentes pour un seul phénomène, parce qu'il y a deux mots alcali & alcalin ; tandis qu'on n'a que le mot acidité, parce qu'il n'y a que le mot acide comme genre, comme espèce, soit pour substantif, soit pour adjectif. En général les deux mots, parfaitement synonymes d'alcalité & d'alcalinité, sont tous deux très-peu employés ; on se sert plutôt des phrases, caractère alcalin, propriété alcaline, &c. Cependant le mot alcalité est un peu plus en usage dans les bons auteurs que celui d'alcalinité. L'oraison connoît la nature intime des alcalis, ainsi que les phénomènes de leur formation & de leur décomposition ; lorsqu'on pourra favoriser ou opérer entièrement l'un ou l'autre de ces phénomènes, les mots alcalité & alcalinité deviendront plus utiles pour indiquer même, si on le trouve nécessaire, quelque différence dans la nature ou la marche de ces phénomènes.

ALCALISATION. On a nommé alcalisation, l'opération par laquelle on développe ou l'on extrait un alcali fixe des substances végétales qu'on brûle ou qu'on laisse pourrir ; c'est sur-tout par la combustion, l'incinération & la forte calcination, qu'on obtient la potasse & la soude. On dit alors qu'on a alcalisé telle ou telle plante, telle ou telle substance végétale, le terre, la lie de vin, la fougère. On dit aussi l'alcalisation du nitre, le nitre alcalisé, parce qu'en chauffant fortement ce sel neutre, ou en l'employant pour brûler le tar-

tre, &c., on en obtient une grande quantité d'alkali végétal ou de potasse.

Le mot alcalisation signifioit autre chose pour les Chimistes qui ont pensé que l'alkali fixe se formoit par la combustion & l'incinération; ils entendoient par cette expression, la formation même de la potasse par la nouvelle combinaison des principes, due à l'action du feu; & on verra aux mots AMMONIAQUE, POTASSE & SOUDE, que cette opinion n'est point à beaucoup près invraisemblable, non pas pour la totalité de l'alkali, mais au moins pour une partie, dans l'incinération, & peut être soutenue dans d'autres opérations, comme la végétation, la putréfaction. Voyez ces mots, ainsi que le mot ALCALI.

ALCANÁ, & quelquefois aussi ALKANNA, mais plus ordinairement, ALCANNA ou ALKANET, (Pharmacie.) Mot introduit dans la pharmacie par les Arabes, & conservé encore dans quelques dispensaires modernes, pour désigner deux plantes d'une espèce fort différente, mais qui l'une & l'autre ont la propriété de colorer en rouge.

L'une de ces plantes désignée sous le nom d'alcanna verd., & par Linnéus sous celui de *Lawsonia*, est un arbrisseau qui croit naturellement dans l'Inde, l'Égypte, la Syrie, & long-temps on l'a regardé comme une espèce de troëne; mais d'après des observations faites sur les lieux même, M. Adanson le place dans la famille des cistées. Les peuples de l'Asie, de l'Afrique, en font un grand usage; ils emploient ses feuilles, ses racines pour reindre en rouge les ongles, les cheveux, & différentes parties de leur corps, ce qui est chez eux un objet de beauté; ils font aussi avec l'alcanna différentes préparations qu'ils emploient dans le traitement de leurs maladies. L'huile dans laquelle on fait cuire les fleurs de cet arbrisseau qui sont odorantes, est employée, dit M. Adanson, pour rendre la souplesse aux fibres devenues roides & trop tendues; le vinaigre dans lequel on les a fait macérer s'emploie en Égypte pour la migraine; les feuilles passent pour le souverain remède des ongles & des maladies de la peau; la décoction de sa racine se boit dans les douleurs de la goutte aux pieds, on extrait des baies de la même plante, disent quelques écrivains, une huile d'une odeur très-agréable dont on fait usage en médecine. Dioscoride, & les écrivains Grecs, font mention de l'alcanna sous le nom de *cyprus*. Pline l'indique sous le nom de *cyprus*, & quelques-uns, ajoute-t-il, pensent que c'est le *ligustrum* d'Italie ou le troëne. Il paroît que les anciens employoient les feuilles de cet arbrisseau pour teindre les cheveux; ils le servoient surtout de sa racine dans le traitement des maladies comme un astringent, & ils la faisoient en-

trer dans la composition des onguents, des pommes rouges, &c. Mais aujourd'hui l'alcanna ne se trouve point dans nos pharmacies européennes, & toutes ces préparations sont entièrement abandonnées.

L'autre plante distinguée sous le nom d'*alcanna spuria* ou *rubra*, est l'*anchusa tinctoria* de Linnéus ou buglose teignante; celle-ci est connue & employée dans nos pharmacies sous le nom d'ORCANNETTE. (Voyez ce mot.)

Quelques-uns aussi, suivant Schroder, & De-meuve (dans son dictionnaire pharmaceutique) ont donné le nom d'alcanna à l'ichthocolle, ou colle de poisson (Voyez ce mot.)

ALCANALI, (Pharmacie.) Dénomination donnée à un antidote, ou sorte de confectio qu'on trouve décrite dans Nicolas Myrepius, & dont il vante l'efficacité contre les fièvres. Léonard Fusch remarque avec assez de vraisemblance, que ce mot est une corruption de la dénomination grecque *angelocalos*, ce que les interprètes latins ont rendu par *bonus nauticus*, antidote de bonne nouvelle: dénomination pompeuse, & dont on trouve bien des exemples dans les anciens.

ALCANSI ou ALKANSI. (Pharmacie.) Sur-nom donné à une espèce d'électuaire, ou confectio décrite par Jean Mésué. Lemery qui rapporte la formule de cet électuaire, dit qu'il a été ainsi surnommé parce que Mésué l'avoit tiré d'un médecin Arabe nommé *Alcanzus*; quoiqu'il en soit, cet électuaire qui étoit destiné pour fortifier l'estomac, exciter l'appétit, la digestion &c., étoit principalement composé de fleurs de romarin, de roses, d'écorces de citron, de balaustes, & de différentes substances aromatiques & résineuses incorporées avec de la pelée de coings; mais cette composition n'est plus préparée dans nos pharmacies, & n'est pas employée en médecine.

ALCAOL, (Pharmacie.) Dénomination équivoque dans les écrits des Arabistes, qui se servent de ce mot pour désigner le lait aigri, ou le mercure. (RULAND, JOHNSON.)

ALCEBRIS, ALCUERID, ALCUR, ALUZAR, (Pharmacie.) Mots synonymes employés par les Arabistes pour désigner le soufre.

ALCÉ, ou comme l'écrivent plusieurs lexiconographes français, ALCEE (Pharmacie.) Dénomination dont l'origine est fort équivoque. Buffon conjecture avec assez de vraisemblance qu'elle vient du Celtique, & il remarque que chez les Latins Jule César est le premier qui ait employé le nom d'alcé. Pausanias, Pline & les écrivains Grecs & Latins qui les suivirent,

adoptèrent cette dénomination, qui a été conservée, pour désigner l'espèce d'animal que nous connoissons aujourd'hui sous le nom d'élan, ou *original*; l'ongle de cet animal a long-temps été vanté comme un excellent antidépilétique, & il est encore inscrit dans quelques dispensaires modernes au nombre des substances officinales (*Voyez* ELAN.)

ALCÉE. (*Pharmacie.*) *Malva alcea*. C'est une espèce de mauve qui en a les propriétés; elle est vivace, & croît naturellement en France, en Allemagne, & en Angleterre. On vante beaucoup sa décoction contre les tranchées, les dysenteries épidémiques, & pour adoucir les acrétes d'urine; on l'emploie dans les lavemens, les fomentations, les cataplasmes émolliens & résolutifs. Pena & Lobel ont remarqué qu'elle étoit moins visqueuse que la mauve vulgaire. Le cataplasme de l'alcée est vanté en Allemagne contre les tumeurs squirrheuses des mammelles; la manne insusée dans du vin sert contre le flux de ventre & les hernies. Il y a des auteurs qui prétendent que cette racine est un violent purgatif; pour détruire cette fausse assertion, nous l'avons souvent substituée à la racine de guimauve en tisane, sans que cette boisson ait occasionné une seule évacuation d'urine. L'alcée est encore digessive & adoucissante; la feuille d'alcée doit être recouverte avant la sécheraison. Cet usage a été copié en son honneur.

Est dysentericis radice alcea juvenem.

Contra sit, celerrime alvo, rapisque moderat;

Fit tremulis confert membris; Armasque resolvit illius. (M. WILLEMET.)

ALCHARIT, ALECHARIT, ALOHOL, ALOGAR, ALTARIS, ALUDIT, ANTARIOL. (*Pharm.*) Différentes dénominations employées par les Arabistes pour désigner le mercure.

ALCHERON. (*Pharmacie.*) *Lapis alcheron*. Quelques écrivains ont donné ce nom à l'espèce de pierre que l'on trouve dans la vésicule du fiel de bœuf; ces sortes de concrétions, ou calculs biliaires, sont formées par l'épaississement de la bile, & on en reconçoit très-fréquemment à la fin de l'hiver lorsque les bœufs ont été retenus long-temps dans l'étable, & réduits au foin, &c.; tandis qu'on en trouve rarement pendant l'été, lorsque ces animaux ont des pâturages frais, & sont employés à quelques travaux. Ces observations faites depuis long-temps par Hoffmann, & confirmées tous les jours dans les boucheries, sont bien senties quelle est l'influence de l'exercice & des alimens sur l'état & la nature de la bile; aussi c'est dans le mois de mai que Schröder conseille de chercher des pierres dans la vésicule du fiel du bœuf. Ces calculs sont d'un volume plus ou moins considérable, ce qui dépend de quelque circonstance particulière, & peut-être de l'état

de force de l'animal, de son âge, & de l'espèce de nourriture qu'on lui a donnée; quoi qu'il en soit, ces calculs ou concrétions sont légères, tendres, friables, d'une couleur jaunâtre, souvent disposées par couches concentriques; & quand on les garde long-temps, dit Lemery, elles se réduisent en poudre à cause des petits vers ou mites qui s'y engendrent.

Cette espèce de pierre, qui a encore été désignée sous le nom de *berpard du bœuf*, a été fort recommandée comme sudorifique, apéritive, propre pour résister au venin, pour arrêter les cours de ventre, pour l'épilepsie. Jof. Duchesne, plus connu sous le nom de Quercetain, en vante sur-tout l'usage contre la jaunisse, & pour dissoudre les calculs biliaires. La dose étoit depuis six grains jusqu'à vingt-quatre, & on la donnoit en poudre, sous la forme de bols, ou délayée dans du vin. Enfin, on la recommandoit comme un excellent erichon pour faire éternuer, & on le regardoit propre à fortifier la vue & le cerveau. Tant de propriétés sont presque oubliées aujourd'hui; l'alcheron ou pierre biliaire du bœuf ne se trouve plus dans nos pharmacies; mais on prépare avec la bile de cet animal une sorte d'extrait dont quelques praticiens ont recommandé l'usage. (*Voyez* BILE.)

ALCHIMELECH. (*Pharmacie.*) Dénomination adoptée par quelques écrivains Arabistes pour désigner une espèce de melilot, que l'on a par la suite distingué sous le nom de *melilotus egyptiac*.

ALCHIMIE.

§. I. Généralités sur l'alchimie.

C'est, dit l'ancienne encyclopédie, la chimie la plus subtile, par laquelle on fait des opérations de chimie extraordinaires, qui exécutent plus promptement les mêmes choses que la nature est long-temps à produire, comme lorsqu'avec du mercure & du soufre seulement on fait en peu d'heures une matière solide & rouge qu'on nomme cinnabre, & qui est toute semblable au cinnabre natif que la nature met des années & même des siècles à produire.

Les opérations de l'alchimie ont quelque chose d'admirable & de mystérieux; il faut remarquer que lorsque ces opérations sont devenues plus connues, elles perdent leur merveilleux, & elles sont mises au nombre des opérations de la chimie ordinaire, comme y ont été mises celles du lilium, de la pyracée, du kermès, de l'émétique, de la teinture de l'écarlate, &c. &c. Suivant la façon dont sont ordinairement traitées les choses humaines, la chimie use avec ingratitude des avantages qu'elle a reçus de l'alchimie; l'alchimie est maltraitée dans la plupart des livres de chimie.

Le mot alchimie est composé de la préposition

al qui est arabe, & qui exprime *sublime* ou par excellence, & de chimie, de sorte que *alchimie*, suivant la force du mot, signifie la chimie sublime, la chimie par excellence. »

« Les antiquaires ne conviennent pas entr'eux de l'origine ni de l'ancienneté de l'alchimie. Si on en croit quelques histoires fabuleuses, elle étoit dès les temps de Noë. Il y en a même qui ont prétendu qu'Adam savoit de l'alchimie. »

« Pour ce qui regarde l'antiquité de cette science, on n'en trouve aucune apparence dans les anciens auteurs, soit médecins, soit philosophes, soit poëtes, depuis Horace jusqu'à 400 ans après Jésus-Christ. Le premier auteur qui parle de faire de l'or, est Zosime, qui vivoit vers le commencement du cinquième siècle. Il a composé en Grec un livre, *sur l'art divin de faire de l'or & de l'argent*. C'est un manuscrit qui est à la bibliothèque du roi. Cet ouvrage donne lieu de juger que lorsqu'il a été écrit, il y avoit déjà long-temps que la chimie étoit cultivée, puisqu'elle avoit déjà fait ce progrès. »

« Il n'est point parlé du remède universel, qui est l'objet principal de l'alchimie, avant Geber, auteur Arabe, qui vivoit dans le septième siècle. »

« Suidas prétend que si on ne trouve point de monument plus ancien de l'alchimie, c'est que l'empereur Dioclétien fit brûler tous les livres des anciens Egyptiens, & que c'étoit ces livres qui contenoient les mystères de l'alchimie. »

« Kirker assure que la théorie de la pierre philosophale est expliquée au long dans la table d'Hermès, & que les anciens Egyptiens n'ignoient point cet art. »

« On fait que l'empereur Caligula fit des essais pour tirer de l'or de l'orpiment. Ce fait est rapporté par Pline, *histoire naturelle*, chap. XXXIII. Cette opération n'a pu se faire sans des connoissances de chimie, supérieures à celles qui suffisoient dans la plupart des arts & des expériences, pour lesquelles on employe le feu. »

« Au reste le monde est si ancien, & il s'y fait tant de révolutions, qu'il ne reste point de monument certain de l'état où étoient les sciences dans les temps qui ont précédé les vingt derniers siècles : je n'en rapporterai qu'un exemple. La musique a été portée dans un certain temps chez les Grecs à un haut point de perfection : elle étoit si fort au-dessus de la nôtre, à en juger par ses effets, que nous avons eu peine à le comprendre ; & on ne manqueroit pas de le invoquer en doute, si cela n'étoit pas bien prouvé par l'attention singulière qu'on fait que le gouvernement des Grecs y donnoit, & par le témoignage de plusieurs auteurs contemporains & dignes de foi. »

« Il se peut aussi que la chimie ait du même été portée à un si haut point de perfection que nous ne pouvons la faire aujourd'hui, & que nous ne comprenons pas comment il seroit possible qu'on

l'exécutât. C'est la chimie aussi perfectionnée qu'on a nommée alchimie. Cette science comme toutes les autres, a péri dans certains temps, & il n'en est resté que le nom. Dans la suite, ceux qui ont eu du goût pour l'alchimie, se sont tout d'un coup mis à faire des opérations dans lesquelles la renommée apprend que l'alchimie réussissoit : ils ont aussi cherché l'inconnu sans passer par le connu. Il n'ont point commencé par la chimie, sans laquelle on ne peut devenir alchimiste que par hazard. »

« Ce qui s'oppose encore fort aux progrès de cette science, c'est que les chimistes, c'est-à-dire ceux qui travaillent par principes, croient que l'alchimie est une science imaginaire à laquelle ils ne doivent pas s'appliquer ; & les alchimistes au contraire, croient que la chimie n'est pas la route qu'ils doivent tenir. »

« La vie d'un homme, un siècle même n'est, pas suffisant pour perfectionner la chimie ; on peut dire que le temps où a vécu Beccer, est celui où a commencé notre chimie ; elle s'est ensuite perfectionnée du temps de Stahl, & on y a encore bien ajouté depuis ; cependant elle est vraisemblablement fort éloignée du terme où elle a été autrefois. »

« Les principaux auteurs d'alchimie sont Geber, le moine Bacon, Lulle, Ripley, Jean le Hollandais, Isaac le Hollandais, Basile Valentin, Paracelse, Van Zuchren, Sendigovius, &c. (*Enc. Encyclop.*)

« On voit par cette manière de parler de l'alchimie, que l'auteur de cet article dans la première édition de l'encyclopédie étoit bien loin d'avoir des idées nettes sur l'art de faire de l'or, sur sa différence d'avec la chimie ; il suppose des principes propres à guider dans cet art, & il auroit dû dire que plus on avance dans la chimie & moins on trouve de chemin qui conduise à l'alchimie ; qu'il n'y a aucune étude, aucune marche connue pour se diriger dans les recherches relatives à l'art de la pierre philosophale. Malquer en a parlé avec bien plus de précision dans son dictionnaire. » Le terme alchimie, dit-il, a été employé par les prétendus adeptes, & par les chercheurs de pierre philosophale, pour désigner la chimie par excellence, dont ils se flattent que la connoissance est réservée à eux seuls. Les adeptes regardent la chimie comme une science vulgaire, qui contient à peine les premiers éléments de la science mystérieuse de l'alchimie ; mais jusqu'à présent ils n'ont rien produit qui, au jugement des personnes sensées, puisse donner le moindre fondement à une pareille prétention. Les vrais chimistes regardent l'alchimie comme une science imaginaire, & ceux qui s'y adonnent comme des gens qui, fiute d'être suffisamment instruits, quittent la réalité pour courir après l'ombre. »

Dans le discours préliminaire qu'il a mis à la

tête de son dictionnaire, il s'exprime encore sur cette science d'une manière qu'on ne faisoit trop loyer, à cause de la précision des idées & de la clarté qui y règnent. En commençant l'histoire de la chimie, il s'arrête sur l'alchimie, qui l'a en effet précédée & qui lui a même donné naissance. « Quoique nous soyons, dit-il, fort peu avancés dans l'histoire de la chimie, nous ne pouvons cependant la suivre plus loin, sans faire mention d'une singulière manie qui attaquait la tête de tous les chimistes : ce fut une sorte d'épidémie générale, dont les symptômes prouvent jusqu'où peut aller la folie de l'esprit humain, lorsqu'il est vivement préoccupé de quelque objet, qui fit faire aux chimistes des efforts surprenans, des découvertes admirables, & mit néanmoins de grands obstacles à l'avancement de la chimie ; dont la guérison enfin, qui n'a commencé à paroître que dans le dernier siècle, a été la véritable époque du renouvellement de cette science, & de ses progrès vers la perfection. »

« On voit bien, sans doute, que je veux parler du désir de faire de l'or : dès que ce métal fut devenu, par une convention unanime, le prix de tous les biens, il alluma un nouveau feu dans le fourneau des chimistes. Il paroisoit fort naturel en effet que ceux qui avoient des connoissances particulières sur la nature & les propriétés des métaux, qui avoient les travailler & leur faire prendre mille formes différentes, cherchassent à produire le plus beau & le plus précieux des métaux. Les merveilles qu'ils voyoient chaque jour naître de leur art, leur donnoient même une espérance assez raisonnable d'ajouter ce nouveau prodige à ceux qu'ils opéroient déjà ; ils étoient bien éloignés de savoir alors si ce qu'ils entreprennoient étoit possible ou non, puisque même à présent la chose n'est point encore décidée. Ce seroit donc une injustice que de blâmer leurs premiers efforts ; mais par malheur ce nouvel objet de leurs recherches n'étoit que trop capable d'exciter dans leur ame des mouvemens bien opposés aux dispositions philosophiques ; il s'empara tellement de leur attention, qu'il leur fit perdre de vue les autres objets : ils crurent voir la perfection de toute la chimie, dans ce qui n'étoit que la solution d'un problème particulier de chimie ; la sphère de leur science, au lieu de s'étendre, se trouva par-là concentrée autour d'un point unique, vers lequel ils dirigèrent tous leurs travaux : le désir du gain devint leur mobile ; ils furent cachés & milieux ; en un mot, ils eurent absolument les caractères des ardeurs : s'ils avoient réussi, ils auroient été de simples faiseurs d'or, au lieu d'être des chimistes éclairés & savans ; mais, par malheur pour eux, ils ne furent que les ouvriers d'un métier qui n'existoit point. »

« Cette circonstance qui les peignoit d'un gain

habituel, fut néanmoins ce qui les empêcha de se confondre avec les autres artisans ; ils eurent par-là une sorte de conformité avec les savans : & comme il est naturel de profiter de tous ses avantages, ils se prévalurent de celui-ci pour s'arroger le nom de philosophes ou de chimistes par excellence, qualité qui est exprimée par la particule arabe *al*, qu'ils ajoutèrent au nom de leur science, & d'où sont venus les noms d'alchimie & d'alchimistes. »

« Cette sorte d'hommes fut donc, comme on le voit, une espèce moyenne entre les savans & les artisans : ils eurent le nom des premiers, le caractère des seconds, & ne furent en effet ni l'un ni l'autre. Pour soutenir leur nom, ils firent des livres comme les philosophes, ils écrivirent les principes de leur prétendue science ; mais comme le caractère ne se dément point, ils lo firent d'une manière si obscure & si peu intelligible, qu'ils ne donnèrent pas plus de lumière sur leur art prétendu, que n'en donnent sur les métiers qu'ils exercent, les ouvriers qui n'écrivent rien. »

« Plusieurs d'entr'eux tentant apparemment le reproche bien fondé qu'on pouvoit leur faire à cet égard, s'efforcèrent d'attirer l'attention de leur lecteur, en annonçant dès le commencement de leurs livres, qu'ils vont parler très-clairement ; mais ils se donnent bien de garde d'en rien faire. C'est une chose singulière que de les voir, après avoir promis avec beaucoup d'emphase de révéler les secrets les plus cachés, s'expliquer d'une manière encore plus obscure que tous ceux qui les ont précédés. »

« On peut juger du degré de considération que s'acquirent, dans la société, ces personnages qui n'y faisoient rien, & dont on n'apprenoit rien ; aussi leur histoire n'est-elle pas moins obscure & moins embrouillée que leurs écrits. On ne sait au juste le vrai nom de la plupart d'entr'eux, le tems où ils ont vécu, si les livres qu'on leur attribue sont ou ne sont pas supposés ; en un mot, tout ce qui les concerne est une énigme perpétuelle. »

Ces considérations générales, si bien pensées & si bien présentées par Macquer, feroient-elles devoir suffire, pour donner de l'alchimie l'idée que les hommes, les plus savans & les plus sages en même-tems, en ont conçue depuis long-tems. Mais on pourroit peut-être croire qu'on a voulu affecter une sorte de mépris, sur un objet qui a occupé tant d'hommes pendant une longue suite de siècles, si l'on s'en tenoit à cet exposé succiné de l'opinion d'un seul chimiste ; on pourroit en inférer qu'un jugement trop prompt ne seroit provenu que d'un examen trop léger ; & l'on doit éviter un pareil reproche, sur-tout dans un ouvrage destiné à présenter l'ensemble le plus vaste & le plus complet des connoissances acquises sur toutes les parties de la chimie. Il y a encore un certain nombre de chimistes qui ne pensent point tout-à-fait comme Macquer sur l'alchimie ; il n'est

*j'ai démontré impossible de faire de l'or, est pour beaucoup d'hommes un argument qu'ils oppoient sans cesse aux détracteurs de cet art prétendu, & contre lequel on n'a rien à opposer, que l'innocence des travailleurs; mais cet succès même, & le conseil qui doit en résulter pour ceux qui seroient tentés de le livrer aux travaux alchimiques, ne peuvent avoir de bâte que dans l'examen approfondi de la question. Pour ne rien négliger sur ce point, il a paru convenable : 1°. de présenter dans cet article, après les généralités qui y ont déjà été exposées, une esquisse de l'histoire de l'alchimie; 2°. de faire connoître les fraudes, les supercheries, employées pour séduire & tromper les hommes à différentes époques, & qui ont été recueillies par Geoffroy; 3°. de le terminer par les observations & réflexions de Bergman, sur le fond de la question. On aura par ce moyen tout ce qu'il y a de plus essentiel sur l'alchimie. A l'histoire des principaux personnages qui s'en sont occupés, sera jointe celle des opérations qu'on dit leur avoir réussi, & des transmutations ou projections les plus fameuses. L'examen approfondi de ces faits principaux, l'ensemble des réflexions les plus sages qu'on ait faites jusqu'ici sur l'art en lui-même, assureront ensuite la marche de la pensée sur cette branche de la chimie; on verra dans les deux premières parties la liaison de l'alchimie avec la chimie, le rapport de ces deux genres de connoissances, leur ancienne confusion, le départ qui s'en est opéré dans le siècle dernier, leur éloignement réciproque qui est bien tôt devenu aussi remarquable, que leur ancien rapprochement avoit été intime. Comme beaucoup d'hommes sans aveu, de charlatans & d'imposteurs, de plus d'un genre, ont pris souvent le prétexte de l'alchimie, & se sont armés du titre d'adeptes pour tromper des hommes crédules qu'ils ont entraînés dans des dépenses folles, & dont ils ont même quelquefois causé la ruine totale, on a cru qu'il pourroit être utile, pour éviter les malheurs, dont on a encore trop d'exemples, de fournir, par l'histoire de leurs impostures connues, un rempart pour se défendre contre leurs impostures à venir. Le mémoire de Geoffroy l'ainé, qui a pour titre : *des Supercheries concernant la Pierre Philosophale*, & qui est inséré parmi ceux de l'académie des sciences, pour l'année 1722, pag. 61, a fourni tous les détails relatifs aux impostures des faux alchimistes. Les ouvrages de Borrichius, du savant Conringius, de l'Anglais Wulfenoy, de Sénac, de Macquer, de Bergman, ont servi pour tracer les principaux points de l'histoire de l'alchimie; deux paragraphes, très-bien faits, de la dissertation de Bergman, sur le moyen ago de la chimie, traitent la question de la possibilité de la pierre philosophale, & de l'existence des transmutations, d'une manière si complète, qu'il a paru suffisant d'en offrir la traduction pour remplir cette partie.*

Chimie. Tome II.

§. II. Histoire abrégée de l'alchimie.

Les anciens monuments égyptiens ne présentent point de traces de la science de ces peuples dans l'art de faire de l'or. Quelques auteurs attribuent, à la vérité à cet art, les immenses richesses de l'Egypte; telles que les étonnantes pyramides, les obélisques, les colosses, les jardins suspendus, les sépultures, les labyrinthes, les canaux souterrains, dont les anciens historiens ont parlé d'après leur propre inspection, & dont il reste encore quelques vestiges; tous ces travaux ne peuvent, suivant ces auteurs, avoir été construits qu'avec les grands moyens que donne l'art de faire de l'or. Diodore de Sicile rapporte que Sesostris fit bâtir un vaisseau de bois de cèdre, tout couvert d'or; il parlo d'un cercle d'or de 365 coudées, placé au suite du tombeau d'Osymandias; il assure que sous le siècle d'Alexis, on éleva, en Egypte, des statues d'or massif, & même des temples entiers du même métal précieux; mais comment ajouter foi à ces récits? Il est, à la vérité, bien étonnant qu'avec de pareilles richesses, on ne connût aucune mine du temps d'Hermès; & que celles qu'on découvrit ensuite aient exigé plus de dépenses qu'elles n'avoient de rapport; aussi quelques historiens pensent-ils que le récit de ces mines n'a été que le voile dont les rois d'Egypte ont couvert ou enveloppé le secret de faire de l'or qu'ils possédoient. On étaye l'existence de cet art, d'un temple élevé à Memphis en l'honneur de Vulcain, dont Hérodote & Diodore parlent, en nous apprenant que c'est à ce dieu qu'on attribuoit la découverte de tous les arts métalliques, & qu'il étoit lui-même adoré sous le nom du feu, en raison des services signalés que le feu a rendu aux hommes pour la création & la perfectionnement de ces arts. C'étoit-là la plus belle partie de la chimie, suivant Zosime & Synésius. Cédénus, auteur du onzième siècle, assure positivement que Faunus ou Hermès a possédé l'art de faire de l'or; mais toutes ces assertions, tous ces exemples ne prouvent point que les Egyptiens ont connu cet art; car l'industrie & le travail peuvent seuls procurer de pareilles richesses. Il est bien plus vraisemblable que ces contrées, dans les temps reculés dont on parle, recelloient des immenses quantités d'or natif dans leur propre domaine, ou dans des pays voisins, d'où on les apportoit en Egypte par la voie du commerce.

Dans le quatrième siècle, la singulière folie de faire de l'or s'empara de tous les hommes qui cultivoient la chimie. Depuis long-temps ce métal procuroit tous les autres biens. Les chimistes connoissant les propriétés de tous les corps, & leur faisant tous les jours éprouver des changements qui sembloient tenir du miracle, s'occupèrent à l'envi, & par un accord commun, à produire ce métal si précieux, soit par l'appât du

E

gain, soit par la vanité d'imiter les opérations de la nature. Ils faisoient faire varier les métaux dans leurs propriétés; ils espéroient qu'ils pourroient aussi en changer la nature & la rendre plus parfaite par des moyens appropriés. Quoique ce problème parût difficile, personne ne l'avoit démontré insoluble, & de nos jours même cette démonstration n'a pas encore été faite : ce n'est donc pas sans espérance que les chimistes se livrèrent à des travaux immémorables pour arriver à leur but. Cependant les travaux ont été suivis sous de malheureux auspices, non-seulement à cause du défaut de succès, mais sur-tout parce qu'en faisant naître un véritable vertige, ils ont détourné les pensées des chimistes de la saine philosophie; l'espoir du gain leur a fait tourner tous leurs efforts vers ce seul point; en sorte que s'ils avoient pu réussir, ils auroient été de simples faiseurs d'or, & point de savans chimistes. L'avarice la plus féroce, la jalousie la plus basse s'emparèrent bientôt de ces hommes, les rendirent fombres, cachés, mystérieux; en sorte que tous ceux qui voulurent décrire leur prétendu art employèrent des figures hiéroglyphiques, des signes & un style ridiculement obscurs & équivoques. En n'apprenant rien, ils ont eu soin de cacher l'ignorance la plus profonde sous une enveloppe dure & grossière. L'écouper d'entr'eux ont cru que leur art étoit caché dans la table d'Hermès; d'autres l'ont reconnu dans la chaîne d'or d'Iomère; quelques-uns, avec plus de vraisemblance, dans la toison d'or conquise par les Argonautes: c'est le sentiment de Johan d'Antioche qui vivoit sous le règne d'Héraclius & de Suidas. C'n fait que les anciens désignoient les livres sous le nom de peaux. Plutarque dit que deux cents mille volumes donnés à Cléopâtre par Antoine, enlevés des bibliothèques des Attalus, rois de Pergame, étoient écrits sur des peaux de bouc. Ces mêmes maîtres de l'art qui nous occupe, expliquent comment la connoissance du grand œuvre est parvenue en Colchide. Strabon rapporte que Séfoltris a visité l'Éthiopie, le pays des Troglodytes, l'Arabie & toute l'Asie, & qu'il a couvert de temples tous ces vastes pays. Ils font venir de là les traces très-anciennes de chimie en Chine, & ils trouvent dans Hérodote, Diodore de Sicile, Strabon & Marcélin, des preuves que ces peuples sont des restes des armées de la Colchide. Suivant eux, ces peuples y ayant trouvé le cinabre, la matière du grand œuvre, y fixèrent leur séjour; & d'après le récit de l'line, ils tirèrent beaucoup d'or & d'argent de la terre vierge, qu'ils y découvrirent aussi; enfin, ils l'emportèrent bientôt sur le magnifique Ésoftris, suivant le même auteur, par la richesse de leurs meubles, de leurs bâtimens de tout genre, & de leurs vêtemens. Les chefs de ces nouveaux habitans initiés dans les mystères des Égyptiens, enlevés à leur premier pays, oublièrent peu-à-peu la loi du silence qu'ils

devoient conserver soigneusement sur la chimie; & s'éloignant des usages des prêtres Égyptiens, ils inscrivirent le grand œuvre sur la toison d'un bœuf; mais ils eurent bientôt occasion de s'en repentir, car les Grecs, attirés par ce secret précieux, entreprirent l'expédition des Argonautes. Mais malgré cette histoire, assez bien tissée pour être vraisemblable, un mot de Strabon empêche d'y croire. Il rapporte que les Libériens, voisins des peuples de la Colchide, ayant inventé l'art d'attacher sur les tissus de laine les fragmens d'or qu'ils recevoient des torrens, ont ainsi donné naissance à la fable de la toison d'or. Ce récit fait disparaître, ou au moins diminuer beaucoup la prétendue antiquité de l'art de faire du l'or. Au reste, quoique, les mots grecs *χρυσος* *or* ou *ισχυατος* peussent signifier la fabrication de l'or par l'union de ses principes, beaucoup de passages des auteurs prouvent qu'ils désignent aussi l'extraction de ce métal de ses propres mines; c'est ainsi que, dans la langue latine, le mot *aurifex* veut dire l'ouvrier qui fait des vases ou des instrumens quelconques avec de l'or. Fabriquer de l'huile ne signifie autre chose que l'extrait des matières où elle est toute contenue. S'il en faut croire Suidas, le troisième siècle a vu périr beaucoup de monumens qui apparemment à cet art. Six cents ans avant lui, l'aul Orosius, prêtre espagnol, avoit assuré la même chose. Dioclétien, dit-on, pour punir les Égyptiens qui s'étoient révoltés contre lui, livra aux flammes tous leurs livres sur la chimie de l'or & de l'argent, afin qu'ils ne pussent plus s'enrichir & résister aux armes des Romains. Sans ajouter foi à ce récit, il est certain que le mot chimie, après avoir été employé pour désigner une connoissance quelconque sur la nature des corps, a signifié ensuite la fabrication de l'or & de l'argent; qu'elle a été nommée aussi *art sacré*, *art divin*, & enfin, par l'effet d'une opinion insensée, *alchimie*, ou *chimie par excellence*. C'est dans les ouvrages de Julius Firmicus Maternus, qui vivoit vers le quatrième siècle, que se trouve pour la première fois le mot alchimie, employé cependant comme un nom très-connu. La phrase où il en est question respire la folie astrologique: *si c'est*, dit-il, *la maison de Mercure, elle donne l'astronomie, celle de Vénus annonce les chants & la joie; celle de Mars les armes, & tous les instrumens guerriers; celle de Jupiter, le culte divin & la science des loix; celle de Saturne, la science de l'alchimie*. Ce mot est peu en usage dans les auteurs jusqu'à neuvième siècle; depuis cette époque, il s'y trouve très-fréquemment. Il est très-remarquable que dans les passages cités de Suidas, de Johan d'Antioche & de Cédrenus, le mot alchimie n'est pas prononcé, mais celui de chimie, *χημια*, & cependant ces deux mots avoient dès-lors une signification très-différente.

Proclus Lycius l'one les Égyptiens de ce qu'ils inscrivirent leurs découvertes sur des colonnes

(Comm. r. in *simas*) ; Galien & Jamblichus affirment la même chose , en ajoutant que chaque découverte approuvée par les prêtres , étoit gravée dans leurs temples. Diodore dit que les prêtres conservèrent les livres les plus secrets , que Clément d'Alexandrie croit être ceux d'Hermès. Ces colonnes d'Hermès contenoient toutes les sciences , & sur-tout l'alchimie , sans parler de ceux de médecine , d'astrologie , de religion , dont les anciens historiens , dans chaque partie , vantent beaucoup le mérite ; mais toutes ces assertions sont au moins aussi obscures & aussi douteuses que l'existence de manuscrits hermétiques conservés encore aujourd'hui dans les bibliothèques. Albert-le-Grand assure qu'Alexandre a trouvé dans ses voyages le tombeau d'Hermès , avec ses ouvrages inscrits sur des tables de pierre ; ces tables , inconnues aux Grecs , & indiquées par les Arabes , contenoient les secrets les plus cachés des arts & des sciences. On en a extrait sur-tout une description plénicienne des secrets d'Hermès Trismégiste , qui contient treize propositions assez courtes , obscures comme tout ce qui tient au langage alchimique , & dans lesquelles on a trouvé le secret de la pierre philosophale. Il seroit superflu de rapporter ici ces propositions , qui ont été traduites en latin par Kriessmann , & qu'on trouve dans Bergman. Schroder assure que cette table autographe existe à Turin , *August. Turinorum*. Kircher nous apprend que Bernhard Ganisius est le premier qui ait fait connoître cet ouvrage ancien , & qu'il contient la théorie du grand œuvre , nommé aussi , comme on fait , élixir de vie , or potable , quintessence , &c. En effet , Kriessmann y a trouvé , en 1657 , l'explication du mercure des philosophes ; & G. Dornus y a vu la médecine iaspérique universelle.

Quant aux autres ouvrages égyptiens sur l'alchimie , on compte dans Uterde , l'opuscule d'Isis adressé à son fils Horus ; la chimie d'Horus , *Hori chemica* ; les traités du prêtre Comarus ou Comarus , maître de Cléopâtre dans l'art philosophal ; les ouvrages de Cléopâtre elle-même sur la confection de l'or , sur les poids & les mesures ; mais Léon Allatus & Borrichius les regardent avec raison comme apocryphes ; ils sont manifestement dus à des hommes qui ont emprunté les noms de personnages fameux pour attirer la confiance de leurs lecteurs. Il paroît , malgré les obscurités qu'on a attribuées aux Egyptiens , relativement au grand œuvre , dont on les a cru possesseurs , que ces peuples étoient très-avancés dans la connoissance de la nature & dans la pratique des arts , mais qu'au milieu des folies restes qu'on nous en a conservés , & des mystères alchimiques qu'on leur a prêtés , nous avons véritablement perdu l'ensemble de leur théorie & de leur science.

Les Grecs , instruits par Cadmus , ont cultivé plusieurs sciences ; mais ils ne paroissent pas avoir beaucoup contribué aux progrès de la phi-

losophie naturelle. Ceux qui s'en font occupés , & que les alchimistes comptent parmi leurs auteurs , ont été puiser leurs connoissances en Egypte. Suivant Diodore , Orphée , Muséus , Mélampe , Dœdale , Homère , l'aton , Pythagore , Eudoxe , Démocrite d'Abdère , ont voyagé chez les Egyptiens , & reçu d'eux les secrets de l'alchimie. l'aton & Eudoxe , dit-il , ont vécu treize ans avec les prêtres égyptiens , qui leur ont communiqué la science des choses célestes , & tous les secrets des arts ; ils ont appris à lire une partie de ces secrets sur les colonnes qui les receloient ; mais ils en ont rapporté en même-temps dans leur pays l'esprit mythologique & le style hiéroglyphique , qui ont empêché les lumières de ces arts de se répandre en Grèce. C'est ainsi que la secte d'Alexandrie , née chez les Grecs , vers le septième siècle , couvrit la chimie d'énigmes , de métaphores , de paraboles , de formules platoniques & cabalistiques ; le peu de lumières que ces peuples possédoient furent beaucoup affoiblies quand ils passèrent sous le joug des Romains , & s'éteignirent entièrement lors de leur conquête par les Sarracins. C'est par la connoissance que les Grecs ont paru avoir de plusieurs mines , par celles de Thaze , dans la mer Egée , d'où ils faisoient extraire de l'or , par la fabrication des trois fameux métaux de Corinthe , l'un imitant l'or , l'autre l'argent & le troisième tenant pour ainsi-dire le milieu ; c'est par l'emploi du cinabre , qui portoit alors le nom de minium ; c'est par l'île de Chypre , qu'on dit avoir donné son nom au cuivre ; c'est , enfin , par tous les détails contenus dans Homère , sur la fusion , la purification , la soudure , l'alliage des métaux , que les historiens de l'alchimie ont attribué aux Grecs le secret de la pierre philosophale. La seule histoire du colosse de Rhodes , de cent dix pieds de hauteur , qui a rendu si célèbre Charès , son auteur , dont la fabrication a duré douze ans , & a coûté trois cents talens , dont les fragmens , après qu'il eût été renversé par un tremblement de terre , chargèrent huit cents chameaux , de huit cents livres chacun ; cette histoire , dis-je , fait voir au moins que l'art du fondeur étoit très-avancé en Grèce ; & l'on fait combien l'étoient aussi l'art de la sculpture , celui de la gravure en pierres dures , &c. ; mais tout cela ne prouve pas plus que les monumens des Egyptiens , que l'alchimie ait véritablement existé chez les Grecs. Il faut , à la vérité , en chercher encore la trace dans l'histoire de quelques Grecs fameux , que les alchimistes ont revendiqués parmi eux. On attribue à Orphée des hymnes & un livre original sur les pierres *magi lapides* , dans lequel étoient exposées la nature cachée & les propriétés de ces corps , pour les sacrifices , & pour fléchir la colère des dieux ; il y est , dit-on , traité du cristal , de l'agate , du jais , de la topaze , de l'opale , de l'aunant , du jayet , &c. On juge bien qu'avec

les connoissances nécessaires pour traiter de ces substances, on a pu supposer qu'Orphée devoit avoir celle de la pierre philosophale. Homère & Pindare ont été également rangés parmi les alchimistes, parce que l'on a regardé l'histoire des pommes du jardin des Hespérides, de l'Hydre vaincue par Hercule, du phénix renaissant de sa cendre, de la toison d'or, &c., comme autant d'emblèmes qui cachotent le secret de la pierre philosophale; &c. en effet, les alchimistes des siècles suivans ont employé les mêmes figures pour voiler leurs opérations. Démocrite d'Abdère est un des philosophes grecs qu'on a le plus vantés parmi les alchimistes de l'antiquité. Seneque dit qu'il savoit fondre les pierres, imiter les émeraudes, colorer de toutes les manières les verres & les compositions, ramollir l'ivoire. L'étrone assure qu'il avoit examiné les sucs d'un grand nombre de plantes, & qu'il a passé une grande partie de sa vie à faire des expériences. Suivant Diogène Laërce il a écrit sur l'or & l'argent, & sur-tout sur la pierre philosophale, ainsi que sur les pierres & la poutre; mais ce qu'il y a de singulier, c'est que cet historien le loue d'avoir été précis & obscur, tandis qu'il blâme l'ambrosien, son contemporain dans ces études, d'avoir été clair & détaillé. Mais on a lieu de douter que Lémocrite ait véritablement écrit sur la pierre philosophale; il paroît qu'il a fait un traité sur les pierres précieuses; à la vérité on lui en attribue un autre sur les *minères de la lune & du soleil*, dont le titre a plus de rapport avec les prétentions de l'alchimie. Aristote, Théophraste, Dioscoride & Galien, ont écrit sur les fossiles & sur les métaux; mais ils n'ont presque rien dit dans leurs ouvrages qui puisse être appliqué à l'alchimie.

On range dans cet ordre le manuscrit de Porphyre sur la chimie, dans le troisième siècle; dans le quatrième siècle, le poème d'Héliodore, sur l'art mystique des philosophes; dans le cinquième, les teintures de l'airain de Perse, & du fer de l'Inde, par Philippe; l'opuscule de Dioscorus, pierre de Sérapis; l'épître de Synésius, au même Dioscorus, sur la teinture d'or & d'argent de Démocrite; c'est au cinquième siècle qu'il faut encore rapporter Zosime; anapolite, fameux parmi les alchimistes; on conserve, dans les bibliothèques, les ouvrages manuscrits de cet homme, *sur la composition des eaux; sur l'art sacré & divin; sur les instruments de ses fourneaux, &c.* Olympiodore est cité comme commentateur des ouvrages de Zosime; on compte aussi, à peu-près à cette époque, l'heophraste le philosophe, qui a écrit *sur l'art sacré & divin; Hierotheus, sur la pierre philosophale; Archaëlus, sur l'art chimique; Anépirophus, sur le moyen de changer l'eau divine, &c. sur la croyance ou l'usage de faire de l'or; Pelagius, sur cet art divin; Eugène, sur le secret chimique;* & un grand nombre d'autres auteurs alchimiques d'une origine obscure, dont l'époque est difficile

à fixer, & dont on conserve beaucoup d'ouvrages manuscrits dans les grandes bibliothèques: Libavius, Olaus Borrichius & Conringius, ont beaucoup parlé des auteurs d'alchimie, & ceux qui voudroient les connoître plus en détail doivent les consulter. Tout ce qu'on peut tirer de cette partie de l'histoire de la chimie, qu'on a entièrement rangée dans celle de l'alchimie, c'est que les Grecs ont fait peu d'expériences, & qu'ils ont imaginé un grand nombre de systèmes plus ou moins frivoles; ainsi, en les considérant sous ce dernier point de vue, on peut, à juste titre, les regarder comme s'étant occupés des chimères alchimiques, dont leurs idées & leur style se rapprochoient en effet beaucoup.

On croit que l'alchimie a régné dans l'Inde, & qu'elle y est même très-ancienne; mais il n'y a rien de certain à cet égard. Quant aux Chinois, si nous en croyons les missionnaires, & sur-tout le jésuite Martini, ils s'occupent d'alchimie 2500 ans avant Jésus-Christ; mais ce qu'on voit, & qui a pu autoriser cette opinion, c'est qu'ils possédoient les arts chimiques long-temps avant l'arrivée des Européens en Chine. On compte, parmi ces arts, la préparation du nitre, du borax, de l'alun, du vert-de-gris, du sublime corrosif, du sublime doux, de l'ethiops mercurel, la poudre à canon, les teints d'artifice, les teintures très-belles & très-durables, les porcelaines d'une excellente qualité; ils s'avoient aussi obtenir purs, l'or, l'argent, le mercure, le plomb, le cuivre, le fer, l'étain, le zinc; ils préparoient ce cuivre blanc, composé de cuivre, de nickel, de fer & de zinc, qu'on fait encore être employé à beaucoup d'usages dans ce pays.

Suivant Joseph Scaliger, les Romains n'ont connu la chimie que très-tard, & après avoir subjugué les Egyptiens & les Grecs, on trouve vers le commencement de l'ère chrétienne quelques traces d'expériences & d'arts que les alchimistes ont regardés comme des preuves de l'existence de l'alchimie chez les Romains. Vitruve décrit l'amaigmentation de l'or employée pour extraire ce métal des étoffes brûlées. Pline indique la dorure en or moulu, & l'essai de l'argent par la pierre de touche. Il parle aussi d'une extraction, ou comme le prétendent les alchimistes d'une fabrication de l'or avec de l'orpiment faite par Caligula, mais il avoit que le profit a été fort au-dessous de la dépense. L'étrone annonce la découverte du verre ductile, dont Dion Cassius parle aussi; mais l'ine observe que cette découverte a été beaucoup plus vaine que prouvée. En général la plupart des arts de luxe que l'on doit à la chimie ont été cultivés avec succès à Rome; mais on ne trouve pas dans l'histoire des Romains des preuves qu'ils aient fait grand cas de l'art de faire de l'or, & que beaucoup d'entre eux aient non pas réussi, mais même travaillé dans cet art.

Ces notions sur l'histoire de l'alchimie dans les premiers âges de la science, appartiennent à l'histoire générale, considérée depuis les plus anciens peuples jusqu'à la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie par les Arabes. Quant à ce que Bergman nomme la seconde époque ou le moyen âge de la chimie, elle s'étend depuis le milieu du septième siècle jusqu'au milieu du dix-septième, & comprend à peu-près mille ans. Une foule d'hommes le sont occupés de l'alchimie dans cet espace de temps, en sorte qu'on pourroit nommer cet âge *alchimique* ou *hermétique*. Les Arabes ont beaucoup cultivé l'alchimie dans le neuvième siècle, c'est alors qu'elle est en quelque sorte confondue avec l'astronomie, qu'on a sur-tout fait sympathiser les métaux avec les planètes : cet accord a duré bien long-temps en Europe. Tchobrahé avoit un laboratoire où il traitoit les corps terrestres par le feu, en même temps qu'il observoit le mouvement des autres, & le grand Newton a mêlé ses recherches chimiques à ses calculs sublimes. Les expéditions des Européens en Orient, répandirent les trésors littéraires des Arabes en Europe vers la fin du onzième siècle, & l'alchimie n'est point oubliée dans ce commerce qui fait le plus d'honneur à l'esprit humain, puisqu'il tend au perfectionnement de la raison humaine & de l'art social. Mais les alchimistes augmentèrent encore leur style mystérieux, il s'envelopperent d'une ombre plus épaisse, parce que tous les hommes qui se distinguoient par l'étude & par des découvertes, étoient poursuivis par la superstition ; souvent ils furent punis de mort comme magiciens ou possédés du démon. Pen-à-peu cependant, & à mesure que les alchimistes multiplioient leurs expériences, la science chimique y gagna, sans que l'alchimie eût plus d'éclat dans ses procédés & plus de précision dans ses moyens. La masse des expériences recueillies sans ordre & sans système ressembloit, dit Bergman, à un tas de pierres, de sable, de chaux, de poutres, &c., propre à la construction d'un édifice, mais l'arrangement n'existoit point dans tous ces matériaux. Les opinions fautes, les préjugés répandus trop généralement, & paussifient encore les ténèbres ; on croyoit certain qu'on faisoit de l'or de toutes pièces, & qu'on étoit sur le point de posséder des remèdes capables de guérir tous les maux & de rendre même l'homme immortel. Ainsi attachés uniquement aux richesses & à la prolongation de la vie, les hommes qui étudioient alors la nature tournoient tous leurs efforts vers ce but ; ils vivoient avec le plus grand soin d'instruire les autres & de les mettre sur la voie pour arriver à leurs découvertes ; ils imaginoient des caractères & des figures métaphysiques, ou figures, pour se rendre intelligibles ; & les ouvrages qu'ils publioient en grand nombre, sembloient n'être destinés qu'à tromper ceux qui voulaient suivre leurs traces ; ils mé-

naçoient même du dernier supplice ceux qui auroient écrit trop clairement & dévoilé leur secret ; tout, jusqu'à leurs noms, étoit un mystère dans leurs ouvrages, & ceux-ci cependant étoient extrêmement multipliés même avant la découverte de l'imprimerie.

Telle est l'idée que Bergman donne de l'alchimie dans le moyen âge ; mais ce tableau rapide ne-suffit point dans un article qui à l'alchimie pour objet : il faut puiser dans un historien particulier de cette science prétendue, quelques détails sur les hommes singuliers qui se font occupés de l'alchimie, depuis les Arabes jusqu'à la création des sociétés savantes. L'englet Dufresnoy, dans le premier volume de son histoire de la philosophie hermétique, présente un précis assez exact dont on croit devoir donner ici les traits principaux. C'est vers le tiers du neuvième siècle que les Arabes commencèrent à se distinguer dans la science hermétique. On doit rapporter, à cette époque, les ouvrages de Geber, fameux en alchimie. On le croit de la ville de Ihus, en Corasan, province de Perse. Il reste trois ouvrages de ce philosophe, dans lesquels on a cru voir tous les secrets de l'alchimie, le testament, l'invocation de la perfection des métaux, & le *summa perfectionis magisterii in sua natura* : c'est sur-tout dans son dernier traité que Geber a, dit-on, décrit le grand œuvre, quoiqu'on convienne qu'il est nécessaire d'en chercher les véritables opérations dans une foule de procédés faux.

Dans le dixième siècle on compte sur-tout Rhafes, médecin de l'hôpital de Bagdad, fameux pour avoir introduit le premier la chimie dans la médecine : lié, par ses talens distingués, avec les princes du temps, ses ouvrages ont été la source de ceux de la plupart des médecins arabes qui l'ont suivi : il est difficile de savoir pourquoi on le range parmi les alchimistes, à moins que ce ne soit en raison de l'obscurité qui règne dans la description de ses opérations sur les substances minérales. Farabi ou Alfarabi, est encore un des arabes qui, dit-on, a écrit sur l'alchimie, & qui en possédait tous les secrets : il parait que c'étoit un de ces hommes nés heureusement, & faits pour réussir dans tous les genres d'études, puisqu'il possédait un grand nombre de talens en apparence très-éloignés les uns des autres. L'englet Morien, qui a écrit en arabe quelques ouvrages sur l'alchimie, & qui a montré le grand œuvre à Calid, sultan d'Egypte. Avicenne, dont les ouvrages en médecine ont été pendant si longtemps un des principaux guides de ceux qui ont voulu étudier avec soin cette science, est encore cité comme ayant écrit sur la philosophie hermétique & pratiqué le grand-œuvre : mais plusieurs savans croient apocryphes les ouvrages qu'on lui attribue sur cette matière.

Il règne beaucoup d'obscurité dans l'histoire de

l'alchimie depuis le dixième jusqu'au treizième siècle. Dans celui-ci, cette folie étendit rapidement son empire ; on fut commencer cette espèce de renouveau à Roger Bacon. Cet homme extraordinaire, par l'étendue de sa science & le nombre de ses découvertes, né en 1214, près d'Elcester, dans le comté de Sommerfet, moine Franciscain, célèbre par ses connoissances en optique, l'invention de la poudre, &c. percuté en 1278, emprisonné en 1279, mort en 1291, après s'être retiré à Oxford, a écrit quelques traités fort obscurs sur l'alchimie ; il n'en est pas moins regardé comme ayant trouvé le secret de la pierre philosophale. Il en est de même d'Albert le grand, &c. on trouve en effet dans ses ouvrages plusieurs passages qui tiennent à la fabrication de la pierre, &c. qui semblent annoncer qu'il en a eu le secret. Thomas d'Aquin, élève du précédent, &c. auteur d'une dissertation très-courte, intitulée *Traité de l'alchimie*, n'a pas pu échapper à cette qualification d'alchimiste ; &c. d'ailleurs il devoit tenir ce secret de son maître Albert. Alain de Lille, est encore un des alchimistes heureux du treizième siècle : comme on dit qu'il a vécu jusqu'à plus de cent ans, c'étoit une conséquence nécessaire qu'il fût préparé l'elixir des sages. La réputation de ces alchimistes a été éclipsée par celle d'Arnaud de Villeneuve, qui fut pour les adeptes une des principales lumières de leur art. Celui-ci, qu'on croit né vers le milieu du treizième siècle dans une des provinces méridionales de la France, a beaucoup voyagé ; quoique sa principale étude ait été la médecine, il s'est beaucoup adonné à l'alchimie ; &c. plusieurs de ses contemporains, en le qualifiant de grand théologien & de savant médecin, ajoutent qu'il faisoit de l'or très-pur, &c. qui résistoit à toutes les épreuves. A en croire Maïus Porrius, le secret de la pierre philosophale a été si familier à Arnaud de Villeneuve, qu'en 1664 il dit avoir vu à Avignon un M. Villeneuve Montpefat, arrière-petit-fils du fameux Arnaud, faire des expériences qui prouvoient que ce secret lui avoit été laissé en héritage. Le témoignage de Jean André, célèbre jarisconsulte, son contemporain, appuie encore cette opinion, en assurant qu'il avoit fait de l'or qu'on trouvoit très-bon, par tous les moyens connus. Il a encore, aux yeux des alchimistes, un autre mérite, c'est d'avoir fait un élève fameux. Raymond Lulle, né à Majorque en 1235, est un des hommes les plus singuliers dont l'histoire de l'alchimie fasse mention : en voyageant de royaume en royaume, de cour en cour pour prêcher le christianisme, dont il a été victime, il a, dit-on, composé cinq cents ouvrages sur toutes les connoissances humaines, &c. sur-tout sur l'astrologie & l'alchimie : il a fait croire à ses contemporains, &c. il étoit peut-être persuadé lui-même qu'il avoit fait de l'or.

Arnaud de Villeneuve & Raymond Lulle,

firent naître le goût de l'alchimie parmi les hommes de toutes les classes : on compte dans cette liste le pape Jean XXII qui a possédé &c. décrit l'art transmutatoire des métaux, qu'on s'est hâté de traduire en français. Il se vante, au commencement de ce livre, d'avoir fait deux cents lingots d'or pesant chacun un quintal. On voit qu'il y a eu dans ce genre des imposteurs de toutes les classes.

Jean de Meun est rangé parmi les alchimistes, parce qu'il paroît, par son roman de la rose, qu'il s'est occupé entr'autres sciences de la philosophie hermétique : on regarde même ce roman comme une histoire allégorique du grand-œuvre. Jean de Meun est né sur les rives de la Loire, à quelques lieux d'Orléans, en 1279, &c. il est mort vers l'an 1365.

Jean de Rupeffissa ou de la Roquetaillade, cordelier, qu'on a mis dans la même liste, paroît cependant n'avoir rien fait qui doive le faire placer dans cette histoire.

Nicolas Flamel, né à Pontoise vers le milieu du quatorzième siècle, étoit écrivain à Paris en 1357 ; il fut en même temps poète, peintre &c. alchimiste : mais ce dernier talent ne lui est venu que par hasard, &c. d'un livre qu'il acheta. Comme de pauvre qu'il étoit il est devenu assez riche pour doter des hôpitaux, &c. on a vu qu'il savoit faire de l'or ; au reste il en a fait un bon emploi en fondations, &c. au soulagement des pauvres ; cependant on a jetté quelques doutes sur la prétendue origine de sa fortune : il dit lui-même, dans ses ouvrages, que c'est le 17 Janvier 1381 qu'il a réussi à la projection, &c. qu'il a converti du mercure en argent ; &c. le 15 août suivant, du mercure en or.

Dans le même temps Pierre-le-Bon de Lombardie, le moine Ferrari en Italie, Crémier, Jean Daustini ou Dastin &c. Richard en Angleterre, ont pratiqué &c. écrit sur la philosophie hermétique. Crémier avoit appris ce qu'il savoit dans cette science de Raymond Lulle, qu'il alla trouver exprès en Italie, &c. qu'il ramena avec lui à Westminster, avec la promesse d'engager Edouard dans la guerre de religion, qu'il avoit vainement cherché à susciter jusqu'alors contre les mahométans : le roi d'Angleterre promit, mais ne tint point sa parole.

Le quizième siècle fut beaucoup plus fécond en artistes que les précédens. Ce fut au commencement de ce siècle que parut l'abbé Valentin, un des plus illustres philosophes hermétiques qui ait jamais existé. On a cru, pendant long-temps, que c'étoit un être imaginaire ; mais l'histoire véritable &c. exacte de la ville d'Erfort où il étoit religieux, en fait une mention expresse. Ses nombreux ouvrages, écrits en allemand, ont été traduits en latin &c. en français. Les plus estimés sont les *Deux Clefs* & l'*ApoA*, ainsi que la *Révélation des secrets des métaux*. Cet habile artiste

a beaucoup travaillé sur l'antimoine, & son ouvrage, sur cet objet, a donné lieu à plusieurs commentaires. Quoiqu'il soit plus clair dans sa logique que ceux qui l'ont précédé, cependant il faut le lire avec beaucoup d'attention, pour en pénétrer le sens & ne pas tomber dans l'erreur.

Les Isaac, hollandais, père & fils, vécutrent dans le même siècle; ils furent, d'après le sentiment de Boerhave, des artistes infiniment distingués. Paracelse & Boyle ont répété avec succès beaucoup des opérations qu'ils ont décrites dans leurs ouvrages, qui ont été traduits en latin, & dont l'objet principal étoit le traitement des métaux.

Bernard Trévifan naquit à Paris en 1406: il a fait lui-même l'histoire de sa vie, & du mauvais succès qu'il a eu en travaillant en alchimie, sur la foi des philosophes qui l'avoient précédé. L'ouvrage de Rhazes fut le premier livre qu'il lut; il en répéta vainement toutes les expériences qui lui coûtèrent huit cens écus. Espérant que Geber seroit plus vrai, il s'y livre & perd plus de deux mille écus. Les mauvais succès ne le décourageoient pas; il conçut de l'espérance des traités d'Archelus, de Rupeiffa & de Sacrobosca, & pour mieux éviter l'erreur, il s'affoia à un religieux, avec lequel il rectifia plus de trois cens fois le même esprit-de-vin que nul vase ne pouvoit contenir tant il étoit expansible: cette opération réitérée lui coûta trois cens écus. Il travailla infructueusement, pendant douze ans, à dissoudre, & à congeler ou cristalliser, à sublimer le sel commun & le sel ammoniac, les différens aluns & la couperose; il tourna aussi ses regards sur les excréments, soit des hommes, soit des animaux: il dépensa, à toutes les opérations qu'il leur fit subir, environ fix cens écus. Enfin, découragé par tant de dépenses & de temps perdu pour lui, il se mit à prier Dieu avec ferveur pour qu'il le dirigé dans la bonne voie. Il recommença à travailler par le sel marin, qu'il rectifia dix-huit fois sans lui faire subir d'altération: ce mauvais résultat lui fit quitter le travail sur cette matière, & porter les vus sur les eaux-fortes, dans lesquelles il fit dissoudre, en pure perte, beaucoup d'argent & de mercure. Ne voulant plus s'appesantir sur une seule méthode, dont il avoit des exemples malheureux, il chercha dans d'autres substances, & les creus devinrent l'objet nouveau de ses recherches: il en fit calciner jusqu'aux coquilles, toujours avec le même succès. Un jour, ayant entendu dire qu'un certain maître Henri, confesseur de Frédéric III, avoit le secret de la pierre philosophale, il partit sur-le-champ, accompagné de quelques personnes atteintes de la même folie, pour le connoître. A force de sollicitation, de confiance & de promesse, ils vinrent à bout de déterminer le confesseur à travailler à frais communs avec eux: ils mirent en expérience quarante-deux marcs d'argent, qui de-

voient leur en rapporter au moins cent cinquante, mais qui finirent, au bout de quelques années, par disparaître entièrement à force de rectifications: cette opération coûta encore à Trévifan deux cens écus. Ces pertes continuelles le rendirent sage pendant deux mois, & c'est beaucoup pour un homme de cette espèce: tout-à-coup un rayon d'espérance renaît dans son esprit, il se remit à parcourir l'Italie, l'Espagne, la Turquie, jusqu'à l'Egypte, la Barbarie, Rhodes, la Palestine, la Perse, espérant recueillir les lumières des philosophes, & en tirer parti pour recouvrer l'argent qu'il avoit perdu; mais ce fut en vain, il ne fit qu'y ajouter la perte de treize mille écus.

Ses propres moyens étoient dissipés; il eut recours à ceux d'autrui; & l'on sent que les résultats en furent semblables; pour s'en consoler, il se retira dans l'île de Rhodes avec la grande rofaine, Arnaud de Villeneuve, Marie la prophétesse & la Tourbe, tant il est vrai que pour daucés les illusions qui entretiennent notre folie, il assure cependant qu'il a fini par connoître le secret, d'après la lecture comparée de tous les auteurs.

Les ouvrages de Trévifan sont peu nombreux; on n'en connoît que trois, la *Philosophie naturelle*, ou l'*Œuvre secret de la Chimie*, la *Parole délaissée*, & une *Lettre à Thomas de Boulogne*. Il est mort en 1490, âgé de 84 ans.

Les grands ne furent point exempts de la folie de faire de l'or; le roi Charles VI gagna cette maladie contagieuse de courtisans qui environnoient son esprit de toutes sortes de prestiges, pour aliéner son royaume & le piller plus à leur aise.

Dans le même temps existoit un autre visionnaire; c'étoit Jean de la Fontaine; il travailla toute sa vie à la construction des fourneaux & aux distillations, sans sortir de son laboratoire; il écrivoit tout ce qu'il faisoit en vers français. Il mourut à Valenciennes en 1413.

C'est en vain que quelques personnes ont voulu faire accroire que Jacques-Cœur avoit fait, par le secours de l'arthermétique, la fortune immense dont il jouissoit. Elle n'étoit que le résultat de ses infâmes concussions, de vols & de dépredations de toutes espèces; ce qui n'a été que trop bien prouvé pour lui.

Nicolas Northon, que l'on croit du milieu du quinzième siècle, a publié un ouvrage sur l'alchimie, dans lequel il dit, avec un air de sincérité, tout ce qu'il fait & peut être ce qu'il ne fait pas. Michel Mayer l'a donné en latin, sous le titre de *Tripas aureus*.

Un homme plus célèbre a été Georges Ripley; il lut les auteurs les plus en réputation sur la science hermétique; mais ne les comprenant point, il voyagea dans l'espérance d'apprendre, par la conversation des philosophes eux-mêmes, ce qu'il n'avoit pu faire dans leurs livres. Il étoit religieux; les communautés, dans lesquelles il entra, ne lui

offrant pas la solitude & le repos qui lui étoit nécessaire pour l'exercice de la philosophie hermétique, il se fit anachorète, &c, renfermé dans sa cellule, il travailla pendant long-temps avec tant de circonspection & de silence, que ses confrères, qui ne comprenoient rien à ce qu'il faisoit, le déclarèrent maëïcen après sa mort, qui arriva en 1499. C'est lui qui a écrit le livre des *Donzè portes*.

L'Italie dans ce temps ne fut point sans alchimistes; mais on s'étonne de voir le célèbre Marfile de Ricci, ce sectateur zélé de la morale de l'aton, ne point trouver indigne de ses regards cette prétendue science qui devoit, selon lui, être une des branches de la médecine. Il mourut en 1492.

Jean Pic, prince de la Mirandole, contemporain de Marfile de Ricci, a laissé un ouvrage sur l'or, qui nous représente moins un artiste qu'un savant curieux de connoître les progrès de la science hermétique.

Le seizième & le dix-septième siècle furent si féconds en artistes & en chimistes de tout genre, que ce seroit fe jeter dans un labyrinthe dont on ne pourroit fortir, que d'essayer d'en faire l'histoire détaillée. Erasme raconte, dans ses dialogues sur la chimie, une partie des supercheries auxquelles s'exercent ces sortes de gens pour tromper la crédulité des avares.

Jean Aurelio Augurelli, né à Rimini, a écrit en vers sur l'alchimie, & comme il enseigna d'abord les belles-lettres à Venise & à Trévise, c'étoit une suite de son premier métier; il a possédé une grande partie de sa vie dans son laboratoire, entouré de fourneaux, de soufflets & de chibon, instrumens de sa cupidité, espérant faire de l'or & de l'argent avec le mercure vulgaire. Ce n'étoit point assez pour lui d'être ridicule pendant sa vie, il voulut l'être aussi après sa mort, en faisant un poème qu'il dédia au pape Léon X: ce pape lui fit remettre une grande bourse vide, en lui disant qu'il ne devoit manquer aux faiseurs d'or qu'un lieu pour le mettre.

Henri Cornelle Agrippa, naquit en 1486 avec des talens supérieurs; il fut assez vain pour vouloir se faire regarder comme un théologien sublime, un excellent juriconsulte, un médecin habile & un grand philosophe, &c il trouva des gens assez confians pour l'en croire fur parole; cela cependant lui procura les emplois les plus importants & les plus honorables; mais sa fortune ne fut pas de longue durée, son imprudence lui fit bientôt perdre la confiance qu'on avoit en lui; il fut abandonné, réduit à la misère la plus grande, d'autant plus promptement & plus complètement, qu'il arbora le signe de l'alchimie, de laquelle beaucoup de personnes commençoient à se désier. Il mourut en France, à l'âge de 49 ans.

Paracelse naquit à Einsiedelen, près de Zurich en Suisse; cet homme extraordinaire ne

suivre point, dans l'art de guérir, les préceptes de ses prédécesseurs; on croit même qu'il ne se donna jamais la peine de les connoître: il commença à l'exercer à Zurich, d'où sa réputation le fit passer à Bale; mais une aventure singulière l'en fit sortir désagréablement. Un chanoine étoit à l'extrémité; les médecins l'avoient abandonné; Paracelse le vit, & promit de lui rendre la santé; il n'y avoit sortes de reconnaissance que le malade ne lui offrit, comme c'est l'usage; il convint de prix; Paracelse n'employa que deux pilules pour guérir le chanoine qui, à peine convalescent, coutassa sur l'honneur du médecin. Le procès fut porté devant les magistrats de la ville qui, trouvant que le médecin avoit guéri trop promptement le chanoine, lui fixèrent un salaire très-moderne; comme il se plaignoit tout haut de cette injustice, les jurés le forcèrent de quitter la ville. Il mourut à Altrbourg, le 24 septembre 1541, à 48 ans, après avoir promis des siècles de vie à tous ceux qui le consultoient.

Ce ne fut que dans sa jeunesse (âge où il est permis d'errer) que George Agricola s'occupa de l'alchimie; après quelques voyages, dont le motif étoit de visiter les mines, il revint dans sa patrie, où il fut employé dans les mines; il sentit que cette voie étoit plus sûre que celle de la transmutation des métaux; il a publié sur cet objet des ouvrages estimés; il prit naissance un an après Paracelse; &c il est mort le 11 décembre 1555, en laissant après lui une réputation durable.

Denis Zachaire, né en 1510, gentilhomme de Guyenne, avoit pris ce nom supposé pour se soustraire au mépris qui a tant pourvuï alors les alchimistes. Il a fait une histoire de sa vie, dans laquelle il raconte, le plus ingénument du monde, toutes les aventures qui lui sont arrivées pendant l'exercice de la science hermétique; il détaille toutes les espérances vaines qu'il avoit conçues, tous les voyages inutiles, les opérations ruineuses qu'il a faites; toutes les embûches auxquelles il a été exposé par la cupidité des philosophes peu délicats du second ordre. C'est un plaisir de l'entendre raconter la manière dont ses écus diminuoient, &c se réduisoient en fumée; &c tout en disant qu'à force de travail il a fini par réussir, il cherche à dégoûter les jeunes gens de l'étude d'une science dont les résultats sont si incertains, &c qu'il n'est donné qu'à philosophes par excellence inspirés de Dieu de trouver.

Kelley Notaire Anglais, fut banni de son pays pour avoir fabriqué de fausses pièces de monnaie; & parcourant le pays de Galles, il lui tomba sous la main un vieux livre qui traitoit de la transmutation des métaux. Il s'informa de l'auteur chez qui il étoit, d'où venoit ce livre; on lui répondit qu'on l'avoit trouvé avec deux boules d'ivoire remplies, l'une d'une poudre rouge très-pesante, l'autre d'une poudre blanche, dans le tombeau d'un évêque, soupçonné d'avoir été enterré avec quelque trésor.

Cet

Cet aubergiste conservoit encore par simple curiosité une de ces boules, & même une portion de la poudre rouge de celle des boules qui avoit été brisée. Il en offrit à l'aubergiste, une livre sterling, qu'il reçut avec beaucoup d'empressement, n'y attachant aucun prix, si ce n'étoit celui d'une vaine curiosité. Kelley retourne aussitôt à l'un des faubourgs de Londres, où chez un orfèvre il fit la projection de sa poudre, qui lui donna un résultat selon ses desirs : alors il partit pour l'Allemagne, comme étant un pays plus libre. Là, il s'abandonna aux excès ordinaires à ceux qui passent subitement de l'indigence à une fortune considérable ; il semoit l'or de tous côtés, & il tranchoit du grand seigneur. Il répéta la projection en présence de l'empereur Maximilien II ; & pour se faire valoir davantage, il se vanta de posséder le secret. Cette gloire imprudente engagea l'empereur à lui ordonner de lui faire de cette poudre, sous peine de prison ; & comme il manqua son opération, il y fut en effet conduit : il le tua en voulant se faire.

Jean-Baptiste Nazzari ne fut pas un véritable alchimiste, mais il a peut-être fait beaucoup plus de mal que chacun d'eux, en exposant dans une seule langue très-connue, toutes les opérations fausses & ruineuses qui ont été faites sur cette science ; car c'est sorti des bornes de l'honnêteté que d'offrir, sous des dehors agréables & comme certains, des procédés que l'on fait être faux & pernicieux. La première édition de sa *Concordance des Philosophes* est de 1752, & la seconde, qui est plus ample, de 1799.

Thomas Erastus, fameux médecin, né à Bâle en Suisse, s'éleva dans les cours publics qu'il y faisoit, contre les opérations de l'alchimie, comme étant illusoires & sophistiques ; mais il eut à combattre un adversaire terrible, Gaston de Clèves, dit *Ledoux*, avocat, & ensuite président du parlement de Nevers. Celui-ci mit une telle chaleur, un tel soin dans cette affaire, qu'un *faulx* présenté à des juges pour soutenir son honneur offensé, n'auroit pas été plus soigneusement travaillé ; c'est ce qui a produit son apologie de la science hermétique écrite en latin. Son traité de la *Pierre philosophale, sa triple préparation de l'or*, ont été traduits en français par M. Salmon, médecin. Ils sont écrits très-nettement, & quelques-unes des opérations y ont un air de vraisemblance.

Blaise de Vigenère, contemporain de Gaston de Clèves, né à Saint-Pourçain en Bourbonnois, quoique n'ayant fait qu'écouter la science hermétique, a cependant donné quelques opérations utiles ; son traité du *feu & du sel*, avec ses commentaires, prouvent, par le génie qui y brille, combien cet homme auroit avancé la science, s'il s'en étoit spécialement occupé. Il mourut en 1596 le 19 février. Dans le dix-septième siècle, l'alchimie jette de profondes racines ; ses branches se multiplient, s'agrandissent, & portent ombrage

aux tois, comme étant funestes à leurs états. Chacun se cache donc, & n'ose paroître sous que dans son cabinet : malheur à celui qui a l'imprudence de se découvrir !

Cosmopolite, d'origine écossaise, dont le vrai nom est *Séthon* ou *Sidon*, fut la victime de son imprudence & de son folie. Ayant fait la transmutation devant Jacques l'hauffen, celui-ci en fut frappé, & ne put s'empêcher de communiquer ce fait aux médecins de la ville. Georges Morosio avoue avoir vu un morceau d'or sur lequel Jean-Anoine Vanderlinder avoit marqué qu'il provenoit d'une transmutation faite le 13 mars 1602, à quatre heures après-midi. Au lieu de rester tranquille dans sa patrie, Séthon alla en Saxe, où il eut l'imprudence d'opérer la transmutation devant des personnes qui ne manqueraient pas de l'aller dénicher à l'électeur. Ce prince, amateur de richesses comme tous les autres, fit arrêter le trésor vivant, & le mit dans une tour sous la garde de quarante hommes. Ce fut en vain que l'électeur employa promesses & menaces successivement pour obtenir son secret. Michel Sendivogus, gentilhomme, s'occupant un peu d'alchimie, eut envie de voir Cosmopolite ; ce qu'il obtint par ses amis qui étoient à la cour, espérant que le prisonnier, par reconnaissance, lui donneroit son secret. Il lui proposa de le faire sortir ; ce qui fut, comme on sent, accepté avec reconnaissance. Le jour qui avoit été fixé pour l'exécution du projet de son évaison, ils enivèrent les sentinelles, & ils partirent ensemble dans un chariot de poste pour Cracovie. Là Sendivogus somma Séthon de sa parole ; mais le philosophe lui répondit : « vous voyez en quel état j'ai été réduit pour n'avoir point voulu découvrir mon secret ; un corps à demi-pourri, des nerfs retirés, des membres entièrement disloqués doivent vous faire connoître combien est grand le silence que je dois garder sur mon opération ». Il n'en put obtenir qu'une once de poudre de projection, qui étoit cependant capable de faire sa fortune. Séthon ne jouit pas long-temps de sa liberté ni de son trésor, car il mourut avant l'année 1604. Tant d'événemens sinistres arrivèrent à Séthon en moins de deux ans ; & l'on voit que quand le secret de la transmutation existeroit véritablement, ce seroit presque à coup sûr un grand malheur que de le posséder.

Les frères de la Rose-Croix formoient entr'eux une société dont les réglemens n'étoient pas seulement des folies, mais des fourberies & des méchancetés. Ils prétendoient tout savoir, ne manquer de rien, être tout-puissans ; ils pouvoient vivre toujours ; aucune maladie ne leur résistait ; ils les prévenaient même quand ils voulaient, &c. C'étoient des espèces de dieux, peut-être même des êtres plus puissans que Dieu même ; mais malgré toutes ces belles qualités, ils ne purent le soustraire au jugement qui fut porté contre eux. Quelques-uns même furent pendus, d'autres en-

voyés aux galères, & le reste fut chassé; sans doute pour avoir attiré à eux, par leur chant mélodieux, quelques perles ou pierres précieuses, comme ils disoient en avoir la faculté. Ce seroit perdre son temps que d'insister sur de pareilles illusions, dont on auroit honte de parler, si ce n'étoit pour faire voir jusqu'où l'esprit humain porte ses égaremens, sa foiblesse, ou plutôt sa fourberie & sa méchanceté. Il n'a pas laissé que de sortir une grande quantité d'ouvrages des membres de cette société; mais ils ne font tiffus que de tromperies & de pièges: il seroit impossible d'en tirer quelque précepte utile pour l'avancement de la science.

Le dix-septième siècle continue à donner plus d'amateurs que de vrais philosophes; cependant les premiers ne sont pas toujours à rejeter; ils font quelquefois, sans y penser, des découvertes utiles dont les philosophes peuvent faire un usage avantageux. C'est dans ce rang que l'on peut placer les Michel Mayer, les Collinus, Mylius, Ortelius & Poterius: cependant il ne faut pas les confondre; il y a entre eux des lignes de démarcation très-sensibles. Le premier, en employant toutes les facultés, n'a rien dit de plus que ce qu'on avoit avant lui, & ses livres ne sont recherchés des curieux que par la seule raison qu'ils sont rares. Orvalde Collinus, qui parut dans le même temps, a donné qu'une introduction à la chimie; il suivoit les principes de Paracelse. On croit qu'il n'a point donné dans les égaremens des chimistes de son temps; il se contenta d'être bon artiste, & c'est bien assez quand on peut atteindre à la perfection. Ses travaux se sont bornés aux combinaisons des métaux, & peuvent fournir quelques lumières aux vrais savans.

Jean-Daniel Millus écrivit davantage; malheureusement ses ouvrages sont une espèce de pot-pourri où tout est mêlé & confondu; mais c'est au lecteur doué de discernement à démêler ce qui lui convient.

Ortelius est moins compliqué & plus ordonné; il mérite l'attention des artistes intelligens.

Michel Poterius étoit un homme glorieux, qui se vantoit de ce qu'il ne faisoit pas: il dit qu'il possédoit les plus grandes merveilles de la nature; qu'il étoit obligé de se cacher, que tous les princes le voulaient avoir. Mais on s'étonne qu'avec tant de secrets il n'ait rien fait pour lui, ni pour sa famille.

Jean, s'équin n'a donné qu'un abrégé succinct de la chimie, mais qui contient quelque chose d'original. Il avoit beaucoup voyagé à dessein de voir les mines, autant pour être pour découvrir le principe de la transmutation, que pour connoître la manière de les exploiter. C'est dans ce sens qu'il dit avoir vu cauler sur les parois de quelques mines, une liqueur onctueuse qui pourroit bien servir à la coagulation d'une matière sulfureuse qui forme les métaux.

Jean d'Espagnet, président à Bordeaux, vivoit en même temps que Reguin. Il s'est expliqué très-clairement sur la science hermétique dans

un ouvrage qui, quoique très-succinct, annonce une main savante. Il est intitulé: *Aranon philosophia hermetica*. Claus Borrichius dit avoir connu à Bordeaux son fils, qui conservoit encore l'original du petit ouvrage de son père.

Jean-Lapierre Vanhelmont, né à Bruxelles en 1577, cultiva la science hermétique; mais il avoue que s'étant spécialement appliqué à suivre les chimères de Paracelse, il n'en avoit point eu le secret: il prit le parti de la médecine, auquel ses parens voulurent en vain lui faire substituer celui de la robe. Il mourut à Vilvorde, près Bruxelles, le 30 décembre 1644.

Les anglais ont fourni, dans le même siècle, moins d'artistes que les autres nations; mais il s'en trouve parmi eux dont la solidité récompense le nombre.

Jean de Thornburg, évêque de Worcester, s'y appliqua; mais il reconnut lui-même qu'il n'étoit pas arrivé au but de la philosophie. Cependant, par amour pour la science, il engagea le roi Jacques à la favoriser, en disant que les vrais artistes qui travailloient secrètement se feroient un plaisir de se découvrir à lui, & de rendre service à la patrie: le roi Jacques ne l'écouta point, & l'eut-il écouté, il est douteux que les alchimistes eussent été assez imprudens pour se confier à un tel homme.

Northon s'y livra peu de temps après Thornburg; on ne sait s'il réussit, on fait seulement qu'il a écrit sur cette science avec assez de détail.

Butler, gentilhomme irlandais, fut moins connu pour philosophe hermétique que pour un voleur de la poudre avec laquelle il opéroit la transmutation; comme on l'accusa de faire de la fausse monnaie, il s'embarqua pour l'Espagne, mais il périt en toute par un naufrage.

Eyrenée Philalète fut un homme très-obscur dans son origine, ses mœurs, &c. On croit cependant qu'il naquit en Angleterre en 1612: quelques anglais pensent, au contraire, qu'il étoit français, parce que la plupart de ses ouvrages sont écrits dans la langue de ce pays. Mais ce qui peut donner des renseignemens plus exacts sur sa véritable patrie, c'est que Georges Starkey, apothicaire de l'Amérique angloise, de retour en Angleterre, a écrit plus d'une fois qu'il avoit connu l'hilalète en Amérique; qu'il venoit souvent dans son laboratoire, où il faisoit quelquefois la transmutation du plomb en or pur; la persécution qu'il éprouva le fit changer souvent de pays. On a cru qu'en passant en France ce fut lui qui donna la poudre avec laquelle Helvétius fit la transmutation du plomb en or. Le fameux Boyle a eu un commerce de lettres avec lui. Il vécut toujours dans la médiocrité, au milieu de richesses inépuisables. Mais comme l'art de la transmutation n'étoit pas toléré chez des particuliers, il ne faisoit d'or que ce qu'exigeoit son simple nécessaire. Il a fait plusieurs ouvrages assez connus, entre autres, *l'Innotius operus*, qui est très-fameux parmi les alchi-

mistes. On ignore comment & où il a fini sa carrière.

C'est avec raison que les allemands vantent plusieurs savans qui ont pris naissance chez eux, & qui se font plus ou moins occupés d'alchimie; tels sont, Glauber, Borrichius, Beccher, Kunckel & Stahl.

Rodolphe Glauber joignit le talent d'un artiste célèbre à celui d'un écrivain très-fertile; on est étonné que du milieu d'une pratique immense il ait pu produire un nombre si considérable de livres. Il vivoit au milieu du dix-septième siècle à Amsterdam, où il avoit élevé une école publique de chimie: il paroît qu'il croyoit à la possibilité & même à l'existence de la pierre philosophale.

Olaus Borrichius, né dans le Danemarck en 1626, diocèse de Høpang, fut distingué par des talens de tout genre; cependant il se livra tout entier à la médecine, & les connoissances qu'il y acquit furent très-utilement mises en pratique dans la peste qui ravagea son pays. Il fut ministre du roi de Danemarck, précepteur de ses enfans, professeur de philosophie, de poésie, de chimie & de botanique, dans l'académie de Copenhague.

Il profitoit des courtes vacances que tous ces emplois lui laissoient pour voyager, & ajouter quelques connoissances nouvelles à celle qu'il avoit déjà; il parcourut les Pays-Bas, l'Angleterre, la France & l'Italie: son goût pour la philosophie l'empêcha de se marier. Il mourut, le 3 octobre 1690, de la pierre. On croit qu'il n'avoit pas le secret de la science hermétique; mais il avoit quelques opérations particulières qui lui valurent une fortune plus grande que celle que l'on peut obtenir par cette science: il en fit un bon usage; il fonda une bibliothèque & une pension pour seize étudiants en médecine.

Jean-Joachim Beccher, né à Spire, quoiqu'ayant moins écrit que Glauber, eut autant de réputation; il possédoit parfaitement les principes de la science hermétique, & étoit bon naturaliste. Sans chercher précisément les moyens de faire de l'or, il n'auroit pas été fâché de le trouver. Il croyoit qu'il y avoit de l'or dans les cailloux, les sables, & il en a quelquefois retiré dans les nombreux essais. Il proposa à plusieurs princes d'Allemagne de faire des recherches, sa fortune ne lui permettant pas de les entreprendre seul; mais les princes, qui aiment beaucoup mieux l'or fait que l'or à faire, n'accueillirent point sa demande. Beccher fut obligé de se borner à son laboratoire, d'où il est sorti quelques expériences utiles: c'est à ses travaux que nous sommes redevables de plusieurs bons ouvrages, & surtout de sa *Physique fixatrice*, dont il n'y a que la première partie imprimée; la seconde, se trouve à Prague dans le cabinet du souverain. Le savant Stahl, très-capable de produire par lui-même, en a commenté la première partie.

La physique souterraine de Beccher est un des plus beaux ouvrages de chimie & d'histoire natu-

relle qu'ait produit le dix-septième siècle. On y trouve par-tout les connoissances les plus étendues & les plus profondes. Beccher a deviné une partie des découvertes faites long-temps après lui, sur les gaz, la fermentation, la putréfaction, la combustion, les acides, les matières animales, &c. Il connoissoit sur-tout un grand nombre de préparations métalliques; & quoique les alchimistes l'aient mis au rang des adeptes à cause de ses travaux sur les métaux, on reconnoît bientôt, en le lisant avec attention, qu'il étoit plus sage & plus instruit que la plupart de ces hommes. On peut encore lire avec fruit la *physique souterraine*.

Jean Kunckel, vivant dans le même temps que Beccher, ne le cède point en science & en réputation aux artistes précédens. S'il n'a pas eu le secret de la pierre philosophale, il a fait des découvertes utiles qui en approchent; il a vu beaucoup de phénomènes sur la dissolution des métaux, & il les a bien décrits dans son *laboratoire chimique*, un des ouvrages qui contiennent le plus de faits intéressans, & le plus de découvertes, de tous ceux qui ont paru dans le dix-septième siècle. C'est à lui que nous devons la connoissance du phosphore dont Hællot a donné le premier la préparation en France.

Quoique Georges l'neft Stahl soit plus près de nos jours, il passe, avec raison, pour le père de la chimie, qui lui doit une grande partie de son lustre. La dissolution de l'or par le tole de soufre, est une des opérations les plus curieuses, & qui peut influer sur la science hermétique. Ses ouvrages, qui sont très-connus, & qui ont été bien étudiés, ont fait avancer les progrès de la chimie, à laquelle son histoire est intimement liée: c'est mal-à-propos qu'on le rangeroit parmi les alchimistes. Sa doctrine du phlogistique qui n'a pu être produite que par un beau génie, a résisté à plus de soixante ans d'expériences & de découvertes.

Telle est l'esquisse de l'histoire de l'alchimie & des alchimistes, depuis les peuples les plus anciens jusqu'au commencement de notre siècle. On y voit par-tout des prétentions exagérées, un amour-propre intolérable, le jeu des plus viles passions, & nulle part une suite de faits vraisemblables, ni les élémens d'aucune science. A l'époque où cette histoire a été conduite ici, les alchimistes ont semblé disparaître de la surface de la terre; on n'a plus entendu parler d'eux, à mesure que la chimie philosophique a dissipé les prestiges & les erreurs de l'alchimie; il existe sans doute encore, & il existera encore long-temps, des hommes qui rechercheront la pierre philosophale; mais ils seront toujours cachés dans l'ombre, comme ils le sont depuis plus de quatre-vingt ans, & on ne pourra plus suivre les traces de l'alchimie. Pour présenter ici, sous un seul point de vue, les principaux traits de cette histoire, il a paru utile d'en offrir une notice chronologique, extraite de l'ouvrage de Lenglet DuRoissy.

*CHRONOLOGIE des plus célèbres auteurs de la philosophie hermétique ;
par l'abbé Lenglet Dufrenoy. (Histoire de la philosophie hermétique ,
Paris 1742, 3 vol. in-12. vol. 1. pag. 459.)*

(L'étoile mise à côté des noms marque un adepte, ou un homme qu'on a cru avoir trouvé le secret de la pierre philosophale.)

AN. J. C.		DEP. J. C.	
1996	* HERMÈS ou MERCURE TRISMEGISTE, roi d'Égypte, connu, dans la liste des rois de cette nation, sous le nom de Siphos; les traités que nous en avons sur la science hermétique, sont supposés, quoiqu'ils renferment sa doctrine.	38	CALIGULA, empereur, pratique la science hermétique.
1599	MOÏSE, chef & conducteur du peuple d'Israël; on a supposé, sous son nom, un livre sur la science hermétique.	80	On prétend que St-JEAN l'évangéliste, pratique la science hermétique.
540	* SOPHAR, persan, fut le maître d'Ortanes.	176	ATHÉNAGORE, philosophe chrétien, à qui on attribue le roman du <i>parfait amour</i> , imprimé à Paris, en 1599 & 1612, dans lequel on trouve quelques opérations de la science hermétique.
500	* OSTANÈS, mède, vivoit sous Xerrès, roi de Perse, à la suite duquel il étoit; alla en Égypte, & fut le maître de Démocrite. On a mis, sous son nom, des livres de philosophie hermétique, qui sont en grec & en arabe; ils sont supposés, ou viennent d'un Ostanes, Égyptien, au cinquième siècle.	350	ÉPIPHANIUS, est cité par Synesius; ainsi il vivoit avant ce dernier; mais nous n'avons rien de lui.
500	* JEAN, (JOHANNES) prêtre, vivoit avant Démocrite; l'on a, sous son nom, un manuscrit grec sur la science hermétique. J'adopte ce qu'en dit un ancien écrivain grec, qui le place avant Démocrite.	399	PHILIPPE, né à Syde en Pamphlie, fut prêtre de l'église de Constantinople, attaché à St. Jean-C. chrysostôme; disputa en 415 le siège patriarcal de cette grande ville; ne possédoit pas la science hermétique, & n'avoit que la teinture du fer & du cuivre en or.
480	* DEMOCRITE, philosophe grec, formé par Ostanes, & ensuite par les prêtres égyptiens; nous avons son traité, qui a été imprimé avec le commentaire de Synesius. Il se trouve fort communément parmi les manuscrits grecs de cette science.	400	SYNESIUS, né à Cyrène, ville principale de la province Cyrenaïque dans la Lybie: de payen se fait chrétien, étudia à Alexandrie, devient évêque de I-tolémaïde l'an 410. On a imprimé son commentaire sur Démocrite: il se trouve aussi dans les manuscrits grecs de la science hermétique. M. Tillemont a fait un très-grand article de Synesius dans son histoire ecclésiastique.
470	* MARIE, fut une juive très-curieuse, que Démocrite trouva à Memphis, où elle avoit été formée par les égyptiens. Son traité est imprimé dans les recueils. Ainsi, elle ne fut pas la sœur de Moïse, comme le marquent quelques éditons.	405	HÉLIODORE, ami particulier de Synesius; ce dernier lui adresse trois lettres qui sont dans ses œuvres. Héliodore fut fait évêque de Tricca en Thessalie: son traité qui est en vers, est imprimé au tome VI de la bibliothèque grecque de Fabricius, page 789.
325	* OSTANÈS, il y eut un philosophe de ce nom, du temps d'Alexandre-le-Grand. On ne fait que son nom, sans que nous en ayons aucun ouvrage.	410	* ZOZIME, né à Panopolis, dans le territoire de l'hébes en Égypte, mais qui demouroit à Alexandrie, est celui des anciens Grecs qui a le plus écrit sur la philosophie hermétique, mais rien n'en est imprimé; il se trouve assez communément dans les manuscrits grecs de cette science. On croit qu'il étoit chrétien; ainsi ce ne sauroit être Zozime l'historien, grand ennemi des chrétiens.
50	* COMARIUS, d'autres le nomme COMANUS, prêtre & philosophe égyptien, a instruit Cléopâtre sur la science hermétique. Nous avons de lui un traité manuscrit, mais qui est assez rare.	415	ARCHELAUS étoit chrétien, & son ouvrage se trouve parmi les autres chimistes grecs; il est obscur, mais on sent néanmoins qu'il étoit praticien dans la science hermétique.
45	* CLÉOPÂTRE, reine d'Égypte; nous avons, sous son nom, quelques procédés sur la conservation de la beauté, & l'on trouve dans les manuscrits quelques traités de cette princesse sur la science hermétique.	420	PLÉAGE cite Zozime; ainsi il lui est pos-

- Dep. J. C.* térieur. Nous avons son traité dans les manuscrits grecs de cette science.
- 430 * OSTANÈS, Égyptien; lettre à *Petofus* sur la science hermétique. Il y a divers traités d'Osthanès sur le même sujet, soit en grec, soit en arabe; mais on ignore s'ils sont de cet Osthanès, ou de quelque autre plus ancien.
- 430 CLYMPIODORE, philosophe de Thèbes en Égypte, lettre à *Petofus*, est certainement de ce siècle; c'est ce qui m'a obligé de mettre dans le même-temps Osthanès, puisque tous deux adressent leurs ouvrages à la même personne. Son traité se trouve seulement en manuscrit.
- 450 THÉOPHRASTE, philosophe chrétien.
- 630 * ETIENNE (ou STEPHANUS) d'Alexandrie, est qualifié dans les manuscrits du titre de philosophe universel; son traité sur la science hermétique n'a pas été imprimé, mais se trouve seulement dans les manuscrits.
- 635 HIEROTHÉE. Lambecius croit que c'est le même qui a commenté l'échelle de Saint Jean Climaque, qui vivoit en 579. Ainsi l'hierothée est du septième siècle.
- 638 PAPPUS, philosophe chrétien, dont l'ouvrage est en grec, & n'a jamais été imprimé.
- 650 COSME, moine, dont on a un traité manuscrit. Il paroît que sur la fin de ce siècle la philosophie hermétique tombe chez les Grecs.
- 830 * GEBER, arabe, né à Tuffo dans le Chorasan, province de la Perse; d'autres cependant le font naître à Haran, dans la Mésopotamie; il est le chef de tous les philosophes arabes. Outre les traités de cet auteur qui sont imprimés, il en reste encore quelques-uns en manuscrit. On dit qu'il avoit fait jusqu'à cinq cents volumes sur la science hermétique. On le prétend faiseur de religion: c'étoit un mélange de christianisme & de judaïsme. Voyez M. d'HERBELOT, bibliothèque orientale, au mot GIBBER.
- 920 RHASIS, ou RASÈS, célèbre médecin arabe, qui le premier a introduit la chimie dans la médecine: nous avons son traité sur la science hermétique.
- 954 FARABIUS, ou ALFARABIUS, célèbre philosophe arabe, meurt en 951. Il passe pour le plus grand philosophe des mahométans.
- 1000 SALMANA, philosophe arabe.
- 1036 * AVICENNE, un des oracles de la médecine & grand philosophe, étoit arabe; meurt en 1036.
- 1050 * ARISTOTE, arabe, se déclare lui-même disciple d'Avicenne: nous avons de lui

- Dep. J. C.* quelques traités qu'on attribue mal-à-propos au célèbre Aristote, précepteur d'Alexandre.
- 1050 * ADFAR, arabe, philosophe d'Alexandrie, & maître de Morien, vivoit vraisemblablement en ce temps.
- 1080 PSELLUS, grec, adresse une lettre à Xiphilin, patriarche de Constantinople, sur la science hermétique.
- 1100 * MORIEN, romain de naissance, mais formé à Alexandrie en Égypte, se retire dans les montagnes voisines de Jérusalem: il instruit Calid sur la science hermétique.
- * CALID, arabe mahométan, calife ou soudan d'Égypte, instruit par Morien.
- 1130 * ARTESIUS cite Adfar, & lui-même est cité par Roger Bacon; ainsi il est entre les onzième & treizième siècles.
- 1193 Naissance d'ALBERT-LE-GRAND à Lavangen, sur le Danube.
- * ABRAHAM, juif, dont Flamel a eu les figures & les explications. Je le place ici par conjecture.
- 1200 * ARISTEUS. Je le place ici par conjecture. S'il a fait la tourbe des philosophes, comme on le croit, il étoit chrétien & non pas mahométan arabe.
- 1200 RECHARDIUS, placé ici par conjecture.
- 1215 ZADITH, fils d'Hamel. Je le place ici par conjecture.
- 1225 Naissance de saint THOMAS D'AQUIN.
- 1235 Naissance de RAYMOND LULLE à Palme, capitale de l'île Majorque.
- 1250 VINCENT DE BEAUVAIS, de l'ordre de St-Dominique, n'a point travaillé, mais a donné de l'historique sur cette science.
- 1260 * CHRISTOPHE DE PARIS, ou de PIRROUSE.
- 1270 * ROGER BACON, cordelier anglais, né en 1192, est, à ce qu'on croit, le premier des Latins qui s'applique à la science hermétique.
- 1272 ALPHONSE, roi de Castille, s'exerce à plusieurs sciences curieuses, sur-tout à la philosophie hermétique.
- 1280 * Le moine FERRARI, ou EFFERRARI: on le croit de ce temps.
- 1294 * RAYMOND LULLE est instruit à la science hermétique, à Naples, par Arnould de Villeneuve.
- 1298 * Mort d'ALAIN DE LISLE, nommé le docteur universel, qui se fit frère convers à Cîteaux.
- PIERRE DE AYOINO n'a pratiqué que fort peu la science hermétique.
- 1310 * Mort d'ARNAULD DE VILLENEUVE, inhumé à Gènes. La plupart de ses traités sont imprimés.
- PIERRE TOLETAN, dont nous avons un

- Dep. J.C.
 1215 ROSEAU. Il paroît que c'est le même que celui à qui Arnould de Villeneuve a écrit.
 * JEAN DAUSTEIN, philosophe anglais, dont nous avons deux traités imprimés; les autres sont restés en manuscrit.
 1316 * JEAN XXII, pape, travaille à la philosophie hermétique: son traité, qui est très-obscur, se trouve imprimé.
 1320 * JEAN DE MEUN écrit & travaille sur la science hermétique, après avoir fini le roman de la rose.
 1325 * JEAN CREMER, abbé de Westminster, ami & disciple de Raymond Lulle, travaille à la science hermétique: son traité ou testament se trouve imprimé.
 1330 RICHARD, d'autres le nomment *Robe t Anglais*, de qui nous avons le *corellorium alchimia*, qui est estimé des connoisseurs.
 1330 * PIETRE BON DE LOMBARDIE travaille à Pola, ville de l'istrie vénitienne.
 1330 * ODOMARE pratique la science hermétique à Paris: nous avons son ouvrage.
 1357 * JEAN DE RUPESSISSA, cordelier français que le pape Innocent VI fit enfermer cette année pour de prétendus prophéties.
 1357 NICOLAS FLAMEL achète le livre d'Abraham, juif, & travaille inutilement vingt-un ans.
 1358 * CARTHOLAIN exerce la science hermétique à Paris.
 1378 FLAMEL va à Saint-Jacques de Compostelle pour chercher quelque juif qui lui explique les figures d'Abraham, juif.
 1376 FLAMEL revient de France, & travaille encore trois ans.
 1381 * Le 17 janvier, FLAMEL fait la projection à l'argent, & le 25 avril suivant, il fait la transmutation en or.
 1399 FLAMEL travaille à l'explication de ses figures.
 1400 CHARLES VI, roi de France, sous le nom duquel nous avons un traité, mais qui est plus capable de faire égarer un artiste que de l'instruire.
 1406 Naissance de BERNARD TREVISAN.
 1408 * ISAAC LE HOILANDAIS est vraisemblablement de ce siècle.
 1413 FLAMEL travaille de nouveau à l'explication de ses figures.
 1414 * BASILE VALENTIN, moine bénédictin à Erfort en Allemagne, est l'un des plus grands artistes de la philosophie hermétique.
 1450 JACQUES CŒUR, grand argentier de France, ou surintendant des finances.
 1455 THOMAS NORTHON, anglois, auteur

- Dep. J.C.
 effimé, dont l'ouvrage est imprimé par Michel Mayer.
 1459 * IACINI Colleagues, LACINI, moine de Calabre, a fait un abrégé de Pierre Lebon.
 1460 NICOLAS DE CUSA, cardinal, allemand, a été en son temps une des lumières de la philosophie: on trouve dans ses ouvrages quelques semences de la science hermétique.
 1470 * GEORGES ANRAC, ou AURAC, de Strasbourg, on le croit adepte. J'ai en manuscrit son *jeu des richesses* en latin, que le nommé Halluy avoit volé à un artiste qui avoit la manière. On prétend qu'il s'appelloit Lufiac; c'étoit un vieillard respectable, sur lequel j'ai fait inutilement beaucoup de recherches, & qui a cependant demeuré à Paris vers l'an 1525.
 1477 * GEORGES RIPLEY, anglais, dédié ses deux portes de la chimie à Edouard IV, roi d'Angleterre; apprend la science hermétique dans ses voyages, & a été un des plus habiles praticiens.
 1480 JEAN TRITHÈME, abbé d'Hirsaug, paroît en ce temps, & meurt seulement en 1516. Il fut très-versé dans toutes les sciences. On croit qu'il n'a pas ignoré la philosophie hermétique.
 1482 JEAN FICO, prince de la Mirandole, né en 1465, & mort en 1494, a donné un traité curieux sur l'or, où l'on trouve beaucoup de faits sur la transmutation des métaux; mais lui-même n'a pas été adepte: il est imprimé dans la collection de Manget.
 1488 VINCENT KOFFSKY, polonois, dont nous avons un traité sur la teinture des métaux; ouvrage très-obscur.
 1490 Mort de Georges RIPLEY, qui d'abord fut chanoine régulier de saint Augustin, puis, de dépit, se fit carme en Angleterre. On croit que Bernard Trevilian est mort la même année.
 1491 MARSILE FICIN, prêtre & grand philosophe, dont nous avons un traité sur la chimie. Il étoit né en 1433, & mourut près de Florence en 1499.
 1493 * Naissance de PARACELSE en Suisse. Il étudia la médecine, & lui fit ensuite changer de face.
 1500 PHILIPPE USTALDE, traité fort estimé, sous le titre de *Ciel des philosophes*.
 1514 AURELIO AURELLI paroît en ce temps à Venise, où il enseigna les belles-lettres, & il meurt à l'extrême, à l'âge de quatre-vingt-trois ans, extrêmement pauvre.
 1515 DIEGO ALVARES CHACAN est presque

- Dep. J.C.* le seul Espagnol qui ait travaillé sur la science hermétique.
- 1519 HENRI-CORNEILLE AGRIPPA, littérateur & philosophe équivoque.
- 1520 REGNIER SNOY, de Torgau en Hollande, a peu écrit sur la science hermétique; aussi en ce genre a-t-il fait très-peu de bruit.
- 1541 Mort de Paracelse, âgé de quarante-huit ans.
- 1542 GEORGES AGRICOLA, plus habile dans la métallique que dans la science hermétique.
- 1548 JEAN BRACESCHI, de Brescia en Italie, a commenté le Gebet qu'il n'entendait pas.
- 1550 GERARD DORNEUS, allemand, disciple de Paracelse, a beaucoup travaillé pour éclaircir son maître.
- 1551 * DREBELLIUS, flamand très-habile, mais fort obscur.
- 1552 PHILIPPE ROUILLAC, cordelier piémontais.
- 1553 * VENCESLAS LAVINIUS, gentilhomme de Moravie, dont nous avons un traité qui ne contient pas plus de trois pages, mais qui est estimé.
- 1555 JEAN FERNEL, de Montdidier en Picardie, médecin du roi Henri II, a donné quelques préparations chimiques, mais qui ne servent de rien; il s'est enrichi, mais non point de la science hermétique, qu'il n'a fait qu'entrevoir.
- 1556 * DENIS ZACHAIRE: on croit que c'est un nom supposé d'un gentilhomme de Guyenne & philosophe, qui vivoit sous Henri II, roi de France, & que l'on regarde comme un adepte.
- 1558 GUILLAUME GRATAROLLE ne peut & ne doit passer que pour un compilateur; il a fait une collection des philosophes hermétiques.
- 1560 LEONARD THURNEISSERS a passé autrefois pour un charlatan, & sa réputation n'est pas meilleure.
- 1561 ALEXANDRE DE SUCHTEN, allemand, doit on a un traité assez curieux sur l'antimoine.
- 1568 EDWARD KELLEY, notaire fripon, ce qui n'est pas rare, fut-tout en Angleterre, a eu, dit-on, la poudre de projection, mais n'en a pas eu le secret.
- 1569 JEAN DIE, ministre de la religion anglicane, ami de Kelley, a écrit sur la science hermétique.
- 1570 SALOMON DE TRISMOSIN, allemand, dont nous avons la raison d'or, estimée parmi quelques-uns, méprisée par

- Dep. J.C.* d'autres; c'est le sort ordinaire de ces sortes de livres.
- 1572 JEAN-BAPTISTE NAZARI, italien, plus grand compilateur qu'habile artiste; son livre est assez connu, mais il n'est pas commun.
- 1579 THOMAS FRASTUS, médecin habile, ennemi de l'alchimie.
- 1580 BLAISE DE VIGNERI, a peu pratiqué & peu écrit, en quoi je le trouve sage.
- 1581 DAVID BEUTHER, philosophe allemand très obscur.
- 1582 JUSTE BALBIAN, d'Alost dans les Pays-Bas, dont nous avons un traité, traduit même en italien, & quelques collections de la science hermétique, traduites aussi en italien.
- 1590 * GASTON DE CLAVES, lieutenant-général du présidial de Nevers, a bien écrit; & si on l'en croit, il a pratiqué heureusement.
- 1591 BERNARD-GABRIEL PENOT, mort à l'hôpital pour avoir pratiqué la science hermétique.
- 1592 FRANÇOIS-ANTOINE, de Londres; nous en avons plusieurs traités assez estimés.
- 1596 THEOBALDUS D'HOGHELANDE, philosophe de Middelbourg, en Zélande, a écrit assez bien, & a donné l'histoire des transmutations métalliques, qu'il a connues.
- 1599 HENRI CONRADT ou KUNRAT, allemand, a beaucoup écrit, & même assez obscurément, il n'a pas plus avancé que les autres; son *Amphitheatrum*, quoique rare & recherché, n'en est pas plus instructif.
- 1600 NICOLAS BARNAUD étoit un compilateur, & rien de plus.
- 1602 JEAN ERNEST BURGRAVE, allemand, a écrit plusieurs traités, mais il n'est pas mention qu'il ait réussi.
- 1603 * LE COSMOPOLITE ou ALEXANDRE SETHON, écossais, mort en Pologne vers l'an 1603.
- 1604 MICHEL SENDIVOIGUS, de Moravie, mais habitué en Pologne, où il est mort en 1646.
- 1605 LES FRÈRES DE LA ROSE CROIX; cette société imaginaire a fait beaucoup de bruit en Allemagne depuis 1605 jusqu'en 1615: aujourd'hui à peine en est-il mention.
- 1606 JEAN BEGUIN a donné une assez bonne introduction à la chimie, quoique très-abrégée; on y trouve des procédés utiles & curieux. Beguin avoit voyagé; il avoit visité les mines, & ce qu'il dit même de l'humour onduieuse qui découle le long des murailles des mines

- [Dep. J. C.] devroit donner quelques lumières aux artistes.
- 1607 PIERRE AMELUNGS a fait une apologie de la chimie ; mais à quoi cela sert-il ?
- 1608 ANDRÉ BRENTZI, de Padoue, a donné plusieurs moyens de parvenir à la pierre philosophale, que lui-même ne posséderoit pas : s'il avoit été assez heureux pour posséder ce trésor, il ne s'en seroit pas vanté, & en auroit encore beaucoup moins écrit.
- 1609 ANDRÉ LIBAVIUS, allemand, l'un des plus fertiles écrivains de la science hermétique. Je trouve même qu'il en a trop écrit : c'est aussi ce qui fait croire qu'il n'a pas réussi. Il est mort en 1616.
- 1610 * LE CHEVALIER IMPÉRIAL ; on le croit étranger, & l'on prétend qu'il est auteur de l'*Arcanum hermeticum philosophia*, attribué au président d'Espagne.
- 1611 ANGE SALA, de Vicence, en Italie, a beaucoup travaillé sur la science hermétique.
- 1612 HENRI NORLIUS a donné divers traités sur la philosophie hermétique.
- 1614 PHILIPPE MULLERS, médecin de Fribourg en Brisgaw, a donné un petit livre, où il prétend découvrir beaucoup de merveilles de la chimie.
- 1615 JEAN THORNEBURG, évêque de Winchester, en Angleterre, veut instruire les commençans ; mais depuis son ouvrage, les commençans n'en savent pas davantage.
- 1616 GABRIEL DE CASTAIGNE, cordelier, qui se qualifioit d'aumônier de Louis XIII, a travaillé sur l'or potable.
- 1617 OSWALDE CROLLIUS, chimiste allemand fort habile ; son introduction est assez recherchée des connoisseurs ; il étoit habile artiste, grand Paracelsiste, & rien de plus.
- 1618 LE SIEUR DE NOISEMENT, demeurant à Ligny, en Barois, a publié, dit-on, les travaux des autres ; mais cela ne lui a pas servi de beaucoup.
- 1619 MICHEL MAYER, médecin, né dans le Holstein, grand amateur, écrivain célèbre, mais qui n'a rien trouvé.
- 1620 * JEAN D'ESPAGNET, président à Bordeaux ; on croit qu'il avoit le secret de la science hermétique : on prétend cependant que le traité qui lui est attribué n'est pas de lui, mais du Chevalier Impérial, anonyme, qui n'est pas connu autrement.
- 1621 ANTOINE GONTHIER BILLICH, allemand, a écrit plusieurs traités curieux

- [Dep. J. C.] mais a-t-il pratiqué & réussi ? l'on en doute.
- 1622 ORTHELIUS a commencé la cosmopolite, & son ouvrage doit être la paimi les amateurs ; il a, dit-on, touché le vrai principe.
- 1623 ANDRÉ TENZELIUS, allemand, habile dans la philosophie hermétique, a fait, entr'autres, *Medicina diaphetica*, qui a été autrefois fort rare. Je sais que dans la rareté de ce livre, une dame philosophe n'ayant pu l'avoir pour de l'argent, offrit pour l'obtenir ce qu'elle avoit de plus précieux ; (c'est avoir bien du goût pour la science hermétique que d'en venir là.)
- 1624 JEAN-DANIEL MILIUS, médecin du pays de Hesse, a beaucoup écrit sur la science hermétique, & ses écrits ne sont pas communs.
- 1629 MICHEL POTIER (POTERIUS), homme qui a fait beaucoup de bruit en son temps, se vantoit extrêmement, se disoit habile & recherché des princes ; cependant il ne paroît pas qu'il en ait su plus que les autres.
- 1630 JEAN AGRICOLA a donné quelques traités assez curieux & assez estimés.
- 1631 SAMUEL NORTHON, anglais, a beaucoup écrit, & même fut des sujets importants.
- 1632 LE BARON DE BEAUSOLEIL, & MARTINE BERTEREAU, dame de Beausoleil. Ces deux personnes sont encore fort célèbres en Provence pour leurs lumières.
- 1635 DAVID PLANISCAMPI, se vantoit beaucoup sur la médecine universelle. Le savant Olaus Borrichius reconnoît qu'il avoit de bons principes, mais qu'il s'en écartoit sur la fin de son opération.
- 1636 JOSEPH DUCHESNE, SEUR DE LA VIOLETTE, a été un grand conteur de merveilles, & a ramassé beaucoup de secrets auxquels ont s'est bien gardé d'ajouter soi.
- 1637 DANIEL SERNERTUS, né en 1572, & mort en 1637, habile médecin, mais qui a plus travaillé sur la chimie vulgaire & la médecine, que sur la chimie métallique.
- 1638 ROBERT FLUD à FLUCTIBUS, anglais, a été encore trop grand écrivain, pour avoir été un grand artiste : ses ouvrages ne sont, ni fort communs, ni fort nécessaires.
- 1640 JEAN COLLESSON offroit d'enseigner le secret de la philosophie hermétique, qu'il ne savoit pas : la grande générosité en est une preuve.
- 1641 BENJAMIN MUSSAPHIA, médecin juif,

soit

- Dep. J.C.* fort célèbre, a donné un traité de l'or potable, qui a mérité d'avoir un commentateur.
- 1641 LOUIS COMRACH, ne peut passer que pour compilateur & pour éditeur. C'est une triste occupation, que celle de ne travailler que les ouvrages d'autrui.
- 1643 JEAN-BAPTISTE VAN-HELMONT, médecin célèbre des Pays-Bas, qui a suivi les principes de Paracelse, né en 1577, mort en 1644, n'a pas su le secret de la science hermétique, mais il a fait la projection.
- 1644 FRANÇOIS GERZAN DE SOUCY, auteur de plusieurs romans chimiques, & de quelques autres traités sur cette science. C'est tout ce qu'il a fait.
- 1645 * EYRENEE PHILALÈTHE se nommoit, à ce qu'on croit, Thomas de Vagan; outre qu'il étoit adepte, nous avons de lui plusieurs traités curieux sur la science hermétique: on en a publié quatre principaux au second volume de la philosophie hermétique.
- 1646 GEORGES STARKEY fut, à ce qu'on croit, domestique de Philalèthe: revenu d'Amérique, il se fit apothicaire à Londres; a fait une pyrotechnie, mais n'a vu pas le secret.
- 1648 LOUIS ASHMOLE, anglois, fut seulement amateur & compilateur des traités écrits en langue angloise.
- 1649 PIERRE JEAN FABRE de Castelnau d'Ar, médecin & chimiste, a donné quelques traités fort curieux; mais il n'a rien trouvé.
- 1650 RODOLPHE GLAUBER, célèbre philosophe allemand, tint un laboratoire de chimie à Amsterdam, où il a travaillé & fait imprimer beaucoup d'ouvrages: on lui a l'obligation d'un sel, qui porte son nom, & qui est fort utile dans la médecine.
- 1651 PIERRE BOREL, médecin de Castres, en Languedoc, grand amateur de la science hermétique, a travaillé, & n'a pas trouvé; ce qui le faisoit fort.
- 1657 JEAN HARPRECHT, de Tubinge, va à Copenhague, d'où il se rend en Hollande, & y fait imprimer, *Lucerna solis* en 1658. Il étoit connu d'Olaus Borrichius, qui en parle dans son *Confessio scriptorum chemicorum*.
- 1658 EDMOND DICKINSON, médecin de Londres, habile philosophe, mais seulement en spéculation, & non en pratique.
- 1660 JACOB BOHEM a donné plusieurs écrits

Chimie. Tome II.

- Dep. J.C.* fort obscurs & fort allégoriques, dont on ne peut tirer aucune lumière.
- 1661 MARTIN BIRRIUS, médecin d'Amsterdam, publie trois traités de Philalèthe.
- 1662 LOUIS DE COMITIBUS (de Conri), étoit habile philosophe, peut avoir pratiqué, mais sans succès, la science hermétique: c'est ce qu'en pensoit Borrichius, qui l'a connu en Italie. Son livre est assez estimé.
- 1663 ATHANASE KIRCHER, jésuite d'Augsbourg retiré à Rome, a travaillé sur l'histoire naturelle, & fort écrit contre la science hermétique: il convient cependant de certains faits.
- 1664 * SALOMON DE BLAUENSTEIN a écrit contre le père Kircher, sur la vérité de la pierre philosophale.
- 1665 HERMAN CONRINGIUS, grand médecin, habile historien, excellent publiciste, grand ennemi de la chimie, mort en 1631, a écrit sur toutes sortes de sujets.
- 1666 JEAN-FRÉDÉRIC HILVETIUS, médecin de la Flais, a fait la transmutation, écrit ensuite son *Vitalis uricus*; travail & ne trouve pas.
- 1667 JEAN LOCQUES a donné de bons éléments de chimie, une pyrotechnie estimée, qui est seulement en manuscrit; je n'en ai que des extraits.
- 1668 ROBERT BOYLE, gentilhomme anglois, qui a donné dans toutes les curiosités de la chimie, mais non pas du côté de la science hermétique.
- 1669 NICOLAS LEFEVRE a donné un traité, ou cours de chimie, travaillé dans de bons principes: les raisonnemens en sont fort sains, & qui le sauroit étudier, y trouveroit le mercure des philosophes.
- 1670 JEAN-JOACHIM BECHER, artiste habile, a couru toute l'Allemagne & la Hollande pour faire réussir sa manière d'or, tirée des pierres & du sable; mais à peine l'écouta-t-on.
- 1671 LE SIEUR D'ATREMONT, gentilhomme français, voyage dans le nord, & fait imprimer, en 1671 à Francfort, le *Tombereau de la pauvreté*, réimprimé depuis à Paris & à Lyon. Borrichius l'estimoit fort peu.
- 1672 JEAN KUNCKEL, l'un des plus célèbres artistes de l'Allemagne, qui a trouvé beaucoup de choses utiles & curieuses en chimie, a toujours beaucoup de réputation.
- 1674 GABRIEL GLAUBER écrit en faveur de la transmutation des métaux contre le père Kircher; ce n'est point à dire qu'il

G

- Dep J.C.* ait eu le secret, mais il desiroit de l'avoir : estimé des uns, méprisé des autres.
- 1675 * CLAUD BORRICHIUS, danois fort habile, né en 1626, & mort en 1690. Célèbre médecin, curieux artiste, & l'on ne doute pas qu'il ait été adepte.
- 1676 CHRISTOPHE-ADOLPHE BALDWIN, artiste allemand très-habile.
- 1677 GEORGES MORHOFLE, littérateur très-habile, est plutôt regardé comme un amateur de la science hermétique, eue comme un auteur célèbre : cependant il a donné quelques traités curieux, mais seulement pour l'histoire.
- 1678 PANTALON, espèce de charlatan, selon Bocher, & qui osoit à tous les princes de l'Europe de grands secrets qu'il n'avoit pas. Recher a écrit contre ce chimiste, dont nous avons quelques traités : cependant Borrichius l'estimoit fort.
- 1679 * JACQUES TOLLIUS, célèbre littérateur hollandais ; on croit qu'il a eu quelque portion du secret de la science hermétique, sur laquelle il a écrit.
- 1680 JOSEPH BORRI, né à Milan en 1616, mort en 1695, célèbre aventurier, de qui nous avons plusieurs traités, & quelques procédés que l'on vante fort.
- 1681 GEORGES STALH, célèbre chimiste allemand, a beaucoup écrit ; il a donné même quelques préparations de l'or, qui peuvent servir pour la métallique.
- 1688 ADOLPHE-CHRISTOPHE BENZIUS, philosophe allemand.
- 1690 JEAN-CONRAD BARCHUSEN, professeur de chimie à Leyde, s'est appliqué à la science hermétique, & ne paroit pas y avoir réussi.
- 1690 JACQUES LEMORT, célèbre artiste, demeurant à Leyde.
- 1696 JEAN-MICHEL FAUSTIUS, médecin de Francfort, a donné une assez bonne édition de l'hilaléthe.
- 1710 JEAN-HELRID JUNGKEN, chimiste allemand très-estimé.
- 1711 GEORGES-WOLFGANG WEDLIUS, habile littérateur, chimiste estimé, dont nous avons plusieurs ouvrages.
- 1720 FREDERIC ROTH-CHOLTZIUS, silésien, qui a publié une bibliothèque hermétique, & quelques autres ouvrages.
- 1730 HERMAN BOLRHAAFE, célèbre professeur de médecine & de chimie à Leyde, où il a fort brillé, & a sur-tout donné un cours complet de chimie.
- 1734 EMMANUEL SWEDENBORG, excellent

- Dep J.C.* naturaliste, de qui nous avons un ouvrage fort savant sur la métallique.
- 1737 JEAN-CHRISTOPHE NUNST, philosophe allemand fort estimé, qui a donné un traité sur la dissolution des métaux par un alkaest particulier.
- 1738 JEAN-HENRI FOTT, philosophe exact & savant, de qui nous avons plusieurs traités sur le zinc, les sels & les métaux.
- 1739 MATHIEU DAMMY, fils d'un marbrier de Gènes, se donne le titre de marquis. Il a demeuré long-temps à Paris, où je l'ai vu : il fut mis en prison pour dettes, & en est toujours sorti en payant : il a donné à Paris une manière particulière de faire une composition de faux marbre. Mais avant que le sieur Dammy en ait donné le secret, j'en ai vu à Vienne, en Autriche, aux recollers de cette ville : les colonnes de leur maître-autel sont de faux marbre, qui se fait avec du plâtre fin, de la colle forte délayée dans de l'eau, à laquelle on joint les couleurs que l'on veut en poudre. Le sieur Dammy s'est retiré à Vienne en Autriche, vers l'an 1725. Il a épousé une fille de condition, ce qui ne l'a pas encore empêché d'avoir quelques aventures singulières.

§. III. *Fraudes & supercheries sur la pierre philosophale.*

Geoffroy l'aîné a donné, dans les mémoires de l'académie des sciences, année 1722, page 61, un détail des supercheries qui ont été employées dans différens temps, pour tromper les hommes crédules sur la prétendue transmutation des métaux. Comme on n'a rien ajouté à ce que Geoffroy a dit sur cet objet, on a cru devoir consigner son mémoire dans cet article.

Il seroit à souhaiter, dit ce chimiste célèbre, que l'art de tromper fût parfaitement ignoré des hommes, dans toutes sortes de professions ; mais puisque l'avidité insatiable du gain engage une partie des hommes à mettre cet art en pratique, il est de la prudence de chercher à connoître ces sortes de fraudes pour s'en garantir.

Dans la chimie, la pierre philosophale ouvre un très-vaste champ à l'imposture.

L'idée des richesses immenses qu'on nous promet, par le moyen de cette pierre, s'empare vivement l'imagination des hommes. Comme d'ailleurs on croit facilement ce qu'on souhaite, le désir de posséder cette pierre porte bientôt l'esprit à en croire la possibilité.

Dans cette disposition, où se trouvent la plupart des esprits, au sujet de cette pierre, s'il survient quelqu'un qui assure avoir fait cette fameuse opération, ou quelque autre préparation qui y conduise, qui parle d'un ton imposant & avec quelque espèce de raison, & qui appuie son raisonnement de quelques expériences, on l'écoute favorablement; on ajoute foi à ses discours; on se laisse surprendre par des prestiges ou par des expériences tout-à-fait séduisantes, que la chimie lui fournit abondamment, enfin, ce qui est le plus surprenant, on s'aveugle assez pour se ruiner, en avançant des sommes considérables à ces sortes d'imposteurs, qui, sous différents prétextes, nous demandent de l'argent, dont ils disent avoir besoin, dans le temps même qu'ils se vantent de posséder une source de trésors inépuisables.

Quoiqu'il y ait quelque inconvénient à mettre au jour les tromperies dont ces imposteurs se servent, parce que quelques personnes pourroient en abuser, il y en a cependant beaucoup plus à ne les pas faire connoître, puisqu'en les découvrant, on empêche un très-grand nombre de gens de se laisser séduire par leurs tours d'adresse.

C'est donc dans la vue d'empêcher le public de se laisser abuser par ces prétendus philosophes chimistes, que je rapporte ici les principaux moyens de tromper qu'ils ont coutume d'employer, & qui sont venus à ma connoissance.

Comme leur principale intention est, pour l'ordinaire, de faire trouver de l'or ou de l'argent à la place des matières minérales, qu'ils prétendent transformer, ils se servent souvent de creusets ou de coupelles doublées, ou dont ils ont garni le fond de *chaux* d'or ou d'argent; ils recouvrent ce fond avec une pâte faite de poudre de creuset, incorporée avec de l'eau gommée ou un peu de cire; ce qui s'accommodent de manière, que cela paroît le véritable fond du creuset & de la coupelle.

L'autre fois ils font un trou dans un charbon, ils y coulent de la poudre d'or ou d'argent, & ils le recouvrent avec de la cire; ou bien ils imbibent des charbons des dissolutions de ces métaux, & ils les font mettre en poudre pour projeter sur les matières qu'ils doivent transformer.

Ils se servent de baguettes ou de petits morceaux de bois creusés à leur extrémité, dont le trou est rempli de limaille d'or ou d'argent, & qui est rebouchée avec de la sciure fine du même bois; ils remuent les matières fondues avec la baguette, qui, en se brûlant, laisse dans le creuset le métal fin qu'elle contenoit.

Ils mêlent d'une infinité de manières différentes, l'or & l'argent dans les matières sur lesquelles ils travaillent; car une petite quantité d'or ou d'argent ne paroît point dans une grande quantité de mercure, de régule d'antimoine, de plomb, de cuivre, ou de quelque autre métal.

On mêle très-aisément l'or & l'argent en *chaux*,

dans les *chaux* de plomb, d'antimoine & de mercure.

On peut enfermer dans du plomb, des émailles ou des lingots d'or & d'argent. On blanchit l'or avec le vit-argent, & on le fait passer pour de l'étain ou pour de l'argent; on donne ensuite pour transmutation l'or & l'argent qu'on retire de ces matières.

Il faut prendre garde à tout ce qui passe par les mains de ces sortes de gens; car souvent les *eaux fortes* ou les *eaux régales* qu'ils emploient, sont déjà chargées de dissolutions d'or & d'argent. Les papiers dont ils enveloppent leurs matières, sont quelquefois pénétrés de *chaux* de ces métaux; l'écriture ou les taches qui paroissent dessus, peuvent être faites avec les teintures de ces métaux; les cartes dont ils se servent peuvent cacher de ces *chaux* métalliques dans leur épaisseur. On a vu le verre sortant des verrettes, chargé de quelque portion d'or qu'ils y avoient glissée adroitement pendant qu'il étoit encore en fonte dans le fourneau.

Quelques-uns en ont imposé avec des clous moitié fer & moitié or ou moitié argent. Ils font accroire qu'ils ont fait une véritable transmutation de la moitié de ces clous, en les trempant à demi dans une prétendue teinture. Rien n'est d'abord plus séduisant; ce n'est pourtant qu'un tour d'adresse. Ces clous, qui paroissent tout de fer, étoient néanmoins de deux pièces, une de fer & une d'or ou d'argent, soudées au bout l'une de l'autre très-proprement, & recouvertes d'une couleur de fer qui dissimuloit en la trempant dans leur liqueur. Tel étoit le clou moitié or & moitié fer qu'on a vu autrefois dans le cabinet de M. le grand duc de Toscane; tous sont ceux que je présente aujourd'hui à la compagnie, moitié argent & moitié fer; tel étoit le couteau qu'un moine présenta autrefois à la reine Elisabeth en Angleterre, dans les premières années de son règne, dont l'extrémité de la lame étoit d'or; aussi-bien que ceux qu'un fameux charlatan répandit il y a quelques années en Provence, dont la lame étoit moitié argent & moitié fer. Il est vrai qu'on ajoute que celui-ci faisoit l'opération sur des couteaux qu'on lui donnoit, qu'il rendoit au bout de quelque temps, avec l'extrémité de la lame convertie en argent; mais il y a lieu de penser que ce changement ne se faisoit qu'en coupant le bout de la lame, & y soudant proprement un bout d'argent tout semblable.

On a vu pareillement des pièces de monnaie ou des médailles moitié or & moitié argent. Ces pièces, disoit-on, avoient été premièrement de l'argent; mais en les trempant à demi dans une teinture philosophale, ou dans l'élixir des philosophes, cette moitié qui avoit été trempée s'étoit transformée en or, sans que la forme extérieure de la médaille eût changé, ni que ses caractères eussent été altérés considérablement.

Je dis que cette médaille n'a jamais été toute d'argent, du moins cette partie qui est or; que ce sont deux portions de médaille, l'une d'or & l'autre d'argent, soudées très-proprement, de manière que les figures & les caractères se rapportent fort exactement; & ce qui n'est pas bien difficile. Voici de quelle manière cela se fait, ou plutôt, voici de quelle manière je jouerois ce jeu, si je voulois en imposer.

Il faut avoir plusieurs médailles d'argent semblables, un peu grossièrement frappées, & même un peu usées; on en modelera quelques-unes en sable, qu'on jettera en or; il n'est pas même nécessaire qu'elles soient modelées dans un sable très-fin.

Pour-lors on coupera proprement une portion d'une des médailles d'argent, & une pareille portion d'une des médailles d'or; après les avoir appropriées avec la lime, on soudera exactement la partie d'or avec la partie d'argent, prenant soin de les bien ajuster, en sorte que les caractères & figures se rapportent, autant qu'il sera possible; & s'il y a quelque petit défaut, on le réparera avec le burin.

La portion de la médaille qui se trouve en or ayant été jettée en sable, paroît un peu grenue & plus grossière que la portion de la même médaille qui est en argent & qui a été frappée; mais on donne ce défaut comme un effet ou comme une preuve de la transmutation, parce qu'une certaine quantité d'argent occupant un plus grand volume qu'une pareille quantité d'or, le volume de l'argent se retire un peu en se changeant en or, & laisse des pores ou des espaces qui forment le grenu: outre cela, on a soin de tenir la partie qui est en or plus mince que l'argent pour garder la vraisemblance, & ne mettre qu'autant d'or à-peu-près qu'il y avoit d'argent.

Outre cette première médaille, on en préparera une autre de cette façon:

On prend une médaille d'argent dont on amincit une moitié, en la limant dessus & dessous pour ne point toucher à l'autre, de sorte que la moitié de la médaille soit conservée entière, & qu'il ne reste de l'autre moitié qu'une lame mince, de l'épaisseur d'une carte à jouer; on a une pareille médaille en or qu'on coupe en deux, & dont on prend la portion dont on a besoin; on la scie en deux dans son épaisseur, & l'on ajuste ces deux lames d'or de manière qu'elles recouvrent la partie amincie de la médaille d'argent, en observant que les figures & les caractères se rapportent; par ce moyen, on a une médaille entière, moitié argent & moitié or, dont la portion d'or est fourrée d'argent.

On présente cette médaille comme un exemple d'un argent qui n'est pas totalement transmué en or, pour n'avoir pas trempé assez long-temps dans l'élixir.

On prépare enfin une troisième médaille d'ar-

gent, dont on dore superficiellement la moitié dessus & dessous avec l'amalgame de mercure & d'or, & l'on fait passer cette médaille pour un argent qui n'a trempé que très-peu de temps dans l'élixir.

Lorsque l'on veut jouer ce jeu, on blanchit l'or de ces trois médailles avec un peu de mercure, en sorte qu'elles paroissent entièrement d'argent. Pour tromper encore mieux, celui qui se mêle de ce métier, & qui doit savoir bien escamoter, présente trois autres médailles d'argent toutes semblables & sans aucune préparation, & les laisse examiner à la compagnie qu'il veut tromper: en les reprenant, il leur fait voir, sans qu'on s'en aperçoive, les médailles préparées; il les dispose dans des verres, dans lesquels il verse suffisante quantité de son précieux élixir, à la hauteur qui lui convient; il en retire ensuite ses médailles dans des temps marqués; il les jette dans le feu; ils les y laisse assez de temps pour exhaler le mercure qui blanchissoit l'or; enfin, il retire du feu ces médailles qui paroissent moitié or & moitié argent, avec cette différence qu'en coupant une petite portion de chacune, dans la partie qui paroît or, l'une n'est dorée qu'à la surface, l'autre est d'or à l'extérieur & d'argent dans le cœur, & la troisième est d'or dans toute la substance.

La chimie fournit encore à ces prétendus philosophes chimistes des moyens plus subtils pour tromper.

Telle est une circonstance particulière que l'on raconte de l'or d'une de ces prétendues médailles transmues, qui est que cet or ne pesoit guère plus qu'un égal volume d'argent, & que le grain de cet or étoit fort gros, peu serré ou rempli de beaucoup de pores. Si cela est vrai dans toutes ces circonstances comme on l'assure, c'est encore une nouvelle imposture qu'il n'est pas impossible d'imiter. On peut introduire dans l'or une matière beaucoup plus légère que ce métal, qui n'en alterera point la couleur, & qui n'abandonnera l'or ni dans le départ, ni dans la coupelle. Cette matière beaucoup moins compacte rendra son grain moins serré & sous un même volume, sa pesanteur aura beaucoup moindre, selon la quantité qu'on y aura introduite.

Passons à d'autres expériences importantes. Le mercure chargé d'un peu de zinc, & passé sur le cuivre rouge, lui laisse une belle couleur d'or. Quelques préparations d'arsenic blanchissent le cuivre, & lui donnent la couleur de l'argent. Les prétendus philosophes produisent ces opérations comme des achèvements à des teintures qu'ils promettent de perfectionner.

On fait bouillir le mercure avec le vert-de-gris, & il paroît que le mercure se fixe en partie; ce qui n'est en effet qu'une amalgame de mercure avec le cuivre, qui étoit contenu dans le verdet. Ils donnent cette opération comme une véritable fixation du mercure.

Tout le monde fait présentement la manière de changer les clous de cinabre en argent. Cet artifice est décrit dans plusieurs livres de chimie, c'est pourquoi je ne le répète point ici.

On donne encore le procédé suivant comme une transmutation du cuivre en argent. On a une boîte ronde comme une boîte à savonnette, composée de deux calottes de cuivre rouge, qui se joignent & ferment très-juste. On remplit le bas de la boîte d'une poudre préparée pour cela. Après avoir fermé la boîte & luté les jointures, on la place dans un fourneau avec un feu modéré, suffisant pour rougir le fond de la boîte, mais non pas assez fort pour la fondre : on la laisse quelque temps dans cet état, après quoi on laisse éteindre le feu, & on ouvre la boîte. On trouve la partie supérieure de la boîte convertie en partie en argent. La poudre dont on se sert en cette occasion, est la chaux d'argent précipitée par le sel marin, ou autrement la lune cornée, qu'on étend avec quelque intermède convenable.

Dans cette opération, la lune cornée qui est un mélange de l'argent & de l'acide du sel marin, s'élève facilement au feu, & elle se sublime au haut de la boîte de cuivre ; mais comme l'acide du sel marin s'unit avec les métaux, & les pénètre très-intimement, & comme il a d'ailleurs plus de rapport avec le cuivre qu'avec l'argent, à mesure qu'il pénètre le cuivre, au travers des pores duquel il s'exhale, il en tonne quelques parcelles qu'il emporte avec lui en l'air, il dépose en leur place les particules d'argent qu'il avoit enlevées, & il le compose ainsi un nouveau dessus de boîte, partie argent & partie cuivre.

Quelques chimistes ont avancé qu'il étoit plus facile de faire de l'or, que de le décomposer ; c'est ce qui a engagé quelques-uns de nos prétendus philosophes à donner certaines opérations pour de vraies décompositions de l'or.

Ils nous proposent des dissolvans, qui, digérés avec l'or, en tirent la teinture, & laissent une portion de l'or qu'ils disent désanimé ou dépouillé de son soufre ou de sa teinture, parce qu'en le fondant, il est blanc ou d'un jaune pâle, & fort aigre. Tel est, par exemple, l'esprit de nitre hexaordique ; mais cette prétendue décomposition de l'or n'est qu'une illusion. Ce dissolvant est quelquefois chargé d'une assez grande quantité de parties régulières d'antimoine qu'il a enlevées avec lui dans la distillation ; lorsqu'on le fait digérer sur l'or, il dissout bien à la vérité, quelque portion d'or, parce que c'est une eau régale qui n'est pas assez chargée d'antimoine pour ne plus mordre sur l'or. De-là vient la couleur jaune que ce dissolvant prend dans cette digestion. Il dépose aussi dans les pores de l'or qui reste sans être dissous, quelque petite portion de régule qu'il tenoit en dissolution ; ce qui rend cet or pâle & même blanc, quand on vient à le refondre, selon la quantité des parties antimoniales qui s'y seront

mélées. Mais cet or que cet esprit tient en dissolution, n'est nullement décomposé, comme il est aisé de s'en assurer par la précipitation.

Il n'y a pas long-tems qu'on proposa à M. l'abbé Bignon une autre prétendue destruction de l'or, ou une manière de réduire ce métal en une simple terre, qu'on ne peut plus refondre en or. Pour cela on faisoit fondre l'or dans un crucible avec environ uente fois autant d'une poudre préparée. Le tout étant bien fondu, on tiroit la matière du feu, qu'on la laissoit refroidir en une masse saline. On la laissoit refondre en liqueur à l'humidité de la cave, & l'on passoit ensuite cette liqueur par le papier gris, sur lequel il restoit une poudre noire, environ du poids de l'or qui avoit été employé. Cette poudre mise à toute épreuve, ne donnoit plus aucune indice d'or, d'où on concluoit que l'or étoit décomposé & réduit en sa terre première.

Nous fîmes chargés, M. de Résumur, M. Lemery & moi, d'examiner cette opération, & nous jugeâmes que ce n'étoit pas assez d'observer cette terre fixe, qu'il falloit encore faire attention à la liqueur passée par le filtre où il y avoit toute apparence qu'on trouveroit l'or, supposé que la poudre dont on s'étoit servi pour intermède, n'en eût pas enlevé une partie pendant la fonte.

Mais ayant bientôt après examiné la poudre dont on se servoit pour cette opération, nous trouvâmes que c'étoit un composé de crème de tartre, de soufre & d'un peu de salpêtre.

Nous ne doutâmes plus pour lors que l'or ne fût passé dans la liqueur, car ces matières détonnées & fondues ensemble, forment une espèce d'*hépar sulphuris* chargé d'or ; il se résout en liqueur rougeâtre, avec laquelle l'or reste entièrement uni, & il passe avec ce même or, au travers du papier gris. La terre fixe qui reste sur le filtre, est la cendre que laisse la crème de tartre après sa calcination, & qu'on nous vouloit donner pour un or désanimé ou décomposé.

C'est avec ces artifices, ou de semblables, que tant de gens ont été trompés.

Il y a même toute apparence que ces fameuses histoires de la transmutation des métaux en or ou en argent, par le moyen de la poudre de projection, ou des élixirs philosophiques, n'étoient rien autre chose que l'effet de quelques supercheres semblables : d'autant plus que ces prétendus philosophes n'en laissent jamais voir qu'une ou deux épreuves, après lesquelles ils dissipent ; ou bien les procédés pour faire leur poudre ou leur teinture, après avoir réussi dans quelques occasions, ont cessé d'avoir leur effet, fort parce que les vaisseaux qu'on avoit garnis d'or secrètement, ont été tous employés, ou parce que les matières qui avoient été chargées d'or, ont été consommées.

Ce qui peut en imposer le plus dans les histoires que l'on raconte de ces prétendus philosophes,

c'est le désintéressement qu'ils marquent dans quelques occasions où ils abandonnent le profit de ces transmutations, & l'honneur même qu'ils pourroient en retirer. Mais ce faux désintéressement est une des plus grandes supercheries, car il sert à répandre & à entretenir l'opinion de la possibilité de la pierre philosophale, qui leur donne moyen par la suite d'exercer d'autant mieux leurs supercheries, & de se dédommager amplement de leurs avances.»

§. IV. Questions fondamentales, sur la possibilité d'existence du grand-œuvre, par Bergman. (1)

Pour nous occuper avec succès de l'histoire du grand-œuvre, & de l'art de faire de l'or, qui a tant occupé les laborieux alchimistes, il faut d'abord traiter deux questions préliminaires; il faut savoir en premier lieu, si la solution de ce problème de faire de l'or est possible, & en second lieu, si la première proposition étant donnée, il y a véritablement quelqu'un qui ait fait de l'or.

PREMIÈRE QUESTION. EST-IL POSSIBLE DE FAIRE DE L'OR?

Il faut avant de discuter la question, en bien déterminer le sens. L'or, comme tous les autres métaux, dit Bergman, est composé d'une terre particulière & du principe inflammable. Si l'on peut obtenir le premier principe, il suffira de l'exposer à un feu suffisant pour obtenir l'or parfait (2).

Si on nommoit cette opération fabrication de l'or, il faudroit de même nommer fabrications les précédés par lesquels on fait tous les jours reprendre la forme métallique à des quantités plus ou moins grandes d'oxides de différens métaux, & certainement cette manière de parler répugne à la raison. Reprenons la chose de plus loin. J'ai réduit les premiers élémens n'appartient en aucun créateur; mais en connaissant bien les loix de l'attraction et des lois par la nature, l'art chimique fait tous les jours des composés inorganiques, soit semblables à ceux qu'on trouve dans notre planète, soit différens de ceux-ci, & entièrement nouveaux. Un réusit d'autant mieux à former ces composés, qu'on en connoît plus exactement les principes constituans & leurs propriétés. Si donc les principes prochains de l'oxide d'or ou de la terre

de l'or, sont le phlogistique & un acide particulier comme cela est vraisemblable, la difficulté se borne à obtenir cet acide en assez grande quantité, car on ne manque point de moyens pour fournir du phlogistique; cet acide étant une fois coagulé par le phlogistique, on a la terre ou l'oxide d'or, & le reste de l'opération devient très-facile.

Comme l'acide de l'or attire fortement le phlogistique regardé par-tout, comme il est impossible qu'il reste long-temps sans combinaison, il est douteux s'il existe plus de cet acide d'or dans le sein de la terre, qu'il n'existe de son oxide ou de l'or lui-même à l'état métallique. Mais comme on ne peut nier son existence avec certitude, si elle a réellement lieu, on ne peut pas affirmer qu'une fois découvert, il soit impossible de le fixer de phlogistique, & que cela puisse le pouvoir de la science.

Les alchimistes sont persuadés que tous les autres métaux contiennent le principe propre de l'or, & que quoiqu'il soit altéré par différentes matières, on peut le purifier par un art convenable, & l'amener à sa plus grande perfection. Il refuse des considérations déjà présentes, que l'assertion précédente ressemble à celle-ci, les acides métalliques radicaux sont tous les mêmes; la proportion différente & le mélange de corps hétérogènes y fait naître une différence telle, que la quantité de phlogistique que chacun est susceptible de prendre, les convertit en diverses espèces de métaux; mais les alchimistes ajoutent que les altérations dans les proportions & les mélanges de corps étrangers sont entièrement détruites par leur élixir ou leur pierre philosophale, de sorte que par un moyen les métaux les plus vils peuvent être convertis en or, ou, comme ils le disent, les plus imparfaits deviennent le plus parfait métal, par l'action soignée de cette pierre.

Mais si l'on examine les expériences connues jusqu'ici pour être les plus exactes sur ce point, on est obligé de convenir qu'elles ne présentent pas la plus légère preuve que les métaux ou les autres corps plus simples, puissent être réciproquement convertis les uns dans les autres. A l'époque où les essais chimiques n'avoient point l'exacte précision que l'on y apporte aujourd'hui, le résultat de quelques expériences a bien pu offrir l'apparence

(1) Bergman, *His. Nova chimie melius amen. Opuscula*, IV vol. *Lipsiæ* 1780, pag. 116.

(2) Lorsque Bergman étoit cette dissertation au commencement de 1780, puisqu'elle a été soutenue en forme de thèse dans l'université d'Upsal, par M. Pierre Alexandre Arvidsson, le 11 juin de cette année, il ne connoissoit point encore la théorie des chaudières françaises; cependant il étoit déjà prouvé ici que la composition des métaux, par des terres métalliques & le principe inflammable, étoit une hypothèse gratuite, nullement fondée sur l'expérience, ou appuyée au moins sur des expériences exactes. Ainsi, on lies d'admettre la première proposition de Bergman, telle qu'il la présente ici, il faut dire, l'or, comme tous les métaux, est un corps qu'on n'a point décomposé, donc on ne connoît pas ses principes; mais qui peut être uni à l'oxygène, ou brûlé, ou calciné, plus difficilement à la vérité que les autres matières métalliques; il faut y ajouter encore que l'or une fois brûlé ou oxygéné, réduit en oxide ou en chaux, n'est très-facile à réduire par la chaleur, parce qu'il est celui de tous les métaux qui tient le moins à ce principe; ainsi, pour rapprocher la phrase de Bergman de l'état où est aujourd'hui la science, on conçoit que supposé qu'on trouvoit quelque jour un oxide d'or, ce qui ne seroit nullement à l'honneur de la terre, il seroit facile d'en obtenir l'or en le chauffant. Les autres raisonnemens de cet habile physicien s'accordent facilement avec ces nouvelles vérités chimiques, en substituant toujours à son prétendu principe de l'or, son composé naturel d'or & d'oxygène, ou de quelque autre matière unie à l'or & qui en marque les propriétés.

de cette transmutation ; mais il y a déjà long-temps qu'on a reconnu l'erreur de cette apparence : les matières qu'on croyoit absolument exemptes d'or, ont pu en révéler quelques atomes , car après le fer , l'or paroît être un des métaux qu'on trouve le plus fréquemment , malgré qu'il échappe souvent à nos recherches par sa petite quantité. Une matière quelconque qui en contient , étant traitée à un grand feu , sera entièrement volatilisée , il ne restera qu'un atome d'or ; l'opérateur admirera cette prétendue production , qui ne sera cependant qu'une extraction. Cependant un homme accoutumé à intervertir la nature avec la fiabilité & l'industrie qu'exige l'art expérimental , doit bien se garder de regarder comme impossible une opération , à moins qu'elle ne soit entièrement contraire à une vérité suffisamment établie. Dans la question présente , personne , il est vrai , n'a une pareille objection à faire , une vérité démontrée à opposer ; au contraire même l'expérience la plus fréquente présente des effets analogues à la purification dont parlent les chimistes ; c'est ainsi qu'un atome de ferment excite avec tant de force la fermentation dans une grande quantité de moût , que l'alcool , ou caché dans les grains de froment se développe en se débarrassant des matières qui le couvroient en quelque sorte , ou se forme par une nouvelle combinaison de principes. Qui peut démontrer l'impossibilité de changer un oxide métallique quelconque en or , par l'addition d'un agent quelconque , qui portera ou enlèvera quelques principes , ou en changera la proportion ?

C'est une objection bien faible que celle qui porte sur l'imperfection & l'instabilité des compositions artificielles comparées à celles de la nature , dans le même genre de composés ; c'est un fait qui ressemble parfaitement , & dans toutes leurs propriétés , à ceux de la nature ; les sels neutres n'en sont-ils pas un exemple frappant ? L'union moins forte ne dépend que de l'humidité qui existe souvent dans les composés artificiels , & dont la nature se débarrasse par le temps.

Tout ce qui a été dit jusqu'ici prouve que l'on ne peut pas démontrer l'impossibilité de faire de l'or ou de transmuter tous les métaux les uns dans les autres ; mais ce seroit se tromper que de conclure de-là que la possibilité de cet art est démontrée ; entre les deux propositions il y a une grande différence. Pour penser qu'on peut avancer quelque chose de certain à priori sur cet objet , il faudroit bien plus connoître la nature & ses procédés que personne n'y est encore parvenu : si cette possibilité étoit même démontrée , il manqueroit encore le complément de la preuve ; car de ce qu'une chose est démontrée possible , il ne s'ensuit pas que l'art puisse la faire. Mais si l'opération réussit suivant une méthode expérimentale , on ne doit plus s'inquiéter de la preuve de la possibilité ; car , comme on fait , on conclut

exactement de l'être au possible , *ab esse ad posse valet consequentia*.

Seconde question. A-T-ON VÉRITABLEMENT FAIT DE L'OR ?

Parmi le grand nombre d'alchimistes qui se sont flattés d'avoir obtenu du succès , y a-t-il quelque homme qui ait véritablement composé ou fait de l'or ? Cette question est très-difficile à résoudre avec une entière certitude , parce qu'il manque toujours quelque chose à la description de la plupart des transmutations. On doit d'abord dans cette histoire , ne point accorder trop de confiance aux auteurs qui ont parlé de leur propre ouvrage , ni au témoignage des spectateurs , souvent grossiers & peu instruits. On sait combien de prestiges ont imaginé de semer de prétendus alchimistes ; ils ont caché l'or dans les creusets , les instrumens de laboratoire , les charbons ; mais quoi qu'on puisse accuser cette fraude dans 99 récits de transmutation , il se peut que la 100^{me} soit vraie ; cependant cette centième même doit être regardée comme invraisemblable , quand elle n'est point appuyée sur des preuves très-fortes & très-particularisées. Il est quelques relations qui paroissent offrir un assez grand caractère de vérité. Si , par exemple , un homme sans aucune confiance dans les transmutations alchimiques , obtient quelques atomes de la pierre philosophique , répète l'expérience seul & sans confidant comme sans témoin , s'il trouve un plus grand poids de véritable or qu'il n'a employé de pierre , il est difficile de soupçonner de la fraude en cas pareil. Tel paroit être le caractère de l'aventure fameuse arrivée à Helvétius. Étant à Magdebourg , il y vint avec force l'existence d'un remède universel ; il s'étoit expliqué d'une manière formelle dans un ouvrage imprimé , sur la poudre sympathique du chevalier Digby. Le 27 décembre 1666 , un inconnu se présenta à lui ; & , après lui avoir parlé de la médecine universelle , il lui montra la pierre philosophale d'une couleur de soufre , & cinq grandes lames d'or pur , & il lui raconta la manière dont il étoit parvenu au fût de l'art. Helvétius le conjura de lui donner un peu de sa pierre , ou de lui en montrer les effets par le feu ; ce que l'inconnu lui refusa , en lui promettant de revenir dans trois semaines. A son retour , qui eut lieu effectivement comme il le lui avoit annoncé , ce ne fut qu'à force de prières & de sollicitations qu'il lui en accorda un petit fragment , gros comme une semence de tave ; & comme Helvétius doutoit qu'une si petite quantité pût changer quatre grains de plomb en or , l'alchimiste en enleva la moitié , en lui disant que cette portion étoit suffisante pour produire l'effet qu'il desiroit. Helvétius , dans le premier entretien qu'il avoit déjà eu avec cet homme , avoit enlevé quelques portions de la pierre , & l'avoit placée sous son ongle ; il l'avoit jetée sur du plomb fondu ; mais tout s'étoit dissipé , & il n'étoit resté au fond du

creusât qu'un peu de terre vitreuse ; il croyoit déjà avoir été trompé , lorsque l'inconnu lui apprit qu'il falloit envelopper de cire la matière de projection , afin qu'elle ne fût point gâtée par la fumée du plomb. Il apprit encore , dans le même entretien , que l'œuvre pouvoit être faite en quelques jours , & qu'il n'étoit pas extrêmement cher. L'alchimiste devoit venir voir le lendemain Hélyétius pour lui montrer la manière de faire la projection ; mais il manqua au rendez-vous. Hélyétius , l'ayant attendu long-temps après l'heure promise , mit , en présence de sa femme & de son fils , six gros de plomb dans un creusât ; & lorsque ce métal fut fondu , il y ajouta le petit morceau de pierre enveloppé dans un peu de cire jaune ; il couvrit le creusât de son couvercle , & un quart d'heure après , il trouva toute la masse convertie en or. Cet or étoit d'un beau vert ; en le coulant dans un cône , il prit une couleur de sang , & redevint d'un véritable jaune d'or en refroidissant. Un orfèvre qui examina d'abord cet or , le trouva si pur , qu'il en l'estima l'once fort haut. Povelius , essayeur général des monnoies de Hollande , ayant ensuite reçu de Hélyétius une portion de cet or , en traita deux gros par la quartation & l'eau-forte , & les trouva augmentés de deux scrupules , ce qu'il attribua à une portion d'argent convertie en or par l'abondance de la teinture : soupçonnant cependant que l'argent n'en avoit été qu'imparfaitement séparé ; il traita de nouveau cet or sept fois de suite avec l'antimoine , mais sa quantité ne diminua pas.

Tel est le récit d'Hélyétius lui-même ; & , puisqu'il est l'alchimiste de qui il tenoit la matière de projection n'avait jamais vu son laboratoire , & n'avait point assisté à son expérience , on ne peut point soupçonner de fraude de la part de ce dernier. Il est également difficile de croire comment Hélyétius le seroit trompé lui-même : c'est donc sur Hélyétius que doit se porter toute l'attention de l'historien. S'il avoit eu quelques circonstances , s'il en avoit ajoutée de contraires à la vérité , sa narration ne seroit plus d'aucun poids pour la démonstration de l'existence de la pierre philosophale. Sa description montre bien qu'il avoit un ardent désir de connaître l'art du grand œuvre ; mais si elle ne doit point répondre , en quelque sorte , de la probité des autres auteurs qui la décrivent ou qui en assurent l'existence , on ne doit pas , d'un autre côté , sans de très-fortes raisons , accuser personne du grand crime de tromper le monde entier , sur-tout quand l'impossibilité de la pierre philosophale n'est pas démontrée.

Perigardus de l'ise raconte à-peu-près comme Hélyétius , un fait qui lui est arrivé relativement à la pierre philosophale ; voici ses propres paroles , (*Circulus Hist.* 25.) : « Je rapporterai ce qui m'est arrivé autrefois , lorsque je doutois fortement qu'il fût possible de convertir le mercure en or.

« Un homme habile , voulant lever mon doute à cet égard , me donna un gros d'une poudre , dont la couleur étoit assez semblable à celle du pavor sauvage , dont l'odeur imitoit celle du fel marin calciné ; & , pour détruire tout soupçon de fraude , j'achetai moi-même le creusât , le charbon & le mercure chez plusieurs marchands , afin de n'avoir point à craindre qu'il y eût de l'or dans aucune de ces matières , ce que les charlatans en alchimie font si souvent. Sur dix gros de mercure , j'ajoutai un peu de poudre , j'exposai le tout à un feu assez fort , & en peu de temps , la masse se convertit toute en près de dix gros d'or , reconnu pour très-pur par les essais des divers orfèvres. Si cela ne m'étoit pas arrivé sans témoins & sans arbitres étrangers , j'aurois pu soupçonner des erreurs & des fraudes ; mais je puis assurer avec confiance que le succès que j'ai obtenu est très-véritable. Van-Helmont dit aussi : je suis forcé de croire à la pierre aurifique & argentifique , puisqu'il m'est arrivé plusieurs fois de faire moi-même la projection avec un grain de poudre sur plusieurs milliers de grains de mercure , & cela , devant une assemblée nombreuse qui en a admiré comme moi le succès ; dans un autre endroit (*de arboris vite*) il dit qu'on lui a donné un demi-grain de cette poudre , qui a converti neuf onces douze grains de mercure.

Il passe pour constant que l'empereur l'érindan , en 1648 , & l'électeur de Mayence en 1658 , ont fait la projection avec tous les soins & toutes les attentions convenables pour éloigner toutes les craintes de séduction & d'erreur , quoiqu'on n'ait point suffisamment détaillé ces précautions (Monconys , voyages). Tous ces témoignages sont de nature à ne point laisser douter de leur vérité. Quant à la grande quantité de transmutations qui sont décrites dans les ouvrages & les histoires de l'alchimie , les uns montrent clairement les tromperies de manière à faire croire qu'elles ont été faites ; les autres , sans présenter des traces très-véridiques de l'erreur , méritent peu de confiance , par plusieurs raisons & circonstances qu'ils présentent. Telle est , par exemple , la transmutation de six gros de plomb , à l'aide d'un gros de la pierre , en une masse d'or du poids de cent quarante-sept ducats d'or , faite en 1707 par le général Orthon-Armould Paikull , détenu en prison. Quoique racontée par Urbain Elizme , (*Sv. magaz.* part. 1. pag. 220 — 237) il y a dans ce récit plusieurs circonstances qui jettent quelques soupçons sur la vérité de l'expérience. Si le militaire Hamilton assure qu'il a vu employer par Paikull , pour préparer la poudre nécessaire à la fixation de la teinture , des matières qu'il avoit employées lui-même , & dans lesquelles il avoit qu'il n'entroit pas d'or , il dit aussi que Paikull jeta de sa propre main la poudre teignante , & qu'on ne s'étoit pas assuré auparavant si le creusât ne contenoit pas d'or , ce qui est arrivé tant de fois dans des essais pareils. Il y a en outre un doute

doute remarquable sur les poids des matières. Accordons en effet que les six gros de plomb, plus le gros de teinture, aient été convertis entièrement en or, le poids total ou absolu de cet or ne devoit pas excéder celui du plomb & de la teinture, & cependant, dans le résultat, il y avoit plus de vingt fois le poids total de la matière employée; ce qui suppose une génération, une production avec rien, ou ce qui est la même chose, ce qui entraîne une absurdité.

Arnould de Villeneuve passe pour avoir converti du fer en or à Rome; Raymond Lulle fit, dit-on, la même opération à Londres devant le roi Edouard, & on frappa avec cet or des nobles à la rose: on dit la même chose de L. Thurneiserus, en 1587, devant Ferdinand, premier, grand duc de Toscane; du Cosmopolite, en présence du duc de Saxe; de Sendigove, sous les yeux de l'empereur Rodolphe II, & de plusieurs autres alchimistes; mais les récits & les descriptions que nous possédons sur toutes ces transmutations, ne portent point le caractère de la certitude; celle de Thurneiserus annonce même une véritable fourberie, Borrichius rapporte, à la fin de son ouvrage, *de oris & progressu chimia*, qu'il a été fait une projection en Poméranie, devant le roi Gustave Adolphe, & que l'on a frappé des ducats portant l'empreinte de Mercure & de Vénus, avec l'or qui en est provenu. Il ajoute qu'un marchand de Lubec a donné au même prince cent livres d'or provenant de la transmutation, & dont on a fabriqué des ducats, avec les caractères du mercure & du soufre: il y avoit, suivant le même auteur, un de ces ducats, en 1634, à Erford, dans la collection royale des médailles; mais on ne doit rien conclure de ce dernier fait, puisqu'il existe encore des monnoies d'Erford qui portent les mêmes signes (GROSCHEN). Après que les Saxons ont eu fait la paix avec l'empereur, ils n'ont plus laissé un libre cours à cette monnoie, parce que la leur a porté pour empreinte les armes de Suède.

Ainsi, de toutes les transmutations qu'on assure avoir été faites, un grand nombre sont manifestement l'effet de l'imposture & de la fourberie; il en est beaucoup d'autres incertaines; mais aussi il y en a quelques-unes d'une telle nature qu'il n'est pas permis de les révoquer en doute, à moins qu'on ne refuse toute confiance aux récits de l'histoire. La plus sévère opinion qu'on peut prendre sur la réussite de ces opérations, c'est que les chimistes qui ont fait les expériences se sont trompés eux-mêmes, quoiqu'on ne trouve point facilement la source de leurs erreurs, & qu'il est sage d'après cela de suspendre son jugement sur cette matière, jusqu'à ce qu'il se présente l'occasion d'observer par soi-même une transmutation; il faut toujours avoir présente à l'esprit cette assertion d'une justesse remarquable, un fait de physique demande bien plus de circonspection pour être

cru d'après les témoignages de l'histoire, qu'on fait commun sur lequel tous les hommes peuvent porter un jugement exact, puisqu'il n'exige que des sens droits & sains.

Bergman termine ces réflexions sur l'alchimie par une note relative aux expériences du docteur Price, qui ont fait tant de bruit. Il y a plus de cinq ans, dit-il, que les expériences de Jacques Price, médecin, & de la société royale de Londres, attirèrent tous les regards, & relevèrent, en quelque sorte, l'alchimie abandonnée depuis long-temps par les véritables chimistes. Ce savant montrait une poudre rouge & une poudre blanche, qu'il avoit découvertes & préparées, & qu'il assuroit être capables de transformer le mercure en or & en argent. Pour tenir sa promesse il fit sept expériences devant des personnes qu'il y avoit invitées, & il en publia le résultat sous les titres suivans: *an account of some experiments on mercury, silver and gold, made at Guilford in may 1782 in the laboratory of James Price M. D. F. R. S. &c. Oxford 1782. 4. — II. London Chronicle n. 4039, 17-19. octob. 1782, &c. Credis novæ Entdeckung in der chemie th. 8, 1783, p. 275.* Comme toute la poudre qu'il avoit préparée fut employée à cette expérience, le docteur Price balançant à recommencer à cause de la longueur de l'ennui & du danger même que comportoit la préparation, son expérience ne parut point concluante. Il est vraisemblable que cet homme, d'ailleurs vivant & honnête, n'a été poussé que par une vanité & une gloire inconsidérée à se dire inventeur de la pierre philosophale; c'est au moins ce qui est indiqué par la mort volontaire. Il s'est par les difficultés & les objections de ses adversaires, qui le sollicitoient vivement de préparer de la poudre, & de répéter ses expériences devant des personnes capables d'en bien juger, il s'empoisonna avec de l'eau distillée de laurier-cerise. (CRELL. *annal. de chimie*, 1784.)

On voit par l'extrait de l'ouvrage de Bergman, que cet homme célèbre, sans nier absolument la possibilité de la transmutation, sans révoquer en doute toutes les opérations qui ont eu cette transmutation pour objet, a fait voir cependant qu'il y a beaucoup d'équivoques & d'incertitudes dans l'histoire la plus avérée de l'alchimie & des alchimistes; qu'il n'existe point de science ou d'art qui conduise à la préparation de la pierre philosophale; que sa recherche a été la source d'une des plus grandes & des plus malheureuses folies qui aient agité l'esprit humain; que les lumières de la physique sont absolument nulles pour l'exercice de ce prétendu art; qu'aucune des vérités trouvées jusqu'à présent dans la chimie ne peut être dirigée vers l'idée de la fabrication de l'or, ni de la transmutation des métaux connus en or; que d'après cela les travaux qu'on désireroit d'entreprendre sur cette opération ne sont que des tentatives du hazard & de l'ignorance

qui ruinent ordinairement la santé & la fortune, avant que rien ait fait concevoir le moindre espoir de succès. Voilà des raisons bien capables d'engager les hommes sages à ne point se livrer à des spéculations, à des recherches qui n'ont aucune buse, & qui ne présentent aucun motif d'espérance. Il est d'ailleurs très-vrai de dire que si jamais la chimie conduit, par les découvertes & ses progrès, si elle arrive conséquemment à faire concevoir la possibilité de fabriquer de l'or, ce ne sera jamais qu'un fait simple de plus; & du moment que cette découverte seroit dans l'ordre de celles qu'on pourroit faire en raison de l'avancement de la science, elle seroit bientôt la possession d'un grand nombre d'hommes, & perdrait bientôt la plupart de ses avantages, par la grande quantité d'or qu'elle verseroit tout-à-coup dans le commerce: il n'y a sans doute que des têtes foibles qui peuvent être séduites par le mystère des ouvrages alchimiques & par la nécessité de ce mystère, pour conserver tout le prix de la pierre philosophale; il faut renoncer à l'espoir de persuader de pareils hommes; mais on doit représenter à ceux qui sont capables de quelques réflexions, que c'est avec cet appareil mystérieux qu'on a séduit les crédules, que c'est sous ce voile qu'on leur a vendu de prétendus secrets, & que la fraude veille sans cesse autour d'eux pour les tromper. Au reste, on offrira une suite de vérités & de raisonnemens sur la même question aux articles MÉTAUX, MÉTALLISATION, TRANSMUTATION, qu'on doit lire après celui-ci.

ALCHIMILLE, ou **PIED DE LYON**, (*Pharm.*) *Alchemilla vulgaris*, LINN. Genre de plante à la famille des pimprenelles, qui croit naturellement dans plusieurs endroits de l'Europe, & sur-tout dans les vallons & les prés montagneux; cette plante, que l'on trouve inscrite dans la classe des substances officinales, étoit fort recommandée par les anciens, comme astringente, détersive & vulnérante.

* Les racines sont grosses, ligneuses, chevelues, noires à l'extérieur, blanchâtres intérieurement; fraîches, elles ont un goût styptique, acerbe, une odeur désagréable, qui approche de celle de l'urine de chat, & qui se perd par la distillation; les feuilles fraîches ont une odeur foible, un savor herbacé; leur décoction, dans l'eau, donne une liqueur jaunâtre, légèrement amère, sans odeur, & qui noircit par l'addition d'une solution de sulfure de fer.

Les anciens employoient principalement les feuilles de cette plante. Ils en tiroient, par la distillation, une eau qu'ils faisoient entrer dans les potions astringentes & vulnérantes; ils en préparoient des infusions, des décoctions, qu'ils recommandoient contre la dysenterie, la diarrhée, les flux utérins, les crachemens de sang, les ul-

cérations internes; ils se servoient aussi de cette décoction en clystères, & pour faire des lotions aux ulcères; ils tiroient le suc des feuilles fraîches, & se faisoient entrer dans des potions, des onguens, des emplâtres; enfin, ils donnoient la poudre des feuilles, & ils en préparoient des cataplasmes, dont ils vantoient l'efficacité, comme un moyen propre à guérir radicalement les hernies.

Quoique cette plante ne soit pas sans vertu, puisque le principe astringent y est très-sensible, cependant, comme nous en avons tant d'autres, dans lesquelles on trouve le même principe en plus grande quantité combiné avec l'arôme ou avec quelqu'autre substance qui ajoute à son énergie, cette plante est très-peu employée dans nos pharmacies; elle entre seulement dans la composition de quelques esprits vulnératoires, & son suc est prescrit dans la préparation de l'emplâtre & du baume opodeldoch. On recueille cette plante en juillet, & il faut la renouveler tous les ans.

ALCHIMISTE. Celui qui travaille à l'alchimie. Voyez **ALCHIMIE**. Quelques anciens auteurs se sont servis du mot *χρηματιστής*, qui signifie *faiseur d'or*, pour dire *alchimiste*; & de *χημικός* — l'art de faire de l'or, en parlant de l'alchimie. On lit dans d'autres livres grecs, *μαγιστής* — *filsoir*, *faiseur alchimiste*, qui signifie aussi *auteur de vers*, *poète*. En effet, la chimie & la poésie ont quelque conformité entr'elles. M. Diderot dit, page 8 du prospectus du dictionnaire encyclopédique, la chimie est imitatrice & rivale de la nature, son objet est presque aussi étendu que celui de la nature même: cette partie de la physique est entre les autres, ce que la poésie est entre les autres genres de littérature; ou elle décompose les êtres, ou elle les revivifie, ou elle les transforme, &c.

On doit distinguer les *alchimistes en vrais*, & en faux ou sous. Les *alchimistes vrais* sont ceux qui, après avoir travaillé à la chimie ordinaire en physiciens, poussoient plus loin leurs recherches, en travaillant par principes & méthodiquement à des combinaisons curieuses & utiles, par lesquelles on imite les ouvrages de la nature, ou qui les rendent plus propres à l'usage des hommes, soit en leur donnant une perfection particulière, soit en y ajoutant des agréments qui, quoiqu'artificiels, sont dans certains cas plus beaux que ceux qui viennent de la simple nature dénuée de tout art, pourvu que ces agréments artificiels soient fondés sur la nature même, & l'imitent dans son beau.

Ceux, au contraire, qui, sans savoir bien la chimie ordinaire, ou qui même sans en avoir de teinture, se jettent dans l'alchimie sans méthode & sans principes, ne lisant que des livres énigmatiques, qu'ils estiment d'autant plus qu'ils comprennent moins, sont de faux *alchimistes* qui perdent leur temps & leur bien, parce que,

travaillant sans connoissance, ils ne trouvent point ce qu'ils cherchent, & sont plus de dépenses que s'ils étoient instruits, parce qu'ils emploient souvent des choses inutiles, qu'ils ne savent pas sauver certaines matières qu'on peut retirer des opérations manquées.

Dailleurs ils ont pour les charlatans autant de goût que pour les livres énigmatiques : ils ne se fient pas d'un bon livre qui parle clairement, mais ne flatte point leur cupidité, comme font les livres énigmatiques auxquels on ne comprend rien, & auxquels les gens entêtés du fabuleux ou du moins du mystérieux, donnent le sens qu'ils veulent y trouver, & qui est plus suivant leur imagination. Aussi ces faux alchimistes s'ennuieront aux discours d'un homme instruit de cette science, qui la dévoile, & qui réduit ses opérations à leur juste valeur : ils écouteront plus volontiers des hommes à secrets aux ignorants qu'eux, mais qui sont profession d'exciter leur curiosité. Il faut dans toutes choses, & sur-tout dans celles de cette nature, éviter les extrémités : on doit éviter également d'être superstitieux ou incrédule. Dire que l'alchimie n'est qu'une science de visionnaire, & que tous les alchimistes sont des fous ou des imposteurs, c'est porter un jugement injuste d'une science réelle à laquelle des gens sensés & de probité peuvent s'appliquer ; mais aussi il faut se garantir d'une espèce de fanatisme dont font particulièrement susceptibles ceux qui s'y livrent sans discernement, sans conseil, sans connoissances préliminaires, en un mot, sans principes. Or les principes des sciences sont des choses connues ; on y doit passer du connu à l'inconnu ; si en alchimie, comme dans les autres sciences, on passe du connu à l'inconnu, on pourra en tirer autant & plus d'utilité que de certaines autres sciences ordinaires. (ANC. ENCYCLOP.)

Il est singulier que l'auteur de cet article dans l'ancienne encyclopédie, n'ait pas défini avec plus de clarté le mot ALCHIMISTE. On diroit qu'il a craint également & d'en parler comme de simples chercheurs de la pierre philosophale, & de le louer de cette recherche. Il semble d'un côté adopter sans réflexions toutes les prétentions des alchimistes, sur les opérations les plus difficiles & les moins connues ; & de l'autre, oublier que le but principal de ces hommes est la découverte de la pierre philosophale. En un mot, sous le prétexte très-apparent de l'auteur, de confondre les chimistes avec les alchimistes, il a fait un article obscur, malgré sa distinction des chimistes en vrais & en faux. Pour suppléer à ce qui peut y manquer, ou pour éclaircir ce qui est y être répandu de douteux, il faut savoir :
1°. que le mot alchimiste est depuis long-temps conservé pour désigner les chercheurs de pierre philosophale ; 2°. que ces hommes diffèrent entièrement des chimistes qu'ils méprisent assez communément ; suivant eux, parce que leur science est

placée à une hauteur bien plus grande que la chimie ; suivant les physiciens, parce qu'il n'existe pas une véritable science dans l'alchimie, & parce qu'ils ne sont point guidés par des principes certains ; 3°. que les vrais alchimistes ne sont pas seulement ceux qu'on assure avoir réussi à la pierre philosophale ; car on ne connoît pas de succès bien avérés sur ce point, mais ceux qui persuadés que cette opération peut réussir, & séduits par l'espérance du succès, passent souvent leur vie dans des travaux pénibles & ruineux ; 4°. que le nombre de ces hommes laborieux & malheureux diminue tous les jours à mesure que les lumières de la physique & de la chimie se répandent ; 5°. qu'il n'y a pas de livres ni d'études connues qui puissent former des alchimistes, & qu'on ne connoît pas de principes dans l'art prétendu qu'ils exercent ; 6°. que les faux alchimistes sont encore en assez grand nombre dans les grandes villes, qu'ils y trouvent encore des dupes qui croient à leurs secrets, qu'ils les diffusent & les entraînent dans des dépenses ruineuses ; 7°. que rien n'est plus ordinaire que de voir de ces hommes qui vantent leur science & leurs opérations, & qui semblent avoir à leur disposition des trésors inépuisables, vous demander des secours d'argent, & se réduire même aux plus vaines prétentions quand ils ne peuvent rien obtenir de plus ; 8°. que depuis plus d'un siècle on est généralement convenu de regarder les alchimistes de bonne-foi comme des hommes à plaindre, qui méritent la compassion de leurs semblables, par la faiblesse d'esprit qui dirige leur conduite, comme des espèces de fous ou d'insensés d'autant plus malheureux, que l'expérience prouve que leur genre de démence est peu curable, à cause de l'opinion où ils sont que leurs pensées sont bien au-dessus de celles du commun des hommes ; 9°. que cette opinion, lorsqu'elle est accompagnée de probité & suivie d'un travail opiniâtre comme elle l'est chez les vrais alchimistes, annonce une espèce de mélancolie dont ces hommes portent en effet tous les caractères dans leurs traits, leurs gestes, leurs discours & toute leur conduite ; ils habitent des quartiers peu fréquentés, fuient en quelque sorte la compagnie des autres hommes, restent presque toujours seuls & enfermés dans leur chambre ou leur laboratoire, ne parlent que par monosyllabes, souvent d'un style énigmatique & figuré, paroissent toujours occupés de réflexions profondes, soignent peu leur extérieur, & quelquefois même se vêtissent d'une manière singulière ; 10°. enfin, qu'il n'y a nulle espèce de rapport depuis long-temps entre les alchimistes & les chimistes ; ces derniers sont guidés dans leurs opérations par des connoissances préliminaires plus ou moins étendues, par des principes certains ; les alchimistes, au contraire, suivent des routes dont ils ne connoissent ni le commen-

cement ni la fin ; ils font des mélanges & des combinaisons dont ils ignorent également & les phénomènes & les résultats ; les produits les plus communs font pour eux des découvertes ; ils croient toujours approcher d'un but qui fuit toujours devant eux ; en un mot, pour employer ici une expression vraie de Macquer, ils font les ouvriers d'un métier qui n'existe point. Voyez d'ailleurs le mot ALCHIMIE ; où le fond de cette question est traitée avec beaucoup de soin & d'étendue.

ALCHITRUM, ALCHYTRAN, & quelquefois **ALKYTRAN.** (*Pharm.*) Ces expressions, que l'on trouve très-souvent dans les écrits des arabisés & des anciens pharmacographes, sont très-équivoques, parce qu'elles font employées sous des acceptions différentes qu'il importe de connoître. Le plus grand nombre des écrivains entendent par le mot alchitrum, l'huile de genièvre, la poix liquide ; d'autres indiquent la résine de cèdre ; Mesué désigne sous ce nom une sorte de médicament contre la douleur & la carie des dents ; les chimistes ont entendu par ce mot, le résidu d'une distillation ; quelques-uns, suivant Ruland & Johnson, ont désigné par ce mot une préparation d'arsenic ; enfin plusieurs ont employé cette dénomination, pour désigner une espèce de sel composé, & dont on trouve différentes formules dans Libavius.

ALCIMAD, ALCOSOL, ALKASIAL : (*Pharmacie*) expressions arabiques pour désigner l'antimoine.

ALCIMMA, & dans quelques auteurs, **ALCIPIA.** (*Pharmacie*) mot grec, adopté par quelques anciens médecins & pharmacographes, pour désigner un liniment fait avec une huile, dans laquelle on avoit fait fondre de la moelle, des graisses, ou dans laquelle on avoit mélangé quelques liqueurs ; cette composition si simple étoit destinée à faire des onctions ou frictions, & ne devoit avoir de consistance que celle d'une huile épaisse, dans cet état les anciens la nommoient *myron* ; mais si on y ajoutoit des résines, de la cire, de manière à lui donner plus de consistance, la composition portoit alors le nom de *myraspon*.

ALCOL. (*Pharmacie*), expression employée par quelques écrivains arabiques pour désigner le vinaigre.

ALCOOL.

Quoique ce mot ait été employé à différentes époques de la chimie pour désigner diverses substances très-éloignées les unes des autres, les auteurs de la nouvelle nomenclature l'ont spécialement appliqué au produit qu'on nommoit

esprit-de-vin ; il y avoit long-temps qu'on se plaignoit dans les ouvrages de physique de cette dénomination d'esprit-de-vin, tenant trop manifestement au temps où les noms étoient fondés sur des idées trop peu exactes ou trop métaphoriques, pour être adoptée aujourd'hui. Le mot d'esprit dont nous expliquerons la valeur à son article, étant aujourd'hui généralement banni, il n'étoit plus permis de conserver le dérivé particulier qui n'avoit pas plus d'exactitude & d'utilité ici que dans toutes les autres acceptions qu'on lui donnoit. Nous avons de plus cru devoir prendre une orthographe particulière en supprimant l'h qu'on mettoit autrefois au milieu de ce mot *alcohol*, & nous remplissons deux objets par cette suppression : 1°. nous avons un mot écrit plus simplement, & dont l'orthographe sera plus vite apprise & retenue ; 2°. cette nouvelle manière de l'écrire le distinguera assez des mots anciens *alkohol*, *alcohol*, pour ne plus les faire confondre, & pour attacher en quelque sorte à celui d'alcool une idée plus exacte, une signification plus étroitement limitée à sa nature.

L'alcool est un des produits des arts chimiques, dont la découverte sembleroit faire le plus d'honneur à l'esprit humain, parce qu'il paroît plus éloigné de la nature qu'un grand nombre d'autres. Sans doute c'est au hasard qu'on en doit la première connoissance, ainsi que celle de la plupart des autres productions des arts ; mais il a fallu pour obtenir l'alcool à part, & sur-tout pour l'avoir pur & rectifié, des efforts & des suites d'expériences ou d'essais qui annoncent un travail immense. Aussi depuis l'antiquité, qui paroît en avoir eu quelque connoissance jusqu'à nos jours, a-t-on sans cesse perfectionné l'art d'extraire & de rectifier cette liqueur ; on verra même que ce n'est que dans notre siècle qu'on a poussé cet art à sa perfection.

L'alcool étant une des matières les plus employées, & les plus utiles dans les expériences de chimie & dans tous les arts chimiques, il est essentiel d'en examiner les propriétés avec le plus grand soin & dans les plus grands détails ; & comme les faits qui contiennent l'ensemble de son histoire sont très-nombreux, nous les partagerons en quatre paragraphes.

Dans le premier, il sera question de la fermentation vineuse qui produit l'alcool ; on y traitera des phénomènes & de la théorie de cette opération ; on y jettera un coup d'œil rapide sur les vins qui en sont le produit, & sur leurs rapports quant à la présence de l'alcool.

Le second paragraphe sera destiné à l'exposé des moyens employés à différents temps pour obtenir & rectifier l'alcool ; on y fera connoître les différentes méthodes en général, & sur-tout celles qui sont prescrites aujourd'hui.

Dans le troisième, seront examinées les véritables propriétés chimiques de l'alcool, & toutes

ses combinaisons connues, ainsi que ses diverses attractions.

Enfin le quatrième & dernier paragraphe de cet article comprendra l'ensemble des usages auxquels l'alcool est employé.

§. I. De la fermentation vineuse, ou de la formation de l'alcool.

En lisant avant cet article, celui qui traite en général des fermentations, on voit que les chimistes ont distingué trois principales espèces de ce mouvement naturel, & qu'ils ont placé la fermentation vineuse au premier rang, parce qu'en effet elle a lieu la première dans les substances qui sont susceptibles de les éprouver toutes les trois. Il est aisé de concevoir que ces mots fermentation vineuse expriment la formation naturelle du vin, & celui-ci étant en général le corps d'où on retire l'alcool, que c'est par cette espèce de mouvement que se forme l'alcool; enfin, que si l'on n'avoit égard qu'à ce vrai produit de la fermentation vineuse, on pourroit la désigner par le nom de fermentation alcoolique.

Pour bien connoître la nature de cette fermentation, nous y considérerons successivement; 1°. les conditions nécessaires à sa production; 2°. les phénomènes qui l'accompagnent & qui la caractérisent; 3°. les diverses matières qui en sont susceptibles; 4°. la cause de ce mouvement intérieurement, ou la véritable théorie de la production de l'alcool, d'après les découvertes modernes.

L'expérience a appris aux chimistes que toutes les matières végétales ne sont pas susceptibles de passer à la fermentation vineuse, & qu'il est nécessaire, pour qu'elle ait lieu dans ces matières, qu'on réunisse plusieurs circonstances particulières: ce sont ces différens objets que nous considérons comme conditions nécessaires à l'établissement de la fermentation vineuse.

Ces conditions sont, 1°. un mucilage sucré: il n'y a que cette matière qui soit susceptible de passer à la fermentation vineuse; aussi nous avons fait remarquer à l'article des fermentations en général, que la formation de la matière sucrée dans les végétaux, semble appartenir à une espèce particulière de fermentation qui précède toutes les autres; 2°. une fluidité un peu visqueuse: un suc trop fluide ne fermente pas plus qu'un suc trop épais; c'est pour cela qu'on conseille d'épaissir un suc sucré ou de fruit trop liquide, & d'ajouter de l'eau à celui qui a trop de consistance; 3°. une chaleur de 10 à 15 degrés au thermomètre de Réaumur: avant ce degré la fermentation vineuse ne s'établit pas, au-delà elle va trop vite, & le produit vineux se détériore en perdant une portion d'alcool qui se dissipe; 4°. une grande masse, dans laquelle il puisse s'exciter un mouvement rapide; une observation multipliée a fait connoître que plus la matière fermentante est considérable, & mieux la fermentation s'y établit.

Lorsque les quatre conditions que nous venons d'indiquer sont réunies, alors la fermentation vineuse commence & marche sans interruption, jusqu'à ce que toute la matière soit convertie en une liqueur vineuse: ce mouvement présenté dans sa continuité à des phénomènes constants qui le caractérisent, & que l'on peut réduire d'après l'observation aux suivans.

1°. Il s'excite dans la liqueur un mouvement qui va en augmentant, jusqu'à ce que la fermentation soit bien établie. Ce mouvement est très-sensible à l'œil; on voit les molécules qui y naissent, s'agiter en différens sens; on entend même en approchant l'oreille de la cuve, un bruit, ou plutôt un bruissement qui annonce le choc & le frottement des molécules les unes contre les autres.

2°. Le volume des matières est bientôt augmenté, & cette augmentation suit la progression du mouvement. On voit la liqueur s'élever dans le vase, se boursoffier, & occuper un espace plus considérable que celui qu'elle occupoit auparavant.

3°. La transparence de la liqueur est troublée par des filamens opaques, qui sont agités & portés dans tous les points de ce fluide. Pour bien appercevoir ce phénomène, il faut que la matière fermentante soit contenue dans un vase de verre. On l'aperçoit bien dans les cours de chimie, lorsqu'on expose la décoction de l'orge prête à fermenter, dans de grands bocaux; on dirait, en observant de près la liqueur; que des stries huileuses s'y promènent en différens sens.

4°. Il se produit une chaleur qui va jusqu'à 18 degrés, suivant M. l'abbé Rozier. On s'assure de ce fait dans l'expérience citée ci-dessus, en tenant un thermomètre plongé dans la liqueur.

5°. Les parties solides mêlées à la liqueur, s'élèvent & la furnagent, à cause du fluide élastique qui s'y développe. Ordinairement les liquides que l'on fait fermenter, ne sont pas parfaitement clairs & sans mélange: on pourroit même compter parmi les conditions, si non nécessaires, au moins utiles de la fermentation vineuse, la présence des matières solides ou flocculeuses, ou pulvérulentes dans les liqueurs; dans le jus des raisins, ce sont les rafles, les pellicules, les grains; ou pepins qui constituent les parties solides: après avoir été agitées en tous sens, les matières solides finissent par s'élever à la surface de la liqueur, & y forment le chapeau.

6°. Il se dégage une grande quantité de gaz acide carbonique; ce gaz forme au-dessus des cuves une couche que l'on doit distinguer facilement de l'air: c'est dans cette couche que M. Priestley & M. de Chaulnes ont fait leurs belles expériences. Les bougies s'y éteignent, les animaux y meurent, la chaux dissoute dans l'eau y est précipitée en craie, les alcalis caustiques y cristallisent parfaitement. C'est cet acide contenu sur les cuves

en fermentation, qui expose à un danger si grand les hommes qui y travaillent.

Le phénomène relatif à ce dégagement de gaz, connu de Paracelse & de Vanhelmont, a été observé avec beaucoup de soin dans la fermentation vineuse, par beaucoup de physiciens modernes; c'est au-dessus des cuves de bière en fermentation, que les premières expériences exactes sur l'air fixe, ont été faites; le gaz, plus lourd que l'air, restoit long-temps au haut des cuves; il n'est diffus & emporté que très-lentement par l'air; sa production est un des plus beaux phénomènes de la fermentation vineuse: elle a singulièrement servi à faire découvrir la théorie de la formation de l'alcool, comme on le verra plus bas.

7°. Le dégagement de ce gaz est accompagné de la formation d'un grand nombre de bulles, qui ne sont dues qu'à la viscosité de la liqueur que l'acide carbonique est obligé de traverser. Ces bulles, en augmentant peu-à-peu, forment au haut de la liqueur une masse d'écume qui s'élève jusqu'à ce que la fermentation s'arrête.

Tous ces phénomènes se ralentissent & s'apaisent à mesure que la liqueur, de douce & sucrée qu'elle étoit d'abord, devient vive, piquante & susceptible d'enivrer; ils ont lieu jusqu'à ce que le vin soit formé.

Le besoin a suggéré aux hommes de préparer des liqueurs fermentées avec un grand nombre de substances végétales différentes les unes des autres; mais l'expérience elle-même réunie à la réflexion sur ses résultats, a convaincu qu'il n'y a que les matières sucrées qui sont susceptibles d'en former.

Cependant quoique la matière sucrée, le sucre, soit la seule des substances végétales capables d'éprouver la fermentation vineuse, & de se convertir en alcool, on a reconnu par des expériences exactes, que lorsqu'elle n'est pas unie, ou au moins mêlée à d'autres matières soit succulentes, soit extractives, soit salines, elle ne passoit jamais à l'état de vin. Du sucre pur dissous dans de l'eau pure, n'éprouve jamais la fermentation vineuse; mais le suc de la canne immédiatement retiré par l'expression, les méléasses, les jus de fruits, toutes substances contenant autre chose que du sucre proprement dit, passent plus ou moins rapidement à cette fermentation; c'est ce qu'on observe dans toutes les matières employées pour préparer des vins.

Parmi ces dernières, celles dont on a fait usage, & qu'il est par conséquent le plus nécessaire de considérer ici, sont les suivantes.

Le suc de raisin produit le vin, proprement dit, la meilleure de toutes les liqueurs fermentées. Il ne sera pas question ici de tout ce qui est relatif à la différence des raisins, des procédés employés pour faire le vin, ces objets seront traités en détail à l'article VIN; mais nous nous contenterons de jeter un coup d'œil rapide sur l'art du vigno-

ron. On conçoit que le but de cet état devenu si important pour les besoins de la vie, suppose toutes les considérations suivantes. 1°. La nature du terrain où croît la vigne. Un sol fec, sablonneux & élevé, aride, est en général très-bon pour cette plante; une terre grasse, forte, basse & humide ne lui convient pas. 2°. Le travail de la culture de ce végétal. On le taille, on en courbe les branches pour arrêter le cours de la sève: on a soin que la vigne soit exposée au soleil, & sur-tout à la réverbération des rayons par la terre, &c. On ne lui fournit point d'engrais, &c. 3°. L'histoire de la végétation de la vigne, de son exposition, de sa floraison, de la formation du raisin, de sa maturité, forme encore un des chapitres de l'art dont le travail précède la formation de l'alcool. 4°. Le détail des accidens auxquels la vigne est exposée, tels que la gelée, la pluie abondante, la grêle, l'humidité. 5°. Le temps de la vendange, qui doit être sec & chaud.

Ces connoissances préliminaires une fois acquises, on doit s'occuper de l'art de faire du vin, qui consiste à mettre les raisins égrappés dans une cuve, à les exposer à une chaleur de 15 à 16 degrés, à les écraser, à les fouler, à les agiter; alors la fermentation s'y excite, & tous les phénomènes ont lieu. Le suc de raisin, ou le moût, ne doit être ni trop fluide, ni trop épais. Dans le premier cas on l'épaissit par la cuisson, dans le second on le délaie avec de l'eau. Lorsque le vin est fait, on le soufre, & on le met dans des tonneaux que l'on ne bouche pas. Il éprouve une seconde fermentation insensible, qui en combine plus intimement les principes; il s'en précipite une lie fine & un sel connu sous le nom de *sarrie*, qui a été examiné dans le premier volume article *acide tartareux*. Pour conserver le vin, on le soufre ou on le mure, en faisant brûler dans les tonneaux où il est contenu, des linges imprégnés de soufre.

On voit bien que nous n'exposons ici que les titres des différens chapitres d'un ouvrage suivi sur la fermentation vineuse & sur les vins: les détails seront exposés à l'article VIN. On ne présente ici ces vues générales que pour rendre plus complète & plus claire l'histoire chimique de l'alcool. Il faut, après avoir étudié la vinification, connoître les différens vins; la France en produit un grand nombre d'excellens; ceux de Bourgogne sont les meilleurs de tous pour l'usage journalier; leurs principes sont parfaitement combinés, & il n'y en a aucun qui domine.

Les vins de l'Orléanois ont des qualités assez semblables à ceux de Bourgogne, lorsque le temps a dissipé un peu de leur verdeur, & a enchaîné l'esprit ou l'alcool qui y est excédent.

Les vins rouges de Champagne sont très-bons & très-délicats: le vin blanc non mouffé de ce pays vaut beaucoup mieux que le vin mouffé, dont le goût piquant & sigrelet, ainsi que la propriété de *mousser*, dépendent de l'acide carbo-

nique qui y a pour-ainsi-dire été renfermé, lorsqu'on l'a mis en bouteille avant que la fermentation fût achevée.

Les vins de Languedoc & de Guienne sont foncés en couleur, très-toniques & très-stomachiques, sur-tout quand ils sont vieux.

Les vins d'Anjou sont blancs, fort spiritueux, & ils enivrent très-prompement. Quant aux vins étrangers, ceux d'Allemagne, connus sous le nom de vins de Rhin & de la Moselle, sont blancs, très-spiritueux; leur saveur est fraîche & piquante; ils enivrent très-prompement. Quelques vins d'Italie, tels que ceux d'Orviette, de Vicence, de Lacrima-Christi, &c. sont bien fermentés, & imitent assez bien les bons vins de France : ceux d'Espagne & de Grèce sont, en général, cuits, doux, peu fermentés & très-mal-sains; il faut cependant en excepter ceux de Rota & d'Alicante, qui passent, avec raison, pour des stomachiques & des cordiaux très-utiles. (Voyez les articles VINIFICATIONS & VINS.)

Après le suc de raisin, qui fournit le vin proprement dit, il faut considérer les pommes & les poires, qui donnent le cidre & le poiré : ces espèces de vins sont assez bons, & on peut en tirer de bonne eau-de-vie, comme l'a démontré M. d'Arcet; les cerises qui fournissent un assez bon vin, dont on retire une eau-de-vie, nommée par les Allemands *Kirchenschwaffer*; les abricots, les pêches & les prunes, avec lesquels on ne fabrique que des vins moins bons que les précédents.

Le sucre, dissous dans l'eau, ne fermente point facilement, quand il est pur, comme nous l'avons dit. Mais quand on veut le faire fermenter, comme cela se pratique dans les îles, on le prend impur & mêlé avec d'autres substances végétales. Alors il imite les sucs des fruits qui sont des mélanges ou des combinaisons du sucre avec d'autres substances végétales, & dont il ne diffère que parce qu'il est plus riche en matière sucrée proprement dite. C'est ainsi, qu'en exposant à une température convenable, soit le *visou* ou suc exprimé de la canne, soit les gros syrops ou les portions de sucre liquide trop impures pour fournir du sucre cristallisé, on fait dans nos îles une liqueur vineuse très-forte, dont on tire une eau-de-vie connue sous le nom de *rassia*, *rhum* ou *guidive*. C'est à la présence de l'extrait ou de la fécule mêlés avec la matière sucrée, qu'est due la fermentation vineuse qui s'exerce dans cette liqueur.

Non-seulement les hommes ont appris à faire fermenter les sucs sucrés, ils ont encore trouvé le moyen de développer la matière sucrée, & conséquemment la propriété fermentescible dans des substances d'une nature en apparence fort éloignée. C'est ainsi que les graines céréales, & spécialement l'orge, fournissent une espèce de vin connu sous le nom de *bière*. L'art du brassier consiste en général dans les procédés suivans : on fait tremper l'orge pendant treute ou quarante

heures dans l'eau pour la ramollir; on laisse germer cet orge mis en tas; on le sèche à la touraille ou fourneau terminé par une trémie, sur laquelle on l'étend on le crible ensuite pour en séparer les germes appelés *tourillons*; on le mout en une farine nommée *malt*; on délaye cette farine dans la cuve *matière* avec de l'eau chaude qui dissout le muilage, l'extrait & le sucre; on nomme cette eau *premier mûrier*; on la renverse de nouveau sur le malt, après l'avoir fait chauffer, & elle forme le second mûrier; on la fait cuire & on la met à fermenter avec du boublon & de la levure, dans une cuve nommée *guilloire*; quand la fermentation est apaisée, on l'agite ou on *bute* la *guilloire*; on tire la bière dans des tonneaux; la fermentation secondaire en élève une écume nommée *levure*, qui sert à exciter la fermentation de la décoction d'orge dans la cuve *guilloire*. On reconnoît ici que la germination développe dans l'orge une matière sucrée à laquelle il doit la propriété de former du vin; on en pourroit faire de même avec la plupart des autres fémences graminées. Avec le riz on fait une liqueur d'oïl l'on retire le *rack*.

C'est d'après les mêmes principes qu'on pourra concevoir la formation des vins avec les eaux sucrées des palmiers, des cocos, le lait des vaches, des brebis, des juments, & en général avec toutes les substances végétales & animales qui contiennent plus ou moins de matière sucrée, mêlée avec d'autres corps. Ainsi, le nombre des matières susceptibles de passer à la fermentation vineuse & de former de l'alcool est très-considérable, & les hommes ont su tirer parti de cette antique observation pour préparer cette liqueur fermentée dans presque tous les pays de la terre.

Tous ces faits démontrent que la matière sucrée est le seul principe des végétaux, qui soit véritablement susceptible de passer à la fermentation vineuse, de former l'alcool; & que l'eau est nécessaire pour la production de ce mouvement intestin. M. Lavoisier a d'abord pensé que ce fluide est décomposé dans cette opération; suivant lui l'oxygène de l'eau se portoit sur la matière carbonieuse du sucre, & formoit l'acide carbonique qui se dégageoit pendant cette fermentation, tandis que l'hydrogène s'unissoit à l'huile du corps sucré, & formoit une substance combustible très-légère, très-divisée, qui contient en effet beaucoup moins de carbone & beaucoup plus d'oxygène que le sucre entier, qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus inflammable que lui, & qui constitue l'alcool. On ne voit donc dans cette opération de la nature qu'une combinaison nouvelle des principes de l'eau & de ceux du sucre, qu'un échange réciproque entre les uns & les autres, qu'un transport & une proportion variée dans leurs élémens. Mais M. Lavoisier a rectifié depuis ses idées sur la fermentation; il a fait voir, par des expériences scru-

pulvément exactes, que les principes du sucre lui-même suffisent pour former l'acide carbonique & l'alcool; que c'est par le partage de l'oxygène sur les deux principes, l'hydrogène & le carbone qui le constituent, que cette espèce de transmutation s'opère; c'est en offrant au lecteur l'article même où ce savant physicien présente les bases de cette théorie, que nous la ferons mieux connaître.

« Cette opération, dit M. Lavoisier, en parlant de la fermentation vineuse, 1. part. chap. 15. de son *traité élémentaire de chimie*, est une des plus frappantes & des plus extraordinaires de toutes celles que la chimie nous présente, & nous avons à examiner d'où vient le gaz acide carbonique qui se dégage, d'où vient l'esprit inflammable qui se forme, & comment un corps doux, un oxide végétal (1) peut se transformer ainsi en deux substances si différentes, dont l'une est combustible, l'autre éminemment incombustible. On voit que pour arriver à la solution de ces deux questions, il falloit d'abord bien connaître l'analyse & la nature du corps susceptible de fermenter, & les produits de la fermentation; car rien ne se crée ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature, & l'on peut poser en principes, que dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant & après l'opération, que la qualité, la quantité des principes est la même, & qu'il n'y a que des changements, des modifications. C'est sur ce principe qu'est fondé tout l'art de faire des expériences de chimie: on est obligé de supposer dans toutes une véritable égalité ou équation entre les principes du corps qu'on examine, & ceux qu'on en retire par l'analyse; ainsi, puisque du moût de raisin donne du gaz acide carbonique & de l'alcool, je puis dire que le moût de raisin = acide carbonique + alcool. Il résulte de-là qu'on peut parvenir de deux manières à éclaircir ce qui se passe dans la fermentation vineuse; la première, en déterminant bien la nature & les principes du corps fermentescible; la seconde, en observant bien les produits qui en résultent par la fermentation, & il est évident que les connaissances que l'on peut acquérir sur l'un conduisent à des conséquences certaines sur la nature de l'autre, & réciproquement. »

« Il étoit important d'après cela, que je m'attachasse à bien connaître les principes constitutifs du corps fermentescible. On conçoit que pour y parvenir, je n'ai pas été chercher les sucs de fruits très-composés, & dont une analyse rigoureuse seroit peut-être impossible. J'ai choisi de tous les corps susceptibles de fermenter le plus simple, le sucre, dont l'analyse est facile. Cette substance est un véritable oxide végétal, un oxide à deux bases, puisqu'il est composé d'hydrogène & du carbone porté à l'état d'oxide par une certaine proportion d'oxygène, & que ces trois principes sont dans un état d'équilibre qu'une force très-légère suffit pour rompre. Une longue suite d'expériences faites par différentes voies, & que j'ai répétées bien des fois, m'a appris que les proportions des principes qui entrent dans la composition du sucre, sont à-peu-près les suivantes :

Hydrogène.....	8 parties.
Oxygène.....	64
Carbone.....	28
TOTAL.....	100

« Pour faire fermenter le sucre, il faut d'abord l'étendre d'environ quatre parties d'eau. Mais de l'eau & du sucre mêlés ensemble, dans quelque proportion que ce soit, ne fermenteront jamais seuls, & l'équilibre subsisteroit toujours entre les principes de cette combinaison, si on ne les rompoit par un moyen quelconque. Un peu de levure de bière suffit pour produire cet effet, & pour donner le premier mouvement à la fermentation; elle se continue ensuite d'elle-même jusqu'à la fin: on rendra compte ailleurs des effets de la levure, & de ceux des ferments en général. (Voyez FERMENTS.) J'ai communément employé dix livres de levure en pâte pour un quintal de sucre, & une quantité d'eau égale à quatre fois le poids du sucre; ainsi la liqueur fermentescible se trouvoit composée comme il suit: (je donne ici les résultats de mes expériences, tels que je les ai obtenus, & en conservant même jusqu'aux fractions que m'a données le calcul de la réduction.) »

Matériaux de la fermentation pour un quintal de sucre.

	liv.	onc.	grains	
Eau.....	400			
Sucre.....	100			
Levure de bière en pâte, composée de {	eau.....	7	3	6
	levure sèche.....	2	12	1
		10		

(1) Voyez les mots OXIDES & OXIDE VÉGÉTAUX.

Détail des principes constituans des matériaux de la fermentation.

	liv.	onc.	gros	grains		liv.	onc.	gros	grains
407 liv. 3 onc. 6 gros 44 gr. d'eau hydrogène.....	61	1	2	71,40					
composées de.....	346	2	3	44,60					
100 liv. de sucre composées de.....	8								
hydrogène.....	64								
oxygène.....	28								
carbone.....									
2 liv. 12 onc. 1 gros 28 gr. d'oxygène.....		12	4	59,00					
levure sèche, composées de.....			5	2,94					
azote.....		4	5	9,30					
hydrogène.....	1	10	2	18,76					
TOTAL.....	510								

Récapitulation des principes constituans des matériaux de la fermentation.

	liv.	onc.	gros	grains		liv.	onc.	gros	grains
OXYGÈNE	340								
de l'eau de la levure.....	6	2	3	44,60					
du sucre.....	64								
de la levure.....									
HYDROGÈNE	60								
de l'eau de la levure.....	1	1	2	71,40					
du sucre.....	8								
de la levure.....	1	10	2	18,76					
CARBONE	28								
du sucre.....									
de la levure.....		12	4	59,00					
AZOTE									
de la levure.....			4	5	9,30				
TOTAL.....	510								

« Après avoir bien déterminé quelle est la nature & la quantité des principes qui constituent les matériaux de la fermentation, il reste à examiner quels en sont les produits. Pour parvenir à les connaître, j'ai commencé par renfermer les 510 livres de liqueur ci-dessus dans un appareil, par le moyen duquel je pouvois, non-seulement déterminer la qualité & la quantité des gaz à mesure qu'ils se dégagèrent, mais encore peser chacun de ces produits séparément à telle époque de la fermentation que je le jugerois à propos. Il seroit trop long de décrire ici cet appareil, que l'on trouvera au surplus décrit à l'article FERMENTATION. Je me bornerai donc à rendre compte des effets. »

« Une heure ou deux après que le mélange est fait, sur-tout si la température dans laquelle on opère est de 15 à 28 degrés, on commence à apercevoir les premiers indices de la fermentation : la liqueur se trouble & devient écumeuse ; il s'en dégage des bulles qui viennent crever à la surface : bientôt la quantité de ces bulles augmente, & il se fait un dégagement abondant & rapide de gaz acide carbonique très-pur, accom-

agné d'écume, qui n'est autre chose que de la levure qui se sépare. Au bout de quelques jours, suivant le degré de chaleur, le mouvement & le dégagement du gaz diminue ; mais il ne cesse pas entièrement, & ce n'est qu'après un intervalle de temps assez long, que la fermentation est achevée. »

« Le poids de l'acide carbonique sec qui se dégage dans cette opération, est de 35 livres 5 onces 4 gros 19 grains. »

« Ce gaz entraîne en outre avec lui une proportion assez considérable d'eau, qu'il tient en dissolution, & qui est environ de 13 livres 4 onces 5 gros. »

« Il reste dans le vase dans lequel on opère, une liqueur vineuse légèrement acide, d'abord trouble, qui s'éclaircit ensuite d'elle-même, & qui laisse déposer une portion de levure ; cette liqueur pèse en totalité 397 livres 9 onces 29 grains. »

« Enfin en analysant séparément toutes ces substances, & en les résolvant dans leurs parties constituantes, on trouve après un travail pénible, les résultats qui suivent, qui seront détaillés dans les mémoires de l'académie. »

TABLEAU des résultats obtenus par la fermentation.

liv.	onc.	gros.	gr.		liv.	onc.	gros.	gr.
35	5	4	19	d'acide carbonique	25	7	1	34
				composées	9	14	2	57
				d'oxygène combiné avec l'hydrogène	31	6	1	64
57	11	1	58	d'alcool sec com-	5	8	5	3
				posées	4	5		
				d'hydrogène combiné avec l'oxygène	16	11	5	63
				de carbone	147	10		59
403	15	5	14	d'eau composées	61	5	4	27
				d'oxygène	2	2		
				d'hydrogène	1	10		
2	8			d'acide acéteux sec	1	11	4	
				composées	2	5	1	67
				de carbone	2	9	7	27
4	1	4	3	de résidu sucre	1	2	2	53
				composées	2	2	2	41
				d'hydrogène	13	1	14	
1	6		50	de levure sèche	6	2	37	
				composées	2	2	30	
				d'azote				

RÉCAPITULATION des résultats obtenus pendant la fermentation.

liv.	onc.	gros.	gr.		liv.	onc.	gros.	gr.
				de l'eau	147	10		59
				de l'acide carbonique	25	7	1	34
				de l'alcool	31	6	1	64
409	10		54	d'oxygène	1	11	4	
				d'acide acéteux	2	9	7	27
				du résidu sucre	1	2	2	53
				de la levure	61	5	4	27
				de l'acide carbonique	9	14	2	57
				de l'alcool	16	11	5	63
28	12	5	66	de carbone	2	10		
				d'acide acéteux	1	2	2	53
				du résidu sucre	2	6	2	37
				de la levure	61	5	4	27
				de l'eau	5	8	5	3
73	8	6	66	d'hydrogène	4	2		
				combiné avec le carbone dans l'alcool	2	4		
				d'acide acéteux	5	1	67	
				du résidu sucre	2	2	41	
				de la levure	2	2	30	
				d'azote				

» Quoique dans ces résultats j'aie porté seulement aux grains la précision du calcul ; il s'en faut bien que ce genre d'expériences puisse comporter encore une aussi grande exactitude ; mais comme je n'ai opéré que sur quelques livres de sucre, & que pour établir des comparaisons, j'ai été obligé de les réduire, en quintal, j'ai cru devoir laisser subsister les fractions telles que le calcul me les a données. »

» En réfléchissant sur les résultats que présentent les tableaux ci-dessus, il est aisé de voir clairement ce qui se passe dans la fermentation vineuse. On remarque d'abord que sur les cent livres de

sucre qu'on a employées, il y en a eu 4 livres 1 once 4 gros 3 grains qui sont restées dans l'état de sucre non décomposé, en sorte qu'on n'a réellement opéré que sur 95 livres 14 onces 3 gros 69 grains de sucre, c'est-à-dire sur 61 livres 6 onces 45 grains d'oxygène, sur 7 livres 10 onces 6 gros 6 grains d'hydrogène & sur 26 livres 13 onces 5 gros 19 grains de carbone. Or en comparant ces quantités, on verra qu'elles sont suffisantes pour former tout l'esprit-de-vin ou alcool, tout l'acide carbonique & tout l'acide acéteux qui a été produit par l'effet de la fermentation. Il n'est donc point nécessaire de supposer

que l'eau se décompose dans cette opération, à moins que l'on ne prétende que l'oxygène & l'hydrogène sont dans l'état d'eau dans le sucre, & que ce ne soit pas, mais que j'ai établi au contraire, qu'en général, les trois principes constitutifs des végétaux, l'hydrogène, l'oxygène & le carbone étoient entre eux dans un état d'équilibre; que cet état d'équilibre subsistait tant qu'il n'étoit point troublé, soit par un changement de température, soit par une double affinité, & que ce n'étoit qu'alors que les principes se combinant deux à deux, formoient de l'eau & de l'acide carbonique.

Les effets de la fermentation vineuse se réduisent donc à séparer en deux portions le sucre qui est un oxyde, à oxygéner l'une aux dépens de l'autre, pour en former de l'acide carbonique; à désoxygéner l'autre en faveur de la première, pour en former une substance combustible, qui est l'alcool; & en sorte que s'il étoit possible de recombinaison ces deux substances, l'alcool & l'acide carbonique, on reformerait du sucre. Il est à remarquer au surplus, que l'hydrogène & le carbone ne sont pas dans l'état d'huile dans l'alcool, ils sont combinés avec une portion d'oxygène, qui les rend miscibles à l'eau: les trois principes, l'oxygène, l'hydrogène & le carbone sont donc encore ici dans une espèce d'équilibre; & en effet, en les faisant passer à travers un ruban de verre ou de porcelaine rouge au feu, on les recombine deux à deux, & on retrouve de l'eau, de l'hydrogène, de l'acide carbonique & du carbone.

Le produit de toutes les substances sucrées fermentées, est une liqueur particulière plus ou moins colorée, d'une odeur aromatique, d'une saveur piquante & chaude, qui ranime le jeu des fibres affaiblies lorsqu'on la prend à petites doses, & qui enivre lorsqu'on en boit trop: c'est ce que tout le monde connaît sous le nom de vin.

Le vin de raisin, que nous prendrons pour exemple, est un composé d'une grande quantité d'eau, d'un arôme particulier à chaque vin, d'alcool, d'un sel essentiel, nommé tartré ou acide tartareux, & d'une matière extracto-résineuse colorante, à laquelle les vins rouges doivent leur couleur.

C'est du vin qu'on extrait l'alcool; c'est en séparant les principes & en détruisant sa combinaison vineuse qu'on obtient ce produit de l'art. Avant de passer à la description des moyens employés pour opérer cette décomposition, & pour avoir à part l'alcool, il seroit utile d'avoir une connaissance assez exacte des propriétés du vin entier, des principales différences qu'il présente dans les divers lieux où on le prépare, & des usages auxquels on l'emploie dans son état d'intégrité; mais cette connaissance exigeoit de longs détails préliminaires qui nous écarteroient de notre objet; nous avons pensé qu'il étoit préfé-

rable de la présenter à l'article VIN, que nous consultons le lecteur avant de passer au paragraphe suivant: il suit, à la rigueur ici, de se former une idée exacte de la nature générale du vin; de se rappeler que c'est un composé intimement lié d'eau, d'alcool & de matières extractive, colorante & saline.

6. II. Extraction & purification de l'alcool.

Pour décomposer le vin & en séparer les différents principes, on se sert ordinairement de l'action du feu. On distille cette liqueur dans un alambic de cuivre étamé (Voyez ALAMBIC), auquel on adapte un récipient; on obtient, dès que le vin bout, un fluide blanc légèrement opaque & laiteux, d'une odeur forte & suave; on continue à recevoir ce fluide jusqu'à ce que les vapeurs qui s'en élèvent cessent de s'enflammer à l'approche d'une lumière. Ce produit est ce qu'on appelle l'eau-de-vie, c'est un composé d'eau, d'alcool & d'une petite quantité d'huile qui lui ôte sa transparence pendant qu'elle distille, & qui la colore en jaune par la suite. On ne doit point attribuer la couleur des vieilles eaux-de-vie du commerce à cette espèce d'huile fétide qui passe avec elle dans la distillation, mais bien à la matière extractive du bois qu'elle a dissoute dans les tonneaux qui ont servi à la contenir. L'eau-de-vie est la liqueur d'où on extrait l'alcool, comme nous le verrons plus bas. Après avoir fourni l'eau de vie, le vin est d'une couleur rouge foncée, d'un goût acide & astringent; il est trouble & on en obtient une grande quantité de cristaux salins qui ne sont que du tartré. Ce fluide est alors tout-à-fait décomposé, & on ne peut plus lui donner ses premières propriétés en combinant le produit volatil qu'on en a obtenu avec le résidu qu'il a fourni. Cette analyse est donc compliquée: si on évapore le résidu du vin d'où on a retiré l'eau-de-vie, il prend la forme & la consistance d'un extrait. On peut en séparer la partie colorante par le moyen de l'alcool, qui ne touche point au tartré. Cette espèce de teinture n'est point précipitée par l'eau; en l'évaporant à siccité, le résidu s'enflamme facilement, & est dissoluble dans l'eau; c'est une véritable substance résino-extractive que l'alcool, formé par la fermentation, a enlevée de la pellicule des raisins. On voit, d'après cette analyse, que le vin est véritablement composé d'eau, d'alcool, de tartré, d'une matière colorante & d'un arôme qui se perd ou se modifie par l'action du feu. Nous ne devons examiner ici que l'art de séparer & de purifier l'alcool.

L'art de distiller les vins pour en obtenir l'eau-de-vie, est pratiqué en grand dans différents départements de la France; il y est connu sous le nom de *brûerie* du vin. Cet art a été beaucoup perfectionné depuis quelques années. Sans entrer

dans des détails trop longs qu'on trouvera dans le dictionnaire des arts, nous nous bornons à donner ici l'esquisse très-bien faite que M. Chapral a consignée dans les *éléments de chimie*, tome 3, d'après ce qu'il a été à portée de voir par lui-même.

« On fabrique, dit-il, des eaux-de-vie depuis le treizième siècle, & c'est dans le Languedoc ou ce commerce a pris naissance: Arnaud de Villeneuve paroît être l'auteur de cette découverte. Les alambics dans lesquels on a distillé les vins pendant long-temps, étoient des espèces de chaudrons surmontés d'un long col cylindrique, très-étroit, coiffé par une demi-sphère creuse, dans laquelle les vapeurs vont se condenser; à ce petit chapiteau est adapté un tuyau peu large qui porte la liqueur dans le serpent. On a ajouté successivement quelques degrés de perfection à cet appareil distillatoire; la colonne a été considérablement baissée, & les chaudières adoptées généralement pour la distillation des vins dans le Languedoc, sont à-peu-près de la forme suivante: ce sont des espèces de chaudrons à cul plat, dont les côtes sont élevés perpendiculairement au fond jusqu'à la hauteur de vingt-un pouces; à cette hauteur on pratique un étranglement qui en réduit l'ouverture à douze; cette ouverture est terminée par un col de quelques pouces de long qui reçoit la base d'un petit couvercle appelé *chapeau*, & qui imite grossièrement la forme d'un cône renversé; c'est de l'angle de la base supérieure du chapeau que part un petit bec destiné à recevoir les vapeurs d'eau-de-vie, & à les transmettre dans le serpent auquel il est adapté; ce serpent présente six ou sept circonvolutions, & est placé dans un tonneau qu'on a soin de remplir d'eau pour faciliter la condensation des vapeurs.

Les chaudières sont pour l'ordinaire enchauffées dans la maçonnerie jusqu'à leur étranglement, le fond seul est exposé à l'action immédiate du feu. Un cendrier trop étroit, un foyer assez large & une cheminée placée vis-à-vis la porte du foyer constituent les fourneaux dans lesquels sont enchauffées ces chaudières.

On charge les chaudières de cinq à six quintaux de vin, la distillation s'en fait dans huit à neuf heures, & on brûle de soixante à soixante-quinze livres de charbon de pierre à chaque chauffe, ou distillation.

Il n'est personne qui ne sente l'imperfection de cette forme de chaudière; les vices majeurs sont les suivans:

1°. La forme de la chaudière établit une colonne de vin assez haute & peu large qui, n'étant frappée par le feu qu'à sa base, est bue dans cette partie avant que le dessus soit chaud.

2°. L'étranglement pratiqué à la partie supérieure rend la distillation plus difficile & plus longue; en effet, cet étranglement continuellen-

ment frappé par l'air, condense les vapeurs qui retombent sans cesse; il s'oppose en outre au libre passage des vapeurs, & fait une espèce d'éclipse, comme l'a observé M. Baumé; de sorte que les vapeurs comprimées à ce goulot réagissent avec effort, pressent fur la fin, & s'opposent à une ascension ultérieure.

3°. Le chapiteau n'est pas construit d'une manière plus avantageuse; la cabote se met à la température des vapeurs, & celles-ci ne pouvant pas se condenser, font effort & suspendent ou retardent la distillation.

4°. Au vice, dans la forme de l'appareil, se joint la méthode la plus vicieuse d'administrer le feu; par-tout on a un cendrier fort étroit, un foyer très-large & une porte qui ferme mal; le courant d'air s'établit entre le combustible & le cul de la chaudière, & la flamme se précipite dans la cheminée sans avoir été mise à profit; il faut donc un feu violent pour chauffer médiocrement une chaudière, d'après ces vices de construction.

On a successivement apporté quelques degrés de perfection dans la construction des chaudières: l'art d'administrer le feu a même été porté à un haut degré de perfection dans les établissemens de M. Joubert; mais j'ai cru pouvoir ajouter encore à ce qui étoit connu, & voici d'où je suis parti.

Tout l'art de la distillation se réduit aux deux principes suivans: 1°. dégager & élever les vapeurs de la manière la plus économique; 2°. en opérer la condensation la plus prompte.

Pour remplir la première de ces conditions, il faut que la chaudière présente au feu le plus de surface possible, & que la chaleur lui soit appliquée également par-tout.

Pour remplir la seconde condition, il ne faut pas que l'ascension des vapeurs soit gênée, il faut qu'elles aillent frapper contre des corps froids qui les condensent rapidement.

Les chaudières que j'ai fait construire d'après ces principes, sont donc plus larges que hautes; le fond est bombé en dedans afin que le feu soit presque à une égale distance de tous les points de la surface du cul de la chaudière; les côtes sont élevés perpendiculairement, de façon que la chaudière présente une portion de cylindre, & cette chaudière est recouverte d'un vaste chapiteau entouré de son réfrigérant; ce chapiteau a une rainure de deux pouces de saillie sur le bord inférieur & intérieur, les parois ont une inclination de soixante-quinze degrés, parce que je me suis convaincu qu'à ce degré une goutte d'eau-de-vie coule sans retomber dans la chaudière; le bec du chapiteau en a toute la hauteur & toute la largeur, il va insensiblement en diminuant pour s'emboîter dans le serpent, le réfrigérant accompagne le bec, & porte à son extrémité un robinet qui laisse couler l'eau qui y tombe sans cesse par le haut.

Lorsque l'eau du réfrigérant commence à échauffer, alors on ouvre le robinet pour qu'elle s'échappe à proportion qu'il en est fourni de la fraîche par le haut; on entretient par ce moyen l'eau à une température égale, & les vapeurs qui vont frapper contre les parois du chapiteau s'y condensent de suite, en même temps que celles qui montent n'éprouvent aucun obstacle, puisqu'elles ne rencontrent aucun étranglement: d'après cette conformation on peut presque se passer de serpentin, puisque l'eau qu'il contient ne s'échauffe pas sensiblement.

Ces procédés sont très-économiques & très-avantageux, car la qualité des eaux-de-vie en est meilleure & la quantité plus considérable.

On soumet la distillation du vin jusqu'à ce que le produit de la distillation ne soit plus inflammable. Cette eau-de-vie est mise dans des tonneaux, où elle se colore par l'extraction du principe réfixe contenu dans le bois.

Le vin de nos climats fournit un cinquième ou un quart d'eau-de-vie à l'épreuve du commerce.

L'eau-de-vie que l'on retire en distillant le vin à feu nud, est un composé d'alcool, d'eau & d'une petite portion de matière huileuse. Pour séparer ces substances & obtenir l'alcool pur, on se sert de la distillation: il y a plusieurs procédés pour distiller l'alcool. M. Baumé conseille de distiller de l'eau-de-vie au bain-marie un assez grand nombre de fois, pour en tirer tout ce qu'elle contient de volatil & d'inflammable. Il recommande de séparer le premier quart du produit de la première distillation, & de mettre également à part la première moitié du produit des distillations suivantes: on mêle ensemble tous ces produits, & on les rectifie à une chaleur douce. La première moitié de liqueur qui passe dans cette rectification, est l'alcool le plus pur & le plus fort, le reste est un alcool moins fort, mais encore très-bon pour les usages ordinaires. Rouelle prescrivait de retirer, par la distillation au bain-marie, la moitié de l'eau-de-vie employée; ce premier produit est de l'alcool commun; en le rectifiant deux fois, & le réduisant environ aux deux tiers, on obtient de l'alcool plus fort, que l'on distille de nouveau avec de l'eau d'après le procédé de Kunckel; l'eau sépare l'alcool de l'huile qui l'altérerait; on rectifie cet alcool distillé avec l'eau, & on est sûr de l'avoir parfaitement pur: le résidu de l'eau-de-vie distillée n'est qu'une eau chargée de quelques parties colorantes & surannée par une espèce d'huile particulière.

On conçoit que ce fluide peut, d'après les différents procédés que l'on emploie, avoir différents degrés de force & de pureté. On a cherché depuis long-temps des moyens de reconnoître la pureté. On a cru d'abord que l'alcool qui s'enflamme facilement & qui ne laisse aucun résidu, étoit très-pur; mais on fait aujourd'hui que la

chaleur, excitée par la combustion, est assez forte pour dissiper tout le phlegme qu'il pourroit contenir, & le faire paroître entièrement combustible. On a proposé l'épreuve de la poudre; lorsque l'alcool allumé dans une cuiller sur de la poudre à canon ne l'enflamme pas, il est regardé comme mauvais; si, au contraire, il y met le feu, on le juge très-bon. Mais cette épreuve est fautive & trompeuse, car en mettant beaucoup du meilleur alcool sur un peu de poudre, l'eau qu'il fournit dans la combustion, humecte la poudre & elle ne s'allumera pas, tandis qu'on pourra l'enflammer en faisant brûler à sa surface une quantité très-petite d'alcool phlegmatique. Ce moyen n'est donc pas plus sûr que le premier. Boëhaave a donné un très-bon procédé pour connoître la pureté de ce fluide; il consiste à jeter dans l'alcool de la potasse bien sèche en poudre: elle s'unit à l'eau surabondante de l'alcool, & elle forme un fluide plus pesant & plus coloré que l'alcool, & qui ne le mêle point avec ce dernier qui le surnage. Enfin M. Baumé, fondé sur ce que l'alcool est d'autant plus léger que l'eau, qu'il est plus pur, a imaginé un aréomètre, à l'aide duquel on peut déterminer d'une manière exacte le degré de pureté de ce fluide, & de toutes les liqueurs spiritueuses: cet instrument plongé dans l'alcool, s'y enfonce d'autant plus que ce fluide est plus pur. Il s'est assuré par des expériences bien faites, que l'alcool le plus pur & le plus rectifié, donne trente-neuf degrés à son aréomètre, à dix degrés du thermomètre de Réaumur. On trouvera une description de cet instrument à l'article ARÉOMÈTRE. Mais comme les détails donnés par M. Baumé dans ses *éléments de pharmacie*, sur la rectification de l'alcool, sont importants pour faire connoître les progrès de l'art chimique, il nous a paru utile de les consigner ici pour compléter l'histoire de l'extraction & de la rectification de l'alcool. Le seul changement que nous nous permettons, est la substitution du mot alcool à celui d'esprit-de-vin.

La rectification de l'alcool, dit M. Baumé, est une opération par laquelle on le dépouille de son flegme, & de son huile essentielle & grossière, par les distillations réitérées.

On met de l'eau-de-vie dans le bain-marie d'un alambic; on procède à la distillation; on reçoit à part environ un quart de la liqueur qui s'élève la première; on fait distiller encore une pareille quantité de liqueur, ou jusqu'à ce que celle qui passe soit blanche & laiteuse.

On soumet de nouveau cette dernière liqueur à la distillation au bain-marie, & on en fait passer environ la moitié, qu'on mêle avec le premier alcool qu'on distille pendant la première opération; on continue la distillation pour tirer tout ce qui reste de spiritueux; on le rectifie de nouveau pour tirer encore une portion de liqueur qui passe

la première, & qu'on mêle avec les précédentes; on continue ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait tiré de l'eau-de-vie tout ce qu'elle peut fournir de liqueur spiritueuse, semblable au premier alcool: il reste dans le bain-marie, après chaque distillation, une liqueur phlegmatique ou à une odeur d'eau-de-vie, mais qui ne contient plus de liqueur inflammable: on la jette chaque fois comme inutile.

Alors on distille de nouveau au bain-marie toutes les premières portions d'alcool qu'on a mêlé à mesure; on en fait passer par la distillation environ la moitié; on la met à part: c'est ce que l'on nomme alcool rectifié. On continue la distillation pour tirer tout le spiritueux qui reste dans l'alambic; on le rectifie de nouveau pour tirer encore la moitié de la liqueur qui passe la première, & on peut continuer ainsi de suite, pour rectifier tout l'alcool de l'eau-de-vie qu'on a employée; on le garde à part, si l'on veut, pour des usages où on n'a pas besoin d'alcool si bien rectifié.

A cette description du procédé pour obtenir l'alcool rectifié, M. Baume ajoute des remarques qui éclairent sur les différens procédés décrits avant lui, & que nous insérerons encore. « Les sages chimistes, dit-il, ont donné leurs procédés pour rectifier l'alcool par des intermédiaires terreux, spongieux, salins & aqueux; mais je n'en ai pas trouvé de plus commode, & qui soit aussi bon que celui qui vient d'être rapporté ».

« L'eau-de-vie qu'on trouve dans le commerce contient, pour ainsi dire, les mêmes principes que le vin, mais dans des proportions bien différentes; elle contient moins de flegme & d'acide que le vin, mais plus d'huile surabondante, & plus d'esprit inflammable ».

« La première portion d'alcool qui s'élève dans chaque distillation, est la plus pure & la moins chargée d'huile essentielle grossière; celle qui la suit en est presque saturée: on remarque même

que certaines eaux-de-vie, sur-tout celles qui ont été tirées des lies de vin, laissent dans l'alambic, après la distillation de la partie spiritueuse, un flegme qui est surchargé par une grande quantité de cette huile, qu'on peut séparer par l'entonnoir; l'eau-de-vie qui a été tirée du vin n'en laisse point, ou du moins une bien moindre quantité: ce n'est pas qu'il en ait passé davantage pendant la rectification de cette espèce d'eau-de-vie, c'est seulement parce qu'elle en contenait une moindre quantité, ce qui fait qu'elle ne devient pas aussi sensible. C'est pour priver l'alcool de plus en plus de cette huile grossière, que nous avons recommandé de rectifier à part les dernières portions d'alcool qu'on tire à chaque distillation. Il est facile de reconnaître les différences qu'il y a entre ces deux portions d'alcool; la première ne laisse aucune odeur de flegme d'eau-de-vie dans les mains après l'évaporation du spiritueux; la seconde, au contraire, laisse une odeur d'huile de vin semblable à l'odeur de l'halène des gens ivres, lorsqu'ils digèrent mal le vin ».

« Quelques personnes se contentent de distiller l'eau-de-vie à plusieurs reprises, en laissant mêler la totalité de l'alcool, elles separent seulement chaque fois le flegme qui reste dans l'alambic: mais cet alcool, quoique bien débarrassé de son flegme, contient une si grande quantité d'huile surabondante, qu'après un grand nombre de rectifications, il laisse dans les mains cette odeur dont nous venons de parler ».

« Kunckel paroît être le premier qui ait fait quelque attention à cette huile étrangère à l'alcool; le moyen qu'il propose pour la séparer, consiste à mêler l'alcool dans une très-grande quantité d'eau, & à procéder ensuite à la distillation pour le retirer. On répète la même opération plusieurs fois de suite & on le rectifie. Il est certain que ce procédé est très-efficace; l'huile de vin reste nageante sur l'eau (1), & l'alcool perd

(1) Un artiste distingué, M. Dubutson, a donné, dans son *art de distiller*, une observation remarquable sur cette huile étrangère dans la distillation de l'alcool. Voici comment il s'exprime sur ce point: (*Art de Distiller*, par Dubutson 1779, 180-101. Page 151.)

« Je ne fais à quelle époque Kunckel s'est avisé de mettre l'alcool en distillation dans l'eau, à dessein de le dépouiller de son huile grasse empyreumatique; mais j'ai l'honneur d'affirmer & d'avouer de bonne foi que je conçois l'idée d'exécuter la même opération; je n'avois alors d'autre intention que celle d'adoucir la trop grande ardeur de l'alcool. Or, comme je remarquai que mon opération remplissoit parfaitement bien l'objet que je m'étois proposé, je la continuai fort long-temps, sans soupçonner même l'existence de cette huile grasse que le hasard me fit appercevoir; & si je rends raison de la remarque que j'ai faite à ce sujet, je puis mes lecteurs de vouloir bien être persuadés que je n'ai point d'autre prétention que celle de continuer le sentiment de Kunckel. Voici le fait; dans les années 1740 & 1741, l'eau-de-vie étant devenue fort chère & très-rare, tant à Paris que dans les provinces qui nous approvisionnoient ordinairement, je pris la résolution de faire venir une petite affaire considérable d'alcool commun, que j'avois recommandé à M. de la Faverie, qui étoit alors un des meilleurs distillateurs de Montpellier; or, comme j'avois observé, pendant plus de dix années avant cette époque, que l'alcool, que je ne recueillois plus qu'après l'avoir mêlé en distillation dans l'eau, ne donnoit une odeur beaucoup plus agréable, & une faveur moins âcre, moins ardente, que celui que j'avois rectifié sans addition d'eau, cette méthode me parut encore d'autant plus intéressante pour mes opérations, que les liqueurs, dans la composition desquelles je faisois entrer cette qualité d'alcool, étoient plus coolantes, & que leur parfum étoit plus délicat, & plus pénétrant, parce que cet esprit ne se chargeroit que des huiles essentielles les plus pures des fruits ».

« Enfin, suivant le principe que j'avois adopté, je mêlai une quatrième partie d'eau de rivière à l'alcool que j'avois tiré de Montpellier, huit jours après ce mélange je procédai à la rectification. Comme je n'avois pas encore fait usage des eaux-de-vie ni des esprits-de-vin du Languedoc, j'en obtins plus attentivement les produits & les résidus, que je trouva d'abord plus

de plus en plus fa mauvaise odeur. Mais ce procédé est embarrassant, parce qu'il exige qu'on emploie beaucoup d'eau, & qu'il faut en venir à plusieurs distillations pour séparer entièrement l'alcool d'avec l'eau, & pour le réduire en ce que l'on nomme alcool de vin ».

« D'autres recommandent de rectifier l'alcool de vin fur de la chaux vive ou éteinte à l'air. Ce moyen est très efficace pour séparer de l'alcool l'huile & l'eau surabondante; mais la chaux altère singulièrement les principes de l'alcool, en s'emparant d'une grande partie de son acide; on retire aussi une bien moindre quantité d'alcool, & celui qu'on obtient est très-puéril ».

« Quelques personnes faisoient usage à Paris de ces différens procédés en même temps, mais dans la vue seulement d'enlever à l'alcool l'odeur des huiles essentielles qu'on y avoit mêlées pour l'aromatiser, afin qu'il payât moins de droits aux entrées de Paris; mais peu-à-peu ces manœuvres se sont découvertes, & l'on a mis des droits égaux sur l'alcool odorant comme sur celui qui n'a point d'odeur. Voici la méthode qu'on emploie pour enlever à l'alcool son odeur étrangère.

« On mêle l'alcool aromatisé avec une suffisante quantité d'eau; le mélange devient laiteux à raison de l'huile qui se sépare; on filtre la liqueur dans des vaisseaux clos, mais au travers d'une certaine quantité de chaux éteinte à l'air; l'huile essentielle reste dans la chaux; on rectifie ensuite cette liqueur pour séparer l'alcool d'avec l'eau; il se trouve très-pur & sans odeur lorsque l'on a bien opéré. Il est cependant bon de faire observer que ce moyen ne réussit que lorsque l'alcool est peu chargé d'huile essentielle, comme il l'étoit dans le temps que les droits étoient différens; mais lorsque l'alcool en contient beaucoup, il y a une portion d'huile essentielle qui se rectifie de plus en plus avec l'alcool, & qui lui conserve l'odeur de l'aromate qu'on lui avoit ajoutée: toutes les manipulations imaginées pour

frauder les droits, sont inutiles aujourd'hui pour remplir cet objet, mais doivent être toujours employées pour rectifier l'alcool odorant.

« Quelques chimistes recommandent de rectifier l'alcool sur du sel alest, après les avoir fait digérer ensemble; mais ce sel décompose l'alcool à-peu-près de même que la chaux; l'alcool acquiert d'ailleurs une couleur rouge, qui est une preuve du commencement de sa décomposition: il est vrai qu'il perd sa couleur par la rectification, mais il n'en est pas moins altéré, puisque la matière saline qu'il laisse après sa distillation, fournit un sel neutre cristallisable, formé par l'acide de l'alcool & le sel alcali ». Ce que dit la M. Baume de la décomposition de l'alcool par les alcalis, mérite confirmation: il en fera question plus bas.

« D'autres chimistes recommandent de rectifier l'alcool sur de la mie de pain sèche, ou sur du son, ou sur de la craie; ces substances sont très-propres à retenir le phlegme & l'huile surabondante de l'alcool; mais la craie produit un effet à-peu-près semblable à celui de la chaux; à l'exception de cette différence seulement qu'elle décompose moins promptement l'alcool: la mie de pain ou le son, n'altèrent point l'alcool; elles fournissent pendant la distillation un mucilage qui s'empare du flegme; ils font l'un & l'autre de très-bons intermédiaires pour rectifier l'alcool ».

« L'alcool que j'ai tiré du vin d'Espagne, a conservé une grande partie de sa faveur & de son odeur, même après avoir passé successivement par toutes les opérations dont nous venons de parler, & ce qui pourroit faire présumer que ces propriétés sont dépendantes de la nature de cette espèce de vin.

« Lorsque on distille de l'eau-de-vie, ou lorsqu'on rectifie de l'alcool, il reste dans l'alambic une certaine quantité de flegme qui sent un peu l'eau-de-vie. J'ai toujours trouvé ce flegme plus léger que de l'eau distillée, même après en avoir

arçus & moins favorables que les alcools que j'avois retirés des eaux-de-vie de Cognac. Des occupations insupportables ne m'ayant pas donné le temps de démontrer mon alambic aussi-tôt après l'opération, lorsque je levai le chapiteau, à l'effet de recommencer une seconde distillation, le résidu de la première étoit presque totalement retrouvé. Comme le collet de ma cucurbitre étoit fort large, j'apparus d'abord quelques bulles d'huile qui s'élevèrent par la superficie de ce résidu, & dont chacune sentoit presque aussi étendue qu'une pièce de six sols; le reflux doucement, aux courbures de son long-mani, je l'observai de manière que j'enlevai toutes ces parties d'huile qui s'élevaient déjà fort épaisses; je les rassemblai dans une soucoupe de porcelaine, que je mis en réserve, & lorsque cette huile fut totalement retroussée sa couleur devint semblable à celle du marbre; elle acquit d'abord la consistance du beurre, & ensuite celle du suif de monton; la vapeur étoit acre & désagréable, & son odeur étoit presque aussi forte que celle de la verbenne; je la formai de ces particules d'huile réunies une balle qui pesoit un gros, elle étoit de la grosseur d'une avoine. Je la soumis à l'inspiration de feu M. Bonelle; comme je ne pus le persuader que cette huile provenoit de l'alcool que j'avois rectifié, pour m'en assurer je m'en mis bien sagement mon alambic, qui étoit d'étain fin, & dont je me servois depuis plus de douze ans; je le chargai avec quarante-huit pintes de la même liqueur, c'est-à-dire, de la même quantité que j'avois employée dans l'opération précédente; je lutai les jointures de mon vaisseau; je procédai à la rectification; & lorsque j'eus obtenu la même quantité d'esprit que dans la première opération, se taillit retrousser le résidu; je démontré mon alambic, & je retirai un peu plus que la même quantité d'huile grasse, parce que je l'avois recueillie avec plus de précaution ».

« Quelques années après; je répétai la même opération avec l'eau-de-vie de Cognac; mais le résidu de la même quantité d'alcool commun que je retirai de cette eau-de-vie me m'a donné qu'un demi-gros & près d'un scrupule de cette huile grasse dont la faveur & la couleur étoient les mêmes que celle des eaux-de-vie du Languedoc. Si mes opérations ont été aussi bien faites que l'ai lieu de le présumer, je me croirois autorisé à conclure que cette espèce d'huile se trouve en plus ou moins grande quantité, mais toujours en raison de ce que les vins contiennent une quantité plus ou moins grande de tartre avec lequel cette huile est nécessairement unie ».

fait évaporer une partie à l'air libre, afin d'être sûr que cette plus grande légèreté ne venoit que de quelque portion d'eau-de-vie qui y étoit réflée. J'attribue la légèreté de ce flegme à une certaine quantité de liqueur spiritueuse qui lui est combinée, comme elle l'est dans le vinaigre. »

« L'usage du serpent, plongé dans une cuve remplie d'eau froide, s'est introduit pour la rectification de l'alcool : cependant cet instrument, tout excellent qu'il est, n'est pas non plus sans inconvénients, sur-tout lorsqu'on veut se procurer de l'alcool débarrassé de tout flegme. Par exemple, lorsqu'on tient très-froide l'eau de la cuve du serpent, on refroidit la masse d'air contenue dans le serpent ; l'humidité de cette masse d'air se condense entre ses parois, de la même manière que la fraîcheur d'un vase porté dans un endroit où l'air est chaud, condense à sa surface l'eau contenue dans l'air qui le touche. L'humidité de l'air ainsi condensée dans l'intérieur du serpent, distille avec l'alcool ; il se décharge, par ce moyen, d'une assez grande quantité d'humidité. Si l'eau du serpent est très-froide, l'alcool qui distille est aussi lui-même très-froid ; dans ce cas, il se condense à sa surface l'humidité de la portion d'air qui le touche, laquelle, en se renouvelant, porte continuellement de l'eau dans l'alcool. »

« Lorsqu'on distille avec un serpent, il faut, toutes choses égales d'ailleurs, un plus grand degré de chaleur pour mettre la distillation en train & pour l'entretenir, que lorsqu'on ne s'en sert pas, parce que les vapeurs qui s'élèvent de l'alambic ont à vaincre la résistance que la colonne d'air contenue dans l'intérieur du serpent, oppose continuellement à ces mêmes vapeurs ; mais on remédie à ces inconvénients, en employant des serpents faits avec des tuyaux d'un plus grand diamètre : par rapport à cela, il est fort dangereux d'adapter à de très-grands alambics, des serpents faits avec des tuyaux d'un petit diamètre ; la quantité de vapeurs qui s'élèvent à la fois ne trouvant pas une issue suffisante pour sortir, fait un effort considérable & soulève le chapiteau de l'alambic, avec danger pour les assistants. »

Tels sont les conseils donnés par M. Baumé, sur la rectification de l'alcool : nous les avons présentés dans tous leurs détails, parce qu'ils auroient perdu leur mérite en les tronquant ; nous en ferons de même pour exposer le résultat des essais faits par ce chimiste, dans l'intention de déterminer les effets de son aréomètre dans des alcools plus ou moins rectifiés, ou mêlés avec des quantités d'eau différentes. Quoique la table qu'il a donnée sur les pesanteurs de ces alcools mixtes ne soit pas de la plus parfaite exactitude, comme elle a servi long-tems, & comme elle sert même encore dans le commerce, il est indispensable de la joindre à cet article. A la vérité, pour la bien concevoir, il faut avoir une connoissance exacte de l'instrument nommé aréomètre ou pèse-liqueur ; car elle est fondée sur la construction d'un pèse-liqueur de l'invention de M. Baumé. On peut lire le mot aréomètre, avant de passer à l'examen de la table suivante : il eût été déplacé de donner ici les détails de l'aréométrie & des aréomètres.

Explication de la table qui contient les résultats des expériences faites sur l'alcool par M. Baumé.

« Dans la première colonne, je désigne les substances que je mets en jeu & que je compare. Ces substances sont de l'alcool rectifié sur de la craie, de l'alcool rectifié sur de la chaux, de l'alcool prodigieusement rectifié (1), de l'alcool ordinaire, mais parfaitement rectifié. Au-dessous de ces substances, & toujours dans la même colonne, je désigne des mélanges d'eau & d'alcool ordinaire, faits en poids. Je commence par deux onces d'alcool sur trente onces d'eau, afin de former deux livres de liqueur, qui est le poids rond le plus approchant de la pinte d'eau, mesure de Paris. Je varie les mélanges, en augmentant la dose de l'un dans la même proportion que je diminue la dose de l'autre, afin d'avoir toujours deux livres de la liqueur. »

« L'alcool & l'eau, pris à des poids égaux, occupent des volumes différens, parce que leur pesanteur spécifique n'est pas la même ; c'est le sujet de la seconde colonne. On y voit que deux

(1) Pour concevoir ce que M. Baumé entendoit par l'alcool prodigieusement rectifié, il faut comparer à ce passage, ce qu'il dit quelques pages auparavant, en parlant de la construction de son pèse-liqueur : « Ayant eu occasion, dit-il, de recueillir beaucoup d'alcool à la fois, j'ai profité de cette circonstance pour m'en procurer qui fût recueilli autant qu'il étoit possible. J'ai distillé 500 pintes d'eau-de-vie, qui donnoient 37 degrés à la température de la glace. Cette quantité a été distillée en quatre fois dans un grand alambic, au bain-marie ; je mettois à part les trente premières pintes qui passaient au commencement de chaque distillation ; j'ai obtenu par conséquent 150 pintes de ce premier alcool. Il donnoit 37 degrés au pèse-liqueur, à la température de la glace. J'ai recueilli ces 150 pintes de premier alcool dans le même alambic, au bain-marie, & j'ai mis à part les trente premières pintes qui ont passé ; cet alcool donnoit encore 37 degrés à la même température. J'ai ensuite recueilli les trente pintes du premier alcool, toujours au bain-marie & sans serpent ; j'ai mis à part les deux premières pintes qui ont passé ; il donnoit 38 degrés. En continuant la distillation, j'ai tiré encore trente pintes, que j'ai mises à part ; il donnoit toujours 38 degrés & c'est cet alcool qui est désigné dans la table, sous le nom d'alcool prodigieusement rectifié. »

M. Baumé ne dit pas qu'il soit nécessaire de se servir de ce procédé pour obtenir de l'alcool aussi rectifié ; il l'a seulement décrit pour faire voir que s'il étoit possible d'avoir un alcool plus sec & plus rectifié, ce procédé le lui eût à-coup-sûr donné ; ainsi, tirant cette expérience, le fort alcool donne 38 degrés, à son pèse-liqueur, au terme de 0 du thermomètre de Réaumur. C'est cet alcool qui, depuis 40 à la température de 10 degrés, &c. & dont on doit se servir dans les expériences exactes de la chimie.

TABLE à l'usage & qui apprend à connoître, dans toutes les températures, laëtre, ou pèse-liqueur de comparaison.

(BAUMÉ, Élémt. de Pharm.)

**MATIÈRES
EMPLOYÉES.**

COMBIEN CES MÉLANGES

chauffés au-dessus de la glace, donnent au pèse-liqueur.

	à 10 degrés.	à 15 degrés.	à 20 degrés.	à 25 degrés.	à 30 degrés.
l'alcool rectifié sur la craie.....	35.....	36.....	37.....	38.....	40 foible...
l'alcool rectifié sur de la chaux.....	36 $\frac{1}{2}$	37.....	38.....	38 fort.....	40.....
l'alcool prodigieusement rectifié.....	40.....	41.....	41.....	43.....	44.....
l'alcool très-rectifié.....	39.....	40.....	41.....	42.....	43.....
l'alcool 2 onces, Eau 30 onces.....	12.....	12.....	12.....	12.....	13.....
l'alcool 4 onces, Eau 28 onces.....	13.....	13.....	13.....	13.....	14.....
l'alcool 6 onces, Eau 26 onces.....	14.....	14.....	14 $\frac{1}{2}$	15 foible...	15 $\frac{1}{2}$
l'alcool 8 onces, Eau 24 onces.....	15.....	15.....	16.....	16 fort.....	17.....
l'alcool 10 onces, Eau 22 onces.....	16 $\frac{1}{2}$	16 $\frac{1}{2}$	17.....	17 $\frac{1}{2}$	18.....
l'alcool 12 onces, Eau 20 onces.....	17 $\frac{1}{2}$	18.....	18.....	19.....	19 $\frac{1}{2}$
l'alcool 14 onces, Eau 18 onces.....	19.....	19 $\frac{1}{2}$	20.....	21.....	21 $\frac{1}{2}$
l'alcool 16 onces, Eau 16 onces.....	20 $\frac{1}{2}$	21.....	22.....	23.....	23.....
l'alcool 18 onces, Eau 14 onces.....	21 $\frac{1}{2}$	23.....	24.....	25.....	25.....
l'alcool 20 onces, Eau 12 onces.....	24.....	25.....	26.....	27.....	28.....
l'alcool 22 onces, Eau 10 onces.....	26.....	27.....	28.....	29.....	29.....
l'alcool 24 onces, Eau 8 onces.....	28 $\frac{1}{2}$	29 $\frac{1}{2}$	30.....	31.....	31 $\frac{1}{2}$
l'alcool 26 onces, Eau 6 onces.....	30 $\frac{1}{2}$	32.....	33.....	34.....	34.....
l'alcool 28 onces, Eau 4 onces.....	33.....	34.....	35.....	36.....	37 foible...
l'alcool 30 onces, Eau 2 onces.....	35.....	37.....	38.....	39.....	39 $\frac{1}{2}$

Nota. L'alcool qui est

onces d'alcool, par exemple, occupent la place & le volume de quatre onces six gros d'eau, & ainsi de suite des autres articles. La première colonne indique le poids de l'alcool qui est employé dans les expériences, & la seconde indique le volume qu'il occupe, comparé à celui d'un pareil poids d'eau ».

« La troisième colonne indique le volume total de l'eau & de l'alcool versés l'un sur l'autre, & avant qu'ils soient mélangés; il est nécessairement égal au volume des deux liquides pris séparément ».

« Mais si l'on vient à agiter ces liqueurs, l'alcool & l'eau se mêlent & se combinent; ces liqueurs se pénètrent mutuellement, & le volume restant est moindre qu'il n'étoit avant le mélange ».

« La quatrième colonne désigne le volume qu'ont ces liqueurs après leur parfait mélange ».

« La cinquième colonne fait voir de combien ces liqueurs se font pénétrées, ou plutôt de combien leur volume est diminué. Il est bon de faire remarquer que la loi de cette pénétration n'est nullement régulière, du moins elle ne suit aucun ordre qui soit facile à saisir. Si l'on emploie, pour ces expériences, un alcool moins rectifié que celui que j'ai employé, on aura des résultats un peu différents, mais qui ne seront pas plus réguliers, & la loi de la pénétration n'en sera pas plus facile à saisir ».

« J'ai fait refroidir, au terme de la glace, l'alcool & l'eau, avant de les employer pour mes expériences, afin d'avoir un terme fixe; néanmoins les liqueurs s'échauffent lorsqu'on les mêle; les degrés de la chaleur qui se produit sont rapportés dans la sixième colonne: il s'ensuit que les mélanges de 8, 10, 12 & 14 onces d'alcool, fut 24, 22, 20 & 18 onces d'eau, donnent le même degré de chaleur, & que les mélanges ou la grande quantité d'eau diminue, donnent moins de chaleur. Il en est de même lorsqu'elle augmente. Cette loi est à-peu-près uniforme; ce qui est fort remarquable ».

« Après avoir examiné les mélanges désignés dans la première colonne de la table, & après avoir fait note de leurs propriétés dans les cinq colonnes suivantes, j'ai reconnu ensuite les degrés que ces mélanges donnent à mon pèse-liqueur, & j'ai comparé ces mélanges à plusieurs bons alcools rectifiés de différentes manières; ils sont tous désignés au commencement de la première colonne. Mais pour procéder avec ordre à ces expériences, j'ai commencé par faire refroidir, à quinze degrés au-dessous du terme de la congélation, ces différents alcools, & les mélanges d'eau & d'alcool; & après les avoir examinés dans cet état, je les ai successivement réchauffés de cinq degrés en cinq degrés: je me suis arrêté à trente degrés au-dessus du terme de la glace. Je les ai pareillement examinés dans ces différents états; les résultats de ces expériences sont rap-

chimie. Tome II.

portés dans les dix dernières colonnes. Quinze degrés au-dessous de la glace, & trente degrés au-dessus de la congélation, sont les deux extrêmes de froid & de chaud que nous éprouvons dans ce climat; ce qui fait dans la température une différence de quarante-cinq degrés au thermomètre de Réaumur, & sur les bons alcools, une différence de huit à neuf degrés à mon pèse-liqueur. L'alcool qui est chauffé à vingt-cinq & à trente degrés au-dessus de la glace, est en évaporation bien visible par les vapeurs qui s'en élèvent, surtout lorsqu'on opère dans une température où l'on est près de la congélation ».

« Il résulte de ces expériences, 1°. que plus l'alcool tient de la nature de l'eau, moins il est susceptible d'éprouver des variations de la part de la température de l'air; & qu'au contraire, plus il est riche en esprit, plus il se rarefie par la chaleur, plus il perd de sa pesanteur spécifique, & plus il donne de degrés au pèse-liqueur; mais il suit une progression bien commode, en ce qu'il n'augmente que d'un degré au pèse-liqueur, pour cinq degrés d'augmentation du chaleur dans l'atmosphère ».

« 2°. On commerce les eaux-de-vie dans les différentes températures; si on les commerce toujours au même degré du pèse-liqueur, il est certain que l'acheteur seroit trompé en été, & à son tour, le vendeur le seroit en hiver. Il y a telle eau-de-vie où l'erreur seroit d'environ un tiers, & d'autre où elle seroit d'environ un quart. Par exemple, on voit par cette table qu'une eau-de-vie composée de douze onces d'alcool & de vingt onces d'eau, donne dix-neuf degrés & demi au pèse-liqueur, la température à trente degrés au-dessus de la glace; & qu'une eau-de-vie beaucoup plus forte, composée de vingt onces d'alcool & de douze onces d'eau, donne au pèse-liqueur vingt degrés, lorsque la température est de quinze degrés au-dessous de la glace ».

« Il en est de même d'une eau-de-vie composée de vingt-quatre onces d'alcool & de huit onces d'eau, & de celle qui contient trente onces d'alcool & deux onces d'eau: la première donne trente-un degrés & demi, lorsque le thermomètre est à trente degrés au-dessus de la glace; & la seconde donne trente-un degrés trois-quarts, lorsque le thermomètre est à quinze degrés au-dessous de la glace. Au reste, il est nécessaire de faire remarquer que les mélanges, qui dans la table sont marqués avoir gelé, ne l'étoient pas en entier, en sorte qu'il restoit assez de liqueur pour qu'on pût l'examiner à l'aréomètre ».

« Au moyen de mon pèse-liqueur & de ma table, on saura dorénavant à quoi s'en tenir sur la qualité des eaux-de-vie & des alcools, soit pour la physique, soit pour le commerce: l'acheteur & le vendeur connoîtront avec certitude, l'un ce qu'il achète, & l'autre ce qu'il vend ».

K

§. III. Des propriétés, des attractions chimiques, & des combinaisons de l'alcool.

L'alcool pur obtenu & rectifié par les procédés qui ont été décrits dans le paragraphe précédent, est un fluide très-transparent, très-mobile, très-léger, qui pèse 6 gros 48 grains dans une bouteille qui tient une once d'eau distillée. Son odeur est pénétrante & agréable, sa saveur est vive & chaude : l'une & l'autre sont particulières & vraiment caractéristiques.

Il est extrêmement volatil. Lorsqu'on le chauffe même légèrement dans des vaisseaux fermés, il s'élève & passe sans altération dans les récipients : il se sépare du peu d'eau qu'il pourroit contenir. C'est pour cela que les premières portions obtenues dans la rectification de l'alcool, sont les plus suaves, les plus volatiles & les plus pures ; aussi employoit-on autrefois des alambics à col très-élevé, dans l'intention de n'obtenir vers le haut que la portion la plus spiritueuse. On croyoit il n'y a pas long-temps, que, dans la distillation de l'alcool, il se dégageroit toujours une grande quantité d'air : on fait aujourd'hui que c'est l'alcool lui-même qui se sépare & qui se volatilise dans l'état de gaz, & qui conserve cet état à une température donnée. On s'exprime aujourd'hui pour cette tendance de l'alcool à prendre la forme gazeuse, d'une manière très-simple & très-exacte, en disant qu'à la pression la plus ordinaire de l'atmosphère, c'est-à-dire à 28 pouces du baromètre, & 64 degrés de température, l'alcool prend la forme de fluide élastique. Ainsi en mettant une couche de quelques lignes de cette liqueur dans une cloche de verre au-dessus du mercure, & en suspendant cette cloche dans un vase couvert de quelques lignes de mercure, & assez grand pour recevoir toute la quantité de ce fluide contenu dans la cloche, si l'on plonge tout l'appareil soutenu en position par des fils de fer, dans un bain d'eau salée assez chaude pour lui communiquer les 64 degrés d'élévation de température, on voit tout-à-coup l'alcool se dilater, devenir gazeux & invisible, comprimer le mercure, & le forcer de descendre dans le vase qui supporte la cloche ; tant que la température reste élevée à 64 degrés, l'alcool conserve la forme de fluide élastique ; mais dès que l'air extérieur ou le contact d'un corps froid quelconque, lui enlève du calorique, il perd tout-à-coup cette forme, & redevient liquide. La pression de l'air fait varier dans l'alcool cette propriété de devenir gazeux ; ainsi sur les hauteurs, l'alcool se vaporise beaucoup plus vite, ainsi que sous le récipient d'une machine pneumatique ; il est tout-à-coup réduit en vapeur au-dessous de 28 pouces de mercure dans la partie vide du baromètre.

M. Priestley, en faisant passer de l'alcool dans un tube d'argile rougi au feu, en a retiré du gaz hydrogène mêlé de gaz acide carbonique ; M. Lan-

delani a remarqué que dans cette opération, le tube étoit enduit d'une matière charbonneuse. En exposant de l'alcool à l'action de l'étincelle électrique, M. Priestley l'a vu se réduire aussi en gaz hydrogène. Ces faits annoncent que l'alcool éprouve une décomposition par une haute température.

Lorsqu'on chauffe l'alcool avec le contact de l'air, il s'allume bientôt, & présente une flamme légère, blanche dans le milieu, & bleue sur les bords ; il brûle ainsi sans laisser aucun résidu, lorsqu'il est bien déseigné : le choc d'éclatrine l'allume également. Plusieurs chimistes ont essayé de savoir ce que donne l'alcool en brûlant. Ils se sont assurés que la flamme n'est accompagnée d'aucune suite ni d'aucune fumée, & qu'en recevant ce qui est volatilisé, on n'obtient que de l'eau pure, invisible, inodore & absolument dans l'état d'eau distillée. Boerhaave pensoit, d'après ce phénomène, que la flamme étoit due à l'eau, & cette opinion est confirmée aujourd'hui par toutes les découvertes faites sur le gaz hydrogène provenant de la décomposition de l'eau, & sur l'eau qu'on obtient en brûlant ce même gaz avec l'air vital. En brûlant de l'alcool dans une cheminée propre à en recueillir les vapeurs, M. Lavoisier a trouvé que l'on obtient plus d'eau que l'on n'emploie d'alcool ; ce qui prouve que ce liquide contient une grande quantité d'hydrogène ; d'un autre côté, M. Berthollet a démontré que lorsque l'on fait brûler un mélange d'alcool & d'eau, le fluide résidu précipite l'eau de chaux ; cette expérience annonce que l'alcool contient du carbone qui, par sa combustion ou sa combinaison avec l'oxygène, forme de l'acide carbonique.

La manière dont M. Lavoisier a opéré la combustion de l'alcool, exige quelques détails qui peuvent intéresser la marche de la science. Ayant d'abord employé le même appareil que pour brûler le charbon, le phosphore, c'est-à-dire, une cloche pleine d'air ordinaire placée sur le mercure, & sous laquelle il mettoit une lampe remplie d'alcool dont la mèche portoit un petit morceau de phosphore pour pouvoir l'allumer à l'aide du fer rouge recourbé porté à travers le mercure, (Voyez la description des appareils propres à la combustion, au mot COMBUSTION.) il a trouvé que cette manière d'opérer étoit susceptible de beaucoup d'inconvénients ; il seroit fuyant lui, imprudent d'employer de l'air vital par la crainte de la détonation qui auroit lieu en raison de l'évaporation de l'alcool ; ce risque est encore à craindre en employant de l'air atmosphérique, & M. Lavoisier en a fait une épreuve qui a manqué lui devenir funeste, parce que l'alcool disposé de la veille avoit pris en partie la forme de gaz, & s'étoit dissous dans l'air. En modifiant l'expérience par rapport à la quantité d'air, M. Lavoisier est parvenu à brûler en différentes fois assez d'alcool pour recueillir le produit de sa combustion, & établir des résultats assez exacts sur sa nature.

On trouve dans le premier volume de ce dictionnaire, article AIR, pag. 723, 724 & 725, la description détaillée de cette belle expérience. Nous n'en retracerons ici que les résultats qui appartiennent à l'histoire de l'alcool. Cette liqueur paroît être composée d'après les produits de la combustion obtenus en eau & en acide carbonique, de 28 parties & demie environ de carbone, de près de 3 parties d'hydrogène, & de 63 parties d'eau toute formée : en comparant ce résultat avec celui de la fermentation vineuse & de la conversion de sucre en alcool, on ne trouvera pas un rapport exact dans l'un & l'autre ; mais on doit savoir qu'il n'a encore été permis d'avoir que des à-peu-près sur ces expériences, & qu'il manque encore plusieurs connoissances pour les rendre aussi positives qu'on le desire ; la seule conclusion importante qu'on peut tirer de ces faits, c'est qu'on a plus de connoissances sur la nature de l'alcool, qu'on n'en avoit autrefois. Au reste les chimistes ont adopté différentes opinions dans différents tems sur cette nature de l'alcool. Stahl, Boerhaave & plusieurs autres, ont regardé ce fluide comme composé d'une bulle très-tendue, d'un acide atténué, & d'eau. Il seroit donc, suivant cette opinion, une sorte de savon acide. D'autres, à la tête desquels on doit placer Cattheuser & Macquer, pensent que l'alcool est formé de l'union du phlogistique avec l'eau. On voit combien ces opinions s'écartoient de la vérité, mais il étoit bien difficile de s'en rapprocher à l'époque où elles ont été conçues. On ne savoit rien alors sur les premiers principes constituans des corps, & sur-tout des composés végétaux : on n'avoit nulle idée du carbone pur, & spécialement de l'hydrogène & de l'oxygène. On en avoit créé d'imaginaires, on s'étoit fait des méthodes fausses, des raisonnemens, des systèmes & des hypothèses que l'expérience a renversés. Voyez les mots PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES, PHLOGISTIQUE.

L'alcool exposé à l'air, s'évapore à une température de 10 degrés au-dessus de la glace, & il ne laisse aucune espèce de résidu, si ce n'est un peu d'eau, lorsqu'il n'est pas très-détrempé. Cette évaporation à l'air est d'autant plus rapide, que l'atmosphère est plus chaude : elle produit un froid plus ou moins fort suivant sa rapidité ; c'est pour cela qu'en se frottant les mains d'alcool bien rectifié, & en les agitant dans l'air, on éprouve un froid considérable. Les médecins peuvent tirer un grand parti de cette observation. Quand l'alcool bien rectifié est exposé à l'air froid ou à la température de quelques degrés au-dessus de 0, il en absorbe l'humidité, & il s'affoiblit sensiblement.

L'alcool s'unit à l'eau en toutes proportions, & il est parfaitement dissoluble. Pendant cette union il se dégage du calorique & de l'air ; les liqueurs se pénétrant réciproquement, & elles occupent bientôt moins d'espace qu'elles n'en occupoient auparavant ; aussi la pesanteur spéci-

fique qu'acquiert cette liqueur mixte, ne répond point à celle que l'alcool indique, d'après la pesanteur particulière à chaque liquide. Cette combinaison d'alcool & d'eau forme des espèces d'eau-de-vie factices, d'autant plus fortes que l'alcool y est en plus grande quantité, mais qui diffèrent de l'eau de vie naturelle par l'absence de l'huile ; aussi l'eau-de-vie artificielle, faite par l'union de l'alcool & de l'eau, n'a-t-elle pas le caractère onctueux & savonneux de la naturelle. Celle-ci, quand on l'agite, moussé à la manière d'une légère eau de savon, ses bulles restent quelque temps après l'agitation à la surface sous la forme d'une espèce d'écume ; au contraire, l'eau-de-vie factice perd tout-à-coup, après la cessation du mouvement qu'on lui communique, les bulles qui s'en étoient élevées & qui se biffent très-promptement. Ce phénomène, produit par l'agitation, porte le nom d'épreuve hollandaise.

L'affinité de combinaison entre l'alcool & l'eau est si forte, que l'eau est capable de séparer de l'alcool plusieurs corps qui lui sont unis, & que réciproquement l'alcool décompose les plus des dissolutions salines & en précipite les sels. C'est d'après cette dernière propriété que Boulduc a proposé de se servir d'alcool pour précipiter les sels contenus dans les eaux minérales, & pour les obtenir sans altération ; mais Boulduc ne savoit pas que les sels déliquescens étoient dissolubles dans l'alcool.

L'alcool n'a point d'action sur les terres pures, sur la silice & l'alumine, elles ne s'y combinent point & ne changent point l'attraction de ses principes : on ne fait point s'il seroit altéré par la baryte & la magnésie. La chaux paroît susceptible de lui faire éprouver quelque changement, puisque lorsqu'on distille l'alcool sur cette substance salino-terreuse, ce fluide prend une légère odeur particulière ; mais on n'a pas assez suivi cette altération. Les auteurs qui ont recommandé de rectifier l'alcool sur la chaux, l'avoient fait dans l'intention d'enlever l'huile qu'ils admettoient dans l'alcool impur, mais ils n'ont pas indiqué l'altération qu'il éprouve & la diminution qu'il paroît supporter. M. Baumé en a fait mention dans ses *éléments de pharmacie* ; mais il ne s'est point convenablement expliqué sur cet objet. Cependant c'est une des expériences qu'il seroit le plus important de faire avec soin, pour savoir ce qui arrive à la terre calcaire, & déterminer si l'on ne pourroit pas par-là découvrir sa nature. Par exemple, si l'on obtenoit de l'ammoniaque de cette combinaison, on pourroit en conclure que l'azote est un des principes de la chaux, & peut-être même trouver à quelle matière l'azote y est uni. Ainsi cette combinaison de l'alcool avec la chaux est une de celles qui méritent le plus d'être examinées avec soin.

Les alcalis fixes purs, la potasse & la soude caustiques, sont dissolubles dans l'alcool ; c'est

en raison de cette dissolubilité que M. Berthollet a donné un procédé pour obtenir les alcalis dans un grand état de pureté, parce que les sels neutres qu'ils peuvent contenir, & spécialement leurs portions combinées avec l'acide carbonique ne se combinent point avec l'alcool. Ces dissolutions sont d'un rouge foncé; quand elles sont très-épaisses & très-saturées, elles laissent déposer une partie des alcalis sous une forme cristalline. Voyez les articles ALCALIS, POTASSE & SOUDE, où les opérations relatives à la purification de ces sels sont décrites en détail.

La couleur rouge que prend l'alcool dans ces dissolutions, paroît indiquer que les alcalis fixes décomposent réellement l'alcool: on acquiert la même preuve en examinant la préparation connue en pharmacie, sous le nom de *Teinture acre de tartre*, qui n'est qu'une dissolution de potasse dans l'alcool. Pour préparer ce médicament, on fait fondre de la potasse dans un creuset; on la pulvérise toute chaude; on la met dans un matras; on verse de l'alcool très-déshégmé, trois ou quatre travers de doigts au-dessus du sel; on bouche le matras avec un autre plus petit; on le lute ensemble, & on fait digérer le tout au bain de sable jusqu'à ce que l'alcool ait acquis une couleur rougeâtre. Il reste plus ou moins de carbonate de potasse & de sels indissolubles au fond du vaisseau. En distillant la teinture acre de tartre, on obtient un alcool d'une odeur suave, peu altéré, & la cornue offre une matière semblable à un extrait savonneux, qui distillée elle-même à feu nud, fournit de l'alcool altéré, un produit stérile que quelques chimistes ont cru être de l'ammoniaque & une huile empyreumatique légère: il reste après cette opération un peu de charbon, dans lequel on retrouve de la potasse. Cette expérience semble démontrer que l'alcool contient une huile dont l'alcali fixe s'empare, & avec laquelle il forme une sorte de savon, ou mieux que dans la réaction de la potasse & de l'alcool, celui-ci éprouve une modification dans ses principes qui produit une espèce d'huile; mais c'est à la génération de l'ammoniaque qu'on reconnoît encore mieux la décomposition que paroît éprouver & l'alcool & la potasse. On ne peut méconnoître ici une séparation de l'hydrogène de l'alcool & une union intime avec l'azote. Ce dernier principe ne peut être fourni que par l'alcali fixe, car aucune expérience n'en démontre l'existence dans l'alcool: mais il manque à cet essai la suite de tentatives & de recherches qui peuvent seules affirmer l'induction qui paroît en découler naturellement. Quelques chimistes ne sont pas encore persuadés qu'il se forme, & qu'on obtienne de l'ammoniaque dans la distillation de l'alcool de potasse, car c'est ainsi que doit être nommée la *teinture acre de tartre*. Il faudroit donc répéter avec un grand soin cette expérience, choisir de la potasse

bien pure, préparée à la manière de M. Berthollet, la dissoudre dans l'alcool très-rectifié; distiller avec une grande exactitude cette dissolution; arrêter cette distillation à différentes époques; examiner le premier produit comparé à ce qu'étoit l'alcool avant cette distillation; voir dans quel état est le résidu épais d'abord en extrait sec; poursuivre l'action du feu sur ce dernier; rechercher avec toutes les précautions requises si l'on en obtient véritablement de l'ammoniaque; en déterminer la quantité; recueillir avec un soin égal les fluides élastiques qui se dégagent pendant cette distillation; analyser par tous les moyens connus, le résidu de cette opération lorsqu'il ne fournirait plus rien de volatil au plus grand feu qu'il puisse supporter: par cette analyse on aurait certainement une connoissance plus exacte, soit de l'alcool, soit de la potasse; on la feroit également sur la soude, & l'on parviendrait peut-être par-là à découvrir la différence de ces deux alcalis fixes: au moins c'est une des recherches chimiques qui conduiroient le plus directement à ce résultat, & il est bien important que l'on s'en occupe incessamment.

Le *Litium de Paracelse* ne diffère de la teinture acre de tartre, que parce que l'alcali fixe qu'on emploie pour le préparer, paroît avoir été mis dans un état de causticité par la forte chaleur qu'on lui fait éprouver en le traitant avec les oxides métalliques. Pour préparer ce médicament on fait fondre ensemble les *régules d'antimoine martial, jovial & de vénius*; c'est-à-dire, l'antimoine uni séparément au fer, à l'étain & au cuivre, à la dose de quatre onces de chaque; on les réduit en poudre, on les fait détonner avec dix-huit onces de nitre & autant de tartre; on pousse à la fonte; on pulvérise ce mélange; on le met dans un matras, & on verse par-dessus de l'alcool bien déshégmé, jusqu'à ce qu'il surpasse de trois ou quatre travers de doigt. Ce mélange, mis en digestion sur un bain de sable, prend une belle couleur rouge plus foncée que celle de la teinture acre de tartre, parce que l'alcool y tient en dissolution plus de potasse; & en effet, on peut faire la *teinture acre de tartre* entièrement semblable au *Litium de paracelse*, en faisant digérer l'alcool sur l'alcali fixe caustique, au lieu de feu servir de sel fixe de tartre, que l'action du feu ne prive pas entièrement d'acide carbonique, à moins qu'on ne le tienne rouge pendant longtemps. M. Berthollet s'est assuré que ces teintures ne sont que des dissolutions de potasse caustique dans l'alcool, & qu'elles fournissent un moyen utile d'obtenir cet alcali très-pur, en le séparant par l'évaporation, comme nous l'avons indiqué plus haut & décrit en détail aux mots POTASSE & SOUDE. La *teinture acre de tartre* & le *litium* sont de très-bons toniques & de puissans toniques; on les emploie dans tous les cas où les forces des malades ne sont point suffisantes pour

favoriser les crises, comme dans la fièvre maligne, les petites vérolés de mauvais caractère, &c.

Il n'est pas besoin de dire que l'alcool a sur la foudre une action égale à celle qu'il exerce sur la potasse, qu'il la dissout quand elle est pure & bien caustique; qu'il en sépare la portion de carbonate de soude & les autres sels neutres, ainsi que les terres, & sur-tout la chaux, contenues ordinairement dans cet alcali; qu'il est employé avec avantage pour obtenir la foudre pure; qu'on pourroit se servir de l'alcool de foudre comme de l'alcool de potasse ou *reinture acide de terre*, dans la médecine, & que la réaction réciproque de l'alcool & de la foudre mérite autant d'être examinée avec soin que celle de la potasse, puisque c'est un des moyens d'analyse que l'on peut employer avec le plus d'avantages, & qui doit jeter le plus grand jour sur la nature des alcalis. Nous ajouterons, à ce que nous avons dit précédemment sur cet objet, qu'il n'est pas démontré qu'il y ait formation d'ammoniac, mais qu'il y a une séparation de carbone & un passage de l'alcool à l'état huileux: voilà pour quoi le résidu a les caractères d'un savon.

On n'a point encore bien examiné l'action de l'ammoniac caustique sur l'alcool: il paroît qu'il se passe entre ces deux corps une action intime qui tient à leur nature, & qui ne semble pas indiquer une décomposition réciproque: quand on mêle de l'alcool avec de l'ammoniac pure ou de l'alcali volatil caustique, il se produit une chaleur vive; ces deux matières se pénètrent réciproquement, & il se dégage une odeur mixte très-forte en raison des deux corps volatilisés en même temps.

Les acides présentent, dans leur action sur l'alcool, des phénomènes fort importants à observer: leur effet général est de le convertir en éther par une décomposition réciproque. L'orsqu'on verse de l'acide sulfurique bien concentré sur partie égale d'alcool rectifié, il se produit une chaleur & un sifflement remarquables; ces deux substances se colorent, & il se dégage en même temps une odeur suave, comparable à celle du citron ou des pommes de reinette. Si l'on place la cornue, dans laquelle on fait ordinairement ce mélange sur un bain de sable échauffé, & qu'on y adapte deux grands ballons dont le premier plonge dans une terrine pleine d'eau froide, on obtient: 1°. un alcool d'une odeur suave; 2°. une liqueur nommée *éther*, d'une odeur aromatique, d'une volatilité extrême, & dont la présence est annoncée par l'ébullition de la liqueur contenue dans la cornue, & par les grosses bulles huileuses qui filonnent la voûte de ce vaisseau: on a soin de rafraîchir la partie supérieure du ballon qui le reçoit avec des linges mouillés, 3°. après l'éther il passe de l'acide sulfurique, dont la couleur blanche & l'odeur avertisseur qu'on doit diluter le ballon pour avoir l'éther séparé; 4°. il

se volatilise en même temps une huile légère, jaunâtre, qu'on appelle *huile douce du vin*. On doit modérer beaucoup le feu après que l'éther est passé, parce que la matière dans la cornue est noire, épaisse, & se boursofle considérablement; 5°. lorsque l'huile douce est toute distillée, il passe encore de l'acide sulfurique qui devient de plus en plus épais, & n'est plus à la fin que de l'acide sulfurique noir & sale; 6°. en continuant cette opération par un feu doux, on parvient à dessécher entièrement le résidu, & à lui donner la forme & la consistance bitumineuse. On en retire une liqueur acide & une substance sèche & jaunâtre qui est de véritable soufre, en exprimant ce bitume à un feu très-fort. M. Baumé, qui a fait une grande suite de travaux sur l'éther sulfurique, a examiné ce résidu avec beaucoup de soin; il y a trouvé du sulfate de fer, du bleu de Prusse ou prussiate de fer, une substance saline & une terre particulière, dont il n'a point déterminé la nature: il assure même que le sulfisme jaunâtre qu'il fournit n'est point du soufre, & qu'il reste blanc & pulvérulent sans s'enflammer sur les charbons. Nous ajouterons à ces détails sur la préparation de l'éther, que le résidu liquide de l'éther, c'est-à-dire, le mélange d'alcool & d'acide sulfurique d'où on a retiré l'éther, peut retourner de nouvel éther, par l'addition d'alcool & par une seconde distillation. On peut même répéter plusieurs fois ces distillations sur le premier résidu auquel on ajoute à chaque fois de l'alcool, & retirer ainsi d'un mélange de six livres d'acide sulfurique & d'alcool, auquel on ajoute successivement quinze livres de ce dernier fluide, plus de dix livres de bon éther. Ce procédé, aussi ingénieux qu'économique, est dû à M. Cadet, de l'Académie des sciences.

L'opération que nous venons de décrire est une des plus singulières que la chimie fournisse par les phénomènes qu'elle présente, & en même temps une des plus importantes par les lumières qu'elle peut répandre sur la composition de l'alcool. Avant les dernières découvertes des chimistes, on a eu, sur la formation de l'éther, deux opinions qu'il est nécessaire de faire connoître. Macquer, en regardant l'alcool comme un composé d'eau & de *phlogistique*, pensa que l'acide sulfurique enlève l'eau de cette substance, & la rapproche de plus en plus des caractères de l'huile. Ainsi, suivant cette opinion, il passe d'abord de l'alcool peu altéré, ensuite un fluide qui tient le milieu entre l'alcool & l'huile, qui est l'éther, & enfin une véritable huile, parce que l'acide sulfurique agit avec d'autant plus d'énergie sur les principes de l'alcool, que la chaleur employée pour obtenir l'éther est plus forte. Pucquer, frappé d'une objection qu'il avoit faite à cette théorie, sur ce qu'il étoit difficile de concevoir comment l'acide sulfurique, chargé dès le commencement de son action sur l'alcool d'une cer-

taine quantité d'eau qu'il avoit enlevée à ce fluide, pouvoit, quoique flegmatique & devenant de plus en plus foible, réagir assez sur une autre portion du même alcool pour le mettre dans l'état huileux, & propoſe une autre opinion ſur la production de l'éther; il regardoit l'alcool comme un fluide composé d'huile, d'acide & d'eau; il penſoit que lorsqu'on mêloit de l'acide ſulſurique à l'alcool, il réſultoit de ce mélange une ſorte de fluide bitumineux qui ſourniſſoit par la diſtillation les mêmes principes que tous les bitumes, c'eſt-à-dire, une huile légère, très-odorante, très-combuſtible, une eſpèce de naphte qui étoit l'éther, & enſuite une huile moins volatile & plus colorée que la première, qui étoit l'huile douce du vin; on verra en effet par les propriétés de l'éther, que nous allons examiner, que ce fluide a tous les caractères d'une huile très-tendue, & telle que la naphte; mais cette théorie qui pouvoit ſuffire & ſatisfaire les chimistes il y a vingt-ans, lorsqu'elle a été préſentée par son auteur, eſt bien loin de remplir le vœu des phyſiciens modernes: il paroît que dans cette opération l'oxygène eſt enlevé à l'acide ſulſurique par l'hydrogène de l'alcool, qu'une partie de l'hydrogène, principe de ce dernier, forme de l'eau avec cet oxygène, & que l'alcool, privé de cette portion d'hydrogène; conſtitue l'éther. Mais outre que tout ce qui ſe paſſe dans cette opération n'eſt pas encore entièrement connu, on ne peut diſcutter cette théorie ſur la formation de l'éther, qu'après avoir examiné en détail les propriétés de cette liqueur, & même après avoir déterminé l'action des autres acides ſur l'alcool: nous devons donc traiter ces deux objets, & remettre la diſcuſſion ſur la théorie de l'éthorification après l'expoſé des faits relatifs à ce phénomène.

L'éther ſulſurique, obtenu par le procédé que nous avons décrit, n'eſt pas très-pur après la première opération, il eſt uni à de l'alcool & à de l'acide ſulſureux; pour le rectifier, on a coutume de le diſtiller dans une cornue au bain de ſable & même au bain de lampe, & en ajoutant de l'alcali fixe ordinaire; ce ſel ſe combine avec l'acide ſulſureux. Mais l'emploi de l'alcali dans cette rectification a un inconvénient qu'on n'a point eſt connu. L'alcali dont on ſe ſert ordinairement eſt celui qui provient du ſtare brûlé; la poſſaſſe y eſt en partie cauſtinue & en partie à l'état de carbonate de poſſaſſe: cette dernière portion fait une violente effervescence avec l'acide ſulſureux contenu dans l'éther non rectifié, & l'acide carbonique qui ſe dégage, emporte avec lui une très-grande quantité d'éther qui eſt perdu. Pour remédier à cet accident, nous rectifions l'éther ſulſurique, par l'addition de la chaux éteinte à l'air, & nous diſtillons à la chaleur douce d'une ſimple lampe: l'éther paſſe très-pur par ce procédé ſimple & peu diſpendieux.

Si l'on ſépère la première moitié de ce produit, on obtient l'éther le plus pur & le plus rectifié; on voit ſouvent quelques gouttes d'huile nager ſur la liqueur du réſidu.

L'éther eſt un fluide plus léger que l'alcool, d'une odeur forte, ſuave & très-expandible, d'une ſaveur chaude & piquante: il eſt li volatil, qu'en le verſant & en l'agitant, il ſe diſſipe en un inſtant; il produit dans ſon évaporation un froid tel qu'il peut faire geler l'eau, comme M. Baumé l'a démontré par ſes belles expériences. Il ſe réduit en une ſorte de gaz éſtéré qui brûle avec rapidité, & qui remplit de flamme la partie de l'atmosphère dans laquelle il eſt diſſous. La diminution de la preſſion de l'air favoriſe ſingulièrement l'évaporation de l'éther; à 15 cens toifes au-deſſus du niveau de la mer, il ſe réduit très-promptement en vapeur, comme l'ont prouvé MM. Saufure & Lamonon. On ſe le réſervoir d'une machine pneumatique, on le voit, dès les premiers coups de piſton, entrer en ébullition & diſparoitre en formant un fluide élaſtique. L'air même, avec ſa poſſanté la plus forte & à une température froide, diſſout l'éther: avec une grande énergie; il ſuſſit, comme on le ſait dans les expériences de phyſique, de jeter quelques gouttes d'éther dans une bouteille du ſer blanc, pour que l'air, qui ſ'en imprègne par la plus légère agitation, devienne très-inflammable, & produiſe une détonation par l'éſcincelle électrique; c'eſt un des procédés que l'on emploie pour l'expérience du piſtolet de Volta. L'air qui tient de l'éther en diſſolution peut paſſer à travers l'eau, ſans ceſſer d'être inflammable & odorant, ce qui prouve que ce produit volatil eſt fort adhérent à l'air atmosphérique.

L'éther ſ'allume très-facilement, dès qu'on le chauffe à l'air libre, ou qu'on en approche un corps enflammé; l'éſcincelle électrique l'allume de même; il répand en brûlant une flamme blanche fort lumineuſe, & il laſſe une trace noire, comme le charbonneſe, à la ſurface des corps que l'on expoſe à ſa flamme. M. Lavoifier a conſtaté qu'il ſe forme de l'acide carbonique pendant la combustion de cette liqueur; mais il n'a pas encore pu réuſſir à obtenir un réſultat exact dans les produits de la combustion de l'éther, par la difficulté de conſtituer un appareil capable de les recueillir. Cette difficulté conſiſte en ce qu'il faut une grande quantité d'air pour brûler complètement l'éther, & dans ce que la flamme qu'il ſorme à l'extrémité d'une lampe eſt à légère, qu'elle ſe détache par la moindre agitation de l'air qu'en fait arriver dans les cloches. Voyez les mots COMBUSTION, APPAREILS, LAMPES, &c. M. Scheele a découvert que le réſidu de l'éther brûlé ſur un peu d'eau, contient de l'acide ſulſurique; & il a aſſuré, d'après cela, que l'éther recèle toujours une portion de l'acide qui ſa ſervi à le former.

L'éther ſe diſſout dans dix parties d'eau, ſui-

vant M. de Laurus. Autrefois on ne connoissoit point cette dissolubilité de l'éther dans l'eau ; & comme on voyoit l'éther mis en assez grand volume sur l'eau , y rester sans apparence de combinaison & à la manière de l'huile , on croyoit que ces deux corps ne s'unissoient point , & on les laissoit toujours en contact l'un avec l'autre : aujourd'hui on ne comment plus cette faute.

On n'a point encore examiné en détail les phénomènes que l'éther est susceptible de présenter avec toutes les substances salines : on ne connoit bien que l'action de quelques acides sur cette liqueur. La chaux & les alcalis fixes ne paroissent point susceptibles de l'altérer. L'ammoniaque caustique s'y mêle en toutes proportions , & elle forme une matière dont l'odeur mixte pourroit être très-utile dans les asphixies & les maladies spasmodiques. L'acide sulfurique s'échauffe beaucoup avec l'éther , & il peut en convertir une bonne partie en huile douce du vin par la distillation. L'acide nitreux fumant , y excite une effervescence considérable ; & l'éther semble devenir plus consistant , plus coloré & plus huileux dans cette expérience. Mêlé avec la dissolution muriatique d'or , il retient une partie de ce métal , & semble agir alors comme les huiles volatiles qui séparent également une portion d'oxide d'or , en le rapprochant de l'état métallique. On n'a point encore examiné la dissolubilité des sels neutres ou moyens dans l'éther : le plus grand nombre , à la vérité , ne se dissout point dans cette liqueur ; mais les sels déliquescents paroissent susceptibles de s'y combiner en certaines proportions. Plusieurs sels métalliques s'y unissent , & sur-tout le muriate de mercure corrosif & le nitrate de mercure , dont il retient une partie , quoiqu'il s'en précipite la plus grande portion.

L'éther se combine facilement aux huiles distillées des bitumes , à la naphte , au pétrole : il dissout aussi le savon ; il s'unit aussi aux huiles volatiles & aux résines plus facilement que l'alcool , & les médecins employent souvent des teintures éthérées.

L'éther est regardé , en médecine , comme un tonique puissant , & comme un très-bon antispasmodique : on l'emploie dans les accès hystériques , dans les coliques spasmodiques ; il s'oppose promptement aux vices de la digestion qui ont pour cause la foiblesse de l'estomac : on ne doit l'administrer qu'avec prudence , parce qu'on sait que son usage excessif est dangereux : on s'en sert encore avec succès à l'extérieur , dans les douleurs de tête , dans les brûlures , &c. Il est bien prouvé qu'à la température ordinaire du corps humain , l'éther prend & conserve la forme de fluide élastique : cette considération mérite toute l'attention des médecins ; elle a été présentée avec toute l'étendue qu'elle mérite , dans le dictionnaire de médecine , au mot *ETHER*. Hoffman , qui s'est beaucoup occupé des combinaisons de

l'alcool avec l'acide sulfurique , se servoit d'un médicament composé d'huile douce du vin , dissoute dans l'alcool , qu'il appelloit *liqueur minérale anodyne*. La faculté de médecine de Paris a ajouté l'éther à cette liqueur , & elle a prescrit , dans son dispensaire , de la préparer en mêlant deux onces de l'alcool qui pisse avant l'éther , & douze gouttes d'huile douce de vin. Ce médicament s'emploie comme l'éther ; mais il n'a pas , à beaucoup près , la même vertu. Telles sont les propriétés connues de l'éther sulfurique. Il résulte de leur ensemble que ce produit est une sorte d'huile formée par un changement de proportion dans les principes de l'alcool , opéré à l'aide de l'acide sulfurique : l'action des autres acides sur l'alcool rendra cette opinion plus claire & plus vraisemblable.

L'acide nitrique agit d'une manière très-rapide sur l'alcool. Navier de Châlons est le premier qui ait donné un procédé facile & peu dispendieux , pour préparer l'éther nitrique. On prend , d'après ce chimiste , une bouteille de Sèvres très-forte ; on y verse douze onces d'alcool bien pur & bien rectifié , & on la plonge dans l'eau froide , ou mieux encore dans la glace : lorsque l'alcool est refroidi , on ajoute à plusieurs reprises , & en agitant chaque fois le mélange , huit onces d'acide nitrique concentré : on bouche la bouteille avec un bouchon de liège qu'on assujettit avec de la peau , & qu'on ficelle bien. On laisse ce mélange en repos dans un endroit écarté , pour prévenir les accidens que pourroit produire la fracture de la bouteille , qui souvent a lieu dans cette opération. Au bout de quelques heures , il s'élève des bulles du fond de ce vaisseau , & il se rassemble à la surface de la liqueur , des gouttes qui forment peu-à-peu une couche de véritable éther. Ce dégagement dure pendant quatre à six jours. Dès qu'on n'apperceoit plus de mouvement dans la liqueur , on perce le bouchon avec un poinçon , pour laisser échapper une certaine quantité de gaz , qui , sans cette précaution , sortiroit brusquement en débouchant la bouteille , & entraîne-roit l'éther , qui seroit perdu. Lorsque le gaz est dissipé , on débouche la bouteille ; on verse la liqueur qu'elle contient dans un entonnoir , dont on bouche la tige avec le doigt ; on sépare le résidu d'avec l'éther qui le surnage , & on reçoit ce dernier dans un flacon à part.

M. Woulfe a donné un autre procédé pour préparer l'éther nitreux ; il consiste à employer des vaisseaux très-grands , pour offrir beaucoup d'espace à l'air qui se dégage. Voyez les mots *APPAREIL DE WOULFE*. On prend un balon de verre blanc contenant huit à dix pintes , terminé par un col de sept à huit pieds de long ; on le pose sur un trépied assez élevé pour qu'on puisse placer dessous un réchaud , on ajuste au cou de ce matras un chapeau tubulé , au bec duquel on adapte un tuyau de verre de sept à huit pieds ; ce dernier est reçu par son extrémité inférieure

dans un ballon à deux pointes percé en dessous d'une tubulure, à laquelle on joint un flacon ; on ajoute aux ouvertures latérales de ce ballon les bouteilles qui constituent en général l'appareil de Woulfe. Voyez ce mot. Lorsque tous ces vaisseaux sont bien lûrés, on verse dans le marras ou ballon à long cou, par la tubulure du chapiteau, un livre d'alcool rectifié, & autant d'acide nitreux fumant refroidi auparavant ; on bouche ensuite le chapiteau avec un bouchon de cristall qu'on enveloppe d'une peau ficelée. Dès que le mélange est fait, il s'échauffe beaucoup ; il s'en dégage des vapeurs qui parcourent rapidement le col du marras ; & en chauffant ce dernier jusqu'à l'ébullition de la liqueur qu'il contient, il passe de l'éther nitrique dans le ballon qui sert de récepteur. Ce procédé, quoique fort ingénieux, a plusieurs inconvénients. L'appareil est long à établir ; il est très-cher & très-embarrassant ; en outre, il expose encore aux dangers de l'explosion & de la fracture, parce que, malgré l'espace donné aux vapeurs, elles se dégagent si rapidement, qu'il est arrivé plusieurs fois que les vaisseaux se sont brisés avec fracas. Sur cinq fois que j'ai vu mettre en pratique ce procédé, j'ai vu deux fois tout l'appareil sauter en éclats ; une fois au cours public de Roux, dans l'amphithéâtre de la faculté de médecine ; & une seconde fois dans le laboratoire particulier de Jusscut.

M. Bogue a publié, en 1773, une autre manière de faire l'éther nitrique. Il conseille de mêler, dans une cornue de verre de huit pintes, une livre d'alcool avec une livre d'acide nitrique, affoibli au point de ne donner que vingt-quatre degrés au pèse-liqueur de M. Baumé ; d'adapter à la cornue un ballon de douze pintes ; de donner passage à l'air, en ajoutant deux tuyaux de plume à la jonction des lûtes, & de distiller à un feu très-doux, en n'enfonçant que très-peu la cornue dans le sable ; à la eu, par ce moyen, six onces d'un éther nitrique assez pur. Il parait, d'après ce qu'a dit M. l'abbé Rozier, que Milotard employoit, dès 1770, un procédé assez semblable à celui de M. Pöppe. Ce chimiste merroit quatre onces d'esprit de nitre fumant, avec douze onces d'alcool en distillation dans une cornue, qu'il ne faisoit que poser légèrement sur le sable, & il obtenoit par ce moyen, qui parait le plus simple de tous, de l'éther nitrique semblable à celui de Navier.

Enfin M. Lelaplanche, apothicaire de Paris, a imaginé successivement deux méthodes connues de préparer l'éther nitrique ; la première consiste à mettre du nitre dans une cornue de grès tubulée, à laquelle on adapte un grand ballon, ou deux ballons enfilés ; à verser par la tubulure, d'abord de l'acide sulfurique concentré, ensuite de l'alcool. L'acide sulfurique dégage l'acide nitrique, qui réagit sur l'alcool, & forme presque sur le champ de l'éther nitrique. Comme on pouvoit

soupçonner que l'éther, préparé par ce moyen, étoit en partie sulfurique, il a substitué à cette première méthode un second procédé fort ingénieux. Il adapte à une cornue de verre tubulée, dans laquelle il a mis six livres de nitre bien sec, un allonge & un ballon qui communique, par un tube recourbé, à une bouteille vide. Cette dernière plonge à l'aide d'un siphon dans une autre bouteille qui contient trois livres d'alcool le plus pur. Le tout bien lûré, & la cornue posée sur un bain de cendre, on jette sur le nitre, par la tubulure de ce dernier vaisseau, trois livres d'acide sulfurique concentré ; on ferme la cornue avec un bouchon de cristall ; on donne le feu jusqu'à l'ébullition, & on l'entretient dans cet état jusqu'à ce qu'il ne passe plus de vapeurs. Dans cette expérience l'acide sulfurique dégage celui du nitre qui passe en partie dans le second flacon. L'opération finie le ballon contient de l'acide nitreux fumant, la cornue du sulfate acide de potasse, & le second flacon un alcool légèrement éthéré. On distille ce dernier liquide dans une cornue avec un simple ballon, & on ne prend que les deux tiers du produit. On distille ce produit avec un quinzième d'acide nitreux fumant, qu'on y verse peu-à-peu à l'aide d'un entonnoir de verre à longue tige ; on ne retire que les deux tiers du mélange ; enfin, on rectifie ce second produit sur de la potasse, on en retire d'abord quatre onces, puis les trois quarts du reste. Les quatre premières onces sont de l'éther nitrique très-pur ; les trois quarts du reste sont une liqueur minérale anodine nitreuse. Les résidus des deux rectifications sont de l'esprit de nitre aulcisé ; car on connoît sous ce nom, en pharmacie, un mélange de deux parties d'alcool, & d'une d'acide nitrique foible.

L'éther nitrique, obtenu par tous ces différents procédés, est un fluide souvent jaunâtre, aussi volatil & aussi évaporable que l'éther sulfurique. Son odeur est analogue à celle de ce dernier, quoiqu'elle soit plus forte & moins suave ; la saveur est chaude & plus désagréable que celle de l'éther sulfurique ; il contient toujours un peu d'acide surabondant ; il fait sauter le bouchon des flacons dans lesquels il est renfermé, parce qu'il s'en dégage continuellement une grande quantité de gaz ; il répand en brûlant une flamme plus brillante, & une fumée plus épaisse que ne le fait l'éther formé par l'acide sulfurique ; il laisse aussi un charbon un peu plus abondant ; enfin, il enlève, comme l'éther sulfurique, l'or de la dissolution ; il s'en charge d'une certaine quantité, & il agit à très-peu de choses près comme lui dans toutes les opérations de chimie.

Le résidu de l'éther nitrique est d'une couleur jaune citrine ; son odeur est acide & aromatique ; sa saveur est piquante & imite celle du vinaigre distillé. Si on le distille, il donne, suivant M. Baumé, une liqueur claire, d'une odeur plus suave que celle de l'éther nitrique, d'un goût assez agréable,

agréable, qui rougit le sirop de violettes; qui s'unit à l'eau en toutes proportions, & qui fait effervescence avec les carbonates alcalins & terreux. Il reste ensuite dans la cornue une matière jaune ambrée, friable, semblable à du fucien; qui attire l'humidité de l'air, & y devient poisseuse, qui se dissout dans l'eau sans la rendre mucilagineuse. Cette substance, que M. Baume appelle gummi favonneuse, donne à la cornue quelques gouttes d'une liqueur acidulée, très-claire, d'une consistance huileuse, & d'une légère odeur empyreumatique. Il reste après la distillation un charbon spongieux, brillant, sans saveur, très-fixe au feu. Bucquet dit que si on fait évaporer la liqueur qui reste après la formation de l'éther nitrique, elle prend la consistance d'un mucilage, & qu'il s'y forme, au bout d'un temps plus ou moins long, des cristaux salins assez semblables à des chenilles velues, auxquels on a donné le nom de cristaux d'Hierac; & après celui qui les a le premier décrits, on a découvert que ces cristaux sont de l'acide oxalique: ce qui prouve que dans la décomposition de l'alcool par l'acide nitrique, une portion de l'hydrogène & du carbone de l'alcool s'unit avec une partie de l'oxygène de l'acide nitrique. Il y a aussi de l'eau & de l'acide carbonique formés dans cette expérience; car on obtient ce dernier en gaz pendant les distillations, & c'est à l'existence de l'eau plus abondante, que l'on doit en partie l'adoucisement de l'acide, observé il y a long-temps dans le simple mélange de deux parties d'alcool, & d'une d'acide nitrique.

L'acide muriatique le plus concentré n'a pas d'action sensible sur l'alcool; cet acide n'est que dulcifié par le simple mélange de cette liqueur, comme le sont les deux autres mêlés en petite quantité avec l'alcool. Pour préparer ce qu'on nomme de l'esprit de sel dulcifié en pharmacie, on fait un mélange de deux parties d'alcool & d'une partie d'acide muriatique, on les laisse en digestion pendant un mois. M. Baume, dans sa *Dissertation sur l'éther*, dit avoir obtenu un peu d'éther muriatique en faisant rencontrer l'acide muriatique & l'alcool en vapeurs. Ludolf & Port ont employé le muriate d'antimoine sublimé ou le beurre d'antimoine dans cette vue. M. le baron de Bornes a prescrit de dissoudre de l'acide du zinc dans l'acide muriatique, & de distiller ce sel concentré par l'évaporation dans des vaisseaux fermés avec l'alcool. Ce procédé donne assez facilement de l'éther muriatique. Mais personne n'a suivi ce travail avec autant de soin que M. de Courtauvaux de l'académie des sciences de Paris. On verse dans une cornue de verre, suivant le procédé de ce chimiste, une pinte d'alcool avec deux livres & demie de muriate d'étain fumant, ou *liqueur fumante de Libavius*; il s'excite une chaleur très-forte, & il s'élève une vapeur blanche suffoquante qui disparaît dès qu'on agite le mélange, bientôt il

Chimie, Tome II.

se dégage une odeur agréable, & la liqueur prend une couleur citrine. On place la cornue sur un bain de sable chaud; on lute deux ballons, dont le dernier est plongé dans de l'eau froide; il passe bientôt de l'alcool distillé; l'éther muriatique s'élève ensuite; on s'en aperçoit à son odeur suave & aux flûtes qu'il forme sur la voûte de la cornue. Dès que cette odeur change & devient forte & suffoquante, on change de récipient, & l'on continue de distiller; on obtient une liqueur acide claire farnagée de quelques gouttes d'huile douce, à laquelle succède une matière jaune, d'une consistance butireuse, un vrai muriate d'étain, & enfin une liqueur brune pesante, qui exhale des vapeurs blanches fort abondantes. Il reste dans la cornue une matière grise pulvérulente, qui est un oxyde d'étain. On verse le produit éthéré dans une cornue sur de la potasse, il se fait une vive effervescence, un précipité fort abondant, dû à l'étain que l'acide enlève avec lui; pendant la distillation on ajoute un peu d'eau, & on distille à une chaleur douce, on obtient la moitié environ de ce produit éthéré. Toutes les liqueurs qui passent après l'éther muriatique, sont très-chargées d'oxyde d'étain; elles attirent l'humidité de l'air; elles s'unissent à l'eau sans rien précipiter. On ne savait pas à quoi attribuer l'action si rapide de l'acide muriatique, contenu dans la liqueur fumante de Libavius sur l'alcool, tandis que cet acide pur n'y agit en aucune manière: mais j'ai fait remarquer dès 1781, d'après la découverte de Schéele, que cela devoit être produit par cet acide mis par l'oxyde d'étain, dans l'état d'acide muriatique oxygéné, & que c'étoit à l'excès de l'oxygène qu'il contenoit dans cet état, qu'il falloit attribuer la propriété de convertir l'alcool en éther. Telle est la théorie que j'avois donnée le premier de cette opération en 1781, & que les travaux de MM. Berthollet & l'elletier ont confirmée, comme on l'exposera bientôt plus en détail.

M. de la Planché l'apothicaire a proposé, pour préparer l'éther muriatique, de verser dans une cornue tubulée de l'acide sulfurique & de l'alcool sur du muriate de soude détrempé. Le gaz acide muriatique, dégagé par l'acide sulfurique, rencontre dans le ballon l'alcool en vapeur, avec lequel il se combine. Il en résulte un acide éthéré que l'on rectifie sur de la potasse, pour en obtenir l'éther pur. Il faudroit pour que ce procédé réussît que l'acide muriatique enlevât une portion d'oxygène à l'acide sulfurique; mais comme on ne connoît point cet effet dans l'action réciproque de l'acide muriatique & de l'acide sulfurique, il paroît qu'il ne se forme pas un véritable éther dans le procédé de M. de la Planché; aussi n'emploie-t-on pas ce procédé pour se procurer l'éther muriatique, & se suit-on toujours dans les laboratoires la méthode de Courtauvaux.

L'éther muriatique, obtenu par cette méthode,

L

est très-transparent, très-volatil; il a à-peu-près la même odeur que l'éther sulfurique; cependant elle est moins forte & moins aromatique. Il brûle comme lui, & donne une fumée semblable à la ficelle. Mais il en diffère par deux propriétés; l'une, c'est d'exhaler, en brûlant, une odeur aussi piquante & aussi vive que l'acide sulfureux; l'autre, c'est d'avoir une saveur styptique semblable à celle de l'alun. Ces deux phénomènes indiquent que cet éther est différent, & peut-être moins parfait que les deux premiers; sans doute qu'en continuant l'examen de ses autres propriétés, on lui trouvera encore des différences plus singulières; mais on manque d'expériences à cet égard, & c'est aux recherches ultérieures à prononcer sur ce point.

C'est en examinant l'action de l'acide muriatique oxygéné sur l'alcool & la conversion de celui-ci en éther par cette action, que M. Berthollet a conçu de nouvelles idées sur la nature de l'un & de l'autre de ces produits. Il a confirmé ses expériences & ses opinions sur ce point de chimie, dans le volume de l'académie pour l'année 1785. Nous insérerons ici son mémoire, parce qu'il est écrit avec trop de précision, & que les matières qu'il contient sont trop importantes pour pouvoir être présentées en extrait. On y trouvera quelques faits déjà indiqués dans cet article, mais sous une forme & avec un rapprochement différents (1).

« Priestley a retiré du gaz hydrogène de l'alcool, par le moyen de l'électrique électrique; il en a aussi retiré qui étoit mêlé à une portion d'acide carbonique, en faisant passer l'alcool à travers un tube d'argile chauffé par des charbons ardents. M. Landriani a remarqué que dans cette dernière opération, une poudre charbonneuse enduisoit le tube; & M. Monge, qui a fait depuis longtemps cette expérience, a observé que l'eau dans laquelle on recevoit le résidu de l'alcool, prenoit la saveur & l'odeur de l'éther. M. Lavoisier a fait voir que dans la combustion de l'alcool il se formoit de l'eau dont le poids surpassoit d'un neuvième celui de l'alcool consumé. Il résulte sur-tout de cette belle expérience, que l'alcool est composé en grande partie de l'hydrogène de l'eau; cependant le gaz hydrogène qu'on retire de l'alcool en le décomposant par la chaleur donne de l'acide carbonique, lorsqu'il brûle avec l'air vital parce qu'il s'est combiné avec une portion du charbon qui est aussi contenu dans l'alcool. Enfin, l'on fait que plusieurs acides, en décomposant cette liqueur, forment de l'éther, & que l'acide nitreux produit, outre cela, de l'acide carbonique & de l'acide oxalique. J'ai tâché de reconnoître plus particulièrement quels

étoient les principes de l'alcool & de l'éther; par le moyen de l'acide muriatique oxygéné. M. Galliste avoit déjà tenté de déterminer l'action du gaz acide muriatique oxygéné sur l'alcool; mais il s'est servi du procédé de Schéele, qui n'a pu le conduire qu'à des résultats imparfaits. (*Journal de Chém.* tom. X, pages 262 & 269.)

« I. J'ai mis quinze onces d'alcool dans un des flacons de l'appareil que j'ai décrit, pour imprégner l'eau d'acide muriatique oxygéné, & j'ai remarqué qu'il absorboit très-facilement l'acide muriatique oxygéné, qu'il prenoit beaucoup de chaleur, & qu'il fondoit une portion considérable de glace dont il étoit environné, quoique le gaz eût passé dans un premier flacon rempli d'eau, & également enroulé de glace.

« Cette opération, dans laquelle j'ai employé quatre onces d'acide muriatique concentré, & une once de manganèse, étant finie, je n'ai point trouvé que l'alcool eût l'odeur d'acide muriatique oxygéné; mais il avoit celle de l'éther, comme l'a observé M. Galliste, il rougissoit les couleurs bleues végétales au lieu de les détruire, il faisoit effervescence avec les alcalis, enfin, l'acide muriatique avoit repris son état naturel. Je réitérai l'opération, & je trouvais que l'alcool avoit pris une odeur d'éther plus forte, je fis encore quatre fois la même expérience, & l'acide muriatique oxygéné parut s'absorber toujours & se décomposer avec la même facilité; mais l'odeur d'éther alla en diminuant depuis la seconde opération; elle étoit presque entièrement dissipée après la dernière; l'on sentoit, au contraire, une odeur assez forte de vinaigre; alors je saturai de soude une moitié de la liqueur, qui prit une couleur jaune, tirant sur le brun; je la distillai au bain-marie; les premières portions qui passèrent étoient une liqueur éthérée qui, cependant, se mêloit avec l'eau; bientôt la liqueur cessa d'être inflammable, & ne fut que de l'eau qui avoit une légère odeur de sucre brûlé. La couleur de celle qui étoit dans la cornue se fonçoit de plus en plus, & présentoit avec la saveur du sel marin une saveur & une odeur bien caractérisées de sucre brûlé ou de caramel; il s'y dépoisoit quelques parties noires qui étoient insolubles dans l'alcool, & qui ressembloient à une huile brûlée. J'ai retiré la plus grande partie du sel marin, en continuant l'évaporation; il est resté une liqueur épaisse, que j'ai desséchée à une légère chaleur; j'y ai mêlé de l'alcool, qui a pris une couleur brune & une saveur salée, mais toujours mêlée à celle de caramel. Le résidu qui n'a pas été dissous étoit un mélange de sel marin & de substance sucrée; j'ai fait évaporer l'alcool jusqu'à ce qu'il se soit formé une cristallisation confuse. La

(1) Mémoire sur la décomposition de l'esprit-de-vin & de l'éther, par le moyen de l'air vital, par M. Berthollet. Lu le 27 avril 1785, pag. 108. On a seulement changé les noms d'esprit-de-vin & d'acide manganéologique qui faisoient en usage alors, avant l'établissement de la nouvelle nomenclature.

substance saline qui restoit alors, m'a paru avoir une faveur semblable à celle de l'acétate de soude, mêlée à celle de la substance sucrée. J'y ai ajouté un peu d'eau distillée; j'ai mis cette distillation dans une cornue avec un peu d'acide sulfurique, & j'ai distillé à un feu léger la liqueur qui a passé, avoit, d'une manière non douteuse, la faveur & l'odeur de l'acide acétique ».

» II. J'ai cru reconnoître, dans cette expérience, la présence du sucre ou d'une matière analogue au sucre; pour m'en assurer, j'ai cherché à déterminer quelle altération pouvoit éprouver le sucre, de la part de l'acide muriatique oxygéné: j'en ai donc imprégné de l'eau sucrée, en me servant toujours du même procédé. L'acide muriatique oxygéné a paru d'abord n'avoir aucune action sur le sucre; mais ayant laissé pendant quelques jours le flacon exactement bouché, la liqueur a perdu peu-à-peu la couleur de l'acide muriatique oxygéné; elle est devenue semblable à de l'eau pure. Dans cet état, elle a rougi le papier bleu, de façon que l'acide muriatique avoit repris ses propriétés. J'ai répété plusieurs fois cette expérience sur la même liqueur, & toujours les mêmes phénomènes ont eu lieu. Après cela, j'ai saturé de soude la liqueur, qui étoit très-acide, & je l'ai fait évaporer; elle a pris peu-à-peu une couleur brune, & elle a laissé un résidu mêlé de sel marin & d'une substance qui ressembloit au sucre brûlé, & ne différoit du résidu que j'avois obtenu de l'alcool, que par sa couleur un peu moins foncée. Une partie de la liqueur qui avoit été laissée dans un flacon, sans avoir été exposée à l'action du feu, a pris, dans un certain espace de temps, une couleur jaune foncée. Je pensois qu'il auroit dû se former quelque acide nouveau par la combinaison de l'oxygène; mais je n'en ai pu reconnoître aucun ».

» Il résulte de-là, premièrement, que l'alcool contient du sucre; secondement, que l'oxygène de l'acide muriatique oxygéné fait éprouver au sucre un effet analogue à celui de la combustion. Il me paroît probable que cet oxygène, qui est très-disposé à se combiner, parce qu'il est privé d'une partie du principe de l'élasticité ou du calorique, s'unit à l'hydrogène de la partie huileuse du sucre, & forme de l'eau: par-là le sucre est réduit dans un état charbonneux. C'est ainsi que, lorsqu'on dégage du gaz hydrogène de l'huile, par le moyen de l'étincelle électrique, les parties de l'huile qui sont décomposées laissent précipiter des molécules de charbon, comme M. Monge l'a observé: de même, lorsqu'on distille du sucre ou bien une huile, & qu'il s'en dégage du gaz hydrogène, le résidu est dans un état charbonneux; mais si l'on fait une combustion à l'air libre, le charbon se combine lui-même avec l'air vital pour former de l'acide carbonique. Il reste à découvrir pourquoi l'oxygène de l'acide muriatique oxygéné ne peut se combiner avec le charbon,

avec lequel cependant il a une grande affinité pendant qu'il se combine avec le gaz hydrogène, privé d'élasticité, avec le soufre, le phosphore & les substances avec lesquelles il a le moins d'affinité.

» III. Une moitié seulement de l'alcool que j'avois imprégné d'acide muriatique oxygéné, avoit servi à ces premières expériences. J'ai tenu l'autre moitié pendant près de deux mois dans un flacon bouché exactement; cette liqueur, qui n'avoit d'abord à l'œil que l'apparence de l'alcool, avoit pris peu-à-peu une couleur jaune. Dans cet état, je l'imprégnai encore plusieurs fois d'acide muriatique oxygéné; après cela, je la saturai de soude: elle se troubla, & j'aperçus un peu d'huile qui venoit nager à sa surface; je la filtrai, & il resta sur le filtre une huile brune, dont une partie étoit presque concrète. Je distillai la liqueur; la première portion qui passa avoit faiblement l'odeur & la faveur faible de l'éther. En continuant l'opération, j'en séparai le muriate de soude, & j'eus un résidu semblable à celui de la première expérience, si ce n'est que je ne pus y retrouver l'acide acétique, quoique la liqueur en eût parfaitement l'odeur.

» IV. J'ai soumis l'éther sulfurique à des opérations semblables; il a aussi absorbé & décomposé une grande quantité d'acide muriatique oxygéné, en produisant beaucoup de chaleur. La couleur n'a point changé, lorsque j'ai saturé de soude l'acide muriatique qui venoit de se reproduire; mais il s'est séparé une quantité assez considérable d'une huile très-légère, aromatique, & semblable à celle qu'on retire dans le procédé de l'éther sulfurique, & qu'on connoît sous le nom d'*huile douce de vin*. La liqueur filtrée faisoit un petit précipité avec la dissolution de baryte; je l'ai distillée; j'en ai retiré un peu d'éther non décomposé, après cela beaucoup d'eau; sur la fin de la distillation, la liqueur qui étoit dans la cornue est devenue un peu jaune, & il n'est resté, en continuant l'évaporation, que du muriate de soude un peu coloré en jaune ».

» Ces dernières expériences font voir que l'éther contient une huile légère, combinée avec une surabondance de gaz hydrogène, lequel, s'unissant avec l'oxygène de l'acide muriatique oxygéné, forme de l'eau; il s'y trouve aussi un peu de l'acide dont on s'est servi pour sa production, ainsi que Schéele l'a déjà prouvé; & cette petite portion d'acide est probablement le seul principe qui constitue la différence des éthers. La couleur jaune qu'a prise la liqueur sur la fin de l'évaporation, me paroît due à une portion d'huile qui a été décomposée par l'acide muriatique oxygéné; & si l'opération eût été poussée plus loin, toute l'huile légère auroit été décomposée de la même manière, parce qu'elle auroit été privée de l'hydrogène qui entre dans sa composition ».

» La nature de l'éther & sa différence avec l'alcool, me paroissent déterminées avec assez de précision par les observations précédentes, & l'on

peut facilement rendre raison de toutes les propriétés qu'on lui connoît. Je vais présenter les idées que je me suis faites sur sa formation ».

» V. Les expériences des numéros I & III prouvent que l'alcool contient de l'huile, qui sans doute est beaucoup plus fluide que je ne l'ai retirée, par les raisons qu'on va voir. Cette huile est combinée avec du sucre, de l'hydrogène, & une certaine quantité d'eau. Lorsqu'on mêle à l'alcool un acide dont l'oxygène peut se combiner avec une portion de l'hydrogène & de l'huile, les principes qui forment l'alcool se trouvent défunis ; la plus grande partie de l'hydrogène se volatilise avec la portion la plus subtile de l'huile, & entraîne dans cette combinaison une petite portion de l'acide qu'on emploie ; la portion la moins tenue de l'huile & le sucre restent dans la cornue à moitié brûlés par l'oxygène enlevé à l'acide ».

» L'éther est donc, d'après cette manière de voir, une huile qui s'est séparée de l'alcool, & qui est combinée avec un excès d'hydrogène & avec une très-petite quantité de l'acide qui a servi à sa formation ».

» Cette théorie me paroît expliquer d'une manière satisfaisante, ce qu'on observe lorsqu'on fait l'éther par le moyen de différens acides. Il est d'abord manifeste que tous perdent une partie d'oxygène ; que l'acide muriatique doit être dans l'état d'acide muriatique oxygéné, & le vinaigre dans celui d'acide acétique ; état dans lequel il a une plus grande quantité d'oxygène, comme je l'ai fait voir (Mém. de l'Acad. 1783). Si l'acide ne cède pas facilement son oxygène, il faut de la chaleur ; c'est le cas de l'acide sulfurique : alors, si l'on pousse la distillation après que l'éther s'est dégagé, il passe une portion d'huile ; mais une partie de cette huile devenue épaisse, & parce que la partie la plus fluide s'en est dégagée, & parce que l'acide a agi sur elle, reste dans la cornue avec le sucre, qui est réduit lui-même dans un état presque charbonneux. Ce mélange donne au résidu une apparence presque bitumineuse ».

» Si l'on se sert d'acide nitreux, qui contient beaucoup d'oxygène, & qui le cède facilement, l'opération peut se faire sans feu. La séparation de l'éther est rapide ; & lorsqu'on distille la liqueur, après en avoir séparé l'éther qui s'est formé, l'huile épaisse & le sucre se trouvent entièrement dénaturés ; l'un & l'autre probablement sont changés en acide oxalique & en acide carbonique. Si l'on traite l'éther qu'on vient de former avec de nouveau acide nitreux, il se décompose de nouveau, & l'on en retire de l'huile ».

» Dans mes expériences avec l'acide muriatique-oxygéné, il ne s'est point séparé d'éther, parce que, comme la chaleur ne déterminoit pas la partie la plus fluide à se dégager, elle subsistoit l'action successive du gaz qui étoit absorbé ; mais Schéele a fait de l'éther muriatique en mêlant de

l'acide muriatique, de l'oxide-manganèse & de l'alcool, & en distillant ce mélange ».

» En considérant que l'acide muriatique n'a point d'action sur l'alcool lorsqu'il n'est pas combiné avec l'oxygène, il étoit naturel de penser que l'oxygène se combinait pour former l'éther. C'est une opinion qu'a eue M. Fourcroy, dans ses *éléments de chimie*, & qui s'étoit aussi présentée à moi, (Mém. de l'acad. 1782, pag. 601) ; mais je pensois alors qu'il entroit réellement dans la composition de l'éther, au lieu qu'il me paroît prouvé, par les observations précédentes, que c'est en se combinant avec une portion du gaz de l'hydrogène & de l'huile, qu'il agit & qu'il produit la séparation de l'éther ».

» Cette combinaison, de l'oxygène avec l'hydrogène de l'alcool & avec celui de l'éther, n'est point douteuse ; car l'on a vu que l'un & l'autre, traités avec l'acide muriatique-oxygéné, se changeoient pour la plus grande partie en eau. L'oxygène agit donc, dans cette circonstance, de la même manière que dans l'expérience de M. Lavoisier, si ce n'est qu'il ne se produit point de lumière sensible ; & quoique la chaleur qui se dégage soit assez considérable, comme l'indique la fonte de la glace, elle l'est cependant moins que si l'oxygène étoit dans l'état élastique. C'est une véritable combustion, dont le principal résultat est de l'eau, & qui se fait au milieu d'un fluide qui, étant bon conducteur de la chaleur, la distribue aussi-tôt qu'elle est dégagée, de sorte qu'il ne lui permet pas de s'accumuler dans quelques parties, comme il arrive dans la combustion qui se fait dans l'air ».

L'action des trois acides minéraux les mieux connus sur l'alcool, renferme presque tout ce qu'on fait d'important sur les combinaisons de ce produit avec les acides en général. La plupart des autres ont ou une action très-foible sur l'alcool, ou au moins, elle n'a encore été que peu examinée ; nous allons donner ici l'état des connoissances chimiques sur ces combinaisons.

L'acide fluorique ne paroît faire éprouver aucune espèce d'altération à l'alcool.

L'acide boracique s'y dissout bien ; cette dissolution brûle avec une flamme verte, très-belle, & l'on avoit pensé que cette couleur, communiquée à la flamme de l'alcool, étoit une preuve de la présence du cuivre dans l'acide boracique, parce que les sels cuivreux lui donnent la même propriété ; cette apparence ne suffit point pour admettre le cuivre dans l'alcool boracique, & aucun chimiste ne croit à l'existence de ce métal dans cet acide.

L'acide carbonique, dans l'état de gaz, est promptement & facilement absorbé par l'alcool, qui en prend plus que son volume : il n'y a d'ailleurs aucune autre action intime, aucun changement de combinaison & de proportion dans les principes entre ces deux corps.

Les acides métalliques, arsénique, tungstique & molybdique, ne sont ni dissolubles, ni sensiblement alterables par l'alcool. Il paroît, cependant, qu'en tenant quelque temps en contact ces acides avec l'alcool, celui-ci leur enlève peu-à-peu une portion de leur oxygène; qu'il est capable de leur ôter leur caractère acide, & de les rapprocher de l'état métallique.

L'acide succinique est en partie dissoluble dans l'alcool; mais sa dissolubilité est très-foible.

Parmi les acides végétaux, il n'y en a que très-peu qui aient une action marquée sur l'alcool. L'acide tartareux ne lui fait éprouver aucune altération, quoiqu'il y soit entièrement dissoluble, lorsqu'il est pur. MM. les académiciens de Dijon ont fait plusieurs expériences sur cette combinaison: voici comme il s'expriment eux-mêmes dans leurs *éléments de chimie*, tome III, page 333.

« Les principes de l'acide tartareux ne sont point unis assez intimement pour pouvoir agir ensemble sur l'alcool, de manière à former l'éther. M. Berthollet a distillé l'huile de l'acide tartareux & l'alcool; ils n'ont point agi l'un sur l'autre, ce qui ne doit point surprendre, vu que, dans l'état huileux, l'acide du tartre est dépourvu de sa partie la plus active. Nous y avons substitué l'acide obtenu suivant le procédé de M. Monnet, c'est-à-dire, séparé du tartre de fer, par l'acide sulfurique; il est plus fort, puisqu'il précipite la dissolution d'argent; il s'est mêlé paisiblement avec l'alcool, & la distillation n'a donné qu'une liqueur qui contenoit l'alcool & l'acide tartareux simplement mélangés & non combinés. Nous avons seulement observé que cette liqueur ne précipitoit plus la dissolution d'argent, ce qui sembleroit être l'effet de l'action de l'alcool sur la portion d'acide minéral (ou d'acide sulfureux), que nous avons dit exister dans l'acide tartareux, obtenu suivant ce nouveau procédé ».

« Nous avons fait bouillir quatre onces de zinc avec une livre de crème de tartre, la liqueur refroidie, a laissé sur le filtre du zinc & de la crème de tartre, qui ont fait long-temps effervescence: après plusieurs jours, nous les avons fait bouillir, & les produits des différentes ébullitions ont été évaporés jusqu'à consistance de bouillie; pour lors nous y avons ajouté cinq onces sept gros d'alcool; ce mélange étant resté dans une étuve pendant douze jours, la liqueur s'est colorée en jaune. Nous avons ensuite procédé à la distillation: l'alcool s'est élevé avec le zinc; l'alcali a précipité ce métal, & l'alcool, en brillant, a fait voir des petites étincelles. En continuant la distillation, la liqueur est devenue laiteuse, ce n'étoit plus qu'un alcool foible; il n'est resté dans la cornue qu'une tache d'un brun rougeâtre, d'environ quinze lignes de diamètre; nous l'avons enlevée au moyen de l'eau distillée, qui, par l'évaporation, a donné un sel en aiguilles, avec quelques gouttes d'une liqueur brune un peu épaisse & laisante;

cette liqueur mêlée avec la dissolution de mercure, a fourni un précipité blanc, qui a bientôt pris une couleur jaune ».

« Il est important de remarquer que, pendant la distillation, il s'est dégagé une très-grande quantité d'air qui éteignoit la flamme d'une bougie ».

« Ces opérations n'ayant point donné d'éther, nous avons essayé de disposer l'acide à cette combinaison, de la même manière que l'on rend le vinaigre capable d'agir sur l'alcool, c'est-à-dire, en le concentrant par la distillation d'un des sels métalliques; nous avons, en conséquence, distillé quatre onces & demie de *tartre de Venus* (tartre de cuivre); il s'est d'abord élevé des vapeurs invisibles très-élastiques, qui éteignoient la bougie, ensuite il a passé de l'huile jaune; peu après une huile brune & beaucoup de vapeurs blanches très-épaisses qui éteignoient toujours la flamme. Les vapeurs ont diminué, elles étoient moins chargées, le ballon s'est éclairci, & l'air qui en sortoit étoit inflammable; il est resté dans la cornue une matière noire assez volumineuse, pesant deux onces cinq gros & demi; il y avoit dans le ballon cinq gros d'huile empyreumatique, ainsi il y a eu une once un gros & demi de perte: l'huile de l'acide tartareux n'a point agi sur la dissolution d'argent; mais elle a précipité en blanc le mercure, & ce précipité a jauni sur-le-champ ».

« Deux onces de tartre de zinc distillées ont présenté ces mêmes phénomènes, c'est-à-dire, qu'ils ont donné de l'air fixe (acide carbonique), de l'air inflammable & de l'huile; il est resté dans la cornue une once douze grains de matière charbonneuse très-boursofflée, l'huile a de même précipité la dissolution de mercure, & n'a point troublé la dissolution d'argent ».

« Le peu de succès de ces tentatives ne laisse guère d'espérances de parvenir à la combinaison de l'éther tartareux; & en supposant que le tartre ne contienne réellement d'autre principe acide que l'air, on ne doit pas en être étonné, puisque nous avons reconnu que l'alcool avoit très-peu d'affinité avec ce fluide; mais nous avons essayé de recomposer le tartre, en favorisant partout sorte de moyens dans l'appareil pneumatique, l'union de son huile avec de nouvel air, soit fix (acide carbonique), soit inflammable (hydrogène), même avec l'intermédiaire de l'alcali cristallisé: toutes ces expériences ont été infructueuses, ce qui nous confirme de plus en plus dans l'opinion que l'air n'entre dans la composition du tartre, qu'au moyen de quelque modification ou appropriation analogue à celle du vinaigre; qu'il n'y a de différence qu'en ce que l'union est beaucoup plus facile; & il ne faut pas chercher d'autre raison de la difficulté de produire l'éther tartareux, que la promptitude avec laquelle le tartre se décompose par la plus légère action du feu ».

L'acide acétique, est le seul acide végétal qui décompose sensiblement l'alcool, & forme de l'éther avec autant de facilité que les acides minéraux, comme l'a découvert M. de Lauragais. Il suffit pour cela de verser dans une cornue du vinaigre radical ou de l'acide acétique sur partie égale d'alcool. Il s'excite une chaleur considérable; on met la cornue sur un bain de sable chaud; on y adapte deux récipiens, dont le dernier plonge dans l'eau froide ou dans la glace pilée; on fait bouillir promptement le mélange; il passe d'abord un alcool déphlegmé, ensuite l'éther, & enfin un acide qui devient d'autant plus fort que la distillation avance davantage; il reste dans la cornue une masse brune assez semblable à une résine. On a soin de changer de récipient, dès que l'odeur éthérée devient âcre & piquante, & on recueille l'acide à part. On rectifie l'éther acétique avec de la chaux éteinte à une chaleur douce; il s'en perd beaucoup dans cette opération. C'est à l'excès d'oxygène, contenu dans l'acide acétique ou vinaigre radical, qu'est due la formation de cet éther. Schéele dit n'avoir pas pu réussir à préparer l'éther acétique par le vinaigre radical uni à l'alcool, & ne l'avoir obtenu qu'en ajoutant un acide minéral. M. Pœrner avoit déjà fait la même remarque sur la difficulté d'obtenir de l'éther acétique, par le procédé de M. Lauragais. Cependant beaucoup de chimistes français ont exécuté ce procédé, & je puis assurer l'avoir répété moi-même avec succès.

M. de la Planché prépare l'éther acétique, en versant sur l'acétate de plomb nitrofluoré dans une cornue de l'acide sulfurique concentré & de l'alcool; la théorie & la pratique de cette opération sont absolument les mêmes que celles des éthers nitrique & muriatique, préparés par un procédé analogue.

L'éther acétique a une odeur agréable comme tous les autres, mais elle est toujours mêlée de celle du vinaigre, quoiqu'elle ne soit point acide. Il est très-volatil & très-inflammable; il brûle avec une flamme vive, & laisse une trace charbonneuse après sa combustion. Quant à l'action de l'alcool sur les autres acides végétaux, voici le peu de faits qu'on a recueillis sur ce point.

L'acide benzoïque est dissoluble dans l'alcool chaud; il s'en sépare la plus grande partie par le refroidissement, & ordinairement il est plus blanc & plus pur après cette séparation, à cause de l'huile ou de la résine retenue par l'alcool; c'est un moyen dont on peut se servir en pharmacie pour purifier l'acide benzoïque qui y est connu, comme on fait, sous le nom de *fleurs de benjoin*.

L'acide citrique est aussi susceptible de se dissoudre dans l'alcool, sans y éprouver d'altération; mais lorsqu'on le traite par la chaux & l'alcool en même temps, il paroît qu'il éprouve une

altération, puisqu'il se convertit en vinaigre. On ne sait pas à quoi tient exactement cette conversion, quoiqu'on aperçoive que c'est à un changement de proportion dans les principes de cet acide, car on fait au moins que la plupart des acides végétaux sont susceptibles de se changer les uns dans les autres.

On dissout facilement l'acide gallique pur, obtenu par le procédé de Schéele, dans l'alcool, lorsqu'on applique même ce dissolvant à la noix de galle entière, quoique l'alcool dissolve en même temps quelques autres principes; on fait que dans ce cas ces principes sont garantis d'altération, & qu'on peut conserver long-temps cette espèce de dissolution pour l'employer comme liqueur d'épreuve propre à faire reconnoître le fer.

L'acide oxalique est dissoluble, mais sans éprouver de changement par l'alcool; il se cristallise régulièrement par l'évaporation de cette liqueur.

Les acides végétaux empyreumatiques sont miscibles en toute proportion avec l'alcool, ce qui paroît dépendre de leur état huileux; on a même assuré que l'acide pyrolique pouvoit convertir l'alcool en éther; mais cela mérite encore confirmation.

On a peu essayé de combiner les acides animaux avec l'alcool, & encore moins examiné l'action intime que ces matières peuvent avoir réciproquement les unes sur les autres. Ainsi nous ne pouvons rien dire des effets de l'alcool sur les acides lactique, saccho-lactique, sébacique, lithique, bombique, formique, &c. ces deux derniers paroissent cependant susceptibles de contracter quelque union avec l'alcool, tandis que les quatre premiers ne s'y unissent point du tout. On a essayé de combiner ensemble l'acide phosphorique & l'alcool; on fait que ce dernier précipite l'acide phosphorique, auquel il ne s'unit point, des dissolutions où il est contenu. MM. les académiciens de Dijon rendent compte dans leurs *éléments de chimie*, tome 3, page 338, des expériences qu'ils ont faites sur cette combinaison, dans l'intention d'obtenir un éther phosphorique.

» Nous avons essayé, disent-ils, la formation de l'éther phosphorique; nous avons mis dans une cornue, au feu de sable, une once d'acide phosphorique retiré du phosphore par déliquescence, & pareille quantité d'alcool très-rectifié; dans les commencemens de la distillation, l'alcool a paru s'élever seul, ensuite la cornue s'est obscurcie & remplie de vapeurs blanches épaisses; quand nous nous sommes aperçus qu'il n'y restoit plus qu'une portion de l'acide qui avoit une consistance gélatineuse, nous avons laissé tomber le feu, & nous avons trouvé dans le ballon une once cinq gros de liqueur, qui ne nous paroît pas pouvoir être encore placée décidément dans la classe des éthers, mais qui n'en est pas moins digne d'attention ».

1°. Cette liqueur est très-fortement acide, ce qui prouve que l'alcool ne s'est pas seulement chargé du flegme; qu'il y a eu combinaison assez puissante pour communiquer à l'acide une volatilité dont il est par lui-même très-éloigné.

2°. Cette liqueur s'allume, & donne une flamme qui, par sa blancheur, son volume & ses fuliginosités, approche plus de celle des éthers que de celle de l'alcool; mais il en reste une partie qui ne se consume pas, & dont l'acidité paroît augmentée.

3°. Elle se mêle à l'eau en toutes proportions.

4°. Versée dans la dissolution d'or, elle ne la surnage pas, & affoiblit seulement la couleur, qui demeure uniformément répandue dans la totalité du mélange.

5°. Elle ne paroît avoir aucune action sur les bitumes.

6°. Elle occasionne dans la dissolution d'argent un précipité blanc qui passe très-promptement au noir; elle précipite en blanc la dissolution nitrique de mercure, & la dissolution acétueuse de fer.

7°. Enfin, elle exhale une odeur à la fois très-pénétrante & très-désagréable, tellement semblable à celle de la liqueur fumante d'arsenic, qu'à s'en tenir à ce caractère, il n'y auroit point à hésiter de les reconnoître pour des corps identiques; l'acide gélatineux, qui reste dans la cornue, en est lui-même fortement imprégné.

Ces détails semblent annoncer un peu d'action entre l'alcool & l'acide phosphorique, & la séparation d'une partie de l'oxygène de ce dernier; mais il est vrai que l'acide qui a été employé pour les expériences, étoit en partie à l'état d'acide phosphoreux, & que cela seul peut expliquer les phénomènes indiqués.

Après avoir rendu compte de l'action de tous

les acides connus sur l'alcool, nous devons reprendre l'histoire des combinaisons de ce fluide avec les autres corps. On a fait des expériences assez nombreuses sur la dissolubilité des sels composés ou des sels neutres dans l'alcool. Macquer a trouvé le premier que les sels sulfuriques ne s'y dissolvoient que difficilement, que les nitrates & les muriatiques s'y unissent beaucoup mieux, & qu'en général l'alcool dissout d'autant plus ces substances, que leur acide y est moins adhérent. L'alcool bouilli sur les sulfates de potasse & de soude, n'en a rien dissous. Cependant le dernier a donné à sa flamme une couleur rouge très-marquée. Le nitrate de potasse est en partie dissoluble dans l'alcool & altère sa flamme; le muriate de soude y est également dissoluble, il cristallise très-bien par l'évaporation de l'alcool; les carbonates de potasse & de soude ne s'y unissent point; la plupart des sels ammoniacaux s'y combinent; les sels terreux deliquescents, tels que les nitrates & les muriates calcaires & magnésiens, s'y dissolvent très-bien; aussi a-t-on proposé d'enlever ces sels aux résidus des eaux minérales par l'alcool; l'acétite de potasse est très-dissoluble dans l'alcool; un gros de ce dissolvant prend à froid onze grains de ce sel. Beaucoup de sels métalliques y sont très-solubles, tels que le sulfate de fer à l'état d'eau-mère, le nitrate de cuivre, le muriate oxygéné de mercure ou sublimé corrosif, l'acétite de zinc, &c.: tous les sels cuivreux donnent une très-belle couleur verte à sa flamme. M. Wenzel a beaucoup étendu les découvertes de Macquer sur la dissolubilité des sels dans l'alcool. M. Guyton (Morveau) a donné sur ce phénomène une table, insérée dans le *Journal de physique*, année 1785, 2^e. vol. pag. 65, que nous croyons devoir présenter ici, parce que c'est la plus complète qui soit connue.

TABLE de la dissolubilité des sels dans l'alcool.

Sels facilement solubles.				Sels peu solubles.				Sels insolubles.			
Noms des sels.	Degrés du thermomètre de Réaumur.	Quantités dissoutes.		Noms des sels.		Quantités dissoutes.		Noms des sels.		Quantités dissoutes.	
Nitrate de cobalt.....	10	140 gr.		Muriate de chaux.....	140 gr.			Borax.			
Nitrate de cuivre.....	10	140		Nitrate d'ammoniac.....	114			Acide tartareux.			
Muriate de zinc.....	10	140		Muriate de mercure corrosif.	112			Muriate de soude.			
Muriate d'alumine.....	10	140		Acétite de soude.....	112			(Nous avons reconnu qu'il est dissoluble dans l'alcool.)			
Nitrate d'alumine.....	10	140		Nitrate d'argent.....	100			Alun.			
Acétite de plomb.....	16	140		Nitrate de soude.....	11			Sulfate ammoniac.			
Nitrate de magnésie.....	66	694		Acétite de cuivre.....	18			Sulfate de fer.			
Muriate de magnésie.....	66	1313		Muriate d'ammoniac.....	17			Sulfate de cuivre.			
Muriate de fer.....	66	140		Arséniate acide de potasse.....	9			Sulfate de zinc.			
Muriate de cuivre.....	66	140		Acide oxalique.....	7			Sulfate de potasse.			
Nitrate de zinc, décomposé.				Nitrate de potasse.....	5			Sulfate de soude.			
Nitrate de fer, décomposé en partie.				Muriate de potasse.....	5			Tartrate de soude.			
Nitrate de bismuth, décomposé en partie.				Arséniate de soude.....	4			Sulfate de chaux.			
				Tartrate de potasse.....	1			Nitrate de plomb.			
								Nitrate de mercure.			
								Muriate de plomb.			
								Sulfate d'argent.			
								Sulfate de mercure.			
								Carbonate de potasse.			
								Carbonate de soude.			

L'alcool ne dissout pas le soufre en masse ni en poudre ; mais il s'y unit lorsque ces deux corps sont en contact dans l'état de vapeurs, comme l'a découvert M. de Lauraguais. Son procédé consiste à mettre du soufre en poudre dans une cucurbitre de verre à placer dans le même vaisseau & sur le soufre un bocal plein d'alcool, & à chauffer la cucurbitre au bain de sable, en y adaptant un chapiteau & un récipient. Le soufre se volatilise en même-temps que l'alcool ; ces deux substances se combinent en vapeurs, & le fluide qui coule dans le récipient est un peu trouble & répand une odeur fétide. Il contient environ un grain de soufre par gros d'alcool. J'ai trouvé qu'on obtient la même combinaison en distillant les eaux sulfureuses, telles que celles de Montmorency avec de l'alcool.

On obtient avec le produit analogue en distillant les dissolutions de sulfures alcalins dans l'alcool ; car ces sulfures, ou *syres de soufre*, sont entièrement & parfaitement dissolubles dans cette liqueur ; ces dissolutions sont plus ou moins rouges, brunes, fétides, décomposables par l'air, par l'eau en grande quantité & à raison de l'air qu'elle contient.

L'alcool n'a aucune action sur les matières métalliques, ni sur leurs oxides ; il dissout en partie le succin ; il ne touche point aux bitumes noirs & charbonés ; on observe que lorsqu'il a été distillé sur un alcali fixe, il s'unit mieux au succin, & que ce sel, mêlé avec ce bitume, le rend beaucoup plus dissoluble en le rapprochant sans doute de l'état favoneux.

Il est peu de matières végétales sur lesquelles l'alcool ne puisse avoir une action plus ou moins marquée ; les extraits y perdent leur partie colorante & souvent toute leur substance, lorsqu'ils sont de la nature des extraits-résineux, ou des résino-extractifs ; les sucres sucrés & savoneux s'y unissent. Marerac a retiré par l'alcool un sel essentiel sucré de la betterave, du chervis, du panais, &c.

Les huiles végétales fixes, fluides, siccatives, concrètes, &c. ne s'unissent point à l'alcool ; leurs combinaisons avec les alcalis fixes ou les savons, s'y dissolvent très-facilement ; on donne le nom d'*essence de savon* à cette dissolution alcoolique.

Les matières végétales avec lesquelles l'alcool se combine le plus facilement, sont les huiles volatiles, l'arôme, le camphre, les baumes & les résines. On donne le nom impropre d'*eaux distillées spiritueuses* à l'alcool chargé de l'arôme des plantes odorantes : ce liquide s'empare du principe de l'odeur, & se volatilise avec lui ; il entraîne même une certaine quantité d'huile volatile, ce qui fait qu'il blanchit avec l'eau distillée ; mais on le sépare de ce principe étranger, en le rectifiant au bain-marie, à une chaleur très-douce ; & on a soin de ne retirer que les trois-quarts de l'alcool qu'on a employé, afin d'être sûr de ne volatiliser avec lui que l'arôme. Ces alcools aromatiques, ou ces *eaux*

distillées spiritueuses, acquièrent une odeur plus agréable à mesure qu'elles vieillissent, & il paroît que le principe odorant se combine de plus en plus intimement avec l'alcool. Cette remarque a été faite depuis long-temps dans les Pharmacies.

L'arôme a tant d'attraction pour l'alcool, que ce dernier est capable de l'enlever aux huiles volatiles & à l'eau. En effet, en distillant de l'alcool sur des huiles volatiles & sur l'eau chargée de l'odeur d'une plante, l'alcool prend le principe odorant, & laisse l'huile & l'eau sans odeur. On observe que l'alcool dissout mieux les huiles volatiles pesantes & épaisses, que celles qui sont bien fluides & légères. L'eau peut désunir ce composé ; elle en précipite l'huile sous la forme de globules blancs & opaques ; mais l'arôme reste toujours uni à l'alcool.

Ce liquide dissout facilement le camphre à froid ; mais il le dissout en plus grande quantité, lorsqu'il est aidé de la chaleur. Cette dissolution bien chargée, comme de deux gros de camphre par once d'alcool, mêlée avec de l'eau qu'on y ajoute peu-à-peu & par gouttes, fournit une végétation cristalline observée par Romieu : c'est un filet perpendiculaire, sur lequel sont implantées des aiguilles qui s'élèvent contre le filet, sous un angle de soixante degrés. Cette expérience ne réussit que rarement, & elle demande beaucoup de raisonnement pour la quantité d'eau, le refroidissement, &c.

On donne le nom de *teintures*, d'*elixirs*, de *baumes*, de *quintessences*, &c. aux composés de sucres huileux ou résineux & d'alcool, quand celui-ci est assez chargé de ces substances pour avoir beaucoup de couleur, & pour précipiter abondamment par l'eau. Elles sont, comme les eaux distillées spiritueuses, ou simples lorsqu'elles ne contiennent qu'une matière en dissolution, ou composées lorsqu'elles en contiennent plusieurs à la fois. Ces médicaments se préparent, en général, en exposant le suc en poudre, ou la plante sèche dont on veut dissoudre l'huile volatile ou la résine, à l'action de l'alcool, que l'on aide par l'agitation & par la chaleur douce du soleil ou du bain de sable. Lorsque l'on veut retirer les résines de plusieurs plantes ou substances végétales quelconques à la fois, on a soin de faire digérer d'abord la matière qui est la moins attaquable par l'alcool, & d'exposer successivement à son action les substances qui y sont les plus dissolubles. Quand ce dissolvant est autant chargé qu'il peut l'être, on le décante ou on le filtre. Quelquefois on fait sur le champ une teinture composée, en mêlant plusieurs teintures simples ; telle est la manière de préparer l'*elixir de propriété*, en unissant les teintures de myrrhe, de safran & d'aloës. On peut séparer les résines & les baumes de l'alcool, en versant de l'eau sur les teintures, ou en les distillant ; mais dans ces deux cas, l'alcool retient le principe odorant de ces substances. L'eau n'est pas capable

capable de décomposer les teintures formées avec les extracto-résineux ou les résino-extractifs, comme celles de rhubarbe, de safran, d'opium, de gomme ammoniacque, &c. parce que ces matières sont également dissolubles dans ces deux liquides. Nous avons découvert, il y a quelques mois, que le gluten de la farine de froment, ou la matière glutineuse en général, est dissoluble dans l'alcool pur; on fait qu'une grande quantité de matières colorantes végétales y sont également dissolubles: ainsi, quand on emploie l'alcool pour le faire agir sur des végétaux entiers, ou des matières végétales sèches, comme des racines, des bois, des écorces, des fruits, &c. ce dissolvant porte son action sur un grand nombre de matières à la fois, & on ne parvient à séparer ces matières dissoutes simultanément que par des procédés compliqués, des évaporations ménagées, interrompues & reprises à différentes époques, des additions d'eau également fracturées & faites à différents temps, l'exposition à l'air, &c.

Les matières animales traitées par l'alcool, présentent à-peu-près les mêmes phénomènes que les substances végétales, dont on fait qu'elles se rapprochent par la nature de leurs principes; les résines, le corps sucré, l'extract acide ou amer, les parties colorantes qu'elles contiennent s'y dissolvent; l'albumine, au lieu de s'y combiner, se prend ou se coagule par le calcoique que le mélange d'alcool développe de l'eau qui la délaye, & toutes les humeurs animales qui sont plus ou moins albumineuses, présentent un pareil phénomène de coagulation plus ou moins marquée avec l'alcool; la matière glutineuse n'y est pas plus dissoluble que le mucilage fide des végétaux; la partie fibreuse est condensée, ressermée & conservée par l'alcool; la bile est dissoluble comme un savon dans l'alcool, qui en sépare la portion d'albumine sous la forme de flocons épais; les calculs biliaires le sont également; les graisses proprement dites refusent de s'unir à ce liquide; mais l'espèce d'huile concrète, analogue au blanc de baleine, que nous avons trouvée si abondamment dans les matières animales, s'y dissolvent très-bien, quoique beaucoup plus à chaud qu'à froid. On voit, d'après ces principes, que l'alcool peut être employé avec succès pour analyser les matières animales.

§. IV. Des usages de l'alcool.

L'alcool & l'eau-de-vie ont des usages très-étendus & très-multipliés. On boit la dernière de ces liqueurs pour relever les forces abattues; mais l'excès en est dangereux, parce qu'elle dessèche les fibres & produit des tremblements, des paralysies, des obstructions, des hydropiques. On emploie l'alcool pur uni au camphre, pour arrêter les progrès de la gangrène.

Les eaux distillées spiritueuses (ou l'alcool aromatisé) sont administrées en médecine comme to-

Chimie, Tome II.

niques, cordiales, anti-spasmodiques, stomachiques, &c. On les donne étendues d'eau, ou adoucies par des syrups.

On fait avec ces eaux & le sucre, des boissons connues sous le nom de *ratatiaux* ou de *liqueurs*. Ces boissons bien préparées, & prises à petites doses, peuvent être utiles; mais en général, elles conviennent à peu de personnes, & elles peuvent être nuisibles à un très-grand nombre. L'excès de ces sortes de liqueurs comporte les plus grands dangers; & au lieu de donner des forces & d'augmenter celles de l'estomac, comme on le croit assez communément, elles produisent, le plus souvent, un effet entièrement opposé. Celles qui sont les moins nuisibles, lorsqu'on en boit rarement & avec modération, doivent être préparées à froid, avec une partie d'alcool distillé sur la substance aromatique dont on veut lui communiquer l'odeur, deux parties d'eau & une partie de sucre royal.

Les teintures ont à-peu-près les mêmes vertus que les *eaux distillées spiritueuses*; mais leur action est beaucoup plus énergique; aussi ne les emploie-t-on qu'à une dose beaucoup plus petite: on les donne dans du vin, dans des potions, ou même dans des liqueurs aqueuses. Le précipité qu'elles forment dans ce dernier cas est également suspendu dans le mélange, & d'ailleurs la partie odorante reste en dissolution dans l'alcool.

L'alcool de potasse, ou la teinture acide de tartre, les différentes espèces d'éther, & surtout l'éther sulfurique, les élixirs, les baumes, &c. sont des médicaments très-employés & très-utiles dont il a déjà été fait mention, & qui seront considérés comme tels, avec toute l'étendue qu'ils méritent, dans le dictionnaire de médecine.

Les usages des eaux-de-vie & de l'alcool pur dans les arts, ne sont pas moins multipliés que dans la médecine; le nombre des arts où l'on emploie cette liqueur est très-considérable, aujourd'hui sur-tout où la chimie commence à répandre sa lumière sur les procédés & les pratiques des ateliers & des manufactures: on s'en sert à tous moments dans les parfumeries pour dissoudre des huiles volatiles odorantes, ou des essences, des baumes, du savon, de l'ambre, du mastic, &c. pour purifier plusieurs des produits naturels végétaux ou animaux, qui sont la base des parfums; pour distiller avec des bois, des racines, des écorces, des fruits, des semences qui lui communiquent leur odeur. Les limonadiers ou distillateurs en font une très-grande consommation pour la préparation des liqueurs de table; on s'en sert dans la cuisine & dans l'office, dans l'art du confiseur: c'est un des corps qu'on emploie le plus souvent dans tous les ateliers, pour conserver sans altération les substances végétales ou animales, pour confire, en quelque sorte, les fruits, les bayes, les boutons de fleurs, les écorces aromatiques, les jeunes pousses, &c.

M

L'alcool uni à la résine copale, à l'huile d'aspic ou de grande lavande, à celle de térébenthine, &c. &c. forme des vernis que l'on nomme *scettifs*, parce qu'en appliquant une couche de ces composés sur les corps que l'on veut vernir, l'alcool se volatilise promptement, & laisse sur ces corps une lame résineuse transparente. Les huiles volatiles qu'on y mêle empêchent ces vernis de se dessécher trop promptement, & elles en préviennent la fragilité par l'ondéité qu'elles leur communiquent.

Enfin, il est peu de substances que l'on emploie aussi souvent & avec un égal succès pour les travaux chimiques. C'est un des dissolvans, un des instrumens ou des matériaux qu'on doit avoir en plus grande abondance dans les laboratoires de chimie. Il est spécialement utile, 1°. pour séparer les sels déliquescens d'avec les autres matières salines qui composent les résidus d'eaux minérales évaporées, celui des bois brûlés ou les cendres, les produits salins mélangés, de quelques substances qu'ils proviennent; 2°. pour obtenir à part quelques sels métalliques, & les séparer d'avec d'autres matières qui ne font point dissolubles dans cette liqueur, ou bien pour les avoir purs en résidus indissolubles, s'ils sont mêlés avec des sels terreaux déliquescens, ou avec d'autres sels métalliques susceptibles de s'unir à l'alcool; 3°. pour dissoudre quelques portions de bitume ou d'huile bitumineuse qui se trouvent dans les terres ou les pierres dont on fait l'analyse; 4°. pour purifier les alcalis fixes caustiques, & pour avoir dans le plus grand état de pureté possible la potasse & la soude; 5°. pour préparer les éthers avec les principaux acides minéraux; pour en dissoudre d'autres sans formation d'éther; pour en purifier quelques-uns; 6°. pour séparer, par une analyse bien entendue, les différens principes des végétaux & des animaux; pour en connoître la nature & la quantité; souvent aussi pour conserver quelques-uns de leurs matériaux, afin de pouvoir s'en servir au besoin, ou en faire une analyse plus exacte & plus détaillée dans un autre temps; en un mot, soit qu'on considère l'alcool comme entrant lui-même dans des combinaisons sans décomposition, ou comme donnant naissance à de nouveaux produits par les modifications qu'il éprouve de la part des corps avec lesquels on le traite, ou comme fournissant un instrument de départ pour séparer des substances différentes unies ensemble par la nature ou par l'art, ou comme principe conservateur d'un grand nombre de matières très-composées par la puissance vivante des corps organiques, il est d'une utilité aussi immédiate & indispensable que multipliée dans les expériences de chimie.

Telle est la raison pour laquelle nous l'avons examiné si en détail dans cet article, auquel il est nécessaire de joindre la lecture des articles, FERMENT, FERMENTATIONS, VINS, LIQUEURS,

SUCRE, & la plupart des articles généraux de chimie, comme ACIDES, AIR, AFFINITÉS, COMBUSTION, EAU, GAZ, HYDROGÈNE, &c. si l'on veut avoir le complément & l'ensemble de toutes ces connoissances, auxquelles tiennent & son histoire & ses grands usages.

ALCOOL ACÉTÉUX. Cette expression doit désigner dans la nouvelle nomenclature, la combinaison de l'alcool avec l'acide acétique, ou le vinaigre distillé. Ces deux liquides se mêlant bien, ils produisent même un peu de chaleur dans le mélange; mais il n'en résulte pas une combinaison, il n'y a aucune réaction entre leurs principes; l'oxigène paroît être trop adhérent aux bases d'hydrogène & de carbone qui constituent l'acide acétique, pour qu'il se transporte sur les principes de l'alcool. On n'observe point la dulcification de l'acide par la même raison. Cette union de l'alcool & de l'acide acétique n'est d'aucun usage en chimie ni en pharmacie; il paroît qu'on ne l'emploie non plus dans aucun art.

ALCOOL ACÉTIQUE. Il n'en est pas de même de l'acide acétique ou vinaigre radical & de l'alcool. La surabondance d'oxigène, contenu dans cet acide, comparée à celle qui existe dans l'acétéux, détermine une action beaucoup plus marquée sur les principes de l'alcool, aussi ces deux liquides présentent-ils une réaction très-considérable l'un sur l'autre. Dans le moment où on les mêle, il se produit une grande chaleur; il se dégage presque tout à-coup une odeur suave & vive, qui annonce la formation de l'éther; mais avant la distillation & l'emploi d'une chaleur artificielle, il n'y a point de véritable éther de formé, l'acide acétique est seulement adouci, dulcifié, comme les acides minéraux, & c'est ce mélange ainsi adouci qui doit porter le nom d'alcool acétique. Voyez le mot ALCOOL.

ALCOOL ARSENIQUE. L'acide arsenique ne se combine point avec l'alcool, & il n'y éprouve pas même de dissolution simple. Scheele dit que l'alcool n'éprouve aucun changement avec l'acide arsenique, ni par la digestion, ni par la distillation; ainsi il n'y a pas d'alcool arsenique connu. Voyez les mots ACIDE ARSENIQUE, ALCOOL & ARSENIQUE.

ALCOOL AZOTÉ. Quoiqu'on ne connoisse point la combinaison de l'alcool avec l'azote, il est possible qu'elle existe dans nos laboratoires; peut-être connoitra-t-on quelque jour un pareil composé dans le résidu de l'éther nitrique. Une nomenclature dont la série méthodique comprend également & ce qui est connu, & ce qui ne l'est pas encore, puisqu'elle embrasse tous les composés possibles, doit, en présentant des combinaisons nouvelles, éveiller l'attention des chimistes; & l'on a trop

de preuves dans les sciences expérimentales de la création d'idées & de découvertes réelles par la seule fixation de l'esprit fut des découvertes possibles, pour qu'on pût se permettre de négliger de pareilles indications, quelque éloignées qu'elles paraissent d'abord des idées & des connaissances acquises. (Voyez AZOTE.)

ALCOOL BENZOÏQUE. L'acide benzoïque est très-dissoluble dans l'alcool, & c'est cette dissolution saturée qui doit porter le nom d'alcool benzoïque. Scheele a fait quelques expériences exactes sur cette combinaison. Suivant lui, le mélange d'acide benzoïque & d'alcool ne donne point d'éther; mais si l'on distille une partie de cet acide concret avec trois parties d'alcool, & une demi-partie d'acide muriatique ordinaire, il passe d'abord de l'alcool pur; lorsqu'on voit dans la cornue deux liqueurs différentes, il faut changer de récipient, & on obtient en continuant la distillation de l'éther, dont une partie fumage l'eau, & la plus grande partie va au fond. Cet éther a l'odeur du benjoin; il brûle avec une flamme blanche, & il donne de la fumée; dissous dans l'alcool de potasse & distillé, il se décompose comme l'éther acétique; ce qui reste dans la cornue, après la distillation, est dissoluble dans l'eau, & en y versant un acide, l'acide benzoïque coagule le mélange en se précipitant.

L'alcool benzoïque, ou la dissolution d'acide benzoïque dans l'alcool, est employé pour purifier cet acide. (Voyez ALCOOL.)

ALCOOL BOMBIQUE. L'acide bombique découvert par M. Chauffeur, est dissoluble dans l'alcool, & cette dissolution employée par le chimiste de Dijon, pour obtenir l'acide bombique pur, doit être nommée alcool bombique; on la distille pour avoir l'acide bombique à part. (Voyez le mot ACIDE BOMBIQUE, à la page 410 du premier volume.)

ALCOOL BORACIQUE. Il y a long-tems qu'on connoit la dissolubilité de l'acide boracique dans l'alcool. Cette dissolution que la méthode de nomenclature moderne doit désigner par le nom d'alcool boracique, a été décrite dans l'article alcool; elle est remarquable par sa propriété de brûler avec une belle flamme verte. (Voyez ALCOOL.)

ALCOOL CAMPHORIQUE. Suivant les règles de nomenclature exposées & employées dans ce dictionnaire, l'expression d'alcool camphorique doit désigner la combinaison de l'alcool avec l'acide camphorique; mais cette combinaison n'est pas encore connue. Depuis la découverte de l'acide camphorique faite il y a plus de six ans, par M. Kofegarten, on n'a presque pas répété ses expériences, il n'existe point de cet acide dans la plupart des labora-

toires, & aucun chimiste n'a parlé de sa dissolubilité dans l'alcool; mais cette lacune ne doit point empêcher d'insérer dans la nomenclature, une dénomination appropriée à une combinaison non-fonctionnelle possible, mais même très-vraisemblable, d'après ce qu'on fait sur la dissolubilité de la plupart des acides végétaux dans l'alcool. (Voyez les mots ALCOOL & CAMPHRE.)

ALCOOL CAMPHRÉ. La dissolution du camphre dans l'alcool doit porter le nom d'alcool camphré. Les propriétés de cette combinaison, les phénomènes qu'elle présente à l'observateur, les usages auxquels on l'emploie, en un mot tout ce qui est relatif à son histoire chimique, a été présumé à l'article ALCOOL. (Voyez ce mot.)

ALCOOL CARBONÉ. Il doit entrer dans les principes d'une nomenclature méthodique, d'embrasser toutes les combinaisons possibles quoiqu'encore inconnues, comme toutes celles qui ont été examinées, & dont on a déterminé les propriétés. C'est dans cette vue que nous indiquons ici l'alcool carboné. Aucun chimiste n'a encore trouvé jusqu'ici le moyen d'unir le carbone à l'alcool; mais cela ne dit point que cette union soit impossible. On peut même prévoir qu'on y réussira quelque jour, puisqu'on fait bien en général que plusieurs matières combustibles, le soufre, le phosphore, se combinent avec l'alcool, & forment avec lui des composés remarquables par leurs propriétés. On fait d'ailleurs que le carbone est un des principes de l'alcool; il n'est pas impossible que ce principe soit excédent aux autres dans quelque combinaison encore inconnue, & alors le nom que nous donnons ici pourra servir pour désigner cette modification. (Voyez l'article CARBONE.)

ALCOOL CARBONIQUE. Nous nommons ainsi la dissolution d'acide carbonique dans l'alcool. On fait que par l'agitation l'alcool dissout ou absorbe presque son volume de gaz acide carbonique. (Voyez ALCOOL.)

ALCOOL CITRIQUE. Lorsqu'on mêle du suc de citron avec l'alcool, il se fait un coagulum considérable, formé par la matière mucronée & presque gélatineuse qui abandonne l'acide citrique à mesure que celui-ci s'unit à l'alcool. La liqueur qui passe par le filtre est l'alcool citrique: il ne donne point d'éther. (Voyez ALCOOL.)

ALCOOL D'AMMONIAQUE. On doit nommer alcool d'ammoniaque, l'union de l'ammoniaque & de l'alcool. Cette combinaison se fait très-facilement. Les deux liquides s'échauffent, mais il ne paroît pas y avoir de réaction entre leurs principes & de décomposition; c'est une simple pénétration ou dissolution. (Voyez ALCOOL & AMMONIAQUE.)

ALCOOL DE POTASSE. La potasse pure est entièrement & facilement dissoluble dans l'alcool. Cette dissolution est d'une couleur rouge brune, elle est épaisse, très-âcre; elle donne des cristaux de potasse par l'évaporation. C'est la vraie teinture âcre de tartre, ou le *lilium de Paracelsus*. Elle est employée avec succès pour obtenir la potasse bien pure d'après le procédé de M. Berthollet. Si l'on veut conserver de la potasse bien caustique, il faut avoir cette dissolution toute préparée dans les laboratoires de chimie. (Voyez les mots **ALCOOL & POTASSE**.)

ALCOOL DE SOUDE. C'est ainsi qu'on désigne dans la nouvelle nomenclature méthodique la dissolution de soude dans l'alcool. Il faut se rappeler ici que le mot **SOUDE** est donné à l'alcali fixe marin ou minéral bien pur, bien caustique. Il n'y a que dans cet état que cette espèce d'alcali est dissoluble dans l'alcool: aussi cette dissolution est-elle le seul moyen d'avoir la soude parfaitement pure, & séparée de toutes les plus petites quantités d'acide carbonique, de silice, de chaux, d'alumine & des sels neutres qui l'accompagnent si souvent. L'alcool de soude est comme l'alcool de potasse, d'une couleur rouge brune, d'une consistance épaisse, d'une causticité énorme. On doit le conserver dans les laboratoires pour se procurer au besoin la soude pure; on l'obtient cristallisée & blanche en évaporant cette dissolution alcoolique dans une petite cornue qu'on doit tenir presque pleine. (Voyez les mots **ALCALI**, **ALCOOL & SOUDE**.)

ALCOOL FLUORIQUE. L'acide fluorique s'unit très-facilement & très-prompement à l'alcool; il se dégage de la chaleur pendant cette union & par l'action même qui la détermine. C'est cette combinaison que nous nommons alcool fluorique. Schéele remarque, dans son analyse du *spark fluor*, ou fluat de chaux natif, que lorsqu'on reçoit le gaz acide fluorique dégagé de ce sel terreux par l'acide sulfurique dans de l'alcool au lieu de le recevoir dans l'eau, il ne se forme ni croute ni précipité de silice. Par ce simple procédé on n'obtient point d'éther; mais en redistillant l'alcool fluorique, il se dégage quelques vapeurs qui annoncent la formation d'un peu d'éther. Voici ce que Schéele dit à cet égard dans ses Expériences sur l'éther. « Je mis dans une cornue partie égale d'acide vitriolique & de spath fluor pulvérisé; j'y adaptai un récipient, dans lequel il y avoit trois onces d'alcool, & je plaçai la cornue sur du sable chaud. Vingt-quatre heures après, je versai cet esprit, qui étoit fumant, dans une cornue, & je distillai à la manière ordinaire: l'acide fluorique passa de tous côtés à travers les luts; mais je ne pus découvrir aucune trace d'éther. Alors je saturai de nouveau de gaz fluorique l'alcool trouvé dans le récipient, comme la première

fois; je le jettai ensuite dans une cornue avec trois onces de manganèse pulvérisé, & je procédai à la distillation: elle se comporta cette fois bien différemment; l'acide ne pénétra pas à travers les luts; je sentis une odeur d'éther: quand tout l'esprit eut passé, je versai le tout dans une autre cornue, & je rectifiai à un feu doux. J'obtins par-là un peu d'éther, qui avoit une odeur agréable, approchant de celle de l'éther nitreux. »

ALCOOL FORMIQUE. L'acide formique, obtenu par la lessive des fourmis dans l'eau chaude & purifié par la distillation, se dissout très-prompement & très-facilement dans l'alcool, c'est là notre alcool formique. Hoffman avoit formé en partie cette combinaison en consillant de distiller l'alcool sur les fourmis, & il nommoit le produit de cette distillation *esprit de magnanimité*. On obtient même une espèce d'éther de cette combinaison. (Voyez les mots **ACIDE FORMIQUE**, **ALCOOL & ÉTHER FORMIQUE**.)

ALCOOL GALLIQUE. Il y a long-temps qu'on fait en chimie, qu'en faisant digérer de l'alcool sur des noix de galle en poudre, on en extrait la matière qui précipite en noir le fer de ses dissolutions, & qu'on nommoit principe altringent. Mais ce n'est que par les travaux des chimistes de l'académie de Dijon, & de Schéele, que l'on sait qu'il se dissout dans cette opération un acide particulier nommé acide gallique, dans l'alcool. Cependant on doit remarquer que l'alcool gallique, préparé par la simple digestion de l'alcool sur les noix de galle, n'est pas une dissolution pure d'acide gallique, qu'il s'y trouve mêlé avec une matière extractive qui le rend altérable, & que pour l'avoir dans son état de pureté, il faut commencer par purifier cet acide en suivant le procédé de Schéele, c'est-à-dire, mettre des noix de galle en poudre dans un vaisseau de verre avec quatre fois leur poids d'eau, les laisser macérer pendant quelques jours, décarter l'eau, la placer dans un nouveau vase de verre, l'exposer à l'air pendant plusieurs semaines, enlever les moisissures qui se forment à la surface, détacher les groupes de cristaux déposés sur ses parois, les dissoudre dans de l'eau distillée, & évaporer cette dissolution. Alors si l'on prend cet acide ainsi purifié, on en forme avec l'alcool le véritable alcool gallique, qui peut être employé à un grand nombre d'expériences, & qu'on doit avoir toujours en provision suffisante dans un laboratoire de recherches.

ALCOOL HYDROGÈNE. Voici encore une expression nouvelle qui ne retracer aucun fait connu dans la science, mais que nous croyons propre à faire éclore des idées nouvelles, & à conduire à quelques découvertes précieuses. L'affinité que l'on connoît à l'alcool pour s'unir à plusieurs

substances combustibles, doit faire penser qu'il existe une attraction particulière entre l'alcool & l'hydrogène. On n'a point encore parlé de cette combinaison; mais aucun chimiste ne l'a encore traitée de manière à la faire réussir. Quelques essais de M. Priestley doivent conduire à penser que ces expériences méritent au moins d'être suivies avec exactitude. On sait que l'hydrogène est le principe le plus abondant de l'alcool, mais qu'il y entre dans une proportion déterminée. Si dans quelques combinaisons alcooliques, ces proportions sont changées, peut-être existe-t-il alors un alcool avec excès d'hydrogène, un alcool hydrogéné. Il est vrai que dans des circonstances analogues, il est déjà connu que l'hydrogène se sépare de l'alcool & se dégage dans l'état de gaz; mais il n'est pas impossible qu'il se forme une portion d'alcool hydrogéné: au moins cette indication mérite bien qu'on ne la perde pas de vue. (Voyez les articles HYDROGÈNE & GAZ.)

ALCOOL LACTIQUE. Lorsqu'on prépare l'acide lactique, ou l'acide du lait aigri, à la manière de Schéele, c'est-à-dire, que pour le purifier on évapore le petit-lait aigri jusqu'à huitième de son volume pour en séparer le fromage, qu'on y ajoute ensuite de l'eau de chaux pour précipiter l'acide phosphorique, & de l'acide oxalique pour enlever le peu de chaux qui y reste dissoute en état de lactate de chaux; enfin qu'après l'avoir épaissi en consistance de miel, on veut l'avoir parfaitement pur & séparé de la portion de sucre de lait, & des autres substances étrangères qui peuvent s'y trouver mêlées, on le dissout après cette dernière évaporation dans suffisante quantité d'alcool, on filtre la liqueur qui est alors l'alcool lactique; cette liqueur est rougeâtre. On doit en avoir une certaine quantité ainsi préparée dans un laboratoire de chimie, destiné aux recherches sur cette science. Si l'on veut avoir l'acide lactique seul & pur, on évapore l'alcool dans des vaisseaux fermés, dans une cornue, & il reste pur au fond de la cornue. Voyez ACIDE GALACTIQUE; c'étoit ainsi que le nommoit M. Morveau, lorsqu'il rédigeoit la première partie du premier volume de ce dictionnaire.

ALCOOL LITHIQUE. On n'a point reconnu d'action réciproque, ni même d'union simple jusqu'ici, entre l'acide lithique ou la matière du calcul urinaire & l'alcool; mais comme on n'a point fait à beaucoup près toutes les recherches possibles sur cet acide animal, & comme il doit entrer dans le plan de ces recherches de mettre & de laisser en contact ces deux corps l'un avec l'autre, nous plaçons cette dénomination ici, pour rappeler d'une part cette expérience aux chimistes, & pour désigner ou étiqueter le vase où sera placé ce mélange d'alcool & d'acide lithique dans les laboratoires. (Voyez ACIDE LITHIQUE, tom. I. pag. 407 & suiv.)

ALCOOL MALIQUE. L'acide malique qui existe en si grande quantité dans les pommes & dans la plupart des fruits aigres ou acides, dont Schéele a reconnu la nature particulière & les principales propriétés, est entièrement dissoluble dans l'alcool. Schéele s'est même servi de ce dissolvant pour purifier l'acide malique, & le séparer de la portion de mucilage qu'il peut contenir; c'est cette dissolution qui doit porter le nom d'alcool malique. Voyez l'histoire de l'ACIDE MALIQUE, sous l'ancien nom d'ACIDE MALUSIEN, tom. I. page 343, 349 & suivantes.

ALCOOL MOLYBDIQUE. L'acide molybdique n'est point dissoluble dans l'alcool, & il paroîtroit, d'après cela, inutile d'adopter la dénomination placée ici, si nous n'avions à faire observer, qu'elle peut avoir son avantage soit pour indiquer aux chimistes l'utilité de faire quelques expériences suivies sur ce point, & pour apprécier l'action réciproque de ces deux corps laissés pendant long-temps en contact, soit pour désigner ce mélange ou le vase même qui le contiendra. Il est vraisemblable qu'à l'aide d'un temps plus ou moins long, l'acide molybdique, comme tous les acides métalliques, ou leurs oxides, sera désoxygéné, ou au moins désacidifié par l'alcool. (Voyez les mots ACIDE MOLYBDIQUE, ALCOOL & ALCOOL TUNSTIQUE.)

ALCOOL MURIATIQUE. Si l'acide muriatique a des principes trop fortement unis pour que leur séparation puisse être déterminée par ceux de l'alcool, & pour que celui-ci éprouve aucune action marquée de sa part, si d'après cela il est impossible d'obtenir une espèce d'éther en traitant l'alcool par cet acide, au moins y a-t-il cependant une réaction remarquable entre ces deux composés entiers, quoiqu'elle ne se passe point entre leurs composans qui restent dans l'équilibre les uns par rapport aux autres. Quand on mêle de l'acide muriatique concentré avec de l'alcool rectifié, il se produit de la chaleur, du mouvement, & il se dégage une vapeur mixte où l'on distingue l'odeur de ces deux corps: il y a union & pénétration sans décomposition. Il en résulte un acide adouci ou dulcifié comme on le nommoit autrefois; ce premier mouvement calmé, la combinaison simple reste tranquille, en équilibre, & n'éprouve point d'autre altération. C'est l'alcool muriatique ou l'acide marin dulcifié des anciens chimistes.

ALCOOL MURIATIQUE OXYGÉNÉ. L'alcool absorbe l'acide muriatique oxygéné avec assez de rapidité; il se produit de la chaleur dans cette combinaison. L'alcool prend une odeur particulière & qui annonce un commencement d'éthérification; mais il est encore loin d'être de l'éther. C'est dans ce premier état qu'il mérite le nom

d'alcool muriatique oxygéné. On a traité très au long de cette action à l'article ALCOOL.

ALCOOL NITREUX. C'est le nom que doit porter l'union de l'alcool avec l'acide nitreux, mais cette combinaison n'est pas permanente; l'action de ces deux corps est même si rapide, que pour peu que l'acide soit concentré & l'alcool rectifié, on ne peut pas les mettre en contact sans qu'il y ait un mouvement considérable, un dégagement violent de gaz nitreux, & une conversion prompte de l'alcool en éther. Cela surtout a lieu dans la combinaison dont il est question ici; car l'acide nitreux, contenant une portion de gaz nitreux uni à l'acide nitrique, gaz auquel il doit sa couleur rouge, est plus près de se laisser décomposer, que ne le seroit de l'acide nitrique ordinaire. Cependant si l'on prend de l'acide nitreux affaibli & qui a déjà perdu une partie de son gaz nitreux par son union avec l'eau, il peut rester uni à l'alcool sans le faire passer à l'état d'éther, & l'alcool nitreux qu'il forme alors est la même chose que ce qu'on nommoit autrefois *esprit de nitre dulcifié*. Voyez les mots ACIDE NITREUX & ALCOOL.

ALCOOL NITRIQUE. C'est le mélange de l'acide nitrique & de l'alcool, qui doit porter le nom d'alcool nitrique. Il faut remarquer que l'acide nitrique diffère de l'acide nitreux, parce que ses deux principes, l'azote & l'oxygène, sont dans de justes proportions de combinaison, tandis que dans l'acide nitreux il y a une portion d'oxygène de moins, & conséquemment une partie de l'azote presque libre; l'acide nitrique est moins voisin de la décomposition que l'acide nitreux: d'après cela il est certain que l'alcool nitrique fait avec cet acide assez affaibli pour ne pas porter une action très-rapide sur l'alcool, doit être plus permanent que l'alcool nitreux: l'acide y est singulièrement adouci, & semble y prendre la saveur d'un acide végétal. Voyez le mot ALCOOL.

ALCOOL NITRO-MURIATIQUE. On sait que l'acide nitro-muriatique, que les anciens chimistes nommoient *eau régale*, est le produit d'une réaction singulière entre les deux acides nitrique & muriatique; que l'acide mixte qui en résulte est très-voisin de la décomposition, & que pour peu que quelque substance vienne changer même légèrement l'équilibre qui existe entre les deux acides qui le constituent, il est tout-à-coup rompu, & il s'exécute entre leurs principes une réaction qui les combine dans un nouvel ordre. L'alcool joue lui-même ce rôle à l'égard de l'acide nitro-muriatique; on ne peut avoir d'alcool nitro-muriatique, c'est-à-dire, de mélange de cet acide mixte avec l'alcool, que lorsqu'on emploie l'acide affaibli avec de l'eau; dans tout autre cas l'alcool passe à l'état d'éther. Voyez les mots

ACIDE NITRO-MURIATIQUE, ALCOOL & ÉTHER.)

ALCOOL OXALIQUE. L'acide oxalique pur est dissoluble dans l'alcool; on en a sur-tout la preuve dans l'ancienne expérience d'Urban Hïerne, qui consiste à mêler de l'acide nitreux & de l'alcool, & à obtenir par une lente évaporation des cristaux minces & tout hérissés, que ce chimiste comparoit à des chenilles velues. Ces cristaux sont de l'acide oxalique, formé aux dépens de l'alcool & par la décomposition de l'acide nitrique, & tenu en dissolution dans la portion d'alcool non décomposée; c'est cette dissolution qui doit porter le nom d'alcool oxalique. L'acide oxalique ou l'oxalate acide de potasse, qu'on connoît dans le commerce sous le nom de *sel d'oselle*, n'est pas dissoluble dans l'alcool. (Voyez l'article ALCOOL.)

ALCOOL PHOSPHORÉ. Le phosphore, espèce de corps combustible, dont on ne connoît pas la nature intime ou la composition, & qu'on n'a point encore décomposé, puîsqu'il dans toutes les modifications ou les combinaisons qu'on lui fait subir, il s'unit en entier, & sans agir par des attractions particulières de ses premiers principes, le phosphore se dissout bien dans l'alcool, c'est cette dissolution que nous nommons *alcool phosphoré*; elle est remarquable par son odeur fétide, sa décomposition par l'eau distillée, & la séparation du phosphore qui a lieu dans ce cas de deux manières; une partie du phosphore se précipite en poussière blanche qui trouble les liqueurs, & une autre portion se dégage en vapeur blanche qui répand une flamme très-belle dans l'obscurité. (Voyez le mot PHOSPHORE.)

ALCOOL PHOSPHOREUX ET PHOSPHORIQUE. Ce sont les dénominations qu'il faudroit adopter pour désigner les combinaisons de l'alcool avec l'acide phosphoreux, & avec l'acide phosphorique, si ces combinaisons avoient lieu. Tous les chimistes qui ont traité de l'acide phosphorique, s'accordent à dire qu'il n'est pas dissoluble dans l'alcool; ils conseillent même ce dissolvant pour séparer & purifier cet acide; cependant, M. Lavoisier, ainsi que MM. les chimistes de Dijon ont vu cet acide se mêler avec l'alcool comme le fait l'eau, ce qui annonce une combinaison assez remarquable; mais l'acide phosphoreux, ou l'acide phosphorique retenant une portion de phosphore, pouvoit être susceptible de se combiner encore mieux avec l'alcool. Si l'on emploie la chaux & la distillation, il paroît aussi que l'alcool enlève à l'acide phosphoreux la portion de phosphore qui n'est pas saturée d'oxygène, & ramène l'acide phosphoreux à l'état d'acide phosphorique. (Voyez les articles ACIDE PHOSPHORIQUE & ALCOOL.)

ALCOOL PRUSSIQUE. Quoique Schéele ait examiné avec soin les propriétés de l'acide prussique pur, préparé par le procédé ingénieux qu'il a fait connaître, il n'a rien dit de sa combinaison avec l'alcool, & aucun chimiste n'en a fait mention depuis. Cependant, il est vraisemblable que cette combinaison a lieu, & qu'il existe un alcool prussique.

ALCOOL PYRO-LIGNEUX. Dans ses recherches sur l'acide fourni par le bois mis en distillation, M. Gœtting a trouvé que cet acide s'unit à l'alcool avec facilité. Cette union est accompagnée de chaleur, de mouvement & de dégagement de bulles de fluide élastique, c'est l'alcool pyro-ligneux, il en résulte promptement de l'éther. Voyez le mot ACIDE-LIGNIQUE suivant l'ancienne nomenclature, adoptée dans la première partie du volume de cet ouvrage. (Voyez aussi le mot ÉTHER PYRO-LIGNEUX).

ALCOOL PYRO-MUQUEUX. L'acide que l'on obtient par la distillation des gommes, du sucre, du miel, de la manne, & de tous les mucilages en général, se mêle facilement à l'alcool. Ce mélange que l'on peut faire en toutes proportions comme avec l'eau, annonce même une combinaison intime, puisqu'il a lieu avec chaleur, dégagement de petites bulles, pénétration. C'est cette dissolution qui doit porter le nom d'alcool pyro-muqueux. On ne l'a encore que peu examiné jusqu'à présent.

ALCOOL PYRO-TARTAREUX. Il n'est pas difficile de savoir que l'acide qu'on obtient de la distillation de l'acidule tartareux ou du tartre, & que nous nommons acide pyro-tartareux, se dissout très-bien dans l'alcool, comme le sont en général tous les produits du feu, puisqu'il suffit de verser un peu de cet acide empyreumatique dans l'alcool, pour s'en convaincre. Mais on n'a encore rien dit de la nature & des propriétés de cette combinaison, parce qu'aucun chimiste n'a entrepris des recherches nécessaires pour bien connaître la nature & les propriétés de l'acide pyro-tartareux.

ALCOOL RÉSINEUX. On a vu dans l'histoire de l'alcool, que ce liquide dissolvait se combine très-facilement aux huiles volatiles & aux résines des végétaux & des animaux. C'est cette combinaison que nous nommons en général alcool résineux : on la désignoit autrefois par le nom de teinture, parce que plusieurs résines communiquent leur couleur à l'alcool. Mais comme cette coloration n'est pas un caractère essentiel de cette combinaison, puisqu'une foule de substances huileuses, volatiles & résineuses n'ont point de couleur, cette dénomination de teinture ne doit pas être conservée : d'ailleurs les vernis, dans la fabrication desquels on a le plus grand intérêt de ne pas donner de couleur à l'alcool, sont véritable-

ment des espèces d'alcool résineux, quoiqu'on ne les ait jamais placés parmi les teintures ; ainsi le nom nouveau d'alcool résineux a une latitude beaucoup plus grande que celui de teintures.

Quoique l'histoire de la combinaison des huiles volatiles & de l'alcool ait été traitée avec assez de détails dans l'article général de l'alcool, il importe d'ajouter ici quelques observations aux généralités qui ont été présentées ailleurs.

1°. L'alcool ne dissout pas avec une égale facilité toutes les résines & toutes les huiles volatiles. Il en est qui se fondent très-vite dans cette liqueur, d'autres résistent plus long-temps avant de s'y dissoudre. Quelques-unes exigent une addition plus ou moins considérable de calorique pour être dissoute ; l'expérience seule & l'habitude conduisent à cette connoissance dans les laboratoires de chimie, & il est impossible de donner des règles générales sur cet objet, parce qu'on ne fait point encore à quelles causes font dues les différences des résines & des huiles volatiles par rapport à leur union avec l'alcool.

2°. Toutes les dissolutions d'huiles volatiles & de résines dans l'alcool, ont une saveur âcre, chaude & amère ; elles sont souvent odorantes & aromatiques. Quand on les évapore, on obtient la résine sous forme molle, & presque sans altération : cette résine ainsi séparée, devient sèche & cassante par son exposition à l'air.

3°. Les alcools résineux sont décomposés par l'eau, qui a plus d'affinité avec l'alcool que n'en ont les résines. Celles-ci se précipitent ou se séparent sous la forme d'une sorte de poussière blanche & colorée qui rend la liqueur mêlée opaque comme du lait : en la recueillant & la faisant chauffer, elle se ramollit, & reprend sa première forme. Les huiles volatiles se rassemblent à la surface & tous les globules qui se sont séparés d'abord, se réunissent peu-à-peu, & forment les huiles. Cependant l'effet de ces décompositions, de ces précipitations, n'est pas certainement de remettre exactement les résines & les huiles dans un état parfaitement semblable à celui qu'elles avoient d'abord ; trois causes dont on n'a pas encore assez apprécié l'influence, paroissent concourir à modifier & à changer les résines & les huiles volatiles ; la première est une portion d'alcool qui y reste adhérente ; la seconde est la perte d'une partie plus ou moins grande de leur arôme qui se volatilise pendant la dissolution & la précipitation ; la troisième est due à la précipitation de l'oxygène qui paroît avoir lieu pendant ces opérations ; c'est sans doute à cette dernière cause qu'est due la conversion des huiles volatiles en résines qui a lieu dans la suite de ces procédés. On voit que sous ce point de vue on n'a point encore bien apprécié tout ce qui se passe dans les combinaisons nommées alcools résineux.

4°. On peut dissoudre plusieurs huiles volatiles & plusieurs résines à la fois dans l'alcool ; ces

mélanges, ou plutôt ces combinaisons complexes, ont tous les jours lieu dans la pharmacie & dans les arts : il est cependant très-vraisemblable que les différents degrés d'affinités qui existent entre les résines diverses & l'alcool, doivent influer sur la manière dont elles se dissolvent les unes par rapport aux autres, quand on les présente ensemble à l'action de ce dissolvant ; M. Tartelin est le seul chimiste qui ait commencé un travail sur cet objet. Il en a donné les résultats dans un Mémoire inséré parmi ceux de l'Académie de Dijon (année 1783. p. 1.) Pour déterminer les degrés d'affinité de l'alcool pour les divers corps résineux, M. Tartelin n'a pas cru pouvoir se servir de la dissolubilité composée de ces corps tels qu'ils sont dans le commerce, à cause des impuretés qui les accompagnent ; mais il a pris des alcools résineux saturés de chacune des résines, il en a évaporé des quantités égales, & il a jugé par celle du produit obtenu du degré d'affinité qui existe entre elles & l'alcool. Cependant il est plus exact de désigner les résultats par le nom de degrés de dissolubilité, que par celui d'affinité, parce qu'il est possible qu'une résine dissoluble en moindre quantité qu'une autre dans l'alcool, ait cependant plus d'adhérence pour lui. Voici ce qu'a trouvé M. Tartelin sur les dissolutions saturées de vingt-cinq résines dont il a évaporé deux onces.

TABLE des quantités de résines dissoutes par l'alcool, & obtenues par l'évaporation de cette liqueur.

Noms des alcools résineux.	Produit de l'évaporation.
Alcools résineux d'aloës.....	188 grains.
— de résine de gayac.....	168
— de benjoin en larmes.....	154
— en sortes.....	148
— d'assa fœtida.....	144
— de sandarach.....	142
— de résine de jalap.....	136
— de baume en coque.....	108
— de gomme gutte.....	104
— de résine de scammosée.....	96
— de baume de tolu.....	92
— de sangdragon.....	84
— de myrrhe.....	78
— de gomme élémi.....	76
— de gomme ammoniacque.....	74
— de galbanum.....	72
— d'oliban.....	60
— de sagapenum.....	48
— de bdellium.....	48
— d'euphorbe.....	48
— de fuccin.....	48
— d'opopanax.....	48
— de la tacaqua.....	48
— de bitume de judée.....	24
— de charbon de terre.....	24

Le travail dont cette table offre le résultat, est sans doute bien loin de répondre encore exactement à ce qu'on doit désirer sur les attractions des alcools pour les résines ; il aurait fallu déterminer comment elles se comportent toutes réciproquement avec ce dissolvant. Ce n'est pas que M. Tartelin n'ait eu aussi cette idée ; mais il n'a pas fait un assez grand nombre d'expériences pour y parvenir.

Sans doute c'est à cet ordre des affinités que tient le phénomène de précipitation des alcools résineux, qui se présente souvent quand on les mêle les uns avec les autres. Les observations de M. Tartelin sur cet objet doivent être citées ici. Il est probable, dit-il dans l'endroit indiqué, que cette précipitation n'a lieu qu'à raison des différentes affinités des résines avec l'alcool. Après avoir donné les résultats de ses essais compris dans la table que nous avons présentée d'après lui, il ajoute les considérations suivantes. « On voit par les détails de cette table, que l'aloës est de toutes les résines que j'ai éprouvées, celle qui a le plus d'affinité avec l'alcool, & le bitume celle qui en a le moins. Il y aurait eu de la précipitation à en conclure que dans le mélange de ces différentes teintures, le précipité, lorsqu'il aurait lieu, devoit se faire aux dépens de celle qui avoit le moins d'affinité avec l'alcool ; en effet ce menstère étant saturé dans l'une & dans l'autre des teintures, ne pourroit pas devoir abandonner une des deux substances qu'il tenoit en dissolution. L'expérience seule pouvoit m'éclaircir sur cet objet, & voici quels en ont été les résultats. »

« Je fis plusieurs mélanges de ces teintures, & je trouvai que toutes celles des substances résineuses, dont l'affinité avec l'alcool étoit égale, ne donnoient aucun précipité lorsqu'on les mêloit ; que le mélange donnoit un précipité d'autant plus abondant, qu'il y avoit plus de différence entre la dissolubilité de ces substances ; qu'ainsi le phénomène de la précipitation étoit réellement conséquent aux différents degrés d'affinités des résines avec l'alcool.

« Il me restoit à reconnoître si ces précipités étoient composés d'une seule des résines dissoutes ou de toutes les deux. Le résultat de mes expériences ne m'autorise pas à prononcer affirmativement sur cet objet intéressant. Je me propose de les répéter, de les multiplier de manière à pouvoir faire cesser toute incertitude ; mais en attendant je vais rendre compte de ce que j'ai observé. J'ai mélangé des teintures de résines odorantes & de résines inodores, de dissolubilités différentes, & qui devoient, suivant mes premières expériences, me donner un précipité. J'ai examiné ensuite ce précipité, il avoit conservé de l'odeur ; mais après un temps plus ou moins long, l'odeur s'est dissipée, & la quantité du précipité a été faiblement diminuée. Ce résultat me

paraît

paroît prouver que ces deux réſines avoient contribué à former ce précipité, & dès-lors qu'il n'eſt pas l'effet de la différence de leur affinité; mais qu'elle eſt donc la cauſe de ce phénomène? C'eſt un nouveau problème que j'ai cherché à résoudre par l'expérience ſuivante.

» J'ai mêlé de la teinture d'aloës, ſubſtance très-ſoluble dans l'alcool, & de celle d'aſſa-fœtida qui l'eſt moins. J'ai fait évaporer ce mélange, & ayant verſé ſur le réſidu la même quantité d'alcool qui avoit tenu ces réſines en diſſolution, j'ai obſervé que ce menſtruelle a refusé d'en diſſoudre une partie, & qu'il a pris environ quatre grains de moins par once.

» Cette différence pourroit engager à ſuppoſer que les réſines en ſe combinant, forment un compoſé qui devint moins diſſoluble, & qu'ainſi les précipités ſont l'effet de ce changement de diſſolubilité. Cependant j'ai cru reconnoître, dans cette expérience, que l'aſſa-fœtida, moins diſſoluble que l'aloës, faiſoit la plus grande partie de la portion non diſſoute, & cette remarque m'engage à ſuſpendre encore mon jugement, & à attendre, avant de le haſarder, que d'autres expériences aient diſſipé toutes mes incertitudes. Je ſouhaiterai même que celles-ci puiſſent détourner quelqu'un d'en tenter de pareilles. Mais je crois devoir, pour leur épargner quelques tentatives illuſoires, les engager à n'employer que les teintures abſolument ſaturées; car alors l'alcool qui ſeroit ſurabondant, rediſſoudroit les précipités à meſure qu'ils ſe formeroient; & ſi je leur fais faire cette obſervation, c'eſt que ce défaut d'attention m'a induit en erreur dans mes premières tentatives.

» Quoique je n'ai pas eu tout le ſuccès que j'eſpérois de mes expériences, il m'a ſemblé utile de les communiquer à l'académie; parce que, 1°. elles prouvent que l'alcool a différens degrés d'affinité avec différentes réſines; 2°. que ces différences, ou celles qui réſultent de la combinaison de deux réſines, occasionnant des précipités, les remèdes qui réſultent du mélange de deux teintures, ne peuvent être exactement appréciés que par la connoiſſance de la ſubſtance qui formera la plus grande partie du précipité.

Par exemple, ſi en mêlant la teinture de mirthe, qui eſt peu purgative à celle d'aloës qui l'eſt beaucoup, on a un précipité, & ſi la myrrhe fait la principale portion de ce précipité, il eſt évident que la vertu purgative de la teinture qui aura éprouvé cette précipitation, ſera proportionnellement plus forte que ſi le précipité étoit compoſé de parties égales des deux réſines, & que cette teinture le ſeroit beaucoup moins, ſi l'aloës étoit la ſubſtance qui ſe ſeroit précipitée en plus grande quantité.

On voit, d'après cet expoſé, des expériences de M. Tarrein, combien il reſte encore d'eſſais à faire pour bien connoître ce qui ſe paſſe pendant l'action de l'alcool ſur les réſines.

Chimie. Tome II.

6°. D'après cette diſſolubilité connue depuis long-temps des huiles volatiles & des réſines dans l'alcool; on a employé ce diſſolvant pour enlever ces matières, & ſur-tout la réſine aux différentes ſubſtances végétales, & réciproquement en voyant agir l'alcool ſur les racines, les bois, les écorces, &c. on en a conclu que ces parties contenoient de la réſine. Boulduc, Neuman, Geoffroy, Rouelle, Cartheuſer, ont ainſi eſſayé par l'action de l'alcool le plus grand nombre des végétaux ou de leurs produits naturels utiles en médecine; il eſt vrai que la différence des réſultats qu'on trouve ſouvent dans ces expériences de ces chimilles ſur les mêmes ſubſtances, jette le lecteur dans l'incertitude; mais on reconnoît par un examen réfléchi qu'ils n'ont pas ſuivi exactement la même méthode, ou opéré dans des circonſtances parfaitement ſemblables. Les matières végétales pouvoient n'être pas parfaitement égales, homogènes, ſèches, ou humides, âgées au même point &c. l'alcool avoit, ſans doute, différens degrés de rectification; les eſſais ont peut-être ainſi été faits à diverſes températures. Quoi qu'il en ſoit, de toutes ces variations, l'alcool eſt toujours le diſſolvant dont on ſe ſert pour extraire & pour apprécier la réſine ſèche, contenue dans les matières végétales deſſéchées, & c'eſt un des plus fréquens & des plus ſûrs moyens d'analyſe végétale que l'on puiſſe employer; il faut avoir cependant que cette liqueur diſſout en même-temps quelques extraits, de ceux ſpécialement qu'on nomme extraits-réſineux, & ſur-tout les réſino-extracts, des gommés réſines, &c.; mais on ſépare enſuite ces diverſes matières par le moyen de l'eau pure, qui précipite les réſines & retient les extraits proprement dits.

Pour faire cette eſpèce d'analyſe, on réduit en petits morceaux, ou même en poudre, les matières végétales dont on veut extraire les principes; on les met dans un matras, on verſe deſſus trois ou quatre fois leur poids d'alcool, de ſorte que ce liquide ſoit au-deſſus des ces matières, on bouche le col du matras avec une veſſie percée de quelques trous d'épingles, ſurleſſes on y luttoit un autre petit matras qu'on nommoit *vaſſeau de rencontre*. On expoſe l'appareil au ſoleil du printemps ou de l'été, ou ſur un bain de ſable modérément chauffé, ſi l'on opère en automne ou en hiver; on laiſſe plus ou moins long-temps ce mélange en digeſtion. Quand l'alcool eſt bien coloré on le décante, on en ajoute de nouveau, & l'on pourſuit cette méthode juſqu'à ce que l'alcool ne paroiſſe plus rien prendre à la matière végétale. Alors on dit que celle-ci eſt épuisée de tout ce qu'elle contenoit de diſſoluble dans l'alcool. On précipite par l'eau cette diſſolution ou cette teinture; on recueille & on examine à part la réſine; on évapore enſuite la liqueur ſurnageante qui fournit l'extract. Si la diſſolution alcoolique ne ſe trouble point par l'addi-

tion de l'eau, comme la fait celle de mûlper-tuis, en évapore le mélange & l'on obtient un extraïto-résineux de Rouelle; on compare alors le produit de cette évaporation avec celui de la simple macération ou de l'infusion par l'eau. Ainsi on réunit l'action des deux dissolvans, on commence par épuiser la matière végétale par l'eau, ensuite on y applique l'alcool; c'est ainsi que M. A. les académiciens de Dijon, en parlant de cette double analyse, en donnent un exemple simple & précis. Une once de racine de bouillon à petites fleurs (*verbasicum lychnitis*), dépuillée par l'eau de ses parties extractives ne leur a fourni ensuite, par l'alcool, qu'une très-petite quantité de résine peu amère; tandis que la même racine traitée d'abord par l'alcool, a donné sur la même quantité un gros & demi d'un extrait visqueux & amer; l'eau a donc enlevé presque tout le principe de cette racine soluble dans l'alcool, aussi remarquent-ils que l'alcool appliqué à ce végétal ne le trouble que très-faiblement par l'addition de l'eau. L'extraïto-résineux d'une once de feuilles de chou bien séchées, pour-suivent les mêmes chimistes, pèse cinquante-neuf grains; il se dissout presque entièrement dans l'éther; il est très-amer, d'une odeur balsamique, & donne à la salive une couleur jaune. L'extraïto-queux des mêmes feuilles pèse un gros & demi; il est visqueux, d'une faveur amère; ils montrent par-là que les feuilles de choux sont aussi riches en parties résineuses que le quinquina, & qu'elles contiennent plus de partie extractive & gommeuse que cette écorce; suivant eux, les feuilles de chou font fébrilifuges d'une manière remarquable.

7°. Il paroît encore, suivant les expériences des mêmes chimistes, ainsi que d'après celles de M. Tartelin & les nôtres propres, que l'alcool n'agit pas seulement comme un dissolvant sur les matières végétales; mais qu'il y occasionne, ou au moins y favorise une altération dont on n'a point encore assez appréciée l'influence. En évaporant un alcool résineux, il arrive souvent que le produit de cette évaporation n'est plus exactement de la même nature qu'il étoit avant cette opération. Toute sa substance, quoiqu'entièrement dissoluble d'abord par l'alcool, ne peut plus s'y combiner; une partie est devenue indissoluble, & ce phénomène analogue à ce qui se passe dans l'analyse par l'eau, paroît pouvoir être attribué à la même cause, c'est-à-dire, à l'absorption de l'oxygène atmosphérique, & à une nouvelle combinaison de ce principe avec la matière résineuse; mais ce point de l'analyse végétale doit être le sujet de nouvelles recherches, puisqu'il n'est pas suffisamment éclairci.

8°. C'est de toutes les observations & de tous les faits présentés dans les numéros précédens, que doivent être tirés les principes relatifs à l'application des alcools résineux dans les arts, tels que

ceux du pharmacien, du distillateur liquoriste, du vernisseur, du parfumeur, &c. qui emploient si souvent ces préparations. Les procédés de ces arts présentent même non-seulement l'application de ces principes; mais ils offrent encore à ceux qui voudront s'occuper de les recueillir une suite de faits trop peu connus, & qui intéressent directement l'analyse végétale en général, & celle d'un grand nombre de végétaux en particulier. Cet heureux accord de la chimie philosophique avec les arts, que l'on a tant de raison d'espérer aujourd'hui, doit répandre sur tous les deux, une clarté qui reculera singulièrement les limites de l'une & des autres. (Voyez les mots ALCOOL & ANALYSE VÉGÉTALE.)

ALCOOL SACH-LACTIQUE. Il ne paroît pas que l'acide sach-lactique soit dissoluble dans l'alcool, & qu'il existe, d'après cela, un alcool sach-lactique. Cependant, comme aucun chimiste n'a encore tenté cette combinaison, il n'est pas permis d'en nier absolument l'existence, & l'article de denomination inférée ici pourra, peut-être, avoir quelque jour son application dans la science. (Voyez ACIDE SACCHOLACTIQUE.)

ALCOOL SEBACIQUE. L'acide sébacique, si remarquable par son odeur vive, piquante, & vraiment singulière, est susceptible de s'unir assez fortement à l'alcool. Il est d'abord adouci dans cette combinaison, comme tous les autres acides; mais il est de plus susceptible de former de l'éther. Voyez le mot ÉTHER SEBACIQUE.

ALCOOL SUCCINIQUE. L'acide succinique obtenu par la sublimation, ne se dissout que difficilement, & en petite quantité, dans l'alcool froid; la chaleur augmente beaucoup cette dissolubilité, & à mesure que la liqueur refroidit, il se précipite une grande partie du sel qui n'a presque rien perdu de sa couleur jaune, (n'en voit donc que l'alcool ne peut pas servir très-efficacement à purifier, comme on auroit pu le croire, l'acide succinique. (Voyez SUCCIN.)

ALCOOL SULFURE. Le soufre en nature & en poudre ne s'unir point facilement à l'alcool; il faut que ces deux corps aient perdu toute leur aggrégation; il faut qu'ils se rencontrent en vapeur pour se combiner, comme l'a découvert M. de Lavoisier. On a décrit les phénomènes de cette combinaison & les propriétés de l'alcool sulfuré à l'article ALCOOL.

ALCOOL SULFUREUX. Par la seule terminaison différente de cette dénomination, on doit entendre qu'elle signifie autre chose que celle d'*alcool sulfuré*; & en effet, la règle de nomenclature adoptée aujourd'hui par un grand nombre de chimistes, apprend que les mots d'alcool sulfuréux

désignent la combinaison de l'alcool avec l'acide sulfureux. Cette combinaison se fait très-facilement ; elle donne , au bout de quelque temps , une odeur fétide de gaz hydrogène sulfuré , surtout si on la distille , &c. semble annoncer que le soufre surabondant à l'acidification de l'acide sulfureux , surabondance qui caractérise l'acide sulfureux , se sépare & s'unit en particulier à l'alcool. Après quelques mois , cette combinaison se trouble & dépose une poussière de soufre. Si l'on chauffe fortement l'alcool sulfureux , il se chauffe de l'éther. (Voyez les mots ALCOOL & ÉTHER.)

ALCOOL SULFURIQUE. C'est le nom que doit porter la combinaison immédiate d'acide sulfurique & d'alcool , avant qu'elle ait passé à l'état d'éther. Cette combinaison se fait sur le champ , lorsqu'on agit les deux liqueurs , qui , dans leur premier mélange , prennent respectivement la place déterminée par leur pesanteur spécifique. Mais tout-à-coup , par l'agitation , les liqueurs se pénètrent ; il se dégage une grande quantité de calorique , qui emporte avec lui de l'alcool d'une odeur vive & aromatique en vapeur. Tant qu'on n'élève point la température de cette union jusqu'à l'ébullition , elle reste dans l'état que nous indiquons ici , &c. ne forme point d'éther ; seulement l'acide y perd une grande partie de sa force & de sa causticité ; il devient ce qu'on nommoit autrefois un acide dulcifié. Rabel , qui a le premier fait & proposé cette préparation simple en médecine , lui a donné son nom. On la désigne encore par la dénomination d'eau de Rabel dans les pharmacies. Ce chimiste la préparoit à grands frais & à grand appareil , en tirant l'acide sulfurique de la combustion des pyrites ou sulfure de fer natif. Depuis longtemps ce procédé a été simplifié. On mêle une partie d'acide sulfurique concentré avec trois parties d'alcool rectifié ; on laisse ce mélange en digestion dans un vaisseau de verre ou de grès bien bouché : peu-à-peu l'action qui se passe entre ces deux liquides décompose une partie de l'alcool , & forme vraisemblablement de l'eau qui adoucit l'acide sulfurique. Le mélange prend une couleur fauve ou rougeâtre , tirant même plutôt sur le brun-clair. C'est dans cet état que nous nommons ce composé *alcool sulfurique* , &c. qu'on l'emploie en médecine. (Voyez l'article ALCOOL.)

ALCOOL TARTAREUX. L'acide tartareux pur , préparé à la manière de Schéele (Voyez AC. TARTAREUX , tom. I. pag. 322.) , est dissoluble dans l'alcool , & c'est cette dissolution que nous nommons alcool tartareux. Bergman , en mettant dans sa douzième colonne des attractions électives de l'acide tartareux , l'alcool comme le dernier des corps dans l'ordre de ses affinités pour cet acide , a indiqué le peu de cohérence qui existe entre ces deux corps. (Voyez les mots ALCOOL & ÉTHER.)

ALCOOL TUNISIQUE. Il n'y a point d'affinité

connue entre l'acide tunisique & l'alcool. Cet acide ne s'y dissout point ; mais comme , en laissant séjourner ces corps en contact l'un avec l'autre , il est vraisemblable qu'ils éprouveront réciproquement une altération , &c. que l'acide tunisique se rapprochera de l'acide de tungstène , &c. peut-être même du tungstène à l'état métallique , nous indiquons cette dénomination pour désigner le mélange de ces deux corps , qu'on peut disposer sur des tablettes d'un laboratoire , dans la vue d'en observer les effets. (Voyez AC. LE TUNISIQUE & ALCOOL.)

ALCOOL , souvent **ALKOOL** , ou **ALCOHOL** , quelquefois , mais anciennement **ALKAHOL** , ou simplement **ATCOL** , comme l'écrivoient quelques-uns. (Pharmacie.)

Ce mot qui vient de l'arabe a généralement été employé en pharmacie pour exprimer l'état de ténuité ou de subtilité dans lequel on réduit une substance , soit par des moyens mécaniques , soit par des procédés chimiques , &c. on appelloit alcoolisation ou alcoolisme , comme le dit Johnson , dans son dictionnaire chimique , la comminution , la réduction d'un corps en molécules extrêmement fines. Ce fut d'abord pour désigner le degré de la pulvérisation d'une substance , qu'on employa ces mots ; ainsi alcoolifier ou réduire en alcool une substance solide quelconque , c'étoit la mettre en poudre impalpable , presque volatile , c'est-à-dire , assez légère pour se dissiper facilement en l'air , assez fine pour ne point gratter la peau , lorsqu'on l'y frotte , pour n'être point sentie sous les dents , lorsqu'on la porte dans la bouche : quelques écrivains employèrent même le mot d'alcool comme un titre distinctif pour désigner différentes préparations de poudre ; ainsi Hartmann , *praxis chemiatrix* , décrit une poudre de vipère , qu'il nomme alcool de vipère ; sous cette acception , l'usage de ce mot est très-ancien , & n'est point borné à la pharmacie. « En effet , on le trouve employé dans différens auteurs sacrés & profanes , pour désigner une poudre très-fine , dont les femmes Égyptiennes , Romaines & autres , se fardoient non seulement leurs sourcils , &c. qu'on croit être l'antimoine qui étoit préparé pour cet usage. Chez les Orientaux , les femmes se servoient aussi de pinceaux pour porter sur leurs yeux une poudre rouge très-subtile , faite de minium ou autre matière de même couleur , qui , à raison de sa ténuité , est nommée alcool dans les historiens qui nous ont transmis ces faits ».

Cette première acception du mot alcool est encore employée dans beaucoup de pharmacopées modernes ; elle est employée par quelques praticiens dans leurs formules , &c. le plus souvent , ils se servent de l'abréviation *alc.* , ou *alk.* , pour désigner le degré de pulvérisation auquel doit être porté la drague ou substance qu'ils prescrivent ; par exemple.

Lapidis hematitis in ale redisti.

Prenez de la pierre hématite réduite en poudre impalpable.

On a aussi employé ce mot comme une expression générique pour désigner la partie la plus pure, la plus simple d'un mixte. Ainsi Paracelse, & d'après lui, quelques écrivains, donnoient le nom d'alcool d'antimoine à l'oxide blanc sublimé de ce métal, parce qu'ils pensoient que, dans cette sublimation, l'antimoine étoit séparé de toutes les substances étrangères avec lesquelles il étoit mêlé, & que le produit de cette opération étoit la partie la plus subtile, la plus efficace du métal; c'est d'après de semblables vues, qu'on a donné le nom d'alcool aux liqueurs qui, par différentes opérations, acquéroient un degré de légèreté, de volatilité, & étoient privées de la portion d'eau avec laquelle elles étoient auparavant combinées; & comme avant la découverte des éthers, la liqueur inflammable que l'on retire par la distillation du vin étoit la plus légère, la plus violente des liqueurs connues, on lui donna le nom d'alcool de vin, ou simplement celui d'alcool, sur-tout lorsqu'elle étoit amenée au point de la plus grande rectification.

Boerhaave employoit encore le terme d'alcool pour désigner, dans son hypothèse, le principe inflammable le plus pur, & réduit à son plus grand degré de simplicité.

Il suffit, sans doute, d'avoir exposé les différentes idées que l'on a attachées successivement au même mot, pour faire sentir l'absurdité de ces dénominations arbitraires, & la confusion qui en résulte nécessairement dans l'étude, & pour les progrès de la science; aujourd'hui nous conservons le mot alcool, mais d'après les principes de la nomenclature méthodique, nous l'employons uniquement comme une expression générique, pour désigner le fluide volatil inflammable qui se trouve dans toutes les liqueurs qui ont subi la fermentation vineuse, & que l'on en retire par le moyen de la distillation.

C'est dans le règne organique seulement, & principalement dans les végétaux, que nous trouvons les substances propres à subir la fermentation vineuse, par conséquent à fournir l'alcool. Le raisin a d'abord été regardé comme la seule substance propre à cette fermentation. Ce fruit en effet, lorsqu'il est dans son état de maturité, lorsque le suc en est exprimé, & exposé à une température convenable, passe facilement & promptement à ce genre de fermentation, & fournit la liqueur vineuse la plus agréable, la plus riche en alcool, celle qui a mérité, par excellence, le nom de vin, mais l'expérience a bientôt fait connoître qu'on pouvoit obtenir une liqueur vineuse analogue, non-seulement des différentes espèces de fruits, des graines frumentacées; mais encore de la moëlle, des écorces de quelques arbres, des racines charnues & tubéreuses, de

plusieurs espèces de plantes: on obtient également du sucre, de la manne, du miel, de la sève de quelques arbres & du lait des animaux.

Il seroit déplacé de faire ici l'énumération de toutes les substances qui ont été successivement soumises à la fermentation vineuse, & qui sont reconnues propres à fournir de l'alcool. (Voyez FERMENTATION.) Il suffit, pour notre objet, de remarquer que les substances qui contiennent le sucre tout formé, ou celles dans lesquelles l'aide de différens procédés, on peut en déterminer la formation, sont toutes susceptibles de passer à la fermentation vineuse, & d'après cette observation, il y aura peu de substance végétale ou animale qui, avec l'addition d'une matière sucrée, ne puisse être entraînée à ce genre de fermentation; car comme l'on prouve les recherches les plus exactes, le sucre lorsqu'il est dissous dans une suffisante quantité d'eau, & exposé à une température convenable, est le principe prochain de la fermentation vineuse & par conséquent de la formation de l'alcool; aussi quelque soit la substance que l'on ait soumise à cette fermentation, quelque soit le procédé qu'on ait suivi pour y parvenir, l'alcool qu'on en obtient par la distillation, est essentiellement le même; il ne diffère de celui qu'on auroit retiré d'une autre liqueur fermentée que par la proportion d'eau, l'existence accidentelle de quelques matières muqueuses, huileuses, avec lesquelles il étoit combiné dans la liqueur vineuse, qui ont été entraînées dans l'acte de la distillation, & que l'on peut en séparer par de nouvelles distillations.

On distingue dans le commerce, & même dans quelques pharmacopées, plusieurs espèces d'alcool auxquelles on a donné des noms différens; ainsi celui qui est retiré après la fermentation du sucre, de la cassonade, ou comme on le pratique plus ordinairement en Amérique, du suc même de la canne à sucre, est connu sous les noms de *tassaparilla*, *eau-de-vie* ou *esprit de sucre*; celui que l'on retire de la bière préparée avec de l'orge, ou le froment, est nommé *eau-de-vie de grain*, *esprit de froment*; les Allemands appellent *kirchen-wasser* ou *kirsch-wasser*, celui qu'ils préparent après la fermentation des cerises: on a nommé *arack*, *esprit d'arack*, l'alcool qu'on obtient du riz. Les Tartares ont aussi donné ce nom à celui qu'ils préparent avec le lait de leur jument, on le connoît plus communément sous le nom d'*air-de-vie de lait*, ou *esprit ardent de lait*. Celui qu'on retire du vin, a été nommé suivant ses différens états, *esprit ardent*, *esprit inflammable*, *eau-de-vie simple*, *eau-de-vie double*, *esprit de vin*; alcool de vin, *esprit de vin rectifié alcoolisé*, ou simplement alcool, &c. Enfin, suivant les différentes substances dont on retire l'alcool, on lui a donné les noms d'*eau-de-vie de pêches*, de *pommes*, de *genièvre*, de *figes*, de *pois*, de *carottes*, de *pommes-de-terre*,

de *potates*, &c. mais toutes ces liqueurs inflammables & une infinité d'autres semblables qu'on peut obtenir par la distillation des liqueurs fermentées, ne diffèrent que par le degré de leur pureté, & sur-tout, par une certaine quantité d'arôme & d'huile, dont elles sont chargées, & elles pourroient être substituées les unes aux autres; cependant, comme dans toutes ses opérations, le pharmacien doit toujours rechercher l'exactitude, la précision, la perfection, comme il importe, pour l'usage médicinal, qu'il y ait de l'uniformité dans les compositions & préparations médicamenteuses; enfin, comme dans quelques cas, des différences qui paroissent légères, peuvent apporter de grands changemens dans l'effet, dans l'énergie des remèdes, on ne doit employer dans les pharmacies que l'alcool retiré du vin, parce qu'on peut plus facilement le priver des substances étrangères, & l'avoir au même degré de pureté.

Dans le pays où le vin est abondant, on le distille en grand pour le commerce; on a pour cela de grands alambics de cuivre auxquels sont adaptés des serpents, on remplit de vin environ aux deux tiers la cucurbitre ou chaudière de l'alambic, & après l'avoir recouverte de son chapiteau, on allume le feu, on conduit la distillation de manière qu'il sort un filet continu de liqueur, & on entretient cette distillation jusqu'à ce que la liqueur qui distille commence à n'être plus inflammable, ou comme le pratiquent quelques-uns, on retire environ la moitié du vin que l'on a mis dans la bouilloire.

Le produit de cette première distillation qui est vulgairement appelée *eau-de-vie*, est une liqueur claire, diaphane, plus ou moins inflammable, pénétrante, légère; elle prend en vieillissant une teinte jaunâtre qui est due en partie à la substance extractive que fournissent les tonneaux de bois dans lesquels on la conserve, en partie à une portion huileuse qui a été entraînée dans la distillation, & quelquefois à des substances colorantes qu'y ajoutent les marchands. Quoiqu'il en soit, cet alcool de première distillation est toujours fort impur, il contient non-seulement plus de moitié de son poids de flegme surabondant; mais encore, il contient une grande quantité d'huile, on y trouve même le tartre acide de potasse; aussi ces eaux-de-vie du commerce, ou alcool de première distillation, altèrent en rouge les papiers de tournesol, & si, comme nous l'avons observé plusieurs fois, on les emploie pour conserver des pièces anatomiques, on trouve après quelques mois dans le fond du bocal, des cristaux salins qui nous ont paru être du tartre acide de potasse (circonstance qu'il importe d'observer parce qu'elle pourroit répandre quel-

que jour sur la formation des alcalis & leur principe constituant). Enfin comme dans les travaux en grand, on distille souvent des vins aigris ou qui ont quelque défaut, comme on y distille quelquefois les lies de vin, les rafles de raisin qui ont subi la fermentation, l'alcool qu'on en retire est encore altéré par une odeur, une saveur empyreumatique.

Nous avons même vu une seule fois, il est vrai, un alcool de première distillation, retiré des mûres blanches (1) & préparé dans un de ces atteliers où l'on fabrique l'eau-de-vie du commerce, tenir assez de cuivre pour donner à la liqueur une saveur métallique, & causer des anxiétés à ceux qui en avoient pris. En recherchant la cause de cet accident, nous trouvâmes que l'intérieur du chapiteau de l'alambic & de son bec, étoit garni d'une couche assez épaisse d'oxide de cuivre, dont la liqueur en distillant avoit dissout une partie.

Ces remarques nous fournissent une réflexion qui ne doit pas être négligée. L'alcool est en pharmacie d'un usage très-étendu, il sert à un grand nombre de préparations très-importantes, & suivant la nature des substances auxquelles on l'applique, il doit être employé tantôt dans un grand état de rectification ou pureté, tantôt il doit être affaibli d'une quantité d'eau quelquefois même assez grande; mais ce seroit se tromper grandement, que d'employer dans ces derniers cas, comme le font plusieurs artistes, ces eaux-de-vie du commerce, ou alcool de la première distillation; car dans ces liqueurs, l'alcool est non-seulement affaibli par une grande quantité d'eau, mais encore il est chargé d'une huile & d'un acide étranger qui changent l'action du dissolvant & l'effet de la préparation; & d'après cette considération, il nous paroîtroit convenable de n'employer en pharmacie que l'alcool pur ou rectifié; mais pour les compositions qui exigent un alcool plus foible, on y ajouteroit de l'eau distillée dans des proportions qu'il est très-facile de déterminer d'une manière sûre & invariable, ainsi que nous l'exposâmes bientôt.

Il nous paroît encore qu'on ne devoit jamais admettre dans les pharmacies ces alcools ou eaux-de-vie du commerce, car quoiqu'à l'aide de nouvelles distillations, on puisse les priver de l'eau surabondante, de l'huile & de l'acide étranger, dont elles sont chargées, cependant si ces liqueurs proviennent d'un vin déjà altéré, chargé d'un arôme particulier; si par la violence d'un feu peu ménagé elles ont contracté une odeur, une saveur empyreumatique, on ne les en privera jamais entièrement, & elles en conserveront l'empreinte.

(1) Une expérience suivie pendant quelques années nous a fait connoître que les mûres blanches, lorsqu'elles sont étendues dans une suffisante quantité d'eau, passent facilement à la fermentation vineuse, & qu'on en retire de l'alcool en assez grande quantité; c'est un objet qui mérite quelque attention dans les pays où on cultive le mûrier pour l'éducation des vers à soie.

Nous ne nous arrêterons pas à décrire la manière de distiller le vin, d'en retirer l'alcool; les procédés de cette opération, les attentions qu'elle exige ont été exposés dans l'article précédent, on y a vu que c'est par des distillations répétées & conduites avec ménagement, que c'est en séparant le premier produit de chaque distillation, qu'on obtient l'alcool dans un état de pureté propre aux opérations de chimie & de pharmacie.

L'odeur, la saveur, sont reconnaître si l'alcool est altéré par un arôme particulier, si dans la distillation, il se contracte de l'empyreume, s'il a entraîné une partie de l'huile que fournit le vin par sa décomposition. L'altération en rouge des papiers colorés par la teinture de tournesol ou par les pétales bleus des plantes, indiquera la présence d'un acide étranger. Enfin, si comme nous l'avons vu une fois, l'alcool tenoit accidentellement un oxide de cuivre, on le découvrirait facilement par l'effusion de quelques gouttes d'ammoniaque; mais il est un autre objet bien important, sur-tout pour le commerce & la pharmacie, c'est de connaître & de déterminer d'une manière précise la quantité de flegme ou d'eau qui reste mêlée avec l'alcool: pour parvenir à ce but, on a proposé différents moyens d'épreuve, tous fondés sur quelque une des propriétés de l'alcool, telles que la facilité avec laquelle il s'évapore, s'enflamme, ou l'étendue de sa dilatilité à une température déterminée. Depuis long-temps l'expérience a fait reconnaître combien tous ces moyens étoient fautifs & infidèles, & comme il étoit démontré que l'alcool étoit d'autant plus léger, qu'il contenoit moins d'eau, on imagina, pour s'assurer de cette propriété, différents instrumens qui sont connus sous le nom d'*aréomètres* ou *pèse-liqueurs*. Ainsi Homborg proposa d'employer une petite bouteille à col étroit & allongé, qui contient exactement une once d'eau, & après l'avoir rempli du fluide dont on vouloit connaître la nature, ou la poids, & la différence de pesanteur formoit la différence des fluides; d'autres ont proposé de plonger dans le fluide un tube de verre, terminé par une boule & lestée d'une certaine quantité de mercure, afin que l'instrument restât droit & soutenu dans la liqueur, & ils jugent de la pureté de l'alcool par l'étendue de l'immersion de l'instrument: ainsi plus l'instrument s'enfonce, plus aussi le fluide est léger, plus il contient d'alcool.

Tel est le principe d'après lequel sont construits les différents pèse-liqueurs généralement connus dans le commerce, mais ces instrumens ne donnent qu'une approximation plus ou moins fautive; car outre, comme le dit M. Baumé lui-même, « qu'il est difficile de se procurer des pèse-liqueurs dont le tube soit parfaitement cylindrique, & d'un diamètre égal, » l'immersion de

l'instrument change nécessairement la hauteur du fluide, & par conséquent la graduation marquée sur sa tige est très-variable & très-inégale pour déterminer la quantité d'alcool contenu dans une liqueur ou si l'on veut, pour connaître ses degrés de rectification; il n'y a sans doute, comme le remarque M. Baumé, qu'un moyen qui soit bon & toujours comparable, c'est de déterminer la pesanteur spécifique comparée à l'eau, car il est indubitable, comme l'observe M. Bertron, « que la pesanteur spécifique d'un corps est le poids qu'il pèse sous un volume déterminé, » & les pesanteurs spécifiques de différents corps comparées entr'elles sont toujours proportionnelles aux poids que pèsent des volumes égaux de ces substances. »

Ces principes d'une vérité incontestable, & généralement reconnus, ont guidé de M. Gouvenain, citoyen de Dijon, dans une suite d'expériences très délicates, qu'il a faites depuis plusieurs années sur la pesanteur spécifique des liqueurs, & particulièrement sur les mélanges d'alcool & d'eau en différentes proportions & ses recherches l'ont conduit à la construction d'un aréomètre ou pèse-liqueur, sinon nouveau, du moins perfectionné, & dont l'usage simple, facile, indique toujours d'une manière précise les quantités réelles d'alcool mélangé avec de l'eau, & fournit, par conséquent, un moyen certain de déterminer les degrés de rectification des diverses espèces d'alcool qu'on trouve dans le commerce.

Cet instrument a, pour la forme, beaucoup de ressemblance avec celui de Fahrenheit; il est composé d'un tube cylindrique de verre, qui a environ quatre pouces de hauteur & onze lignes de diamètre; ce tube qui forme le corps de l'instrument est fermé par le bas, & rétréci par un étranglement qui forme un petit réservoir dans lequel on introduit du mercure pour lester l'instrument; dans le haut, ce tube cylindrique est tiré en une tige mince, égale, de trois quarts de ligne de diamètre, de la hauteur d'un pouce, & qui se termine par un petit bafin propre à recevoir des poids qui sont étalonnés avec la plus grande exactitude. Cette tige dont on a conservé l'ouverture, reçoit un petit cylindre de verre terminé supérieurement par un petit bouton qui laisse la facilité de le retirer à volonté; on trace sur ce cylindre une ligne transversale qui forme le point fixe de cet instrument.

Nous ne nous arrêterons pas à exposer les attentions nécessaires dans la construction de cet instrument, ces détails appartiennent à la physique; il nous suffira d'observer ici que cet instrument doit être égal en volume & en poids à nullo grains d'eau distillée, prise à la température de dix degrés au thermomètre à mercure, selon M. de Luc, ou pour nous expliquer d'une manière

qui pourra paroître plus claire à quelques personnes, l'instrument avec son leste, doit peser exactement mille grains d'eau; & plongé dans un vase plein d'eau distillée, & à la température judicieuse, il doit, en s'enfonçant jusqu'au point fixe marqué sur sa tige, déplacer un volume de mille grains d'eau; deux conditions essentielles pour la perfection de cet instrument. On obtient facilement l'un à l'aide de balances exactes, on parvient à l'autre avec des attentions & de la patience.

Si l'instrument pesant avec son leste mille grains, s'enfonce au-dessus du point marqué sur sa tige, alors il a trop peu de volume, il faut l'augmenter. Pour cela après avoir retiré le mercure qu'on avoit introduit dans sa capacité pour servir de leste, on présente à la flamme d'une lampe d'émailleur le corps de l'instrument, & lorsque le verre est dans un état suffisant de ramollissement, on souffle légèrement de manière à augmenter le volume du tube; on verse ensuite dans la cavité de l'instrument la quantité de mercure qu'on en avoit retiré, & on l'essaye de nouveau en le mettant dans de l'eau; si l'enfoncement est encore au-dessus du point marqué sur sa tige, il faut encore en augmenter le volume, & recommencer à souffler le tube jusqu'à ce que l'instrument s'enfonce exactement au point marqué. Lorsqu'au contraire l'instrument a trop de volume, il ne s'enfonce pas jusqu'au point fixe, alors il faut diminuer le volume du tube, & on y parvient en retranchant un peu de sa longueur, ce que les ouvriers accoutumés à travailler le verre exécutent facilement.

D'après les détails dans lesquels nous venons d'entrer, on voit que la construction de cet instrument exige des attentions, des tâtonnements qui sont plus minutieux que difficiles; mais aussi construit d'après ces principes, cet aréomètre présente de grands avantages, non-seulement l'usage en est simple, facile, commode, toujours comparable, mais encore il a beaucoup plus de sensibilité que tous ces instruments où les degrés sont marqués sur la tige; & comme son volume est déterminé, il ne s'agit que d'en connoître le poids, pour trouver le rapport de la pesanteur spécifique d'une liqueur quelconque à celle de l'eau, ainsi l'exempte l'embarras des calculs; enfin on n'est pas obligé, comme pour les aréomètres ordinaires, d'adopter aveuglément une division arbitraire, ou de s'en rapporter bonnement à la parole du fabricant. En effet, en mettant dans la capacité de l'instrument du mercure ou tout autre leste, jusqu'à ce qu'il pèse mille grains, cet instrument, pour être bon, doit plonger dans l'eau distillée, & à la température de dix degrés, précisément jusqu'au point marqué dans l'intérieur de sa tige. Ce moyen de vérifier sur-le-champ la justesse de ces sortes d'instruments est si simple, si facile, qu'il

ne doit jamais être négligé lorsqu'on en fait construire.

Le volume une fois bien constaté, un seul instrument pourroit, à la rigueur, suffire pour déterminer la pesanteur spécifique des différentes espèces de liqueurs, & en connoître le rapport à celle de l'eau; il ne s'agiroit, pour cela, que d'augmenter ou de diminuer dans des proportions connues, le poids ou la quantité de leste suivant la densité de la liqueur qu'on auroit à éprouver; ce qui ne seroit pas fort difficile, puisque la tige de l'instrument étant ouverte on peut y introduire ou en retirer du mercure, & pour éviter l'embarras d'avoir recours à la balance chaque fois qu'on changeroit le poids du leste, on pourroit avoir des quantités de mercure différentes renfermées dans de petits flacons étiquetés, & qu'on introduiroit dans l'aréomètre, suivant la densité de la liqueur à éprouver; mais l'est infiniment plus simple, plus commode & plus sûr d'avoir plusieurs aréomètres du volume de mille grains d'eau, mais tous lestés différemment, ce qui ne doit point paroître plus extraordinaire dans un laboratoire, que d'avoir plusieurs balances suivant les différents poids qu'on a à employer.

Ainsi, comme en considérant la densité des liqueurs, nous pouvons en distinguer six espèces très-différentes, nous conseillons pour la commodité des expériences d'avoir six aréomètres différens par leur poids quoique semblables par leur volume.

Le premier, avec son leste, doit peser sept cents vingt grains, & il est destiné pour l'éther, l'alcool pur, ou affaibli d'une petite quantité d'eau.

Le second pèsera huit cents grains, & il servira pour les différentes espèces d'alcool, esprits-de-vin, eaux-de-vie du commerce & pour les huiles.

Le troisième du poids de neuf cents quarante-deux grains servira pour l'eau, les différentes espèces de vin, liqueurs de table, ratafiats, quelques dissolutions salines peu chargées, & pour l'acide nitrique.

Le quatrième toujours du volume de mille grains d'eau, pèsera douze cents grains, & il servira pour les dissolutions salines très-chargées, l'acide nitrique faible.

Le cinquième du poids de quatorze cents cinquante grains, est destiné pour les acides nitreux & nitrique concentrés, & pour l'acide sulfurique faible.

Le sixième enfin, du poids de dix-sept cents grains, sera employé pour les liqueurs plus denses, l'acide sulfurique concentré.

Le poids de chacun de ces aréomètres garni de son leste, est marqué en encre rouge sur son bassin, de sorte qu'en prenant l'instrument pour en faire usage, on voit sur-le-champ quel est son poids, & le volume étant le même pour

tous, on a toujours le rapport le plus exact.

La manière de faire usage de cet instrument est très-simple, & à la portée de tout le monde. Il ne faut que des poids, & un petit vase cylindrique de verre à pied, propre à recevoir l'instrument.

Non-seulement les poids doivent être connus & bien étalonnés, mais encore il convient qu'ils soient repliés dans une partie de leur étendue, afin qu'à l'aide d'une pince ou des doigts, on puisse les placer & les déplacer avec facilité.

Le vase de verre destiné à recevoir la liqueur que l'on doit éprouver, doit avoir quinze à dix-huit lignes de diamètre, ce qui est à-peu-près indifférent; mais sa hauteur doit être un peu moindre de trois ou quatre lignes que la hauteur totale de l'instrument, ce qui est nécessaire pour prévenir l'introduction de la liqueur dans le bassin de l'instrument, si par hasard il s'enfonçoit tout-à-coup beaucoup au-dessus du point fixe.

Après ces préparatifs plus longs à décrire qu'à exécuter, on verse de la liqueur dont on veut connoître la pesanteur spécifique, environ jusqu'à la moitié ou aux deux tiers de la hauteur du vase, puis on y porte un des arcomètres; s'il s'enfonce aussitôt au-dessus du point marqué sur sa tige, cet instrument est trop chargé pour la liqueur qu'on éprouve, il faut en prendre un autre, dont le lest soit moindre; & si ce second instrument abandonné à lui-même se soutient dans le fluide au-dessous du point marqué sur sa tige, on met successivement sur le bassin des petits poids, jusqu'à ce que l'instrument s'enfonce au point fixe. Alors réunissant au poids de l'instrument le nombre des grains ajoutés sur son bassin, on a le rapport précis de la liqueur qu'on éprouvoit comparé à un volume de mille grains d'eau distillée; par exemple, je cherche à connoître la pesanteur spécifique d'un alcool du commerce; après avoir versé de cette liqueur dans un vase, j'y place l'arcomètre qui pèse huit cents grains, l'instrument reste élevé de sept à huit lignes au-dessus du point marqué sur sa tige; je porte sur son bassin successivement différents poids, & je vois qu'il faut cinquante grains pour l'amener au point fixe marqué sur sa tige. Ainsi connoissant le poids de l'instrument qui est de huit cents grains, y ajoutant les cinquante qui ont été placés sur le bassin, je conclus, sans crainte de me tromper, que la pesanteur spécifique de cet alcool comparée à celle de l'eau prise à la même température, est comme huit cents cinquante à mille.

Témoin depuis plusieurs années des expériences délicates & multipliées que M. de Gouvenain a faites avec ces arcomètres sur les différentes liqueurs, & particulièrement sur des mélanges en différentes proportions d'alcool & d'eau, je l'ai engagé à me communiquer la table qu'il en a dressée; il me l'a remise sans difficulté, & m'a

laissé la liberté d'en disposer, en m'ajoutant cependant, que cette table qui lui avoit coûté des soins infinis, demandoit encore à être revue pour y corriger quelques légères inexactitudes qui avoient échappé dans le calcul; mais le temps nécessaire pour cette révision devoit être fort long, & l'auteur ne pouvant s'y livrer dans ce moment, nous avons cru faire plaisir aux savans, de leur présenter cette table qui diffère entièrement de toutes celles qu'on connoît jusqu'à présent sur cet objet, & qui sera d'un usage très commode, non-seulement dans les laboratoires, mais encore pour le commerce.

Explication de la table de la pesanteur spécifique des mélanges d'alcool & d'eau fuits par centièmes de volume.

Cette table est composée de vingt-sept colonnes; dans les deux premières, on a exprimé les volumes ou quantités respectives d'eau & d'alcool, qui ont été mélangés & prises à la température de dix degrés.

L'alcool employé dans ces expériences étoit porté au dernier terme de rectification possible, sa pesanteur spécifique comparée à celle de l'eau distillée, étoit de huit cents grains, & il étoit, par conséquent, plus léger que celui que M. Baumé nomme *prodigieusement relâché*.

Pour amener l'alcool à ce degré de pureté qui n'étoit pas encore connu, M. de Gouvenain employa le procédé suivant; il distilla plusieurs fois, comme l'indique M. Baumé dans ses *éléments de pharmacie*, une grande quantité d'alcool ordinaire, il en mit à part les premiers produits, qui furent ensuite mêlés & distillés de nouveau, avec l'attention de conserver séparément la première portion. Ce procédé fournit à M. de Gouvenain l'alcool au degré de rectification qu'indique M. Baumé; des distillations répétées sur cet alcool, & toujours faites avec les mêmes attentions, n'apportant aucun changement ultérieur, M. de Gouvenain essaya pour lors si le mélange de quelque intermède pourroit encore dépouiller l'alcool de quelque portion d'eau; pour cela, il le distilla sur de la potasse qui avoit été soigneusement desséchée au feu, ayant toujours l'attention de séparer les premiers produits; plusieurs opérations ainsi répétées sur de la potasse parfaitement desséchée, lui fournirent enfin un alcool dont la pesanteur spécifique étoit seulement de huit cents grains. Amené à ce point de rectification, cet alcool fut encore distillé avec les mêmes attentions; mais toutes les distillations ultérieures n'apportant aucun changement, M. de Gouvenain regarda cet alcool comme au dernier terme de rectification possible, & il en employa la plus grande partie aux expériences qui ont servi à la rédaction de cette table.

La troisième colonne présente le poids correspondant

TABLE de la pesanteur spécifique dde 0 jusqu'au vingtième degré du thermomètre à mercure.

VOLUMES		Poids correspondant du Falcost.	PESANTEUR SPECIFIQUE		Poids correspondant du Falcost.	TEMPERATURE DEPUIS 0 JUSQU'AU VINGTIÈME DEGRÉ.										
d'eau.	d'Alcool. à 50.		Mathéma- tique.	Réelle à 50 degrés.		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Alcool pur.					100	796,00	795,00	794,00	793,00	792,00	791,00	790,00	789,00	788,00	787,00
1	99	79				803,75	803,75	803,75	803,75	803,75	803,75	803,75	803,75	803,75	803,75	803,75
2	98	78				811,25	811,25	811,25	811,25	811,25	811,25	811,25	811,25	811,25	811,25	811,25
3	97	77				818,75	818,75	818,75	818,75	818,75	818,75	818,75	818,75	818,75	818,75	818,75
4	96	76				826,25	826,25	826,25	826,25	826,25	826,25	826,25	826,25	826,25	826,25	826,25
5	95	75				833,75	833,75	833,75	833,75	833,75	833,75	833,75	833,75	833,75	833,75	833,75
6	94	74				841,25	841,25	841,25	841,25	841,25	841,25	841,25	841,25	841,25	841,25	841,25
7	93	73				848,75	848,75	848,75	848,75	848,75	848,75	848,75	848,75	848,75	848,75	848,75
8	92	72				856,25	856,25	856,25	856,25	856,25	856,25	856,25	856,25	856,25	856,25	856,25
9	91	71				863,75	863,75	863,75	863,75	863,75	863,75	863,75	863,75	863,75	863,75	863,75
10	90	70	820,			871,25	871,25	871,25	871,25	871,25	871,25	871,25	871,25	871,25	871,25	871,25
11	89	71				878,75	878,75	878,75	878,75	878,75	878,75	878,75	878,75	878,75	878,75	878,75
12	88	70				886,25	886,25	886,25	886,25	886,25	886,25	886,25	886,25	886,25	886,25	886,25
13	87	69				893,75	893,75	893,75	893,75	893,75	893,75	893,75	893,75	893,75	893,75	893,75
14	86	68				901,25	901,25	901,25	901,25	901,25	901,25	901,25	901,25	901,25	901,25	901,25
15	85	68				908,75	908,75	908,75	908,75	908,75	908,75	908,75	908,75	908,75	908,75	908,75
16	84	67				916,25	916,25	916,25	916,25	916,25	916,25	916,25	916,25	916,25	916,25	916,25
17	83	66				923,75	923,75	923,75	923,75	923,75	923,75	923,75	923,75	923,75	923,75	923,75
18	82	65				931,25	931,25	931,25	931,25	931,25	931,25	931,25	931,25	931,25	931,25	931,25
19	81	64	840,			938,75	938,75	938,75	938,75	938,75	938,75	938,75	938,75	938,75	938,75	938,75
20	80	64				946,25	946,25	946,25	946,25	946,25	946,25	946,25	946,25	946,25	946,25	946,25
21	79	63				953,75	953,75	953,75	953,75	953,75	953,75	953,75	953,75	953,75	953,75	953,75
22	78	62				961,25	961,25	961,25	961,25	961,25	961,25	961,25	961,25	961,25	961,25	961,25
23	77	61				968,75	968,75	968,75	968,75	968,75	968,75	968,75	968,75	968,75	968,75	968,75
24	76	60				976,25	976,25	976,25	976,25	976,25	976,25	976,25	976,25	976,25	976,25	976,25
25	75	60				983,75	983,75	983,75	983,75	983,75	983,75	983,75	983,75	983,75	983,75	983,75
26	74	59				991,25	991,25	991,25	991,25	991,25	991,25	991,25	991,25	991,25	991,25	991,25
27	73	58				998,75	998,75	998,75	998,75	998,75	998,75	998,75	998,75	998,75	998,75	998,75
28	72	57				1006,25	1006,25	1006,25	1006,25	1006,25	1006,25	1006,25	1006,25	1006,25	1006,25	1006,25
29	71	56	860,			1013,75	1013,75	1013,75	1013,75	1013,75	1013,75	1013,75	1013,75	1013,75	1013,75	1013,75
30	70	55				1021,25	1021,25	1021,25	1021,25	1021,25	1021,25	1021,25	1021,25	1021,25	1021,25	1021,25
31	69	54				1028,75	1028,75	1028,75	1028,75	1028,75	1028,75	1028,75	1028,75	1028,75	1028,75	1028,75
32	68	54				1036,25	1036,25	1036,25	1036,25	1036,25	1036,25	1036,25	1036,25	1036,25	1036,25	1036,25
33	67	53				1043,75	1043,75	1043,75	1043,75	1043,75	1043,75	1043,75	1043,75	1043,75	1043,75	1043,75
34	66	52				1051,25	1051,25	1051,25	1051,25	1051,25	1051,25	1051,25	1051,25	1051,25	1051,25	1051,25
35	65	51				1058,75	1058,75	1058,75	1058,75	1058,75	1058,75	1058,75	1058,75	1058,75	1058,75	1058,75
36	64	51				1066,25	1066,25	1066,25	1066,25	1066,25	1066,25	1066,25	1066,25	1066,25	1066,25	1066,25
37	63	50				1073,75	1073,75	1073,75	1073,75	1073,75	1073,75	1073,75	1073,75	1073,75	1073,75	1073,75
38	62	49				1081,25	1081,25	1081,25	1081,25	1081,25	1081,25	1081,25	1081,25	1081,25	1081,25	1081,25
39	61	48	880,			1088,75	1088,75	1088,75	1088,75	1088,75	1088,75	1088,75	1088,75	1088,75	1088,75	1088,75
40	60	48				1096,25	1096,25	1096,25	1096,25	1096,25	1096,25	1096,25	1096,25	1096,25	1096,25	1096,25
41	59	47				1103,75	1103,75	1103,75	1103,75	1103,75	1103,75	1103,75	1103,75	1103,75	1103,75	1103,75
42	58	46				1111,25	1111,25	1111,25	1111,25	1111,25	1111,25	1111,25	1111,25	1111,25	1111,25	1111,25
43	57	45				1118,75	1118,75	1118,75	1118,75	1118,75	1118,75	1118,75	1118,75	1118,75	1118,75	1118,75
44	56	44				1126,25	1126,25	1126,25	1126,25	1126,25	1126,25	1126,25	1126,25	1126,25	1126,25	1126,25
45	55	44				1133,75	1133,75	1133,75	1133,75	1133,75	1133,75	1133,75	1133,75	1133,75	1133,75	1133,75
46	54	43				1141,25	1141,25	1141,25	1141,25	1141,25	1141,25	1141,25	1141,25	1141,25	1141,25	1141,25
47	53	42				1148,75	1148,75	1148,75	1148,75	1148,75	1148,75	1148,75	1148,75	1148,75	1148,75	1148,75
48	52	41				1156,25	1156,25	1156,25	1156,25	1156,25	1156,25	1156,25	1156,25	1156,25	1156,25	1156,25
49	51	40				1163,75	1163,75	1163,75	1163,75	1163,75	1163,75	1163,75	1163,75	1163,75	1163,75	1163,75

TABLEAU DES DIFFERENDS DEGRES DE TEMPERATURE DEPUIS 0 JUSQU'AU VINGTIÈME DEGRE.

ETA SC	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	936,60	935,80	934,20	933,40	932,60	931,80	931,00	930,20	929,40	928,60	927,80	927,00
6	937,80	937,00	936,20	935,40	934,60	933,80	933,00	932,20	931,40	930,60	929,80	929,00
7	939,00	938,20	937,40	936,60	935,80	935,00	934,20	933,40	932,60	931,80	931,00	930,20
8	940,20	939,40	938,60	937,80	937,00	936,20	935,40	934,60	933,80	933,00	932,20	931,40
9	941,40	940,60	939,80	939,00	938,20	937,40	936,60	935,80	935,00	934,20	933,40	932,60
10	942,60	941,80	941,00	940,20	939,40	938,60	937,80	937,00	936,20	935,40	934,60	933,80
11	943,80	943,00	942,20	941,40	940,60	939,80	939,00	938,20	937,40	936,60	935,80	935,00
12	945,00	944,20	943,40	942,60	941,80	941,00	940,20	939,40	938,60	937,80	937,00	936,20
13	946,20	945,40	944,60	943,80	943,00	942,20	941,40	940,60	939,80	939,00	938,20	937,40
14	947,40	946,60	945,80	945,00	944,20	943,40	942,60	941,80	941,00	940,20	939,40	938,60
15	948,60	947,80	947,00	946,20	945,40	944,60	943,80	943,00	942,20	941,40	940,60	939,80
16	949,80	949,00	948,20	947,40	946,60	945,80	945,00	944,20	943,40	942,60	941,80	941,00
17	951,00	950,20	949,40	948,60	947,80	947,00	946,20	945,40	944,60	943,80	943,00	942,20
18	952,20	951,40	950,60	949,80	949,00	948,20	947,40	946,60	945,80	945,00	944,20	943,40
19	953,40	952,60	951,80	951,00	950,20	949,40	948,60	947,80	947,00	946,20	945,40	944,60
20	954,60	953,80	953,00	952,20	951,40	950,60	949,80	949,00	948,20	947,40	946,60	945,80
21	955,80	955,00	954,20	953,40	952,60	951,80	951,00	950,20	949,40	948,60	947,80	947,00
22	957,00	956,20	955,40	954,60	953,80	953,00	952,20	951,40	950,60	949,80	949,00	948,20
23	958,20	957,40	956,60	955,80	955,00	954,20	953,40	952,60	951,80	951,00	950,20	949,40
24	959,40	958,60	957,80	957,00	956,20	955,40	954,60	953,80	953,00	952,20	951,40	950,60
25	960,60	959,80	959,00	958,20	957,40	956,60	955,80	955,00	954,20	953,40	952,60	951,80
26	961,80	961,00	960,20	959,40	958,60	957,80	957,00	956,20	955,40	954,60	953,80	953,00
27	963,00	962,20	961,40	960,60	959,80	959,00	958,20	957,40	956,60	955,80	955,00	954,20
28	964,20	963,40	962,60	961,80	961,00	960,20	959,40	958,60	957,80	957,00	956,20	955,40
29	965,40	964,60	963,80	963,00	962,20	961,40	960,60	959,80	959,00	958,20	957,40	956,60
30	966,60	965,80	965,00	964,20	963,40	962,60	961,80	961,00	960,20	959,40	958,60	957,80
31	967,80	967,00	966,20	965,40	964,60	963,80	963,00	962,20	961,40	960,60	959,80	959,00
32	969,00	968,20	967,40	966,60	965,80	965,00	964,20	963,40	962,60	961,80	961,00	960,20
33	970,20	969,40	968,60	967,80	967,00	966,20	965,40	964,60	963,80	963,00	962,20	961,40
34	971,40	970,60	969,80	969,00	968,20	967,40	966,60	965,80	965,00	964,20	963,40	962,60
35	972,60	971,80	971,00	970,20	969,40	968,60	967,80	967,00	966,20	965,40	964,60	963,80
36	973,80	973,00	972,20	971,40	970,60	969,80	969,00	968,20	967,40	966,60	965,80	965,00
37	975,00	974,20	973,40	972,60	971,80	971,00	970,20	969,40	968,60	967,80	967,00	966,20
38	976,20	975,40	974,60	973,80	973,00	972,20	971,40	970,60	969,80	969,00	968,20	967,40
39	977,40	976,60	975,80	975,00	974,20	973,40	972,60	971,80	971,00	970,20	969,40	968,60
40	978,60	977,80	977,00	976,20	975,40	974,60	973,80	973,00	972,20	971,40	970,60	969,80
41	979,80	979,00	978,20	977,40	976,60	975,80	975,00	974,20	973,40	972,60	971,80	971,00
42	981,00	980,20	979,40	978,60	977,80	977,00	976,20	975,40	974,60	973,80	973,00	972,20
43	982,20	981,40	980,60	979,80	979,00	978,20	977,40	976,60	975,80	975,00	974,20	973,40
44	983,40	982,60	981,80	981,00	980,20	979,40	978,60	977,80	977,00	976,20	975,40	974,60
45	984,60	983,80	983,00	982,20	981,40	980,60	979,80	979,00	978,20	977,40	976,60	975,80
46	985,80	985,00	984,20	983,40	982,60	981,80	981,00	980,20	979,40	978,60	977,80	977,00
47	987,00	986,20	985,40	984,60	983,80	983,00	982,20	981,40	980,60	979,80	979,00	978,20
48	988,20	987,40	986,60	985,80	985,00	984,20	983,40	982,60	981,80	981,00	980,20	979,40
49	989,40	988,60	987,80	987,00	986,20	985,40	984,60	983,80	983,00	982,20	981,40	980,60
50	990,60	989,80	989,00	988,20	987,40	986,60	985,80	985,00	984,20	983,40	982,60	981,80
51	991,80	991,00	990,20	989,40	988,60	987,80	987,00	986,20	985,40	984,60	983,80	983,00
52	993,00	992,20	991,40	990,60	989,80	989,00	988,20	987,40	986,60	985,80	985,00	984,20
53	994,20	993,40	992,60	991,80	991,00	990,20	989,40	988,60	987,80	987,00	986,20	985,40
54	995,40	994,60	993,80	993,00	992,20	991,40	990,60	989,80	989,00	988,20	987,40	986,60
55	996,60	995,80	995,00	994,20	993,40	992,60	991,80	991,00	990,20	989,40	988,60	987,80
56	997,80	997,00	996,20	995,40	994,60	993,80	993,00	992,20	991,40	990,60	989,80	989,00
57	999,00	998,20	997,40	996,60	995,80	995,00	994,20	993,40	992,60	991,80	991,00	990,20
58	1000,20	999,40	998,60	997,80	997,00	996,20	995,40	994,60	993,80	993,00	992,20	991,40
59	1001,40	1000,60	1000,00	999,20	998,40	997,60	996,80	996,00	995,20	994,40	993,60	992,80
60	1002,60	1001,80	1001,00	1000,20	999,40	998,60	997,80	997,00	996,20	995,40	994,60	993,80
61	1003,80	1003,00	1002,20	1001,40	1000,60	999,80	999,00	998,20	997,40	996,60	995,80	995,00
62	1005,00	1004,20	1003,40	1002,60	1001,80	1001,00	1000,20	999,40	998,60	997,80	997,00	996,20
63	1006,20	1005,40	1004,60	1003,80	1003,00	1002,20	1001,40	1000,60	999,80	999,00	998,20	997,40
64	1007,40	1006,60	1005,80	1005,00	1004,20	1003,40	1002,60	1001,80	1001,00	1000,20	999,40	998,60
65	1008,60	1007,80	1007,00	1006,20	1005,40	1004,60	1003,80	1003,00	1002,20	1001,40	1000,60	999,80
66	1009,80	1009,00	1008,20	1007,40	1006,60	1005,80	1005,00	1004,20	1003,40	1002,60	1001,80	1001,00
67	1011,00	1010,20	1009,40	1008,60	1007,80	1007,00	1006,20	1005,40	1004,60	1003,80	1003,00	1002,20
68	1012,20	1011,40	1010,60	1009,80	1009,00	1008,20	1007,40	1006,60	1005,80	1005,00	1004,20	1003,40
69	1013,40	1012,60	1011,80	1011,00	1010,20	1009,40	1008,60	1007,80	1007,00	1006,20	1005,40	1004,60
70	1014,60	1013,80	1013,00	1012,20	1011,40	1010,60	1009,80	1009,00	1008,20	1007,40	1006,60	1005,80
71	1015,80	1015,00	1014,20	1013,40	1012,60	1011,80	1011,00	1010,20	1009,40	1008,60	1007,80	1007,00
72	1017,00	1016,20	1015,40	1014,60	1013,80	1013,00	1012,20	1011,40	1010,60	1009,80	1009,00	1008,20
73	1018,20	1017,40	1016,60	1015,80	1015,00	1014,20	1013,40	1012,60	1011,80	1011,00	1010,20	1009,40
74	1019,40	1018,60	1017,80	1017,00	1016,20	1015,40	1014,60	1013,80	1013,00	1012,20	1011,40	1010,60
75	1020,60	1019,80	1019,00	1018,20	1017,40	1016,60	1015,80	1015,00	1014,20	1013,40	1012,60	1011,80
76	1021,80	1021,00	1020,20	1019,40	1018,60	1017,80	1017,00	1016,20	1015,40	1014,60	1013,80	1013,00
77	1023,00	1022,20	1021,40	1020,60	1019,80	1019,00	1018,20	1017,40	1016,60	1015,80	1015,00	1014,20
78	1024,20	1023,40	1022,60	1021,80	1021,00	1020,20	1019,40	1018,60	1017,80	1017,00	1016,20	1015,40
79	1025,40	1024,60	1023,80	1023,00	1022,20	1021,40	1020,60	1019,80	1019,00	1018,20	1017,40	1016,60
80	1026,60	1025,80	1025,00	1024,20	1023,40	1022,60	1021,80	1021,00	1020,20	1019,40	1018,60	1017,80
81	1027,80	1027,00	1026,20	1025,40	1024,60	1023,80	1023,00	1022,20	1021,40	1020,60	1019,80	1019,00
82	1029,00	1028,20	1027,40	1026,60	1025,80	1025,00	1024,20	1023,40	1022,60	1021,80	1021,00	1020,20
83	1030,20	1029,40	1028,60	1027,80	1027,00	1026,20	1025,40	1024,60	1023,80	1023,00	1022,20	1021,40
84	1031,40	1030,60	1029,80	1029,00	1028,20	1027,40	1026,60	1025,80	1025,00	1024,20	1023,40	1022,60
85	1032,60	1031,80	1031,00	1030,20	1029,40	1028,60	1027,80	1027,00	1026,20	1025,40	1024,60	1023,80
86	1033,80	1033,00	1032,20	1031,40	1030,60	1029,80	1029,00	1028,20	1027,40	1026,60	1025,80	1025,00
87	1035,00	1034,20	1033,40	1032,60	1031,80	1031,00	1030					

pondant du volume de l'alcool qui a été employé dans chaque mélange.

La quatrième & la cinquième contiennent l'expression de la pesanteur spécifique des quantités d'alcool & d'eau qui ont été employées; mais dans l'une de ces colonnes, on a exprimé cette pesanteur telle que le calcul la donne en additionnant le poids des quantités d'eau & d'alcool pris avant leurs mélanges. Dans l'autre, la pesanteur spécifique est marquée telle que l'a donnée l'expérience après le mélange des liqueurs, & à la température de dix degrés. Le résultat du calcul comme on peut voir, est ici bien différent de celui de l'expérience. Cette différence dépend d'une circonstance généralement connue; mais qui, peut-être, n'a pas encore été suivie autant qu'elle mérite de l'être; c'est que les liqueurs, en se mêlant, se pénètrent & occupent moins d'espace qu'elles n'en occupoient séparément chacune avant leur mélange. Ce phénomène que l'on désigne sous le nom de pénétration, s'observe d'une manière plus ou moins sensible dans le mélange du plus grand nombre des liqueurs; il se présente journellement dans les pharmacies, lorsque, dans une potion, on ajoute une certaine quantité d'éther ou d'alcool éthéré sulfurique, il s'observe aussi très-sensiblement dans les mélanges d'eau & d'alcool; il y a d'abord un dégagement assez grand de calorique, & lorsque le mélange est revenu à sa température première, on y trouve une augmentation de densité. L'aréomètre suffit pour démontrer cette pénétration des deux liqueurs; mais on peut la rendre encore plus sensible, en apprécier les effets, par un appareil très-simple & très-commode.

Pour cela, on choisit deux flacons de cristallin, de la contenance de six, huit ou dix gros d'eau chacun, ce qui est à-peu-près indifférent; mais il importe que ces deux flacons qui doivent servir de mercure aient exactement la même capacité; il importe que leurs cols soient mis sur une surface plane à l'émeril, & que leur ouverture soit petite, afin de prévenir les différences qui pourroient résulter de la convexité que les liqueurs forment à leur surface.

On choisit ensuite un petit bocal ou bouteille, qui contiennent exactement le double de chacun des flacons ou mesures. Le col de ce bocal doit être allongé, étroit, égal autant qu'il est possible, & il le porte sur un des côtés de sa surface externe, une division par millièmes de sa capacité.

Ce petit appareil que je nommerois volontiers *diaporomètre*, parce qu'il sert à mesurer la pénétration des liqueurs, étant ainsi préparé, on remplit une des mesures d'eau distillée & l'autre d'alcool; on verse ensuite ces deux mesures dans le bocal; on l'agite légèrement en bouchant son ouverture avec le doigt ou avec une glace

usée à l'émeril, & après le dégagement du calorique, lorsque les liqueurs ont repris leur température première, on juge de la pénétration des liqueurs par l'espace qu'elles occupent, & qui se rapporte à une des divisions marquées sur le col.

On ne peut présumer que cette diminution de volume résultant du mélange des deux liqueurs dépende d'une perte de quelques-unes de leurs parties constituantes; mais très-assurément cette augmentation de densité, ou, si l'on veut, cette diminution de volume, ne pourroit tout au plus être attribuée qu'au dégagement de calorique qui a eu lieu dans l'instant du mélange; car si on distille le mélange, si on recueille séparément les deux moitiés, alors chacune des portions aura les mêmes propriétés, occupera exactement le même espace qu'avant l'expérience; & si on en fait de nouveau le mélange, elles se pénétreront de nouveau avec les phénomènes déjà observés.

Cette pénétration des mélanges d'alcool & d'eau employées dans les expériences est exprimée en millièmes dans la sixième colonne de cette table.

La septième contient le rapport de la pesanteur spécifique des différens mélanges d'alcool & d'eau aux degrés du pèse-liqueur de M. Baumé.

Dans les vingt autres colonnes, on a désigné les changemens successifs de la pesanteur spécifique des mélanges d'alcool & d'eau aux différens termes de température les plus ordinaires dans nos climats, & on s'est servi pour cela d'un thermomètre à mercure, divisé, selon M. de Luc en quatre-vingt parties, depuis la glace jusqu'à l'eau bouillante.

La manière de faire usage de cette table, & les avantages qu'elle présente, soit dans les laboratoires, soit pour le commerce, nous arrêteront beaucoup moins que l'explication des différens colonnes dont elle est composée. Pour connoître le degré de rectification d'un alcool, ou, si l'on veut, pour déterminer combien il contient encore de parties d'eau, on commence par s'assurer de la température à l'aide d'un bon thermomètre; on détermine ensuite sa pesanteur spécifique par l'aréomètre, comme nous l'avons indiqué plus haut, puis jettant les yeux sur la table, on choisit la colonne qui marque le degré de température....

On la suit dans toute sa longueur jusqu'à ce qu'on arrive au nombre donné par l'aréomètre; après avoir trouvé ce terme, on suit alors la ligne transversale jusqu'à ce qu'on soit arrivé aux deux premières, qui contiennent l'expression des volumes ou quantités d'eau & d'alcool; par exemple l'alcool qu'on éprouve est à la température de quinze degrés, & sa pesanteur spécifique déterminée par l'aréomètre est de neuf cents. En suivant la ligne transversale, on trouve que cet

alcool est un mélange de trente-six parties d'eau, & de soixante-quatre d'alcool; au contraire la température étant à dix degrés, & la pesanteur spécifique étant la même, on trouve que cet alcool contient seulement trente-quatre parties d'eau sur soixante-six d'alcool.

Il suffit sans doute d'avoir cité ces deux exemples, un peu de réflexion & d'exercice donnera bientôt l'habitude de cette table, en fera facilement saisir la disposition & les avantages.

Nous terminerons ces généralités sur l'alcool en rappelant que ce fluide est d'un usage fort étendu en pharmacie; quelquefois il est employé comme *auxiliaire*, pour faciliter quelque opération, disposer une substance à une préparation ultérieure, c'est ainsi qu'en versant quelques gouttes d'alcool sur du camphre, on le divise facilement, on le réduit en une pâte molle, fine, propre à être incorporée dans des pommades, des cérafs; c'est ainsi qu'en versant quelques gouttes d'alcool dans une masse de pilules qui ont la térebenthine ou quelque baume pour excipient, on hâte le mélange intime des différentes substances dont elles sont composées, & on leur donne avec moins de peine la forme de pilules, &c. mais le plus souvent l'alcool est employé comme *menstrue* ou dissolvant, & fournit pour les arts & pour la médecine, un grand nombre de préparations que nous allons décrire sous le titre d'ALCOOLS OFFICINAUX, & dont nous ferons connaître les genres & les espèces principales; mais pour ces diverses préparations, l'alcool ne doit pas être employé dans le même état; il est des préparations qui exigent l'alcool pur, ou du moins chargé d'une très-petite quantité d'eau; mais il en est d'autres qui seroient moins efficaces si l'alcool étoit pur, s'il n'étoit pas affaibli par une certaine quantité d'eau. Nous distinguerons donc par une épithète les divers états de l'alcool, & nous appellerons :

1°. *Alcool pur ou très-rédistillé*, celui qui est privé d'eau autant qu'il est possible, & dont la pesanteur spécifique à la température de dix degrés est de huit cents; tel est celui que M. de Gouvenain a préparé pour ses expériences.

2°. Nous nommerons *alcool rectifié* celui qu'on obtient par les distillations répétées, telles que M. Baumin les indique; cet alcool, sur cent parties, contient encore six à huit parties d'eau, & sa pesanteur spécifique à la température de dix degrés est de huit cents vingt-deux à huit cents vingt-neuf. Il convient pour la préparation des éthers, pour la dissolution & l'extraction de quelques résines.

3°. Nous appellerons *alcool ordinaire* celui qu'on obtient par des distillations conduites avec moins de ménagement, & tel qu'on le trouve dans le commerce; cet alcool contient généralement de douze à seize parties d'eau, & sa pesanteur spécifique toujours à la température de dix de-

grés est de huit cents quarante-deux à huit cents cinquante-trois; cet alcool convient généralement pour la dissolution des résines, des baumes, des huiles volatiles, de l'arôme des plantes, & de quelques gommés-résines, &c.

4°. Nous comprendrons sous le nom d'*alcool faible* les différentes espèces d'eaux-de-vie du commerce, qu'on nomme quelquefois eaux-de-vie fortes, eaux-de-vie doubles, qui sont composées d'environ parties égales d'eau & d'alcool; la pesanteur spécifique de cet alcool à la température de dix degrés, est d'environ neuf cents trente-cinq. Il doit être employé pour la dissolution de quelques gommés résines, pour l'extraction des propriétés médicamenteuses de quelques plantes, &c. & à ces eaux-de-vie du commerce, quelques fois suspectes, on peut y substituer avec avantage l'alcool ordinaire ou rectifié, affaibli avec parties égales d'eau.

5°. Enfin nous désignerons sous le nom d'*alcool de première distillation*, l'alcool faible que l'on trouve dans le commerce sous le nom d'eau-de-vie ordinaire, & qui, sur cent parties, contient non-seulement soixante parties d'eau, mais encore une portion d'huile & d'acide tartareux fourni par le vin; cette espèce d'alcool très-impur convient quelquefois pour la solution de quelques gommés-résines, de quelques substances extractives, parce que, dans ces préparations, la portion huileuse, & d'acide tartareux combinés avec l'eau & l'alcool, ajoute à l'énergie du dissolvant, ou rend la préparation médicamenteuse plus douce, plus convenable à l'objet qu'on se propose de remplir.

Alcools officinaux.

Nous comprenons, sous ce titre, toutes les compositions fluides dans lesquelles l'alcool est combiné avec une ou plusieurs substances, & dont il forme la partie principale : ces préparations très-multipliées dans les pharmacies, ont été jusqu'à présent désignées sous une multitude de dénominations quelquefois métaphoriques, souvent arbitraires, toujours équivoques, & plus propres à cacher la nature de la composition, à favoriser le charlatanisme & la cupidité, qu'à soulager la mémoire, ou à faciliter la méthode & les progrès de l'étude. Ainsi nous trouvons ces différentes préparations désignées sous les noms de *baumes*, d'*essences*, *quintessences*, *esprits*, *eaux spiritueuses*, *elixirs*, *liqueurs*, *gouttes* & *teintures*, &c. (*Voyez* chacun de ces mots); mais comme l'observe M. Poirer, *delineatio pharmacie chimico-therapeutica*, ces dénominations sont devenues si arbitraires, qu'un pharmacien nomme essence ce qu'un autre appelle teinture; & en conservant ces dénominations vulgaires, il seroit impossible de présenter une division, une classification méthodique des différentes préparations faites avec l'alcool.

Il importe donc pour les progrès de l'art, pour l'avantage de la médecine-pratique, de supprimer toutes ces dénominations insignifiantes, d'y substituer une dénomination simple, uniforme, qui rappelle toujours au médecin la nature de la composition qu'il prescrit.

En nous proposant de faire cette réforme, nous avons senti, comme M. l'opérateur, que l'habitude des anciennes dénominations pourroit embarrasser ceux qui seroient dans le cas de connoître & de rechercher ces préparations : aussi nous nous sommes décidés à joindre les anciennes dénominations aux nouvelles, & à faire mention de ces préparations sous les noms vulgaires, dans les endroits de cet ouvrage où l'ordre alphabétique les appellera. Ce plan nous a paru le plus propre pour concilier les opinions diverses, & anéantir toutes les difficultés que l'intérêt, la routine & le préjugé ne manquent jamais d'élever contre les innovations les plus utiles.

Pour mettre un ordre systématique dans l'exposition des préparations alcooliques, nous les diviserons en genres et espèces. Nous distinguerons deux genres, le premier comprendra les alcools salins, & le second les alcools non salins ou oléagineux ; chacun de ces genres sera divisé en sections, & chaque section en paragraphes, sous lesquels nous rapporterons en autant d'articles séparés les différentes préparations comme autant d'espèces distinctes.

Toutes ces préparations seront désignées par le nom de la substance que l'alcool tient en dissolution ; ainsi nous appellerons *alcool de potasse*, *d'alais*, *de benjoin*, les dissolutions de ces substances faites par l'alcool ; mais comme dans plusieurs préparations, l'alcool tient en dissolution deux, trois ou même un plus grand nombre de substances, nous distinguerons ces espèces secondaires, autant qu'il sera possible, par une seconde épithète formée par une des substances principales qui entrent dans la composition, & qui modifient la propriété première, ou y ajoutent une qualité nouvelle ; mais lorsque les différentes substances combinées avec l'alcool, concourent au même effet, nous nous bornerons à désigner ces préparations par le nom de la substance principale ; mais en y ajoutant l'épithète de *composé* ; enfin dans d'autres cas, nous désignerons la différence de la composition, exprimant le mode employé dans la préparation.

Cette méthode de dénomination, toujours tirée des substances qui entrent dans la préparation, est bien préférable à celle qui seroit fondée sur les propriétés, sur la couleur de la composition, ou d'autres qualités accessoires & variables ; en effet, outre que ces dénominations fondées sur les propriétés n'indiquent jamais complètement quel peut, quel doit être l'effet ou l'action du remède, elles sont souvent fausses, toujours équi-

voques, & peuvent facilement induire en erreur le jeune médecin qui prescrirait d'après le titre du remède.

Nous rendrons ceci plus sensible par quelques exemples.

1°. Au lieu d'appeler, comme on le fait ordinairement, *elixir pectorique*, *elixir asthmique de Londres*, la dissolution de benjoin & d'opium par l'alcool, nous la nommerons *alcool de benjoin avec l'opium*, & nous nommerons *alcool de benjoin aloëse*, la composition dans laquelle le benjoin est tenu en dissolution par l'alcool avec une certaine quantité d'aloës, parce que les substances que l'on fait entrer dans ces compositions, modifient la propriété de la substance principale, & y ajoutent des qualités nouvelles.

2°. Nous nous bornerons à nommer *alcool d'aloës composé*, *alcool de gentiane composé*, d'autres préparations alcooliques, sans désigner une autre substance qui entre dans la composition, parce qu'elles concourent toutes au même effet, & sont seulement des adjuvants de la substance désignée.

3°. Enfin nous distinguerons d'autres espèces par le mode suivi dans la préparation ; ainsi nous appellerons *alcool de lavande par infusion*, *alcool de lavande par distillation*, ces liqueurs qu'on appelloit *eau-de-vie de lavande rouge*, *eau-de-vie*, ou *esprit de lavande*, &c.

Afin que l'on puisse saisir plus facilement, & en quelque sorte d'un coup-d'œil, les principes qui nous ont dirigé dans cette réforme, également nécessaire pour les progrès de la pharmacie, & la pratique de la médecine, nous avons rédigé le tableau ci-joint qui présente les divisions, les dénominations anciennes & nouvelles des préparations les plus ordinairement employées dans la pratique de l'art de guérir, ou décrites dans le plus grand nombre des pharmacopées.

On a déjà dit, & on ne manquera pas de le répéter : « que les dénominations jettent de la confusion dans les idées, parce que, dit-on, ceux qui apprennent la chimie entendront nécessairement par *alcool de potasse*, *esprit de-vin*, ou *esprit ardent tiré de la potasse*, ce qui seroit absurde, parce que la potasse ne fournit rien de spiritueux ».

Mais cette objection, & quelques autres de même nature, que nous lisons dans la sixième édition d'un ouvrage de pharmacie, imprimé en 1790, est assurément plus spécieuse que solide ; elle nous paroit plutôt dictée par un attachement servile & irrésistible pour les anciens usages, que fondé sur la raison ; elle nous paroit même contraire aux principes de dénominations généralement adoptées dans toutes les pharmacies, pour désigner les différentes compositions ; en effet, ne dit-on pas journellement *argente de cantharide*, *de guimauve*, *de mercure*, *emplâtre de minium*, *de bétaine*, &c. & ceux qui apprennent la pharmacie ont-ils jamais entendu que ces on-

guents ou emplâtres fussent tirés de la céruse, de guimauve, du mercure, du minium? ce qui seroit absurde, car assurément ces substances ne contiennent rien d'onctueux, ou d'emplastique. L'étudiant le moins attentif, ne sent-il pas que toutes ces dénominations expriment le mélange ou la combinaison de la substance désignée avec une préparation onguentacée ou emplastique? Et quand on parle d'huile d'hypericum, de sureau, &c. a-t-on jamais entendu que l'huile demandée fût tirée de ces plantes? N'a-t-on pas toujours compris par ces dénominations, la combinaison de l'huile avec les principes de l'hy-

pericum, du sureau, &c. Comment donc le pharmacien, accoutumé à toutes ces dénominations, peut-il trouver absurde & extraordinaire qu'on désigne les combinaisons de l'alcool avec les différentes substances par le nom du dissolvant & de la substance qui y est dissoute? Et loin de jeter la confusion dans les idées comme il l'avance, n'est-ce pas substituer la simplicité, l'uniformité aux embarras d'une nomenclature arbitraire, souvent obscure, & quelquefois extravagante? N'est-ce pas enfin se rapprocher des principes généralement adoptés en pharmacie pour une multitude d'autres compositions?

Classification & dénomination des alcools officinaux, d'après les principes de la nomenclature méthodique de la chimie.

GENRE PREMIER. Alcools salins.

§. I. Alcools acides, combinaisons de l'alcool avec les acides.

Dénominations anciennes.

- | | |
|---|--|
| 1°. Alcool sulfurique, (inf.)..... | { Eau de Rabel.
Elixir acide d'Haller. |
| 2°. Alcool nitrique, (inf.)..... | { Elixir antipodagrique, antinéphrétique de Dippel;
Esprit de nitre dulcifié. |
| 3°. Alcool muriatique, (inf.)..... | { Esprit carminatif des trois.
Esprit de sel dulcifié. |
| 4°. Alcool tartareux, (dist.)..... | { Eau tempérée de Basile Valentin.
Esprit acide de tartre dulcifié de Westrumb. |
| 5°. Alcool acétique, (inf.)..... | { Préparation non employée. |
| A. Alcool sulfurique térébenthiné, (mix.).... | { Baume astringent d'Edimbourg. |
| B. Alcool sulfurique aromatique, (inf.).... | { Elixir de vitriol de Mynsicht.
Elixir de vitriol acide d'Edimbourg. |

§. II. Alcools étherés, combinaisons de l'alcool avec un acide, mais qui dans l'opération, a acquis une partie de l'odeur & des propriétés de l'éther.

- | | |
|--|---|
| 1°. Alcool étheré sulfurique, (dist.)..... | { Liqueur minérale anodine d'Hoffman.
Esprit étheré vitriolique. |
| 2°. Alcool étheré nitrique, (dist.)..... | { Esprit nitreux étheré.
Liqueur minérale anodine nitreuse. |
| 3°. Alcool étheré muriatique, (dist.)..... | { Acide muriatique dulcifié. |
| A. Alcool étheré de succin, (inf.)..... | { Teinture de succin avec la liqueur d'Hoffman. |
| B. Alcool étheré de valériane, (inf.)..... | { Teinture de valériane, avec..... |
| C. Alcool étheré de gayac, (inf.)..... | { Teinture de gayac, avec..... |

§. III. Alcools alcalins ou combinaisons de l'alcool avec un alkali.

- | | |
|---|---|
| 1°. Alcool de potasse, (inf.)..... | { Lilium de Paracelse. |
| 2°. Alcool de soude, (inf.)..... | { Teinture acre de tartre des métaux. |
| 3°. Alcool ammoniacal, (dist.)..... | { Teinture acre d'antimoine d'Hoffman.
Esprit de sel ammoniac vixieux ou spiritueux. |
| A. Alcool ammoniacal avec l'opium, (inf.).... | { Liqueur anodine volatile. |
| B. Alcool ammoniacal de valériane, (inf.).... | { Teinture de valériane volatile. |
| C. Alcool ammoniacal aromatique, (mix).... | { Esprit volatil aromatique huileux, &c. |
| D. Alcool ammoniacal de gayac, (inf.)..... | { Baume, élixir, teinture ou essence de gayac volatil. |

N. B. Les préparations qui se font par simple digestion, sont marquées par l'abréviation (inf.), celles qui exigent la distillation, sont marquées par (dist.), & celles qui se font par une simple mixture, sont désignées par (mix.)

Dénominations anciennes:

- E. Alcool ammoniacal d'assa-fœtida, (inf.)... Esprit de sel ammoniac fétide.
 F. Alcool ammoniacal anisé, (dist.)... Esprit de sel ammoniac anisé.

§. IV. *Alcools salins secondaires, compositions dans lesquelles l'alcool tient en dissolution quelques sels neutres ou secondaires.*

- 1°. Alcool de muriate de fer, (inf.)... Teinture de muriate de fer.
 2°. Alcool de muriate mercuriel, (inf.)... Solution de sublimé spiritueuse.
 3°. Alcool de muriate de chaux, (inf.)... Mixture anti-vénérienne des Suédois, &c.

GENRE DEUXIEME.

Alcools non salins, ou oléagineux.§. I. *Alcools balsamiques.*

- 1°. Alcool de baume de Tolu, (inf.)... Teinture de baume de Tolu.
 2°. Alcool de baume du Pérou, (inf.)... Teinture de baume du Pérou.
 3°. Alcool de benjoin (inf.)... Teinture de benjoin.
 A. Alcool de benjoin aloécé, (inf.)... Teinture de benjoin composée.
 B. Alcool de benjoin avec l'opium, (inf.)... Elixir pargorique, ou aithmatique.
 C. Alcool balsamique de gayac, (inf.)... Elixir ou baume de gayac.
 D. Alcool balsamique aromatique, (inf.)... Baume de vie d'Hoffman.

§. II. *Alcool résineux (1).*

- 1°. Alcool d'aloës, (inf.)... Teinture spiritueuse d'aloës.
 2°. Alcool d'ammonium, (inf.)... Teinture spiritueuse de gomme ammoniacque;
 3°. Alcool d'assa-fœtida, (inf.)... Teinture d'assa-fœtida.
 4°. Alcool d'euphorbe, (inf.)... Teinture ou essence d'euphorbe.
 5°. Alcool de jalap, (inf.)... Teinture de jalap.
 6°. Alcool de gayac, (inf.)... Elixir anti-arthritique des Caraïbes.
 7°. Alcool de mirrhe, (inf.)... Teinture de mirrhe.
 8°. Alcool de fucien, (inf.)... Teinture ou essence de succin simple.
 A. Alcool d'aloës composé, (inf.)... Elixir d'aloës, de propriété de Paracelse.
 B. Alcool de jalap composé, (inf.)... Elixir de jalap composé, ou aithelminitique.
 C. Alcool-résine balsamique, (inf.)... Baume du Commandeur de Pérou.

§. III. *Alcools aromatiques huileux (2).*

- 1°. Alcool camphré, (inf.)... Esprit-de-vin camphré.
 2°. Alcool de canelle, (dist.)... Eau spiritueuse de canelle.
 3°. Alcool d'iris, (inf.)... Eau de violette de Baupé.
 4°. Alcool de lavande par distillation... Eau-de-vie, esprit de lavande.
 5°. Alcool de romarin, (dist.)... Esprit de romarin, d'anthos, eau de la reine d'Hongrie.
 A. Alcool aromatisé composé par distillation... Eau vuln. spir., eau d'arquebuse de Lémery, &c.
 B. Alcool aromatisé composé par infusion... Eau vuln. par infusion, eau vuln. rouge, &c.

§. IV. *Alcools extraits.*

- 1°. Alcool de cachou, (inf.)... Teinture de catechu.
 2°. Alcool de castoreum, (inf.)... Teinture de castoreum, essence.
 3°. Alcool de castoreum composé, (inf.)... Elixir fœtida, anti-histérique utérin.
 4°. Alcool de caecarille, (inf.)... Teinture de caecarille.
 5°. Alcool de cantharides (inf.)... Teinture de cantharides.
 6°. Alcool d'énula-campana composé, (inf.)... Elixir carminatif de Dasse.
 7°. Alcool de fourmis, (dist.)... Esprit de fourmis.
 8°. Alcool de gentiane composé, (inf.)... Teinture de gentiane composée.
 9°. Alcool de gentiane composé, (inf.)... Elixir stomachique ou teinture amère d'Edimbourg, de Stoughton, &c.

(1) Il faut rapporter à cette section toutes les préparations destinées pour les arts, & qui sont connues sous les noms de vernis spiritueux, vernis à l'esprit-de-vin.

(2) On doit rapporter à cette section toutes les liqueurs aromatiques qui se préparent pour la table, pour la toilette, & qui sont l'objet particulier de la parfumerie & du liquoir.

8°. Alcool de genièvre, (disf.).....	Eau de genièvre spiritueuse, eau-de-vie, esprit de genièvre.
9°. Alcool d'hellebore noir, (inf.).....	Teinture d'hellebore noir.
10°. Alcool d'opium, (inf.).....	Teinture d'opium.
Alcool d'opium safrané, (inf.).....	Laudanum liquide, gouttes anodines de Sydenham.
Alcool d'opium camphré, (inf.).....	Teinture d'opium camphrée.
11°. Alcool de pimprenelle, (inf.).....	Teinture ou essence de pimprenelle.
12°. Alcool de pimp. composé, (inf.).....	Essence de pimp.
13°. Alcool de quina, (inf.).....	Teinture d'écorce du Pérou.
Alcool de quina, composé, (inf.).....	Teinture d'écorce du Pérou, composée.
14°. Alcool de rhubarbe, (inf.).....	Teinture de rhubarbe.
Alcool de rhubarbe, composé, (inf.).....	Teinture de rhubarbe composée.
15°. Alcool de safran, (inf.).....	Esprit-de-vin safrané, eau pessilient. d'Hartmann.
16°. Alcool de savon camphré, (inf.).....	Esp. de savon, esp. résolutif, baume favonneux, &c.
17°. Alcool de sabine, (inf.).....	Teinture de sabine.
18°. Alcool de vers de terre, (disf.).....	Esprit de vers terre très.

Sans doute il eût été très-facile de distinguer par le nom même d'alcool, des compositions dans lesquelles il entre; pour cela, il eût suffi de changer la terminaison du mot, aussi on auroit pu désigner sous le nom d'alcool les compositions dans lesquelles entre l'alcool, comme on appelle *cérat* les compositions auxquelles la cire donne la consistance; nous ayons d'abord pensé à cette addition, mais comme l'alcool est toujours le produit de la fermentation vinifiée, comme il est toujours de même nature, il ne peut y avoir d'inconvénient à conserver le mot primitif pour désigner les compositions dans lesquelles il entre comme dissolvant.

Quoi qu'il en soit, les alcools officinaux se préparent ou par simple mixture, ou par digestion, ou enfin par distillation. Tous les pharmaciens ne procèdent pas de la même manière à la préparation des mêmes alcools, & tandis que les uns opèrent par la distillation, les autres se bornent à une simple digestion. Le choix de l'une ou de l'autre de ces méthodes n'est cependant point indifférent, il doit être fondé sur la nature même de la combinaison: nous indiquerons par la suite à chaque formule, la méthode qui paroîtra préférable, nous nous bornerons ici à quelques préceptes généraux.

1°. La mixture ne peut avoir lieu que lorsqu'il s'agit d'unir à l'alcool une huile volatile, ou quelque autre substance fluide; ainsi on prépare souvent dans le commerce les alcools aromatiques en mêlant avec l'alcool quelques gouttes d'une huile volatile extraite des plantes aromatiques; mais on ne procède ne rempli qu'incomplètement l'objet qu'on se propose; les combinaisons sont peu durables, l'huile volatile se sépare facilement par l'addition de l'eau; aussi dans les pharmacies, on ne doit se borner à la simple mixture que pour quelques préparations particulières, & lorsque elles doivent être faites dans l'instant même.

2°. L'infusion ou digestion convient généralement pour la préparation de tous les alcools officinaux; elle est sur-tout nécessaire, lorsque les substances sur lesquelles l'alcool doit agir sont

sèches, compactes, d'une solution, d'une combinaison difficiles; c'est dans des vaisseaux de verre ou de terre cuite en grès qu'on met l'alcool en contact avec les mixtes dont il doit extraire quelques principes; on se sert ordinairement de *vaisseaux de rencontre*, de ballons ou de matras à long col, bouchés avec un liège, avec un papier ou un parchemin collé sur l'ouverture, & si la préparation exige par la suite la distillation, on en fait quelquefois la digestion dans des alambics, dans des cornues; mais dans tous ces appareils, pour prévenir la rupture des vaisseaux qui pourroit être produite, soit par la seule raréfaction de l'air renfermé, soit par la vaporisation de l'alcool, ou par le dégagement des gaz, il importe d'y conserver une petite ouverture qu'on bouche avec un morceau de lut, &c.

Lorsque les substances sur lesquelles l'alcool doit agir sont sèches, on les pulvérise; lorsqu'elles peuvent produire de l'effervescence avec l'alcool, on en fait le mélange peu-à-peu & avec précaution.

Souvent la digestion doit être aidée par l'agitation, souvent elle exige une chaleur plus ou moins grande, & elle doit être de plus ou moins longue durée, suivant la qualité des mixtes sur lesquels on opère.

En général, on doit se borner à la digestion, lorsque le principe médicamenteux consiste dans une substance balsamique, résineuse, extractive, moins volatile que l'alcool, ou lorsque la combinaison première éprouveroit une altération, une décomposition par la chaleur de la distillation; mais dans tous les cas où l'on se borne à la digestion, il importe toujours de tirer au clair la liqueur ou de la filtrer lorsque la solution est complète.

Enfin dans les préparations composées de plusieurs substances résineuses, balsamiques, extractives, il convient de faire infuser séparément ces substances dans différentes portions de l'alcool qu'on doit employer pour la composition, ainsi on prend une partie de l'alcool, & on y fait infuser d'abord les racines, les fleurs, les bois, dans une autre, on fait infuser les gomme-

réfines, enfin s'il entre dans la composition des baumes, on les dissout dans une troisième portion de l'alcool; lorsque l'alcool est chargé de tous les principes qu'il peut extraire de ces différens mixtes, on le décante, on mêle ensemble ces différentes dissolutions, on réunit ensuite dans un ballon tous les résidus de la première digestion, & on y verse la dernière portion de l'alcool qu'on avoit réservée: enfin lorsqu'on a extrait toutes les parties solubles, on décante la liqueur, & on la mêle aux premières dissolutions; cette méthode d'opérer fournit assurément des dissolutions plus chargées, plus colorées que si on ent d'abord versé toute la quantité de l'alcool. Il nous paroît cependant que cet objet mérite encore quelques considérations; car il est certain que différentes teintures ou dissolutions faites par l'alcool, se précipitent lorsqu'on les mélange; mais ce fait n'a pas encore été suivi avec assez d'attention pour qu'on puisse en tirer des conséquences incontestables.

3°. La distillation est le dernier moyen employé dans la préparation des alcools officinaux; elle procure une combinaison plus intime, plus durable, elle est généralement nécessaire pour la préparation des alcools huileux, aromatiques, lorsque les substances employées sont d'une solution difficile, ou contiennent une certaine quantité d'eau, de mucueux, de principe colorant, qui n'ajoutent aucune qualité utile à la préparation; cette méthode ne peut être employée que lorsque les substances dont l'alcool est chargé, & qu'il importe d'y conserver, peuvent être entraînées dans l'acte de la distillation; cette opération se fait tantôt dans des alambics, tantôt dans des cornues, & l'on distille au bain-marie ou au bain de sable, suivant la nature des substances employées, mais toujours à un feu modéré.

On peut procéder à la distillation, immédiatement après le mélange, toutes les fois que l'affinité devienne de l'alcool avec les principes qu'il doit dissoudre, est supérieure aux affinités quiescentes de ces mêmes principes; mais dans le cas opposé, il faut commencer par une digestion continuée plus ou moins long-temps.

On peut distiller à secité, lorsqu'on emploie un alcool rectifié & des huiles volatiles ou des substances sèches, & qui ne puissent point se charbonner, mais il faut interrompre la distillation après avoir obtenu un quart, un tiers, ou une moitié de la masse totale du liquide quand l'alcool est foible de première distillation, ou quand on a seulement employé du vin. Il faut observer les mêmes attentions quand on a mis dans la cucurbitte de l'alambic des plantes fraîches plus ou moins aqueuses; la quantité de l'alcool, la quantité des plantes détermine la quantité de liqueur qu'on doit recueillir dans le récipient.

Toutes les attentions à avoir sont fondées

sur la volatilité de l'eau au degré de l'ébullition, & même un peu au-dessous de ce degré, mais on sent qu'elles ne seroient pas nécessaires, si l'on régloit le feu de manière à ne jamais porter la chaleur à ce degré. Au reste, comme il est possible qu'on s'écarte de cette règle, & qu'on ne puisse pas évaluer au juste la quantité d'alcool qui peut s'élever; il faut, pour se prémunir contre l'erreur, avoir un récipient d'une capacité connue & percé d'un petit trou que l'on tiendra fermé par un petit morceau de lut gras; sur la fin de l'opération, on débouchera cette ouverture pour juger par l'odeur, par l'inflammabilité de la vapeur qui s'échappera, si l'alcool a cessé de passer. Cette précaution sera encore avantageuse dans quelques distillations, parce qu'il est des substances qui fournissent des gaz capables de briser les vaisseaux par leur expansion, & qu'on se mettra ainsi à l'abri de cet inconvénient.

Mais lorsqu'attentif que l'on soit, il est possible que la liqueur passée dans le récipient n'ait pas le degré de pureté qu'on doit désirer, qu'elle soit trop aqueuse, ou qu'il se soit élevé de l'huile non dissoute.

Dans ce cas-ci, on pourra séparer les huiles surabondantes, par une filtration à travers un papier sans colle, double & imbibé d'eau, ou même par le moyen de l'entonnnoir, ainsi qu'il sera dit à l'article *huiles volatiles*. Lorsque la liqueur sera trop chargée de phlegme, on réitérera la distillation à un feu très-doux & fort au-dessous du degré de l'eau bouillante.

Lorsque les alcools auront acquis la perfection désirée, on les conservera dans des flacons de cristal fermés par un bouchon de même matière usé à l'émeril.

I GENRE DES ALCOOLS OFFICINAUX.

Alcools salins.

Nous comprenons sous ce titre générique toutes les combinaisons de l'alcool avec une substance saline, & quoiqu'on ne reconnoisse que trois sortes de substances salines, savoir les acides, les alcalis & les sels neutres ou secondaires, nous distinguerons conformément au tableau que nous en avons donné, quatre espèces principales d'alcools salins, dont nous traiterons dans autant de sections particulières. Nous distinguerons encore ces alcools en *simples* & en *composés*; nous appellerons *simples*, les préparations dans lesquelles l'alcool tient en dissolution une seule substance, & nous nommons *composés*, celles dans lesquelles l'alcool est combiné avec deux, trois, ou même un plus grand nombre de substances.

§. 1°. *Alcools acides.*

L'alcool peut s'unir en toutes proportions avec

presque tous les acides connus, mais il ne forme pas avec tous une combinaison également intime, & qui soit également utile dans nos pharmacies; ce seroit donc s'arrêter à des objets superflus de l'examiner & de rechercher toutes les combinaisons possibles de l'alcool avec les différentes espèces d'acides. La pharmacie, comme on convient tous les hommes instruits & de bonne foi, est déjà surchargée d'un si grand nombre de préparations & de formules compliquées, bizarres, ridicules, inutiles ou même dangereuses, qu'on ne sauroit apporter trop d'attention à ne pas multiplier ces préparations; nous nous bornerons donc à décrire cinq espèces d'alcools acides généralement employés, ou qui nous paroissent pouvoir l'être avec avantage dans quelques cas; nous ferons connoître les différents modes d'opérations qui ont été successivement conseillés ou employés pour la préparation de ces alcools; mais quoique ces détails historiques servent à faire connoître les progrès de l'art, nous ne nous y arrêterons pas en traitant des autres espèces d'alcools moins importants, nous nous bornerons simplement à en exposer la formule, le mode de préparation le plus convenable, & à indiquer en peu de mots leur usage & leurs propriétés principales.

Ces alcools acides sont généralement connus sous le nom d'*acides dulcifiés*, ou *esprits acides vineux*, & ces préparations sont non-seulement fort utiles en médecine, mais encore elles forment un dissolvant composé, que l'on peut employer avec beaucoup d'avantage pour extraire les résines & les principes de différents mixtes.

Première espèce. Alcool acétique.

Pour faire cette préparation, il faut employer de l'acide acétique & de l'alcool rectifié, & pour rendre la combinaison plus intime, on les laisse en digestion sur un bain de sable modérément échauffé pendant huit ou dix jours; d'après les essais que nous avons faits, il nous a paru que la meilleure proportion étoit de quatre parties d'alcool sur une d'acide acétique; l'odeur très-vive & pénétrante dans l'inslant du mélange, s'adoucit par la combinaison avec l'alcool, & après quelques jours de digestion, la liqueur ne rougit les papiers bleus qu'après l'évaporation de l'alcool; brûlée dans une cuiller, elle laisse une eau faiblement acide, & ayant encore la saveur de l'alcool, circonstances qui annoncent une combinaison intime de l'alcool avec l'acide acétique.

Cette préparation n'est point employée en médecine, mais il nous paroît qu'elle pourroit l'être avec avantage, sur-tout dans les maladies putrides, comme un anti-septique cordial, propre à exciter l'action vitale, & à favoriser l'excrétion des sueurs & des urines; la dose en seroit de quatre cents soixante gouttes dans des potions appro-

priées & prises à la cuillerée. Cette préparation pourroit aussi être employée en pharmacie comme un dissolvant composé, propre à extraire les résines & les principes médicamenteux de différentes substances; & ce sont ces considérations qui nous ont engagés à faire mention ici de cette préparation.

1°. *Alcool muriatique, précédemment acide du sel commun doux, ou acide muriatique dulcifié, esprit vineux muriatique, eau tempérée de Basile Valentin, &c. &c.*

La combinaison de l'acide muriatique & de l'alcool a été connue par plusieurs anciens chimistes, tels que Raymond Lulle, Isaac le Hollandais, &c. mais ils en ont parlé d'une manière obscure; Basile Valentin est le premier qui ait décrit avec clarté le procédé à suivre pour préparer cette composition, & l'on verra que les modernes qui ont travaillé sur le même sujet, n'ont fait que perfectionner ses procédés, & suivre l'idée qui l'avoit conduit à les employer. Par le premier, il prescrivit de mêler l'acide muriatique à l'alcool, de distiller ce mélange, & de verser trois fois dans la cornue ce qui aura passé dans le récipient. Il employoit dans le second le muriate d'antimoine sublimé, ou beurre d'antimoine qu'il rectifioit avec l'alcool.

Salomon Trimosinus se bornoit à verser de l'alcool sur du muriate mercuriel corrosif, & par des distillations, des cohobations, des rectifications multiples, jusqu'à ce qu'il retirât une liqueur limpide, il obtenoit l'alcool muriatique.

Paracelse, pour avoir la même préparation, employoit les deux procédés de Basile Valentin, celui de Trimosinus, & un quatrième, qui consistoit à dissoudre du muriate de soude ou sel marin dans du suc de raisin, à distiller cette dissolution, & à mêler à l'alcool le produit de la distillation.

Pour, des œuvres duquel nous avons extrait ces détails, (deuxième dissertation du tome II de la traduction de M. Machy.) fait observer que, depuis Paracelse jusqu'à Beguin, les chimistes ne le font pas occupés de cet alcool; que Beguin n'a même fait que copier ce que Paracelse en avoit dit, mais que Hartman, dans ses notes sur Crollius, avance que l'acide muriatique s'adoucit uniquement par le moyen de l'alcool, soit qu'on ajoute cette liqueur avec le sel, ou qu'on le mêle à l'acide muriatique pour les cohobations ensemble.

Le même auteur dit encore que Kessler recommande l'alcool aiguisé par les cristaux doux de sel marin; que Cardilius prescrivit de distiller trois fois le mélange de parties égales d'acide muriatique & d'alcool, pour avoir un préservatif contre la peste; & que Maerz, ainsi que plusieurs médecins,

médecins Hollandois ayant fait usage de cet alcool dans leur pratique, c'est d'après eux qu'on a commencé à l'employer assez fréquemment en médecine.

Cependant, malgré leur exemple, on a longtemps considéré cet alcool comme un remède suspect; on a longtemps hésité sur la nature de cette combinaison, ses propriétés & le mode de l'obtenir, parce qu'on n'employoit que des procédés, parce qu'on n'avoit pas saisi les principes qui doivent diriger dans cette préparation. L'imperfection de la plupart des alcools muriatiques qu'on trouvoit alors dans la pharmacie, confirmoit encore dans cette idée; on ne voyoit, dans cette préparation, qu'un simple mélange d'acide avec l'alcool; mais enfin la chimie plus éclairée a fait cesser toutes les incertitudes sur cet objet; elle a fait connoître que l'on pouvoit d'une manière assurée & par des procédés simples & faciles obtenir une combinaison intime de l'acide muriatique avec l'alcool, & procurer constamment cet état de dissolution ou de combinaison que la médecine desiroit dans l'usage de ce remède; enfin l'expérience a démontré que pour parvenir à ce point, il y a deux conditions essentielles, l'une d'employer un acide muriatique concentré ou fumant, & l'autre de choisir un alcool rectifié.

Tous les artistes font d'accord sur la nécessité de ces conditions, & nous verrons dans l'exposition des différens procédés qui sont en usage, qu'ils se font tous atteints à les remplir; mais tous ne pensent pas de même au sujet des doses respectives de ces deux drogues; les uns emploient deux parties d'alcool contre une d'acide; les autres trois, quatre & même six; ils diffèrent aussi d'opinion, relativement au procédé à suivre, les uns regardent comme suffisante une digestion de deux à trois jours, les autres de dix, douze, même quatorze, & il en est qui distillent le mélange & répètent les distillations, en versant dans la cornue ce qui est passé dans le récipient.

Mætz, & d'autres chimistes, au rapport de M. Pott dans l'ouvrage cité, mêloient l'alcool rectifié, au muriate de soude, y ajoutoient de l'acide sulfurique & distilloient le mélange, ou bien faisoient dissoudre une livre de muriate de soude dans de l'eau bouillante, & mêloient à cette dissolution trois livres d'alcool rectifié & une livre d'acide sulfurique, puis soumettoient le mélange à la distillation.

Mais, comme l'observe très-bien M. Pott, ces procédés sont défectueux, parce qu'ils ne fournissent qu'un produit impur bien éloigné de l'objet qu'on desire, puisque cette préparation se trouve toujours assaillie d'une certaine quantité d'eau, toujours chargée d'une assez grande quantité d'acide sulfurique qui a été vaporisé dans l'acte de la distillation.

Glauber cité par M. Pott, procédoit d'une

Chimie. Tome II.

manière bien différente; il mêloit six parties d'alcool à une partie d'acide muriatique, & enflammait le mélange sous la cloche; il mettoit sur le résidu du nouvel alcool qu'il faisoit encore brûler & remettoit la liqueur qui couloit le long des bords de la cloche, mais il n'avoit qu'une eau légèrement acide, & non pas un alcool muriatique.

M. Pott fait encore mention d'un procédé qu'il qualifie d'ingénieux, & qui consiste à mettre dans un récipient huit à dix parties d'alcool, & dans une cornue tubulée, quatre parties de muriate ammoniacal ou sel ammoniac; après avoir réuni le ballon & la cornue & luté les jointures, l'artifice versoit par la tubulure deux parties d'acide sulfurique; le muriate ammoniacal étoit décomposé, l'acide sulfurique s'unissoit à la base de ce sel, & en dégageoit le muriatique qui passoit dans le récipient, & alloit se combiner avec l'alcool qu'on y avoit mis.

Ce procédé a paru si bon à M. Pott, qu'il le regarde comme le moins dispendieux & le plus certain, mais il substitue au muriate ammoniacal celui de soude ou sel marin commun. M. de Machy, dans les notes dont il a accompagné sa traduction, improuve ce procédé, parce qu'on ne peut pas savoir quelle est la quantité d'acide muriatique qui aura été dégagée par le sulfurique, & qu'une portion de cet acide pourra se vaporiser, passer dans le récipient conjointement avec l'acide muriatique, se combiner avec l'alcool, ce qui formeroit une composition chargée de deux acides. Le traducteur de la pharmacopée de Londres, fait au sujet de ce mélange la même remarque, mais nous croyons qu'il est aisé de faire cesser aujourd'hui les craintes de l'un & de l'autre de ces savans.

1°. On fait par les expériences de MM. Bergman & Kirwan, que dans quatre onces de muriate de soude, il y a environ deux onces d'acide; ainsi l'on peut évaluer la quantité que le sulfurique déplacera.

2°. Il est probable que ce dernier acide, quoique plus pesant que le muriatique, quoiqu'attiré par la base du muriate, ayant plus d'affinité avec l'alcool que n'en a l'acide muriatique, passera en partie dans le récipient, & se confondra avec l'alcool muriatique; mais à l'aide du muriate de baryte, il sera facile de reprendre l'acide sulfurique & de purifier l'alcool; une double affinité procurera cette dépuracion, la baryte s'emparera de l'acide sulfurique & tendra le muriatique en échange à l'alcool.

Ainsi nous regardons le procédé approuvé par M. Pott, comme méritant la préférence sur tous ceux qui avoient été imaginés avant lui, pourvu qu'on emploie à sa dépuracion le muriate barytique.

Boethaave & les auteurs des dispensaires de Wittenberg, de Brandebourg, & de plusieurs

P

autres, veulent qu'on procède par la distillation à la préparation de l'alcool muriatique & qu'on mêle trois parties d'alcool à une d'acide dans la cornue, cela nous paroit moins avantageux que de présenter l'acide en vapeur à l'alcool contenu dans le récipient.

M. Spielman dans sa pharmacopée admet ce procédé, mais ne fait le mélange que de six parties d'alcool contre huit d'acide; par ce moyen il prétend avoir dans le récipient un alcool très-huileux & très-acide; mais pour en modérer l'acidité, il prescrit de mêler ensuite une once de cet alcool à quatre onces de nouvel alcool; procédé qui donnera un excellent alcool muriatique dulcifié.

Le savant traducteur de la pharmacopée de Londres propose de faire digérer seulement dans un matras garni de son vaisseau de rencontre, sur un bain de sable pendant dix à douze jours, un mélange d'une partie d'acide muriatique fumant avec trois parties d'alcool rectifié; on obtient par ce procédé une liqueur citrine, d'une odeur agréable & qui n'est point corrosive. On ne peut se refuser à reconnaître que de tous les procédés, c'est le plus simple & le plus facile à pratiquer. Malouin conseille à-peu-près le même procédé; nous en rapporterons la formule, parce qu'elle présente le détail de toutes les attentions qu'il faut avoir dans cette opération.

« Mettez dans un grand matras huit onces d'alcool rectifié; versez-y peu-à-peu quatre onces d'acide muriatique, & chaque fois que vous y en aurez mis, bouchéz le matras avec un bouchon de liège. Lorsque tout l'acide muriatique y aura été versé, mettez à la place du bouchon un autre petit matras renversé & lutez-en exactement les jointures; laissez le tout en cet état pendant huit ou neuf jours, remuant de temps en temps, ensuite faites digérer encore pendant un mois sur les cendres chaudes, à un feu de sable très-doux, n'oubliant pas de remuer tous les jours; enfin laissez bien refroidir le tout, & versez cette liqueur dans une bouteille que vous boucherez exactement ».

Ce procédé simple & facile, qui est également indiqué dans la pharmacopée de Paris, remplit bien l'objet qu'on se propose, mais la dose de l'acide muriatique nous paroit un peu trop forte dans cette formule, & nous croyons plus convenable de n'employer qu'une partie d'acide contre trois d'alcool.

Les propriétés médicales de cet alcool se rapprochent beaucoup de celles de tous les acides minéraux, mais elles en diffèrent par une sorte d'état savonneux; il se neutralise comme les acides les humeurs alcalines, corrige & prévient la putridité, calme la soif, stimule les fibres, mais il agit avec une force modérée & en qualité de substance savonneuse il devient un dissol-

vant efficace des humeurs muqueuses trop densées. La réunion de ces propriétés le rend stomacique, apéritif, & diurétique; on le donne à la dose de 30 à 40 gouttes dans un véhicule approprié à la maladie contre laquelle on y a recours, ou dans des tisanes jusqu'à agréable acidité.

On recommande l'alcool muriatique à la dose désignée ci-dessus, contre les accidens qui accompagnent & suivent l'ivresse.

Cn debite à Paris, sous le titre d'eau de Baileau & de Beloffe, une liqueur à laquelle on attribue des propriétés merveilleuses contre les suites des chûtes & des coups reçus; mais cette eau si vantée n'est autre chose qu'un acide muriatique imparfaitement dulcifié par l'alcool coloré par l'addition du safran: elle ne mérite aucune confiance.

La vertu de guérir la hernie, attribuée par le prieur de Chabrieres à l'acide muriatique, (*l'ouvrage l'art, de cet acide*), a engagé à employer l'alcool muriatique dans la même maladie. Lieutaud, (pag. 541. de son *Synopsis medicina practica*) le conseille, & Malouin (dans le 2. tom. de sa chimie médicinale, p. 490) trace la méthode à suivre dans l'usage de ce remède.

Cn en donne tous les matins à jeun & tous les après-midi quatre heures après dîner, depuis deux gouttes jusqu'à douze, dans une demi-verrée de vin composé d'après la formule suivante.

Prenez une poignée de la racine du sceau de Salomon, pilez-la après l'avoir nettoyée & lavée; versez dessus vin blanc, deux livres; laissez ce mélange en digestion pendant trente heures, filtrez-le, & conservez le vin pour l'usage dans une bouteille bien bouchée.

Cn applique en même temps sur l'endroit par où l'intestin a coutume de s'échapper, un cataplasme préparé, avec la même racine du sceau de Salomon, prise fraîche & simplement pilée, cataplasme qu'on assujettit avec un bandage.

Il faut continuer ce remède pendant un mois, rester au lit pendant tout ce temps-là, & observer un régime exact. Malouin assure avoir vu plusieurs jeunes personnes guéries par ce traitement; le régime, l'application du cataplasme & le séjour au lit, ont probablement plus contribué à la guérison que l'alcool muriatique. La confiance qu'a méritée Malouin nous a engagé à rapporter son observation dans cet article.

3°. Alcool nitrique.

Cette préparation que l'on nomme ordinairement esprit de nitre dulcifié, esprit de nitre vineux, esprit de vin nitreux, acide du nitre doux, quelquefois esprit carminatif des trois & même essence de nitre, est une combinaison de l'alcool avec l'acide nitrique.

Les procédés pour la préparation de cet alcool ont été ainsi variés, aussi multipliés, que pour la préparation de l'alcool muriatique, & on a eu la même incertitude sur la nature, le choix des substances qu'il falloit employer, & leur dose respective. Les uns conseillèrent de choisir un acide nitreux ou concentré, & un alcool rectifié, d'autres préférent un acide nitrique pur, & un alcool affaibli d'une certaine quantité d'eau. Les premiers qui firent cette préparation, se bornoient à mettre dans une cucurbitule de verre de l'acide nitreux, sur lequel ils versèrent en une seule fois la totalité d'alcool qu'ils destinoient à cette composition; mais ce mélange brusque est bientôt suivi d'une grande effervescence; la quantité de gaz & de vapeurs tutillantes qui s'en élèvent, incommode l'artiste, entraîne une partie de la combinaison, & le dégagement subit d'une quantité considérable de calorique, fait souvent briser les vaisseaux; on prit donc le parti de verser l'acide sur l'alcool, de le mélanger peu-à-peu pour prévenir les effets de la chaleur excessive qu'auroit produite la fusion brusque de la totalité, d'agiter le vaisseau pour faciliter la combinaison, enfin de faire le mélange dans une cornue tubulée garnie de son récipient; on introduisoit l'acide nitreux par la tubulure; on recueilloit les vapeurs dans le récipient.

Quelques artistes persuadés que la combinaison seroit plus facile & plus parfaite si on portoit sur l'alcool l'acide nitreux lorsqu'il se dégage de sa base, mirent dans une cucurbitule du nitrate de potasse & de l'alcool, y versèrent par-dessus une certaine quantité d'acide sulfurique.

D'autres, cités par M. Pott, imaginèrent d'après le même principe de mettre de l'alcool dans un récipient, & du nitrate de potasse dans une cornue tubulée, & après avoir ajusté ces vaisseaux, & luté les jointures, ils versèrent peu-à-peu par la tubulure de l'acide sulfurique. On concevoit facilement la théorie de ce procédé. L'acide sulfurique s'emparant de la potasse déplaçoit l'acide nitrique, qui, réduit en vapeur, passoit dans le récipient & se combinait ainsi avec l'alcool.

M. Pott considérant que l'effervescence peut vaporiser en même temps une petite portion de l'acide sulfurique, y joignit à cet appareil un ballon enflé, & il plaçoit l'alcool dans ce second récipient, espérant par cette disposition que l'acide nitrique seiroit se combiner avec l'alcool.

Les auteurs des dispensaires de Brandebourg, de Hambourg, de Ratibonne & de Wirtemberg, ont conseillé un autre procédé bien plus compliqué encore; entraînés comme Pott par la crainte de l'alliage d'une portion de l'acide sulfurique, ils y recommandent de faire un mélange de tartre acide de potasse, ou *tartre blanc*, & de nitrate de potasse, & d'en faire la protection par parties dans une cornue tubulée, dont le col est reçu dans un récipient qui contient une certaine

quantité d'alcool; ces auteurs pensoient que par cette détonation, l'acide nitrique se dégageoit de sa base, passoit dans le récipient, sous forme de vapeurs, se combinait ainsi avec l'alcool, & ils donnoient au produit de cette opération le nom singulier d'*esprit carminatif des trois* (Spiritus carminativus de tribus) Nous ne nous arrêterons pas à faire observer l'insuffisance & les défauts de ce procédé; aujourd'hui que la chimie est plus éclairée, on sent très-bien que par cette détonation on n'obtient qu'une décomposition de l'acide nitrique.

Nous trouvons encore bien d'autres différences dans les procédés employés pour la combinaison de l'acide nitrique avec l'alcool; plusieurs artistes se bornent à la simple digestion du mélange; d'autres emploient la distillation, & parmi ces derniers, les uns font précéder la distillation par plusieurs jours de digestion, les autres y précèdent immédiatement après l'effervescence du mélange; il en est qui distillent jusqu'à siccité; il en est qui arrêtent la distillation au moment où les sries cessent de paroître dans le ballon, ou bien lorsqu'à travers le trou pratiqué dans le récipient, ils sentent une odeur marquée d'acide. Enfin il en est qui versent sur le résidu que contient la cornue, la liqueur qui a passé dans le ballon, & la cohobent ainsi deux ou trois fois. Il y a encore plus de diversité dans la proportion sous laquelle on emploie l'alcool & l'acide nitrique; elle est dans quelques procédés d'une égalité parfaite; dans plusieurs comme 2:1, 3:1, 4:1, & même comme 8:9.

Hoffman (liv. 2. de ses observations chimiques) & le traducteur de la pharmacopée de Londres, (dans ses notes pag. 374 du 2e. vol.) font observer qu'elle doit être réglée d'après la rectification de l'alcool, & la concentration de l'acide; & suivant Hoffman, il faut généralement une partie d'acide nitrique sur huit d'alcool pour une dulcification ou combinaison parfaite.

Nous ne nous arrêterons pas davantage à ces détails plus curieux qu'utiles, nous nous bornons à présenter la formule simple que donne la pharmacopée de Paris, pour la préparation de l'alcool nitrique.

Mettez dans un grand matras *douze onces* d'alcool rectifié, versez dessus peu-à-peu & à différentes reprises *six onces* d'acide nitrique pur, & faites digérer pendant un mois.

Le plus grand nombre des Pharmaciens se borne à faire le mélange d'une partie d'acide, contre trois d'alcool, & cette préparation nous paroit la meilleure.

Malouin avertit que cette opération doit se faire sous la cheminée, & il conseille de placer le matras sur un plat rempli de cendres; il faut, continue-t-il être très-long-temps à faire le mélange & boucher le matras avec du papier feulement lorsqu'on s'en éloigne; enfin lorsqu'on a

mêlé tout l'acide nitrique avec l'alcool, on ajuste au matras un vaisseau de rencontre, & on lute les jointures, on porte le tout dans un lieu frais en été, ou dans un lieu tempéré en hiver; on les laissera en digestion ainsi pendant 40 jours, remuant de temps en temps les matras entre les mains, sur-tout les premiers jours qu'il faudra remuer à tous momens, pour qu'il ne se fasse pas de combinaisons séparées qui tiendraient de celles que produit la distillation. »

Crollius, au rapport de M. Pott, paroît être le premier qui ait fait usage de l'alcool nitrique; Hartman, & Rolfincius l'ont imité, & depuis, ce remède a chaque jour acquis plus de crédit. On l'a recommandé comme stomachique, apéritif, antiseptique, diaphorétique; sa vertu diurétique l'a fait célébrer par Sylvius, comme un lithontriptique efficace; mais l'expérience n'a pas confirmé les idées de ce célèbre médecin chimiste.

On l'emploie ordinairement à la dose de 20 à 40 gouttes dans des potions, des eaux distillées; on l'ajoute quelquefois dans des tisanes à la dose d'un gros par deux livres de boisson; on s'en sert quelquefois pour toucher les aphtes, & les ulcères gangréneux de la bouche, de la gorge. Hoffman remarque que la propriété diaphorétique de cet alcool est beaucoup augmentée, si on le mêle avec de l'alcool ammoniacal, enfin on a regardé cette préparation comme un carminatif efficace, &c. mais son usage mérite toujours quelques attentions.

4°. Alcool sulfurique.

Cette préparation que l'on connoît vulgairement sous les noms d'eau de Rabel, *Elixir antipodagrique*, *antiphthérique de Dippel*, *Elixir acide de Haller*, est une combinaison de l'acide sulfurique avec l'alcool; elle n'a été fréquemment employée en médecine que depuis la fin du dernier siècle, époque à laquelle un empirique nommé Rabel mit cette composition en réputation, en l'annonçant comme un moyen efficace d'arrêter les hémorrhagies même après la section des gros vaisseaux, dans les amputations des membres; quelques succès exagérés, ainsi que c'est l'usage, firent la fortune de ce remède & do son promoteur, & l'on donna à cette préparation le nom de celui qui passoit pour en être l'inventeur.

Le procédé de Rabel étoit très-compiqué; soit ignorance, soit désir d'en imposer par l'embarras des manipulations, cet empirique a surchargé de pratiques minutieuses & superflues la formule qu'il a donnée de son remède. Il prenoit des marcasites ferrugineuses qu'il trouvoit près de Passy, & qu'il assuroit être les seules qui pussent donner de l'efficacité à son remède; il en faisoit une forte lessive & l'exposoit à l'air, puis les arrosoit avec la même lessive,

jusqu'à ce qu'elles fussent tombées en efflorescence. Il les lessivoit encore, & par l'évaporation obtenoit un sulfate de fer dont il retirait l'acide par la distillation, & c'étoit cet acide qu'il dulcifioit par l'alcool au moyen de la digestion, en mêlant deux parties de cet alcool à une d'acide sulfurique.

Les chimistes attentifs reconnurent aisément l'inutilité du choix & de toutes les précautions minutieuses que Rabel recommandoit; ils s'assurèrent bientôt qu'on obtenoit le même produit, en employant l'acide sulfurique ordinaire, qu'il falloit seulement avoir l'attention de choisir un acide concentré, pur, limpide & un alcool rectifié.

L'opinion des artistes sur le procédé à suivre dans la composition de l'alcool sulfurique n'est pas aussi uniforme; plusieurs veulent qu'après une digestion préalable de ses deux parties constituantes, on soumette le mélange à une distillation, mais les autres, & ils sont en plus grand nombre, se bornent à la simple digestion.

Mais il nous paroît qu'il ne peut y avoir de doute sur ce point. L'intention dans cette composition est seulement de combiner l'acide avec l'alcool, & non pas de lui donner un caractère éthéré; ainsi nous pensons avec Lemery, avec la faculté de médecine de Paris, le traducteur de la pharmacopée de Londres, & le plus grand nombre de pharmacographes, qu'il faut procéder de la manière suivante, à la préparation de l'alcool sulfurique.

Prenez acide sulfurique concentré une partie, alcool rectifié trois parties.

Mettez l'alcool dans un matras à long col, versez dessus peu-à-peu l'acide sulfurique, il y aura un mouvement intestin bruyant & beaucoup de chaleur, & d'autant plus que ces ingrédients seront plus concentrés; remuez le matras pour accélérer la combinaison & n'ajoutez de nouvelle portion d'acide qu'après que le mélange sera devenu calme, adaptez au matras qui le contiendra un matras de rencontre, lutez les jointures, & laissez le tout en digestion à froid pendant sept à huit jours, décantez la liqueur & conservez-la pour l'usage dans un flacon de verre bouché avec un bouchon usé à l'emfil.

Cette liqueur a une odeur suave un peu éthérée, une faveur aromatique, stiptique, & très-acide sans être caustique, une couleur rouge claire. Cette couleur est très-pâle, si l'on s'est servi d'alcool mal rectifié, ou d'acide sulfurique foible; elle tire sur le brun si cet acide étoit noir ou rouge, si l'alcool tenoit en dissolution quelques substances huileuses étrangères, & l'on doit suspecter tout alcool sulfurique d'une couleur très-foncée. Pour masquer l'imperfection de cette liqueur préparée avec des drogues mal conditionnées, on la colore souvent avec les

fleurs de coquelicot ; ces altérations sont de peu d'importance par elles-mêmes, mais lorsqu'elles déguisent l'imperfection de la combinaison, elles méritent beaucoup d'attention.

Si l'on est donc dans le cas de soupçonner cette imperfection, il faudra en verser quelques gouttes sur du carbonate de potasse, il n'y aura qu'un léger frémissement, s'il y a combinaison des parties constituantes, & effervescence marquée si l'acide est trop à nud.

Dans ce cas on pourroit réparer en partie le mal, en mettant du même alcali dans l'alcool sulfurique pour s'emparer de l'acide non combiné, mais il faut user de ce moyen avec précaution, & s'arrêter au moment où l'effervescence ne seroit plus bien sensible, le sel qui se seroit formé se cristalliserait à la longue ou la liqueur saline se sépareroit & occuperoit le bas du flacon ; on pourroit par une décantation ménagée avoir à part l'alcool pur.

C'est en qualité d'astringent & pour l'usage extérieur, qu'on a principalement employé & qu'on emploie encore cet alcool, mais on s'est convaincu par l'expérience que s'il est capable d'arrêter le sang des vaisseaux même artériels ouverts, ce n'est que sur les plus petits qu'il peut agir avec efficacité, & la prudence a engagé les chirurgiens à lui préférer la ligature des gros vaisseaux, l'application de l'agaric de chène & la compression ; on s'en sert cependant comme d'un remède auxiliaire, & la manière d'en faire usage est d'y tremper des bourdonnets de charpie qu'on applique sur les plaies des vaisseaux.

On l'emploie aussi contre les hémorrhagies du nez, contre les aphtes & les ulcères de la bouche & de la gorge. Dans les premiers cas on l'introduit dans les narines, à l'aide des tentes de charpie. Dans le second on trempe dans un mélange de cet alcool & de miel rosât des pinces de linge dont on touche les ulcères : on s'en sert jusqu'à agréable acidité dans des gargarismes.

Ce remède peut être pris par la bouche en l'étendant dans des potions appropriées, à la dose de huit à douze gouttes, & jusqu'à agréable acidité dans des tisanes.

C'est un roborant légèrement irritant & conséquemment un astringent, un antiseptique, mais il ne peut être employé que dans les cas de relâchement manifeste & d'altération putride. Tout état inflammatoire en contr'indique l'usage.

Les hémorrhagies utérines, celles qui ont lieu par les selles, celles qui ont pour cause une diathèse scorbutique ou atrabilaire, les fièvres pétéchiales, les varioles accompagnées d'éruptions pourprées, sont les maladies dans lesquelles on peut donner avec succès l'alcool sulfurique à doses répétées en potions & en tisanes.

Dans le cas d'une disposition gangréneuse manifestée par de larges taches pourprées &

par un affaiblissement extrême, on peut réunir à l'usage interne de ce remède celui de l'application de linges trempés dans un mélange de ces alcools avec de l'alcool camphré.

5°. Alcool tartareux.

Nous renvoyons à la section suivante l'exposition de cet alcool, qui d'après un nouvel examen nous paroît par sa nature, les propriétés & le mode de sa préparation, être placé plus convenablement au nombre des alcools étherés.

ALCOOLS ACIDES COMPOSÉS.

(A) Alcool sulfurique térébenthiné, & ordinairement Baume astringent d'Embourg.

Prenez alcool sulfurique quatre gros, térébenthine claire, ou huile volatile de térébenthine une once & demie, mêlez peu-à-peu dans un matras, ensuite ajoutez en versant à différentes fois trois onces d'alcool rectifié & faites un mélange exact, en agitant plusieurs fois le matras, ou en remuant la liqueur avec une baguette de verre.

Cette préparation qui n'est gueres qu'une mixture, a été recommandée comme un remède tonique astringent, convenable sur-tout pour arrêter les écoulemens gonorrhéiques ; on l'a aussi recommandée contre les hémorrhagies. La dose est de 16 à 30 gouttes dans un véhicule aqueux ou quelque autre boisson appropriée.

Quelques praticiens ont recommandé dans les mêmes vues l'alcool muriatique, dans lequel on ajoutoit une certaine quantité de baume de Copahu.

(B) Alcool sulfurique aromatique, & vulgairement Elixir de vitriol, Elixir de Myrsich, Elixir de vitriol acide d'Embourg.

Prenez galanga, camomille, absinth, écorces sèches de citron, de chaque quatre gros, géroflie, cannelle, muscade, & gingembre, de chaque deux gros ; concassez, mettez dans un matras, & versez dessus vingt-quatre onces d'alcool sulfurique ; faites digérer pendant huit jours ; l'objet dans cette préparation est de réunir à l'alcool sulfurique l'extract de différentes substances aromatiques ; plusieurs dispensaires ajoutent à cette composition, la sauge, la menthe poivrée ; d'autres prescrivent de faire digérer d'abord dans trente onces d'alcool rectifié, les espèces aromatiques, & après avoir filtré l'infusion d'y ajouter six onces d'acide sulfurique foible ; la pharmacopée de Wurtzbourg prescrit de verser peu à peu sur trois onces d'alcool sulfurique un demi-gros des huiles volatiles de cannelle, de citron, & un gros d'huile volatile de menthe, & de faire digérer ce mélange à un feu très-doux dans un matras bien

bouché. Quelques autres prescrivent un procédé plus compliqué ; nous avons choisi la formule qui nous parait la plus simple & la plus efficace.

Cette préparation a été recommandée comme stomacique, antiseptique. La dose doit être de 10 à 12 gouttes dans un véhicule approprié.

• 5. II. ALCOOLSEETHERES.

Les préparations que nous comprenons dans cette section résultent de la combinaison d'un acide avec l'alcool ; cependant nous les distinguons des alcools acides, parce qu'elles en diffèrent essentiellement, par leur saveur, leur odeur, leur propriété, & par le mode de leur préparation : en effet tous les alcools acides, quelque intime que soit la combinaison, ont une saveur aigre, stiptique ; ils font une effervescence légère avec le carbonate de potasse ; ils rougissent le papier de tournesol, & ils conservent toujours & doivent conserver le caractère de l'acide dont ils sont formés : enfin tous doivent être préparés uniquement par une digestion plus ou moins prolongée. Les alcools étherés ne présentent point de semblables caractères, ils ont une odeur & une saveur particulières ; leur volatilité est plus grande ; ils ne doivent ni rougir le papier de tournesol, ni faire effervescence avec le carbonate de potasse ; enfin leur préparation exige toujours la distillation & quelquefois une seconde rectification.

On nous observera sans doute que plusieurs artistes, que beaucoup de pharmaciens, ainsi que nous l'avons rapporté, conseillent la distillation pour la préparation des alcools acides ; mais n'hésitons pas à le dire avec un grand nombre de médecins & de chimistes, ce procédé est défectueux, c'est dépasser le but qu'on se propose dans la préparation ; car la distillation donne ici des produits nouveaux ; & comme le dit fort bien Malouin, (tom. 2. de sa chimie ; pag. 512) l'alcool sulfurique ou eau de Rabel ne vaudrait rien, & ce ne serait même pas une eau de Rabel, que ce qui résulteroit de la distillation de tout le mélange de l'alcool & de l'acide sulfurique.

Par la distillation du mélange de l'alcool avec quelques-uns des acides minéraux, ce qui distille dans le commencement, n'est pas la même chose que ce qui distille ensuite, & à la fin de l'opération, quand même on distilleroit tout de suite ces différentes espèces de liqueurs ensemble, elles ne sont pas un tout si homogène, si simple que, lorsqu'on fait l'union de l'alcool avec l'acide par une longue digestion seulement.

La distillation fait d'autres combinaisons qui méritent beaucoup, mais c'est pour remplir d'autres vues, & il faut avoir séparément ces différentes combinaisons.

Enfin, ajoute-t-il, la digestion de l'alcool avec les acides, ne le décompose pas comme fait la

distillation, ils s'unissent parfaitement & les acides sont suffisamment adoucis par l'alcool dans la digestion, pourvu qu'elle soit longue, & qu'il y ait assez d'alcool : il faut deux parties d'alcool avec une d'acide, & encore faut-il que l'alcool soit rectifié.

Ces considérations & quelques autres, fondées sur l'énergie de leur propriété dissolvante, nous ont engagés à distinguer les alcools étherés des alcools acides, & nous en décrivons quatre espèces principales.

1°. *Alcool étheré sulfurique*, & vulgairement *Liqueur minérale adonice* d'Hoffman, quelquefois *Liqueur étherée vitriolique*, *esprit d'acide vitriolique*, *esprit de vitriol doux*, &c. &c.

Marremayer, apothicaire à Halle dans le Duché de Magdebourg, est le premier qui ait préparé cet alcool ; il lui avoit donné le nom mystérieux de *panacea de vitriol*, *essence de mayence*, mais cette préparation fut bientôt connue sous le nom de *liqueur minérale adonice* d'Hoffman, parce que ce célèbre chimiste a perfectionné le procédé de l'inventeur, & a fait connoître ses propriétés médicinales.

On ne sait pas exactement quel étoit le procédé que suivait Hoffman dans la préparation de cette liqueur, mais il paroît, notamment par un passage de la XIII^e. de ses observations chimiques, liv. 2. tom. 4. pag. 495, qu'elle étoit le produit de la dissolution de l'huile étherée dans une certaine quantité d'alcool rectifié.

Hoffman venoit de parler de la manière d'obtenir cette huile, & il ajoute : *Hoc oleum aromaticum, recens, exquisite solvitur in spiritu vini rectificatissimo, ipsi que sapore, odore & virtutem conferat anodinum ac sedativum, in omnibus doloribus & spasmodis utilissimum.*

Il semble que d'après ce texte si formel on ne devoit pas varier dans le procédé à employer pour composer cette liqueur ; cependant cette préparation est une de celles pour lesquelles on trouve plus de différentes formules.

Nous ne nous arrêtrons pas à les décrire toutes, mais nous remarquerons deux différences essentielles & très-frappantes.

1°. Quelques-uns se bornent à réunir les deux premiers produits de la distillation du mélange d'alcool & d'acide sulfurique employé pour la préparation de l'éther, ou bien ils consistent simplement de mêler parties égales d'alcool rectifié & d'acide sulfurique, de distiller le mélange à un feu doux, d'arrêter la distillation lorsque l'acide sulfureux commence à se manifester, & ils recueillent ce produit sous le titre d'*esprit d'éther vitriolique* ; ou enfin quelques auteurs veulent qu'on se borne à distiller la liqueur qui reste dans la cornue après la rectification de l'éther.

2°. D'autres persuadés d'après l'autorité & l'expérience d'Hoffman que l'efficacité de la préparation consiste essentiellement dans l'addition de l'huile éthérée, prescrivent de mêler aux deux premiers produits de la distillation de l'éther, l'huile éthérée, ou comme ils l'appellent l'huile douce qui se précipite dans l'acide sulfurique, ou bien comme le recommandent plusieurs, il faut faire dissoudre de l'éther & de l'huile éthérée dans la liqueur aromatique qui s'élève la première dans la distillation de l'éther.

Pour concilier ces différentes prétentions sur lesquelles l'expérience médicale peut seule prononcer, nous distinguons, ainsi que l'ont fait les médecins de Londres dans la dernière édition de leur pharmacopée, en 1788, deux espèces d'alcools éthérés l'un simple, l'autre composé ou huileux, parce qu'il est chargé d'huile éthérée.

Le premier qui est décrit dans la pharmacopée du collège royal de médecine de Londres, sous le nom d'*esprit d'éther vésicatoire*, se prépare comme nous l'avons déjà indiqué plus haut, en mêlant dans une grande cornue de verre une livre d'alcool rectifié, sur lequel on verse peu à peu, avec précaution, en agitant de temps en temps, une livre d'acide sulfurique; on met ensuite le bec de la cornue dans un ballon tubulé, qui reçoit un second récipient, & on distille à un feu très-doux jusqu'à ce que l'on voye des vapeurs d'acide sulfurique.

Cette liqueur très-limpide, d'une odeur suave, éthérée, ne doit point manifester de signes d'acidité, si la distillation a été conduite avec soin, & si on l'a arrêtée à propos.

Le second qui est décrit dans la même pharmacopée sous le titre d'*esprit d'éther vésicatoire composé*, & que nous nommons *alcool éthéré sulfurique huileux* se prépare par la simple mixture d'un gros d'huile éthérée dans deux livres d'alcool éthéré sulfurique simple que nous venons de décrire.

Presque toutes les pharmacopées donnent des formules différentes pour la composition de cet alcool; nous transcrivons celle qu'a donnée le savant traducteur de la pharmacopée de Londres, in-4°.

Prenez *siçe parties* de l'alcool ou esprit aromatique qui s'élève le premier lors de la distillation de l'éther, *dissolvez-y deux parties* d'éther & *une partie* d'huile éthérée.

Cette formule qui paroit se rapprocher des vues qu'Hoffman a données sur la composition de cet alcool, ne diffère de celle du *Codex* de Paris, & de plusieurs autres Pharmacopées que par la proportion des ingrédients; l'huile éthérée étant en plus grande quantité dans cette formule que dans la plupart des autres précédemment données pour la préparation de cet alcool.

Le plus grand nombre des pharmaciens se borne

à la simple mixture des trois substances qui entrent dans la composition de l'alcool éthéré sulfurique huileux; mais quelques-uns distillent le mélange à un feu doux, & ils en nomment le produit *liqueur minérale anodine d'Hoffman rectifiée*. Cette rectification nous paroît une condition nécessaire pour la perfection de cet alcool.

Ainsi préparée cette liqueur est limpide, suave; son odeur participe un peu de celle de l'éther, sa saveur est vive, pénétrante, légèrement stiptique, un peu amère, elle s'évapore facilement, mais plus lentement que l'éther; elle ne rougit point le syrop de violette, & ne répand point d'odeur sulfureuse; elle s'unit à l'eau, mais cependant s'y délaye moins promptement que l'alcool éthéré sulfurique simple, à cause de la quantité d'huile éthérée qu'elle contient.

Ces deux alcools éthérés sulfuriques sont généralement regardés comme sédatifs, anodins, toniques, antispasmodiques, & on les emploie dans les affections nerveuses, hystériques, les coliques venteuses, à la dose de ʒi à 40 gouttes que l'on fait entrer dans des potions, avec des liqueurs appropriées. L'addition de l'huile éthérée, sur-tout quand elle est en grande quantité, paroît augmenter l'effet stimulant, & le rendre plus durable.

On en a aussi recommandé l'usage extérieur dans les douleurs de tête. Menck en recommande l'application dans la carie, & il regarde la mixture de l'alcool éthéré sulfurique avec le miel comme un très-bon vulnéraire.

Malgré les grands éloges prodigués à ces préparations, il faut en éviter l'usage trop fréquent ou porté à trop haute dose. Il paroît augmenter la chaleur, & déterminer un genre particulier d'irritation: c'est sur-tout dans les grandes foiblesses, à la suite des hémorrhagies, & chez les femmes très-sensibles, qu'il faut être circonspect sur l'usage de cette préparation. Nous avons vu quelquefois dans ces cas des potions préparées avec l'alcool éthéré sulfurique huileux, causer des vertiges, une sorte de stupeur & d'ivresse qui se renouvelloit toutes les fois qu'on administroit ce remède.

Nous terminerons cet article en remarquant, 1°. que ces alcools éthérés ne doivent donner aucun signe sensible d'acide. Cependant si on néglige quelque attention dans leur préparation, ou si on les conserve très-long-temps, on dans des flacons mal bouchés, l'acide devient alors sensible, & on parvient facilement à enlever cet acide, qui n'est pas combiné, en projetant dans la liqueur quelques grains de carbonate de potasse, & il convient de distiller ensuite cet alcool à un feu très-doux. Quelques pharmaciens qui aiment à multiplier les dénominations, désignent ce produit sous le nom de *liqueur minérale anodine d'Hoffman alcalisée*.

20. Si dans la préparation de l'alcool éthéré sulfurique huileux, on a employé une huile éthérée, qui contient encore un peu d'acide sulfureux, l'alcool en conserve l'odeur, & on ne peut que difficilement l'enlever. On peut cependant avec quelque avantage imiter des pharmaciens, qui, après avoir dissous de la potasse dans la liqueur, en font la distillation à un feu très-doux.

30. Enfin, comme ces alcools sont très-volatils, il faut toujours renfermer les pions où entrent ces liqueurs dans des bouteilles bouchées exactement, au moins avec un liège. Ce conseil pourra paroître minutieux : mais nous avons vu si souvent négliger la précaution qui en est l'objet, que nous n'avons pu nous refuser à le donner.

20. *Alcool éthéré nitrique ou vulgairement liqueur minérale anodine nitreuse, esprit d'éther nitreux, esprit nitreux éthéré.*

Cette préparation est bien moins connue que la précédente. Nous ne nous arrêterons pas à présenter les différens procédés qu'on a imaginés & employés successivement pour préparer ce remède, ce seroit presque répéter sous d'autres noms, ce que nous avons déjà dit plus haut ; nous rapporterons seulement la méthode simple, facile, que MM. de Laffon père, & Cornette, ont publiée dans les mémoires de la société royale de médecine, & que nous avons fait répéter plus d'une fois au laboratoire de l'académie de Dijon.

On met dans une ample cornue de verre, une livre d'acide nitrique très-pur, (cette pureté absolue est ici très-nécessaire,) avec deux livres d'alcool foible, l'un & l'autre donnant vingt-cinq à vingt-six degrés au pèse-liqueur de M. Baumé, (c'est-à-dire dont la pesanteur spécifique est d'environ 900) on laisse digérer le mélange pendant plusieurs heures : on le distille ensuite à une très-douce chaleur jusqu'à la diminution d'environ moitié, ou jusqu'à ce que la totalité de la liqueur spiritueuse soit passée ; on trouve dans le récipient une liqueur très-aromatique, très-suave, mais fort chargée d'acide libre & surabondant, qu'il s'agit de détruire, & de saturer, en projetant une suffisante quantité d'alcali fixe, bien sec, sur la totalité de la liqueur distillée : après quoi on la redistille de nouveau, avec la même circonspection. On peut ainsi préparer en peu de tems, sans danger & à peu de frais, dix ou douze onces d'une liqueur anodine nitreuse, toujours constante & uniforme : & jamais exposée à varier, comme il arrive à celles qui d'ailleurs seroient préparées avec plus de peine & plus de soin, en opérant sur les différens résidus de l'éther nitreux.

20. Telle est, disent ces MM., notre liqueur

anodine nitreuse, dont nous faisons usage comme médicament. Ils ajoutent ensuite que M. Majault, savant médecin de la faculté de Paris, ayant fait dans sa pratique une attention plus particulière aux bons effets produits par une liqueur anodine nitreuse, préparée à sa manière, encore bien peu connue, est le premier qui l'ait annoncée comme très-efficace. L'usage fréquent que nous avons fait depuis plusieurs années de l'éther nitreux, & sur-tout de la *liqueur anodine nitreuse*, l'un & l'autre préparés par les méthodes que nous avons données dans ce mémoire, nous autorise à les regarder en général comme plus tempérans & plus sédatifs que l'éther vitriolique & que la *liqueur anodine minérale d'Hoffman* : celle-ci plus chargée d'huile essentielle du vin, improprement appelée *huile douce de vinol*, occasionne assez souvent par son acreté, aux personnes d'une constitution nerveuse & irritable, de la chaleur & de l'agitation, au lieu de tempérer. Plus d'une fois, nous l'avons vu suspendre les sécrétions, échauffer la gorge, causer de la toux, diminuer sensiblement le cours des urines, & porter une forte de trouble dans l'économie animale, tandis que la liqueur anodine nitreuse, moins chargée d'huile essentielle du vin, laquelle d'ailleurs paroît y être plus étroitement, plus intimement combinée, ne sauroit produire le même agacement. Aussi l'avons-nous presque toujours employée avec un succès plus marqué contre les affections vaporeuses, les vomissemens spasmodiques, la migraine, le hoquet, les palpitations de cœur, les pincemens douloureux de l'estomach, & contre certaines toux convulsives ; mais principalement dans le cas où le cours des urines est interrompu & même supprimé par l'effet du spasme. Nous avons remarqué que cette dernière propriété de notre liqueur est une des plus constantes.

Enfin ils concluent de leurs observations, « Que la *liqueur anodine nitreuse* (que nous nommons ici alcool éthéré nitrique) est certainement plus douce & moins échauffante que la *liqueur anodine vitriolique d'Hoffman*, & qu'elle doit être aussi plus tempérante & plus sédative : par les mêmes raisons, on peut l'administrer à plus forte dose ; car sur quatre onces d'un véhicule convenable, nous avons prescrit depuis un gros jusqu'à six gros de notre liqueur nitreuse, donnant par intervalles une cuillerée de la potion, & jamais ces divers essais n'ont eu d'inconvénients. En général, les proportions moyennes & ordinaires doivent être de deux gros de la liqueur anodine sur quatre onces de véhicule. »

On pourroit, de même que nous l'avons dit à l'article précédent, ajouter à cette première préparation, une certaine quantité d'huile éthérée, & on formeroit ainsi un alcool éthéré nitrique, huileux ou composé.

3°. Alcool éthéré muriatique.

Les détails, dans lesquels nous sommes entrés dans la section première, en traitant de l'alcool muriatique, nous exemptent de rappeler ici les différentes opinions que l'on a eues sur cette préparation, & sur les procédés pour l'obtenir; on a vu que plusieurs artistes avoient employé des distillations répétées, & qu'ainsi, au lieu de former seulement l'alcool acide muriatique, ils obtenoient un alcool éthéré muriatique. Nous nous bornerons donc ici à exposer la formule que l'on doit suivre dans la préparation de l'alcool éthéré muriatique.

Mettez dans une grande cornue de verre, deux onces d'alcool rectifié, versez dessus peu-à-peu, & à différentes fois, deux onces d'acide muriatique, & après avoir agité la liqueur, & laissé digérer quelques jours, distillez à un feu doux, de manière à obtenir environ les deux tiers du mélange, ou jusqu'à ce que la liqueur de la cornue ait pris une consistance huileuse épaisse. On doit par une seconde distillation conduite avec ménagement, rectifier le premier produit. Enfin les attentions doivent ici être à-peu-près les mêmes que pour la préparation des alcools éthers, que nous avons déjà décrits.

L'alcool éthéré muriatique est inscrit dans la classe des remèdes discutifs, apéritifs, antispasmodiques, anti-spasmodiques. On le regarde comme diurétique, & on l'emploie à la dose de 20 à 30 gouttes dans des potions appropriées: on le prescrit aussi mélangé avec du miel, pour toucher les ulcères de la bouche, de la gorge.

4°. Alcool tartareux.

C'est à M. Westrumb que nous devons le procédé, pour obtenir une combinaison intime de l'acide tartareux avec l'alcool, & comme cette préparation encore peu connue dans les pharmacies, nous paroit mériter quelque attention, nous rapporterons la formule de son procédé, tel qu'il l'a donné dans le journal de M. Crell.

Prenez acide tartareux, préparé à la manière de Reizius & oxide noir de manganèse, de chacun une once, mêlez-les exactement par la trituration dans un mortier de verre, mettez-les ensuite dans une petite retorte de verre, & ajoutez-y deux onces d'alcool rectifié.

Distillez à une chaleur douce, dans un appareil ordinaire, vous aurez dans le récipient une once d'alcool, qui exhale une odeur agretole, agréable.

Versez alors sur le résidu contenu dans la cornue une once d'eau distillée, & deux gros de l'alcool obtenu par la première distillation. Vous retirerez par la distillation six gros d'un fluide odorant, dont il ne se séparera ni éther, ni huile pesante.

Chimie. Tome II.

Remettez dans une nouvelle cornue le produit de ces deux premières distillations, placez la cornue au bain-marie, & on obtiendra ainsi un alcool tartareux, qui par son odeur, sa volatilité & le mode de sa préparation, se rapproche beaucoup des alcools éthers, que nous avons décrits précédemment.

Cet alcool tartareux n'est point encore employé en médecine: mais il pourroit l'être comme antiseptique & diaphorétique léger, à la dose de 30 à 40 gouttes, dans des potions appropriées.

Nota. En observant les attentions recommandées dans les articles précédents, on peur, avec différents autres acides, & sur-tout avec l'acide acétique, former des alcools éthers. Ces préparations sont non-seulement fort utiles en médecine comme remèdes, mais elles sont utiles en pharmacie, pour extraire les principes des différentes substances, & servir ainsi à former des alcools composés.

Tous ces alcools éthers doivent être conservés soigneusement à l'abri des rayons solaires, & il faut renouveler ces préparations, au moins tous les deux ans; car elles s'altèrent en vieillissant, elles perdent de leur odeur, & l'acide devient sensible; on retarde cette altération, en les conservant en liqueurs dans de petits flacons bien fermés & toujours exactement remplis; car le vuide, qui se trouve dans les flacons, & le contact de l'air, concourent à l'altération de ces liqueurs.

ALCOOLS ÉTHÉRÉS COMPOSÉS.

(A) Alcool éthéré d'ambre gris, & communément teinture ou essence liquide d'ambre.

Mettez dans une phiole de verre un scrupule d'ambre gris, que vous ferez liquéfier sur un feu très-doux: alors ajoutez-y deux onces d'alcool éthéré sulfurique, que l'on aura légèrement chauffé; agitez plusieurs fois la bouteille, & lorsque la dissolution est faite, on y ajoute quatre grains de musc, & on conserve cette liqueur dans un flacon bien bouché.

Cette préparation est recommandée comme roborant, éménagogue, aphrodisiaque, & on en a recommandé l'usage dans le vertige, la paralysie, l'apoplexie séreuse, les gonorrhées habituelles. La dose est de 15 à 20 gouttes.

(B) Alcool éthéré de gayac, ou teinture de gayac à la liqueur d'Huffman.

Mettez dans un matras deux onces de résine de gayac grossièrement pulvérisée. Versez dessus une livre d'alcool éthéré sulfurique, & laissez infuser quelques jours dans un endroit tempéré, ayant soin de remuer de temps-en-temps le ballon;

Q

lorsque la solution de la résine est faite, ce qui est plus ou moins long, suivant la température de l'atmosphère, on tire au clair, ou on filtre la liqueur, & on la conserve dans un flacon bien bouché.

On a recommandé ce remède contre les affections arthritiques. Quelques praticiens pensent qu'il est plus doux, moins échauffant, en employant l'alcool éthéré nitrique, pour faire la dissolution de la résine de gayac.

(C) *Alcool éthéré de succin, communément teinture de succin à la liqueur d'Hoffman.*

Prenez succin jaune en poudre deux onces, alcool éthéré sulfurique, une livre.

Faites digérer pendant trois jours au bain de sable, & sur un feu très-doux, filtrez ensuite.

Cette préparation, suivant Plenck, est très-efficace, pour arrêter les progrès de la carie, & en procurer la guérison.

Nota. On peut préparer de la même manière des dissolutions d'opium, de castoreum, de myrrhe, de toutes les résines, & charger ainsi les alcools éthérés des principes extraits & médicamenteux des plantes. Quelques-uns prescrivent de préparer ces dissolutions seulement avec de l'alcool acide sulfurique, & ils nomment ces préparations, *teintures faites avec l'eau de Rabel.*

§. III. ALCOIS ALCAINS.

Ce titre indique assez que nous comprenons dans cette section les combinaisons de l'alcool avec un alcali, & nous en distinguons trois espèces.

1°. *Alcool de potasse.*

Cette préparation, qui est décrite dans les pharmacopées, sous les titres de *teinture acide de tartre*, *lithium de Paracelse*, *teinture des métaux*, *teinture acide d'antimoine d'Hoffman*, & pour laquelle on a prescrit un grand nombre de procédés différents, n'est autre chose qu'une dissolution de potasse dans l'alcool; mais pour l'obtenir, il faut employer une potasse pure, ou, comme on s'exprimoit précédemment, un alcali caustique, qui ne soit point combiné avec l'acide carbonique; & c'est-là le but auquel tendent tous les procédés différents, qui ont été recommandés pour la composition de cet alcool.

Nous ne nous arrêterons pas à décrire la formule de cet alcool, les attentions nécessaires dans sa préparation & ses propriétés médicinales, ces différents objets ont été traités avec soin, dans l'article *Alcool chimie*, & nous y renvoyons le lecteur. Nous nous bornerons à remarquer que cet alcool se décompose en par-

tie avec le tems, sur-tout quand on le conserve dans de grands flacons, à moitié pleins; qu'on ne doit jamais l'employer à l'intérieur seul & pur, parce qu'il agiroit comme caustique, mais qu'il doit toujours être étendu dans quelques liqueurs appropriées; enfin nous remarquerons que quelques médecins conseillent d'ajouter à l'alcool que l'on fait digérer sur la potasse, une certaine quantité d'huile volatile d'anis: ils pensent que cette addition rend la préparation plus carminative & plus convenable aux personnes, dont l'estomac est très-irritable.

2°. *Alcool de soude*

La soude, lorsqu'elle est pure, de même que la potasse, se dissout dans l'alcool, & auroit vraisemblablement les mêmes propriétés médicinales: mais cette préparation n'est point faite en pharmacie.

3°. *Alcool ammoniacal ou d'ammoniaque*, & communément *esprit de sel ammoniac*, *esprit de sel volatil*, *vinaix*, *spiriteux ou ailepsis*.

Cette préparation est une combinaison de l'ammoniaque avec l'alcool, & on peut l'obtenir de différentes manières. La pharmacopée d'Edimbourg prescrit uniquement de mêler quatre onces d'ammoniaque-fluor, ou alcali-volatil caustique avec huit onces d'alcool rectifié. Cette préparation si simple peut aisément suffire pour l'usage médical, mais c'est plutôt une mixture qu'une combinaison intime; aussi le plus grand nombre des dispensaires prescrit de faire cette préparation par la distillation; les formules diffèrent beaucoup pour la proportion des substances à employer, nous rapporterons celle qui est prescrite dans la dernière pharmacopée du collège des médecins de Londres.

Prenez muriate d'ammoniaque... quatre onces. potasse ou cendres gravellées..... six onces.

Reduisez en poudre séparément chacune de ces substances, mêlez ensuite dans une corne, & versez-y trois livres d'alcool foible; ajoutez le bec de la corne dans un grand recipient, & après avoir bien lutté les jointures, distillez à un feu doux une livre & demie de liqueur, qu'il faut conserver dans un flacon bien bouché.

Les phénomènes que présente cette opération, les attentions qu'elle exige, seront exposées plus particulièrement au mot *AMMONIAQUE*; nous nous bornerons simplement à dire ici que cet alcool ammoniacal est un stimulant, un tonique, un résolusif très-actif; il excite particulièrement les sueurs, sur-tout quand on fait usage en même tems d'infusions aqueuses chargées d'un principe aromatique & muqueux. Il ne peut être employé dans l'état inflammatoire, & tou-

jours il doit être donné dans quelque boisson appropriée à la dose de 12 à 30 gouttes. On l'emploie aussi quelquefois à l'extérieur, comme excitant, dans les cas d'atonie, de paralysie; on l'applique comme résolutif sur des tumeurs enflées, scrophuleuses, des engorgements compacts dans le tissu cellulaire; enfin, en pharmacie, on l'emploie pour différentes préparations.

ALCOOLS ALCALINS COMPOSÉS.

(A) Alcool de potasse anisé.

Cette préparation, qui est ordinairement nommée, *teinture d'antimoine anisé*, a été indiquée dans cette section, à l'article, ALCOOL DE POTASSE.

(B) Alcool ammoniacal, aromatique, & communément, esprit volatil, aromatique, huileux.

On trouve dans les dispensaires plusieurs formules très-différentes pour la préparation de cet alcool. La pharmacopée de Londres, (édition de 1788) prescrit uniquement de prendre deux livres d'alcool ammoniacal, & d'y mêler huile volatile de limons & de muscade de chacun deux gros.

Cette préparation très-simple & très-facile, peut se faire dans l'instant même où on en a besoin, & le médecin peut, suivant les indications que présente la maladie, substituer aux huiles volatiles prescrites l'huile de succin, de castoreum, ou toute autre convenable aux circonstances.

D'autres artistes emploient un procédé plus compliqué, & qui paroit produire une combinaison plus intime. Ainsi Malouin conseille de prendre de la pellicule jaune de citrons & d'orange amères fraîches, du maïs & de la cannelle, de chacun quatre gros, muriate d'ammoniaque quatre onces; concassez le tout ensemble, & mêlez-le dans un matras; ajoutez-y quatre onces d'alcool ordinaire, & quatre onces d'eau de fleurs d'orange très-odorante, bouchéz bien le matras, & laissez en digestion pendant huit ou dix jours dans un lieu chaud sans feu, & remuez quelquefois.

Ensuite mettez le tout dans une cucurbitre, & ajoutez-y quatre onces de potasse (ou alcali fixe du tartre) couvrez promptement la cucurbitre avec un chapiteau; & ajustez un récipient au bec du chapiteau; luttez bien les jointures & laissez encore deux ou trois jours en digestion, enfin faites-en la distillation au bain-marie jusqu'à ce qu'il ne distille plus rien, & que ce qui reste dans la cucurbitre soit à sec. Si on faisoit cette distillation au bain de sable au lieu de la faire au bain-marie, il faudroit ménager le feu bien doucement.

Ces combinaisons d'huiles aromatiques, avec l'alcool ammoniacal, ajoutent à son action stimu-

lante, & en rendent généralement l'effet plus durable. La dose en doit être la même que celle de l'alcool ammoniacal simple, & toujours dans des potions ou autres véhicules appropriés.

(C) Alcool ammoniacal, avec l'assa-fœtida, *Spiritus ammonia fastidus* de la pharmacopée de Londres.

Prenez alcool foible..... six livres.
muriate d'ammoniaque... une livre.
potasse..... une livre.
assa-fœtida..... quatre onces.

Il faut, pour cette préparation, observer les règles qui ont été recommandées dans la formule précédente: on dissout l'assa-fœtida dans l'alcool; on pile séparément le muriate d'ammoniaque & la potasse concrète, puis on mêle le tout dans une grande cucurbitre de verre, on la recouvre de son chapiteau, & après avoir lutté les jointures, & adapté un récipient, on distille à un feu très-doux, & on retire cinq livres de liqueur.

On prépare, de la même manière, un alcool ammoniacal anisé, & on peut faire plusieurs autres préparations analogues.

(D) Alcool ammoniacal de valériane, & communément teinture de valériane volatile, de la pharmacopée de Londres, édition de 1788.

Prenez racines de valériane sauvage, quatre onces.
alcool ammoniacal aromatique..... deux livres.

Faites digérer pendant huit jours dans un matras bien bouché, & filtrez.

(E) Alcool ammoniacal de gayac; & communément teinture, ou essence de gayac volatile, & quelquefois élixir ou baume de gayac volatil.

Nous trouvons dans les dispensaires différentes formules plus ou moins compliquées pour cette préparation, nous préférons la suivante qui est plus simple, elle est tirée de la pharmacopée de Londres, édition de 1788.

Prenez résine de gayac..... quatre onces.
alcool ammoniacal aromatique..... une livre & demie.

Faites digérer pendant trois jours, & filtrez.

(F) Alcool ammoniacal avec l'opium, ou liqueur anodine volatile de Flingsten.

Prenez alcool ammoniacal..... deux onces.
opium..... deux scrupules.
camphre..... un scrupule.

Mêlez & faites digérer à froid pendant trois jours en remuant souvent le ballon, filtrez ensuite & réservez pour l'usage.

On peut d'après ces diverses formules, faire

différentes préparations d'alcools ammoniacaux composés.

§. IV. ALCOOLS SALINS SECONDAIRES.

Nous comprenons sous ce titre les combinaisons de l'alcool avec un sel neutre ou secondaire; plusieurs de ces sels sont solubles dans l'alcool, ou peuvent le devenir par différens procédés; mais toutes ces solutions ne sont pas également utiles & importantes, ainsi nous bornerons à en indiquer quelques espèces qui sont ou peuvent être employées en médecine, & qui serviront d'exemples pour d'autres que l'on voudroit essayer.

1°. Alcool de muriate de fer; autrefois teinture de mars dans l'esprit de sel.

Cette préparation est décrite dans la pharmacopée de Londres, édition de 1788, sous le titre de *teintura ferri muriati*; elle se fait de la manière suivante :

Prenez carbonate de fer (rouille de fer)..... demi-livre.
acide muriatique..... trois livres.
alcool rectifié..... trois livres.

Mettez le carbonate de fer dans un matras de verre, versez dessus l'acide muriatique, laissez digérer pendant trois jours en l'agitant de temps en temps; décantez ensuite la liqueur que vous faites évaporer sur un feu doux jusqu'à la réduction à une livre; & lorsqu'elle sera refroidie ajoutez-y l'alcool, & conservez dans un vase bien bouché.

2°. Alcool de muriate mercuriel.

La solution du muriate mercuriel corrosif qui a été connue sous le nom de *liqueur siphilitique* de Turner, *mixture minérale anti-vénérienne* des Suédois, *Remède de Vanswieten*, se prépare de la manière suivante.

Prenez muriate mercuriel corrosif... six grains.
alcool foible..... douze onces.

On pile le sel mercuriel dans un mortier de verre (& non pas de marbre & encore moins de métal, car il y auroit décomposition du sel) on y verse d'abord quelques gouttes d'alcool, & en continuant de piler on ajoute peu-à-peu le restant; on verse ensuite cette dissolution dans une bouteille, & on la laisse dans un lieu chaud jusqu'à la solution complète.

Cette préparation dont on a tant usé & abusé dans le traitement des maladies vénériennes, se donne à la dose d'une demi-cuillerée ou d'une cuillerée matin & soir, dans un véhicule approprié.

Quelques-uns aiment mieux dissoudre douze grains de sel mercuriel dans deux onces d'al-

cool, & ils le donnent par gouttes dont ils augmentent peu-à-peu le nombre suivant les circonstances. Dans les premiers temps où l'on fit un grand usage de ce remède, plusieurs préféroient pour la solution du sel un alcool retiré du froment; mais aujourd'hui on fait peu usage de la solution de muriate mercuriel dans l'alcool, on préfère la dissolution de ce sel dans l'eau distillée.

3°. Alcool de muriate calcaire.

C'est à M. Fourcroy que nous devons la connoissance des propriétés médicinales du muriate calcaire; l'expérience lui a fait reconnoître que ce sel pris à la dose de quelques grains & dissous dans l'eau, étoit un fondant incifif, efficace dans les obstructions des glandes, méfentériques, & généralement dans tous les cas de relâchement de solides, accompagnés d'engorgemens muqueux & lymphatiques. Le muriate calcaire se dissout aussi très-bien dans l'alcool, & cette dissolution peut fournir un remède très-utile dans plusieurs affections locales; elle doit se préparer de la manière suivante :

Prenez muriate calcaire..... deux onces.
alcool foible..... une livre.

Faites digérer pendant deux ou trois jours jusqu'à la solution complète du sel, & conservez pour l'usage.

Cet alcool est un résolutif fortifiant; nous l'avons employé avec succès à l'extérieur sur des humeurs indolentes & des engorgemens muqueux des articulations, produits par un vice scrophuleux.

4°. Alcool de sulfure alcalin antimoine.

Cette préparation généralement peu connue, a été décrite par quelques auteurs sous le nom de *teinture d'antimoine*. Rotrou lui donnoit le nom d'*elixir aurifique*. Nous rapporterons la formule que Malouin donne pour cette préparation dans le tom. 2°. de sa chimie médicinale.

Prenez une partie de sulfure d'antimoine, (antimoine crud) & deux parties de poudre concrète (alcali du tartre) le tout en poudre & mêlez. On mettra dans un creuset qu'on placera dans un fourneau, au milieu des charbons ardens, & on le couvrira, on laissera pendant une heure le tout en fonte; il faut conduire le feu doucement, d'abord parce qu'il est à craindre que le mélange des matières qui se fondent ne bouillonne trop; la matière étant fondue, on la versera dans une poêle, ou dans un chaudron de fer chauffé, & dès que la matière commence à refroidir il faudra la casser en petits morceaux plats, qu'on mettra dans un matras, & on versera de l'alcool dessus, la hauteur d'environ deux doigts, on ajustera un matras ou autre vaisseau

de rencontre, & on laissera en digestion jusqu'à ce que l'alcool soit bien coloré, ce qui se fait ordinairement en vingt-quatre heures.

Après avoir versé par inclination cette première dissolution, on peut verser de nouvel alcool sur ce qui reste dans le matras, & on le decanterà lorsqu'il sera bien coloré.

On s'assure que cette préparation tient véritablement du sulfure d'antimoine en y laissant tomber quelques gouttes d'acide acétique; car, dit Malouin, il s'en élèvera une mauvaise odeur & il s'en précipitera un oxide d'antimoine.

Cet alcool n'ayant pas une odeur agréable comme l'alcool de potasse, on peut l'aromatiser en joignant à l'alcool qu'on emploie une huile volatile, comme celle d'orange, de citron; ou de romarin : on peut lui donner un goût amer par le moyen de l'huile volatile d'absynthe.

Cette préparation vantée par Rotrou dans le traitement des maladies scrophuleuses & des tumeurs indolentes, est singulièrement utile dans les cas de langueur, pour le scorbut & la suite des maladies vénériennes; elle est bonne, ajoute Malouin, pour résoudre les obstructions du méfentère, sur-tout aux enfants, & M. Homberg dit que cette préparation lui avoit très-bien réussi dans les dysenteries.

On donne ce remède par gouttes, dans quelques cuillerées de thé, de bouillon, ou d'autres véhicules, & la dose est depuis trois gouttes jusqu'à douze, qu'on peut réitérer plusieurs fois dans le même jour.

5°. *Alcool de sulfate de fer, & communément teinture de mars de Ludovic.*

On fait bouillir ensemble, dans une ou deux livres d'eau de rivière, du sulfate de fer calciné en blancheur, & du tartrate acide de potasse, (crème de tartre) de chacun quatre onces; on fait évaporer toute l'humidité jusqu'à ce qu'il reste une masse sèche & pulvérulente, ayant soin de remuer la matière avec une spatule de fer, & qu'elle ne brûle point au fond du vaisseau, alors on met cette poudre bien sèche dans un matras : on verse par-dessus de l'alcool ordinaire, jusqu'à ce que la matière en soit surnagée d'environ quatre doigts. On place le matras sur un bain de sable, & on fait digérer ce mélange pendant cinq ou six jours, ou jusqu'à ce que l'alcool ait acquis une couleur jaune; ensuite on decante la liqueur, on la filtre, on dessèche de nouveau le marc, on verse de nouveau l'alcool, on fait digérer comme dessus, & on mêle à la première, cette seconde dissolution que l'on conserve dans une bouteille qu'on bouche bien.

Cet alcool est tonique, fortifiant; il excite l'appétit, convient à la suite des maladies d'obstructions, mais pris à petites doses & long-temps continué. La dose ordinaire est depuis cinquante gouttes jusqu'à quatrevingt.

M. Baumé, de qui nous empruntons cette formule & ces détails, remarque qu'on peut sans inconvénient prendre deux parties de sulfate de fer non calciné, & le traiter avec le tartrate acide de potasse comme on l'a dit précédemment. Cet alcool est d'autant plus coloré, qu'on a moins desséché la matière & qu'on emploie un alcool plus foible. Si l'on veut donner une couleur rouge à cette dissolution, on peut la faire digérer sur des fleurs de coquelicot, comme le conseille Ludovic.

6°. *Alcool de sulfate de cuivre, communément teinture de vitriol verte d'Helvetius.*

Prenez sulfate de cuivre (vitriol bleu) deux onces, muriate d'ammoniaque une once & demie, réduisez-les séparément en poudre avant que de les mêler. Mettez ce mélange dans une petite casserole de terre neuve vernissée sur un feu de charbon & faites-le fondre en consistance de sirop épais; vous observerez de le remuer avec une spatule de bois jusqu'à ce qu'il prenne une couleur verdâtre tirant sur le noir; augmentez ensuite le feu pendant quelques minutes, & la matière achevant de se fondre deviendra aussi fluide que de l'eau.

Retirez alors la casserole du feu, & continuez de remuer jusqu'à ce que le mélange soit presque refroidi & durci; détachez cette masse saline & réduisez-la sur le champ en poudre très-subtile dans un mortier de fonte bien échauffé.

Mettez cette poudre dans un matras, & versez par-dessus de l'alcool redistillé deux livres, de sorte que le fluide surnage la masse saline de trois ou quatre doigts; il faut avoir soin de remuer fortement & souvent le matras, pour empêcher que dans les premiers temps la matière saline ne se dépose au fond & ne forme une masse dure.

On bouche ensuite le matras avec une vessie mouillée, on en fait la digestion au bain-marie pendant deux ou trois jours, on decante ensuite la liqueur qui est d'un beau verd d'émeraude, on la filtre & on la conserve dans une bouteille bien bouchée.

Helvetius qui donne la formule de cette préparation, en recommande l'usage à la dose de quelques gouttes, comme le remède le plus propre à combattre la charنة & le rachitis des enfans; il ajoute qu'on rend cette composition plus active, plus incisive, en y ajoutant lorsqu'elle est filtrée une cinquième ou sixième partie d'ammoniaque fluor (esprit volatil de sel ammoniac fait avec h. chaux). Nous n'avons jamais fait cette préparation, mais la formule nous paroît chargée de plusieurs procédés inutiles & embarrassans. Nous indiquerons à l'article CUIVRE une

méthode plus simple & plus assurée pour remplir le même objet.

II^e GENRE DES ALCOOLS OFFICINAUX.

Alcools non salins ou oléagineux.

Les préparations que nous rapportons sous cette seconde division, diffèrent essentiellement de celles que nous avons exposées précédemment par la nature des substances qui sont combinées avec l'alcool; nous avons établi comme premier genre la combinaison de l'alcool avec les substances salines; & les substances qui peuvent être considérées comme simples, ou du moins comme peu composées, appartenant essentiellement au règne inorganique; maintenant nous considérons comme second genre la combinaison de l'alcool, avec des substances que la nature nous présente dans un ordre de composition moins simple; toutes ces substances sont le produit de la vie, appartiennent au règne organique; plusieurs, il est vrai, contiennent des sels, mais ils y sont cachés, enveloppés, peu sensibles, ou ne sont qu'une petite partie de la masse: enfin dans toutes on reconnoît un principe huileux, inflammable, libre, abondant dans quelques-uns, masqué dans d'autres; mais à l'aide de la distillation, ou de différentes opérations, on peut extraire de toutes une huile plus ou moins abondante, & ces considérations nous ont engagés à désigner ce second genre sous le titre d'alcools non salins ou oléagineux. Nous en distinguerons quatre espèces principales, dont nous traiterons dans autant de sections particulières.

5. I. ALCOOLS BALSAMIQUES.

Les baumes se dissolvent facilement & entièrement dans l'alcool; ces dissolutions plus ou moins colorées sont généralement connues dans les pharmacies, sous le nom de *teintures balsamiques*, ou *baumes spiritueux*. Leur préparation doit toujours se faire par digestion; beaucoup de pharmacopées prescrivent uniquement de prendre telle quantité que l'on voudra de la substance balsamique, de la mettre dans un matras, de verser par-dessus de l'alcool de la hauteur de quatre doigts, & après avoir bouché le matras, de faire digérer pendant quelques jours, au bain de sable, en remuant de temps en temps, enfin de décantier la liqueur lorsque la solution est faite; mais ces proportions arbitraires ne conviennent jamais dans la préparation des remèdes, & elles peuvent avoir des inconvénients dans leur usage. M. Baumé observe très-judicieusement que les alcools balsamiques lorsqu'on vient à les mêler dans des potions aqueuses forment des pellicules à leur surface, les troublent lorsqu'on les agite & qu'une partie de la substance s'attache aux parois de la fiole, tandis

que l'autre partie reste en grumeaux disposés dans la liqueur; ainsi ceux qui sont usage de ces potions, prennent inégalement les particules balsamiques qui y sont contenues, & jamais en totalité; le moyen de remédier à cet inconvénient, du moins en grande partie, est de triturer la dose prescrite de ces alcools dans un mortier avec les poudres qu'on fait entrer dans les potions, ou avec un peu de sucre, ou avec le sirop qui est prescrit; mais il est un moyen plus sûr alors pour l'usage intérieur de ces alcools; c'est de les faire prendre avec un peu de jaune d'œuf, ou de mêler chaque dose de l'alcool balsamique dans une cuillerée à café de sirop que l'on fait prendre sur le champ au malade, & que l'on reitère suivant le besoin.

1^o. *Alcool de baume du Pérou, ordinairement teinture ou essence de baume du Pérou simple.*

Prenez baume du Pérou..... quatre onces.
alcool rectifié..... une livre.

Faites digérer avec les précautions nécessaires jusqu'à parfaite solution du baume, & décantez.

On prépare de même les alcools
de baume de tolu.
du baume de copahu.
du storax.
du benjoin, &c. &c.

Ces différentes préparations sont employées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, comme stimulants, vulnéraires détersifs; toutes rougissent plus ou moins sensiblement les papiers colorés en bleu par les pétales des plantes, parce qu'elles contiennent un acide qui fait partie de la substance balsamique; cet acide est sur-tout très-sensible dans le benjoin, on l'en retire par différents procédés & sur-tout par la sublimation. Cet acide huileux que l'on connoît ordinairement dans nos pharmacies sous le nom de *fleurs de benjoin* , est soluble dans l'alcool, & cette dissolution acide, d'une odeur agréable, peut être employée pour l'usage intérieur, comme bécique & incisif, avec plus d'efficacité que la solution du benjoin dans l'alcool.

Alcools balsamiques composés.

(A) *Alcool de benjoin avec l'opium, ordinairement élixir pargorique ou asthmique de Londres.*

Prenez acide benzoïque sublimé (fleurs de benjoin).
extrait d'opium.... de chacun un gros.
camphre..... deux scrupules.
huile volatile douce. demi-gros.
alcool rectifié..... vingt-quatre onces.

Faites digérer à un feu doux, & filtrez.
Cette préparation a été recommandée comme

béchuque, incisive, dans la toux, l'asthme, les affections catharrales chroniques, de la poitrine; la dose est de huit à dix gouttes dans un véhicule approprié.

On trouve dans la pharmacopée d'Edimbourg, & pour remplir les mêmes vues, une autre préparation, qui diffère de la précédente, en ce que pour faire la dissolution de l'acide benzoïque, de l'opium, & des autres substances indiquées, on prescrit six onces d'alcool ammoniacal.

(B) *Alcool de benjoin aloësi*, ordinairement *baume éraumatique ou teinture de benjoin composée*, de la pharmacopée de Londres, édition de 1788.

Prenez benjoin.....trois onces.
styrax coulé.....deux onces.
baume de tolu.....une once.
aloësi focorin.....demi-once.
alcool rectifié.....deux livres.

Faites digérer à une douce chaleur, & filtrez.

(C) *Alcool balsamique de gayac*, & communément *élixir ou baume gayacien*, de la pharmacopée d'Edimbourg.

Prenez résine de gayac.....doute onces.
baume du Pérou.....trois gros.
alcool rectifié.....vingt-quatre onces & demie.

Faites digérer pendant dix jours, & décantez.

Cette dissolution très-chargée est employée par gouttes, depuis dix jusqu'à vingt, deux fois par jour, dans les affections arthritiques & rhumatismales.

(D) *Alcool balsamique composé*, ou *élixir balsamique pectoral* d'Edimbourg.

Prenez baume de tolu }
styrax }
benjoin } .. de chacun trois gros.
mirthe }
safran } .. deux gros.
alcool rectifié.....vingt onces.

Faites digérer & filtrez. On emploie cette préparation par gouttes depuis trente jusqu'à quarante, comme pectorale, fortifiante; on s'en sert aussi à l'extérieur pour le pansement des blessures récentes, &c.

(E) *Alcool balsamique de muriate mercuriel*, ordinairement *teinture anti-vénérienne de fatch*, *teinture ou essence de baume du Canada monaissant*.

Prenez muriate mercuriel
corrosif.....vingt-quatre grains.
alcool rectifié.....quatre onces.

Faites d'abord dissoudre le sel mercuriel dans

l'alcool, ainsi que nous l'avons indiqué précédemment.

D'autre part, prenez ré- }
fine de gayac..... } de chacune une once.
baume du Canada vrai. }
alcool rectifié.....quatre onces.

Faites digérer jusqu'à la solution parfaite de la résine & du baume, alors décantez en versant par inclination, mêlez ensemble les deux dissolutions, enfin ajoutez-y huile volatile de sassafras deux gros.

Cette préparation est fort vantée par quelques auteurs comme un remède énergique contre les maladies vénériennes invétérées, accompagnées de pustules, d'affections cutanées qui ont résisté aux moyens ordinaires.

La dose en est de dix à vingt gouttes deux fois par jour, dans un véhicule approprié.

§. II. ALCOOLS RÉSINEUX.

Nous comprenons dans cette section les combinaisons de l'alcool avec les résines, les gommes résines & même le succin, quoique cette dernière substance soit généralement classée parmi les bitumes; plusieurs dissolutions des gommes résines auroient pu être placées dans la section des alcools extractifs, parce que la substance extractive forme la plus grande partie de leur masse, tandis que d'autres auroient dû être inscrites au nombre des alcools résineux, parce que la résine en est la partie la plus abondante. Comme dans l'étude on a coutume de considérer ensemble toutes les espèces de gommes résines, comme leurs dissolutions dans l'alcool se rapprochent par quelques propriétés, comme elles s'opèrent principalement par la partie résineuse; nous les réunissons toutes ici sous le même titre, cette réunion rapproche trop sans doute des substances essentiellement distinctes par leurs principes constitutifs; c'est un défaut qu'on n'auroit pu éviter qu'en multipliant les divisions, & ce défaut est commun à toutes nos méthodes, à tous nos systèmes de classification; ils n'expriment jamais complètement le plan de la nature, & ils ne doivent être considérés que comme des divisions artificielles générales, imaginées pour soulager la mémoire & faciliter l'étude.

Quoi qu'il en soit, tous les alcools compris dans cette section se préparent seulement par digestion; mais la qualité de l'alcool que l'on emploie doit varier suivant la nature de la substance à dissoudre; les résines pures se dissolvent en entier dans l'alcool, mais pour obtenir cette dissolution il faut employer un alcool rectifié; les gommes résines ne se dissolvent qu'incomplètement dans l'alcool; au contraire la partie résineuse se dissout presque seule dans un alcool

rectifié ; & si l'on veut obtenir une solution plus complète, il faut employer un alcool faible & en aider l'action par la chaleur, citations essentielles à observer pour ces préparations médicamenteuses, où l'on a besoin de conserver dans un état d'union la plus grande partie des principes qui constituent une gomme résine ; tandis que si l'on avoit seulement à séparer ou extraire la partie résineuse, il faudroit employer un alcool très-rectifié ; cette affinité de l'alcool, plus grande pour la résine que pour la partie extractive, fournit un moyen d'analyse simple, facile, & très-utile en pharmacie, pour extraire la portion résineuse qui est disséminée dans le tissu d'une plante ; il ne s'agit pour cela que de faire digérer dans un alcool rectifié le bois, l'écorce, l'excrécence de la plante, & lorsque l'alcool est chargé de la substance résineuse, ce que l'on reconnoît par la faveur, la couleur, la pesanteur spécifique, on filtre, on sépare l'alcool par l'évaporation, la distillation, & on recueille la résine de la plante ; la partie qui n'a pas été dissoute par l'alcool est soumise à l'action de divers dissolvans & on obtient ainsi séparément la partie extractive ; mais ces détails appartiennent essentiellement à l'ANALYSE, Voyez ce mot. Nous aurons aussi occasion d'y revenir à l'article RESINE. Nous nous bornerons à ajouter que nous avons traité ainsi plusieurs substances, & ce moyen nous a fourni quelques observations qui intéressent la pharmacie ; ainsi nous avons extrait de l'agaric blanc une résine très-acre ; nous avons encore trouvé que cette excrécence contenoit une grande quantité de fécale ou amidon.

Les combinaisons de l'alcool avec les résines & les gommés résines sont généralement connues dans les pharmacies sous les noms de *reineures*, *essences*, *elixirs*, quelquefois sous celui de *potions*, ou d'autres dénominations métaphoriques & mystérieuses. Toutes se décomposent par l'addition d'une certaine quantité d'eau ; ainsi lorsqu'on les mêle dans des potions aqueuses, elles les rendent plus ou moins troubles & opaques ; quelquefois la résine se précipite promptement en petits grumeaux, ou s'attache aux parois du vase ; d'autres fois elle reste suspendue en molécules très-fines disséminées dans la liqueur, & lui donne une apparence laiteuse ; la portion extractive reste seule parfaitement unie à l'eau des potions, circonstance que nous faisons remarquer, parce qu'elle présente un moyen d'obtenir d'une manière plus sûre la séparation des résines & de la substance extractive. En traitant dans la section précédente des alcools balsamiques, nous avons déjà indiqué les attentions qu'il falloit apporter dans la préparation des potions où l'on fait entrer ces alcools ; elles sont également nécessaires ici, & M. Baume ajoute que ces potions doivent être données froides,

parce que si on les faisoit chauffer, la résine se grumelerait.

Beaucoup de dispensaires ne prescrivent pour la préparation de la plupart des alcools résineux, ni les doses des substances résineuses, ni la qualité d'alcool qu'il faut employer ; & ils se bornent à dire qu'on versera sur la substance de l'alcool à la hauteur de trois ou quatre doigts ; cette désignation, peut suffire pour un objet d'analyse ; mais lorsqu'il s'agit d'une préparation médicamenteuse, il faut être attentif sur-tout au choix de l'alcool. Nous présenterons quelques formules des alcools résineux, ordinairement employés, extraites des pharmacographes les plus célèbres, & nous suivrons dans cette exposition l'ordre alphabétique, réunissant dans le même article les alcools simples & les alcools composés.

1°. *Alcool d'aloës*, & ordinairement teinture d'aloës.

Comme cette préparation est très-importante, & peut être également employée à l'intérieur & à l'extérieur, nous devons en distinguer deux espèces ; l'une que nous nommons *alcool résineux d'aloës*, se prépare avec

aloës socotrin..... deux onces.
alcool rectifié..... dix onces.

Faites digérer pendant quelques jours, & filtrez : cette préparation qui est une dissolution de la partie résineuse de l'aloës, est principalement destinée pour l'usage extérieur ; on la recommande dans le traitement de la carie, pour le pansement des ulcères putrides, vermineux ; mais le praticien doit être averti que l'usage extérieur de cette préparation sur des ulcères un peu étendus, ou continué quelque temps, détermine souvent la diarrhée. Monro en avoit déjà fait la remarque, & nous avons souvent eu occasion de le vérifier ; nous avons vu des diarrhées opiniâtres, causées exactement par des pansements, cesser promptement, en supprimant l'aloës ou d'autres substances de semblable nature, employées dans les pansements.

La seconde préparation que nous nommons *alcool extracto résineux d'aloës*, se prépare de la même manière, mais en substituant à l'alcool rectifié, un alcool très-foible.

La pharmacopée de Londres, édition de 1788, prescrit, sous le titre de *teinture d'aloës*, la préparation suivante.

Prenez aloës socotrin réduit en
poudre..... demi-once,
extrait de réglisse.... une once & demie,
eau distillée.....
alcool foible..... de chacun huit onces.

Faites digérer au bain de sable en remuant de temps en temps jusqu'à parfaite solution, & filtrez.

Alcool

Alcool d'aloës, avec mirrhe & ordinairement, Elixir de propriété de Paracelse; Elixir aloëtique; teinture d'aloës composée, de la Pharmacopée de Londres, édition de 1788.

Prenez aloës focotrin. } de chacun trois onces.
safran. }
alcool de mirrhe. deux livres.

Faites digérer pendant huit jours, & filtrez.

Plusieurs pharmaciens forment sur le champ cette composition, en mêlant ensemble quatre onces d'alcool de mirrhe avec trois onces d'alcool d'aloës, & autant d'alcool de safran.

Quelquefois on ajoute à la totalité de ce mélange deux gouttes d'acide sulfurique soible; & on le désigne ordinairement sous le nom d'*élixir de propriété acide*.

Cet alcool est un tonique stimulant, convenable principalement dans les affections de l'estomac qui dépendent de foiblesse; il est aussi emménagogue, & la dose est depuis six gouttes jusqu'à un demi-gros.

La pharmacopée Suédoise donne sous le titre d'*élixir d'aloës savonneux*, la formule suivante.

Prenez aloës focotrin. }
acétite de potasse. } de chacun une once.
bile de bœuf épaisse. }
mirrhe. }

Pilez dans un mortier de verre, ensuite ajoutez-y
safran. demi-once;
alcool rectifié. une livre.

Faites digérer pendant trois jours en agitant de temps en temps, & filtrez.

C'est à cet article des alcools d'aloës composés que l'on doit rapporter toute ces préparations fameuses que la cupidité fait débiter dans le public sous les noms pompeux de *Baume de vie, Baume de longue vie, Elixir sacré stomachique, Teinture amère*; nous rapporterons la formule d'une de ces compositions que nous nommerons *Alcool d'aloës avec rhubarbe*.

Prenez aloës focotrin. une once & un gros.
rhubarbe. quatre gros.
agaric }
safran } de chacun un gros.
zedoaire }
gentiane }
thériaque }
alcool foible. deux livres.

Réduisez en poudre grossière les substances sèches, & faites infuser au bain de sable à une douce chaleur pendant plusieurs jours, ayant soin d'agiter le vaisseau de temps en temps, ensuite décantez & filtrez; quelques-uns ajoutent à cette composition du soufre; & pour corriger l'amertume de la préparation, ils y font dissoudre

Chimie, Tome II.

quatre onces de sucre. D'autres varient les doses, mais toutes ces préparations sont essentiellement les mêmes, c'est l'aloës qui en fait la partie principale & à laquelle on ajoute différentes substances purgatives, amères & aromatiques. Les charlatans qui débiterent ces alcools d'aloës composés, les vantent indistinctement contre toutes les maladies tant internes qu'externes; il faut les considérer seulement comme des stomachiques amers légèrement purgatifs, dont on doit user avec modération, qui ne conviennent que dans des cas de relâchement; la dose est depuis un gros jusqu'à quatre.

2°. *Alcool d'ammonium*, ordinairement teinture, ou essence de gomme ammoniacque. Nous avons cru devoir donner le nom d'*ammonium* à l'espèce de gomme résine que l'on appelle ordinairement gomme ammoniacque, pour distinguer cette substance de l'alcali volatil, que les chimistes modernes nomment *ammoniaque*. Ce changement de dénomination nous a paru d'autant plus convenable, que beaucoup d'autres espèces de gommes résines ont leurs terminaisons en *um*, tels sont le *Galbanum*, le *Sagapenum*, le *Baelium*.

Prenez ammonium (gomme ammoniacque) deux onces.
alcool foible. deux livres.

Faites digérer à une douce chaleur, & filtrez.
On prépare de même l'alcool de galbanum, de mastic, d'euphorbe.

3°. *Alcool d'assa-fœtida*, ou teinture d'*assa-fœtida*, de la pharmacopée de Londres.

Prenez assa-fœtida. quatre onces,
alcool ordinaire. deux livres.
Faites digérer à un feu doux pendant six jours, & filtrez.

4°. *Alcool de castoreum*, ou teinture de castoreum, de la pharmacopée de Londres.

Prenez castoreum de Russie en poudre. deux onces.
alcool foible. deux livres.
Faites digérer pendant huit jours, & filtrez.

On trouve dans les pharmacopées, sous le titre d'*élixir fœtide, élixir anti-hystérique ou astringent, essence de castoreum*, &c. la préparation suivante que nous nommons *alcool de castoreum composé*.

Prenez castoreum de Russie }
safran } de chacun quatre gros.
valériane sauvage }
menthe poivrée }
alcool rectifié, ... quinze onces.

Fiderit, qui rapporte cette formule, conseille de faire d'abord digérer le safran dans l'alcool, & après avoir retiré le safran, d'y faire digérer

le *collosum*, de décantier ensuite la liqueur & d'y faire digérer les plantes prescrites; enfin après quelques jours d'infusion, de filtrer & d'y ajouter un gros d'huile volatile de menthe poivrée.

Cette manière de procéder mérite d'être remarquée; en général on recommande pour la préparation des alcools composés, de partager en plusieurs portions la totalité de l'alcool, & d'y infuser séparément les différentes substances dont on doit extraire les principes médicamenteux; cette méthode est généralement recommandée comme nous l'avons rapporté; mais convient-elle dans tous les cas? L'alcool déjà chargé de quelques substances n'acquiert-il pas une énergie nouvelle, qui le rend propre à dissoudre des substances qu'il auroit faiblement attaquées s'il eût été pur? Ce sont des objets sur lesquels une suite d'expériences faites avec attention, & à l'aide de l'aréomètre, peut seule prononcer.

Quelques dispensaires au lieu d'alcool prescrivent d'employer l'alcool ammoniacal, d'autres ont recommandé l'alcool éthéré sulfurique; mais les propriétés de ces préparations dépendent essentiellement du *collosum*; on les emploie comme antiscorbutiques, antihistériques, dans des potions à la dose de 12 à 40 gouttes, & dans des électuaires à la dose d'un demi-gros ou d'un gros.

5°. *Alcool de gayac*, vulgairement, remède des Caraïbes contre la goutte, élixir anti-arthritique des Caraïbes.

Prenez résine de gayac. deux onces.
alcool ordinaire.. quatre-vingt seize onces.

Après avoir pilé grossièrement la résine, faites digérer pendant huit jours, & filtrez.

Lorsque ce remède, fort vanté d'abord pour guérir la goutte, ou au moins en éloigner les accès, commença à être connu, on exigeoit d'abord, pour faire la dissolution de la résine de gayac, l'alcool retiré du sucre, que l'on connoit ordinairement sous le nom d'eau-de-vie de sucre, ou *sassa*; mais l'alcool n'est ici que l'excipient du remède, & si l'on croyoit nécessaire à l'effet l'addition de quelques portions huileuses, on peut y ajouter une once de sucre ou deux onces de sirop simple ou de guimauve, ce qui rendroit le remède plus doux & plus agréable. La dose de ce remède étoit de deux petites cuillerées, que l'on prenoit le matin, buvant ensuite quelque infusion appropriée.

6°. *Alcool de jalap ou teinture de jalap*, de la pharmacopée de Londres.

Prenez jalap en poudre..... huit onces.
alcool faible..... deux livres.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant huit jours, & filtrez.

Alcool de jalap composé, & communément élixir de jalap composé, ou anthelminthique, ou *sassa*-de-vie allemande.

Prenez jalap..... huit onces.
 scammonée d'Alep..... deux onces.
 racines de turbit..... une once.
 alcool faible ou de première
 distillation..... trois livres.

Après avoir mis dans un matras les substances en poudre grossière, on verse dessus l'alcool, on laisse infuser à froid ou à une douce chaleur, pendant sept ou huit jours, on passe avec expression, & on filtre la liqueur, qui est employée comme purgatif actif, depuis quatre gros jusqu'à douze.

Quelques dispensaires ajoutent à cette formule deux gros de gommes gutte, & nous trouvons dans le dispensaire universel de Reuss, sous le titre très-impropre d'*élixir ac citron purgatif*, la formule suivante.

Prenez résine de jalap..... une once.
 écorces de citron récentes. trois gros.
 cannelle..... un gros.
 diagrède..... deux gros.
 semences d'anis..... demi-gros.
 alcool rectifié..... huit onces.

Faites infuser pendant quelques jours dans un lieu chaud, & filtrez. Cet alcool de jalap composé est principalement recommandé comme un purgatif facile pour les enfans; on le donne à la dose de 10 à 15 gouttes, pour un enfant d'un an, & on peut en imbibier aussi un morceau de sucre ou de quelque autre substance qui soit du goût de l'enfant. Il est inutile d'ajouter que tous ces purgatifs irritans ne conviennent pas dans tous les cas.

7°. *Alcool de mirrhe ou teinture de mirrhe*; de la pharmacopée de Londres.

Prenez mirrhe concassée. trois onces.
 alcool faible... une livre & demie.
 alcool ordinaire.. demi-livre.

Faites digérer pendant huit jours à une douce chaleur, & filtrez. Cet alcool est employé à l'intérieur comme stimulant, emménagogue, & à l'extérieur comme anti-septique, & propre à arrêter les progrès de la carie.

8°. *Alcool d'opium ou teinture d'opium*, de la pharmacopée de Londres.

Prenez extrait sec d'opium
 en poudre..... dix gros.
 alcool faible..... une livre.

Faites digérer pendant dix jours, &c. filtrez.

Il est peu de préparations si importantes pour la pratique médicale que celle-ci, &c. cependant il en est peu, pour lesquelles on trouve une plus grande variété de formules & de dénominations.

Le plus grand nombre des pharmacographes, au lieu de l'extrait sec d'opium, emploient l'opium même, y ajoutent différentes substances aromatiques, &c. prescrivent pour dissolvant le vin d'Espagne : mais 1°. l'opium du commerce, tel qu'on le préfère, est toujours impur ; ainsi sa dose est incertaine. 2°. Les substances aromatiques, tels que le safran, la cannelle, le gérosif, qu'on ajoute, chargent seulement l'infusion, sans ajouter aux propriétés réelles ; ces additions se faisoient d'après les idées hypothétiques & surannées, que l'opium étoit une substance froide, & qu'il falloit corriger sa froideur. 3°. Le vin d'Espagne est si souvent adulteré, sophistiqué, qu'il est bien plus sage d'employer une substance simple, qu'on peut aisément se procurer par-tout. D'autres pharmacographes ont conseillé d'ajouter à la solution de l'opium, du carbonate ammoniacal, &c. & toutes ces différentes préparations, qui ne différoient que par les additions inutiles dont on chargeoit la substance vraiment essentielle, étoient désignées sous les noms de *gouttes anodines, laudanum liquide de Sydenham, teincture ou essence anodine, teinture thébaïque, gouttes anodines d'Angleterre*, &c. &c.

Comme il importe au médecin de connoître exactement les doses d'opium que contiennent une liqueur, nous remarquerons que l'alcool d'opium simple que nous avons décrit, d'après la pharmacopée de Londres, contient 45 grains d'opium par onces de liqueur, 5 grains & demi par gros, &c. un grain sur quinze gouttes. Cet alcool d'opium a toutes les propriétés de l'opium.

Il est deux autres combinatifs de l'alcool avec l'opium, qui méritent d'être conservés, parce qu'ils peuvent être utiles dans quelques cas ; l'une est l'alcool ammoniacal d'opium, dont nous avons donné la formule à l'article des alcools alcalins, l'autre est l'alcool de benjoin avec l'opium, qui a été décrit à l'article des alcools balsamiques.

9°. Alcool de succin, &c. vulgairement teinture ou essence de succin.

Prenez succin réduit
en poudre très-fine... deux onces.
alcool rectifié..... une livre.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant huit ou dix jours, &c. filtrez. L'alcool ne dissout qu'une petite quantité de succin, & cette dissolution est peu colorée ; aussi on préfère gé-

néralement d'employer pour dissolvant l'alcool éthéré sulfurique.

10°. Alcool résina balsamique, communément, Baume du Commandeur de Perles.

Prenez racines sèches
d'angelique..... demi-once.
fleurs sèches d'hipericum... une once.
alcool rectifié. deux livres quatre onces.

On fait digérer dans un matras, pendant cinq à six jours, à une chaleur modérée ; ensuite on passe l'infusion avec forte expression. On met la liqueur dans un matras, &c. on ajoute les substances suivantes qu'on a concassées.

mirthe }
oliban } de chacun quatre gros.
aloès }

On fait digérer comme dessus ; on ajoute les substances suivantes, qu'on a également concassées.

storax calamite..... deux onces.
benjoin trois onces.
baume du Pérou en coques. une once.
ambre gris, (s'il on
veut)..... quatre gros et.

On fait digérer de nouveau, pendant un jour ou jusqu'à ce que ces substances soient entièrement dissoutes ; on laisse déposer la liqueur, on la verse par inclination, on la filtre à travers un papier gris, & on la conserve dans une bouteille bien bouchée.

Nous rapportons la formule & le procédé de cette préparation, d'après M. Baumé ; d'autres pharmaciens préfèrent de faire d'abord des infusions séparées des différentes substances, avec une portion de l'alcool, &c. & après avoir décanté l'alcool, lorsqu'il est bien coloré, ils réunissent les résidus, versent sur le tout le résidu de l'alcool, qu'ils font de nouveau digérer, &c. lorsqu'il est bien coloré, ils le décantent, &c. l'ajoutent à la première infusion qu'ils ont déjà séparée ; ils filtrent le tout. D'autres mettent toutes les drogues dans un matras, &c. versent entièrement l'alcool ; chacun prendra sa méthode est la meilleure. L'expérience le décidera d'une manière plus sûre que les raisonnemens & l'analogie.

Cet alcool est fort recommandé à l'intérieur comme stomacique, cordial, emménagogue, &c. on l'emploie à l'extérieur pour les blessures légères & récentes.

Nota. On doit rapporter à cette section toutes les préparations destinées pour les arts, &c. connues sous les noms de vernis à l'esprit-de-vin.

5. III. ALCOOLS AROMATIQUES ET HUILEUX.

Nous réunissons dans cette section les combinaisons de l'alcool avec l'arôme & les huiles volatiles, parce que souvent la nature nous présente ces substances dans une union intime. C'est par la distillation qu'on procède à la préparation du plus grand nombre de ces alcools, & on les connoit ordinairement sous les noms d'*esprits*, *esprits ardens*, *eaux spiritueuses*, &c.

Quelquefois on les prépare par la mixture d'une huile volatile, avec une certaine quantité d'alcool rectifié, d'autres fois on se borne à la simple digestion, & on connoit ordinairement ces derniers sous les noms de *teintures* ou *essences*.

Le plus grand nombre de ces alcools ne sont pas décomposés lorsqu'on les mêle avec l'eau; cependant ceux qui sont préparés par simple mixture, ceux qui sont fort chargés d'une huile volatile, naturellement concrète ou épaisse, se rapprochent des alcools résineux, & rendent l'eau laiteuse, opaque; & ceux qui ont été préparés, en faisant digérer l'alcool sur des plantes aromatiques, se rapprochent des alcools extractifs, parce qu'outre l'arôme & l'huile volatile contenus dans la plante, l'alcool a encore dissous une partie extractive.

Ces préparations très-multipliées appartiennent presque également au parfumeur, au liquoriste & au pharmacien; mais les uns recherchent l'odeur, la saveur, l'agrément, & l'autre doit s'attacher essentiellement à extraire, à conserver le principe médicamenteux. Aussi il doit y avoir quelques différences dans les procédés, dans le choix de l'alcool. Nous les indiquerons, en présentant quelques formules extraites des pharmacographes les plus estimés, & nous traiterons d'abord des alcools aromatiques qui se préparent par distillation.

1°. *Alcool d'anis*, &c communément, *esprit ou eau spiritueuse d'anis*.

Prenez semences d'anis
grossièrement pilées.... six onces.
alcool foible..... quatre livres.

Faites digérer pendant 12 heures, distillez à un feu doux, & retirez seulement deux livres de liqueur. La qualité de l'alcool qu'on employe dans la préparation, doit déterminer la quantité de la substance aromatique qu'il faut faire infuser, & celle de la liqueur que l'on doit retirer par la distillation. Si l'alcool est rectifié, il faut augmenter la dose de la substance aromatique, & on retirera une plus grande quantité de liqueur. La pharmacopée de Londres, édition de 1788, recommande toujours pour ces distillations, de choisir un alcool foible; souvent même il est prescrit d'ajouter dans la cucurbitte de l'alambic une certaine quantité d'eau, pré-

caution sur-tout nécessaire, lorsqu'on distille des plantes; mais il faut avoir l'attention d'arrêter la distillation à temps, de ménager le feu, &c pour cela, il importe toujours de faire cette opération au bain-marie; & quelques pharmaciens conseillent de distiller une seconde fois l'alcool aromatique obtenu par la première opération, & de n'en tirer que les cinq dixièmes; cette méthode fournit assurément un alcool plus rectifié, plus inflammable, d'une odeur plus suave; mais est-ce bien la l'objet qu'on doit rechercher pour l'usage médical? D'autres conseillent de distiller l'alcool qu'on a obtenu sur une nouvelle dose de la substance aromatique, &c, par ce moyen, il se trouve chargé d'une plus grande quantité de l'arôme. On prépare de la manière indiquée tous les alcools simples; il n'y a de différences que dans les doses qu'on emploie, & nous allons rapporter celles qui sont prescrites pour les préparations le plus ordinairement employées.

Alcool d'anis composé, ou esprit d'anis composé; de la pharmacopée de Londres.

Prenez semences d'anis
concassées..... de chacun huit onces.
semences d'angelique
que concassées.....
alcool foible..... huit livres.

Eau, suffisante quantité, pour prévenir l'empyreume; & retirez huit livres de liqueur par la distillation.

2°. *Alcool de carvi, ou esprit de carvi, de la pharmacopée de Londres.*

Prenez semences de carvi
écrasées..... huit onces.
alcool foible..... huit livres.

Eau, suffisante quantité, & retirez huit livres de liqueur par la distillation.

3°. *Alcool de cannelle, ou esprit de cannelle, ibidem.*

Prenez canelle concassée..... une livre.
alcool foible..... huit livres.

Eau, suffisante quantité, & retirez huit livres.

4°. *Alcool de fleurs d'oranges. Baumé.*

Prenez fleurs d'oranges récentes.. six livres.
alcool ordinaire..... six livres.

5°. *Alcool de fraises. Baumé.*

Prenez fraises bien mûres..... neuf livres.
alcool ordinaire..... quatre livres.

On écrase les fraises, on les met dans le bain-marie d'un alambic d'étain, on verse dessus l'alcool, & on retire par la distillation trois livres de liqueur.

On prépare de même un alcool de framboises, de pêches.

des autres suits odorants.

Mais ces préparations appartiennent plutôt au liquoriste qu'au pharmacien.

6°. Alcool de genièvre; esprit, eau spiritueuse, ou eau-de-vie de genièvre.

Prenez bayes de genièvre, récentes & écrasées, ... six livres.
alcool foible, ... douze livres..

Et retirez-en dix livres. Quelques personnes avoient conseillé de préparer cet alcool par la fermentation, & pour cela ils conseillent d'écraser de délayer les bayes dans l'eau, d'y ajouter du miel, de la levure de bière, & de tenir le mélange dans une température d'environ 20 degrés. Le procédé que nous indiquons paroît plus simple & plus sûr.

Alcool de genièvre composé, de la pharmacopée de Londres.

Prenez bayes de genièvre
écrasées, ... une livre.
semences de carvi }
semences de fenouil } de chacun une once.
nouil doux, ... }
alcool foible, ... huit livres.

Eau suffisante quantité, & retirez huit livres de liqueur.

7°. Alcool de lavande, appellé communément eau-de-vie de lavande; esprit de lavande, de la pharmacopée de Londres.

Prenez fleurs récentes de lavande, ... une livre & demie.
alcool foible, ... huit livres.

Distillez au bain-marie, & retirez cinq livres de liqueur. Il faut avoir soin de monder les fleurs, & d'en séparer les tiges, parce qu'elles communiquent à l'alcool une odeur herbacée désagréable.

8°. Alcool de romarin, & ordinairement, eau de la reine d'Hongrie, Spiritus anthos, esprit de romarin, de la pharmacopée de Londres.

Prenez sommités récentes de romarin, ... une livre & demie.
alcool foible, ... huit livres.

Retirez par la distillation cinq livres de liqueur. On prépare de la même manière & aux mêmes doses.

l'alcool de thym.

de melisse.
de menthe poivrée.
de menthe des jardins.
de serpolet, &c.

Mais ces dernières plantes doivent être employées sèches.

9°. Alcool de muscade, ou esprit de muscade, de la pharmacopée de Londres.

Prenez noix muscades concassées, deux onces.
alcool foible, ... huit livres.

Fait suffisante quantité, & retirez par la distillation huit livres.

On prépare de la même manière, & aux mêmes doses, l'alcool de mirre ou *pimento*, avec les bayes de cette plante, l'alcool de géroselle, de foucliet, de *calamus aromaticus*.

10°. Alcool de roses, communément esprit de roses, ou esprit ardent de roses.

Prenez roses pâles avec leurs calices, ... trente livres.
alcool, ... trente livres.

On met les roses dans le bain-marie d'un alambic, on les foule bien, dit M. Baumé; on verse par dessus l'alcool, & on procède à la distillation, pour retirer tout l'alcool: si on ne trouve pas le produit de la distillation assez odorant, on peut le distiller une seconde fois sur une pareille quantité de roses.

Quelques pharmaciens ajoutent à la quantité d'alcool prescrite une certaine quantité d'eau; d'autres emploient du vin, & pendant la distillation ils séparent ce premier produit qu'ils nomment *esprit de roses*, & ils recueillent la partie aqueuse qu'ils conservent sous le titre d'eau de roses: d'autres préparent l'alcool de roses par la fermentation; pour cela on met, par exemple, cent livres de roses dans un tonneau avec dix ou douze livres de miel dissous dans dix ou douze pintes d'eau; on laisse ce mélange en macération à une température convenable, & jusqu'à ce qu'il ait éprouvé une fermentation vineuse, ce que l'on reconnoît par l'odeur facilement, alors ils distillent toute cette substance, & obtiennent ainsi une liqueur odorante; ils la rectifient par une seconde distillation, mettent à part le premier produit, qui est un alcool chargé de l'arôme de la rose, & conservent la liqueur aqueuse, & on a par ce moyen dit Charas, une eau rose beaucoup meilleure que toutes celles qu'on tire par les voies ordinaires. Ainsi préparée cette eau est effectivement limpide, très-odorante; mais elle rougit fortement les papiers de tournesol, le sirop de violettes, & au lieu d'être un astringent doux, un rafraîchissant,

c'est un irritant plus ou moins dangereux, suivant l'usage que l'on en fait. Cette eau contient toujours un acide produit dans l'ordre de la fermentation ou provenant de la décomposition du vin qui a été employé. Les remarques que nous faisons ici sont fondées sur l'observation. Comme l'alcool de roses est fort recherché par les parfumeurs & les liquoristes, nous savons que plusieurs pharmaciens suivent le procédé que nous venons d'indiquer, & nous avons vu des accidens très-fâcheux, occasionnés par l'usage de ces eaux de roses préparées comme le prescrit Charas; on ne peut-être trop attentif sur la préparation des remèdes, sur-tout quand ils sont destinés pour l'usage interne ou pour des parties délicates & sensibles comme l'œil.

11°. *Alcool de cochlearia.*

Prenez cochlearia récent; & écrasé. dix livres.
alcool foible..... cinq livres.

Retirez par la distillation environ cinq livres de liqueur.

12°. *Alcool de raifort composé, communément esprit ardent de cochlearia, esprit de raifort composé, de la pharmacopée de Londres.*

Prenez racines de raifort }
sauvage fraîches }
écorses extérieures } *de chacun deux livres.*
d'oranges }
desséchées... }
cochlearia des jardins récent..... quatre livres.
noix muscade concassée. une once.
alcool foible..... seize livres.

Fait suffisante quantité, & retirez seize livres de liqueur.

13°. *Alcool des plantes aromatiques, ou alcool aromatique composé par distillation, ordinairement eau vulnéraire spiritueuse, eau d'arquebuse, &c.*

Prenez feuilles récentes }
de sauge }
d'angelique }
d'absinthe }
de sarriette }
de fenouil }
de menthastrum }
d'hysoppe }
de mélisse }
de basilic } *de chacune quatre onces.*
de rhue }
de thim }
de marjolaine }
de romarin }
d'origan }
de calament }
de ferpolet }
fleurs de lavande }
alcool ordinaire, ... huit livres.

On coupe généralement toutes ces plantes, on les met infuser pendant dix ou douze heures dans l'alcool; on procède ensuite à la distillation au bain-marie, pour tirer tout l'alcool qui est chargé du principe aromatique des plantes. On trouve des formules bien plus chargées & dans lesquelles on comprend des plantes inodores, mais ces substances sont inutiles pour l'objet qu'on se propose, & ne servent qu'à compliquer une formule qui l'est déjà trop.

Si l'on fait infuser seulement & sans distiller dans de l'alcool foible toutes les plantes aromatiques qui ont été indiquées, cette préparation nommée ordinairement *eau vulnéraire rouge*, par infusion, doit être désignée sous le nom d'*alcool aromatique composé par infusion*.

On prépare de même un *alcool de lavande par infusion*, que l'on nomme ordinairement *eau-de-vie de lavande rouge*, & ces préparations se rapprochent beaucoup des alcools extractifs.

14°. *Alcool camphré, esprit-de-vin camphré.*

Prenez camphre..... quatre onces.
alcool ordinaire..... deux livres.

Le camphre se dissout facilement dans l'alcool par la seule digestion, on l'accélère par la trituration; mais on ne peut pour cette préparation employer la distillation.

15°. *Alcool de citrons, Esprit de citrons.*

Prenez huile volatile de citrons, une once.
alcool rectifié..... huit livres.

On met ces deux substances dans une bouteille, & l'huile de citrons se dissout complètement dans l'alcool; mais il faut pour cet objet employer un alcool rectifié.

16°. *Alcool de lavande, composé par infusion ou esprit de lavande composé, de la pharmacopée de Londres.*

Prenez alcool de lavande, par distillation; trois livres.
alcool de romarin par distillation, ... une livre.
cannelle & muscade concassée, de chacune demi-once,
santal rouge, ... une once.
Faites digérer pendant dix jours, & filtrez.

17°. *Alcool d'iris par infusion, autrement, Eau de violette de Baume.*

Prenez iris de Florence, ... quatre onces,
alcool ordinaire, ... deux livres.

On fait infuser pendant douze ou quinze jours & ensuite on filtre, cette liqueur ne devant point être distillée, parce que l'iris perd considérablement de son odeur par la distillation.

D'après les exemples que nous venons de rapporter, on peut facilement faire plusieurs autres

combinaisons de l'alcool avec l'arôme & les huiles volatiles.

S. IV. ALCOOLS EXTRACTIFS.

Nous comprenons dans cette section les combinaisons de l'alcool avec les substances extractives, (*Voyez EXTRACTIF*). Ces préparations sont importantes pour l'usage médical, se font seulement par infusion ou digestion; elles sont simples ou composées, & elles sont communément connues sous les noms de *teintures*, *essences*, *quintessences*, *elixirs*, &c. Nous rapporterons les formules des préparations qui sont le plus recommandées.

- 1°. *Alcool extractif d'absinthe* ou *alcool d'absinthe par infusion*, communément, *teinture d'absinthe*.
Prenez sommets d'absinthe
sèches..... demi-once.
alcool ordinaire..... trois onces.

On incise même les sommets d'absinthe, on les met dans un matras, on verse par dessus l'alcool, on bouche le vaisseau avec de la vessie mouillée qu'on assujettit avec du gros fil, & on fait digérer pendant deux ou trois jours, au bain de sable & à une douce chaleur; il faut avoir soin de faire un trou d'épingle à la vessie pour faciliter la sortie de l'air rarifié, qui pourroit faire casser le vaisseau sans cette légère ouverture, ou bien il faut employer un matras percé sur son col d'un petit trou que l'on bouche avec un morceau de lut gras. On peut aussi faire ces infusions à froid, mais alors il faut les continuer douze ou quinze jours, ou même davantage, à proportion que la substance est plus difficilement attaquée par l'alcool. Dans les infusions à froid, le vaisseau doit être parfaitement bouché, parce qu'il n'y a pas de raréfaction à craindre.

En général, on prépare de la même manière tous les alcools extractifs: seulement la dose des substances doit varier, & nous pensons qu'au lieu d'employer un alcool rectifié, comme l'indiquent la plupart des pharmacopées, il convient de préférer au moins pour le plus grand nombre de ces préparations un alcool foible, ou tout au plus un alcool ordinaire. La dissolution des parties extractives doit être plus complète par un alcool foible que par un alcool rectifié; l'usage en sera moins échauffant, & on pourra donner la substance médicamenteuse à plus haute dose.

Alcool d'absinthe composé par infusion, ordinairement, *teinture d'absinthe composée*, *quintessence d'absinthe*.

Prenez feuilles de grande absinthe } de chacune trois gros.
& de petite absinthe }

sommets de petite centaurée..... deux gros.
girofle..... quatre gros.
cannelle..... un gros.
sucre..... deux gros.
alcool..... cinq onces.

Après avoir coupé les feuilles & les sommets des plantes concassées, la cannelle, le girofle & le sucre, on met toutes ces substances en digestion avec l'alcool, pendant trois ou quatre jours, on passe avec expression, on filtre la liqueur à travers un papier gris, & on la conserve dans une bouteille bien bouchée.

- 2°. *Alcool d'aristoloché par infusion*, ordinairement, *essence d'aristoloché*.

Prenez aristoloché ronde, sèche & grossièrement pulvérisée. deux onces.
alcool rectifié..... dix onces.

Faites digérer pendant quatre jours, & filtrez.

Cette préparation a été principalement recommandée contre la carie, & les préparations destinées pour l'usage extérieur doivent principalement être faites avec un alcool rectifié.

- 3°. *Alcool de cachou, teinture de cachou* de la pharmacopée de Londres.

Prenez cachou en poudre
grossière..... trois onces.
cannelle concassée..... deux onces.
alcool foible..... deux livres.

Faites digérer pendant huit jours, & filtrez.

On prépare de la même manière & aux mêmes doses l'alcool de petit cardamome.
de canelle.
d'écorces d'oranges.
de serpentaire de Virginie.

Alcool de canelle, composé par infusion, ou *teinture de canelle composée*, de la pharmacopée de Londres.

Prenez canelle concassée... six gros.
semence de petit cardamome }
dont on aura séparé les capsules. } de chacune deux gros.
poivre long }
gingembre en poudre }
alcool foible..... deux livres.

- 4°. *Alcool de cantharides par infusion*, ou *teinture de cantharides*, de la pharmacopée de Londres.

Prenez cantharides en poudre
grossière..... deux gros.
cochenille en poudre... un demi-gros.
alcool foible..... une livre & demie.

Faites digérer pendant huit jours, & filtrez.

On trouve dans les pharmacographies plusieurs formules très-différentes pour la préparation de cet alcool. Les uns prescrivent une dose plus forte de cantharides, d'autres conseillent d'ajouter à l'alcool, du camphre, de l'opium, de l'acide nitrique; beaucoup recommandent d'employer un alcool rectifié; mais, comme ce remède est très-actif, très-impur, il faut être circospect sur les doses des substances, & comme il peut être employé à l'intérieur & à l'extérieur, il convient d'avoir dans les pharmacies deux préparations différentes & distinctes, l'une que nous nommerons, *alcool de cantharides faible*, doit se préparer, comme nous venons de l'indiquer, d'après la pharmacopée de Londres; il est destiné pour l'usage intérieur, & il se prescrit comme diurétique & tonique très-actif par gouttes, depuis huit jusqu'à vingt, dans un véhicule approprié.

L'autre que nous distinguerons sous le nom d'*alcool de cantharides fort*, doit être préparé avec cantharides récentes &

écrasées.....	deux onces.
alcool ordinaire.....	deux livres.

Faites digérer, & filtrez. Cette préparation uniquement destinée pour l'usage extérieur, est un rubéfiant; on l'a employé quelquefois avec succès en friction, sur des membres paralytiques; nous nous en sommes servi avec avantage pour faire des frictions sur une partie où il importe d'exciter promptement une irritation, de déterminer une exudation, & de hâter l'action d'un vésicatoire ordinaire. Leur action se fait ressentir très-promptement sur la vessie, sur les organes intérieurs, & son usage exige des attentions.

5°. *Alcool de cardamome composé, teinture de cardamome composée*, de la pharmacopée de Londres.

Prenez semences de petit cardamome, dont on aura séparé les capsules.....	} de chacun deux gros.
semences de carvi.....	
cochenille.....	
cannelle concassée.....	deux onces.
raisins de caïsse, dont on aura ôté les pépins.....	quatre onces.
alcool faible.....	deux livres.

Faites digérer pendant quatorze jours, & filtrez.

6°. *Alcool de castaïlle, ou teinture de castaïlle*, de la pharmacopée de Londres.

Prenez castaïlle en poudre.....	quatre onces.
alcool faible.....	deux livres.

Faites digérer à une douce chaleur pendant huit jours, & filtrez.

On prépare de la même manière & aux mêmes doses les alcools de pimprenelle blanche.

de quinquina.
de ficelle.
de valériane.
d'hellebore noir.

Seulement on prescrit de faire infuser avec l'hellebore noir *deux serapites* de cochenille en poudre.

7°. *Alcool de columbo, ou teinture de columbo*, de la pharmacopée de Londres.

Prenez racines de columbo en poudre.....	deux onces & demie.
alcool faible.....	deux livres.

Faites digérer pendant trois jours, & filtrez.

8°. *Alcool d'enula campana composé*, ordinairement, *elixir carminatif des dages*.

Prenez enula campana, semences d'anis, de carvi, de coriandre, rapure de gayac, de chacun six onces; séné, trois onces; tartre acide de potasse, une once; rhubarbe, demi-once. Après avoir coupé, concassez toutes ces substances, faites digérer pendant trois ou quatre jours dans quarante-huit onces d'alcool ordinaire, & filtrez.

9°. *Alcool de fourmis*.

Prenez des grosses fourmis au mois de juin & de juillet.....	une livre.
alcool rectifié.....	deux livres.

Mélez & distillez au bain-marie. Cette préparation qui se rapproche des alcools acides, & qui a été regardée comme un stimulant, un aphrodisiaque, a encore été désignée sous les noms très-imprescriptibles d'*elixir* ou *eau de magnanimité*, &c.

10°. *Alcool de gentiane composé, teinture de gentiane composée*, de la pharmacopée de Londres.

Prenez racines de gentiane coupées & concassées.....	deux onces.
écorces jaunes d'oranges sèches.....	une once.
semences de petit cardamome concassées.....	deux onces.
alcool faible.....	deux livres.

Faites digérer pendant huit jours, & filtrez. On peut rapporter à cet article ces compositions fameuses & si vantées dans le public, connues sous les noms d'*elixir amer*, *elixir stomachique* de Whitt, de Stroughton, &c.

Toutes ces préparations ne diffèrent essentiellement

lement de la précédente que par les doses & l'addition d'une certaine quantité d'aloes.

11°. *Alcool de pin composé, ou essence antiscorbutique de pin.*

Prenez extrait des sommités

de pin..... deux onces.

alcool de cochlearia..... dix onces.

Faites digérer à une douce chaleur, jusqu'à la solution de l'extrait, & filtrez.

12°. *Alcool de quina composé, ou teinture d'écorce du Pérou composée, de la pharmacopée de Londres.*

Prenez quina en poudre..... deux onces.

écorces jaunes

d'oranges sèches. une once & demie.

serpenteaire de

Virginie concassée..... trois gros.

safra..... un gros.

cochenille en poudre. deux scrupules.

alcool foible..... vingt onces.

Faites digérer pendant quatorze jours, & filtrez.

13°. *Alcool de rhubarbe composé, ou teinture de rhubarbe composée, de la pharmacopée de Londres.*

Prenez rhubarbe coupée

en tranches..... deux onces.

gingembre en pou-

dre } de chacun dix gros.

safra.....

réglisse concassée..... demi-once.

eau distillée..... une livre.

alcool foible..... douze onces.

Faites digérer pendant quatorze jours, & filtrez.

14°. *Alcool de sabine composé, autrefois, teinture de myrthe, teinture de sabine composée, de la pharmacopée de Londres.*

Prenez extrait de sabine..... une once.

alcool de castoreum..... une livre.

alcool de myrthe..... huit onces.

Faites digérer jusqu'à la solution de l'extrait, & filtrez.

15°. *Alcool de safran, teinture de safran, esprit-de-vin safrané.*

Prenez safran..... une once & demie.

alcool ordinaire..... dix onces.

Faites digérer à une douce chaleur, & filtrez.

Quelques-uns ajoutent à cette préparation un peu de camphre, & ils lui donnent alors le nom d'eau pestilentielle d'Hartmann.

Chimie. Tome II.

16°. *Alcool de séné composé, ou teinture de séné, de la pharmacopée de Londres.*

Prenez séné..... une livre.

semences de carvi

concassées..... une once & demie.

semences de cardamome

concassées..... demi-once.

raisins de caïlle, dont

on a séparé les pépins. seize onces.

alcool foible..... huit livres.

Faites digérer pendant quatorze jours, & filtrez.

17°. *Alcool de savon, vulgairement, essence de savon, &c.*

Prenez savon blanc coupé

en tranches..... dix onces.

alcool foible..... trois livres.

Faites digérer à un feu doux ou à la chaleur du soleil, & lorsque la solution du savon est complète, filtrez. Cette préparation aromatisée avec quelques gouttes d'huile volatile de citron, est plus souvent préparée par les parfumeurs qu'en pharmacie. Elle a été cependant recommandée comme un très-bon fondant résolutif, &c. Quelques-uns y ajoutent du camphre, de l'opium, les huiles volatiles d'origan, de romarin, suivant l'objet qu'ils se proposent, &c. on donnoit à ces différentes préparations les noms de baume savonneux, esprit de savon, &c.

18°. *Alcool de vers de terre, ou esprit de vers de terre.*

Prenez vers de terre

vivans..... deux livres.

alcool ordinaire..... cinq livres & demie.

Après une digestion de deux jours, distillez jusqu'à moitié. Plenck, de qui nous tirons cette formule, lui attribue des propriétés résolutives, stimulant, & semblables à celles de l'alcool des fourmis.

On trouve dans les pharmacopées une infinité d'autres préparations semblables, plus ou moins composées; celles que nous avons rapportées, suffisent pour en donner une idée, & faire sentir combien la pharmacie est surchargée de formules, de préparations.

ALCUBUD, ALUMBAIR. (Pharmacie.)
Dénomination des arabes, pour désigner le beurre frais.

ALCYON, ou, comme l'écrivent quelques-uns, Halcyon (Pharmacie). Ce mot, qui dérive du grec, & qui, suivant Lemery, signifie *né dans la mer*, ou *produit par la mer*, est équivoque dans notre langue, parce qu'il a été employé pour désigner deux objets très-différens, qui, l'un & l'autre, ont été mis, par les anciens pharmacographes, au

nombre des substances officinales, à cause des vertus médicamenteuses qu'ils leur attribuoient.

1°. Les Grecs nommoient *halcyonion*, &c d'après eux, les Latins ont nommé *alcionium*, différentes espèces de concrétions que l'on trouve dans le sein de la mer, ordinairement attachées à la superficie des rochers baignés par les eaux, mais qui quelquefois sont détachées, flottantes à la surface des eaux & poussées sur les rivages. La forme, la consistance de ces concrétions offrent beaucoup de variétés; les unes sont molles, fongueuses, cellulées, &c ne diffèrent pas essentiellement des éponges; d'autres sont d'un tissu plus compact, recouvertes d'une membrane rugueuse, ou encroûtées d'une couche terreuse; quelques-unes ressemblent aux mousses, aux champignons, ou présentent des divisions en forme de branches; aussi ces concrétions ont-elles été regardées, tantôt comme des plantes spongieuses, tantôt comme une écume de la mer qui s'est desséchée par la chaleur du soleil; d'autres fois comme le nid ou l'excrément d'un oiseau; &c d'après les différentes idées qu'on avoit de leur nature, on les a désignées sous les noms d'*écume de mer*, *merde de Cormoran*, &c. Aujourd'hui on s'accorde généralement, d'après les observations de M. Poyssonel, à regarder toutes ces concrétions comme une sorte de roche formée dans le sein de la mer par des animaux assez semblables aux polypes. Quoi qu'il en soit, Dioscoride, Galien, &c d'après eux tous les anciens, distinguoient cinq espèces d'alcyon, dont ils indiquoient plusieurs préparations, &c auxquelles ils attribuoient des propriétés médicamenteuses très-différentes suivant les espèces; mais ces substances sont entièrement bannies des nos pharmaciens.

2°. On a donné le nom d'alcyon, *halcyon* des Grecs, *alsedo* des Latins, à plusieurs espèces d'oiseaux, &c entr'autres à une espèce d'hirondelle de rivage que l'on trouve à Java, à Siam, à la Cochinchine, &c qui aujourd'hui est plus généralement connue sous le nom de *Salangane*. Les nids de cet oiseau sont faits avec du frai de poisson, qui se dessèche par la chaleur du climat; ils sont secs, blancs, friables, s'amollissent facilement par l'ébullition dans l'eau; ils ont la forme de tasses rondes ou de petits paniers hémisphériques. Les Siamois, les voyageurs qui en apportent en Europe, les vantent comme un aliment agréable & très-restaurant. (Voyez, sur cet objet, le dictionnaire de médecine.)

On a encore donné le nom d'alcyon au Martin-pêcheur, &c on recommandoit de faire sécher cet oiseau, &c de le pendre au cou des enfans, pour les préserver de l'épilepsie; mais cette propriété n'est fondée que sur l'imagination.

ALEC ou **ALECH**. (Pharmacie.) Expression des arabes, pour désigner le vitriol ou sulfate de fer.

ALECHARITH. C'est une des dénominations alchimiques du mercure.

ALECTOIRE, **ALECTORIENNE**; **PIERRE LAPIS ALECTORIUS** (Pharmacie). On a donné ce nom à une pierre que l'on trouve dans l'estomac d'un vieux coq, &c à laquelle on attribuoit des propriétés merveilleuses, &c sur-tout une vertu animante & aphrodisiaque; mais toutes ces prétentions sont aujourd'hui inscrites au nombre des fables. Les oiseaux gallinacés avalent instinctivement différentes espèces de pierre; il peut même se former, par état de maladie, des concrétions pierreuses dans la substance de leur foie, de leur estomac; mais ces corps étrangers n'ont aucune propriété particulière.

ALEMBIC. (Pharmacie). Ce mot, suivant Ruiland & Johnson, a été employé par les alchimistes &c les arabes, pour désigner le mercure.

ALEMBROTH. Ce mot a été employé pour désigner plusieurs choses très-différentes les unes des autres en chimie. Depuis assez long-temps, on s'en servoit pour nommer un sel composé de muriate de mercure corrosif, ou *sel sublime corrosif*, &c de muriate d'ammoniaque, ou *sel ammoniac*. On nommoit aussi ce composé *sel de la sagelle*; les alchimistes en faisoient un grand cas & un grand usage. C'est un sel triple dont il sera parlé à l'article du mercure & à son article propre. (Voyez MURIATE D'AMMONIAQUE ET DE MERCURE).

L'ancienne encyclopédie donne d'autres définitions du mot alembroth; c'est un mot chaldéen, y est-il dit, dont se servent les alchimistes pour signifier *clé de l'art*; c'est-à-dire, de l'art chimique. Cette clé fait entrer le chimiste dans la transmutation; &c elle ouvre les corps de sorte qu'ils sont propres à former la pierre philosophale. Qui fait ou qui sauroit cette clé, sauroit le grand-œuvre. Il y en a qui disent que cette clé est le sel du mercure.

Alembroth signifie aussi un *sel fondant*; & parce que les sels les plus fondans sont les alcalis, *alembroth* est un sel alcali qui sert à la fusion des métaux.

Dans ce sens, *alembroth* a été employé pour signifier un sel alcali naturel qui se trouve en Chypre; &c il y a apparence que ce sel est une espèce de borax, ou qu'on en pourroit faire du borax. (Voyez BORAX.)

ALEMBROTH. (Pharmacie). Ce mot, que les uns disent chaldéen, & d'autres arabe, se trouve dans un grand nombre d'écrivains, mais avec des acceptions différentes.

Les alchimistes s'en servent quelquefois dans un sens allégorique, pour désigner la *clé de l'art*, un des ardens du grand-œuvre, celui qui dispose les corps à la transmutation, &c les rend propres à

former la pierre philosophale. D'autres fois, & plus ordinairement, ils employent ce mot pour désigner un sel propre à servir à la fusion des mines, des terres, des métaux; & ils en distinguent deux espèces, un naturel que l'on retire d'une terre particulière qu'on trouve au mont Olimpe en Chypre, qui a la forme & la couleur du sang desséché, & qu'ils disent être d'une nature nitreuse & aluminieuse; mais, comme les alcalis sont généralement les flux ou fondans les plus puissans des terres, il y a apparence, d'après les propriétés qu'ils lui attribuent, & d'après la description qu'ils en font, que ce sel naturel dont ils parlent étoit un carbonate de soude, ou un borate natif de soude. Le sel alembroth artificiel, qu'ils indiquent sous les noms de *sel elebroth*, *sel albitran*, étoit un mélange de différentes substances salines qui avoient la soude ou la potasse pour base. André Libavius a donné plusieurs formules de ces sels de fusion & de fixation.

Les alchimistes ont aussi donné le nom de *sel alembroth*, ou *alembroth*, à une préparation saline de mercure, qu'ils nommoient encore *sel des philosophes* & de l'art.

Enfin ils appelloient *alembroth purifié* (*alembroth defecatum*), le sel de tartre ou carbonate de potasse.

Les pharmacographes ont décrit, sous le nom de *sel alembroth*, *sel de taber*, *sel albitran*, un mélange salin dont on trouve dans les auteurs plusieurs formules à-peu-près semblables. Lomery a donné la suivante.

Prenez sel gemme (ou muriate de soude) *quatre onces*; sel alcali ou de soude, c'est-à-dire, carbonate de soude ou de potasse, *quatre onces*; sucs dépurés de menthe & de benoite, *de chacun une once*; mêlez le tout ensemble, & le dissolvez dans suffisante quantité d'eau; filtrez la dissolution, & faites évaporer l'humidité dans une terrine de grès, ou dans un vaisseau de verre au feu de sable jusqu'à siccité: on garde ce sel dans une bouteille.

D'après cette description, qui est à-peu-près la même dans Schroder, on voit que ce sel n'est qu'un muriate de soude avec excès d'alcali. On lui attribuoit beaucoup de propriétés médicinales; on le regardoit comme fondant, diurétique, apéritif, propre à dissoudre les engorgemens des glandes & les humeurs visqueuses. La dose étoit depuis un demi-scrupule jusqu'à un gros; mais cette préparation est bannie de nos pharmacies.

Mais on a plus généralement conservé le nom d'*alembroth* pour désigner un sel triple, formé par la combinaison du muriate mercuriel corrosif, ou sublimé corrosif, avec le muriate d'ammoniac, vulgairement sel ammoniac. Cette combinaison saline présente quelques phénomènes & a quelques propriétés particulières, qui seront indiquées d'après la nomenclature méthodique, sous le mot *MURIATE AMMONIACO-MERCURIEL*.

ALEMBROTH. (Voyez ALEMBROTH). (Pharm.)

ALEPHANGINE ou ALEFANGINE. (Pharmacie.) Dénomination qui vient de l'arabe *allegin*, ou comme l'écrivent quelques-uns, *alefangia*, arôme, substance aromatique, & qui a été employée par Mesué, pour désigner des trochisques & des pilules composées de différentes substances aromatiques. Les trochisques qui étoient distingués par le nom de *pallia alephangina*, sont depuis long-temps bannis de nos pharmacies; les pilules sont encore décrites dans plusieurs pharmacopées, sous le nom de *pilules aromatiques de Mesué*, ou *pilules alephangines*; elles sont composées de cannelles, girofle, macis, muscade, cardamome, cubebe, *spicanard*, bois d'aloès (ou à son défaut santal citrin), *calamus aromaticus*, *asarum*, *schwanntz*, & *carposalsamum*, de chacun quatre gros; *absinthe pontique* & *roses rouges*, de chacun deux gros & demi; *aloès*, huit onces; *myrrhe* & *massic*, de chacun deux gros & demi; *safran*, un gros & demi.

Après avoir concassé les substances aromatiques, on les fait bouillir quelque temps dans trois livres d'eau, on coule la décoction, on l'exprime & on y fait fondre l'aloès grossièrement pulvérisé. Lorsque la solution en est faite, on laisse reposer la liqueur, on la verse par inclination; enfin on la fait évaporer sur un feu doux jusqu'à consistance d'extrait un peu liquide, alors on la retire du feu, & on y mêle fort exactement la myrrhe, le massic & le safran, qui doivent avoir été réduits en poudre très-fine, & on conserve cette composition dans un vase de fayence.

Ces pilules alephangines, qui sont purgatives & propres à fortifier l'estomac, à favoriser la digestion, étoient prescrites pour être prises peu de temps avant le repas, & la dose en étoit de 24 à 72 grains.

L'intention dans cette composition étoit d'allier l'aloès au principe aromatique; mais cet objet étoit bien mal rempli par la manière dont on procédoit à la confection de ces pilules; en effet, quoiqu'il entre beaucoup de substances aromatiques dans la formule de ces pilules, la cuisson qu'on leur fait subir dissipe le principe aromatique, & il ne reste qu'une décoction trouble, acre, amère, acerbée & astringente; ces défauts ont été bien saisis par plusieurs pharmaciens, ce qui les a engagés à proposer différentes corrections: ainsi on trouve dans les pharmacopées des formules très-différentes pour la confection de ces pilules.

Adrien Myndicht, dans son *armamentarium medicum chemicum*, a décrit sous le nom d'*aleophangines*, des pilules d'une espèce bien différente, & qu'il ne faut pas confondre comme le font plusieurs lexiconographes, avec les pilules alephangines; celles-ci paroissent avoir été ainsi nommées, parce que l'aloès en est la base; comme elles ne sont point en-

ployées dans nos pharmacies, nous n'en rapportons pas la formule, qui est très-bien composée. Plusieurs pharmacographes se sont occupés à les réformer, & en ont donné différentes formules que l'on trouve dans les dispensaires, sous les noms de *pillules aloëphangines capitales & stomachiques*, *pillules aloëphangines réformées*, &c. Les uns ont ajouté à l'aloës des poudres purgatives & aromatiques, qu'ils incorporent avec un sirop; les autres proposent de faire infuser dans l'alcool les substances aromatiques, pour en extraire le principe résineux que l'on unit ensuite à l'aloës. Lemery propose la formule suivante, sous le nom de *pillules aloëphangines réformées*.

Prenez aloës soccotrin, quatre onces; *séné mondé*, quatre gros; *ellébore noir*, un gros & demi; *trochisques althamali*, sels d'absinthe & de charbon blé, poudres diamoschi & diambra, safran oriental, myrrhe en larmes, de chaque un gros; huile volatile de camelin, de saucin, de romarin & de camomille, de chacun six gouttes; sirop de nerprun, suffisante quantité pour faire une masse de pilules.

La manipulation de ces pilules est simple & facile, elle consiste uniquement à réduire en poudre fine les différentes substances, & à les incorporer avec le sirop de nerprun; mais la formule est encore chargée d'un grand nombre de substances, on pourroit en retrancher sans diminuer leur efficacité. Ces pilules sont beaucoup plus purgatives que les premières, & la dose doit en être depuis douze grains jusqu'à soixante au plus; mais rarement elles sont employées.

ALEXANDRIN. (Pharmacie.) Surnom donné par les anciens à différentes compositions médicamenteuses, soit parce que quelques-unes avoient été imaginées par le médecin Alexandre, ou par des disciples de l'école d'Alexandrie, soit parce qu'on y avoit attaché le nom du roi Alexandre comme une sorte d'hommage, ce qui étoit assez fréquent parmi les anciens; & qu'il en soit, on trouve dans Celse la description d'un emplâtre qu'il nomme *alexandrin*, & qu'il place au nombre des remèdes attractifs; il étoit composé d'alun fossilé, de sel ammoniac, de scories de cuivre, de myrrhe, d'encens, de résine de pin, d'huile & de vinaigre; cet emplâtre, dont la base étoit un oxyde de cuivre dissous par l'acide acétique, devoit être d'une couleur verte. J. Mesué décrit sous le nom d'*emplâtre alexandrin* ou d'*Alexandre*, deux compositions d'une nature bien différente de celle que nous venons d'indiquer: l'un étoit fait avec des dattes, des coings, du styrax, du mastic, & d'autres substances astringentes & toniques, & il étoit destiné pour appliquer sur le ventre, fortifier l'estomac, &c. L'autre qui avoit à-peu-près le même usage, étoit principalement composé d'ail avec le styrax, le bdellium, l'aloës, &c. Il décrit aussi un *ceras d'Alexandre*,

propre à fortifier l'estomac & les viscères abdominaux qui étoit composé avec les tiges d'absinthe, l'encens, le styrax, la gomme ammoniac, de la cire & du vin. Nicolas Myrepsus décrit un antidote qu'il nomme *aurea alexandrina* *phlegmatica*. Acce donne la formule d'une poudre pour les maladies des yeux, qu'il nomme *collyrium sicum alexandro regi inferiptum*; enfin les anciens employoient beaucoup sous le nom de *julep alexandrin* ou *royal*, une sorte de potion ou de sirop clair, composée de six onces d'eau de roses, & deux onces de sucre, que l'on faisoit bouillir quelques minutes, & que l'on donnoit le plus ordinairement par cuillerées aux malades, ou que l'on mêloit à leurs boissons.

Quelques pharmacographes ont encore conservé le nom d'*alexandrin* pour désigner un sirop, qui, de même que le julep, se prépare avec quelque eau aromatique distillée, telles que celles de roses, d'oranges, de cannelle, de menthe, de mélisse, &c. & qui n'en diffère que par la proportion plus grande du sucre. Pour faire ce sirop, sur quatre onces d'une de ces eaux aromatiques, on fait fondre au bain-marie sept onces de sucre, & on laisse refroidir dans un vaisseau clos pour conserver le principe odorant.

ALEXANTHI ou **ALTINGAR.** (Pharmacie) Expression des arabes pour désigner les fleurs de cuivre ou oxyde de cuivre.

ALEXIPHARMAQUES, *remèdes.* (Phar.) Généralement on donne ce nom aux médicaments propres à combattre les effets des poisons, des venins ou de la malignité. Les anciens appelloient particulièrement **ALEXIPHARMAQUES**, les remèdes qu'ils employoient contre les poisons, & ils nommoient *alexiteres* ceux dont ils se servoient contre les blessures faites par des animaux venimeux: quelques-uns par la suite imaginèrent encore une autre distinction; ils désignèrent sous le nom d'*alexiticaux*, les remèdes qui sont propres à résister à la malignité des maladies, ou à la combattre. Mais Galien fait peu de cas de ces distinctions, & il comprend sous le titre général d'*antidotes* toutes les compositions médicamenteuses propres à résister aux poisons, aux venins ou à la malignité; plusieurs écrivains ont encore désigné ces remèdes sous le nom de *bétoardiques*, parce qu'ils regardoient le bétoard comme l'*alexipharmaque* le plus efficace dans tous les cas.

Il seroit déplacé de faire ici l'énumération de toutes les substances que l'on a successivement regardées comme alexipharmaques; celles qui méritent véritablement ce nom, sont principalement les plantes qui, outre le principe aromatique, contiennent une huile volatile unie à une résine, ou à une substance âcre, amère, saline, échauffante, propre à stimuler la fibre, à exciter la transpiration, la sueur; on doit également y

comprendre quelques produits des substances animales, & toutes les préparations qui ont la propriété d'exciter, d'augmenter instantanément l'action. (On peut consulter sur cet objet le Dictionnaire de médecine.) Nous nous bornerons à remarquer que ce genre de médicamens étoit autrefois beaucoup employé; aussi trouvons-nous dans les dispensaires, les pharmacopées; un grand nombre de formules qui sont désignées par l'épithète d'*alexipharmiques*; telles sont les espèces alexipharmiques; elles étoient formées du mélange de racines d'asclépias & de lièvre, de chacune une livre; de feuilles de scordium & de galega, de chaque huit onces; d'écorces de citrons une once & demie; quelques-uns ajoutaient à ce mélange les racines d'angelique, de contrayerva, de serpentina de Virginie, de zédoaire, les feuilles de mentha, de marum, les fleurs de chardon béni; d'autres y faisoient entrer le macis, le gérosif & quelques aromatiques chauds. On employoit ces espèces en infusion ou en décoction, souvent dans l'eau, quelquefois dans le vinaigre ou l'alcool, & on préparoit ainsi des vinaigres, des essences alexipharmiques, dont on vantoit l'efficacité contre la peste, la variole & les maladies épidémiques & contagieuses. Nous trouvons encore dans les pharmacopées différentes espèces de *poudres & d'émulsions*, qui portent le nom d'alexipharmiques: nous n'en rapporterons pas les formules, parce que ces compositions ne sont plus employées de nos jours.

Ces mots d'alexipharmiques & alexitères, viennent du grec, *quod ex veneno nomum arcant*, comme l'a fort bien dit Gorris dans ses notes sur le poème de Nicandre, intitulé *alexipharmaca*.

ALEXIPYRETIQUES. (*Pharmacie.*) Cette dénomination qui est employée par plusieurs écrivains pour désigner un genre de remèdes, est formée de deux mots grecs, qui signifient *antidote des fièvres ou chasser la fièvre*. Mais il faut bien distinguer ce genre de remèdes de nos fébrifuges amers, astringens, dont l'effet lent, se borne à soutenir le ton général du système nerveux, & dont l'usage est restreint au temps des intermissions. Les anciens entendoient par alexipyretiques, des remèdes qui terminent tout-à-coup les fièvres, en suspendant l'ordre périodique & prévenant le retour de l'accès, *qua solum & sine malis folliculatae febres solvunt*. C'est la définition qu'en donne Jer. Mercurialis, & elle exprime très-bien l'idée que nos anciens avoient de la manière d'agir de ces remèdes. Aussi Galien qui nous a conservé la formule de plusieurs électuaires, destinés à remplir cette intention, les désigne sous le nom de LEXOPYRETIQUES, les nomme LEXOPYRETIQUES, *id est optime sedans febrem*. Plin, qui fait mention de ce genre de remèdes, les nomme LEXIPYRETIQUES. Cette même dénomination se trouve dans Alexandre de Tralles,

Nicolas Myrepsus, enfin comme l'observe Rhodius & Léonard Fusch, cette dénomination paroit plus conforme à l'étymologie, & plus convenable pour exprimer l'énergie & la manière d'agir de ces remèdes. Quelques-uns même les ont nommés LYSIPYRETIQUES (*quod febres solvant*) parce qu'ils font la solution des fièvres; Scribonius Largus, qui vivoit sous l'empire de Claude, est le seul des anciens qui ait désigné ce genre de remèdes sous le nom d'alexipyretiques.

Quoi qu'il en soit, nous devons entendre, par alexipyretiques ou lexi-pyretiques, les remèdes qui terminent promptement les fièvres, & en arrêtent tout-à-coup les accès; effet qu'ils produisent en déterminant un trouble momentané dans l'économie animale, en y excitant un mouvement contraire à l'action fébrile & capable de prévenir le frisson, en augmentant la chaleur, & souvent en procurant la sueur ou d'autres évacuations. Les moyens pour remplir cet objet peuvent être très-variés; ceux que nos anciens employoient se rapprochoient beaucoup des alexipharmiques, ils consistoient presque toujours dans un mélange de différentes substances stimulantes plus ou moins actives, souvent combinées avec les narcotiques, dont les malades faisoient usage immédiatement ou peu de temps avant le retour de l'accès; car l'efficacité de ces remèdes dépend beaucoup de la manière de les administrer, & de l'instant précis où on les place: leur usage, peut-être trop négligé par les modernes, exige beaucoup d'attentions. Nous ne nous arrêterons pas à exposer les cas où ils peuvent être avantageux, ceux où ils peuvent être nuisibles; on pourra consulter, sur ces objets, un mémoire que nous avons donné en 1790, à l'académie de Dijon, & qui sera imprimé dans la suite des mémoires de cette société; nous nous bornerons à rapporter les formules de deux électuaires alexipyretiques, la première se trouve dans Scribonius Largus, & elle est composée de semences de nasturtium, de jusquiame, d'opium & de myrrhe, de chacun une once; safran & soufre, de chacun demi-once; poivre blanc deux gros; on incorpore toutes ces substances avec suffisante quantité de miel, & on en donne de la grosseur d'une fève une heure avant l'accès, & après avoir frotté long-tems le corps avec de l'huile chaude: ce remède, ajoute-t-il, prévient le frisson, & guérit les fièvres qui ont un retour périodique; c'est pourquoi on l'a nommé *alexipyretos*.

Galien nous a conservé, dans son livre septième de la composition des médicamens, la formule suivante, qu'il décrit sous le nom de confection de Proxenus, qu'on appelle LEXOPYRETIQUES, & dont Antoine Musa s'est servi avec succès.

Prenez poivre blanc, opium, cardamomum, de chacun trois gros; safran, soufre, myrrhe &

comme substantif, pour désigner un remède par excellence; & auquel on attribuoit des vertus distinguées; ainsi d'après Basile Valentin, plusieurs chimistes ont décrit sous le nom d'*alexiter d'antimoine* une sorte de teinture ou liqueur rouge que l'on obtenoit en faisant digérer de l'acide acéteux sur l'oxide vitreux d'antimoine, & en y mettant ensuite une certaine quantité d'alcool. Cette préparation que Lemery a décrite avec soin, étoit vantée comme cardiaque fortifiante, propre à vivifier la transpiration, & à pousser la peau; mais elle n'est point employée dans nos pharmacies modernes.

Rotrou avoit aussi donné fort improprement le nom d'*alexiteres* à des pilules purgatives très-actives qu'il préparoit avec la graine de ricin ou les pignons d'inde; nous ferons connoître la préparation & l'usage de ces pilules au mot *RICIN*.

ALEXIR. (*Pharmacie.*) Cette dénomination, suivant Ruland & Johnson, a été employée par les arabistes, pour désigner un remède préparé chimiquement.

ALFACTA. (*Pharmacie.*) Expression des arabistes, pour désigner une distillation.

ALFADIDAM. (*Pharmacie.*) Scorie de fer, suivant Johnson.

ALFARD, LESACH, ou, comme quelques-uns l'écrivent, **ALTARD.** (*Pharm.*) On appelle ainsi, dit Lemery dans son dictionnaire des drogues, le fruit d'une plante qui croît aux Indes, & que les naturels emploient en décoction comme le gayac, pour le traitement de la vérole.

ALFATIDA. (*Pharmacie.*) Expression des arabistes, pour désigner le cuivre brûlé, l'oxide de cuivre par le feu ou la limaille de cuivre.

ALFENIATI. (*Pharmacie.*) Expression des médecins Arabes, employée par quelques-uns de leurs copistes & commentateurs, pour désigner les especes aromatiques, telles que le gérofle, la cannelle, &c.

ALFESCERA, ou ALPHESFRA. (*Pharm.*) Surnom donné à un électuaire décrit par J. Mesué, & dont la base étoit la racine de bryone, que, suivant la remarque de Jean Manard, les Arabes nommoient *fiera*, ou *phesra*. Cette composition, recommandée par l'auteur dans l'épilepsie, la paralysie, n'est plus employée de nos jours. Mesué décrit encore un looch que les interprètes ont traduit sous le nom de *alfesera*.

ALFUSA. (*Pharmacie.*) Dénomination employée par les arabistes, pour désigner la tuthie. (Voyez *ZINC*.)

ALGALLIA. (*Pharmacie.*) Dénomination employée par quelques écrivains arabistes, pour désigner la substance que l'on nomme *zibeth*, ou *ci-vette*. (Voyez ces mots.)

ALGAROTH. (Poudre d') Ce nom a été, pendant long-temps, le seul nom chimique d'une préparation antimoniale, que l'on fait en jetant le muriate d'antimoine sublimé liquide, ou beurre d'antimoine, dans de l'eau; il se forme tout-à-coup un précipité blanc très-lourd; on le lave avec beaucoup d'eau, à plusieurs reprises. C'est un oxide antimonisé, surchargé d'oxigène, qui n'auroit aucune vertu, aucune action sur l'économie animale, s'il ne retenoit pas un peu d'acide muriatique, qu'on ne lui enlève jamais complètement par le lavage, & qui est d'un effet très-incertain, très-inconstant, parce que, suivant la manière dont il a été lavé, il peut en retenir une quantité différente. On n'emploie plus, depuis long-temps, la poudre d'algaroth en médecine, on l'a proposée pour la préparation du muriate d'antimoine, ou *terre stibil*. (Voyez les mots *ANTIMOINE*, *OXIDES D'ANTIMOINE*, &c.)

ALGAROTH, ou ALGEROTH. (Poudre d') (*Pharmacie.*) On a nommé ainsi pendant très-long-temps un oxide blanc d'antimoine, que l'on obtient du muriate d'antimoine sublimé, ou beurre d'antimoine. La préparation la plus ordinaire consiste à verser de l'eau sur le muriate d'antimoine; il se sépare aussitôt une poudre blanche très-fine, que l'on édulcore par plusieurs lavons: c'est ce précipité que l'on a nommé poudre d'algaroth, parce que Victor Algeroth, médecin italien, a introduit dans la médecine l'usage de cette préparation, & en a vanté l'efficacité dans plusieurs cas; on a encore donné à cet oxide d'antimoine les noms très-impropres de *mercure de vie*, *poudre angélique*, &c.

Une observation suivie nous a appris qu'on pouvoit facilement obtenir cet oxide d'antimoine sous forme cristalline; pour cela, on met dans une grande capsule de verre quelques onces de muriate d'antimoine sublimé, & on l'expose à la cave, dans un endroit frais, à l'abri des insectes & de la poussière; ce muriate d'antimoine attire peu-à-peu l'humidité, il paroît même se combiner avec une des parties de l'air atmosphérique, & après quelques semaines, on trouve le fond & les parois de la capsule recouvertes de petits cristaux brillans, argentins, & dont la figure n'a pas encore été déterminée. Nous indiquerons au mot *ANTIMOINE* l'usage & les propriétés de cet oxide.

ALGERIC. (*Pharmacie.*) Expression des arabistes pour désigner la chaux. (RULAND.)

ALGUE COMMUNE. (*Pharmacie.*) *Zostera*

marina. (LINNÉ.) Pour ne rien omettre dans ce dictionnaire de pharmacie, nous allons dire un mot sur deux algues marines. La première est, dit-on, vulnératoire, rafraîchissante, apéritive, dessicative; elle apaise la douleur de goutte & les inflammations, étant appliquée récemment sur le mal. Lacuna assure qu'à Rome, on se sert de cette algue pour tuer les puces & les punaises, & qu'il en a vu les effets. Les paysans la font sécher, & en tirent un fort bon fumier pour les terres; les vèrriers, parfumeurs & autres artistes s'en servent pour emballer; on fait avec sa cendre du vert : elle offre encore aux bestiaux un assez bon fourrage; on la trouve dans l'Océan & la mer Baltique. Gaertner, dans son traité de *frutibus*, en a parfaitement représenté la partie de la fructification. (M. WILLEMET.)

ALGUE PORTE-SUCRE. (*Pharmacie.*) *Fucus saccharinus*. (LINNÉ.) Cette seconde algue se trouve dans la mer d'Islande. M. Goulin, dans son dictionnaire de matière médicale, dit qu'elle tient aux rochers par des racines, lesquelles donnent de nouvelles feuilles à la place de celles qui ont été arrachées. Lorsque lamer les a poussées sur le rivage, & qu'elles y ont séjourné quelque temps, elles se couvrent d'une poussière farineuse que les naturels du pays recueillent avec soin, & qu'ils mettent avec d'autres aliments au lieu de sucre. Ils ramassent aussi ses feuilles, & les font macérer dans de l'eau de pluie ou de fontaine; elles donnent alors ce suc qui est très-doux au goût. Les brebis sont fort avides de ces feuilles, & celles qui en mangent deviennent extrêmement grasses. Sibbald dit, qu'en Ecosse on la mange en salade.

Ce varec est rafraîchissant. Borrichius, Widalinus, Bruckmann, Paul & Whiteorne, ont traité spécialement de cette plante.

(M. WILLEMET.)

ALHAGI. (*Pharmacie.*) Geste de plante épinoïse, que l'on nomme encore *AGUL* ou *ALMAGI*. Cette plante croît naturellement en Perse aux environs d'Alep & de Kaika en Méso-potamie; ses feuilles sont dessicatives & chaudes; ses fleurs purgent; on en fait bouillir une poignée dans de l'eau.

Ses feuilles & ses branches, dit M. Tournefort, se couvrent dans les grandes chaleurs de l'été, d'une liqueur grasse & onctueuse, & qui a, à-peu-près la consistance de miel. La fraîcheur de la nuit la condense & la réduit en forme de grains; ce sont ces grains auxquels on donne le nom de *manne d'alhagi*, & que les naturels du pays appellent *tranjabin*, ou *térésabin*. On la recueille principalement aux environs de l'Auris, ville de Perse, où on la réduit en pains assez gros, & d'une couleur jaune-foncée. Les grains les plus gros qui sont chargés de poussière & de

parcelles de feuilles desséchées, sont les moins estimés; on leur préfère les plus petits, qui, cependant pour la bonté, sont au-dessous de notre manne de Calabre.

On en fait fondre trois onces dans une infusion de feuilles de séné, que l'on donne aux malades que l'on veut purger.

ALHANDAL. & quelquefois **AL-HANDHAL.** (*Pharmacie.*) Mot arabe qui signifie la coloquinte, & qui est généralement adopté pour désigner une préparation que l'on fait avec cette substance, & que l'on connoît dans les pharmacies sous le nom de trochisque alhandal. (*Voyez* les mots de **COLOQUINTE** & **TROCHISQUE**.)

ALHARIF. (*Pharmacie.*) Ce nom qui, suivant Guy de Chauliac, signifie confection de bonne saveur, est donné à deux espèces d'électuaires ou confectons décrites, par J. Mesué, & dont la base sont les myrobolans unis à quelques autres purgatifs. Ces électuaires ne sont plus employés.

ALHASCE ou **ALHASECH.** (*Pharmacie.*) Dénominations des Arabes, répétées par quelques-uns de leurs copistes, pour désigner le thym; ainsi on trouve dans Mesué une décoction, une huile préparée avec le thym, & qu'il nomme décoction *althasce*, huile de *althasch*.

ALHASSER. (*Pharmacie.*) Mot arabe que l'on trouve dans quelques écrivains de matière médicale, & par lequel ils désignent une sorte de gomme résine que l'on obtient de l'apocin. Cette plante contient un suc laiteux fort abondant, & lorsqu'on en arrache une feuille, le suc coule le long de la tige, s'épaissit, devient concret, & forme une sorte de gomme résine blanche, friable, qui a l'apparence de la gomme adragante, mais qui en diffère beaucoup par ses propriétés, car il est acre & amer; c'est ce suc concret que les Arabes ont désigné sous les noms de manne, ou sucre alhasser; cette substance, à laquelle on a attribué autrefois quelques propriétés médicinales, n'est plus employée dans nos pharmacies.

ALHENNA ou **KENNA.** (*Pharmacie.*) Dénomination employée par quelques écrivains pour désigner la plante que nous avons indiquée sous le nom d'**ALCANA VERA.** (*Voyez* ce mot.)

ALIBOUR, eau d' (*Pharmacie.*) On trouve dans le public sous cette dénomination, une espèce de solution saline dans l'eau assuégée d'une certaine quantité d'alcool, & que l'on emploie à l'extérieur pour le traitement des plaies & des contusions.

Cette eau, dont l'auteur a fait pendant quel-

due temps un secret, est composée de la manière suivante.

Dans quatre livres d'eau commune mettez sulfate de zinc ou vitriol blanc, deux onces, sulfate de cuivre ou vitriol bleu, quatre gros, safran en poudre fine, deux scrupules. Lorsque la solution des sels est complète, ajoutez-y huit onces d'alcool foible, dans lequel on aura dissous un demi-gros de camphre, & conservez cette liqueur dans une bouteille bien bouchée.

Cette eau, ainsi que mille autres semblables dont on trouve les formules dans le public, & dont chacun vante les propriétés merveilleuses, est un astringent, un condensant léger, qui peut être employé utilement dans quelques plaies récentes lorsqu'il n'y a point d'hémorrhagie, & dans le traitement des contusions lorsqu'elles sont légères & peu profondes.

ALIEUTICON, ou comme quelques-uns l'écrivent, **HALIEUTICON**. (Pharmacie.) Nom d'un emplâtre dont on trouve, dit J. Gorris, deux formules dans les ouvrages d'Acce.

ALIGULUS. (Pharmacie.) Ce mot, suivant Johnson, désigne une confection.

AI IPASMA. (Pharmacie.) Mot grec par lequel les anciens désignaient une sorte de liniment ou d'onguent, dont ils se servoient pour absorber la sueur, ou corriger l'odeur.

ALIPTA MOSCHATA. (Pharmacie.) Dénomination que l'on trouve dans un grand nombre de dispensaires, & qui *ai* ou signifie *mélange musqué*; cette dénomination est principalement employée pour désigner des trochisques dont Lemery donne la formule suivante.

Prenez ladanum très-pur... trois onces.
styrax calamite.... une once & demie.
benjoin..... une once.
bois d'aloes..... deux gros.
ambre gris..... un gros.
musc..... douze grains.

Toutes ces substances étant réduites en poudre fine, on les incorpore avec suffisante quantité de mucilage de gomme adragante préparé avec l'eau de rose, & on en forme des trochisques que l'on fait sécher à l'ombre, qu'il faut conserver dans un vase bien bouché. Quelques dispensaires faisoient entrer dans cette composition un demi-gros de camphre; mais beaucoup suppriment cette substance, à cause de son odeur forte & peu agréable.

Ces trochisques, ou pastilles, ont été, pendant quelque temps, un objet de mode, ils étoient estimés à cause de leur odeur; on les croyoit propres à fortifier le cerveau, à corriger l'altération de l'air, à prévenir la contagion des

Chimie, Tome II.

épidémies, aussi en recommandoit-on l'usage dans les temps de peste; on les portoit dans des boîtes comme préservatif & parfum; on en faisoit quelquefois des fumigations dans les appartemens, en les jetant sur de la braise allumée. Enfin, on les prescrivait pour l'usage intérieur depuis douze grains jusqu'à vingt-quatre; aujourd'hui cette préparation est entièrement abandonnée.

ALISIER COMMUN ou blanc. (Pharmacie.) *Crataegus aria*, (LINNÉ.) C'est un arbre de moyenne grandeur, qui peuple avantageusement nos forêts, & qui peut servir à former de petites avenues, à garnir les clairières des bois & des bosquets. Le dessous de ses feuilles est argenté, ce qui fait qu'au moindre vent, l'arbre paroît tout blanc; cet effet forme dans la forêt, ainsi que dans les plantations d'agrément, une variété pittoresque; les fleurs, qui viennent par bouquet, sont aussi un bel effet dans le printemps. Son bois est employé par les tourneurs, menuisiers, charpentiers & autres ouvriers; il est bon aussi pour le chauffage: son fruit est sans odeur, farineux, alimentaire; mais un peu venteux & amer. Linné a consacré un article en sa faveur dans sa *matière médicale*. Plenck, dans sa *Bromatologie*, conseille, dans les années de disette, de faire sécher les baies de l'alisier, de les pulvériser, pour en fabriquer du pain que les villageois mangent; l'on en retire dans le nord une espèce d'esprit ou d'alcool, & suivant Haller on en prépare une bonne bière. Les oiseaux sont avides de ce fruit.

(M. WILLEMET.)

ALISIER TORMINAL. (Pharmacie.) *Crataegus torminalis*, (LINNÉ.) Cet arbre, ainsi que le précédent, se trouve dans nos forêts, son bois peut également servir aux mêmes usages; son fruit qui se nomme *alisie*, se mange lorsqu'il est mol & en maturité; il se vend par bouquets en automne dans les marchés de la Toscane, en Allemagne, en Angleterre; il est astringent, propre pour arrêter le cours de ventre, & apaiser les tranchées qu'occasionne la dysenterie; de-là est venu une partie de sa dénomination; son suc qu'on fait épaisir en consistance de rob, pris à la dose de demi-once, est un excellent médicament contre les dévoiemens. Pour le rendre plus agréable, on ajoute du sucre, & on le fait réduire en forme d'écueuain un peu solide, l'on prépare avec la pulpe d'alisie & le sucre, une très-bonne conserve, que Crantz estime être un aliment sain, & Haller dit qu'il l'a vu remédier efficacement à une suppression de règles.

(M. WILLEMET.)

ALISIER COTONNEUX. (Pharmacie.) *Crataegus tomentosa*, (LINNÉ.) C'est un arbre indigène, à la Géorgie, à la Caroline, à la Virginie & à la Nouvelle-Angleterre; il donne de petites

T

pommes-rouges, douces, que les Américains font cuire avec du sucre; ils en préparent aussi un sirop pour les malades. (M. WILLEMET.)

ALISSON BOUCLIER. (*Pharmacie.*) *Alyssum calcicum.* (LINNÉ.) Les champs sablonneux nous offrent cette plante, à qui les anciens attribuoient la propriété de guérir l'hydrophobie & le hoquet; elle est, en outre, digestive, détensive & dessiccative: plusieurs botanistes modernes prétendent que l'alisson champêtre n'est qu'une variété de cette espèce; il faut recueillir cet alisson au printemps, lorsqu'il est en fleur, c'est une des premières plantes vernalles, elle est annuelle: les alissons, relativement à l'usage médical, sont tombés dans l'oubli, après avoir été en vogue chez les anciens, principalement contre la rage, d'où vient l'étymologie de leur nom.

(M. WILLEMET.)

ALISSON BLANCHETRE. (*Pharmacie.*) *Alyssum incanum.* (LINNÉ.) Quelques auteurs le regardent comme apéritif employé en infusion ou en décoction. Les chèvres & les moutons mangent cette plante que les chevaux ne touchent pas, sa fleur plaît aux abeilles: l'alkali volatil contenu dans l'alisson, fait qu'il convient, au rapport d'Adanson, pour guérir les morsures venimeuses; appliqué extérieurement, il est bon pour guérir les maladies de la peau, telles que la galle & la lepre. (M. WILLEMET.)

ALISSON DE MONTAGNE. (*Pharmacie.*) *Alyssum montanum.* (LINNÉ.) Cette plante donne la fleur d'un jaune charmant des les premiers beaux jours; elle peut orner les petits parterres, on estime qu'elle est anti-hydrophobique, apéritive, diaphoretique: il faut la recueillir au printemps, lorsqu'elle est fleurie. Boerhaave prétend que les alissons sont doués de propriétés si subites & si pénétrantes, qu'ils chassent les venins par les pores de la peau, comme un puissant diaphoretique.

(M. WILLEMET.)

ALKAEST ou **ALKAHEST.** Fit un menstrue ou dissolvant que les alchimistes disent être pur, au moyen duquel ils prétendent résoudre entièrement les corps en leur matière primitive, & produire d'autres effets extraordinaires & inexplicables. Voyez MENSTRUE DISSOLVANT, &c.

Paracelse & Vanhelmont, ces deux illustres adeptes, déclarent expressément qu'il y a dans la nature un certain fluide capable de réduire tous les corps sublunaires, soit homogènes, soit hétérogènes, en la matière primitive dont ils sont composés ou en une liqueur homogène & potable qui s'unit avec l'eau & les sucs du corps humain, & retient néanmoins ses vertus féminales, &c. qui, étant rommée avec elle-même se convertit par ce moyen en une eau pure & élémentaire, d'où, comme se le font imaginé ces

deux auteurs, elle réduiroit enfin toute chose en eau.

Le témoignage de Paracelse, appuyé de celui de Vanhelmont, qui procède, avec serment, qu'il possédait le secret de l'alkaest, a excité les chimistes & les alchimistes qui les ont suivis à chercher un si noble mensûre. Boyle en étoit si entêté, qu'il avoue franchement qu'il aimeroit mieux posséder l'alkaest que la pierre philosophale même.

En effet, il n'est pas difficile de concevoir que tous les corps peuvent venir originellement d'une matière primitive qui ait d'abord été sous une forme fluide. Ainsi la matière primitive de l'or n'est peut-être autre chose qu'une liqueur pesante qui, par sa nature ou par une forte attraction entre ses parties, acquiert ensuite une forme solide. En conséquence, il ne parait pas qu'il y ait rien d'absurde dans l'idée d'un étre ou matière universelle qui résout tous les corps en leur état primitif.

L'alkaest est un sujet qui a été traité par une infinité d'auteurs, tels que Pantaloon, l'hilacène, Tachénins, l'odovic, &c. Boerhaave dit qu'on en pourroit faire une bibliothèque. Veindensel, dans son traité de *secretis adeptorum*, rapporte toutes les opinions que l'on a eues sur cette matière.

Le terme d'alkaest ne se trouve dans aucune langue en particulier. Vanhelmont dit l'avoir remarqué premièrement dans Paracelse, comme un terme qui étoit inconnu avant cet auteur, le quel dans son II liv. de *viribus membrorum*, dit en parlant du foie, *est etiam alkaest liquor magnum hepatis conservandi & confortandi &c.* c'est-à-dire, il y a encore la liqueur alkaest qui est efficace pour conserver le foie, comme aussi pour guérir l'hydropisie & toutes les autres maladies qui proviennent des vices de ce viscère, &c.

C'est ce simple passage de Paracelse qui a excité les chimistes à chercher l'alkaest; car dans tous les ouvrages de cet auteur, il n'y a qu'un autre endroit où il en parle, & encore, il ne le fait qu'à d'une manière indirecte.

Où, comme il lui arrive souvent de transporter les lettres des mots, de se servir d'abréviations, & d'autres moyens de déguiser sa pensée, comme lorsqu'il écrit *matratz pour tartarum*, *matrin* pour *nitrum*, on croit qu'alkaest peut bien être aussi un mot déguisé. De-là, quelques-uns s'imaginent qu'il est formé d'*alkali* & *est*, & par conséquent, que c'est un tel alkali de terre volatile. Il semble que c'étoit l'opinion de Glauber, lequel avec un pareil menstrue, fit en effet des choses étonnantes sur des matières prises dans les trois genres des corps: savoir, animaux, végétaux & minéraux; cet alkaest de Glauber est le nitre qu'on a rendu alcalin, en le fixant avec le charbon.

D'autres prétendent qu'alkaest vient du mot allemand *alquei*, comme qui dirait entièrement.

spiritueux ou volatil, d'autres veulent qu'il soit pris de *faltzgeist*, c'est-à-dire, *esprit de sel*; car le menstrue universel doit être, à ce qu'on prétend, de l'eau; & Paracelse, lui-même, appelle le sel le centre de l'eau où les métaux doivent mourir.

En effet, l'esprit de sel étoit le grand menstrue dont il se servoit la plupart du temps. Le commentateur de Paracelse qui a donné une édition latine de ses œuvres à Delft, assure que l'alcaest est le mercure réduit en esprit. Zwelfer jureoit que c'étoit un esprit de vinaigre rectifié du verd-de-gris, & Starkey croyoit l'avoir découvert dans son foin.

On a employé, pour exprimer l'alcaest, quelques termes synonymes & plus significatifs. Vanhelmont le père, en parle sous le nom d'*ignis*, *aqua*, *fen*, *eau*; mais il semble, qu'en cet endroit, il entend la liqueur circulée de Paracelse, qu'il nomme *feu*, à cause de la propriété qu'elle a de consumer toutes choses, & *eau*, à cause de sa forme liquide. Le même auteur appelle l'alcaest *ignis gehennæ*, feu d'enfer, terme dont se sert aussi Paracelse; il le nomme aussi *summus*, & *sublimissimum omnium salum*, « le plus excellent » & le plus heureux de tous les sels, qui, ayant acquis le plus haut degré de simplicité, de pureté & de subtilité, joint seul de la faculté de n'être point altéré ni affoibli par les sujets sur lesquels il agit, & de dissoudre les corps les plus intractables & les plus rebelles, comme les cailloux, le verre & les pierres précieuses, la terre, le soufre & les métaux, &c., & d'en faire un véritable sel de même poids que le corps dissout, & cela avec la même facilité que l'eau chaude fait fondre la neige. Ce sel, continue Vanhelmont, étant plusieurs fois cohobé avec le *sal circulatum* de Paracelse, perd toute sa fixité, & à la fin, devient une eau insipide de même poids que le sel d'où elle a été produite ». Vanhelmont déclare expressément « que ce menstrue est entièrement une production de l'art & non de la nature, quoiqu'il ait, dit-il, puisse convertir en eau une partie homogène de la terre élémentaire; je ne cependant que la nature seule puisse faire la même chose, car aucun agent naturel ne peut changer un élément en un autre ». Et il donne cela comme une raison pourquoi les éléments demeurent toujours les mêmes. Une chose qui peut porter quelque jour dans cette matière, c'est d'observer que Vanhelmont, ainsi que Paracelse regardoit l'eau comme l'instrument universel de la chimie & de la philosophie naturelle; la terre comme la base invariable de toutes choses; le feu comme leur cause efficiente; que selon eux, les vertus féminales ont été placées dans le mécanisme de la terre; que l'eau, en dissolvant la terre, & fermentant avec elle comme elle fait par le moyen du feu, produit chaque chose; que

c'est-là l'origine des animaux, des végétaux & des minéraux; & que l'homme même fut ainsi créé au commencement, au récit de Moïse.

Le caractère essentiel de l'alcaest, comme nous l'avons observé, est de dissoudre & de changer tous les corps sublunaires, excepté l'eau seule: voici de quelle manière ces changemens arrivent suivant les auteurs cités.

1°. Le sujet exposé à l'opération de l'alcaest, est réduit en ses trois principes, qui sont le sel, le soufre & le mercure, ensuite en sel seulement, qui, alors devient volatil, & à la fin, est changé entièrement en eau insipide. La manière d'appliquer le corps qui doit être dissous, par exemple, l'or, le mercure, le sable & autres semblables, est de le toucher une fois ou deux avec le prétendu alcaest, & si ce menstrue est véritable, le corps sera converti en sel à poids égal.

2°. L'alcaest ne détruit pas les vertus féminales des corps qu'il dissout, ainsi en agissant sur l'or, il le réduit en sel d'or, il réduit l'antimoine en sel d'antimoine, le safran en sel de safran, &c. sels qui ont les mêmes vertus féminales & les mêmes propriétés que le concret dont ils sont formés.

Par *vertus féminales*, Vanhelmont entend les vertus qui dependent de la structure ou mécanisme d'un corps, & qui le continuent ce qu'il est. Par le moyen de l'alcaest on pourroit facilement avoir un or potable actuel & véritable, puisque l'alcaest change tout le corps de l'or en un sel qui conserve les vertus féminales de ce métal, & qui est en même temps soluble dans l'eau.

3°. Tout ce que dissout l'alcaest peut être volatilisé par un feu de sable; & si après l'avoir volatilisé on distille l'alcaest, le corps qui reste est une eau pure & insipide, de même poids que le corps primitif, mais privée de ses vertus féminales. Par exemple, si l'on dissout de l'or par l'alcaest, le métal devient d'abord un sel qui est l'or potable; mais lorsqu'en donnant plus de feu on distille le menstrue, il ne reste qu'une pure eau élémentaire, d'où il paroît que l'eau simple est le dernier produit ou effet de l'alcaest.

4°. L'alcaest n'éprouve aucun changement ni diminution de force en dissolvant les corps sur lesquels il agit, c'est pourquoi il ne souffre aucune réaction de leur part, étant le seul menstrue inaltérable dans la nature.

5°. Il est incapable de mélange, c'est pourquoi il est exempt de fermentation & de putréfaction; en effet, il sort aussi pur du corps qu'il a dissous, que lorsqu'il y a été appliqué, & ne laisse aucune impureté.

On peut dire que l'alcaest est un être de raison, c'est-à-dire, un être imaginaire, si on lui attribue toutes les propriétés dont nous venons de parler d'après les alchimistes.

Cela ne doit pas dire que l'alcaest est les *alcaest*

volatilisés ou digérés par les huiles, puisqu' Vanhelmont lui-même dit que, si on ne peut pas atteindre à la préparation de l'alcaest, il faut volatiliser les alcalis ann que, par leur moyen, on puisse faire les dissolutions.

Telle est la manière dont l'auteur des articles de chimie dans l'ancienne encyclopédie a traité celui de l'alcaest; il a donné l'extrait de la doctrine des deux plus fameux adeptes connus, Paracelse & le Vanhelmont; mais il n'a pas assez insisté sur le ridicule & la fausseté des prétentions des alchimistes; on voit en lisant son article, qu'il n'avait pas autant besoin de s'élever contre l'obscurité qui règne dans leurs idées sur cet objet, puisque le fond de cet article même, quoiqu'écrit avec beaucoup plus de méthode que les ouvrages originaux où il est parlé de l'alcaest, ne présente que des idées vagues, & les incertitudes qui caractérisent tous les objets d'alchimie. Macquer, dans un article de quelques lignes consigné dans le dictionnaire de chimie, a jugé très-sagement cette affaire de l'alcaest. « Un pareil dissolvant, dit-il, n'existe point, ou bien il n'y a point de corps dans la nature qui ne puisse devenir un alcaest; car quoiqu'il y ait certaines substances que, jusqu'à présent on n'ait point pu combiner avec les autres, les découvertes qui se font de jour en jour en chimie, au sujet de ces sortes d'unions qu'on avoit crues impossibles, semblent prouver, qu'avec des manipulations, & dans des circonstances convenables, on peut combiner une substance quelconque avec toutes les autres, c'est-à-dire, dissoudre tous les corps par un seul pris à volonté ». On conçoit bien par ce raisonnement, que la dernière assertion de Macquer est exacte, puisque tous les corps ont certainement les uns pour les autres un degré d'attraction, une affinité quelconque; l'expérience a prouvé cependant qu'il y a certaines substances qu'il a été jusqu'actuellement impossible de combiner avec quelques autres.

Peut-être pourroit-on regarder le calorique comme un alcaest, puisqu'il n'est pas permis de douter, qu'introduit en assez grande quantité dans les corps les plus réfractaires, il ne finisse par les fondre, & puisque la fusion est une véritable dissolution. Mais ce n'est pas ainsi que les adeptes ont considéré l'action de l'alcaest, ils ne l'ont pas présentée comme un simple dissolvant; ils le croyoient capable d'altérer la nature de tous les corps, & de les réduire à un seul état, tandis que lui même devoit être immuable, & c'est en cela que consiste leur folie.

ALKAEST DE RESPOUR. Chaque alchimiste, chaque adepte avoit son alcaest, & s'il falloit insister sur toutes les espèces ou tous les degrés de cette folie, on trouveroit un grand nombre de détails inutiles dans ce dictionnaire; la plupart

des procédés des alcaests sont obscurs & intelligibles, comme ceux de l'alchimie ou de la pierre philosophale, auxquels ils sont nécessairement liés. Respour n'a point mis une pareille obscurité dans son alcaest. Hellot rapporte que ce chimiste attribuoit à la dissolution du nitre fixé par le zinc, ou de la potasse tenant de l'oxide de zinc, la propriété de dissoudre tous les métaux & même de tous les corps; en un mot, que cette dissolution étoit l'alcaest de ce chimiste. Cette prétention se rapproche, comme on voit, de l'idée de quelques chimistes, qui pensent que l'alcaest est formé par les alcalis caustiques; mais on apprécie bientôt le peu de fondement d'une pareille prétention. Glauber regardoit comme un alcaest, le nitre fixé, tandis que Zwelfer vouloit que cette prérogative fût accordée seulement à l'acide acétique ou vinaigre radical, retiré de la distillation du verd-de-gris.

ALKAEST DE VANHELONT. C'est à Vanhelmont qu'on rapporte le plus ordinairement la gloire d'avoir possédé un alcaest, & il en parle en effet dans plusieurs endroits de ses ouvrages; mais il n'expose nulle part la manière de le préparer, ni la nature d'une manière assez claire, pour qu'on puisse savoir de quoi il a voulu parler. Les notions de l'alcaest de Vanhelmont ont d'ailleurs été assez discutées dans l'article général **ALKAEST**, pour qu'il soit inutile d'y revenir ici.

ALKAFIAL. (*Pharmacie.*) Expression employée par quelques écrivains arabites pour désigner l'antimoine.

ALKAHOL ou **ALCOOL.** (*Pharmacie.*) Voyez ce dernier mot.

ALKALAC, ALKALAT. (*Pharmacie.*) Différentes dénominations employées par les arabites & les alchimistes, pour désigner le sel commun, ou muriate de soude, ou quelquefois une autre substance saline.

ALKALE. (*Pharmacie.*) Expression des arabites pour désigner l'huile ou la graisse de poule, suivant Johnson.

ALKANTUM. (*Pharmacie.*) Ce mot, dit Johnson, signifie le cuivre brûlé, ou suivant quelques autres, une espèce aromatique, ou l'arsenic.

ALKARANUM ou **DUENEC VIRIDE.** (*Pharmacie.*) Les alchimistes désignoient par ces dénominations barbares le sulfate de fer.

ALKANT ou **ALMARKASITA, ALOZET.** (*Pharmacie.*) Expressions des arabites pour désigner le mercure.

ALKEKENGE, ou comme l'écrivent quelques

**anciens ALKAKENG, ALCHERENG ou ALQUE-
QUENG.** (*Pharmacie*) Dénomination arabe égale-
ment adoptée par les botanistes & les pharmaciens,
pour désigner une plante que les Grecs nommoient
halicacabos ou *physalis*. Les latins ont rendu cette
dernière expression par le mot *vesicaria*, plante
à vessie, soit parce que le fruit de cette plante
est enfoncée dans une sorte de vessie membra-
neuse & pleine d'air, soit parce que, comme le
dit *Pline*, cette plante a une grande efficacité
contre le calcul & les maladies de la vessie.

On connoît plusieurs especes de cette plante ;
la plus connue & la plus employée dans nos phar-
macies est le *physalis alkekengi* de Linnéus, &
vulgairement *coquerelle* ou *coqueret* des François.

Cette plante croît naturellement dans la plus
grande partie de l'Europe, on la trouve sur-tout
très-fréquemment dans nos haies, dans nos vignes ;
elle porte pour fruit une baie de la grosseur d'une
cerise, enfoncée dans une large vessie membra-
neuse, formée par l'expansion de son calice ; cette
baie, molle, pulpeuse, fucculente, d'une belle
couleur rouge lorsqu'elle est mûre, contient plu-
sieurs semences ovales & applaties dans leur ma-
turiété ; lorsqu'elles sont fraîches, ces baies ont
une saveur douceâtre, aigrelette, qui n'est point
désagréable ; aussi en Suisse, en Espagne, voit-on
plusieurs personnes en manger avec plaisir ; mais
il faut avoir l'attention de ne pas toucher au
calice, car il est amer, & de ne pas écraser
les semences sous la dent, car elles sont un peu
âcres & amères ; la saveur de ces baies dimi-
nue par la dessiccation, & leur décoction dans
l'eau, fournit une couleur citronnée qui n'est
point altérée par l'addition d'une solution de sul-
fate de fer.

Les anciens attribuoient à l'alkenge un grand
nombre de propriétés médicinales. Les feuilles
étoient employées en forme de cataplasme, comme
un topique anodin & calmant ; l'écorce passoit
pour vulnéraire, mondificatif ; les racines étoient
astringentes & les semences étoient regardées
comme un tonique, mais les baies sur-tout étoient
recommandées comme un diurétique rafraîchis-
sant & très-efficace contre l'embaras, le calcul
des reins & les maladies des voies urinaires ;
quelques-uns les vantoient également contre l'hy-
dropisie, la jaunisse, le crachement de sang,
le rhumatisme, & même contre la goutte : aussi
les baies d'alkenge ont-elles été employées de mille
manières différentes ; les uns en tiroient le suc
par expression, qu'ils donnoient à la dose d'une
once ou deux, d'autres prescrivoient l'infusion
ou la décoction, qui se préparoit tantôt dans du
vin blanc, tantôt dans du petit-lait, dans de l'eau
commune, ou dans une eau distillée ; quelques-
uns recommandoient de faire infuser les baies
dans du vin en fermentation ; plusieurs après avoir
déchiffé les baies, les réduisoient en une poudre
fine qu'ils mêloient dans des potions, ou qu'ils

donnoient sous forme de bol ; d'autres faisoient
épaissir en forme d'extrait le suc exprimé des baies ;
par la distillation, ils tiroient de toute la plante
une eau qu'ils faisoient entrer dans les potions,
& par l'incinération ils en retiroient un sel alcali,
dont ils vantoient les vertus diurétiques. Outre
ces préparations simples, nous en trouvons dans
les pharmacographes un grand nombre d'autres plus
composées, ainsi Acec, l'auteur d'Egine, Méfue, &c.
nous donnent la formule de différentes especes
de *posittles*, *trochisques*, *psittes*, *filates*, *écouilles* d'al-
kekengi, préparations qui, dans ces écrivains, &
dans beaucoup d'autres qui les ont suivis, sont géné-
ralement désignées sous les noms de *diaphysalidon*.
Nous remarquons à ce sujet que cette déno-
mination grecque qui signifie préparation avec le
physalis, se trouve singulièrement altérée dans
le plus grand nombre des écrits des Arabes &
de leur copistes. Ainsi, par corruption du mot
grec *diaphysalidon*, Avicenne nomme les tro-
chisques d'alkenge, *diysalidi* & *diysalidi* ; Sérapion
sous le nom de *aisculinditi* & Halyabbas les ap-
pelle *apsoliditi*. Jean Langius, dans la descrip-
tion de ses remèdes secrets, donne la formule
d'un *srop d'alkenge*, composé, dont il vante
l'efficacité pour entraîner les calculs, & dissi-
per les affections du foie. Jean Faber, dans son
myrotechium, *spargarium*, décrit une *quinquiescence*
d'alkenge qui, suivant lui, est un remède ad-
mirable contre la jaunisse & toutes les maladies
des reins & des voies urinaires.

Horstius, dans ses ouvrages, Hoffer, dans son
hercules medicus, Causser, dans les éphémérides
des curieux de la nature, donnent les formules
de différentes liqueurs dont les baies d'alkenge
sont la base, & qu'ils disent avoir éprouvées contre
le calcul des reins. Le plus grand nombre de
nos dispensaires modernes conservent encore la
formule des trochisques d'alkenge, & quelques
praticiens, par habitude sans doute, par imitation
des anciens, les prescrivent encore dans quel-
ques cas.

Ces trochisques sont composés de la manière
suivante :

Prenez. Pulpe de fruits d'alkenge.. deux onces.

Gomme arabique.
— adragante.
Extrait de réglisse.
Amandes écorcées.
Semences de pavot blanc amères,
de chacun..... quatre gros.
Semence d'ache.
Succin préparé, de chacun, deux gros.
Opium..... un gros.
Sucs des feuilles d'alkenge,
quantité suffisante.

» On pile dans un mortier de marbre des fruits

récents d'alkenge avec leur graine ; on en tire la pulpe par le moyen d'un tamis ; on pile ensemble les semences de pavot blanc, d'ache, & les amandes amères, pour en former une pâte ; on la mêle avec la pulpe précédente ; on ajoute les autres substances réduites en poudre ; on forme du tout une masse, en ajoutant du suc d'alkenge non dépuré & nouvellement exprimé ; on divise la masse par petites portions afin qu'elle se sèche, alors on la réduit en poudre fine ; on la passe au travers d'un tamis de soie ; on humecte la poudre avec une suffisante quantité d'eau ; on forme une pâte solide en la pilant dans un mortier de fer, & on la divise par petits trochisques en pyramides triangulaires ; on les fait sécher, & on les conserve pour l'usage.

« Les semences d'alkenge, de pavot blanc & d'ache ne se réduisent pas en poudre suffisamment fine, c'est pour cette raison que nous recommandons de pulvériser la masse après qu'elle est sèche, afin de diviser de nouveau les parties trop grossières, & de mêler les substances très-exactement ; cela est d'autant plus nécessaire, que ces trochisques sont souvent employées dans les potions magistrales, & qu'elles contiendraient des parties qui dégouteroient les malades ».

La description de la préparation des trochisques d'alkenge est un peu différente de celle décrite par Mélius. Le plus grand nombre des pharmacographes ont fait des changemens dans cette formule, celle que nous rapportons est tirée du code de Paris ; quelques médecins ont supprimé l'opium de cette composition, Lémery voudrait qu'on en retranchât les amandes & les semences de pavot qui sont des matières huileuses, & empêchent que la masse prenne exactement la liaison qu'elle doit avoir, & il donne une autre formule pour la composition de ces trochisques dans lesquels il ne craint pas de faire entrer l'acétate de plomb, on se le sature.

Mêlé tant d'éloges accordés aux baies d'alkenge, il nous parait qu'elles ne peuvent avoir que les propriétés des fruits muqueux & acides, & ces propriétés sont nécessairement très-légères, puisqu'il est des pays où l'on mange les fruits d'alkenge, puisque l'on s'en sert ordinairement dans nos campagnes pour colorer le beurre ; si, dans plusieurs cas de dysurie, de calcul des reins, de douleurs à la vessie, les trochisques d'alkenge ont procuré du soulagement, c'est à l'opium que les effets doivent être attribués, & non à l'alkenge, qui y est en trop petite quantité pour produire un effet sensible ; il en est de même des différentes liqueurs ou préparations recommandées par les anciens, c'est toujours à l'addition de quelques substances actives qu'il faut attribuer l'effet du remède.

Les baies d'alkenge entrent encore dans quelques espèces de sirops ; mais suivant nous, elles doivent être uniquement réservées pour prépa-

rer des tisanes ou décoctions. On doit ramasser ces baies dans les mois d'octobre & novembre, & pour les conserver, il faut les faire sécher avec le péricarpe au-dessus d'un four à une chaleur modérée ; lorsqu'elles sont parfaitement sèches, on les enferme dans une boîte, & il faut les renouveler tous les ans.

Il est d'autres espèces d'alkenge qui peuvent être employées en pharmacie ; pour les faire connaître, nous rapporterons les articles suivans qui nous ont été fournis par M. Willmet, démonstrateur de botanique à Nancy.

ALKEKENGÉ OU COQUERET DE VIRGINIE. (*Pharmacie.*) *Physalis purascens.* (LINNÉ.) Cette plante de la Virginie, à son fruit de la grosseur d'une noix, vert d'abord, & se joint en mûrissant ; il a les mêmes propriétés que les baies d'alkenge ordinaire, c'est un diurétique par excellence. La décoction de ses feuilles est anodine, l'on s'en sert à laver les jambes ; on trouve ce coqueret dans quelques jardins botaniques.

ALKEKENGÉ VISQUEUSE. (*Pharmacie.*) *Physalis viscosa.* (LINNÉ.) Cette plante également de Virginie, & qui se trouve aussi à Rhode-Island, d'une odeur nauséabonde, est employée dans l'Amérique septentrionale comme diurétique, c'est toujours son fruit qui a cette propriété : les enfans en mangent.

ALKEKENGÉ, OU CERISE DE MAHON. (*Pharmacie.*) *Physalis tomentosa.* (MEDIC.) Cette nouvelle espèce n'est point décrite par les botanistes, sinon par M. Medicus, directeur du jardin électoral des plantes de Mannheim, & savant botaniste, dans les mémoires de l'académie palatine ; on la croit originaire de l'île de Minorque. Il faut l'ensemencer sur couches, ensuite la repiquer ou la mettre en pot ; on peut la conserver deux ans, en l'abritant l'hiver ; sa culture n'est pas difficile. Cette alkengé a ses feuilles duveteuses, un peu anguleuses ; ses tiges ressemblent à celles de la pomme-de-terre, sa fleur est jaunâtre ; son fruit d'un rouge jaunâtre, est sigrelet, agréable à manger & recherché des riches : on le sert au dessert sur les tables.

ALKERMÈS, & quelquefois ALKERMES. (*Pharmacie.*) Mot arabe adopté par tous les pharmacographes, & conservé de nos jours, pour désigner une confection décrite par J. Mélius, & dont la base est le suc d'une espèce d'insecte connu sous le nom de kermès, ou vulgairement graine d'ecarlante.

On trouve encore dans nos pharmacies un sirop d'alkermès ; quelques anciens décrivent aussi un *Majjistra d'alkermès*, un *electuaire d'alkermès*, &c. Nous renvoyons l'exposition de toutes les pré-

parations de leur usage & de leurs propriétés au mot KERNES.

ALKIN. (*Pharmacie.*) Mot employé par quelques écrivains arabites, & par lequel ils désignent tantôt la suie, tantôt le charbon, & d'autres fois les cendres gravelées. (Voyez POTASSE.)

ALKINDES ou CONDISI. (*Pharmacie.*) Mots employés par quelques écrivains arabites, pour désigner l'espèce de plante que les Grecs nommoient *Struthion*, & que nous connoissons sous le nom de *Japonaire*.

ALKOOL. L'esprit-de-vin le plus rectifié, le plus sec, ayant été nommé ainsi il y a longtemps, nous avons adopté ce nom très-préférable à celui d'esprit-de-vin; nous avons seulement changé son orthographe en celle d'alcool. (Voyez ce mot.)

ALKOOL. Ce mot a été souvent employé dans les arts chimiques, & sur-tout dans la pharmacie, pour indiquer une poussière très-fine; on disoit autrefois pulvériser en alkool, ou alcooliser telle ou telle substance; à cette expression arabe, a surchargé celle de *porphyriser*, parce que c'est à l'aide d'un porphyre que l'on parvient à réduire les matières dures en une poudre extrêmement fine. On doit abandonner entièrement le mot alkool, synonyme de poussière très-fine, non-seulement parce qu'on ne l'emploie plus, mais sur-tout parce qu'il peut être confondu avec le mot alcool qui appartient au produit de la fermentation vineuse, autrefois connu sous le nom d'esprit-de-vin.

ALKOSOR. (*Pharmacie.*) Expression qui se trouve dans quelques écrivains arabites, & par laquelle ils désignent le camphre.

ALLELUIA. (*Pharmacie.*) Expression hébraïque consacrée d'abord à quelques cérémonies religieuses, & presqu'généralement adoptée par les écrivains françois & les pharmacographes, pour désigner une espèce de plante, à cause, dit Lemery & quelques autres lexicographes, qu'elle fleurit ordinairement vers le temps de pâques, lorsqu'on chante par-tout *alleluia*.

Cette plante, que Linnéus désigne plus convenablement sous le nom d'*Altilis acetosella*, est encore nommée par plusieurs botanistes françois, *oxalide*; elle fournit en pharmacie quelques préparations utiles & efficaces; en en retire sur-tout un sel semblable à celui que l'on débite dans le commerce, sous le nom de *sel d'oseille*, mais que, d'après ses principes constituans, on nomme aujourd'hui *oxalate acide de potasse*; & comme il importe de supprimer, de réformer toutes déno-

minations insignifiantes, absurdes & métaphoriques que l'ignorance & le préjugé ont introduites dans les sciences; comme il importe, pour les progrès de la pharmacie d'y adapter l'ordre & les principes de la nomenclature méthodique de la chimie, nous désignerons la plante dont il s'agit sous le nom d'*oxalide*. Nous renvoyons à ce mot l'exposition des différentes préparations que l'on fait en pharmacie de leurs usages & de leurs propriétés, tant pour la médecine que pour les arts. (Voyez OXALIDE & ACIDE OXALIQUE.)

ALLENEC ou ALNEC. (*Pharmacie.*) Dénomination des arabites pour désigner l'échin. (RULAND JOHNSON.)

ALLIACE, ALLIACÉE. (*Pharmacie.*) Ces dénominations sont adoptées par un grand nombre d'écrivains modernes, pour désigner les substances qui ont l'odeur & la saveur de l'ail; ainsi les botanistes distinguent une famille de plantes qu'ils nomment *alliées*, telles sont l'ail, l'oignon, le poireau. Les pharmaciens emploient également ces expressions pour désigner l'odeur, la saveur de quelques substances médicamenteuses; ainsi l'*assa-fœtida* a une odeur alliée; l'arsenic projeté sur des charbons ardens répand une odeur alliée; la plante que l'on nomme *velar alliaire*; a, lorsqu'elle est fraîche, une saveur alliée. On trouve aussi dans nos dispensaires plusieurs préparations alliées, telles que le sirop d'ail de l'ancienne pharmacopée de Londres, l'elixir allié de la pharmacopée de Bruxelles. (M. WILLEMET.)

ALLIACÉE. (odeur) Tout le monde connoît l'odeur forte & fétide qu'exhale l'ail; on retrouve cette espèce d'odeur, dans plusieurs végétaux ou matières végétales, qu'on désigne d'après cela par le nom de plantes ou matières végétales alliées; & telles que l'alliaire, *erysimum alliarum*, le scordium, *tenerium scordium*, une espèce de thlaspi; *thlaspi alliaceum*; l'assa-fœtida, le galbanum, le sagapanum, l'opopanax, la gomme ammoniacque, la bdellium, &c. Si la nature seule offroit des corps caractérisés par l'odeur d'ail, on pourroit penser qu'elle dépend uniquement d'une composition générale analogue; qu'elle est un des produits du travail de la végétation; elle n'auroit alors un véritable intérêt que pour les médecins qui voyent dans cette analogie d'odeur, une analogie de principes & de vertus. Elle ne pourroit d'ailleurs occuper encore les chimistes qui n'ont pas de moyens pour déterminer la nature & la différence des principes odorans (Voyez AROMA). Mais les considérations sur l'odeur alliée ont un rapport immédiat avec la chimie, en raison de la production fréquente de cette odeur dans plusieurs combinaisons qu'il est important de rapprocher ici. Le

soufre dans ses unions avec les terres alcalines, & les alcalis, dans la combustion lente opérée par l'eau & par l'air, lorsqu'il est en contact avec plusieurs métaux, & sur-tout avec le fer & le cuivre, en un mot dans un grand nombre de phénomènes où il se dégage du gaz hydrogène qui emporte un peu de soufre en dissolution, répand souvent une odeur manifestement alliée. C'est sur-tout lorsqu'on le triture à froid, soit seul, soit dans les composés métalliques, l'antimoine, &c. avec un alcali bien caustique & bien pur, que cette odeur fétide d'ail se développe avec énergie. A la vérité cette odeur, en même-temps qu'elle tient de celle de l'ail, est mêlée d'une fétidité que n'a point cette plante. Le phosphore & tous les composés phosphorés, sur-tout le gaz hydrogène phosphoré répand également une odeur d'ail très-manifeste; les verres d'acide phosphorique opaques, acides & semblables à des frites d'émail, tels qu'on les obtient souvent en les traitant dans des creusets de terre poreuse, exhalent aussi une odeur analogue. Enfin l'arsenic en brûlant, les oxides d'arsenic chauffés & sublimés, & la plupart des composés arsenicaux réduits en vapeurs, sont tellement remarquables par l'odeur d'ail qui s'en dégage, qu'on a donné cette odeur comme un de leurs caractères distinctifs. Nous n'invoquerons pas ici une prétendue analogie de nature ou de principe entre le soufre, le phosphore & l'arsenic, comme on faisoit autrefois en physique, & nous ne raisonnerons pas longuement sur une hypothèse dénuée d'expériences; mais il suffira de faire remarquer avec soin ce rapport dans l'odeur, pour indiquer, non pas une identité de principes ou méconnue ou supposée gratuitement, mais la nécessité de s'occuper de ces rapprochemens, de ne négliger aucun des phénomènes qui les présentent, & de les lier comme des espèces de pierre d'attente. Ces faits, qui pourront quelque jour être employés à un nouvel édifice théorique, déjà même quelques expériences modernes sur les plantes, dont l'odeur alliée est un des caractères, semblent annoncer que cette odeur est au moins en partie due à du soufre qui entre dans leur composition intime, & dont on peut présumer ainsi une analogie entre cette odeur alliée végétale, & celle qui, dans les minéraux, est manifestement produite par des combinaisons sulfureuses très-atténuées; mais rien ne montre encore un rapprochement entre le soufre & le phosphore ou l'arsenic, dont les molécules réduites en vapeurs, portent dans l'atmosphère une odeur d'ail encore plus forte que celle des composés sulfureux.

ALLIAGE. Voici un de ces mots qui, dans un dictionnaire, peuvent être traités de deux manières très-différentes, ou très-brièvement & simplement comme une définition, ou très-longuement,

avec tous les détails qui peuvent lui appartenir dans l'ensemble de toutes les expériences chimiques. La première méthode auroit peut-être plus d'avantage encore que la seconde; car suivie celle-ci dans toute sa latitude, ce seroit se jeter dans une mer de détails qui ne laisseroient aucun repos à l'esprit du lecteur. Cependant, d'un autre côté, si l'on se tenfermoit dans une simple définition, on n'apprendroit rien à celui qui cherche à s'instruire, & l'on manqueroit l'occasion de faire connoître quelques propriétés générales, & plusieurs axiomes de chimie qui pourroient être ou trop négligés ou même entièrement oubliés dans les différens articles qui ont du rapport avec celui-ci, & l'on fait que dans un ouvrage, où l'on a pour but de rassembler tous les faits d'une science, il vaut encore mieux risquer de présenter des redites, que de s'exposer à des omissions nuisibles & impardonnables. Pour éviter l'un & l'autre écueil dont il vient d'être fait mention, j'ai cru devoir consigner ici un aperçu méthodique de l'histoire des alliages. L'article du dictionnaire de Macquer m'a pour-ainsi-dire servi de texte principal; mais j'y ai ajouté & des faits plus nombreux que ceux qu'il contenoit, & des applications plus multipliées aux arts que l'histoire des alliages intéresse, & sur-tout j'y ai fait des changemens relatifs à l'état actuel de la théorie de la chimie, de telle sorte qu'on pourra regarder cet article, comme absolument différent de ce qu'il étoit dans le dictionnaire de Macquer.

Le nom d'alliage employé en chimie, en métallurgie & dans tous les arts chimiques, désigne l'union des différentes matières métalliques les unes avec les autres, & en nombre ainsi qu'en proportions différentes.

Comme il peut résulter une infinité de combinaisons différentes, suivant la nature, le nombre & les proportions des matières métalliques qui sont susceptibles de s'allier, on n'entrera point ici dans le détail de tous les alliages particuliers qui ne sont pas même encore tous connus, à beaucoup près. On trouvera ceux qui sont en usage, comme airin, bronze, métal de clochers, or de Mannheim, or gris, or rouge, or vert, tombac, cuivre jaune, similor, cuivre ou tombac blanc, pontin, soudure, penchebets; laiton, &c. &c. sous leurs dénominations particulières; & ce que l'on connoit des autres, en partie aux articles & sous les noms des différens métaux, & en partie dans ce présent article.

Il faut d'abord remarquer que les substances métalliques ne peuvent contracter aucune union directe avec les matières terreuses, pas même avec leurs propres oxides qu'on a regardés autrefois comme des terres, lorsqu'ils sont privés des propriétés métalliques; c'est ainsi que les métaux qui sont oxides à leurs surfaces, présentent une séparation entre la portion oxidée & la por-

tion métallique, mais on peut dire, qu'en général, tous les métaux sont susceptibles de s'allier les uns avec les autres, quoiqu'avec plus ou moins de facilité, & quoiqu'il y en ait aussi quelques-uns qu'on n'ait pas encore pu, jusqu'à présent, unir ensemble, ou au moins qu'on n'a encore alliés qu'en très-petite quantité, & très-difficilement.

Une seconde remarque simple, mais qui conduit très-loin dans la pratique des alliages, c'est qu'on peut faire singulièrement varier le nombre des métaux alliés depuis deux jusqu'à cinq, six, & même davantage; ainsi il y a des alliages de deux métaux, de trois, de quatre, de cinq, de six, & même d'un plus grand nombre; cependant il est rare qu'on fasse des alliages aussi compliqués pour le besoin des arts; les alliages les plus composés le sont de trois ou quatre métaux.

La proportion de chaque métal qui entre dans les alliages, peut varier singulièrement, & varie en effet suivant les propriétés qu'on veut leur donner, & les usages auxquels on les destine. On conçoit que le nombre des alliages est prodigieux quand on les considère sous ce point de vue, car on connoît aujourd'hui seize matières métalliques différentes les unes des autres; mais il est bon d'observer que, dans les alliages connus & employés, il y a toujours un métal plus abondant que les autres, & qui en fait en quelque sorte la base; le plus souvent c'est le cuivre, le plomb ou l'étain, quelquefois c'est l'or ou l'argent, ou même le platine, dont on commence à faire des applications utiles à différents arts.

Avant d'aller plus loin dans l'exposé général des propriétés des alliages, je dois avertir que si l'on veut en tirer un parti utile, il est indispensable d'étudier préliminairement les propriétés générales des matières métalliques, & même celles des principaux métaux usités dans les alliages; ainsi on doit lire les articles MÉTAUX, CUIVRE, PLOMB, ÉTAIN, OR, ARGENT, &c.

Comme les métaux sont des corps naturellement solides, la première condition nécessaire pour leur union, est qu'ils soient en fusion; ils s'unissent alors comme tous les corps qui se dissolvent réciproquement, & il résulte de ces combinaisons de nouveaux composés qui ont des propriétés nouvelles & très-rarement mixtes des substances composantes. La chaleur, la fonte dans des creusets, est donc le procédé qu'on emploie pour faire les alliages; on mêle ou l'on brasse bien les métaux fondus pour favoriser leur union. Sans cette précaution, les métaux se séparent plus ou moins, ou forment des couches d'alliages différents dans leurs proportions; souvent sans cette agitation, les métaux se placent dans l'ordre de leur pesanteur spécifique.

Quoique les alliages conservent en général les propriétés générales des matières métalliques, on observe toujours que quelques-unes des propriétés des métaux qui forment un alliage, sont altérées

ou diminuées ou modifiées par cette union même. La ductilité, par exemple, d'un métal composé de deux ou plusieurs autres métaux, est communément moindre que celle des mêmes métaux lorsqu'ils sont seuls & parfaitement purs. La densité ou la pesanteur spécifique des métaux change aussi dans leurs alliages, quelquefois la pesanteur du métal mixte est moyenne entre celles des métaux qui la composent, le plus souvent ou elle est moindre ou elle est plus grande, cela dépend de la nature des métaux, & indique qu'ils éprouvent plus ou moins de pénétration réciproque, & des changements de forme ou d'arrangement entre leurs molécules.

On peut dire aussi la même chose de la couleur des substances métalliques alliées les unes avec les autres, quoiqu'en général, elle varie d'autant plus, que la couleur des métaux alliés est plus différente; & quoiqu'on puisse, d'après cela prévoir, quelle sera la nature des alliages suivant la nature & la proportion des métaux qui doivent y entrer, il est cependant plusieurs cas dans lesquels l'alliage prend une couleur qu'on n'aurait pas pu prévoir dans les expériences préliminaires; par exemple l'or perd entièrement sa couleur jaune par une partie & demie d'argent, moitié d'argent lui donne un coup-d'œil verdâtre; le cuivre prend avec l'antimoine une couleur violette très-brillante, le manganèse rend singulièrement altérables par l'air toutes les combinaisons métalliques dont il fait partie.

Les chimistes modernes ont observé que plusieurs alliages sont beaucoup plus oxydables, que les métaux qui les forment ne le sont dans leur état d'isolement. On a même cru que c'étoit un moyen d'oxyder les métaux qui n'en sont que peu ou point susceptibles dans leur état de pureté. Cet effet est dû à la division de leurs molécules & à la diminution d'attraction pour elles-mêmes qu'elles éprouvent en se combinant avec les molécules d'autres métaux.

Les alliages des métaux sont ou naturels ou artificiels. Les premiers sont ceux qui sont faits par la nature, tels que le sont la plupart des minéraux qui contiennent tous plusieurs métaux alliés les uns avec les autres: l'or natif qui est toujours plus ou moins allié d'argent; l'argent natif qui contient aussi plus ou moins d'or; ces deux métaux qui, ensemble ou séparément, sont alliés par la nature avec le cuivre; le fer avec l'arsenic, le manganèse, le zinc; l'antimoine avec l'arsenic, le plomb avec l'argent, le bismuth avec l'arsenic, &c.

Les alliages artificiels sont ceux qu'on fait exprès de plusieurs métaux les uns avec les autres pour différents usages, ou pour examiner leurs propriétés dans ces nouvelles combinaisons.

Quoique les alliages des différentes matières métalliques les unes avec les autres soient d'une très-grande importance, tant pour la théorie que

pour la pratique de la chimie & des arts chimiques, il ne parait pas qu'on ait fait encore sur cet objet toutes les recherches dont il est susceptible, & qu'il mérite. Il arrive tous les jours dans les laboratoires de chimie où l'on démontre les éléments de cette science, dans des cours où l'on réunit la pratique à la théorie, qu'on fait des alliages nouveaux & inconnus dans les arts. Les livres de chimie font pleins de descriptions d'alliages pareils, dont on n'a encore fait que peu ou point d'usage dans les arts. Il seroit fort à désirer qu'on entreprit une suite de recherches sur ce point; elles pourroient toutes éclairer les arts. Gellert est un des chimistes qui s'en font le plus occupés: on trouve dans la chimie métallurgique, un très-grand nombre d'expériences qu'on va rapporter ici sommairement; celles de ces expériences qui ont été faites pour les alliages des métaux cassans avec les métaux ductiles, sont de Gellert lui-même; il les a vu entreprendre pour déterminer ce qui concerne la densité ou la pesanteur spécifique de ces alliages. Il a tiré les autres, déjà connues en partie, des ouvrages des chimistes qui en avoient fait mention; mais sur-tout d'une dissertation particulière de Kraft sur cet objet. (*Voyez* la chimie métallurgique de Gellert.) On ne passera point ici des alliages du mercure avec les autres matières métalliques, ces alliages portent le nom particulier d'*amalgame*, il en sera question sous ce mot.

L'or s'unit facilement avec l'argent, & en toutes proportions. Gellert dit que l'alliage de ces deux métaux s'accorde assez pour l'ordinaire avec les règles de proportions de l'alliage, & que la pesanteur spécifique n'est augmentée que de très-peu de chose. Cet alliage est peu d'usage dans les arts, mais il l'a été dans les monnoies; comme les métaux purs sont toujours plus ductiles que les métaux alliés dans les arts où l'on a besoin de toute la ductilité de ces métaux, comme dans ceux du tireur & du batteur d'or, on choisit toujours l'or & l'argent les plus purs. Il est cependant d'usage d'allier l'or avec la moitié à-peu-près de son poids d'argent, pour faire l'or vert qui s'emploie dans les bijoux.

L'argent s'allie facilement & en toutes proportions avec le cuivre; ce dernier métal s'unit de même avec l'or. Gellert remarque que l'alliage de l'argent avec le cuivre est d'une pesanteur spécifique plus grande que les proportions de l'alliage ne semblent l'indiquer; mais qu'au contraire, celui de l'or avec le cuivre est d'une pesanteur spécifique moindre que celle donnée par le calcul. Le cuivre rend l'or & l'argent plus durs & plus sonores, sans cependant diminuer beaucoup leur ductilité; il a la même propriété remarquable de rendre ces deux métaux moins susceptibles de la perdre par la vapeur du charbon, ce à quoi ils sont très-sujets dans leur état de pureté: le cuivre rehausse aussi la couleur de l'or. Les propriétés du cuivre relativement à l'or

& à l'argent, tendent son alliage avec ces métaux d'un très-grand usage dans l'orfèvrerie, parce qu'il donne aux ouvrages qu'on en fait plus de fermeté & de facilité pour être travaillés, & dans la monnaie, pour la même raison; cette portion de cuivre introduite dans les monnoies d'or & d'argent sert de plus à payer les frais de la fabrication de la monnaie. La quantité de cuivre que l'on allie avec l'or & avec l'argent pour ces différents usages, varie suivant les différents pays; mais elle est ou doit être déterminée, fixe & constante dans chaque pays; c'est donc à la loi à déterminer le titre de l'alliage que doivent avoir les métaux précieux. On décrira ailleurs les moyens de reconnoître la quantité de ces alliages. On se contentera de dire ici que lorsque les proportions indiquées par la loi, existent dans les alliages d'or & d'argent, la quantité de cuivre contenu dans ces métaux précieux, n'altère que très-peu leurs propriétés, & ne les rend point sujets aux inconvénients que présente le cuivre seul. Il y a des nations qui permettent une trop grande quantité de cuivre dans leur argenterie, & dont les ustensiles sont en conséquence susceptibles de s'altérer, de se noircir, & de donner même du verd-de-gris par l'action de l'air, de l'eau, & sur-tout des acides végétaux unites sur nos tables.

Le fer s'allie bien avec l'argent & encore mieux avec l'or. Gellert observe que l'alliage de l'or avec le fer, est plus léger qu'il ne sembleroit devoir l'être. Cependant l'affinité de ces deux métaux est très-grande; car l'or facilite la fusion du fer, ce qui indique toujours dans deux métaux une très-grande disposition à s'unir ensemble. Gellert remarque, à l'occasion de cette propriété, que l'or vaudroit mieux, par cette raison, que le cuivre, pour fonder les petits ouvrages de fer ou d'acier. On croit que les Anglois font usage de cette soudure dans leurs ouvrages d'acier. On assure que les lames de sabre, de couteau & d'autres instrumens, dites de Damas, contiennent de l'or; mais on ne voit pas trop ce que cette addition pourroit y faire de bon, puisque, dans cet alliage d'or & de fer, ces deux métaux ne se pénètrent pas assez pour augmenter réciproquement leur densité suivant la remarque de Gellert. Les orfèvres qui travaillent l'or en bijoux, & qui font les ors de couleur, emploient un alliage de fer & d'or pour avoir l'or gris. Je ne doute pas que cet alliage ne pût être d'une beaucoup plus grande utilité; il étoit plus connu. Le départ de cet alliage est facile au moyen de l'acide sulfureux ou de l'acide muriatique, qui dissolvent le fer sans toucher à l'or.

Le fer ne s'unit au cuivre que difficilement & en petite proportion; il rend la couleur de ce métal plus pâle. La portion de fer qui, dans une fonte, n'a pu s'allier avec le cuivre, forme un métal ou un culot séparé, qui cependant est fort attaché à la surface du cuivre. Les degrés d'affinité du fer avec les autres métaux, suivant la

able de Gellert, en renversant l'ordre dans lequel il les a remarqués (c'est-à-dire, en commençant par ceux avec lesquels il a la plus grande affinité, ce qui paroît plus naturel), sont l'or, l'argent & le cuivre.

L'étain, suivant le même auteur, s'unit avec tous les métaux & les rend aigres; le fer & le plomb sont ceux qu'il altère le moins à cet égard : l'or & l'argent sont, au contraire, ceux auxquels l'étain donne le plus d'aigreur. Cependant, j'observerai relativement à cette propriété, qu'il s'en faut de beaucoup qu'elle soit aussi énergique qu'on l'a dit & que les orfèvres le craignent. On a prétendu que le voisinage, & même les vapeurs de l'étain fussent pour rendre l'argent & l'or très-caillants; dans les laboratoires des monnoies & des orfèvres, on évite avec grand soin d'avoir, & sur-tout de fondre de l'étain à côté des fourneaux où l'on fond l'or; il y a certainement un peu de préjugé à cet égard. On sépare l'érain de l'argent & de l'or, par le moyen du plomb & de la couelle. On emploie quelquefois le nitre & le muriate de mercure corrosif, ou le sublimé corrosif, pour le même usage.

L'alliage de l'étain avec l'or & l'argent n'est donc d'aucun usage; au contraire, on l'évite avec le plus grand soin; mais avec le cuivre, l'étain, forme un métal allié connu sous le nom de *bronze* ou d'*airain* qui est fort utile, & qui mérite un article particulier en raison de ses grands usages. (Voyez les mots BRONZE, ALLIAGE DE CLOCHE après celui-ci.)

L'alliage de l'argent & du cuivre avec l'étain, est d'une pesanteur spécifique plus grande, & celui de l'or avec l'étain est d'une pesanteur moindre que la règle de l'alliage ne sembleroit l'indiquer. La table d'affinités de Gellert donne pour celles de l'étain, avec les autres métaux, en les nommant toujours dans un ordre renversé du sien, comme on le fera toutes les fois qu'il en sera question, le fer, le cuivre, l'argent & l'or.

Le plomb s'unit avec tous les métaux, à l'exception du fer, avec lequel on n'a pas pu l'allier jusqu'à présent. Gellert observe à ce sujet, que cette propriété du fer à l'égard du plomb, le rend propre à séparer ce dernier métal d'avec les autres, pourvu que le métal dont il s'agit de le séparer n'ait pas plus de disposition à s'unit avec le plomb qu'avec le fer. Ce qu'il y a de certain, c'est que le plomb lui-même peut servir d'intermédiaire pour séparer le fer d'avec d'autres métaux, par exemple de l'argent; car si l'on fait fondre une suffisante quantité de plomb avec de l'argent allié de fer, le plomb s'empare de l'argent très-facilement, & en sépare le fer, qu'on voit nager à la surface de ces deux métaux fondus.

L'alliage de l'or & de l'argent avec le plomb est d'une pesanteur spécifique plus grande que la proportion du mélange ne sembleroit l'annon-

cer, au lieu que le métal composé de cuivre ou d'étain avec le plomb est d'une pesanteur spécifique moindre.

L'alliage du plomb avec les autres métaux est en usage pour les essais des mines, pour l'affinage & pour la *liqutation*.

On allie aussi le plomb & l'étain ensemble pour en former la soudure propre aux tuyaux & autres ouvrages en plomb, ou pour oxider ces métaux ensemble, & en faire le blanc nommé *calciné*, qui fait partie de l'*émail blanc*.

Malheureusement on ne borne point l'usage de cet alliage à ce qu'on vient d'annoncer. La cupidité & la nécessité de faire des ouvrages d'étain à bas prix pour les besoins des hommes peu fortunés, a fait employer l'étain allié à un quart de plomb, pour fabriquer les vases en usage dans différens cas de l'économie domestique; & quoique des loix autrefois exécutées enjoignissent de ne vendre cet alliage que sous le nom de *ciatre-étouffe*, pour des usages à la vérité différens de ceux de la cuisine, on a étendu ses usages à beaucoup d'autres cas où elle peut avoir de grands inconvéniens, en raison des maux que le plomb produit dans l'économie animale. Il sera question plus en détail de cet alliage, & des moyens de l'essayer, à l'article de l'ÉTAIN.

La table des affinités de Gellert ne donne, pour celles du plomb avec les autres métaux, que l'argent, l'or, l'étain & le cuivre.

Le zinc s'allie avec toutes les matières métalliques, à l'exception du bismuth, avec lequel il ne peut s'unir suivant Gellert. Ce métal, caissant en s'unissant aux autres substances métalliques, rend plus fusibles celles qui sont plus difficiles à fondre que lui. Les alliages de l'or, de l'argent, du cuivre & du plomb avec le zinc, sont d'une pesanteur spécifique plus grande; ceux de ce même métal avec l'étain, le fer & l'antimoine, sont au contraire d'une pesanteur spécifique moindre que la somme de celles des deux métaux de l'alliage.

Les alliages du zinc avec la plupart des matières métalliques ne sont point utilisés dans les arts; mais celui de ce métal avec le cuivre, l'est beaucoup, c'est lui qui forme le *cuivre jaune*, les *tombacs*, le *finilor*, &c. (Voyez ces mots.)

Les affinités du zinc avec les autres matières métalliques, sont, suivant la table de Gellert, dans l'ordre suivant : le cuivre, le fer, l'argent, l'or, l'étain & le plomb; mais il est marqué pour ce dernier métal, en partie, c'est-à-dire, apparemment que le zinc ne s'unit point au plomb dans toutes sortes de proportions. (Voyez ZINC.)

Le bismuth s'unit avec tous les métaux ductiles & avec la plupart des métaux caillants; cette substance métallique a même une telle action sur les autres, qu'elle facilite sensiblement leur fusion. Le bismuth rend tous les métaux auxquels il est uni, aigres & caillants. Il ne s'unit point au zinc, ni, suivant

Gellert, à l'arsenic; quand on le fait fondre avec zinc, il occupe le fond du creuset, comme plus pesant, & le zinc se place sur le bismuth. Lorsque le tout est refroidi, on voit en cassant le culot, que ces deux métaux sont séparés, & forment deux couches distinctes, appliquées l'une sur l'autre assez fortement. L'or, l'argent, le plomb & l'antimoine, forment avec le bismuth des alliages d'une pesanteur spécifique moindre, & enfin, celui de cuivre s'accorde avec les proportions observées dans le mélange.

Les alliages du bismuth ne sont point d'usage, si ce n'est peut-être pour quelques compositions particulières de métaux à faire des miroirs. On en fait cependant à de très-petites proportions de bismuth avec l'étain, le plomb, &c. pour donner à ces métaux plus de dureté & de solidité qu'il n'en ont naturellement, c'est à la dose de quelques livres par quintal, qu'on ajoute le bismuth à ces métaux moux; si l'on augmentoit cette proportion, on rendroit les mêmes métaux trop aigres, & on ne pourroit plus les employer aux usages auxquels ils sont destinés. Les potiers d'étain, les fondeurs en caractères d'imprimerie, ceux qui fabriquent les robinets d'étain, &c., font ceux qui emploient un peu de bismuth pour donner la consistance nécessaire aux métaux moux qu'ils travaillent.

La table de Gellert donne pour les affinités des métaux avec le bismuth, le fer, le cuivre, l'étain, le plomb, l'argent & l'or.

Le cobalt (1), dit Gellert, s'allie avec tous les métaux connus; mais il n'agit que fort peu sur le plomb & sur l'argent. Quand on fait fondre ensemble partie égale de plomb & de cobalt, on trouve que ces deux substances ne sont qu'attachées l'une à l'autre. Le plomb, en vertu de sa plus grande pesanteur spécifique, occupe la partie inférieure, & le cobalt la partie supérieure, de manière qu'on a tout lieu de croire qu'ils ne se font aucunement combinés. Mais si on fait fondre ce même cobalt, après qu'il a été ainsi traité avec du fer, qui semble être le métal le plus propre à faire union avec lui, on trouve au fond du creuset un petit culot de plomb, parce que le fer & le plomb ne se dissolvent point. On croiroit d'abord que l'argent & le cobalt ne peuvent se dissoudre l'un l'autre. En effet, si l'on veut faire fondre ensemble deux parties de cobalt avec une partie d'argent, on trouve l'argent en bas, & le cobalt au-dessus, simplement attachés l'un à l'autre; cependant, l'argent devient plus cassant, il est d'une couleur plus grise, & le cobalt d'une couleur plus blanche qu'auparavant. Si on met cet argent sur la cou-

pelle, on remarquera que la partie de cobalt s'attachera en forme de cercle sur la coupelle, & on trouvera que l'argent a perdu un huitième qui se retrouve si on fait l'essai sur le cobalt pour savoir l'argent qu'il contient. (Chimie métallurgique, édition française, tome 1, page 184.)

Ces expériences de Gellert prouvent que le cobalt ne peut point s'unir avec le plomb & à l'argent en toutes proportions, mais seulement en petite quantité. Il en est peut-être de même du bismuth, avec lequel Gellert dit, (*ibid.* page 185) que le cobalt s'unit très-facilement; car M. Baumé, qui a beaucoup travaillé sur le cobalt, a observé qu'en le faisant fondre avec du bismuth, ces deux métaux se séparent, le bismuth occupant la partie inférieure, & le cobalt la partie supérieure du culot. Cette expérience a lieu dans le traitement des mines de cobalt, qui contiennent souvent du bismuth, ou réciproquement, on obtient les deux culots séparés; le bismuth occupe toujours le fond du creuset, & le cobalt est placé au-dessus: on sépare aisément ces deux métaux par un coup de marteau.

Les alliages du cobalt ne sont encore que peu connus, & d'aucun usage dans les arts. La table des affinités de Gellert, désigne les affinités du cobalt avec les matières métalliques, dans l'ordre suivant: le cuivre, le fer, l'étain, le zinc, l'antimoine, le bismuth, le plomb & l'arsenic (en partie).

L'antimoine peut s'allier avec presque toutes les substances métalliques. Gellert dit que les alliages de ce métal, avec le fer, l'étain & le zinc, ont une pesanteur spécifique plus grande; il remarque aussi que l'antimoine allié avec le fer, diminue beaucoup plus que toute autre substance métallique, la propriété qu'a le fer d'être attiré par l'aimant.

Les alliages de l'antimoine sont peu usités dans les arts; ce métal entre cependant dans quelques compositions particulières pour des miroirs. On prépare aussi un médicament connu sous le nom de *lilium de Paracelse*, ou *teinture des métaux*, pour lequel on allie ce métal séparément avec le fer, l'étain & le cuivre. On nommoit autrefois ces alliages *régule Martial*, *Jovial* & de *Vénus*. Mais il est prouvé aujourd'hui que ces alliages ne servent en aucune manière à la teinture ou à la coloration de l'alcool, & que c'est l'état bien caustique de la potasse qui fait cette coloration. Voyez ALCOOL & LILIUM. Les alchimistes se servoient autrefois beaucoup de l'antimoine pour purifier l'or; ils prétendoient que, dans cet alliage, la

(1) C'est sans doute ce que l'on nommoit autrefois *régule de cobalt*, que M. Gellert désigne sous le nom de *cobalt*; car le cobalt des boutiques est un minéral composé qui, outre le métal nommé cobalt, dont il est ici question, contient beaucoup d'autres substances, comme du soufre, de l'arsenic, souvent du bismuth, de l'argent, des terres non-métalliques, &c. Voyez COBALTE.

teinture de l'or étoit rendu plus intense, plus riche, & que la quantité de ce métal précieux augmentoit sensiblement dans cette combinaison. Voyez les mots ANTIMOINE, OR.

Les affinités des substances métalliques, avec l'antimoine sont, suivant la table de Gellert, dans l'ordre suivant: le zinc, le cuivre, l'étain, le plomb, l'argent & l'or. Le bismuth est désigné dans cette table, comme ne pouvant point s'unir avec l'antimoine.

L'arsenic s'unir avec la plupart des matières métalliques; il blanchit le fer, dit Gellert, mais l'alliage qui en résulte, est très-cassant. Il forme sur-tout le fer cassant à chaud, suivant Bergman. Le cuivre devient très-blanc, par son alliage avec l'arsenic, comme tout le monde le sait. Cet alliage forme le tombac blanc qui imite beaucoup l'argent. Voyez TOMBAC BLANC. Mais Gellert avance que, malgré l'alliage de l'arsenic, le cuivre demeure assez ductile & malleable, ce qui est très-remarquable. Cependant, si cet alliage contient une trop grande quantité d'arsenic, il devient aigre, cassant & noircit à sa surface. L'arsenic uni à l'étain, se réduit en partie en une poudre semblable à de la cendre, dans laquelle il reste combustible d'arsenic; le reste de l'étain est très-brillant, d'un tissu soyeux, & ressemblant extérieurement au zinc, sans cependant en avoir les propriétés. L'étain devient aussi beaucoup plus dur & plus sonore par son union avec l'arsenic. On trouvera dans l'histoire de l'étain quelques détails plus précis sur cet alliage, observé par M. l'ayen.

Le plomb uni avec l'arsenic, donne de la fumée & se gonfle plus promptement à un feu modéré, qu'il ne seroit s'il étoit pur; pour lors une partie s'en dissipe sous la forme d'une vapeur fort épaisse; une autre partie se change en un verre d'un jaune rougeâtre, & le plomb qui reste devient aigre cassant, & d'une couleur foncée. L'arsenic s'unir avec l'argent, & le rend cassant, il en est de même de l'or; mais de plus il le palit & lui enlève sa couleur. Cette substance métallique s'unir très-difficilement avec le cobalt: quand il y est uni, il forme une matière noire & luisante. Enfin, toujours suivant Gellert, dont tout ceci est tiré, le bismuth ne peut point contracter d'union avec l'arsenic.

On voit, par la table d'affinités de cet auteur, que les métaux s'unissent à l'arsenic dans l'ordre suivant, qui est le même que celui de l'antimoine; le zinc, le fer, le cuivre, l'étain, le plomb, l'argent, l'or & l'antimoine.

Ceux des alliages de l'arsenic qui sont usités pour les arts, sont le tombac blanc, & quelques compositions particulières pour les miroirs de métal.

Il est essentiel de remarquer, au sujet de l'arsenic, que cette substance singulière a la propriété de s'unir aux métaux, lors même qu'elle

est dans l'état d'oxide, & quoiqu'elle ne soit point dans l'état métallique, ce qui vient de son caractère salin, & de la propriété qu'a l'arsenic de céder une partie de son oxygène aux métaux très-combustibles. Il doit, en conséquence de cela, se trouver des différences entre les alliages faits avec l'oxide d'arsenic, & ceux dans lesquels on emploie l'arsenic métallique. Macquer n'a pas pris garde, en avançant ce dernier fait, que cela ne dépend que de la proportion d'arsenic qui est beaucoup moindre dans le cas où c'est l'oxide qu'on emploie, parce que la portion qui se combine aux métaux perd auparavant son oxygène; car suivant un des axiomes de chimie relatifs aux alliages que Macquer n'auroit pas dû oublier, puisqu'il y a spécialement insisté au commencement de son article, les oxides des métaux ne peuvent pas s'unir aux métaux eux-mêmes dans leur état métallique.

Il faut observer en général, au sujet de tous ces alliages métalliques, qu'il y a beaucoup de diversités dans les résultats qu'en donnent la plupart des chimistes qui en ont parlé, comme on pourra le voir dans les articles particuliers de chaque matière métallique, qu'il est bon de consulter à ce sujet. Mais ces variétés n'ont rien qui doive étonner, si l'on fait attention à la difficulté de la matière, & aux grands obstacles qui s'opposent à la parfaite exactitude des expériences. Tous ceux qui ont suffisamment travaillé en chimie, sentiront aisément que, sans compter la différence des proportions des métaux employés dans les alliages qui doit cependant apporter beaucoup de différence aussi dans les résultats, il doit s'en trouver de beaucoup plus considérables, dépendantes de la pureté des métaux, & de la quantité plus ou moins grande d'oxygène avec lequel plusieurs d'eux sont susceptibles d'être unis, de la destructibilité & de la volatilité très-variables aussi de beaucoup de matières métalliques, & enfin du juste degré de chaleur qui fait encore beaucoup dans tout ceci, & qu'il est comme impossible de déterminer avec une certaine précision. Si ces différentes circonstances doivent faire varier les propriétés des alliages, comme il est aisé de le pressentir, les chimistes doivent donc être invités à ne négliger aucune de ces circonstances, à en apprécier l'influence par des expériences comparées, & à les décrire avec assez d'exactitude, pour qu'elles puissent être reproduites au besoin par tous ceux qui les suivront.

On doit conclure de ces observations, que pour faire une suite d'expériences exactes sur les alliages métalliques, & sur lesquelles on pur compte, il faudroit d'abord employer toutes les matières métalliques dans le plus grand degré de pureté, ce qui est fort difficile; en second lieu, faire toutes les fontes dans des vaisseaux exactement clos, pour empêcher l'altération, la combustion

& la destruction de tous les métaux qui en sont susceptibles ; enfin , déterminer avec le plus grand soin le juste degré de chaleur nécessaire pour la meilleure combinaison de toutes les matières métalliques les unes avec les autres. Mais il ne paroît pas qu'aucun chimiste ait fait jusqu'à présent ce grand & important travail ; il est à souhaiter qu'on l'entreprene : combien restera-t-il ensuite de belles expériences à faire sur tous ces alliages pour en bien faire connoître toutes les propriétés , & que d'utilités ne pourra-t-on pas y puiser pour les arts ?

La fusibilité , par exemple , doit varier considérablement dans les différens alliages ; on en a une preuve bien sensible dans celui de l'étain , du plomb & du bismuth. Ces trois métaux unis ensemble , forment toujours un mélange ou un métal composé beaucoup plus fusible qu'aucun d'eux ne l'est séparément , ou même qu'ils ne le sont alliés deux à deux. Newton, Nuschembroek, Homberg , avoient fait quelques expériences sur les proportions de ces trois métaux pour en composer un alliage très-fusible ; mais M. d'Arcet qui a si bien mérité de la chimie par ses travaux importants , a publié dans le journal de médecine (juin 1775) , les recherches qu'il a faites pour trouver les proportions de ces mêmes métaux qui donnent l'alliage le plus fusible ; elles sont de huit parties de bismuth , cinq parties de plomb , & trois parties d'étain. La fusibilité de cet alliage est telle , que le métal composé qui en résulte , se fond & devient coulant comme du mercure , non-seulement dans l'eau bouillante , mais même au bain-marie. M. d'Arcet remarque : « Que les alliages de ces trois métaux en différentes proportions , quoiqu'ils soient aigres , se laissent pourtant couper au couteau , lorsqu'ils sont d'un brun noirâtre & terne dans la cassure ; que dans quelques-uns le grain est assez gros , & que dans d'autres , il est très-fin , qu'ils sont plus ou moins blancs , quand on les colle dans la lingotière ; que celui de Homberg , par exemple , (partie égale des trois métaux) a la blancheur de l'argent ; mais que tous se ternissent facilement à l'air , & plus promptement encore lorsqu'on les fait bouillir dans l'eau , où ils se couvrent d'une pellicule sensible , ridée , & à demi-calcinée , qui s'en détache peu-à-peu sous la forme d'une poudre noire ».

Quoiqu'il reste , comme on voit , une infinité de belles expériences à faire sur les alliages des métaux , ce qu'on a fait jusqu'à présent sur cette matière , suffit néanmoins pour établir quelques vérités générales. On en a exposé plusieurs au commencement de cet article ; en voici encore une qui résulte évidemment des expériences de Kraft & Gellert , c'est qu'il en est des substances métalliques comme de tous les autres corps , relativement à leurs unions , les unes se dissolvent facilement , les autres seulement dans certaines

proportions , d'autres enfin paroissent ne pouvoir s'unir en aucune manière.

Il est très-important d'observer sur ces deux matières métalliques de n'en pouvoir dissoudre d'autres qu'en une certaine proportion , est très-capable d'en imposer , & de faire croire qu'un métal ne peut s'unir à un autre , parce qu'on les voit séparés , formant deux culots distincts après la fonte , tandis qu'il y a réellement une quantité , mais souvent fort petite , d'un des métaux unie avec l'autre. C'est ainsi que se comporte le bismuth avec le cobalt , suivant Gellert , c'est encore ainsi qu'on faisant fondre du cuivre allié d'environ un cinquième d'étain avec du plomb , celui-ci se sépare en grande partie ; mais il en reste une certaine quantité unie au premier alliage. Il en est de cela comme de l'éther : tous les chimistes ont cru pendant longtemps que l'éther n'étoit point dissoluble dans l'eau , parce que l'on confondoit ensemble ces deux liqueurs dans un même vase , on les voyoit constamment faire bande à part ; l'éther , comme beaucoup plus léger , occupant toujours la partie supérieure , & nageant à la surface de l'eau ; mais M. de Lauraguais ayant examiné la chose plus attentivement , & comme on doit le faire en bonne chimie , a démontré , dans un mémoire lu à l'Académie des sciences , que l'éther est réellement dissoluble dans l'eau , mais seulement dans une certaine proportion , ce qu'on pouvoit inférer aussi des différences entre les propriétés de l'éther qui n'a point touché à l'eau , & celle de celui qui y a touché , dont M. Baumé parle dans sa dissertation sur l'éther. Cela posé , peut-être que si l'on examinoit les mélanges de toutes les substances métalliques les unes avec les autres , on trouveroit aussi que toutes celles qu'on a regardées jusqu'à présent comme incapables de s'unir , en sont cependant très-capables , mais seulement dans certaines proportions , & si l'on en trouvoit quelques-unes qui refusassent absolument de s'unir par la fonte à l'ordinaire , il resteroit encore à essayer de rompre plus parfaitement leur aggrégation , & de les présenter l'une à l'autre dans cet état , comme M. de Lauraguais l'a fait à l'égard du soufre & de l'alcool.

Non-seulement les arts , comme on l'a dit dans plusieurs endroits de cet article , retirent un grand avantage des expériences qui y sont présentées ; mais l'histoire naturelle , la minéralogie y gagnent beaucoup ; on connoitroit beaucoup plus d'alliages naturels qu'on n'en a trouvés encore ; on auroit des notions beaucoup plus claires sur les mines , & déjà même quelques-unes de ces connoissances sont acquises. On sait , depuis quelques années , que le manganèse est très-fréquent dans plusieurs combinaisons métalliques naturelles ; en le recherchant encore dans des métaux , & sur tout dans les différens va-

tiétés de fer que l'on obtient dans les usines & dans les forges, il est vraisemblable qu'on trouvera des combinaisons variées de ces deux métaux entr'eux, & peut-être même avec quelques autres substances métalliques. Enfin, une grande raison qui doit engager à multiplier les recherches chimiques sur les alliages, c'est qu'il est intéressant de constater quels effets seront produits dans les métaux connus, par l'addition de ceux qui sont de couverts depuis quelques années, comme le molybdène, le tungstène, l'uranite, &c. Il ne faut pas perdre de vue dans ces belles recherches, qu'on doit les faire dans un ordre tellement exact, tellement méthodique, que toutes les expériences soient bien comparables, & que les résultats soient faciles à apprécier comparativement. Ainsi par exemple, il faudroit les tenter dans des creusets de même volume, sur des poids égaux, mesurer la chaleur employée au thermomètre de Wedgwood, décrire l'instant de la fusion, observer les phénomènes du refroidissement, la cristallisation, &c. déterminer avec soin la couleur, le tissu, la ductilité ou la fragilité, la pesanteur spécifique, la tenacité, la solidité ou la résistance à la pression aux efforts en différens sens, l'altérabilité par l'air, par l'eau, la dissolubilité dans les acides. Quand on auroit l'histoire d'un grand nombre d'alliages examinés de cette manière, on en construïroit des tableaux, dans lesquels on verroit d'un seul coup-d'œil toutes les propriétés utiles ou nuisibles, & l'on se détermineroit tout-à-coup sur le choix d'un alliage dont on auroit besoin.

ALLIAGE DES CLOCHES. Nous parlerons du métal mixte ou allié qu'on emploie pour fabriquer les cloches à ce titre d'alliage, parce qu'il n'y a pas de mot qui convienne mieux pour désigner cette substance, & parce que son histoire est devenue aujourd'hui d'un si grand intérêt, que nous avons cru devoir la consigner le plus promptement possible dans cet ouvrage, pour en faire plutôt jouir les souscripteurs de l'Encyclopédie.

Depuis que l'assemblée nationale a décrété que les cloches des églises de France supprimées seroient employées pour fabriquer une monnaie, on a fait beaucoup plus d'attention à ce métal qu'on n'en avoit fait depuis long-temps : on a plus étudié & reconnu ses propriétés en quelques mois, qu'on ne l'avoit fait pendant les siècles précédens ; on s'est sur-tout beaucoup occupé de l'art d'en faire le départ, d'en séparer les métaux, & d'en obtenir le cuivre pur. Le métal employé pour la fabrication des cloches est un alliage de cuivre & d'étain ; les proportions les plus ordinaires, sont de 75 livres de cuivre pur ou de cuivre rosette, sur 25 livres d'étain. Cependant il paroît que les fondeurs de cloches n'ont pas toujours suivi strictement cette proportion ;

la quantité d'étain paroît en général avoir été plus grande dans les cloches moins précieuses & surtout dans les plus petites ; il paroît encore que quelques cloches contiennent plusieurs autres métaux & sur-tout du zinc & de l'antimoine ; cependant on pense avec raison que ces deux dernières substances métalliques se trouvent comme par hasard dans le métal des cloches, & qu'elles proviennent des cuivres jaunes & blancs & en général des cuivres impurs qu'on mêle souvent dans les fournaux où l'on fond la matière des cloches. Ce qu'il y a de vrai à cet égard c'est que lorsqu'on fond des cloches d'un grand diamètre, pour les grandes occasions, on n'emploie que du cuivre & de l'étain purs.

L'alliage qui résulte de ces deux métaux a une pesanteur spécifique plus grande que celle qui devroit résulter de la combinaison de leur pesanteurs spécifiques particulières. Macquer observe que deux onces d'un métal composé de quatre cinquièmes de cuivre rouge pur-pur & d'un cinquième d'étain également pur, ont sept grains & un dixième de plus en pesanteur spécifique que ne doit avoir la même quantité de ces deux métaux non alliés, ayant égard à la moindre pesanteur spécifique de l'étain, comparé au cuivre ; ce qui prouve, ajoute-t-il, que dans l'union de ces deux métaux il y a pénétration, c'est-à-dire, que l'un remplit alors en partie les pores de l'autre ; peut-être aussi cet effet est-il réciproque. La couleur du cuivre est presque entièrement éteinte dans cet alliage ; celle de l'étain domine & le métal est plus ou moins blanc. Il a un tissu grenu & comme cristallin. Il est si cassant qu'une percussion subite & un peu forte le brise très-promptement. Il est très-dur & difficile à limer. Ces propriétés sont d'autant plus singulières, que ni le cuivre, ni l'étain isolés ne présentent rien de semblable ; l'étain est mou & facile à couper comme à plier ; le cuivre jouit aussi d'une grande ductilité. Il n'est donc pas douteux qu'il y a entre ces deux métaux une pénétration intime, un changement de forme, un arrangement de molécules qui modifie singulièrement leurs propriétés. C'est encore une preuve bien forte que les qualités, les propriétés des composés diffèrent entièrement de celles de leurs composans & qu'elles sont presque toujours bien loin d'être moyennes. On n'est pas étonné, & l'on conçoit même facilement, qu'un alliage de cuivre & d'étain, soit beaucoup plus sonore que chacun des métaux qui le constituent, puisque cette propriété paroît tenir à la densité qu'ils acquièrent & au rapprochement des molécules qui s'opère pendant & par la combinaison ; mais il semble qu'on ne peut pas concevoir avec la même facilité comment un alliage aussi dur, aussi dense, se fond à une moindre chaleur & plus promptement que le cuivre. Ici l'on pourroit invoquer l'opinion

ancienne des chimistes, qui pensoient que les composés ont des propriétés mixtes de celles de leurs composants, car il est certain que l'alliage de cloches est plus fusible que le cuivre & moins que l'étain; mais cette explication même est une faute dans la comparaison des deux doctrines, puisque la pénétration des deux métaux & l'arrangement nouveau de leurs molécules, ne peut plus permettre qu'on admette le mélange des propriétés, ou l'état moyen de cet ensemble de propriétés; il suffit pour ne pas multiplier ici les difficultés au désavantage de la science, d'attribuer à l'étain cette fusibilité que contracte le cuivre. C'est encore à la présence de ce métal & à la dureté qu'il contracte dans sa combinaison avec le cuivre, qu'il faut attribuer le peu d'alérabilité de l'alliage par le contact de l'air; le métal de cloches ne se rouille presque point, en comparaison du cuivre qui se recouvre si promptement à l'air humide d'une couche d'oxide verd. On droit en rapprochant cette inaltérabilité par l'air de la couleur blanche de l'alliage que chaque molécule de cuivre est enveloppée & très-exactement recouverte d'une couche d'étain, qui le défend du contact & de l'action de l'atmosphère, en lui donnant une couleur blanche qui en masque entièrement la nuance. Tel étoit l'état des connaissances chimiques sur l'alliage de cloche à commencement de cette année ou à la fin de l'année dernière; on ne s'étoit point ou presque point occupé de l'art d'en séparer les deux métaux principaux le cuivre & l'étain; ainsi dans la fabrique & la fonte des cloches que l'on faisoit de temps en temps dans différents lieux de la France, on continuoit sans cesse à cacher & à gâter en quelque sorte du cuivre de rosette dans cet alliage; car quelques personnes pensoient qu'on ne pouvoit pas retirer le cuivre des cloches, & en effet l'art s'étoit très-peu exercé à cette espèce de départ. Les vues de l'assemblée nationale sur les cloches des églises supprimées réveillèrent l'attention des chimistes & des artistes; ils commencèrent bientôt à faire des expériences sur cet alliage, dans l'intention d'en séparer le cuivre; on vit successivement M. Pelletier, Auguste, Dizé & Jeannery proposer des procédés différents pour obtenir le cuivre pur des cloches, & déjà plusieurs établissemens sont formés pour faire ce travail en grand. J'ai de mon côté entrepris un travail sur cet objet, & en décrivant les expériences qui me sont particulières, j'ai fait connoître les résultats de celles des chimistes dont je viens de parler. En plaçant ici le mémoire que j'ai publié sur cet objet & qui est divisé en neuf paragraphes, je crois qu'il ne restera que peu de choses, inconnues sur l'alliage métallique qui constitue les cloches; on trouvera encore d'autres détails relatifs à un alliage analogue dans l'argile bronzée.

§. I. Objet du travail sur le métal des cloches.

Le métal des cloches fixe depuis quelques mois l'attention des savans & des artistes; on agite plusieurs questions importantes sur cet alliage. Peut-on en faire le départ? Existe-t-il en chimie des procédés pour séparer les métaux qui le composent? quels sont ces procédés? quelle est leur valeur respective? quel est le plus économique? La quantité & la pureté du cuivre qu'on obtiendra indemnifient-elles des frais nécessaires à cette espèce d'affinage? à quel prix reviendra le cuivre affiné? pourra-t-on tirer quelque parti de l'étain & des métaux cassans, tels que le zinc & l'antimoine qui y sont quelquefois alliés dans le métal des cloches? Y auroit-il plus d'avantage à vendre ce métal allié ou à l'employer à d'autres usages, qu'à en séparer le cuivre? Peut-on le faire servir à couler des canons, des statues, des cylindres, &c? Ne pourroit-on pas même le fabriquer en monnoies coulées? Ne seroit-il pas plus utile de lui donner de la ductilité en l'alliant à une suffisante quantité de cuivre, & d'employer ce nouvel alliage, susceptible d'être lamé, coupé en flans & frappé, pour la fabrication de la monnaie décrétée par l'assemblée nationale, & si l'on adoptoit ce dernier parti, ne seroit-il pas convenable d'affiner une portion du métal des cloches, & d'en extraire le cuivre pur pour l'allier à une autre portion du premier métal?

Tels sont les principaux objets sur lesquels il s'est élevé des discussions dans le sein même de l'assemblée nationale, dans plusieurs comités de cette assemblée, & dans un grand nombre de sociétés savantes & patriotiques. C'est pour éclaircir quelques-unes de ces questions, qu'ont été faites les expériences suivantes sur le métal des cloches.

§. II. Essai d'un alliage artificiel de cuivre & d'étain.

Pour déterminer avec plus d'exactitude la marche qu'il falloit suivre, on a d'abord allié 80 parties de cuivre pur, & 20 d'étain de Malacca, & on a fait cet sur alliage une suite d'expériences propres à faire mieux connoître les phénomènes que pourroit présenter le métal des cloches, & sur tout à déterminer avec plus d'exactitude le rapport des résultats que donneroit ce dernier, avec ceux que présenteroit cet alliage fait dans des proportions bien connues.

EXPÉRIENCE I.

On a pris 100 parties de l'alliage fictice en poudre, on l'a exposé sous une moufle à une chaleur capable de le faire rougir

gir (1). La matière a pris une couleur grise noirâtre à-peu-près semblable à celle des mines de cuivre appelées *schist*; elle a augmenté de 4 parties pendant cette opération; on l'a mise ensuite dans un creuset couvert, & on l'a poussée à un feu médiocre, mais elle ne s'est pas fondue, les molécules ne se sont que légèrement agglutinées; on l'a chauffée ensuite très-fortement pendant une demi-heure, & on a obtenu un culot de cuivre rouge très-beau du poids de 54 parties.

On avoit pensé que pendant la première exposition de l'alliage au feu & à l'air, les principes qui le composent, savoir, l'étain & le cuivre, s'oxideroient en partie, & qu'en les chauffant ensuite fortement dans un creuset fermé, le cuivre se réduiroit en cédant son oxygène à l'étain non entièrement oxidé par la première opération, & qui tend à s'oxidiser davantage par une chaleur forte; cette opinion étoit fondée sur la loi des affinités connues de l'oxygène. On voit qu'elle a été confirmée par l'expérience; mais celle-ci a donné en même-temps deux autres résultats; le premier, c'est que le cuivre légèrement oxidé, mêlé à l'oxide d'étain, est très-réfractaire, & ne se réunit en culot qu'avec une grande difficulté; le second, c'est qu'une grande portion du cuivre reste adhérente à l'oxide d'étain sous forme de scorie, & qu'il y a près d'un tiers de perte à une première fusion.

EXPÉRIENCE II.

On a pris une lame épaisse d'une ligne pesant 118 gros, du même métal artificiel; on l'a exposée pendant un quart-d'heure sous une moufle très-chaude, mais pas assez pour la faire fondre; elle avoit alors une couleur grise noirâtre à sa surface; elle sembloit avoir rejeté en-dehors une poussière noire qui, à la loupe, offroit une végétation analogue à un bifus gris; elle avoit augmenté de 2 gros par ce traitement; en cassant cette lame, on a remarqué qu'il ne restoit qu'une très-petite épaisseur de matière à l'état métallique; la cassure faite à chaud devenoit à l'air d'un rouge de cuivre assez beau. Réduite en poudre & poussée au feu dans un creuset couvert pendant un quart-d'heure, elle a donné une masse métallique recouverte d'une matière grisâtre qui y adhéroit fortement; cet alliage avoit encore une couleur jaune, mais bien plus foncée que la première couleur. Il étoit moins cassant. Fondue & recuite à trois reprises successives, cette lame avoit perdu 14 gros en scories & en sublimé blanc; à la dernière fonte, le creuset contenoit au-dessus de

la masse métallique, des flocons & des aiguilles blanches d'oxide d'étain; le métal obtenu après ces trois oxidations, n'étoit point encore ductile; l'analyse a fait voir qu'il contenoit encore 11 parties d'étain au quintal; on étoit donc parvenu à en oxidier & à en séparer 8 parties, & cela suffisoit pour prouver qu'en continuant ces opérations simples, on parviendroit à affiner l'alliage de cuivre & d'étain, & à brillet complètement ce dernier. C'est en effet ce qui arrive à tous les alliages de cuivre avec des métaux plus oxidables que lui. On ne peut pas les chauffer & les faire rougir avec le contact de l'air sans les affiner plus ou moins, comme on le fait dans les ateliers où l'on travaille le cuivre. Mais cette opération ne suffisoit pas encore; il falloit traiter l'alliage par la fusion; car c'est surtout en tenant les cuivres impurs ou alliés fondus avec le contact de l'air, qu'on les affine en grand.

EXPÉRIENCE III.

On a fait fondre dans un creuset plat 100 parties de cet alliage factice; on l'a réduit en espèces de scories, ou en oxide scorifié, en l'agitant avec le contact de l'air; cette scorification a duré un quart-d'heure; le métal avoit acquis 11 parties. Ces scories chauffées seules, ne se sont point réduites, on y appercevoit seulement quelques grains de cuivre; en y ajoutant un fondant, on multiplioit la grenaille de cuivre pur, mais on n'a pas pu l'obtenir en une seule masse. Il est donc certain qu'en l'avoit trop oxidé par ce procédé, & qu'il étoit devenu irréductible & infusible spontanément, au moins au degré de feu qu'il nous a été possible de donner dans nos fourneaux de laboratoire.

EXPÉRIENCE IV.

100 parties d'alliage en poudre mêlées avec 20 parties de nitre commun, ont été exposées au feu de forge pendant un quart-d'heure. On a obtenu le cuivre dans le plus grand état de pureté, mais la dose du réactif salin étant à ce qu'il paroît trop considérable, la perte a été très-grande; on n'a obtenu que 48 parties de cuivre raffiné. Cette expérience a été recommencée avec une plus petite quantité de nitre sur le véritable métal des cloches.

EXPÉRIENCE V.

100 parties du même métal allié mêlées à 18 parties d'oxide noir de manganèse en poudre & exposées à un feu violent pendant une demi-heure, ont offert à leur surface une couche de matière rouge fondue, au-dessous de laquelle

(1) Le métal des cloches brûle avec une flamme brillante lorsqu'on le jette en petits morceaux sur un corps très-chaud; c'est l'étain qui lui donne cette propriété.

étoit un métal d'un jaune d'or demi-ductile, & pesant 83 grains.

La propriété de donner facilement son air vital dont on fait que jout l'oxide de manganèse, avoit engagé à le substituer au nitre. Cette dose n'étant pas assez forte pour oxidier tout l'étain, on a recommencé l'expérience avec 30 parties du même oxide de manganèse sur 100 de notre alliage; on a obtenu 64 parties de cuivre en grenailles mêlées aux scories qui contenoient en outre beaucoup d'oxide de cuivre brun en poussière.

Ces expériences prouvoient que l'on pouvoit séparer le cuivre d'avec l'étain par différens procédés, qui tous tendoient à unir à l'étain la proportion d'oxygène nécessaire pour le brûler sans oxidier le cuivre; elles étoient d'accord avec les résultats des procédés connus dans l'art d'affiner le cuivre, ainsi qu'avec ceux qui avoient été proposés par différentes personnes pour remplir ce but; elles ont été multipliées ensuite sur des fragmens d'une cloche que M. de Cussy, président du comité des monnoies, a fait remettre pour ce travail.

§. III. *Oxidation & effiage du métal des cloches par la chaleur & l'air.*

EXPERIENCE I.

On a pris 500 parties d'un fragment de cloche pulvérisée; on l'a exposé pendant 10 minutes sous la moufle à une chaleur capable de le faire rougir, il a augmenté de 50 parties pendant cette opération; exposé ensuite dans un creuset fermé à une chaleur plus forte, il a présenté après ce traitement deux matières bien distinctes; l'une occupoit la circonférence bien fondue, de couleur jaunâtre & demi-ductile, l'autre qui étoit au centre avoit une couleur rouge très-belle, & étoit composée de grains agglutinés les uns aux autres, mais qu'une légère percussion séparoit facilement; c'étoit de l'oxide de cuivre très-voisin de l'état métallique. Il résulte de cette expérience qu'une très-légère oxidation du métal de cloche sans le faire fondre & poussée jusqu'à l'augmentation de poids d'un pour cent seulement, oxide déjà assez d'étain pour le séparer du cuivre pur, que la portion de ce métal affinée est plus réfractaire que celle qui ne l'est point encore.

EXPERIENCE II.

On a mis sous une moufle 1000 parties de métal de cloche, on l'a tenu rouge pendant 20 minutes, l'augmentation a été de 62 parties; cette augmentation est plus grande que celle de l'expérience précédente, aussi la couleur de la matière étoit beaucoup plus avancée vers le

noir ou le gris noirâtre. On a pris la moitié de cette masse, c'est-à-dire, 531 parties; on l'a chauffée fortement pendant une heure dans un creuset de l'esse, sans aucune addition de matières fondantes ni réductives; l'appareil refroidi a offert, 1°. à sa surface une masse griseâtre contenant beaucoup de grains d'oxide de cuivre non encore entièrement fondus; 2°. à sa partie inférieure un culot métallique de couleur rouge très-ductile; il pesoit 300 parties, la perte est considérable; mais comme il a été dit, il restoit beaucoup de cuivre dans l'oxide d'étain, dont il n'a pas été possible de déterminer la quantité, & qui se seroit sans doute réuni à la masse générale, si on avoit chauffé plus long-tems, ou si on avoit employé des fondans, comme on le verra dans les expériences suivantes.

EXPERIENCE III.

On a pris 100 parties du même métal, on y a combiné par l'action de la chaleur 1 parties d'oxygène, c'est-à-dire, qu'on l'a grillé jusqu'à l'augmentation de 2 pour 100; on a ensuite exposé cette combinaison à un feu de forge pendant une demi-heure: le creuset refroidi & brisé a offert une légère couche de matière grise qui recouvroit un métal de couleur jaune demi-ductile, & que plusieurs coups de marteau appliqués de suite & avec rapidité, gerçoient sensiblement; mais les percussions ne le faisoient point sauter en éclats comme cela a lieu pour le métal des cloches; il pesoit 83 parties, ce qui donne une perte de 17 parties.

EXPERIENCE IV.

100 parties de métal de cloche auxquelles on avoit combiné 17 parties d'oxygène par la chaleur ou le grillage, ont été mises dans un creuset, & poussées au feu pendant une demi-heure, mais il n'y a point eu de réduction de cette matière en métal, elle s'est fondue en une masse de couleur rouge-brune dans laquelle on ne voyoit que quelques petits globules métalliques; il est évident qu'ici l'oxidation avoit été poussée trop loin.

EXPERIENCE V.

100 parties du même métal oxidées à 12 d'oxygène, ayant été exposées au feu comme dans l'expérience précédente, n'ont pas plus été réduites, mais se sont fondues en une espèce de masse de cuivre qui contenoit plus de globules de cuivre que le précédent; ce qui provient de ce que l'oxidation & la quantité d'oxygène étoient moins fortes ici que dans l'expérience précédente, mais dans l'une & dans l'autre

l'autre, on avoit poussé l'oxidation plus loin, à la vérité dans l'intention de déterminer les limites de la quantité d'oxygène nécessaire pour brûler & séparer l'étain d'avec le cuivre. Assuré par les deux dernières expériences que l'augmentation de 17 pour 100 étoit trop considérable pour n'oxidier que l'étain, il étoit essentiel de voir si en ajoutant du nouveau métal de cloche à celui qui étoit trop oxidé, l'oxygène en se partageant entre les deux, ne les mettroit pas dans le cas de laisser séparer le cuivre pur.

EXPÉRIENCE VI.

Sur 100 parties de métal de cloche oxidé à 18 pour 100, on a mis 200 parties de métal cloche nouveau non oxidé; on a exposé ce mélange à l'action du feu de forge dans un creuset, en ayant soin de chauffer légèrement au commencement, afin de donner le temps à l'oxygène de passer de l'un dans l'autre avant que la fusion eût lieu, car alors le partage n'auroit pu se faire, ou au moins il auroit été très-irrégulier.

Après la fonte, on a eu une masse métallique de couleur rouge, très-ductile, & qui pesoit 200 parties; on n'a donc eu ici qu'un tiers de perte.

Après beaucoup d'essais de ce genre sur le métal des cloches chargé de différentes doses d'oxygène, je crois pouvoir fixer le point d'oxidation nécessaire pour séparer ou permettre au cuivre de se séparer de l'étain oxidé, entre 5 & 7 pour 100, au-delà ou en-deçà desquels on n'obtient pas de cuivre ductile; quand la proportion d'oxygène ne s'élève point à cette quantité, on n'a qu'un métal qui se rapproche plus ou moins du cuivre pur, si la quantité d'oxygène est voisine de celle qui a été déterminée, ou bien on n'obtient qu'une masse absolument semblable au métal de cloche, recouverte d'une certaine quantité d'oxide de cuivre, si l'on a chauffé fortement au commencement de l'opération. Lorsque la proportion de l'oxygène excède 7 pour 100, on n'obtient qu'une masse fondue, formée des oxides de cuivre & d'étain, & contenant quelquefois des grenailles de cuivre, si l'on a appliquée une grande chaleur.

EXPÉRIENCE VII.

100 parties de métal de cloche ont été fondues par une coupelle de terre & sous une moufle; on a ensuite laissé ce métal s'oxidier & se réduire en espèce de scories noirâtres qu'on enlevait à mesure de dessus la portion fondue. Quand toute la masse métallique a été ainsi scorifiée, elle avoit augmenté de 19 parties. Alors contenant trois fois plus d'oxygène que cela n'étoit nécessaire pour la simple oxidation de l'étain,

fixée à six pour cent, par les expériences précédentes, on n'a pas pu la réduire sans addition, & par une forte chaleur. On n'a obtenu par un grand feu qu'une espèce d'émail vitreux, d'un brun foncé, dans lequel on ne voyoit même pas de globules métalliques; fondue une seconde fois avec le tiers de son poids de sel marin, cette masse d'oxide ne s'est pas mûx réduite, quoique plus en grand; & par une chaleur long-temps continuée, cette réduction s'opère & l'étain se sépare mieux, comme on le verra plus bas. Cette expérience prouve que le métal étoit trop oxidé par cette scorification, pour être facilement réductible même à l'aide d'un fondant.

EXPÉRIENCE VIII.

On a pris une lame de métal de cloche d'environ une ligne un quart d'épaisseur; on l'a exposée au feu, elle a noirci à sa surface; il sembloit sortir de son intérieur, sous la forme de végétation, une matière grise très-foncée. Cette lame brisée n'avoit plus dans son intérieur qu'une légère épaisseur de matière brillante & métallique. Elle avoit augmenté pendant l'oxidation de 5 pour 100. Mise dans un creuset, & chauffée par degrés jusqu'à la fusion, elle a fourni 72 parties par 100 de cuivre rouge, dont la ductilité approche beaucoup de celle de ce métal pur; cependant on s'est assuré qu'il contenoit encore entre 5 & 7 pour 100 d'étain. Il faut observer, que dans beaucoup d'essais en petit, c'est-à-dire, sur 100 grains, on obtient un cuivre pur du métal des cloches oxidé à 3 & à 4 pour 100; mais il paroît qu'il absorbe une nouvelle quantité d'oxygène au commencement de l'opération par laquelle on le fond, car lorsque l'on opère sur 100 gros, on ne peut jamais obtenir du cuivre de la même pureté du métal oxidé à ce point (1).

§. IV. *Oxidation & effaçage du métal par les oxides métalliques.*

Quoique l'oxidation simple du métal des cloches opérée par le contact de l'air & du feu, ait suffi pour l'affiner, il étoit important de rechercher s'il n'existoit pas quelques substances qui, en raison de l'oxygène qu'elles contiennent, & de leur peu d'adhérence pour ce principe, pussent le communiquer à l'étain du métal des cloches; nous avons sur-tout essayé ceux des oxides métalliques, qui laissant aller facilement leur oxygène par la chaleur, offroient un moyen d'oxidier promptement l'étain sans toucher au cuivre, & d'opérer conséquemment la séparation de celui-ci. Les oxides de mercure, de plomb, & sur-tout ce-

(1) Voyez dans la seconde partie de ce mémoire la description des procédés de MM. Anguille, Ducl & Jannery, qui sont analogues à ces expériences, & fondées sur les mêmes principes.

lui de manganèse, ont été essayés avec le succès qu'on va voir dans les expériences suivantes.

EXPERIENCE IX.

100 parties d'oxide rouge de mercure, mêlées avec 200 parties de métal de cloche pulvérisé, & chauffées doucement au commencement de l'opération, ont donné 126 parties de cuivre très-pur & très-dur, cette matière étant très-chère en raison de la perte du mercure, elle ne peut être employée en grand, aussi ne l'avons-nous essayée que pour nous éclairer sur la manière dont quelques autres oxides métalliques pourroient opérer sur le métal de cloche. Il suffit qu'il soit prouvé que les oxides de mercure peuvent affiner l'alliage du cuivre & de l'étain.

EXPERIENCE X.

100 parties de litharge ou d'oxide de plomb demi-vitrifié, ont été mêlées avec 400 parties de métal de cloche, on a chauffé fortement, & après l'opération qui a duré une demie-heure, on a eu un verre de plomb transparent de couleur jaunâtre, & au-dessous un métal blanchâtre aussi cassant que les cloches mêmes, & qui avoit augmenté de huit parties; d'où il suit que les oxides de plomb vitrifiés ne peuvent point affiner le métal des cloches.

EXPERIENCE XI.

On a pris 100 parties de ce métal pulvérisé, on y a mêlé 18 parties d'oxide de manganèse cristallisé en poudre, & on a exposé le mélange à un feu violent pendant une heure. Le creuset brisé a offert à sa surface une couche de matière rouge vitreuse fondue, & au fond une masse métallique, d'un jaune d'or, demi-dur, & pesant 83 parties. Comme cette expérience en offrant dans l'oxide de manganèse un intermédiaire utile pour séparer le cuivre de l'étain, nous annonçoit qu'on n'en avoit point employé une suffisante quantité, on l'a répétée avec 25 parties de manganèse, & en ajoutant de plus une couche de verre pilé à la surface du mélange. En opérant comme ci-dessus, on a obtenu cette fois 63 parties d'un cuivre assez pur, qui s'étendoit bien sous le marteau, mais qui n'étoit pas encore aussi rouge ni aussi ductile que le cuivre de rosette. D'autres expériences ont appris que 32 parties de l'espèce d'oxide de manganèse employée dans la précédente, suffisoient pour oxidier entièrement l'étain & pour en séparer le cuivre.

Cette matière pourroit donc servir à l'affinage du métal de cloche, en en employant une proportion qui devroit être variée à la vérité suivant la bonté de cet oxide, ou suivant

la quantité d'oxygène qu'il contient, ce qui seroit facile à déterminer. Un fondant de peu de valeur seroit, dans cette opération, d'une grande utilité pour entraîner en vitrification l'oxide de manganèse, cui sans cela restoit toujours entre ses molécules quelques portions de cuivre & des globules du métal même, à moins qu'on ne lui fasse subir l'action d'un feu très-violent. Si l'on n'emploie point de fondants, le cuivre reste dans le creuset sous la forme de globules ou de grenailles plus ou moins grosses, suivant le feu que l'on donne. Quelquefois même, si la chaleur est trop faible ou la quantité nécessaire d'oxide de manganèse trop abondante, le cuivre séparé de l'étain reste sous la forme de poussière disséminée dans les scories formées d'oxide d'étain & de manganèse; dans ce dernier cas, il faut pratiquer un lavage de toute la masse pour séparer le cuivre & le fondre au creuset.

Il y a plus de six mois que M. Pelletier a proposé au comité des monnoies l'oxide de manganèse pour affiner le métal des cloches; nous décrivons son procédé à la fin de ce mémoire; il suffit d'indiquer ici que M. Pelletier a eu le premier cette idée ingénieuse.

EXPERIENCE XII.

100 parties de métal & 25 parties d'oxide blanc d'arsenic ont été mêlées & poussées au feu de forge dans un creuset; dès les premiers instans des vapeurs arsenicales se sont fait sentir, la matière étant fondue, on a retiré le vase du feu; on y a trouvé une masse grise, dure & plus cassante que le métal de cloche; aussi paroit-il s'y être fixé quelques portions d'arsenic réduit.

§. V. Du métal des cloches traité par les fels oxides.

Parmi les matières salines il n'y avoit que celles qui, par la chaleur, peuvent céder leur oxygène aux corps combustibles & sur-tout aux métaux, qui paroissent mériter l'attention, & dans cet ordre se présentent les nitrates & les sulfates; mais ces derniers on se décomposent fournissant du soufre, ne pouvoient être que préjudiciables au succès de l'opération du départ de l'étain avec le cuivre. L'expérience ayant prouvé cette assertion, fournie d'abord par la théorie, on ne décria pas les essais qui ont été faits sur cet objet.

Le principe qui forme l'acide nitrique avec l'oxygène, n'étant que peu susceptible de s'unir aux métaux ni à la plupart de leurs oxides, & laissant par conséquent la base du sel à nud, ce qui est très-avantageux pour faciliter la fonte du cuivre, on a fait plusieurs essais avec le nitrate de potasse de la première cuite.

EXPÉRIENCE XIII.

100 parties de métal & 20 parties de nitre commun, mêlées & chauffées ensemble, ont donné un cuivre très-beau & très-ductile, il ne paroît point contenir aucune matière étrangère ; mais la perte ayant été considérable, & le métal étant recouvert d'une grande quantité d'oxide de cuivre combiné avec celui d'étain, on a pensé que la dose de nitre avoit été trop forte, & on a recommencé cette expérience avec une quantité plus petite de sel.

EXPÉRIENCE XIV.

100 parties du métal de cloche & 12 parties de nitre de la première cuite ont encore donné un métal fort beau & très-ductile ; cependant il n'étoit pas aussi doux que celui de l'expérience précédente. Aussi n'avoit il pas tant perdu, car l'autre ne pesoit que 48 parties, & celui-ci en pesoit 57. Cette expérience répétée assez en grand & à la dose de quelques livres, a donné jusqu'à 63 par 100 de cuivre assez beau, quoique pas encore entièrement pur. On a remarqué dans le grand nombre d'essais qu'on a faits avec le nitre sur le métal de cloche, que quand on chauffe légèrement au commencement, on obtient un cuivre infiniment plus pur, & qu'il suffit d'employer depuis 12 jusqu'à 14 livres de salpêtre pour 100 de métal de cloche, tandis que si l'on chauffe d'abord brusquement, on n'a qu'un cuivre peu ductile ; dans ce dernier cas la quantité de nitre que l'on vient d'indiquer n'est pas suffisante, il en faut au moins 18 à 20.

La raison de ces phénomènes est aisée à concevoir ; quand on chauffe lentement, le nitre se fond peu-à-peu, l'oxygène qui s'en sépare successivement a le temps de se partager entre toutes les molécules de la masse métallique & d'oxyder l'étain ; en augmentant ensuite la chaleur par degrés, l'étain absorbe & retient tout l'oxygène, & l'alcali facilite la fonte de son oxide ainsi que celle du cuivre pur. Au contraire, l'action d'une chaleur forte au commencement, fait fondre tout-à-coup le nitre, qui s'élevant bientôt à la surface, répand tout son oxygène dans l'air, tandis que le métal se fondant quelque temps après, se rassemble promptement au fond du creuset, & ne présente plus qu'une très-petite surface à l'oxygène du nitre. On conçoit qu'alors on se doit avoir qu'un cuivre encore cassant.

EXPÉRIENCE XV.

On a aussi répété cette expérience en faisant fondre auparavant le métal de cloche en y jettant par paquets le nitre, & en brassant bien le tout. Cette manière d'opérer réussit très-bien,

mais il faut plus de nitre que quand on mêle ces deux corps en poudre grossière. Un quintal de métal de cloche ainsi traité, demande 15 à 16 livres de nitre, pour donner 59 à 62 parties de cuivre assez pur.

EXPÉRIENCE XVI.

On s'est assuré qu'en ajoutant au nitre une petite portion de potasse, la fusion du cuivre se faisoit beaucoup plus facilement & plus complètement, & que l'on gaignoit bien par cette addition le combustible qu'on use, lorsqu'on ne la fait pas.

EXPÉRIENCE XVII.

L'expérience nous a encore démontré qu'en mêlant 3 à 4 parties de nitre avec la quantité d'oxide de manganèse nécessaire pour purifier un quintal de métal de cloche, on parvenoit à fondre alors très-facilement le cuivre en une seule masse, tandis que sans cela il faut, comme nous l'avons déjà vu, un feu très-violent & long-temps continué, ou une opération longue & difficile pour séparer le cuivre & pouvoir le fondre à part. Nous reviendrons sur cet objet dans le dernier paragraphe.

§. VI. Départ du métal des cloches par les acides.

L'intention de ce travail étoit de multiplier & de varier les expériences, d'employer tous les moyens qui fournissent la chimie pour séparer les métaux qui forment l'alliage des cloches, & de connoître même l'action des substances qui par leur prix ne peuvent point être proposées pour l'usage en grand. C'étoit avant de questions chimiques auxquelles il étoit important de répondre, pour déterminer avec précision les véritables procédés utiles. Tous les chimistes savent que le métal des cloches peut être analysé exactement par l'acide nitrique, que cet acide en dissolvant le cuivre oxide l'étain, & qu'en pesant cet oxide bien lavé & bien séché, on reconnoît promptement la proportion de l'alliage.

Si les cloches contiennent du zinc, de l'antimoine & du fer, comme on l'a reconnu pour quelques-unes, l'antimoine reste oxidé avec l'étain ; le fer & le zinc peuvent être séparés de la dissolution nitrique par l'ammoniaque qui retient le cuivre ; ainsi l'on peut même reconnoître chacune de ces substances étrangères à l'étain ; mais elles ne méritent pas cette attention, lorsqu'on ne s'occupe que de l'art de départir le cuivre : on y reviendra d'ailleurs dans la suite de ce mémoire. Il ne devoit pas être question dans ces essais de l'action de l'acide nitrique qui dissout le cuivre, mais bien de la recherche d'un dissolvant qui pût enlever l'étain, sans tou-

cher au cuivre. On a pensé que la liqueur dissolvante qu'on emploie à Birmingham pour séparer l'argent du cuivre plaqué, & que M. Kair a fait connaître, pourroit servir à cet effet en modifiant plus ou moins sa préparation.

EXPERIENCE XVIII.

On a pris 50 parties de métal de cloche en poudre, on y a mêlé 100 parties de nitre, 50 parties d'acide sulfurique à 70 degrés & 100 parties d'eau, on a chauffé le tout dans un matras jusqu'à faire bouillir la liqueur ; il s'est dégagé du gaz nitreux. Le métal est devenu d'une couleur grise, à-peu-près comme par le grillage à l'air libre ; la liqueur n'a point pris de couleur bleue ni verte, elle est restée blanche. On a séparé la dissolution qui étoit trouble & laiteuse ; on a bien lavé & séché la matière métallique restante : elle avoit perdu 16 grains dans cette opération. On a ensuite exposé cette matière au feu ; elle s'est fondue assez facilement ; le métal qui en est résulté étoit d'une couleur jaunâtre, & n'étoit que très-peu ductile ; il y avoit à sa surface une matière rouge vitrifiée : le métal pesoit 444 parties, ce qui a fait 40 parties perdues pendant la fusion.

L'ammoniaque versée dans la dissolution en précipitoit une matière blanche d'abord, mais qui jaunissoit & se rouilloit bientôt après à l'air ; cet alcali mis en surabondance à la saturation de l'acide, n'a point formé de couleur bleue dans la liqueur. Ceci prouve que l'acide nitrique n'avoit agi que sur l'étain & les autres métaux blancs qui entrent quelquefois en petite quantité dans la composition des cloches ; il étoit aussi prouvé par-là que la liqueur d'essai ou dissolvante n'étoit point assez abondante, puisque le métal étoit encore cassant.

On a recommencé cette expérience avec d'autres proportions & en ajoutant une portion de sel marin, laquelle a été diminuée sur le nitre ; on a pris 500 parties de métal, 100 parties de nitre commun, autant de sel marin, 100 parties d'acide sulfurique & 400 d'eau. On a fait bouillir pendant quelques minutes, & les phénomènes ont été les mêmes que dans l'expérience ci-dessus ; il s'est formé beaucoup de cristaux blancs dus à la combinaison de l'oxide d'étain avec l'acide muriatique. En ajoutant beaucoup d'eau au mélange, la liqueur est devenue laiteuse, & il s'est déposé une poussière blanche sur le métal non dissous ; on a recueilli exactement cette poussière blanche, elle pesoit 159 parties. La portion qui avoit été dissoute par le mélange acide, conservoit une couleur grisâtre dans laquelle on voyoit beaucoup de points rouges cuivreux ; son poids étoit de 356 parties, ce qui fait quinze d'augmentation, sans compter la portion qui a été dissoute par la

liqueur. Cette dissolution mêlée à l'ammoniaque ; a donné un précipité blanc-jaunâtre ; elle n'a pris qu'une couleur bleue très-légère par l'addition de cet alcali en excès ; la poussière qui s'est séparée par l'eau de la liqueur où elle étoit dissoute, a pris une couleur rougeâtre en séchant, d'où l'on pense qu'il y restoit un peu d'oxide de cuivre. En effet, en la fondant avec de la potasse, on a obtenu un petit culot de cuivre assez ductile. La portion qui n'avoit point été dissoute (les 356 parties), exposée au feu dans un creuset, s'est facilement fondue ; il en est résulté un métal jaune pesant 311 parties, dont la ductilité étoit à-peu-près la même que celle du métal des cloches auquel on auroit ajouté 30 livres de cuivre pour 100.

Quoique ces deux expériences ne permettent pas de douter qu'avec une dose convenable des dissolvans on ne vint à bout de purifier le métal des cloches, cependant comme cette méthode ne pouvoit pas être adoptée pour affiner ce métal en grand, on n'a pas cru devoir les poursuivre plus loin.

9. VII. Essai de la liqution du métal des cloches par le plomb.

Il eût été fort à désirer qu'on eût pu trouver un métal ou un corps très-soluble, qui en s'emparant de l'étain sans toucher au cuivre, fût ainsi capable de séparer ces deux métaux. On avoit pensé que le plomb pourroit peut-être remplir cet objet par une chaleur douce & par un procédé analogue à la liqution, employée avec tant de succès dans le traitement du cuivre tenant argent ; mais cet espoir ne s'est pas réalisé, comme on va le voir par le détail des expériences suivantes.

EXPERIENCE XIX.

100 parties de métal de cloche ont été fondues avec 100 parties de plomb ; leur fusion a été assez prompte ; on l'a entretenue pendant 10 minutes. Le creuset refroidi & cassé à présent sous une masse de plomb qui paroît pur, un alliage plus blanc que le métal des cloches, très-distinct du plomb, & qui étoit plus cassant encore que le métal des cloches ; cet alliage avoit augmenté de 28 parties ; il étoit un composé de cuivre, d'étain & de plomb. Toute la masse métallique a été fondue lentement, sans qu'il ait été possible d'en séparer le plomb. Plusieurs autres métaux ont été employés avec aussi peu de succès.

EXPERIENCE XX.

C'est pour ne pas laisser en quelque sorte une question indécise, que l'on a essayé l'usage

du soufre, car il étoit facile de prévoir qu'il ne pourroit pas séparer les deux métaux alliés. 25 parties de soufre fondues avec 100 de métal de cloche, ont donné une matière grise, striée, très-cassante, bien différente du métal des cloches, quoiqu'il n'y restât que 7 à 8 grains de soufre; l'attraction de ce corps pour le cuivre est si grande, qu'il s'y unit rapidement, & qu'elle détermine même la combinaison avec l'étain qui sans cela n'auroit pas lieu dans un degré à beaucoup près aussi marqué; il en est résulté un sulfure de cuivre & d'étain, une espèce de matte grise, très-fragile, sans ténacité, très-fusible, cristallisable, &c. qu'il auroit fallu griller long-temps & traiter comme des mines de cuivre: elles-mêmes pour obtenir les métaux, & qui étoit devenue beaucoup plus difficile à départir & à affiner que ne l'est le métal des cloches, parce qu'il y a trois affinités à vaincre au lieu de deux.

§. VIII. Du métal des cloches allié avec le cuivre.

Après avoir essayé les différens moyens de séparer le cuivre de l'étain, il entroit dans le plan de ces recherches de déterminer quelle quantité de cuivre il faudroit ajouter au métal des cloches pour le rendre ductile; car si ce moyen pouvoit être employé, il épargneroit un grand déchet. On a fait sur cet objet les expériences suivantes.

EXPERIENCE XXI.

90 parties de métal de cloche ont été fondues avec 10 parties de cuivre de rosette. Le mélange s'est fondu très-facilement, & le métal qui en est provenu, n'a pas paru sensiblement plus ductile que le métal de cloche lui-même; sa couleur n'a voit presque pas changé; ainsi 10 parties de cuivre ajoutées à 90 parties de métal de cloche, sont loin de suffire pour rendre ce métal susceptible d'être converti en monnoie.

EXPERIENCE XXII.

190 parties de métal ont été mises à la fusion avec 20 parties de cuivre de rosette; on a obtenu 120 parties de métal bien fondu, mais toujours cassant, incapable d'être laminé, & ne supportant pas le coup de marteau, sans se diviser en beaucoup de parties.

EXPERIENCE XXIII.

100 parties de métal de cloche, & 30 parties de cuivre pur, n'ont donné par la fusion qu'un métal encore très-cassant & incapable d'être laminé.

EXPERIENCE XXIV.

Il a fallu arriver jusqu'à unir 80 parties de cuivre avec 20 de métal de cloche, pour donner à cet alliage la ductilité nécessaire pour le passer au laminoir & le rendre susceptible d'être coupé en saons & frappé en monnoie. Ainsi il faudroit ajouter 425 livres de cuivre rosette à chaque quintal de métal de cloche pour le laminé & le convertir en fils. Ce résultat est d'accord avec ce que l'on fait sur la propriété qu'a l'étain de détruire la ductilité du cuivre. Un lingot de ce métal allié à un vingtième d'étain, commence à se gercer sensiblement au laminoir, & il n'est pas douteux qu'en suivant même la proportion indiquée, on n'auroit pas toute la ductilité nécessaire à la fabrication prompte & facile de la monnoie qu'on a coutume de faire avec du cuivre pur.

§. IX. Résultats & comparaison des expériences précédentes; description d'une nouvelle méthode pour l'usage du métal des cloches en grand.

Parmi toutes les expériences qui ont été décrites dans les paragraphes précédens, il n'y a que l'oxidation ou le grillage à l'air, l'addition du nitre & de l'oxide de manganèse, qui puissent être employées avec succès pour séparer en grand le cuivre d'avec l'étain dans le métal des cloches. Pour se déterminer dans le choix d'une des méthodes fondées sur ces principes, il faudroit comparer leur résultat, les manipulations, le temps, l'appareil & le combustible qu'elles exigent. Sans doute une des plus promptes & des plus faciles seroit, sans contredit, l'emploi du nitre; il suffiroit, après avoir fondu le métal des cloches dans un bassin plat, d'y projeter 12 à 14 livres de nitre de la seconde cuite sur 100 de métal, de bien brasser la matière, d'en séparer l'oxide d'étain qui se formeroit à la surface, à l'aide du vent d'un soufflet, & de laisser affiner quelques heures le métal par la fonte. On obtiendrait ainsi 64 à 66 livres de cuivre pur par quintal, suivant le terme moyen de toutes les expériences connues; mais il y a dans cette méthode un grand inconvénient, c'est le haut prix du nitre. Il en faudroit pour 8 ou 9 francs par quintal de métal de cloche, sans y compter les frais de combustible, de travail, de construction & d'entretien des fourneaux. On ne pourroit donc le pratiquer que dans les lieux où le nitre seroit à bon compte; alors ce seroit un des moyens les plus simples.

L'usage de l'oxide de manganèse proposé par M. l'ellietier, présente une méthode moins chère, & qui paroît remplir une grande partie des vues qu'on a dans cet affinage; il ne faut

que 25 livres de cet oxide par quintal de cloches ; l'affinage ne demande qu'un simple mélange du manganèse avec le métal des cloches fondu, un brassage exact, puis on pousse à la fonte sans addition ; on obtient le cuivre en grenailles que l'on sépare & que l'on fond dans un creuset. Quoique ce procédé (1) exige trois opérations successives, il est cependant susceptible d'être employé en grand avec avantage ; on pourra même en diminuer la longueur & les difficultés en ajoutant un fondant à bas prix, après l'action de l'oxide de manganèse, afin d'obtenir le cuivre réduit & rassemblé dans la même opération. Nous savons que dans les ateliers, on a déjà disposé des fourneaux, pour exécuter ce procédé, qu'on y a fait provision de manganèse, & nous ne doutons pas qu'il n'ait du succès ; on n'a à craindre que l'augmentation du prix de cet oxide, la difficulté de s'en procurer de constamment & d'uniformément bon ; il sera d'ailleurs toujours nécessaire d'employer quelque fondant, pour diminuer la longueur & les difficultés de l'opération.

Quant à l'oxidation ou la calcination opérée à la manière d'un grillage avec ou sans fusion préliminaire, on a vu par les expériences pré-

céderentes qu'elle suffisoit pour opérer la séparation des métaux qui constituent les cloches, qu'il ne faut rigoureusement qu'oxidier l'étain, sans toucher au cuivre, pour obtenir ce dernier à part ; qu'on peut ensuite, en poussant le métal grillé à la fonte, avoir le cuivre plus ou moins pur, soit en grenailles, soit en grains agglutinés & même en culot, à l'aide d'un grand feu ; que la proportion d'oxygène à ajouter au métal dans cette oxidation, propre à en favoriser le départ, doit aller de 5 à 7 pour le quintal, suivant les différences qui se rencontrent dans l'alliage des cloches ; qu'on obtient jusqu'à 72 parties de cuivre d'un alliage qui n'en contiennent jamais plus de 80, par ce simple procédé ; enfin que le même métal coulé en plaques minces & calciné ou grillé plusieurs fois de suite, se purifie également & passe peu-à-peu à l'état de cuivre pur : tous ces résultats tirés des essais ci-dessus décrits étoient faciles à prévoir par la théorie, mais ils sont de plus d'accord avec la pratique, & ce point est plus satisfaisant. On fait depuis long-temps dans les ateliers & les manufactures, où l'on traite le vieux cuivre en grand, pour en faire différens utensiles, qu'en tenant le cuivre allié d'étain, de zinc, d'anti-

(1) Nous donnons ici la note d'une expérience faite devant nous par M. Pellétier, & rédigé par lui-même.

Procédé de M. Pellétier.

Une livre de métal des cloches a été mise dans un creuset. Lorsqu'il a été fondu, l'on y a projeté de l'oxide de manganèse (de la manganèse) en poudre ; l'on a tenu le tout avec une baguette de fer, la matière est devenue pulvérulente ; l'on a tenu le creuset rouge, en agitant la matière de temps en temps, & en y ajoutant du manganèse par petites portions, & à distances éloignées. L'on a employé 6 onces de manganèse, & le creuset a été tenu rouge pendant quatre heures, & sur la fin, l'on a augmenté le feu pour faire entrer le mélange en fusion. On s'est servi d'un double creuset pour cette expérience.

L'on a ensuite cassé le creuset, afin d'en séparer la matière ; tous les grains de cuivre ont été réunis à l'aide de la pulvérisation, & on les a fondus avec le culot qui étoit au fond du creuset ; le produit de la fonte a été un culot de cuivre du poids de 1 lb 3 1/2 3 (ce qui donne 71 livres 14 onces au quintal). Ce cuivre contenoit encore une petite portion d'étain ; l'essai que j'en ai fait, m'apprend qu'il en tenoit 2 1/2 par 100.

En réduisant les scories avec du flux noir, l'on obtient un métal blanc & argentin (c'est de l'étain uni à une petite quantité de cuivre) ; le poids du culot fourni par les scories, est de 3 onces 1 gros (a) ; ces étain le laisse couper au couteau, mais il se brise sous le marteau.

Dans cette expérience, l'on a obtenu,

Savoir :

Cuivre..... 1 lb 3 1/2 3, ou 71 lb 14^{on}. au quintal.

Étain pur,

Réduit des scories, 3 3/4 3, ou 13 lb 8^{on}. ou 13 lb 8^{on}. 5 5^{on}. 14 5^{on}. au quintal.

Total..... 1 lb 4 3/4 3

L'on avoit employé 14 onces de métal des cloches ; il se trouve donc une perte de 3 onces 4 gros qui est due au cuivre, & principalement à l'étain qui s'est volatilisé dans la calcination.

(a) L'on n'a réduit qu'une partie des scories, & l'on en a conclu la quantité de métal qu'elles fourniroient par cent. Le culot obtenu de la portion réduite, pesant 3 onces 1 gros d'étain, sur une livre & demie de métal, répond à 13 livres 8 onces 5 gros 14 grains au quintal.

moins

moins & de tous les métaux très-combustibles & très-volatils, fondu avec le contact de l'air, en l'exposant sur-tout en couches minces, en le brûlant & l'agitant, il s'affine de plus en plus. On fait qu'on avance beaucoup cet affinage, soit en versant de l'air comprimé à la surface de ce métal fondu par le moyen des soufflets, soit en y jetant de petites quantités d'eau, qui opère avec rapidité l'oxidation de l'étain, & qui en emporte même l'oxide en vapeur. Ces divers procédés sont pratiqués en grand dans beaucoup d'endroits. Les expériences décrites ci-dessus ne diffèrent de ces données de l'expérience en grand, que parce que l'alliage des cloches a été plusieurs fois brûlé sans fusion dans les nôtres, tandis qu'en grand on affine toujours par la fusion. Nous avions voulu par-là éviter les pertes qu'entraîne nécessairement l'oxidation du cuivre, sur-tout lorsque son oxide s'unit à celui d'étain. A la vérité il seroit impossible d'oxidier en grand le métal des cloches réduit en poudre, comme nous l'avons presque toujours fait en petit, & c'est pour cela qu'on sera obligé de fondre & de brûler par scorification; ce dernier procédé permettra d'ailleurs de séparer plus facilement en grand l'oxide d'étain de l'oxide de cuivre qui se réduit aisément, en employant un fondant à bon marché, tels que du verre à bouteille, des laitiers, du sel marin, du fiel de verre, &c. Dans quelques-uns des essais précédents, après avoir oxidé le métal des cloches jusqu'à l'augmenter de 6 pour 100, on l'a fondu avec du verre pilé, de la potasse, de la soude, du borax, &c. &c. on a obtenu le cuivre plus pur & rassemblé en culot. Car on a vu que sans l'emploi des fondans, on ne sépare qu'avec une extrême difficulté le cuivre de l'oxide d'étain, & on n'a le premier qu'en grains ou en poudre.

C'est par des procédés analogues aux expériences sur l'oxidation spontanée & fondée absolument sur les mêmes principes, que MM. Auguiste, & Dizé réuni à M. Jeannety, ont proposé de purifier le métal des cloches. Chacun d'eux a eu des succès qui confirment ce que nous avons exposé. M. Auguiste fond le métal des cloches sur une coupelle; il le scorifie en entier en agitant les oxides d'étain & de cuivre qui se forment à la surface jusqu'à ce qu'ils soient réduits en une poudre d'un gris foncé; il ajoute à cette masse scorifiée six onces de sel marin par livre de métal; il la chauffe fortement dans la même coupelle jusqu'à ce qu'elle soit en pâte, & qu'il aperçoive des globules de métal rouge. Alors il donne un bon coup de feu pour rassembler ces molécules en grenailles; il met toute la matière dans un creuset, où il la fond au fourneau à soufflet ordinaire. Il obtient ainsi depuis 58 livres jusqu'à 71 livres de cuivre par quintal de métal des cloches; il tire encore partie des scories en réduisant l'étain & les autres métaux qu'elles contiennent.

MM. Dizé & Jeannety fondent & oxident d'abord le métal des cloches dans un test à rotir; ils y mêlent ensuite deux onces de sable fin & pur, par livre; ils le poussent au feu dans un creuset à la forge; ils y ajoutent à la fin un huitième de verre pilé ou de sel de verre pour entraîner l'oxide d'étain, faciliter sa vitrification avec le sable, ainsi quela séparation du cuivre (1).

Il est nécessaire d'ajouter ici quelques réflexions générales sur ces procédés qui consistent à oxidier le métal des cloches par l'air. Il est certain qu'on oxide le cuivre en même-temps que l'étain, puisque l'on réduit le métal en espèces de scories; mais on fait que l'oxide de cuivre repasse à l'état métallique par une forte chaleur; la difficulté que l'on éprouve à fondre le cuivre au milieu de

(1) Nous joignons le détail exact des procédés de MM. Auguiste, Dizé & Jeannety, tels qu'ils nous ont été remis, & qu'ils ont été exécutés devant MM. Tiller, Caillet, d'Arcet & moi, commissaires de l'Académie réunis avec MM. du comité des monnoies de l'Assemblée nationale.

Procédé de M. Auguiste pour obtenir séparément le cuivre & les autres matières qui entrent dans la composition du métal des cloches.

Après avoir placé dans un fourneau à air une coupelle suffisamment distante des barres pour quelle acquière un grand degré de chaleur, je pose le métal des cloches dans la coupelle, & la recouvre d'un vase de forme sphérique qui lui est supérieur en diamètre, afin d'éviter que le charbon ne tombe dans la matière. Je laisse entre le vase supérieur & le vase inférieur une distance pour établir un courant d'air à la surface du métal. Quand il a reçu un degré de chaleur suffisant pour être fondu, je donne un coup de feu. Aussi-tôt après j'ouvre le fourneau, j'enlève le couvercle de dessus la coupelle, pour que le contact de l'air froid détermine plus promptement la *chaux* d'étain à se former à la surface. A mesure que les pellicules se forment je les tire avec un râteau de fer sur les bords de la coupelle, & ainsi de suite jusqu'à ce que ce qu'il ne reste plus de métal liquide. Alors je rapporte tout ce qui est sur les bords dans le centre de la coupelle, & je continue à broyer jusqu'à ce que le métal réduit en poudre acquière une couleur grise. Quand il est dans cet état, j'ajoute 6 onces par livre de sel marin, je recouvre la coupelle de son dôme, & je mets de nouveau le feu au fourneau. Quand la matière est en pâte, & que le départ de l'étain ou du cuivre se manifeste par des globules de métal rouge, je donne un coup de feu pour les déterminer à se rassembler en grenailles. La

Chimie. Tome II.

l'oxide d'étain qui le retient, & le rend réfractaire, oblige à l'emploi des fondans, & est cause qu'on n'obtient presque jamais le cuivre qu'en grenailles; aussi dans les essais que nous avons vu faire des deux procédés indiqués, a-t-on été obligé de reprendre la masse chauffée avec les fondans, d'en séparer les portions de grosses grenailles de cuivre, de pulvériser le reste de la masse, & c'e la laver pour emporter l'oxide d'étain avec les scories légères, & pour avoir

le cuivre précipité & isolé. C'est même par la suite de cette opération que nous avons trouvé que dans l'essai de M. Auguste, par le sel marin, ce sel est en partie décomposé par l'oxide d'étain. C'n a lieu d'espérer à la vérité que ces difficultés seront levées par le travail en grand, sur-tout si on a l'intention de n'oxider le métal de cloches que jusqu'à l'augmentation de 6 à 8 pour 100; d'ailleurs la réduction, la fusion, la séparation des scories, l'affinage en un mot, par

surface de la coupelle est couverte de bouillons de matière enveloppée de sel marin cristallisé qui recouvre la *chaux d'étain* & des autres métaux qui se manifestent par une couleur jaune pâle. C'est dans cet état que l'on enlève la matière du fourneau pour la transporter dans un autre creuset où je fais la fonte. Le cuivre se précipite au fond du creuset, il se forme au-dessus une scorie de couleur cendrée. Cette scorie est sèche, & se réduit facilement en poudre dans le mortier. Le cuivre qui en résulte est pur, & entièrement ductile, au point qu'il peut passer aux travaux sans éprouver le retard d'un nouvel affinage. La scorie mêlée avec de la poussière de charbon allumé, donne un métal blanc d'autant plus fiable l'étain est plus surchargé d'antimoine, de bismuth, de cuivre, &c.

Produit d'une livre de métal de cloches.

	<i>La livre.</i>		<i>Le quintal.</i>	
Une livre de matière de cloches a rendu en cuivre un poids de	10 ^{lb} 11 ^{oz} 2 ^{gr}	45 ³ / ₄	70 ^{lb} 12 ^{oz} 7 ^{gr}	
Cela donne au quintal	100 ^{lb} 11 ^{oz} 2 ^{gr}	45 ³ / ₄	70 ^{lb} 12 ^{oz} 7 ^{gr}	
La même livre a rendu en métal blanc un poids de	3	1	14 ³ / ₄	
c'est pour le quintal, ...	3	1	14 ³ / ₄	19 11 9
Totaux	14	3	59 ¹ / ₄	90 7 7
Déficits généraux ..	1	4	12 ³ / ₄	9 8 1
	1 ^{lb} 11 ^{oz} 2 ^{gr}	45 ³ / ₄	70 ^{lb} 12 ^{oz} 7 ^{gr}	100 ^{lb} 11 ^{oz} 2 ^{gr}

Procédé de MM. Dixt & Jeannety, pour séparer l'étain allié à la matière des cloches.

Calcinez 8 onces de métal de cloches dans une moufle ou dans un test de terre, jusqu'à ce qu'il ait augmenté en poids d'une once & un gros; la calcination faite, mêlez à cette *chaux métallique* deux onces de sable fin & exempt de terre calcaire; jetez ce mélange dans un creuset bien rouge, continuez le même degré de chaleur pendant une demi-heure, pour donner le temps à la *chaux* de cuivre de lâcher la base de l'air pur qu'elle avoit reçue dans la *calcination*. Cela fait, le feu doit être poussé assez fort pour liquéfier ce mélange; d'abord que la fusion commence, il devient noir; en continuant ce degré de chaleur, il prend une couleur rouge très-foncée. Alors cette masse vitreuse laisse apercevoir des globules de cuivre pur infiniment petits & très-multipliés. Le sable, lorsqu'il est seul, mêlé avec la *chaux d'étain*, est un fondant très-réfractaire au degré de chaleur que l'on peut donner dans nos fourges, nous sommes obligés d'ajouter sur la fin de l'opération un huitième de fondant comme le verre pilé, le sel de verre, &c. Le feu donne de la subtilité au sable, & laisse précipiter une partie des globules de cuivre. Au bout d'une heure de feu, la réduction du cuivre est finie, & la *chaux d'étain* passe en entier en vitrification avec le sable. Ce procédé nous a donné 4 onces 6 gros de cuivre à-peu-près sur 8 onces du métal des cloches.

Nous avons fait un essai dont M. d'Arcet nous avoit donné l'idée, il y a long-temps. C'est l'usage en petit du fourneau à manche; cette expérience a été faite sur 5 livres de cloches calcinées dans la moufle. Cette opération a duré quatre heures, le résultat a été une masse de métal que nous croyons pour le moins à moitié affiné. La méthode simple de ce procédé, & la présomption d'une réussite, méritent que l'académie demande qu'il nous soit donné les facilités de répéter cette expérience dans un fourneau à manche construit en grand.

l'une ou l'autre des méthodes simples décrites jusqu'ici, réussissent bien mieux dans de vastes fourneaux où le feu ne perd point son activité, où le travail se continue sans relâche, où les matières échappées à un premier travail, sont reprises successivement.

Les difficultés que présente le cuivre oxydé en même-temps que l'étain, pour être séparé de ce dernier, pour être réduit & fondu, m'ont porté à chercher s'il ne seroit pas possible de tirer parti de l'une des expériences décrites plus haut (expérience 6, § 3), & si l'on ne pourroit pas en faire une espèce d'affinage en grand. On se rappelle qu'on réussit à obtenir le cuivre pur du métal des cloches en oxidant seulement jusqu'à l'augmentation de six livres sur chaque quintal; qu'on n'obtient qu'un émail sans réduction, en poussant à la fonte ce métal oxydé & vitrifié jusqu'à l'augmentation de seize à dix-huit livres par quintal; que lorsqu'il a été oxydé à ce point, on peut le rappeler à l'état métallique en le mêlant avec deux fois son poids de métal de cloches; que ce dernier métal ajouté perd en même-temps son étain qui enlève l'oxygène au premier. D'après ces principes, voici comment il sera possible de convertir cette expérience en une méthode pour affiner en grand le métal des cloches. On oxidera un tiers de ce métal jusqu'à le faire augmenter de dix-huit livres par chaque quintal; cette oxidation sera pratiquée en grand dans un fourneau à réverbère, ou un simple four dont le fond formera un bassin ou une espèce de coupelle; en agitant le métal fondu avec des râteaux de fer, elle ne durera qu'une demi-heure ou une heure au plus. Cet oxide divisé en espèces de scories spongieuses, sera jeté dans des creusets sur le métal de cloches fondu, à la dose d'une partie du premier sur deux parties du second (car on sait que contenant dix-huit livres d'oxygène au quintal, il suffit à l'oxidation de l'étain contenu dans les deux autres quintaux de ce métal, & à la sienne propre, en faisant absorber $\frac{1}{2}$ par quintal à toute la masse) On brassera fortement ce mélange, les dix-huit livres d'oxygène se partageront dans les soixante-quinze livres d'étain qui entrent dans chaque masse de trois quintaux du métal. Pour séparer l'étain oxydé & obtenir le cuivre réduit, fondu & affiné, on ajoutera à la masse treize à quarante livres sur trois cens de cendre de verre pilé ou de sel marin, ou d'un mélange de ces diverses matières fondantes; on agitera bien ces matières avec le métal fondu; on le tiendra en belle fonte pendant deux ou trois heures; on l'examinera en retirant des petites portions avec un ringard creusé en cuiller à l'extrémité, & lorsqu'il paroîtra con-

venablement affiné, on le coulera en plaque ou dans des lingotières. Ce procédé, comme on voit, est le plus simple de tous ceux qui ont été indiqués jusqu'à présent. Il n'exige aucune matière étrangère, c'est une portion ou un tiers du métal même qui remplit ici les usages du nitre ou de l'oxide de manganèse; cette opération est en même-temps la plus prompte, la plus facile & la moins chère de toutes; elle ne demande de frais que le combustible dont il faudra même une moindre quantité que dans toutes les autres, & l'appareil des fourneaux qui sera très-facile; en faisant tous les frais de cet affinage, on reconnoît qu'ils n'iront point, autant qu'on peut en juger, au-dessus de cinq livres par quintal de métal de cloche; enfin, il est hors de doute que ce sera, de tous les procédés, celui qui donnera le plus de cuivre affiné; car il n'y a ici aucun moyen de destruction pour ce métal; on pourroit tirer un parti utile des scories, & les réduire en étain de bas aloi, comme l'ont fait MM. Pelletier & Auguette; ces avantages suffisent pour établir sa supériorité sur ceux qu'on a proposés jusqu'actuellement; il n'est même pas besoin de reprendre en détail toutes les questions posées au commencement de ce mémoire; la réponse qui renferme presque toutes les autres, est contenue dans cette assertion, que les expériences citées nous autorisent à regarder comme démontrées: le métal des cloches est facile à affiner sans frais considérables; on peut en obtenir au moins soixante-quatre livres de cuivre pur par quintal; on réduira toutes les cloches à la disposition de la nation, en un métal pur, susceptible d'être employé à tous les usages, & sur-tout à la fabrication d'une monnaie; enfin, on évitera tous les inconvénients d'une monnaie faite avec un alliage dur, cassant, & coloré d'une manière à donner toutes les ressources possibles aux spéculations & à l'avidité de la fraude.

Expériences sur l'affinage en grand du métal des cloches, faites à Romilly, par M. PELLETIER, en juillet & août 1791.

Affinage avec l'oxide de manganèse.

Le lundi premier août 1791, on a mis dans un fourneau 400 livres de métal de cloches; il étoit neuf heures & un quart, & le fourneau avoit été chauffé d'avance. A neuf heures & demie, le métal étoit en belle fonte, on y a projeté quelques pelletées d'oxide de manganèse réduit en poudre, & on a brassé le métal avec l'oxide de manganèse, à l'aide d'un ringard, ce qui s'opère avec facilité (1); à neuf heures trois quarts,

(1) On avoit pesé 200 livres d'oxide de manganèse dans un petit tonneau placé à côté du fourneau, & c'est dans ce tonneau que l'on prenoit l'oxide de manganèse, employé dans cette opération.

ou y a projeté d'autres pelletées de manganèse, & on a procédé au bralement; à dix heures un quart, on a encore projeté quelques pelletées de manganèse. Ayant ensuite retiré un essai, on l'a trouvé d'une couleur jaune & recevant l'empreinte du ciseau. Il a paru d'un rouge plus vif que l'alliage que l'on obtient de parties égales de cuivre & de métal de cloches.

A onze heures, on a fait une nouvelle projection d'oxide de manganèse, & on a ensuite retiré un second essai, il étoit d'un beau rouge & très-doux à la lime.

A midi, on a fait une nouvelle projection d'oxide de manganèse, & l'on a brassé. Le troisième essai que l'on a retiré, étoit très-malléable & plus rouge que le précédent.

A midi & demi, un quatrième essai retiré du fourneau a paru plus rouge & d'un grain plus fin que le troisième.

A une heure, on a augmenté le feu, & la porte du fourneau a été scellée.

Ayant alors pesé l'oxide de manganèse, qui restoit dans le ronneau, il ne s'en est trouvé que 20 livres; on en avoit donc employé dans l'expérience 80 livres.

A une heure & demie, on s'est disposé à couler. Pour cet effet, on a ouvert le fourneau, & à l'aide d'un ringard, on a repoussé la scorie vers le fond du fourneau; ce qui a donné la facilité de puiser le cuivre à la cuiller, & on l'a coulé en deux fois dans des lingotières. On a eu de ces deux coulées 237 livres de cuivre.

La porte du fourneau ayant été scellée de nouveau pendant un quart-d'heure, il y a eu une petite quantité de cuivre, qui paroissoit ruisseler de la scorie dans le puisoir, on l'a coulé à la cuiller dans des lingotières, son poids a été de 16 livres; ce qui fait avec la quantité précédente 303 livres de cuivre.

On a ensuite, à l'aide d'un ringard, retiré les scories qui paroissoient très-pâteuses; elles pesoient 296 livres. Elles étoient d'une couleur plombée, & l'on voyoit dans leur intérieur quelques grains de cuivre: si l'on ajoute le poids de ces scories à celui du cuivre, on a en tout 599 livres de matière.

Comme on n'avoit employé que 400 livres de métal des cloches & 80 livres d'oxide de manganèse, l'augmentation de 119 livres a paru devoir être attribuée à ce qu'avant l'opération, la fosse du fourneau étoit raboteuse & remplie de crasse que l'oxide de manganèse a vitrifiée & a entraîné dans les scories. On en a été bien convaincu, en retrouvant dans les scories des débris de brique, de la fosse même du fourneau qui seroit depuis long-temps.

Affinage avec une portion de métal de cloche oxidé.

Le 30 juillet 1791, on a pesé 100 livres de

faire l'oxidation; une partie a été mise dans un fourneau à réverbère, dont la fosse étoit plate. Comme le fourneau étoit bien échauffé, le métal n'a pas tardé à devenir rouge; alors on l'a brisé, à l'aide d'un ringard, & on l'a aussitôt étendu sur toute la surface du fourneau, après quoi on l'a continuellement remué, en se servant du même ringard, jusqu'à ce que le métal ait paru suffisamment oxidé. Alors on a retiré ce métal oxidé, & on a mis dans le fourneau une des deux autres parties des 100 livres; on l'a brisée de même, & après son oxidation, on a traité de la même manière la troisième partie des 100 livres. Chaque oxidation a demandé une heure & demie. La matière réunie & pesée s'est trouvée du poids de 221 livres.

Le 2 août 1791, on a mis dans un fourneau à réverbère, qu'on avoit eu l'attention de tenir bien chaud, 300 livres de métal de cloches, il n'a pas tardé à entrer en fusion; aussitôt on y a ajouté 166 livres & demie du métal des cloches oxidé de l'expérience précédente, proportion indiquée par M. Fourcroy. Lorsque tout cet oxidé a été introduit dans le fourneau, on a brassé pendant un bon quart-d'heure, afin que le métal oxidé fût parfaitement mêlé avec le métal non oxidé, lequel étoit en parfaite fusion.

Ayant alors retiré un essai, on l'a trouvé de nature différente du métal des cloches ordinaires; étant limé, la poussière étoit jaune, & sa cassure de couleur grise commençoit à paroître fibreuse, le ciseau s'y marquoit bien un peu, mais il étoit encore dur à la lime, comparé avec le premier essai de l'expérience faite avec l'oxide de manganèse.

Une demie-heure après, on a retiré un second essai qui avoit acquis très-faiblement de la qualité; sa couleur à la lime étoit plus jaune, & sa cassure plus fibreuse avoit une couleur plus cuivrée.

Un troisième essai retiré du fourneau, une demie-heure après, étoit d'une couleur jaune rouge, & plus doux à la lime que le précédent.

Un quatrième essai a été retiré, une demie-heure après, il étoit plus rouge & plus fibreuse que les trois premiers essais, il paroissoit aussi bien plus malléable.

Depuis le cinquième essai jusqu'au dixième, retirés, comme tous les précédents, de demie-heure en demie-heure, chaque essai a augmenté progressivement de qualité, de couleur rouge, de douceur à la lime & de ductilité.

Après cinq heures de fusion & d'affinage, on a augmenté le feu qui cependant avoit été jusqu'alors entretenu à un degré assez fort, la porte a été scellée; après une demie-heure d'un feu très-vif, on a retiré un onzième essai qui a présenté tous les caractères d'un bon cuivre. Alors

on a coulé le cuivre, à l'aide d'une cuiller, en ayant soin de repousser avec un ringard les scories au fond du fourneau. Pendant que l'on couloit le produit de cette fonte dans des lingotières, on voyoit une fumée épaisse, blanche, qui sortoit du métal en fusion, &c. qui s'arrêtoit sur les corps qu'on lui opposoit sous la forme d'une poudre blanche, &c. au dessus des lingots coulés, on distinguoit des petites cristallisations blanches &c. en aiguilles; c'étoit de l'oxide d'étain : le produit obtenu en cuivre a été de 145 livres.

Après la coulée, on a fermé la porte du fourneau, &c. on l'a sablée; le feu a été encore entretenu pendant une demi-heure, par ce moyen une partie du cuivre contenu dans la scorie, s'en est séparée &c. s'est ramassée dans le puifoir, d'où il a été pris à la cuiller. Il y en avoit 23 livres 8 onces, qui réunies aux 125 livres précédentes, &c. au poids des essais réunis de 1 livre 13 onces, font en tout 270 livres 5 onces.

Les scories retirées avec des ringards, pesoient 220 livres, ce qui forme avec le cuivre ci-dessus un total de 490 livres 5 onces, plus fort de 23 livres 13 onces que le total des métaux employés; mais cette augmentation dépend manifestement dans cette expérience, comme dans la précédente, du mauvais état de la sole du fourneau, &c. du mélange de la terre avec les scories.

Toute l'opération a duré six heures.

Quant au rapport du cuivre obtenu dans ce second affinage, relativement au métal des cloches employé, on a eu 270 livres 5 onces de cuivre sur 450 livres du métal des cloches; ce qui donne 60 livres de cuivre par 100 livres d'alliage de cloches.

R E F L E X I O N S .

Si l'on calcule le produit de la première expérience, on trouve qu'elle a donné soixante &c. quinze trois quarts de cuivre par 100 de métal des cloches; comme on a eu une trop grande quantité de scories, on auroit désiré répéter la même expérience; mais cela n'a pas été possible, attendu la quantité de métal de la même cloche, qu'on avoit destiné à ces deux expériences comparatives.

On a eu aussi occasion de voir, en répétant cette expérience, qu'on s'étoit trop pressé d'ajouter de l'oxide de manganèse: car, après les deux premières projections, qu'on peut évaluer à environ vingt livres, le métal étoit beaucoup plus affiné que ne l'étoit le métal de M. Fourcroy, après le mélange qu'il indique du métal oxide avec le métal non oxidé; &c. que nous avons reconnu par la couleur & l'action de la lime. Et métal des cloches. On les a partagées en trois parties, pour avoir une plus grande facilité à en

comme dans l'expérience de M. Fourcroy, le métal s'affine, en le runant dans le fourneau, sans de nouvelle addition de métal oxidé, il est certain que dans l'expérience faite avec l'oxide de manganèse, le métal se seroit de même affiné, sans y ajouter de nouvel oxide de manganèse. On a cru devoir infiltrer sur cette réflexion, afin que dans une autre expérience, on porte son attention sur ce phénomène; une fois les proportions de l'alliage des cloches changées &c. le cuivre se trouvant plus abondant qu'il n'est dans ce métal, l'étain vient s'oxidier &c. même se volatiliser à la surface, sans déterminer la combustion du cuivre, tandis que le cuivre & l'étain se brûlent ou s'oxident ensemble, lorsque l'étain fait le cinquième de l'alliage.

D'après tous les essais qui ont été faits dans la manufacture sur le métal des cloches, auquel on alloit le cuivre, n'importe dans quelle proportion, on a observé que le nouvel alliage tenu en fusion pendant quelque temps, s'affinoit en raison de l'étain qui s'oxidait.

On a vu encore que, lorsqu'on ajoutoit à du métal des cloches fondu, soit de l'oxide de manganèse, soit du métal des cloches oxidé, ce n'étoit point aussi-tôt après le mélange que le métal avoit acquis le degré d'affinage, mais qu'on l'y amenoit, en le tenant ensuite dans le fourneau pendant quelques heures. Aussi paroit-il que l'oxide de manganèse ou le métal des cloches oxidé ne font d'abord qu'oxidier une portion d'étain de ce métal, &c. qu'alors les proportions de cuivre & d'étain n'étant plus les memes, l'étain continue &c. finit de se brûler &c. de se volatiliser seul &c. par la seule action continuée du feu, en entraînant à la vérité toujours avec lui une portion de cuivre, qui est de même brûlée.

D'après toutes ces observations, voici comment l'on pourroit entreprendre l'affinage du métal des cloches: on chargerait de métal des cloches un fourneau de reverbera à affinage; lorsqu'il seroit bien fondu, on y ajouterait, soit un peu d'oxide de manganèse, soit des battitures ou des écailles de cuivre, qui tombent dans les cuves où l'on décape le cuivre, soit encore une portion de métal des cloches, que l'on auroit fait oxidier auparavant, soit enfin du cuivre en nature: on braiseroit bien, &c. ensuite on retireroit un essai que l'on compareroit avec le métal de cloche, dont on auroit chargé le fourneau. Si l'on trouve que sa couleur soit changée, &c. qu'elle soit d'une teinte plus rouge que ne l'étoit le métal des cloches employé, alors il suffira de le tenir pendant quelques heures au fourneau, jusqu'à ce qu'enfin l'essai indique qu'il est assez affiné; & avant de le couler, il faudra avoir l'attention de repousser les scories vers le fond du fourneau. Si, à la première prise d'essai, l'on juge qu'il n'y a pas un assez grand changement dans la qualité & la couleur du métal, alors on pourroit y ajouter, soit du métal

de cloches oxidé, soit de l'oxide de manganèse, &c; & on ne peut encore avoir l'attention de rebraiser plusieurs fois au commencement de l'opération, pour que l'oxide qui nage au-dessus du métal, soit bien mélangé avec le métal non affiné.

Quant à la scorie, elle se trouve contenir des grains de cuivre affiné, elle contient en outre de l'oxide d'étain & de l'oxide de cuivre. On en pulvérisera une partie, dont on se servira pour un nouvel affinage, le cuivre qu'elle contient, viendra aussi augmenter la proportion de celui qui est contenu dans le métal des cloches; ce qui, comme on doit le juger d'après la théorie qui a été établie sur ces opérations, déterminera l'affinage du métal des cloches.

Il ne faudra donc après le premier affinage, pour un travail suivi d'affinage de métal des cloches, ni oxide de manganèse, ni sel marin, ni faire calciner du métal des cloches. Chaque opération fournira des scories qui contiendront du cuivre à l'état métallique, & du cuivre à l'état d'oxide, lesquels seront plus que suffisants pour les affinages suivans.

On aura néanmoins des crasses ou scories plus que suffisantes, dont il faudra se débarrasser; on pourra les piler, & en séparer par les lavages, tous les grains de cuivre que l'on fondra dans le même fourneau de réverbère. Le reste sera traité au fourneau à manche, & l'on obtiendra un métal blanc, aigre & dur, composé de cuivre & d'étain, qui sert, comme on sait, à beaucoup d'usages.

Tel est le détail des deux essais faits en grand, d'après le procédé de M. Pelletier, & d'après celui que j'ai donné au public au mois de septembre 1791; je ne me permettrai aucune réflexion sur leur différence & leur résultat, on sent assez quel est l'avantage de n'avoir pas besoin de métal ni de matière étrangère pour faire l'affinage du métal des cloches; on conçoit, d'ailleurs, que, malgré la défaveur apparente du mien, par rapport au produit en cuivre, un travail en grand non interrompu donnera facilement plus de soixante livres de cuivre pur au quintal; c'est d'ailleurs au temps & aux expériences faites dans les ateliers où on purifie le cuivre, à prononcer à cet égard.

ALLONGES. Les allonges sont, comme leur nom l'indique, des vaisseaux qui servent à allonger les appareils en usage en chimie; elles sont faites de différentes matières, il y en a de métal, de verre & de terre; leur forme est soumise à l'usage auquel on les destine. La plupart sont droites, & ressemblent à un fuseau, c'est-à-dire, qu'elles ont une ouverture large, & l'autre étroite, qui se termine en bec d'entonneau, & elles sont renflées dans le milieu; d'autres avec une ouverture large, vont en diminuant par degrés insensibles jusqu'à la pointe qui finit en crochet.

L'usage des allonges est d'écarter du feu les produits que l'on obtient dans les opérations de la chimie, en s'adaptant soit au col d'une cornue, soit au bec d'un alambic, pour porter dans un récipient les matières sublimées: elles ont encore un autre avantage, c'est de présenter aux principes peu volatils qui se dégagent des corps soumis à la distillation, une base sur laquelle ils se déposent, & où on peut les obtenir séparés de ceux qui sont plus volatils, & qui passent jusque dans le récipient.

Les allonges de métal servent plus souvent dans les arts en grand, & dans la pharmacie pour les distillations à l'alambic, que dans la chimie proprement dite. On voit une allonge de cette espèce, fig. 9, classe sixième; elles sont presque toutes courbées à leur extrémité, pour entrer dans des bouteilles placées verticalement; on ne peut s'en servir que dans des opérations où les matières n'ont pas d'action sur l'étain; car c'est ordinairement de ce métal qu'elles sont faites.

Les allonges de verre sont celles qui sont le plus employées dans les laboratoires de chimie; lorsque le col d'une cornue ou est trop court ou trop gros pour pouvoir s'adapter au récipient, on y ajoute alors une allonge; par ce moyen, on peut joindre les parties de l'appareil, & les produits sont en même-temps éloignés de la chaleur, condition quelquefois nécessaire pour certaines opérations.

La fig. 8, classe sixième, représente une allonge de cette nature.

Les allonges de verre sont de tous les volumes & de toutes les formes possibles; il en est de si larges, qu'elles peuvent servir de récipient pour les matières qui deviennent concrètes en se sublimant.

Les allonges de grès ne sont presque pas en usage, cependant on s'en sert dans plusieurs ateliers pour les distillations des acides, & spécialement des eaux fortes. Je ne sais pas pour quoi on ne les emploie pas plus communément en chimie, en place des allonges de verre qui sont très-chères, & infiniment plus fragiles. Leur forme peut être toute aussi variée & multipliée, suivant l'exigence des cas, que celle des allonges de verre.

On peut, avec avantage, faire servir les cols de cornues & de matras cassés, au même usage, souvent même ils sont plus utiles que des allonges de verreries, dont la large ouverture, munie d'un rebord saillant, est très-sujette à les faire casser, pour peu qu'elles soient trop serrées dans les appareils.

On appelle quelquefois allonges dans les laboratoires, les ballons à deux tubulures. Voyez les mots APPAREILS, BALLONS, DISTILLATION et SUBLIMATION.

ALMAKANDA, ALMAKIST, ALMARIAL, ou ALMARHAZ. (Pharmacie.) Sy-

nonymes employés par les écrivains arabistes, pour désigner la litharge ou oxide de plomb.

ALMARGEN. (*Pharmacie.*) Dénomination employée par les écrivains arabistes, pour désigner le corail.

ALMEZEREON. (*Pharmacie.*) surnom d'une espèce d'électuaire ou confection purgative, très-violente, décrite par Mésué, qu'il recommande comme un hydragogue très-efficace dans l'hydro-pisie, mais qui n'est plus employée de nos jours.

ALMICH ou **ALMISA.** (*Pharmacie.*) Mot arabe & employé par quelques anciens pharmacographes & chimistes, pour désigner le musc.

ALMIZADIR. (*Pharmacie.*) Expression des arabes pour désigner le verdet ou acétite de cuivre.

ALMYRA. (*Pharmacie.*) Mot arabe, & que l'on trouve dans quelques pharmacographes anciens, par lequel ils désignent la chaux.

ALMYRINTHRA. (*Pharmacie.*) Ce mot que l'on trouve dans la formule d'une poudre dentrificée décrite par Nicolas Myrepsus, paroît très-équivoque à Léonard Fuchs, son interprète. Il présume avec assez de vraisemblance que ce mot vient de l'arabe *almyra*, & que par cette expression l'auteur a voulu désigner la chaux.

ALOEDAIRE. *Alœdarian* des Grecs. (*Pharmacie.*) Cette dénomination étoit employée par les Grecs, pour désigner un remède composé d'aloes, & de différentes substances purgatives & aromatiques. Aëce nous a conservé dans ses ouvrages, plusieurs formules d'alœdaires qu'il a tirées d'Orbasé & de Philagrius. Nous en rapporterons une qu'il nomme *alœdarium, ex philagrio*. Prenez pulpe de coloquinte, aloes & scammonée, de chaque cinq gros; suc d'absinthe ou sommités de cette plante en poudre, cinq gros; incorporez le tout avec suffisante quantité de suc de chou pour faire des pilules de la grosseur d'un pois chiche.

Par la suite, cette expression a été adoptée par quelques médecins & pharmacographes, pour désigner les préparations dont l'aloes est la base; ainsi Raimond Minderer, médecin d'Ausbourg, a publié en 1666, sous le titre d'*alœdarium, mar-cosinum*, un traité de l'aloes & de ses préparations. Abraham Muntingius a aussi publié en 1681 une histoire de l'aloes sous ce même titre, & on trouve dans Angelus Sala, un extrait d'aloes qu'il nomme *alœdarium tartaro violatum* ou comme l'exprime le traducteur de Schroder, *aloes violat tartarific*. Nous rapporterons la formule de cette préparation, parce qu'elle est simple, & qu'elle peut être utile dans quelques cas. Dans trois livres d'une forte infusion de fleurs de violettes, faites dissoudre une livre de bel aloès lucide; la dissolution faite, filtrez à tra-

vers une étamine, & faites épaissir cette solution à un feu doux jusqu'à consistance de miel, alors ajoutez-y tartre acide de potasse en poudre très-fine, huit onces, que vous mêlerez avec l'extrait, en remuant avec une spatule de bois; lorsque la masse a acquis une consistance épaisse, & est refroidie, on l'aromatise avec un scrupule d'oleo-saccharum de canelle, & on en forme des pilules dont l'auteur indique la dose depuis un scrupule jusqu'à un gros, & dont il vante l'efficacité comme un purgatif doux & efficace.

ALOES, **ALOE** des Grecs & des Latins. (*Pharmacie.*) C'est le nom d'un genre de plante, dont on connoît un grand nombre d'espèces très-différentes par leur figure, leur grandeur, & l'usage qu'on en fait. Ces plantes croissent naturellement dans les climats chauds, principalement en Asie, en Egypte, dans l'Inde, &c. On en trouve aussi quelques espèces en Espagne, & même en France, sur-tout dans le département des Pyrénées orientales; enfin dans les climats plus froids, on cultive ces plantes dans les terres, pour la beauté de leur forme.

Les feuilles de cette plante sont épaisses, charnues, remplies d'un suc visqueux & très-abondant; elles peuvent être avec quelque avantage employées comme topique dans quelques affections locales. Pline rapporte que dans les pays où cette plante croît naturellement, on applique ses feuilles sur les blessures, & il ajoute que cette application favorise singulièrement la réunion des plaies. Quelques voyageurs disent encore qu'en Egypte on tire par la distillation des feuilles récentes de cette plante, une eau qui est employée efficacement contre la jaunisse, la toux & l'asthme. On retire encore de quelques espèces d'aloes, par différents procédés, les fibres qui en forment l'écorce & le tissu, & on en prépare une sorte de fil fort, plus ou moins fin, qui est employé à quelques ouvrages d'art: mais le principal usage que l'on fait de l'aloes, est d'en extraire le suc, qui par la chaleur & l'évaporation devient concret, solide, friable, & forme une sorte de gomme-résine, fort employée dans la médecine, & que l'on connoît dans le commerce & dans les pharmacies sous le nom d'**ALOES**.

Cette préparation de suc d'aloes étoit très-anciennement connue. Dioscoride & Pline en font mention, comme d'une substance médicamenteuse, très-familierement employée dans la médecine des hommes & des animaux; mais les anciens écrivains, ainsi que les arabistes, dispoient seulement deux espèces d'aloes: l'une dont la couleur jaune bruniâtre approchoit de celle du foie, & que pour cette raison on appella hépatique, étoit regardée comme la plus pure. Ils estimoient sur-tout celui qu'on leur apportoit des Indes, & ils regardoient comme le moins bon celui qui ve-

noir de l'Arabie ; l'autre espèce d'aloes, dont les anciens font mention, étoit noire, épaisse, mêlée de sable. Ils pensoient qu'elle étoit formée des fèces, ou résidu de la première espèce. Aujourd'hui on distingue dans le commerce trois espèces principales d'aloes, & on peut en distinguer un bien plus grand nombre, si on s'attache uniquement à quelques caractères extérieurs & variables.

La première espèce est généralement appelée ALOES DU LEVANT, & plus ordinairement ALOES SOCOTRIN, parce qu'on la tire principalement de l'île Socotra. Quelques-uns l'ont nommée *focotrin* ou *cycotrin*, à cause, disent-ils, de sa couleur citrine ; d'autres l'ont nommée *fycotrin*, & suivant la remarque de Geoffroy & de quelques autres pharmacographes, cette dénomination dont on a vraisemblablement tiré le mot *chicotrin*, pour désigner une substance fort amère, paroît venir du grec *ficoton*, expression employée par quelques écrivains barbares & les grecs modernes, pour désigner le foie. Quoi qu'il en soit, l'aloes focotrin est le plus pur de tous. On l'apporte du levant, souvent dans des cuirs, quelquefois dans des petites vessies extrêmement fines, & on le trouve dans le commerce sous forme de pains aplatis, ou en fragmens irréguliers, plus ou moins gros. Cet aloès est sec, léger, facilement friable dans les temps secs ; il s'amollit un peu devant le feu, & lorsqu'on le manie avec les doigts. Sa couleur est noire jaunâtre en dehors, souvent couvert à sa surface d'une poussière d'un gris noirâtre ; lorsqu'on le casse, il répand une odeur forte, la fracture est lisse, unie, sans grains, mais parsemée de petits points jaunes, brillans comme du mica ; sa couleur en dedans est rougeâtre, ses fragmens sont demi-transparens ; mais ce qui forme un signe plus caractéristique, lorsqu'on les écrase, ils forment une poudre d'un beau jaune citron, ou, comme dit Robinson, semblable à la poudre de rhubarbe. Cette poudre très-amère, mais sans acreté, sans fétidité, conserve son état pulvérulent dans l'alcool faible, s'y dissout facilement, promptement, & ne laisse qu'un très-léger résidu. Quelques marchands distinguent une variété de cet aloès, qu'ils nomment *aloes lucide*. Cet aloès qui est assez rare & fort recherché des curieux, diffère de celui que nous venons de décrire par une sorte de transparence plus marquée ; sa poudre est médiocrement amère, mêlée de quelque douceur, dit Robinson, & son odeur aromatique approche de celle de la myrrhe ; il ne se trouve guères qu'en petits morceaux, & ne paroît être qu'un aloès plus pur & formé par un suc plus parfaitement clarifié.

La seconde espèce que quelques-uns préfèrent à la première pour l'usage médical, parce qu'ils la croient plus purgative, est nommée ALOES MÉRATIQUE, à cause qu'étant brisée, il a la cou-

Cet aloès diffère du focotrin, principalement par sa couleur qui est plus brune, plus terre, sa cassure, quoique lisse & unie, présente moins de points jaunes & brillans ; sa saveur est plus amère, & lorsqu'on l'écrase, la poudre est d'un jaune plus terne & moins brillant, qui, suivant Robinson, approche de celle de l'argile. Enfin, lorsqu'on met cette poudre dans l'alcool faible, au lieu de conserver son état de division, elle s'agglutine, se dissout moins facilement, moins promptement que l'aloes focotrin, & laisse un dépôt plus abondant.

Cet aloès nous vient encore des Indes orientales. On apporte aussi des îles de l'Amérique, & principalement des Barbades, un aloès que l'on trouve dans le commerce dans des caisses de différens poids, & dont plusieurs droguistes font une espèce particulière, qu'ils nomment *aloes des Barbades*, *aloes en caissette*.

Lorsqu'il est récent, il est brun molasse, mais conserve quelque temps dans les caisses, & les qu'on nous les apporte, & exposé à une dessiccation lente, il durcit, devient friable, & se rapproche beaucoup des espèces précédentes, quelquefois même il prend en vieillissant une sorte de demi-transparence.

La troisième espèce d'aloes est surnommée CABBALLIN, parce que l'on s'en sert ordinairement pour les chevaux. Cet aloès est une sorte d'extrait brûlé, souvent mêlé de sable, de terre, de fragmens de bois, de parties charbonneuses. Sa couleur est noirâtre, la cassure est grenue, son odeur est fétide, nauséabonde ; sa poudre est plus ou moins brune, & lorsqu'on la délaye dans l'alcool faible, elle s'agglutine, & laisse un dépôt terneux, fort abondant. Cet aloès nous vient quelquefois d'Espagne, & on le trouve ordinairement dans le commerce enfermé dans des paniers de palmier ou de jonc. Cette substance fort impure est toujours à bas prix, & c'est la raison qui a déterminé à l'employer dans la médecine des animaux, mais ici, comme dans bien d'autres circonstances, la prétexte est spécieuse, & l'apparence a trompé. Car, outre qu'il n'est jamais prudent d'employer comme remède des drogues aussi suspectes & aussi misérablement altérées, il faut, pour obtenir un effet sensible, employer une dose beaucoup plus forte, que si on eut choisi un aloès plus pur. Aussi les artistes vétérinaires attentifs rejettent cette espèce d'aloes, & il seroit à désirer qu'elle fût bannie du commerce, ou au moins qu'on ne l'employât que pour les ouvrages des arts, & garantir les bois de l'attaque des vers & d'autres insectes destructeurs.

Il est indubitable que ces différentes espèces de gomme-résine, dont nous venons de parler, sont préparées par l'expression & l'évaporation des sucs de la plante que nous nommons aloès ; mais on n'est pas également d'accord sur l'espèce

de la plante qu'on emploie, sur la manière dont on en fait la préparation.

Beaucoup d'écrivains & de voyageurs assurent que ces trois espèces de gommes-résines sont préparées avec le suc d'une seule & même plante, qui est l'*aloë perfoliata* de Linnéus, & que la différence dans les produits dépend uniquement du mode de la préparation. Ainsi ils prétendent qu'on obtient l'aloë focotrin, en prenant le suc de la plante, lorsqu'il est éclairci par le repos, & en le laissant évaporer seulement à la chaleur du soleil; ils ajoutent qu'on prépare l'aloë hépatique par la décoction, & en employant l'ébullition, pour faire évaporer toute l'humidité. Enfin l'aloë cabalin est formé par la réunion des fèces du suc de la plante, & par une évaporation faite à grand feu, & peu ménagée. D'autres soutiennent que l'on emploie deux espèces d'aloës pour la préparation de ces gommes-résines, & quelques-uns prétendent que les différences de ces substances proviennent du climat où croît la plante. Il nous paroît vraisemblable que ces assertions sont également fondées, & que le mode de la préparation varie, non-seulement suivant les pays, mais encore suivant l'habitude & les vues de ceux qui font ces préparations.

Quoi qu'il en soit, comme l'aloë est une substance fort importante pour l'usage médicinal, comme elle sert de base à un grand nombre de préparations, le pharmacien doit être fort attentif sur le choix qu'il en fait, mais comme ces distinctions & ces dénominations de focotrin, hépatiques & cabalin, &c. servent répétées par les écrivains qui se sont copiés successivement, sont équivoques, arbitraires, & ne servent réellement qu'à favoriser les prétentions, la cupidité des marchands, & à entretenir l'ignorance & l'incertitude sur un objet si simple, il convient d'y substituer des dénominations plus précises, & qui rappellent constamment le caractère propre à faire reconnoître la nature de ces substances: c'est ne nous paroit pas embarrassant, si l'on fait attention que, plus l'aloë est pur, plus aussi sa poudre est d'un beau jaune clair, & citron: qu'au contraire, plus il est impur, plus aussi la poudre en est brune ou noirâtre. D'après ce principe incontestable, & en conservant la distinction des trois espèces d'aloës généralement adoptées, nous nommons le plus pur *aloë citrin*, parce que, comme nous l'avons dit, sa poudre est d'un beau jaune citron clair, parsemée de points brillants comme du mica. Par la même raison nous nommons la seconde espèce *aloë brun*. Enfin nous désignons sous le nom d'*aloë brut* l'espèce impure, qu'il conviendrait de rejeter du commerce. Ainsi d'après ces dénominations & d'après les caractères que nous avons exposés plus haut, on reconnoitra facilement la nature de l'aloë, & le pharmacien s'attachera à choisir celui qui donne une poudre d'un plus beau jaune clair, & il re-

jettera constamment celui dont la poudre est plus ou moins brune.

Dioscoride, Plin & les anciens médecins, disent que l'aloë est souvent adulteré par des mélanges de gomme, d'acacia, de terre, &c.; & quelques pharmacographes modernes répètent encore cette assertion; mais comme l'a remarqué *Garcin ab horio*, depuis la facilité du commerce, & sur tout depuis la découverte de l'Amérique, l'aloë est en si grande quantité, & son prix est si peu considérable, qu'il y auroit peu d'avantage aujourd'hui à faire de tels mélanges; d'ailleurs, ils ne pourroient se faire sans être facilement reconnus, puisqu'ils altéreroient la couleur, la saveur, la friabilité, qui doivent caractériser le bon aloë; aussi nous sommes disposés à attribuer les impuretés que l'on trouve quelquefois dans cette drogue, à quelque défaut dans la préparation première, ou aux avaries qu'elle aura subies dans le transport.

Quoiqu'à l'inspection l'aloë paroisse homogène, cependant cette substance est composée de deux parties très-différentes par leur nature, leurs propriétés & leurs proportions respectives; ces parties se trouvent naturellement dans le suc qu'on exprime de la plante. La préparation première ne fait que les rapprocher, mais on peut facilement les séparer par différents procédés, & à l'aide de différents dissolvants.

L'une de ces parties est résineuse, & comme les résines, elle est inflammable, elle s'amollit, se liquéfie par la chaleur, se dissout dans l'alcool, & reste insoluble dans l'eau; l'autre partie qui compose l'aloë est gommeuse, ou pour parler plus exactement, elle est de nature extractive, & se dissout principalement dans l'eau. Ces deux substances si distinctes par leur nature, ont des propriétés différentes. Boulduc, Valentini, Hermain, ont avancé positivement que la propriété purgative de l'aloë réside principalement dans la partie extractive, & que la portion résineuse est plutôt roborante & astringente, que purgative, & cette opinion est encore adoptée de nos jours par quelques médecins; d'autres cependant assurent le contraire, & James dit expressément que les parties résineuses de l'aloë extraites avec l'esprit-de-vin, purgées avec beaucoup de violence, & mais l'extrait de la partie gommeuse avec de l'eau, est un excellent vulnéraire. Des essais faits par différents praticiens paroissent appuyer cette assertion, qui d'ailleurs se trouve conforme à ce que nous savons sur la nature d'autres substances analogues, qui sont d'autant plus actives & purgatives, qu'elles sont plus résineuses: malgré ces raisons, on voit encore quelques praticiens conserver des doutes, parce qu'ils pensent qu'il est difficile d'obtenir complètement la séparation de la résine, & de la partie extractive de l'aloë, & ils observent que dans l'aloë ainsi que dans toutes les gommes-résines, le mélange de la

gomme & de la résine est si intime, que la liqueur qui dissout une des parties entraîne une portion de l'autre ; mais en convenant avec les praticiens qu'il faut des soins, des attentions particulières, pour séparer complètement la résine de la partie extractive, il nous paroît du moins qu'on ne peut se refuser à reconnoître que toutes les préparations d'aloës dans lesquelles la portion résineuse a été diminuée sont moins purgatives que l'aloës simplement réduit en poudre, & qu'au contraire les préparations dans lesquelles on a conservé toute la partie résineuse sont des purgatifs très-actifs ; d'après ces faits, nous pouvons donc regarder la résine de l'aloës, comme la partie essentiellement purgative. Nous insistons sur ce point, parce qu'il mérite la plus grande attention dans le choix des préparations diverses qui ont été recommandées.

Quoique la proportion respective de la résine, & de la partie extractive varie dans les espèces d'aloës, cependant d'après le résultat des différentes analyses qui ont été faites, on peut avancer comme un terme général & moyen, que dans un aloës bien choisi, tel qu'on doit l'employer dans les pharmacies, sur cinq parties de gomme, il y en a une de résine. Outre ces deux substances, qui constituent essentiellement l'aloës, on y trouve toujours une certaine quantité de parties féculentes provenant du débris de quelques fibres de la plante ; & entraînées dans l'expression du suc, ces parties sont peu abondantes dans l'aloës citrin ; enfin on y trouve accidentellement des parties terreuses, des fragmens ligneux. Ces observations, faites par les plus anciens médecins, ont déterminé différentes préparations sur l'aloës, dont l'objet est 1°. de séparer les substances étrangères qui s'y trouvent accidentellement mêlées, ainsi que les parties féculentes qui ont été entraînées par l'expression ou la décoction première du suc de la plante. 2°. De diminuer la proportion respective de la résine & de la gomme. 3°. Enfin de rendre la résine plus facilement soluble dans les liqueurs animales, & de prévenir son impression irritante sur l'estomac & les intestins. Ces différentes opérations ont été désignées sous les noms de dépuración, d'extraction ou lotion, de correction & insuccation : nous allons les indiquer successivement.

1°. LA DÉPURACIÓN, ainsi que le nom l'indique, est une opération dans laquelle on se propose de purifier l'aloës, d'en séparer les parties féculentes, les substances étrangères qui peuvent s'y trouver accidentellement mêlées. Mais en même-temps, on doit avoir pour objet, de conserver dans leur intégrité les principes résineux & gommeux qui constituent l'aloës, car sans cette condition, au lieu d'obtenir simplement un aloës dépuré, on auroit un extrait plus ou moins chargé de parties résineuses : pour faire

cette dépuración, ainsi que nous l'entendons ici, il faut employer un véhicule qui puisse dissoudre en même-temps la résine & la gomme, sans altérer leurs propriétés, sans changer leurs proportions : l'alcool soible, le vin, le vinaigre sont les dissolvans les plus propres à remplir cet objet ; ainsi lorsqu'on voudra dépurier l'aloës, on concalera cette substance, on la réduira en poudre grossière, on versera par-dessus un des dissolvans indiqués, de manière qu'il surnage de deux ou trois pouces, on laissera ce mélange en digestion jusqu'à une parfaite dissolution, on le filtrera à travers un blanchet ou un linge serré, & l'on fera évaporer la dissolution à un feu doux jusqu'à siccité. On pourra également obtenir une dissolution complète des deux principes qui constituent l'aloës, en employant de l'eau pure, mais chaude, car à l'aide de la chaleur, la gomme sert d'intermède pour la solution de la résine ; mais il faut éviter l'ébullition, parce qu'à ce degré de température, la résine se grumèle, se précipite, & l'aloës est en partie décomposé ; enfin de quelque manière que l'on procède, quelque soit le dissolvant qu'on ait choisi, il nous paroît que, dans cette opération, on ne conserve jamais complètement les proportions respectives de gomme & de résine qui se trouvent naturellement dans l'aloës ; car, comme l'a remarqué Hoffman, une longue ébullition, même dans l'eau la plus pure, dépouille l'aloës de sa qualité purgative, parce que, comme nous l'avons indiqué, la résine se précipite & se grumèle. En se bornant à une évaporation lente & graduée, il y a encore lieu de croire, comme le dit Robinson, que cette évaporation doit l'altérer à d'autres égards ; aussi la dépuración de l'aloës a-t-elle été confondue par un grand nombre de pharmacographes avec l'extraction, & cette opération qui paroît avoir été imaginée par les anciens, parce que l'aloës qu'ils recevoient étoit alors mélangé avec des parties fablonieuses, terreuses, ou des fragmens ligneux, est très-inutile de nos jours, où nous avons facilement l'aloës, & dans un état de pureté assez constant ; elle seroit même contraire à l'objet qu'on se proposeroit puisqu'elle changeroit les proportions de ses principes ; ainsi donc lorsqu'on a besoin de conserver la vertu purgative & stimulante de l'aloës, il faut l'employer tel qu'on nous l'envoie, il suffit de le choisir d'après les caractères que nous avons indiqués précédemment.

2°. L'EXTRACTION est une préparation dans laquelle on cherche à extraire, à séparer la gomme de la résine, ou au moins à diminuer la proportion respective de ces deux substances ; cette opération a encore été désignée par les anciens, & dans un grand nombre de dispensaires, sous le titre de lotion de l'aloës ; on fera facilement la théorie & les procédés de cette opération, si on se rappelle que dans l'aloës, sur cinq parties de gomme il y en a une de résine, & que cha-

cune de ces deux substances, en raison de sa nature, à un dissolvant particulier; l'une étant soluble dans l'eau froide, & l'autre dans l'alcool: d'après ces principes généralement avoués, on peut obtenir de l'aloës deux extraits très-différents par leur nature & leurs propriétés. L'un doit être simplement désigné sous le nom d'extraire, ou comme on l'appelle ordinairement extrait gommeux, & l'autre doit être nommé résine ou extrait résineux d'aloës. Pour préparer l'*extrait gommeux d'aloës*, on prend la quantité que l'on veut d'aloës, on la pile dans un mortier, & lorsqu'elle est en poudre, on verse peu-à-peu dessus, & en triturant, une certaine quantité d'eau froide. On continue la trituration pour faciliter la solution de la partie extractive de l'aloës. On laisse reposer quelques minutes, & on décante la liqueur; on verse ensuite peu-à-peu, & en continuant la trituration, une nouvelle quantité d'eau que l'on tire au clair, on réunit ces deux dissolutions que l'on laisse déposer pendant cinq ou six heures, on décante ensuite la liqueur, & on la fait évaporer au bain-marie, jusqu'à consistance d'extrait.

Quelques-uns pour préparer cet extrait, font digérer de l'aloës concassé dans de l'eau froide, pendant quarante-huit heures; ils filtrent ensuite la liqueur, & la font évaporer comme nous l'avons dit.

On peut encore employer de l'eau chaude, même bouillante, pour obtenir cet extrait; mais alors comme l'infusion contient une assez grande quantité de résine en dissolution, il faut la laisser refroidir avant de la filtrer, afin que la résine ait le tems de se précipiter; mais quel que soit le procédé qu'on préfère, il faut toujours employer la plus petite quantité d'eau qu'il est possible; car, comme nous l'avons indiqué d'après Robinson, l'évaporation même la plus lente altère toujours les propriétés de l'aloës.

Pour préparer l'*extrait résineux*, qui, dans quelques dispensaires, est nommé *baume d'aloës*, on verse de l'alcool rectifié sur le résidu de la dissolution première, & par une digestion de deux fois vingt-quatre heures, on a une dissolution de la résine d'aloës, que nous nommons *alcool résineux d'aloës*, & par l'évaporation de l'alcool on obtient l'extrait résineux sous forme concrète. On peut en mélangeant l'alcool d'aloës avec la dissolution aqueuse, se procurer un extrait pourvu des deux principes de l'aloës, & très-dépuré.

Nous ne nous arrêterons pas à exposer les propriétés différentes de ces préparations; on peut consulter, sur cet objet, le *dictionnaire de médecine*; nous remarquerons seulement que l'extrait gommeux que Lieutaud nomme *aloës lavé*, contient encore une certaine quantité de résine qui a été entraînée par les parties extractives, ce qui le rend encore un purgatif assez actif à la dose de huit à quinze grains; il est cependant

moins purgatif, & sur-tout moins échauffant que l'aloës; il convient sur-tout aux personnes qui font un usage habituel ou fréquent de l'opium, car l'opium procure la constipation, & l'extrait d'aloës rétablit, entretient la liberté du ventre sans débilitier l'estomach, sans procurer de la chaleur; nous l'avons employé avec succès dans une forte de phthisie pulmonaire, compliquée d'un dérangement des règles, & accompagnée d'une toux & d'un état d'irritation que l'on ne calmoit que par l'usage fréquent de l'opium. En faisant dans l'eau froide, & avec les précautions indiquées, une solution de ce premier extrait, on séparera encore quelques portions résineuses, on obtiendra un produit plus pur, plus apéritif, moins échauffant; mais aussi moins purgatif. Galien en avoit déjà fait la remarque, car il dit expressément, livre de la faculté des médicaments simples: « Si aloë quod purgat, ab eo quod est astringens eluatur (id quod fieri potest per exactam lotionem) tunc certe aut debilitat, aut plane nihil purgabit. »

Robinson, dans son ouvrage intitulé *le Pharmacien moderne*, avance que la manière dont les anciens préparoient l'aloës lavé, étoit tout-à-fait différente de celle qu'on pratique aujourd'hui, pour obtenir l'extrait gommeux; car, dit-il, on jetoit tout ce que l'eau avoit dissout, & on employoit le résidu en qualité de remède: pour appuyer cette assertion, il rapporte le passage suivant de Van-Helmont: *aloë ablutione succum amittit meraque resina manet residua qui sua ad intestina adhesionem torminum & hemorrhoidum concitatrix*: il cite encore quelques passages de Galien, qui dit expressément que l'aloës perd beaucoup de sa vertu purgative, par la lotion, mais ces citations prouvent seulement que les anciens connoissent les deux principes qui constituent l'aloës, & en admettant les conséquences qu'en tire Robinson, il faudroit en conclure que la résine de l'aloës n'est point purgative, ce qui nous paroit contraire à l'observation, comme nous l'avons remarqué plus haut.

3°. Comme on vit que l'usage de l'aloës procure souvent des évacuations abondantes, & des douleurs intestinales, on assésia à l'aloës différentes substances que l'on crut propres à corriger cette propriété irritante: dans ces vues les anciens associoient souvent à l'aloës, comme CORRECTIFS, le safran, & différentes substances aromatiques; ils recommandoient sur-tout de l'incorporer avec du miel, & de faire prendre ces préparations peu avant le repas, afin que le remède mêlé avec les alimens, fût plus facilement dissous: par la suite on reconnoit que les tranchées qui accompagnent si souvent l'usage de l'aloës, sont principalement occasionnées par la portion résineuse, qui étant plus tenace, plus visqueuse, moins soluble dans les liqueurs aqueuses que la partie extractive.

s'agglutine, adhère aux parois des intestins, & y produit ainsi différens points d'irritation; on chercha différens moyens qui pussent faciliter la division de la résine, la mettre dans une sorte d'état savonneux, & d'une grande solubilité; les essais que l'on a faits ont appris que la potasse, le savon, le safran, le miel, la bile des animaux, le jaune d'œuf, les extraits des plantes, & sur-tout celui de gentiane, remplissoient très-bien cet objet, & facilitoient singulièrement la solubilité de la résine; ainsi ces substances & quelques autres analogues, sont associées à l'aloës, comme moyens correctifs, dans un grand nombre de préparations usuelles.

Plusieurs pharmacographes, pour remplir ces vues, au lieu de dissoudre l'aloës dans l'eau pure, pour en préparer l'extrait, ont proposé d'ajouter une livre de sucre de citron sur cinq livres d'eau: ce procédé est spécialement recommandé dans les dispensaires de Wirtemberg, de Hambourg, de Brandebourg, &c.

D'autres pour opérer cette dissolution, emploient le suc de roses, de violettes, de bourrache, de buglosse, &c. Ils nomment cette opération *INSECCUTION*, & l'extrait obtenu par cette préparation, est désigné sous les noms d'*aloës rosat*, ou *rosé*, *aloës violet*, *borraginé*, ou *buglossé*, &c.

On prescrit dans le dispensaire d'Hambourg, de Wirtemberg & de Brandebourg, de faire un mélange de tous ces sucs, d'y faire digérer l'aloës, & l'extrait qu'on obtient par ce dissolvant composé, est nommé *aloës inséccé*. Quelques-uns ont proposé d'employer le suc de nicotiane, de bouillon blanc, de chicorée ou de quelque plante hépatique, apéritive, suivant l'objet qu'on se proposoit de remplir; mais malgré les grands éloges prodigués par quelques écrivains à ces opérations, elles n'ont d'autres propriétés que celle de l'extrait d'aloës; ou du moins elles sont si peu différentes, qu'elles méritent peu de considérations. Les anciens avoient cru par l'addition de ces sucs, non-seulement corriger l'aloës, mais encore lui donner des propriétés nouvelles & spécifiques: ils imaginoient que par ces préparations, l'aloës acquéroit une action particulière sur le foie, sur la rate, sur le poulmon, suivant l'espèce de plante qu'ils employoient; mais il est évident que l'extrait de ces sucs se trouve en trop petite dose dans chaque prise d'aloës, pour produire quelque effet; aussi toutes ces préparations ne changeant point la nature du remède, peuvent être regardées comme inutiles.

4°. Pline, & quelques, anciens font encore mention d'une autre opération sur l'aloës, qu'ils nomment *TORREFACTION*; cette opération consistoit à rôtir & à brûler l'aloës sur un plat, & on obtenoit ainsi une masse carbonée qui n'avoit aucune vertu purgative, & qui étoit re-

commandée comme un astringent: cette opération est entièrement oubliée de nos jours.

Outre ces préparations premières, l'aloës entre dans un grand nombre de compositions différentes: il est la base de toutes ces pilules purgatives si vantées dans le public, & qu'on débite sous les noms de *pilules antiques*, *pilules gourmandes*, *pilules ANTE CIBUM*, *grains de vie*, & d'une infinité d'autres semblables. Il entre dans un grand nombre d'electaires & de confections amères & purgatives; il est la base de cette composition si recommandée par les anciens, décrite sous le nom de *HIERA-PERA*, & dont on trouve dans les dispensaires tant d'espèces différentes, que quelques pharmacographes ont nommé *DI-ALOËS*. En faisant infuser l'aloës dans l'alcool, dans du vin, on fait les préparations connues sous les noms de *VIN D'ALOËS*, *ALCOOL D'ALOËS*, *teinture sacrée*, *elixir sacré*, &c. Faber, dans son *myrothesicum spagiricum*, décrit une *quinessence d'aloës*, qu'il préparoit en distillant cette gomme-résine dans une cornue. Schroder rapporte la formule suivante qui se rapproche beaucoup de celle de Faber, qu'il nomme *huile purgative d'aloës*.

Prenez aloës jaune, une livre, mirrhe, deux onces, encens, demi-once, distillez le tout à petit feu, sur les cendres, dans une petite cucurbitte, & il ajoute que l'huile appliquée au nombril purge & rue les vers.

On préparoit avec l'aloës des onguents ou linimens contre les vers: nous rapporterons la formule d'une de ces compositions, qui n'est pas entièrement sans efficacité.

Prenez aloës jaune, un gros, fiel de bœuf épais, demi-gros, huile de coloquinte de quercetan, quantité suffisante, mêlez le tout, pour faire un liniment qu'on applique sur le nombril des enfans.

Enfin, l'aloës est la base de ces liqueurs purgatives, stomachiques, que tant de charlatans débitent indistinctement dans le public, sous le nom pompeux d'*elixir de longue vie*, *baume de vie*, *elixir stomachique*, &c. Nous ne pouvons nous empêcher de remarquer à ce sujet, combien l'abus ou l'usage indifcret de ces préparations aloétiques est dans les mains des charlatans; nous avons vu une femme âgée, après avoir pris pendant les mois de juillet & août, un de ces elixirs si vantés pour rétablir les digestions, éprouver une hémorragie excessive par le nez; hémorragie qu'on eut beaucoup de peine à arrêter, & qui la conduisit à une hydropisie, dont elle périt peu de temps après. Nous avons vu un jeune homme, après avoir pris pendant quelques jours, & dans un temps excessivement chaud, quelques pilules aloétiques, éprouver une semblable hémorragie: de tels exemples se renouvellent de temps en temps, & ils ne corrigent pas le public; mais l'homme de l'art ne

doit pas se lasser de répéter la vérité, & elle sera enfin entendue.

Non-seulement l'aloès a été recommandé contre un grand nombre de maladies internes très-différentes; mais encore, on l'a fait entrer dans différentes espèces d'onguents, d'emplâtres & d'embrocation, on en a recommandé l'usage comme vulnérinaire, anti-putride, anti-vermineux, dans le traitement des maladies chirurgicales; mais nous le répéterons, il faut être circonspect, même sur l'usage extérieur de l'aloès; car ces applications topiques, si elles sont continuées quelques-temps, où si elles sont faites sur une grande surface, procurent souvent des diarrhées, & quelquefois la dysenterie. On a encore vanté l'usage de l'aloès dans le traitement des maladies des yeux; mais comme l'a expressément remarqué Plinie, il faut pour cette objet que l'aloès soit dépouillé de sa partie résineuse.

On trouvera aux articles, ALCOOL, ÉLECTUAIRES, POUDRE, PILULES & VINS, les différentes préparations de l'aloès, qui méritent encore d'être connues.

Nous terminerons cet article, en observant que l'aloès peut se conserver plusieurs années sans altération; mais pour cela, il faut le fermer dans un endroit médiocrement chaud, à l'abri de l'humidité, du contact de l'air; enfin, il ne faut pas qu'il soit en poudre, car toutes les poudres perdent facilement leurs propriétés premières.

ALOËS, bois d' (*Pharmacie.*) Voyez le mot BOIS, où nous réunirons toutes les espèces de bois employés en pharmacie.

ALOËS DES GAULES, *aloe gallica*, des Grecs. (*Pharmacie.*) Dioscoride, & d'après lui, quelques écrivains & pharmacographes ont donné ce nom à la gentiane, peut-être comme le dit J. Gorris, à cause de l'amertume de sa racine, & c'est vraisemblablement la même raison qui a engagé quelques-uns à désigner cette plante sous le nom d'*aloites* ou *aloitis*.

ALOËSÉS, remèdes. (*Pharmacie.*) Expression moderne, employée par quelques écrivains, & entr'autres, par M. Hevin, *éours de pathologie*, pour désigner les remèdes dans lesquels entre l'aloès; mais suivant le génie de notre langue, la terminaison de ce mot, marque un diminutif, & il ne doit être employé que pour désigner les préparations ou compositions dans lesquelles l'aloès entre, mais à petite dose, & seulement comme adjuvant ou auxiliaire; ainsi un purgatif est *alodé*, lorsque l'aloès ajoute à ses vertus, à son énergie première, mais n'en constitue pas l'essence.

ALOËTIQUES, remèdes. (*Pharmacie.*) Ex-

pression que l'on trouve très-fréquemment dans les ouvrages de pharmacie & de matière médicale; quelques-uns l'emploient comme un terme générique, pour désigner tous les médicaments acres, amers, résineux, tirés des végétaux qui, par leur propriété purgative & stimulante, approchent de la nature de l'aloès; mais cette dénomination est plus généralement employée pour désigner les compositions ou préparations dont l'aloès est la base ou l'ingrédient principal.

ALOGAR, ALOHOC. (*Pharmacie.*) Expressions employées par quelques alchimistes, pour désigner leur mercure ou principe mercuriel.

ALOIDE. (*Pharmacie.*) Ce mot dérivé du grec, signifie semblable à l'aloès, & il a été donné par plusieurs botanistes à une plante aquatique, plus généralement connue sous le nom d'aloès des marais, *stratiote aquatique*, *stratiotes aloides*. Cette plante que l'on dit vulnérinaire, n'est point employée en pharmacie; mais comme la similitude des noms pourroit induire en erreur, il faut bien prendre garde de confondre cette plante avec la gentiane, qui, dans quelques écrits anciens, est nommé *aloites* ou *aloitis*.

ALOINE, & plus communément, **ALUINE.** (*Pharmacie.*) Dénomination employée par quelques écrivains, pour désigner une espèce d'absinthe, parce que, dit Léon Fufch, cette plante n'est pas moins amère que l'aloès.

ALOS, ALO, ALIC ou ALEC. (*Pharmacie.*) Expressions qui paroissent dériver du grec, mais qui sont employées par quelques anciens pharmacographes traducteurs arabites, ou pour désigner le sel commun, ou muriate de soude, ou toute autre substance saline analogue.

ALOUCHI. (*Pharmacie.*) Gomme qu'on tire du cannellier blanc, & qui est très-aromatique. (*Voyez CANNELLE.*)

ALPHONIX ou ALPHENIC. (*Pharmacie.*) Dénomination employée par les écrivains arabites, & adoptée par le plus grand nombre des pharmacographes, pour désigner la préparation de sucre, que l'on connoit aujourd'hui sous le nom de *sucre d'orge blanc* ou *sucre tora*. Cette préparation qui étoit autrefois fort recommandée, & qui entroit dans plusieurs compositions de pharmacie, comme béchique, adoucissant & légitif, étoit aussi appelée *penide* ou *épénide*, & par les Latins *penidium*, *saccharon penidium*. Les arabes, disent quelques lexicographes, l'avoient nommée *alphaux*, à cause de sa blancheur, ou, comme d'autres l'interprètent à *coloris phauco*; l'intérêt & l'amour du merveilleux avoient fait

conserver cette dénomination mystérieuse, pour donner plus d'importance à la chose; et quoi qu'il en soit de ces diverses interprétations étimologiques, l'alphenix se trouve aujourd'hui rarement dans nos pharmacies; la préparation est en quelque sorte abandonnée aux confiseurs; pour la faire, ils mettent dans une bassine deux livres de sucre avec une livre d'eau, ils l'écument & le font bouillir doucement, jusqu'à ce qu'il soit cuit en consistance d'électuaire solide (Voyez SUCRE.) Alors ils le jettent sur un marbre frotté d'un peu d'huile d'amandes douces, & lorsqu'il a la consistance d'une térébenthine épaisse, (ce qui se fait dans une ou deux minutes,) ils le partagent en le coupant en bandes plus ou moins larges; s'ils le laissent dans cet état, ce sucre en se refroidissant, seroit brillant, transparent & d'une couleur citronnée, mais pour lui donner l'opacité, la blancheur, le gremé que l'on recherche dans l'alphenix, après avoir coulé le sucre sur le marbre, lorsqu'il commence à s'épaissir, & tandis qu'il est encore très-chaud, on le ramasse, on le malaxe comme une pâte avec les mains qu'on a auparavant frottées d'amidon ou grâillées avec de l'huile, afin que le sucre ne s'attache pas à la peau & ne brûle pas; on réitère ces malaxations, & tandis que la masse est encore molle, on la partage promptement en morceaux que l'on allonge, que l'on tire, que l'on tortille comme une corde, par le moyen d'un clou, d'un crochet, ou simplement avec les doigts, & on forme des espèces de petits bâtons qu'on laisse refroidir. Par ces différentes tractions & torsions, les molécules n'ont pas le temps de prendre un arrangement uniforme & symétrique; la cristallisation est en quelque sorte troublée & confuse, & le sucre devient blanc, opaque & gremé.

Le plus grand nombre des dispensaires prescrit de faire dissoudre le sucre dans une décoction d'orge. Plusieurs recommandent d'ajouter à la masse coulée sur le marbre quelques gouttes d'une huile volatile agréable, telle que celle de citron, d'orange; Durenion dit que si on ajoute au sucre un peu de miel, la préparation sera plus facile, sans être moins efficace, & l'emery avertit que quelques confiseurs y mêlent souvent beaucoup d'amidon, pour le rendre plus blanc, & y gagner davantage; on reconnoît facilement ce mélange, non seulement parce que l'amidon rend le suc pâteux dans la bouche, mais encore si on en fait dissoudre dans l'eau, la liqueur est trouble, & l'amidon se précipite.

ALSEBRAN. (*Pharmacie.*) Surnom donné à une espèce d'électuaire ou confection purgative, dont la base étoit l'ésule que les arabes nommoient *alsebran*; cet électuaire qui étoit un purgatif violent, n'est plus employé de nos jours.

ALSECH. (*Pharmacie.*) Expression des ara-

bites pour désigner une espèce d'alun, ou sulfate d'alumine.

ALSELENGEMISCH. (*Pharmacie.*) Dénomination des Arabes & répétée par leurs compilés, pour désigner une espèce de basilic, *ocymum* de Linnéus.

ALSESIRICON. (*Pharmacie.*) Dénomination donnée par Mésué à un onguent & une confection dont il rapporte les formules, & il faut, dit Maffard, entendre par ce mot *PSORICON*.

ALSIRACOSTON. (*Pharmacie.*) Nom d'un médicament composé, dont Mésué donne la description, & vante les propriétés contre les fièvres, &c., mais qui n'est plus employé dans nos pharmacies.

ALTALCH, ALUME, CALES, SEBA. (*Pharmacie.*) Différentes dénominations employées par les écrivains arabes, pour désigner l'alun ou sulfate d'alumine.

ALTARANBEL. (*Pharmacie.*) Ce mot que l'on trouve dans Mésué, & dans quelques écrivains, est employé pour désigner un insecte qui entre dans la composition d'un onguent épispastique. Mésué qui en rapporte la formule, le nomme onguent *altaranbel*, & Maffard dit qu'il faut entendre par ce mot, les cantharides, les campes ou les buprestes.

ALTARASACON ou ALTARAXACON. (*Pharmacie.*) Mots employés par les anciens pharmacographes & écrivains arabes, pour désigner le pistil, ou *leontodon taraxacum* de Linnéus.

ALTERANS. (*Pharmacie.*) Les médecins ont divisé les remèdes, par rapport à leur manière d'agir, en deux classes principales. L'une comprend tous ceux qui, peu de temps après leur application, procurent une évacuation sensible, qui augmentent & excitent les sécrétions naturelles; on les nomme *évacuans*. Tels sont les vomitifs, les purgatifs, les diurétiques, les sudorifiques, & l'autre classe de remèdes comprend ceux qui procurent un changement remarquable dans l'économie animale, mais sans déterminer une évacuation du moins prompte & sensible; ceux-ci sont distingués sous le nom d'*altérans* ou *altératifs*: ils ont encore été appelés, d'après les Grecs, *altiotiques*: tels sont les calmans, les astringens, les fébrifuges, &c.

A la rigueur, cette division n'est qu'une distinction de méthode imaginée, pour établir l'ordre & faciliter l'étude. En effet l'expérience journalière démontre que les évacuans donnés à doses fractionnées peuvent devenir altérans, & que ceux-ci, suivant des circonstances particulières, deviennent évacuans; quoi qu'il en soit, cette division a été adoptée par le plus grand nombre des pharmacographes pour la classification des mé-

dicaments. Ainsi dans nos dispensaires, les sirops, les électuaires, les tablettes, les pilules, les trochisques, enfin le plus grand nombre des remèdes destinés pour l'intérieur, sont divisés en évacuans & en altérans. On désigne également sous le nom d'altérans les bouillons, les apozèmes, les potions, que l'on prépare journellement dans nos pharmacies, & dont l'usage ne procure aucune évacuation sensible.

ALTERATION, ALTERER. Quoique ces mots ne soient rien moins que particuliers à la nomenclature de la chimie, il est nécessaire cependant de les bien définir dans le langage de cette science, afin qu'on puisse comprendre un grand nombre d'articles qui, dans cette explication préliminaire, pourroient rester obscurs & induire même les lecteurs dans des erreurs préjudiciables. Altération est un changement quelconque qui arrive dans quelque corps que ce soit & qui en modifie, en altère réellement la nature. Cette altération, ce changement est produit dans les corps, soit par un mouvement insensible qui s'établit dans leurs propres molécules, comme une fermentation &c., alors on la nomme *altération spontanée*. On dit que tel corps *s'altère* ou *s'est altéré spontanément*. Ou bien l'altération est produite dans les corps par d'autres corps qu'on met en contact avec eux, & qui changent l'attraction de leurs molécules ou de leurs principes. C'est dans ce sens qu'on dit par exemple que la chaleur, que le feu altère les matières végétales, les sels décomposables, &c. Il est vrai que dans le langage le plus pur de la science, on emploie plus souvent & plus volontiers les mots *altération*, *altéré*, pour indiquer l'absence ou la nullité de changement, qui a souvent lieu entre plusieurs substances. Ainsi l'on dit que l'alumine n'altère point la filice par la voie humide, & n'est point altérée par elle, ou qu'il n'y a point d'altération entre ces corps. On voit donc que les mots traités dans cet article, bien employés en chimie dans un sens déterminé, pour exprimer une action réciproque quelconque qui produit un changement dans les corps, ou la nullité d'action entre eux, lorsque ces mots sont accompagnés d'une négation.

ALTERATION. (Pharmacie.) En général, on entend par ce mot tout changement accidentel & partiel d'un corps, qui ne va pas jusqu'à le rendre méconnaissable, mais qui lui donne une forme, une consistance, des propriétés nouvelles, ou diminue celles qu'il avoit d'abord. En pharmacie, nous entendons par altération tout changement spontané qui arrive aux différentes substances médicamenteuses, soit simples, soit composées, & qui modifie leurs propriétés premières, ou leur en donne de nouvelles. Ainsi l'altération diffère de l'*adulteration* qui est un mélange frauduleux d'une matière étrangère, ou

de qualité inférieure à une substance pure & de qualité supérieure; elle diffère de la *falsification* ou *sophistication*, qui est la substitution frauduleuse d'une drogue ou d'un ingrédient de mince valeur à une substance d'un prix & d'une qualité supérieure, ingrédient auquel on tâche de procurer l'aspect & quelques-unes des qualités apparentes de la substance vraie. Enfin l'altération est le résultat d'une action spontanée, & l'adulteration ainsi que la falsification sont l'ouvrage de la fraude & de la cupidité la plus dangereuse.

Il n'y a point d'effet sans cause, & l'altération des substances médicamenteuses dans nos pharmacies dépend toujours de quelque agent naturel; l'eau, l'air, le calorique & la lumière sont ces agens. C'est en se combinant avec un ou plusieurs des principes de la substance médicamenteuse, qu'ils en altèrent les qualités premières, de sorte qu'à proprement parler, l'altération des drogues & des préparations pharmaceutiques est une combinaison nouvelle, lente, graduée & successive, mais toujours déterminée par l'affinité ou attraction chimique.

L'eau répandue dans l'atmosphère, celle qui est contenue dans le tissu de la substance, ou combinée dans la préparation médicamenteuse, est dans nos pharmacies la cause la plus active & la plus ordinaire de l'altération; ainsi les plantes mmeuques recueillies ou conservées dans un endroit humide, celles dont la dessiccation n'a pas été soignée, comme on les trouve si ordinairement dans les boutiques des herboristes, perdent la couleur, l'odeur, la saveur & toutes les propriétés qui les caractérisoient.

Dans ces cas, l'eau n'agit pas simplement par contact, mais elle éprouve une sorte de décomposition qui nous paroît manifeste; le principe muqueux de la plante éprouve une putréfaction, ou, si l'on veut, une sorte de combustion lente, qui retient l'oxygène de l'eau, tandis que l'hydrogène se dégage sous forme de gaz. En effet ces plantes sont en quelque sorte charbonnées, elles sont brunnâtres, & l'alcali s'y développe, comme dans un commencement d'incinération, ce dont on s'assurera facilement, en portant au milieu d'une certaine quantité de plantes dans cet état, un papier légèrement mouillé & coloré avec les pétales de la mauve, de l'iris & de la violette. La couleur bleue de ce papier sera bientôt altérée en vert; ce qui annonce d'une manière indubitable la présence d'un alcali.

Cette altération que les plantes éprouvent par la décomposition de l'eau, a des degrés différens. Le premier que l'on nomme *moisture*, est une sorte d'efflorescence ou de végétation blanchâtre qui se forme à la surface de la plante. Il dépend d'une putréfaction lente du principe muqueux; dans le second, la plante est brunâtre, en quelque sorte charbonnée, & l'alcali y est plus ou moins sensible; c'est une sorte de combustion

lente. Enfin, lorsque les plantes mal séchées sont amoncelées en grande quantité, elles éprouvent une inflammation manifeste, comme on le voit arriver quelquefois dans nos campagnes aux tas de foin, qui contiennent encore de l'humidité; phénomène qui confirme bien l'explication que nous avons donnée sur la manière dont l'eau agit dans l'altération des plantes.

C'est encore à la décomposition de l'eau qu'il faut attribuer l'altération qu'éprouvent dans nos pharmacies les sirops, les électuaires mols. Cette décomposition de l'eau est sur-tout bien manifeste aux opiates mols, dans lesquels on fait entrer la limaille de fer; peu de temps après la préparation, ces opiates deviennent durs comme la pierre, & le fer se trouve dans un état d'oxide ou de carbonate.

La chaleur, le contact de l'air concourent à toutes ces altérations: c'est à la continuité de leur action qu'il faut spécialement attribuer la rancidité des semences grasses, des huiles, des onguens, des emplâtres, la dureté, le changement de couleur que prennent en vieillissant les compositions emplastiques, sur-tout celles dans lesquelles il entre quelque préparation de plomb ou de zinc.

L'air atmosphérique est, comme l'on sait, d'après la belle analyse qu'en a faite M. Lavoisier, un mélange de gaz oxygène & d'azote, qui tiennent une petite quantité de gaz acide carbonique, & une quantité plus ou moins grande d'eau qui tantôt est en dissolution, tantôt est seulement dans un état de suspension. Ces différentes substances exercent une action très-marquée sur les corps avec lesquels elles sont en contact, ainsi l'eau est enlevée à l'air par la potasse, & différentes espèces de sels concrets d'abord après leur préparation, mais qui peu-à-peu deviennent fluides & tombent en déliquescence; d'autres sels au contraire & sur-tout ceux qui ont la soude pour base, perdent peu-à-peu leur forme cristalline, ils diminuent de poids, se réduisent en poudre, tombent en efflorescence, parce qu'ils sont privés de leur eau de cristallisation par le contact de l'air; différentes drogues ou préparations pharmaceutiques agissent plus directement sur les principes constitutifs de l'air atmosphérique. Ainsi la potasse en contact avec l'air, se charge peu-à-peu du gaz acide carbonique, se cristallise, devient effervescente & forme un carbonate de potasse; l'oxygène avec le concours du calorique, se fixe dans les compositions emplastiques, dans les huiles, & augmente leur oxidation, enfin plusieurs préparations métalliques, & sur-tout quelques oxides de mercure, attirent, retiennent & fixent l'azote.

La lumière est un quatrième agent naturel de l'altération dans nos pharmacies. Son action est encore peu observée. Elle est cependant très-sensible sur plusieurs préparations, & parait se

borner à en dégager l'oxygène. Ainsi l'acide muriatique oxygéné, quoique conservé dans un flacon de cristal bien bouché, perd bientôt une partie de son oxygène & de ses propriétés, & nous voyons plusieurs oxides métalliques, sur-tout ceux de mercure, quoique conservés dans des flacons de verre bien bouchés, & dans des endroits d'une température égale, changer peu-à-peu de couleur, & se rapprocher de l'état métallique. Cette altération est sur-tout très-remarquable à la superficie la plus exposée à l'influence de la lumière.

Outre ces agens naturels, il est, dans nos pharmacies, d'autres causes accidentelles; ainsi différentes espèces d'insectes attaquent les substances animales & végétales, rongent le principe muqueux, & ne laissent à sa place que leurs excréments, ou les dépouilles de leurs larves.

La forme des vases, la matière dont sont composés ceux dans lesquels on fait la préparation, & où on la conserve, est encore une cause de l'altération des substances médicamenteuses; ainsi les sirops que l'on conserve dans des *chervettes* ou vases à large ouverture, sont bien plus sujets à se candir que ceux que l'on met dans des bouteilles de verre, & bouchées avec un liège.

La matière des vases dans lesquels on prépare ou on conserve les médicaments, altère souvent leurs propriétés, & leur donne quelquefois des qualités nuisibles & très-dangereuses; pour la faire sentir, nous observerons que la solution de potasse ou de soude, dans leur état de pureté, attaque les flacons de verre; les tamarins du commerce contiennent souvent un oxide de cuivre & même en assez grande quantité, parce qu'on les laisse fermenter dans des vases de cuivre; le sirop de violette contient aussi souvent un oxide d'étain, parce que les pharmaciens recommandent, comme une condition pour l'obtenir d'un beau bleu, de faire l'infusion des fleurs de violettes dans un vase d'étain. Souvent nous avons vu préparer le sirop de vinaigre, de framboises, dans des terrines de porcelaine vernissée, aussi nous trouvons dans ces sirops une certaine quantité d'oxide de plomb, & leur usage causeroit des coliques, & d'autres accidents de même nature. Nous pourrions ajouter beaucoup de remarques semblables sur cette cause de l'altération des substances médicamenteuses, mais nous airons occasion d'y revenir dans plusieurs articles de cet ouvrage, & sur-tout aux mots CONSERVATION ET PRÉPARATION des médicaments.

Le rapprochement de ces différentes observations doit faire sentir combien le pharmacien doit apporter de soins, d'attentions dans le choix des substances qu'il emploie, dans leur préparation, & sur-tout dans leur conservation; ces observations doivent également faire sentir au médecin avec quelle circonspection il doit prescrire ces compositions officinales dont la prépa-

ration

ration date quelquefois de plusieurs années, & dont la conservation est si suspecte. Peut-être seroit-il plus avantageux pour les malades, & pour s'assurer de l'effet réel des remèdes, de ne prescrire que des substances simples, dont la mixture & la préparation fussent faites dans le temps où on en a besoin; de rejeter toutes les confusions & préparations pharmaceutiques, dont les propriétés premières sont si facilement altérées par le laps de temps, & le concours des différens agens que nous avons indiqués.

Quoique d'après l'étymologie, le mot *altération* désigne seulement un changement spontané accidentel d'une substance, cependant en pharmacie, & suivant l'acception la plus ordinaire, on y attache toujours l'idée de dépravation, de détérioration ou de corruption; mais il faut observer que quelques substances ou préparations, en éprouvant un changement dans leur forme, dans leur consistance, dans leur couleur, ne perdent pas toute leur efficacité première, que quelques-unes acquièrent des propriétés nouvelles qui sont encore utiles & avantageuses, que d'autres peuvent être facilement ramenées à leur état premier; & d'après ces considérations, peut-être seroit-il convenable de distinguer deux genres, ou si l'on veut deux degrés d'altération.

Le premier, que nous nommerions volontiers *altération de combinaison*, comprendroit les différens changemens qu'éprouvent les substances ou préparations pharmaceutiques, mais qui ne perdent pas toutes leurs propriétés médicinales, ou qui en acquièrent d'autres également utiles; nous rapporterions à ce premier genre la déliquescence, l'efflorescence spontanée des sels, l'espèce de fermentation lente & graduelle qu'éprouvent quelques électuaires; ainsi la thériaque, après quelques mois de préparations, est bien changée de ce qu'elle étoit d'abord, elle est moins narcotique, mais la mixture est plus intime; les résines sont dans un état de solution plus parfaite, & en perdant de sa propriété narcotique; & cet électuaire conserve encore des qualités fortifiantes qui le rendent utile.

Le second genre que nous nommerions *dépravation, détérioration ou corruption*, comprendroit tous les modes d'altération qui diminuent, détruisent toutes les propriétés utiles d'une substance, ou lui donnent des qualités nuisibles & dangereuses; nous rapporterions à ce genre, la moisissure, la putréfaction des plantes, la vermoulure des substances animales, la dissipation du principe aromatique, la rancidité des huiles, des compositions emplâtriques, la fermentation acide des sirops des conserves, &c. &c.

Les drogues que nous fournit le commerce maritime sont quelquefois mouillées, soit par les brouillards, soit par les eaux de la mer; ce genre particulier d'altération est désigné sous le nom d'*avarie* ou *drogues avariées*.

Chimie, Tome II.

Quelques anciens pharmaciens employoient encore le mot d'*altération* pour désigner la préparation qu'ils faisoient subir à différentes substances, pour corriger, modérer ou diminuer des propriétés trop actives.

ALTERCUM ou **ALTERCANGENON**. (*Pharmacie*.) Ces dénominations, suivant Pline, viennent des Arabes, & elles sont employées par beaucoup de pharmacographes anciens, pour désigner la jussquiame.

ALTERENIABIN. (*Pharmacie*.) Dénomination des Arabes pour désigner la manne, & plus particulièrement celle de l'alhagi. On trouve, dans Mésué, une préparation faite avec la manne, qu'il nomme *sirap acéteux alterenibin*.

ALTHAIUT. (*Pharmacie*.) Dénomination employée par quelques écrivains arabites, pour désigner cette espèce de gomme résine, que l'on connoît dans le commerce sous le nom de *gomme ammoniac*, & que nous nommons simplement *ammonium*, pour la distinguer de l'ammoniaque des chimistes modernes, ou alcali volatil. (*Voyez* AMMONIUM & AMMONIAQUE.)

ALTHANACA, **ALTERNET**, **ALBIMEC**. (*Pharmacie*.) Expressions des arabites, pour désigner l'orpiment ou oxide d'arsenic sulfuré jaune.

ALTHEA. (*Pharmacie*.) Dénomination grecque, également adoptée par les boranistes & les pharmaciens, pour désigner une plante que l'on connoît généralement en France, sous le nom de *gula-mauve*. C'est sous ce mot que nous rapporterons les différentes préparations médicinales que l'on fait en pharmacie, avec cette plante.

Des alchimistes toujours amateurs de dénominations pompeuses, pour cacher les préparations les plus simples, ont aussi donné suivant la remarque de Pliniscampi, le nom d'*althea*, *plurim* ou *anima saturni*, au précipité que l'on obtient en versant de l'eau dans une solution de plomb, par l'acide acéteux.

ALTINURAUM. (*Pharmacie*.) Expression des arabites, pour désigner le virgrol, ou sulfat de fer.

ALTIHT. (*Pharmacie*.) Dénomination employée par les Arabes, & quelques-uns de leurs copistes, pour désigner l'espèce de gomme résine, que l'on connoît généralement sous le nom d'*assa-fœtida*. (*Voyez* ce mot.)

ALTINGAT. (*Pharmacie*.) Dénomination des arabites, pour désigner le verdet, ou oxide de cuivre par l'acide acéteux.

A a

ALUD, ou simplement **UD**. *Pharmacie*.) Dénomination arabites, pour désigner le bois d'aloes ou agalochum. (*Voyez* ces mots.)

ALUDELS. *Figure 35 des Instrumens & fourneaux*. Les chimistes ont nommé aludels, des espèces de pots ouverts par les deux bouts, renflés dans leur partie moyenne, & portant chacun une gorge à leur partie supérieure pour se joindre ensemble, en sorte que quand ils sont réunis, ils forment un tuyau (*fig. 16, même planche*,) plus ou moins long, suivant le nombre de pots dont il est composé ; celui que l'on destine à terminer le tuyau, doit être fermé à sa partie supérieure, ou n'avoir qu'un petit trou pour le passage de l'air. Cependant ce pot est quelquefois ouvert comme les autres, mais on le couvre d'un chapeau de verre aveugle, (*fig. 37, même planche*,) c'est-à-dire, dont le bec n'est point ouvert. Cette construction vaut même mieux que l'autre, parce qu'à travers ce chapeau, l'on peut par quelques phénomènes qui s'y présentent juger des progrès de l'opération. La réunion des aludels n'est donc qu'une espèce de récipient ou de chapeau que l'on peut agrandir & diminuer à volonté. Leur usage est en général de recevoir des matières sèches réduites en vapeurs dans une cucurbitre de terre, (*fig. 38, même planche*,) sur laquelle ils doivent être posés. C'est ainsi qu'on prépare les fleurs de soufre, ou le soufre sublime, l'acide benzoïque, l'oxide d'arsenic, &c. (*Voyez SUBLIMATION*.) L'on pourroit faire ces vases de beaucoup de matières différentes, mais il n'y en a que de terre ou de fayence ; d'ailleurs leur usage est si peu étendu aujourd'hui & si peu nécessaire, qu'il n'est pas étonnant qu'on ne s'en soit pas occupé davantage. (*M. Vauquelin*.)

ALUDIL. (*Pharmacie*.) Nom donné au mercure, par quelques écrivains arabites.

ALLULFULUMEN. (*Pharmacie*.) Expression barbare que l'on trouve dans quelques anciens pharmacographes, & par laquelle, dit Marnard, il paroît qu'ils ont voulu désigner l'espèce de plante que nous connoissons sous le nom d'*ocymum* ou basilic.

ALUM. (*Pharmacie*.) Nom donné par quelques écrivains arabites à la grande confoude.

ALUME. *Voyez* **ALTALCH**.

ALUMINE. Ce mot a son étymologie très-facile à déterminer dans le mot latin *alumen*, *aluminis*, & il est formé comme on voit du génitif. C'est M. Morveau, qui le premier a proposé cette dénomination pour désigner la terre de l'alun, que l'on appelloit argile avant

même qu'on fût bien instruit de la différence qui existe entre ces deux substances ; mais depuis que cette différence est bien connue, (*voyez* le mot **ARGILE**,) on a senti la nécessité de posséder un nom particulier, pour désigner convenablement la terre pure qui fait la base de l'alun. L'expression proposée par M. Morveau, a été adoptée unanimement comme très-propre à remplir ce but, par les physiciens français, qui ont concouru à la formation de la nouvelle nomenclature. (*MM. Lavoisier, Morveau, Berthollet, Fourcroy*.) *Voyez* **NOMENCLATURE**.

Dans l'état actuel de la chimie, & sur-tout relativement à son union avec les arts, & à l'influence qu'elle doit bientôt avoir sur la rapidité de leurs progrès, les combinaisons, & en général l'histoire chimique de l'alumine, présentent un des objets les plus importants, & doivent être exposées dans tout le détail nécessaire, soit pour faire connoître à fond les propriétés de cette terre, soit pour mettre sur la voie des nouvelles découvertes que la science désire encore sur cette matière ; car on sçait, que nous avons toujours en vue de remplir ces deux objets dans cet ouvrage. En conséquence, nous nous occuperons successivement, & dans cinq paragraphes séparés, 1°. de l'histoire des principales découvertes faites sur l'alumine ; 2°. de son extraction & de sa purification ; 3°. de ses attractions & de ses combinaisons ; 4°. de sa nature intime, ou de sa composition ; 5°. de ses usages en la considérant dans la nature & dans les arts.

Ces divisions sont presque les mêmes que celles qui ont été suivies dans l'article général des alcalis, & l'on verra qu'en effet l'alumine a des rapports remarquables avec ces sels ; aussi le même ordre nous guidera-t-il constamment dans les articles des diverses terres, telles que la baryte, la chaux, la magnésie & la silice, ainsi que dans ceux des trois alcalis, ammoniacque, potasse & soude, & dans l'histoire d'un grand nombre d'autres substances.

Il n'est pas besoin sans doute de faire observer que comme il est question d'une des cinq terres qu'on a trouvées jusqu'ici dans l'analyse chimique des productions naturelles, on suppose que le lecteur connoit déjà les propriétés générales des terres, qu'il se rappelle leurs caractères distinctifs, ou que si il commence l'étude de la science, il aura lu d'abord l'article général des terres.

§. I. Histoire des principales découvertes relatives à l'alumine.

On est bien étonné lorsqu'on recherche l'époque des connoissances exactes que l'on a acquies en chimie, de reconnoître que sur la plupart des substances dont on s'occupe, elles n'ont été acquies que depuis le milieu de notre siècle, &c

que toutes celles qu'on possédoit auparavant n'étoient que des notions vagues, inexactes & incertaines, souvent même des erreurs très-grossières. Cette assertion est sur-tout applicable aux matières terreuses, & particulièrement à l'alumine. Il n'y a pas plus de quarante ans, que les chimistes croyoient tous que la base de l'alun étoit une terre absorbante, une véritable terre calcaire. Margraf est le premier, qui par la précision singulière de ses procédés & de ses expériences, ait commencé à soupçonner que cette base n'étoit pas de la même espèce que la terre à chaux, mais il ne s'est pas expliqué sur sa nature particulière. Baron en appuyant le sentiment de Margraf sur la différence de la base de l'alun d'avec une terre calcaire, s'est plus éloigné que lui de la vérité en voulant déterminer sa nature, puisqu'il l'a indiquée comme une terre métallique. C'est à Macquer que l'on doit la première connoissance exacte de la base de l'alun; il a fait voir qu'elle étoit constamment contenue dans les argiles, & que ce n'étoit que de l'argile pure; à la vérité il n'a point assez insisté pour être sur la différence de cette terre pure, d'avec ce qu'elle est dans la nature, & à cet égard M. Baumé a beaucoup insisté sur cette différence, quoique les idées qu'il avoit adoptées sur l'analogie de la base de l'alun avec le gypse ou le sulfate de chaux, soient bien éloignées de la vérité. En comparant tout ce qu'on a écrit sur la base de l'alun depuis Pott & Margraf, jusqu'au temps tout-à-fait moderne, on reconnoît facilement que les incertitudes, les idées vagues, les inexactitudes qui ont d'abord régné sur cette terre malgré les expériences du dernier de ces chimistes, tiennent presque entièrement au défaut de l'inexactitude; c'est même ici le lieu de faire appercevoir combien la précision & la propriété du langage influent sur la clarté & la netteté des idées. La confusion du mot argile signifiant tantôt la base de l'alun, tantôt les terres argileuses que présente la nature, est la principale source des incertitudes qui longtemps ont obscurci l'histoire de cette terre dans les leçons & les ouvrages de chimie; dans la nouvelle nomenclature, on ne peut plus craindre ces embarras, ces obscurités, ces erreurs mêmes. Le mot alumine désigne uniquement la base de l'alun, la terre qui est combinée avec l'acide sulfurique en excès dans le sulfate acide d'alumine, & on ne peut plus la confondre avec les argiles, ou les pierres argileuses qui sont ou des mélanges, ou des combinaisons naturelles de différentes substances terreuses, ni avec aucune autre espèce de terre; ainsi cette dénomination nouvelle qui tient essentiellement à l'histoire de cette terre ne pénétrera plus qu'on ne se méprenne sur sa nature particulière, & forcera de se rappeler les propriétés qui la distinguent & qui la caractérisent.

§. II. De l'extraction & de la purification de l'alumine.

On ne peut pas douter que les incertitudes qui ont pendant si long-temps régné sur la base de l'alun, ne dépendissent aussi & spécialement de la méthode peu exacte qu'on employoit autrefois pour examiner les terres & sur-tout pour les obtenir. Il suffisoit de voir une précipitation opérée dans une dissolution saline par un alcali, pour regarder ce précipité comme une terre absorbante, & l'on renfermoit sous la même dénomination, toute terre séparée par un alcali, en raison de la propriété qu'on avoit reconnue en général dans une terre soluble d'absorber les acides; ensuite, comme la terre calcaire étoit celle qu'on trouvoit le plus fréquemment dans les expériences, c'étoit à elle qu'on rapportoit tous les précipités auxquels qu'on obtenoit. Lorsque par les travaux successifs de Pott, Margraf, Baron, & Macquer, ont eut découvert que la base de l'alun étoit une terre analogue à l'argile, il fut facile de reconnoître que pour obtenir cette terre pure, il falloit la séparer de l'alun; on commença donc par conseiller de précipiter une dissolution d'alun par l'alcali fixe, mais on étoit bien loin d'avoir encore, dans ce procédé simple, un moyen d'obtenir la base de l'alun pure; ce n'étoit point là de l'alumine; comme nous la connoissons aujourd'hui, Baron dans son mémoire sur cette terre, imprimé parmi ceux de l'académie pour l'année 1760, reconnoît que la terre précipitée de l'alun par l'alcali fixe, quoique bien lavée, contenoit de l'acide sulfurique ou vitriolique comme on l'appelloit alors. Il employa un moyen simple pour l'en débarrasser & pour purifier cette terre, c'étoit de la faire bouillir dans une lessive alcaline, & de la laver ensuite avec assez d'eau bouillante pour emporter tout l'alcali dont elle pouvoit être imprégnée; à l'aide de ce procédé il obtint la base de l'alun assez pure, pour qu'elle ne donnât plus de traces d'acide sulfurique, en la chauffant fortement avec le charbon; mais cela ne pouvoit suffire qu'à l'époque où travailloit Baron. Douze ans après ce travail, Black ayant examiné & prouvé qu'il couvrait dans les alcalis, d'eau fix qui est nommé aujourd'hui acide carbonique, on reconnoît que ces sels employés pour la précipitation des terres, leur fournissoient toujours de l'air fixe ou acide carbonique, de sorte qu'elles ne se séparent point pures & telles qu'elles étoient unies aux acides, mais combinées avec celui qui étoit contenu dans les alcalis; l'alumine précipitée de l'alun par l'alcali fixe ordinaire ou chargée d'une quantité plus ou moins grande d'acide carbonique, se combine donc avec ce dernier acide, à mesure que l'alcali fixe s'unit à l'acide sulfurique, & au lieu d'avoir de l'alumine pure, on a du carbonate d'alumine. Enfin, la tendance de l'affinité de l'alumine pour les matières métalliques, & sur-tout pour les oxides de fer, connus

depuis long-temps en chimie, d'après les recherches de Geoffroi, de Baron, Rimmann, & de tous les chimistes modernes, est encore une cause ordinaire ou très-fréquente de l'impureté de cette terre, parce que l'alun est très-souvent mêlé d'un peu de sulfate de fer, ou d'oxide de ce métal. Telles sont les sources abondantes de l'impureté de l'alumine, & comme elles pouvoient se trouver toutes réunies, & qu'il étoit même fréquent qu'elles se trouvaient réunies, on conçoit qu'avant d'en bien connoître & l'existence, & l'influence, il étoit presque impossible de se procurer de l'alumine pure. Il en est donc de cette terre, comme de toutes les autres substances primitives en quelque sorte, dont on a sans cesse besoin dans un laboratoire de chimie; pendant très-long-temps, on ne les préparoit qu'impures, & de-là procenoient leur origine une foule d'erreurs qui rendoient les connoissances chimiques incertaines & incertaines. Il falloit que les découvertes chimiques fussent arrivées au point où elles sont, depuis une quinzaine d'années, pour qu'on connût exactement les caractères du plus grand nombre des matières simples, & qu'on pût les amener à leur véritable état de pureté. Si d'après l'identité reconnue entre la base des argiles naturelles & la base de l'alun, il a été promptement décidé par les expériences de MM. Macquer & Baume, qu'on ne pouvoit pas trouver l'alumine pure dans les terres offertes par la nature, il a fallu plus de travaux encore que les deux chimistes n'en avoient fait, il a fallu sur-tout quelques découvertes qui leur manquoient, pour avoir des moyens capables de donner cette terre dans un grand état de pureté. Cela est si vrai, qu'on ne trouve point encore même dans les livres de chimie moderne, la suite & la description des procédés nécessaires pour obtenir l'alumine seule & séparée de toute autre matière étrangère. Nous allons y suppléer en décrivant la méthode simple que nous employons pour cela.

On choisit de l'alun ou du sulfate-acide d'alumine bien pur & qui ne contienne pas de fer. On le dissout dans suffisante quantité d'eau distillée; on laisse cette dissolution exposée à l'air pendant quelques jours, dans des vases plats & larges, afin d'en faire précipiter les moindres molécules de fer; si elle en contient on la filtre ou on la décante; on l'essaise avec du prussiate de potasse ou du prussiate calcaire & de la noix de galle; si elle ne se colore point par ces réactifs, elle est propre à la réussite de l'expérience. Alors on verse dans la dissolution de la potasse ou de la soude caustique, bien pures & préparées par l'alcool, (*Voyez les mots POTASSE & SOUDE*); on a soin de mettre l'un ou l'autre de ces alcalis en excès, pour bien attirer & enlever tout l'acide sulfurique; on fait bouillir pendant quelques minutes la liqueur avec le précipité, & en l'agi-

tant beaucoup, afin de multiplier les surfaces & de bien enlever tout l'acide sulfurique à l'alumine; on laisse déposer le précipité, on décante la portion liquide & on lave la terre déposée à plusieurs reprises avec de l'eau bouillante, & jusqu'à ce que celle-ci n'ait plus de saveur alcaline, ni ne verdisse plus le papier teint avec la fleur de mauve. On fait ensuite sécher l'alumine sur des assiettes de fayence, dans une étuve ou au soleil. Par ce procédé, on obtient l'aluminé dans une terre blanche, très-fine & absolument privée d'acide sulfurique, d'acide carbonique, d'oxide de fer & de substance terreuse quelconque. C'est dans cet état de pureté parfaite, que l'alumine présente toutes les propriétés qui seront le sujet du paragraphe suivant. Il est nécessaire d'en avoir toujours quelques livres préparés ainsi dans des poudriers de verre munis d'un couvercle à raipure, ou dans des flacons, ou dans des bouteilles bouchées avec le liège, qu'on nomme ordinairement dans les laboratoires des poudres renversés. La seule objection qu'on puisse faire à ce procédé, c'est la cherté; mais il faut observer que l'on ne doit point regarder aux dépenses, pour les laboratoires de recherches; l'exercice de la chimie est très-dispendieux, & c'est un malheur inévitable. On doit faire remarquer encore que cette préparation de la terre aluminieuse n'est nécessaire que pour les expériences très-exactes, pour se procurer par exemple des sels aluminés, très-purs, & qu'il y a beaucoup de circonstances où l'on peut employer l'alumine précipitée par l'alcali fixe ordinaire, c'est-à-dire, par la potasse du commerce, qui est un mélange de potasse caustique, de carbonate de potasse, & de quelques sels neutres, de plusieurs terres, & souvent d'un peu d'oxide de fer; aussi l'alumine préparée de cette manière, n'est-elle pas pure, & contient-elle du carbonate d'alumine, de la silice, de la craie & du fer.

§. III. Des propriétés & des attractions de l'alumine.

1°. L'alumine bien pure & préparée comme il a été dit dans le paragraphe précédent, est sous la forme d'une poudre blanche, très-fine, sèche & douce au toucher, sans odeur; elle se polt sous le doigt, & y adhère; elle peut aussi être sous la forme de globes ou rognons irréguliers, si on la fait sécher en flocons, en petites masses, après l'avoir précipitée, & si on ne la réduit point en poudre après sa dessiccation. Il n'est point indifférent de l'employer dans l'un ou l'autre état pour les expériences de la chimie; ses attractions s'exercent bien mieux sous la forme de poudre que sous celle de morceaux solides.

2°. Quoiqu'on ne puisse pas dire que l'alumine ait une véritable saveur, elle excite cependant sur la langue & sur le palais une action qui lui appartient en propre, & qu'on ne trouve point dans d'autres substances. Elle produit d'abord une fuan-

sation de sécheresse & de resserrement léger, qui semble attirer, absorber toute l'humidité de la bouche, & qui se convertit en une sorte d'apprêt plus facile à indiquer d'une manière générale, qu'à décrire avec clarté. Cette sensation s'étend jusqu'aux fosses nasales, où elle porte une espèce de sécheresse remarquable.

3°. Le pesanteur spécifique de l'alumine, dit M. Kirwan, n'exède pas 2,000, tandis que celle de la baryte plus pesante à la vérité des matières terreuses, va au-delà de 4,000, suivant le même chimiste.

Suivant Bergman, l'alumine a pour pesanteur spécifique 1,304.

4°. On ne fait pas si la lumière se combine avec l'alumine ; mais on fait qu'exposée aux rayons du soleil, cette terre n'éprouve aucune altération qu'on puisse apprécier.

5°. Il n'en est pas de même de l'impression du calorique en action, du calorique libre, ou de la chaleur par l'alumine. Quand on l'expose au feu, soit qu'on y ait ajouté auparavant un peu d'eau, pour lui donner du corps & de la consistance, soit qu'on la chauffe avec la portion d'eau qu'elle retient fortement, comme nous le dirons plus bas, elle se resserre, se durcit en se gerçant dans différents points de sa continuité ; elle prend de la retraite, & acquiert une telle dureté, qu'elle devient capable d'étinceler par le choc du briquet. Cette propriété est une des plus singulières & en même-temps une des plus caractéristiques de l'alumine ; elle mérite de fixer l'attention des chimistes. Quoiqu'elle soit le fondement de tous les arts relatifs aux différentes espèces de poteries, depuis les briques & les tuiles jusqu'à celui de la porcelaine, & quoiqu'elle soit connue depuis la plus haute antiquité, sa cause est encore entièrement ignorée. Comment d'abord s'opère par l'action du calorique qui dilate & raréfie tous les corps, un resserrement, un rapprochement dans toutes les dimensions, qui est proportionnel aux différentes quantités de calorique introduit dans cette terre, ou plutôt aux différents degrés de température, auxquels on l'a exposée, resserrement dont M. Wedgwood a tiré tant de parti pour la construction de son thermomètre propre à mesurer les températures au-dessus de celles des liqueurs en évaporation ? (*Voyez THERMOMÈTRE.*) Ce phénomène est-il dû simplement à l'attraction des molécules d'alumine pour elles-mêmes, favorisée par l'action du calorique qui les dispose, de manière à ce qu'elles s'appliquent & adhèrent les unes aux autres par les surtaces qui se conviennent le mieux ; & à l'évaporation de l'eau qui écartoit ces molécules & qui les tenoit à une distance donnée par son attraction particulière ? On n'a pas d'autre raisonnement, d'autre théorie pour expliquer cette induration de l'alumine par le feu. Car il n'est pas vraisemblable qu'on l'attribue aux molécules du calorique fixées dans

celles de la terre, puisque cette combinaison forme en général des composés plus rares, plus fusibles, &c. Ne pourroit-on pas regarder la cuité de l'alumine accompagnée d'une diminution de volume ou de retraite, comme une sorte de fusion commencée, & qui s'arrête bien avant le terme de la vification ? Cette assertion peut être étayée d'une des expériences de M. Lavoisier, sur les effets de la chaleur produite par l'action de l'air vital sur les charbons. Ce célèbre physicien ayant exposé de l'alumine pure à son appareil de fusion par l'air vital, observa qu'elle formoit une fusion pâteuse, & qu'elle finissoit par se transformer en une sorte de pierre très-dure, qui coupoit le verre, comme les cristaux gemmes, & qui ne se laissoit que difficilement entamer par la lime. M. Lavoisier en conclut que l'alumine est vitrifiable par elle-même. M. Geyer n'a pu en fondre que les bords, soit sur le charbon, soit sur la pince. M. Hermann l'a vue couler dans une minute en un globe blanc laiteux. Il est difficile de ne pas croire que la petite portion de cendre & de poraille qui se trouve en contact avec l'alumine, dans le creux du charbon dans lequel on l'expose au courant d'air vital, suivant les procédés des expériences indiquées ici, a pu influer sur cette espèce de fusion. Au reste un grand principe de chimie explique ces difficultés apparentes. Il paroît certain qu'il n'y a aucun corps infusible par lui-même, & qu'il n'est pas un des corps les plus réfractaires qu'on connoisse, qui ne soit susceptible de se fondre, en lui donnant un degré de feu suffisant, ce qui revient à dire que plusieurs substances ne sont pyrrées ou infusibles pour nous, que parce que nous ne pouvons pas leur appliquer le degré de feu qui leur convient. Cela est sur-tout vrai, par rapport à l'alumine, & la propriété de se durcir au feu, devient plus intelligible & plus d'accord avec tous les phénomènes de la science, lorsqu'on la considère comme un commencement de fusion, qui ne peut devenir complète qu'à une température bien supérieure à celles que l'on emploie ordinairement. Quoique quelques chimistes aient cru qu'après sa cuité l'alumine avoit changé de nature, & qu'elle s'approchoit de la terre silicee, des expériences font voir qu'elle est toujours ce qu'elle étoit auparavant. Elle forme les mêmes sels avec les acides qui seulement la dissolvent beaucoup plus lentement, en raison de son extrême densité.

6°. On n'a pas encore décrit avec exactitude dans les ouvrages de chimie les altérations que l'alumine pure est susceptible d'éprouver de la part de l'air atmosphérique ; elle en attire réellement l'humidité, lorsqu'elle est très-sèche, & l'air très-charge d'eau. Il ne faut cependant pas considérer ce phénomène, comme la déliquescence des sels très-dissolubles, mais il ne faut pas non plus le passer sous silence. Les argiles naturelles s'humectent à l'air, & se délient par couches. Il est moins prouvé,

quoiqu'il soit également vraisemblable, que l'alumine absorbe l'acide carbonique de l'atmosphère; à la vérité ce phénomène est beaucoup moins sensible que dans les alcalis fixes & la chaux; mais il suffit qu'il paroisse exister, pour qu'on y ait attention dans les laboratoires, & qu'on ne laisse pas l'alumine pure exposée à l'air.

7°. L'alumine a une attraction assez forte pour l'eau, quoiqu'elle n'y soit pas réellement dissoluble. C'est l'espèce d'avidité que cette terre a pour absorber l'humidité, qui fait qu'elle adhère avec un peu de force à la langue : ce qu'on nomme haper à la langue. En jettant un peu d'eau sur de l'alumine sèche, on voit celle-ci l'absorber avec force, il s'en exhale une odeur fade, particulière, qu'on nomme odeur de terre, odeur d'argile. On fait par un léger broyement une pâte ductile, à laquelle on peut donner toutes les formes possibles. Cette pâte chauffée ne perd toute l'eau qu'on a mêlée avec l'alumine, qu'à un grand feu continué long-temps. Ce sont sur-tout les dernières portions d'humidité, qui adhèrent le plus fortement à l'alumine, & qu'on ne peut en séparer qu'avec une extrême difficulté. Lorsqu'on jette un peu d'alumine en poudre dans une grande quantité d'eau, & qu'on la mêle dans la totalité en l'agitant, cette terre y reste suspendue & ne se sépare que très-lentement. L'eau acquiert par cette suspension une sorte de caractère savonneux; elle est grasse & comme douce au toucher, elle mousse légèrement & nettoie bien les étoffes de laine. Tous ces faits annoncent, comme nous l'avons indiqué, une attraction remarquable entre l'alumine & l'eau. Plusieurs auteurs ont même cru que cette terre pouvoit s'y dissoudre; quelques-uns ont pensé que cette dissolution faisoit une classe d'eaux minérales; mais l'examen chimique ne répond pas à cette assertion, au moins quant aux eaux où l'on a mêlé artificiellement de l'alumine; car en évaporant ces eaux filtrées jusqu'à sécher, on n'a pas un dix millième de résidu.

8°. L'alumine se combine avec toutes les terres par la voie sèche. Quelque difficile qu'elle soit à fondre, quand elle est seule, elle acquiert une fusibilité plus ou moins énergique, par l'addition des autres terres; c'est sur-tout avec la silice & avec la chaux qu'elle devient fusible. Si l'on chauffe trop fortement les creusets & les pots faits avec un simple mélange d'alumine & de silice, ils fondent par parties ou entièrement. Les briques sont vitrifiées à leur surface, lorsqu'elles sont trop cuites. Elles se couvrent de même d'un émail ou d'un vernis vitrifié dans les fourneaux, où l'on fond le verre, le fer, où l'on cuit les porcelaines, la porcelaine, &c.; dans les fourneaux de fusion de nos laboratoires, les creusets se déforment & se ramollissent très-souvent. Dans les hauts fourneaux de trente-neuf pieds de hauteur, où l'on traite la mine au creuset, près de Montcenis en Bourgogne, des creusets de dix pouces de hau-

teur, de trois pouces de largeur, & de plus d'un pouce d'épaisseur, faits avec la terre argileuse qui sert à fabriquer les briques dont on revêt l'intérieur même de ces fourneaux, jettes par le gueulard ou par le haut, ont été complètement fondus, & se sont dissous dans le laitier. Enfin le contact seul de la chaux rend l'alumine fusible; aussi M. Darcet a-t-il observé que les pierres calcaires se fondent dans les creusets d'argile, vers les parois mêmes de ces creusets, & M. Gérhard a-t-il trouvé que l'alumine se fond dans un creuset de craie, & reste sans fusion dans un creuset d'argile. On reconnoît bien dans ces fusions une action réciproque des terres les unes sur les autres, & le produit d'une attraction particulière entre leurs molécules. Le résultat de ces combinaisons est une sorte d'émail ou de verre opaque, dur, scintillant, difficile à fondre, & auquel on ne peut donner aucune transparence, quand la proportion d'alumine est un peu considérable. La nature fait des combinaisons terreuses analogues dans les volcans, & on les retrouve dans les laves & les basaltes. Il paroît même qu'elle combine intimement l'alumine avec d'autres terres, par le moyen de l'eau : car les calcédoines, les talpes, & sur-tout les schistes, plusieurs gemmes, les grenats, la zéolite, le talc, & plusieurs autres pierres dans lesquelles l'analyse chimique a fait trouver jusqu'à près de soixante pour cent d'alumine, paroissent manifestement avoir été formées par l'eau.

9°. On n'a point encore convenablement examiné l'action des alcalis sur l'alumine; voici ce que l'on a déjà ou vérifié ou simplement aperçu à cet égard par l'observation, quoiqu'on n'ait point fait d'expériences & de recherches suivies sur cet objet. Par la voie sèche, les alcalis fixes ne font entrer l'alumine en fusion qu'avec beaucoup de peine, encore est-ce une fusion pâteuse, jamais on n'obtient de véritable verre transparent & homogène; quand on ajoute de la silice, qui fait, comme on fait, la base du verre, l'alumine se fond mieux, mais forme dans le verre un fond blanc opaque, comme l'oxide d'étain dans les émaux. Par la voie humide, l'alumine paroît être dissoluble dans les alcalis caustiques, lorsqu'elle est très-divisée, par exemple, lorsqu'elle vient d'être précipitée de ses dissolutions dans les acides ou des sels qu'elle forme avec eux. L'ammoniaque même paroît avoir aussi cette propriété dissolvante, par rapport à l'alumine; car, dans la précipitation de cette terre du sulfate acide d'alumine par l'ammoniaque, lorsqu'on ajoute une plus grande quantité de celle-ci qu'il n'en faut pour la précipitation, on voit une grande partie de l'alumine disparaître & se dissoudre dans la liqueur ammoniacale. Il est vrai qu'on peut attribuer la dissolution de la terre à la formation d'un sel triple qui paroît en effet exister entre ces deux bases & l'acide sulfurique. On voit au moins, d'a-

près cet exposé, que l'action réciproque de l'alumine & des alcalis mérite d'être examinée avec soin par les chimistes.

10°. Tous les acides sont susceptibles de s'unir à l'alumine, & de former avec elle des sels composés ou moyens, qui sont rarement neutres. Il faut remarquer à l'égard de cette combinaison en général, qu'elle n'a lieu que, lorsque l'alumine est très-divisée, soit sous la forme de poussière, soit, & encore bien mieux, sous celle de flocons légers & comme rarefies, suspendus dans l'eau, tels qu'en présente l'alumine, lorsqu'on vient de la précipiter du sulfate par les alcalis. Dans ce dernier état, il n'y a presque aucun acide, excepté ceux qui sont peu dissolubles & peu sapides qui ne la dissolvent pas; mais, lorsqu'on l'a laissée se précipiter, & lorsque ses molécules se sont rapprochées les unes des autres, au point de former au fond des vases un magma solide, il n'y a plus dès-lors que les acides puissans, qui la dissolvent promptement. Si on la fait dessécher à l'air, la dissolution devient de plus en plus difficile. Telle est la raison pour laquelle l'analyse des argiles naturelles demande beaucoup de temps, en raison de l'adhérence des molécules de l'alumine les unes pour les autres, ainsi que pour celles des autres terres qui lui sont unies dans la nature. Lorsque l'alumine a subi l'action du feu, lorsqu'elle est durcie ou cuite, les acides les plus acides ne la dissolvent qu'à la longue. C'est ainsi que les poteries sont d'autant moins altérables par les acides, qu'elles sont plus dures ou d'une cuisson plus forte. Cependant il n'en est aucune, sans en excepter la porcelaine la plus dure, qui ne soit altérable par l'acide sulfurique, lorsqu'on l'a laissée séjourner long-temps dans cet acide. Voilà pourquoi les capsules ou les soucoupes de porcelaine, dans lesquelles on a évaporé des dissolutions sulfuriques, dont l'acide étoit à nud, deviennent ternes, poreuses, graveleuses, & offrent à leur surface des aiguilles de sulfate acide d'alumine, qui s'y forment, & y repaissent constamment, après qu'on les a enlevées, jusqu'à ce que tout ce qu'il y a eu d'acide sulfurique, qu'absorbe par la pâte, soit ainsi sorti du vaisseau, qui en étoit imprégné. Ces faits apprennent comment on peut employer l'acide dont il est ici question, pour enlever peu-à-peu l'alumine aux terres & aux pierres mêmes les plus solides, qui en sont en partie composées.

11°. Les combinaisons de l'alumine avec les acides ou les sels neutres alumineux, sont en général d'une faveur astringente, quelquefois même fortement styptique, souvent avec excès d'acides, en général très-dissolubles, & même deliquescents. Quelques-uns prennent une forme cristalline régulière. Le plus grand nombre ne cristallisent que très-difficilement ou même tendent plutôt à rester sous la forme gélatineuse ou comme mucilagineuse. Ils sont tous plus ou moins décomposables

par le feu, par la baryte, les alcalis fixes, la chaux & la magnésie; ces terres & ces alcalis ont en général plus d'affinité avec les acides, que n'en a l'alumine. Elle paroît être susceptible de s'unir cependant avec les acides, en même-temps que plusieurs des bases précédentes, sur-tout l'ammoniaque & la magnésie, & de former des trifides ou sels triples, qui n'ont point encore été examinés convenablement.

12°. Il n'y a pas d'action sensible entre l'alumine & les sels neutres terreux ou alcalins, mais il en existe une entre cette terre & les sels moyens métalliques. Comme il ne s'agit ici que de la généralité de cette action, (car les détails appartiennent, ou à l'histoire de chaque métal, ou à celle de chaque espèce des sels métalliques en particulier), nous partagerons cette action générale en deux classes: l'une est relative à la décomposition des sels métalliques par l'alumine, c'est celle qui a été regardée comme la plus générale & la plus constante; l'autre comprend l'union de l'alumine avec le sel métallique, dont elle ne décompose qu'une petite portion, & avec la presque totalité de laquelle elle s'unit, de manière à former un sel triple alumineux & métallique en même-temps. Cette seconde action de l'alumine sur les sels métalliques est peut-être la plus fréquente, quoique la moins examinée jusqu'à présent. On ne l'a gueres aperçue, que pour le sulfate de fer. Aussi les chimistes, qui l'ont les premiers observée, ont-ils pensé que l'alumine avoit pour les acides une affinité égale à-peu-près à celle des oxides métalliques, ou que les acides avoient une sorte d'indifférence dans leur attraction pour ces bases comparées; mais on est fort loin de posséder sur ce point les connoissances nécessaires, pour juger sainement de ces triples combinaisons.

13°. L'alumine ne se combine point avec les métaux, mais elle a une attraction très-marquée pour les oxides métalliques. On le prouve par l'adhérence qu'elle contracte avec eux dans toutes les opérations de la chimie. Lorsqu'on prépare des sels alumineux, si l'alumine contient un oxide métallique quelconque, & sur-tout de fer ou de cuivre qui se trouvent le plus communément avec cette terre, cet oxide n'abandonne point l'alumine, & s'unit en même-temps qu'elle avec les acides; de sorte qu'il se forme dans ce cas des sels triples. Pour peu qu'un de ces oxides soit ou mêlé ou combiné dans des sels alumineux, si l'on précipite ces sels par un alcali, la terre précipitée entraîne avec elle l'oxide, & se trouve colorée dans toutes ses molécules également; en un mot, quelque petite que soit la quantité d'un oxide métallique, mêlé avec l'alumine, dans quelque opération que ce soit, cette terre est toujours intimement unie à l'oxide, & uniformément colorée par lui. Minnami a fait voir dans son histoire du fer, que les oxides de ce métal

non-seulement s'unissent facilement à l'alumine, mais encore font contracter à ses molécules une adhérence très-forte, les unes avec les autres, de sorte qu'elle devient très-promptement d'une dureté excessive. Telle est la cause de la densité extrême des pierres qui contiennent de grandes proportions d'alumine & d'oxide de fer, intimement combinées. La force de cette attraction entre l'alumine & les oxides métalliques, est encore prouvée, & par les mélanges & les combinaisons fréquentes que la nature présente entre ces deux genres de corps, & par la difficulté qu'on éprouve sans cesse en chimie, pour enlever un oxide métallique uni à l'alumine. C'est cette suite de phénomènes, déjà reconnus depuis long-temps en chimie, qui a fait penser à plusieurs chimistes qu'il y a une analogie de nature entre l'alumine & les métaux, ou comme ils nommoient autrefois les oxides de ces corps combustibles, les *terres métalliques*. Nous verrons ce qu'il faut penser de cette opinion dans le paragraphe suivant.

14°. Il n'y a pas une attraction bien sensible entre l'alumine & le soufre, ou au moins les expériences des chimistes modernes ne prouvent pas exactement encore cette attraction. Quand on met en contact de l'alumine & du soufre, il ne se passe rien entre eux à froid. Si on fait chauffer ces deux corps avec de l'eau, on ne trouve point de combinaison, on n'en observe que de faibles traces. Les terres qui ont une action marquée & analogue à celle des alcalis sur le soufre, donnent dans une expérience analogue à celle-ci, une couleur plus ou moins rouge, une saveur âcre & forte, une odeur fétide, à l'eau dans laquelle on les fait chauffer; il se forme pendant leur combinaison avec le soufre, ou par la décomposition de l'eau qui a lieu par l'acte même de cette combinaison, un gaz composé, que nous nommons gaz hydrogène sulfuré; (*Voyez les mots GAZ HYDROGÈNE, SOUFRE ET SULFURE TERREUX*) le même phénomène n'a point lieu avec l'alumine; l'eau ne contracte aucune couleur sensible; elle n'exhale qu'une très-légère odeur fétide, mêlée de celle de terre que donne toujours l'alumine délayée ou chauffée avec l'eau. Le soufre & la terre alumineuse restent sans combinaison au fond de ce liquide. Il n'y a pas d'indices plus marqués de combinaison lorsqu'on chauffe l'alumine avec le soufre dans des creusets; mais il y a une union intime entre ces deux corps, & une véritable formation de sulfure d'alumine, dans une expérience déjà ancienne de la chimie, qui est la préparation du pyrophosphate de Hornberg. Après avoir fait fondre & calciner de l'alun avec une matière végétale ou animale, comme du sucre, de la farine, du miel, qui se brûle & se réduit en charbon en même-temps, on chauffe fortement ce mélange mis dans un matras que l'on plonge dans un creu-

set rempli de sable & placé au milieu d'un bon fourneau. La matière noire & pulvérulente qu'on trouve dans le matras après quelques heures de feu, est un vrai sulfure d'alumine, qui ne peut se former sans doute que lorsque le soufre & l'alumine se trouvent dans un grand état de division, comme cela a lieu dans l'opération citée ici, tandis que ces deux matières sont en quelque sorte trop grossières dans leur état ordinaire pour pouvoir s'unir ensemble. (*Voyez le mot L'YDROPHORE DE HORNBERG*).

15°. On ne connoit point d'union entre l'alumine, le phosphore & le charbon, non plus qu'entre cette terre & les bitumes. Cependant on doit croire que l'alumine a quelque attraction pour les bitumes, & peut se combiner avec eux, puisqu'on trouve très-souvent des argiles naturelles imprégnées de bitume liquide. On voit beaucoup d'argiles & de glaises, brunes & noires, qui exhalent, quand on les chauffe, une odeur bitumineuse très-forte. Quelques-unes même en sont si chargées qu'elle répandent de la flamme; celles-ci sont même employées comme combustibles dans plusieurs lieux, & leur présence dans les fouilles a souvent trompé les personnes qui les entreprennent, en faisant regarder ces terres comme des espèces de charbon de terre. Ces argiles qui contiennent de l'alumine imprégnée de bitume, deviennent grises ou blanches après avoir éprouvé l'action de la chaleur, & on reconnoit bientôt que les matières qui les colorent sont combustibles & volatiles. On emploie plusieurs d'entre elles pour faire des poteries grises & blanches.

16°. Parmi les matières qu'on extrait des végétaux, & qu'on nomme principes ou matériaux immédiats de ces corps, il n'y a que les acides & les huiles qui paroissent susceptibles de s'unir à l'alumine, & de former avec elle des composés particuliers. La combinaison de cette terre avec les acides végétaux, a déjà été indiquée dans les numéros précédens 10 & 11. Nous ajouterons seulement ici que les acides végétaux s'unissent beaucoup moins facilement à l'alumine que les acides du règne minéral, & que cette terre forme avec les premiers des sels encore peu connus, mais qui paroissent être tous plus ou moins déliquescents. Quant aux huiles, celles qu'on nomme huiles fixes ou huiles grasses, & qu'on obtient par expression, paroît seul avoir une forte d'affinité avec l'alumine; en effet, quand on broie cette terre avec ces liquides, elle s'en pénètre, elle forme une pâte molle & ductile, dans laquelle l'huile ne se dessèche ou ne s'épaissit que très-lentement. On connoit aussi, par l'usage très-répandu des terres-grasses pour enlever les taches, la tendance que l'alumine a pour absorber les huiles, & la facilité avec laquelle elle se combine avec ces corps.

17°. Il faut considérer les matières animales
par

par rapport à cette terre absolument comme les substances végétales ; l'action réciproque de ces corps les uns sur les autres , est exactement la même ; les huiles , les graisses animales , se combinent avec l'alumine , & semblent prendre un caractère favorable dans cette combinaison. Quant aux acides animaux , on n'a encore que peu examiné les sels que plusieurs sont susceptibles de former avec l'alumine , car il y en a d'autres qui , à raison de leur peu d'énergie , & de la faible attraction de cette terre , semblent refuser de s'y unir.

18°. Le mode d'une combinaison plus intime , plus profonde , entre l'alumine & les produits animaux , indiquée par la présence de cette terre dans plusieurs de ces produits , est encore parfaitement inconnu. Il n'est pas douteux que dans les filières organiques des végétaux & des animaux , l'alumine se combine avec les premiers élémens de leur corps , & fait ensuite partie des matériaux composés ou compliqués qui les constituent , puisque l'analyse chimique en montre manifestement des traces dans les cendres qu'on obtient après la séparation de tous les principes volatils de ces matériaux. On peut même étendre cette considération beaucoup plus loin , lorsqu'en portant les regards sur les masses immenses d'alumine contenues dans les argiles qui forment des couches suivies dans les montagnes , on reconnoît manifestement que cette terre a été travaillée dans le sein des mers , & peut-être composée de toutes pièces par les tribus innombrables d'animaux qui en habitent les eaux. Mais cette considération appartient plutôt à l'ensemble de celles qui sont relatives à la nature de l'alumine , & elle doit être renvoyée au paragraphe suivant.

19°. Quoique l'ordre des attractions électives ou affinités de l'alumine , ne soit pas encore bien déterminé , soit parce que les expériences sur cette terre , ne sont point encore assez multipliées , soit parce qu'elles présentent beaucoup de difficultés en raison de son indissolubilité ; soit enfin parce que la plupart de ses combinaisons salines ne cristallisent que confusément ou point du tout , Bergman en recueillant tous les faits connus relatifs aux combinaisons de l'alumine , a présenté une esquisse de ses affinités , dans la trente-quatrième colonne de sa table des attractions électives simples , suivant la série suivante ; les acides sulfurique , nitrique , muriatique , oxalique , arsénique , fluorique , sélénique , tartareux , succinique , sacchar-lactique , stérique , phosphorique , formique , lactique , benzoïque , acéteux , boracique , lignique , malique , pyromuqueux , tannique , sulfureux , nitreux , carbonique , & prussique. Au bas de cette colonne , on trouve les attractions électives simples de l'alumine par la voie sèche , & dans un ordre un peu différent du précédent ; les acides phosphorique , bor-

cique , arsénique , tannique , sulfurique , nitrique , muriatique , fluorique , sélénique , succinique , formique , lactique , benzoïque , acéteux , les alcalis fixes , le soufre & l'oxide de plomb. Voici comment Bergman s'exprime lui-même sur les premières affinités , ou sur les affinités par la voie humide de cette terre. L'acide sulfurique attire l'alumine plus fortement que tous les autres , ensuite l'acide nitrique & l'acide muriatique après l'ordre que suivent les autres , n'est pas encore déterminé assez exactement ; il est certain cependant que les acides fluorique , arsénique , oxalique , tartareux & phosphorique , enlèvent l'alumine à l'acide acéteux. Il n'ajoute rien sur la manière dont il a déterminé ces attractions électives ; mais en comparant la fin de la trente-quatrième colonne à celles des trois précédentes qui appartiennent à la baryte , à la chaux & à la magnésie , on voit qu'il a suivi à peu de choses près le même ordre.

§. IV. De la nature intime de l'alumine.

Les vœux des chimistes sont encore bien loin d'être remplis par rapport à ce qu'ils desireroient savoir sur l'alumine. La nature intime de cette terre est encore entièrement inconnue comme celle des autres matières terreuses. On n'a présenté jusqu'ici que des hypothèses , ou des opinions absolument dénuées de fondement sur cette matière. Geoffroy & Baron ont cru dans le commencement & jusqu'au milieu de ce siècle , que l'alumine étoit un oxide métallique ; ils se fondaient sur la saveur acerbe des sels qu'elle forme avec les acides , sur son affinité pour les métaux , sur la constance avec laquelle elle en accompagne plusieurs & sur-tout le fer dans la nature , enfin sur la coloration que le feu lui donne. Geoffroy croyoit même être parvenu à convertir de l'argile en fer , en la chauffant fortement avec du charbon ; mais il est aisé de juger que ce qu'il avoit cru être une conversion , n'étoit qu'une simple extraction du fer contenu dans la terre qu'il avoit traitée. Il y a quelque mois qu'on crut avoir fait la même découverte à Schemnitz. M. Ruprecht , conseiller & professeur très-habile de cette mine , en traitant toutes les terres pures avec du charbon à un feu beaucoup plus fort que celui qu'on avoit employé , en a obtenu des petits globules métalliques ; cette expérience lui a réussi en particulier sur l'alumine , & il en a conclu qu'elle étoit comme les autres terres un véritable oxide métallique ; nous discuterons ces opinions sur toutes les terres en général , à l'article des TERRES. Il suffira de dire ici que M. Savard , qui a travaillé à Schemnitz avec M. Ruprecht lui-même , a bien prouvé , comme nous le pensions ici depuis les premières nouvelles de ces expériences , qui nous sont parvenues en décembre 1790 , que l'alumine seule ne fournit point de globules métalliques &c.

B b.

que ceux qu'on a obtenus, proviennent de la poudre de coupelle & du charbon qu'on emploie dans ces expériences; aussi ce prétendu métal retiré de l'alumine s'est-il trouvé par l'analyse, être comme celui qu'on a obtenu de toutes les autres terres, un véritable phosphore de fer.

On a eu encore d'autres idées sur la nature de l'alumine. Buffon, un des premiers écrivains de notre siècle, auquel on aura l'éternelle obligation d'avoir donné aux François le goût de l'histoire naturelle, mais dont le génie étoit trop éloigné de la route de l'expérience & de l'observation, pour interroger toujours l'une & l'autre, avoit imaginé un système singulier sur l'alumine, ou l'argile si abondante dans la nature. Il la regardoit comme de la silice altérée par les météores, atténuée, divisée par l'air, la chaleur du soleil, & les eaux, comme dénaturée & pourrie en quelque sorte par de longues macérations. Il croyoit que telle étoit la source de cet enduit en partie argileux que l'on trouve à la surface d'un grand nombre de cailloux, & il prenoit ainsi la séparation de cette terre combinée avec la silice dans toutes les pierres scintillantes opaques, pour une véritable transformation. Ce système a été adopté par plusieurs naturalistes, & même par quelques chimistes. On voit que M. Baumé en indiquant des analogies entre la base des pierres quartzées & l'argile, en les regardant comme une seule terre, & en les confondant sous le nom de terre vitrifiable, a pensé que la silice pouvoit être convertie en alumine, par différens procédés de la nature & de l'art, & qu'il a spécialement attribué cette espèce de transmutation aux alcalis fixes. Cette dernière opinion lui a été suggérée par la liqueur des cailloux, ou la dissolution du verre fusible fait avec la silice & la potasse, dans laquelle il a trouvé la base de l'alun; mais Schéele a prouvé que cette portion d'alumine provenoit du creuset rongé par le verre, & n'étoit point du tout le produit d'une prétendue conversion de la silice en argile. Cet objet sera discuté avec l'étendue qu'il exige, à l'article de la POTASSE. Quoique M. Baumé ait énoncé son opinion sur l'analogie de la silice & de l'alumine d'une manière très-prononcée dans plusieurs endroits de sa chimie expérimentale & raisonnée, (tome I, pag. 326 à 332.) il semble adopter une autre opinion quelques pages plus loin, (pag. 353 & suiv.) lorsqu'il regarde les argiles comme du gypse réduit en poudre & roulé par les eaux de la mer; il croit que le gypse devient plus simple & repasse à l'état d'une terre vitrifiable; il admet cependant toujours un peu d'acide sulfurique dans les argiles, & conséquemment dans la terre de l'alun, de sorte que pour le rendre un compte exact de son système, il faut concevoir que la terre vitrifiable atténuée & combinée avec un peu d'acide sulfurique, devient de l'argile. Mais

on fait que l'alumine pure ne contient point d'acide sulfurique, qu'il n'y a nulle analogie entre le gypse ou sulfate de chaux, & la terre alumineuse; que dans aucun cas la silice pure ne devient alumine; ainsi le système de M. Baumé se ressent de l'inexactitude où étoit la science à l'époque où il a écrit, de l'embarras où il étoit de distinguer convenablement & par des caractères certains toutes les terres différentes les unes des autres; il confond manifestement ou ne sépare que par de légères modifications, les terres siliceuses, gypseuses, calcaires, alumineuses, argileuses, ou plutôt, il les regarde toutes comme de la terre vitrifiable, plus ou moins atténuée, divisée, altérée par diverses combinaisons.

Aujourd'hui, que cinq substances terreuses sont bien reconnues, & séparées les unes des autres, savoir, la silice, l'alumine, la baryte, la magnésie & la chaux, on convient qu'on ne connoit point encore la nature intime d'aucune d'entre elles. Ainsi l'alumine est véritablement une matière terreuse inconnue dans sa nature, dans sa composition. On ne fait point si c'est réellement une matière composée, & de quels principes elle est formée, on n'en a point fait l'analyse, & on la compte avec raison parmi les substances indécomposées; elle se comporte dans nos expériences, absolument comme si elle étoit un corps simple, voilà pourquoi on la désigne quelquefois comme une substance simple; mais il ne faut point que cette expression employée pour se faire entendre dans les ouvrages & dans les cours de chimie, soit prise trop à la lettre. On ne peut s'empêcher de croire que l'alumine est un composé naturel; mais ses élémens, ses principes, sont si fortement unis, ont une attraction si considérable, qu'on n'a pas pu les séparer jusqu'ici les uns des autres; peut-être, cependant, parviendra-t-on à opérer cette décomposition, cette espèce d'analyse; peut-être même l'opère-t-on souvent dans les laboratoires de chimie, & dans les ateliers d'arts chimiques sans s'en douter encore; peut-être la composition de toutes pièces sans le savoir. Si cela étoit, comme il est vraisemblable qu'il existe pour plusieurs substances encore inconnues dans leur nature, il faudroit en conclure que l'art n'est point assez avancé pour qu'on puisse même reconnaître quels sont les cas où cette décomposition & la recomposition de l'alumine ont lieu: dans les expériences destinées à l'avancement des sciences, il faut que l'œil soit guidé par l'esprit, & celui-ci ne peut diriger la vue du physicien, que lorsqu'il s'est élevé, par la marche lente de ses progrès, à une élévation donnée.

§. V. Des usages de l'alumine.

L'alumine pure, & préparée comme il a été

dit dans le second paragraphe, n'est, & ne peut même être d'usage que dans les laboratoires de chimie, à cause de son prix, de la longueur & de la difficulté de sa préparation. Elle sert à la fabrication des sels alumineux, & à la détermination des affinités ou attractions électives de cette terre pour les différens corps; on doit donc en avoir toujours une certaine quantité préparée dans les laboratoires de recherches; elle est surtout employée pour les démonstrations de la science, & il seroit fort à désirer que cet emploi fût même plus multiplié, afin que la chimie & les utiles connoissances qu'elle fournit aux arts fussent plus répandus. On ne fait point, par exemple, dans tous les ateliers, combien l'alumine ou la terre précipitée de l'alun par les alcalis fixes présenteroit d'avantages en la substituant aux argiles pures qu'on est obligé de chercher long-temps, qu'on ne trouve qu'o difficilement, & qui exigent des préparations, des lavages, des inarérations, des pétrillages, des épluchages très-long & très-dispendieux. Les Anglois nous ont devancés dans cette carrière; on fait qu'ils fabriquent depuis long-temps des poteries plus multipliées dans leurs espèces & dans leurs propriétés, des variétés sans nombre de fayences & de porcelaines qui sont beaucoup moins chères, & d'une légèreté beaucoup au-dessus des nôtres; on connoit particulièrement la propriété des terres angloises, d'aller sur le feu sans se casser, tandis que les nôtres ne peuvent pas être chauffées sans se fendre dès la première impression d'une chaleur sèche au-dessus de la température de l'eau bouillante. Quoiqu'on ait dit que tous ces avantages dépendent des terres que les Anglois possèdent, ou qu'ils avoient mieux choisir que nous, & que cela soit en partie vrai, il y a une seconde cause de la perfection de cet art chez eux, c'est l'usage où ils sont d'ajouter à leurs terres naturelles une proportion plus ou moins grande d'alumine précipitée de l'alun, afin de leur donner le liant, la blancheur, & l'espèce de grain, de dureté qu'ils désirent. C'est en dosant ainsi les bases de leurs poteries, qu'ils leur donnent, d'une manière certaine, les diverses qualités qu'on y recherche, & qu'ils font que ces qualités ne varient jamais. M. Wedgwood qui a une fabrication si distinguée dans ce genre, & qui fournit des poteries très-légères & très-agréables à différentes parties de l'Europe, a fait un usage très-intéressant & très-utile de la terre d'alun pur; il en a fabriqué des petits cubes qui servent à déterminer la température des diverses expériences de fusion, de calcination, de vitrification, parce que; se resserrant d'autant plus qu'ils éprouvent une plus grande chaleur, ils entrent plus ou moins avant entre deux règles de cuivre ou de porcelaine, fixées sur une planche de cuivre, & qui vont en se rapprochant l'une de l'autre vers leur extrémité.

Sur ces règles, M. Wedgwood a tracé des lignes & des numéros qui indiquent les degrés différens de chaleur auxquels se fondent les métaux, & l'on voit que cette espèce de thermomètre peut exprimer toutes les températures au-dessus de l'eau bouillante. (Voyez l'HERMOMÈTRE.) On peut aussi se servir de l'alumine pure pour fabriquer & enduire des creusets, bouches & luter des ouvertures de vaisseaux qui vont au feu, &c.

ALUMINEUX, ALUMINEUSE. On se sert souvent de cet adjectif, pour désigner des combinaisons dont l'alumine fait partie. Ainsi l'on dit nitrate alumineux, carbonate alumineux, sels alumineux en général. Ce mot vient, comme celui d'alumine, du génitif du nom latin *alumen, aluminis*. En histoire naturelle, ainsi que dans les arts, il a une détermination plus précise, mais plus limitée. Il n'appartient qu'à l'alun proprement dit, ou sulfate acide d'alumine, & il sert à indiquer les substances, les terres surtout, & les eaux qui contiennent ce sel. C'est ainsi qu'on désigne sous le nom d'alumineux ou d'alumineuse, les pyrites, les terres pyriteuses, les argiles, les schistes & ardoises, les laves décomposées qui contiennent de l'alun, de forte qu'en les lessivant, on en retire facilement ce sel. On l'emploie même, pour désigner plusieurs minéraux qui, sans contenir de l'alun immédiatement, sont susceptibles d'en donner, après avoir subi une efflorescence ou une combustion lente dans l'air, ou une calcination & une combustion rapide, qui, en brûlant le soufre se convertissent, en acide sulfurique, & favorisent la combinaison avec l'alumine. (Voyez ALUN & SULFATE D'ALUMINE.)

ALUN. L'alun est un sel composé d'acide sulfurique en excès & de terre alumineuse ou d'alumine. Ce sel est d'un très-grand usage dans les arts & sur-tout dans la teinture; & comme il est très-connu & extrêmement employé sous le nom simple d'alun, on croit devoir en donner ici les principaux caractères en quelques lignes, parce qu'on se réserve d'en faire l'histoire complète & détaillée, à son véritable nom chimique, celui de SULFATE ACIDE D'ALUMINE. L'alun a une saveur stiptique & piquante. Il rougit les couleurs bleues végétales; il cristallise en octaèdres, il se fond & se calcine à la chaleur, il s'effleurit légèrement à l'air, il se dissout facilement dans l'eau, il est décomposé par la baryte, la magnésie, la chaux & les alcalis fixes; il n'est décomposé qu'en partie par plusieurs de ces agens, & sur-tout par l'ammoniaque qui forme, à ce qu'il paroît, avec l'acide sulfurique excédant à la saturation de l'alumine, un sel triple très-peu connu. L'alun s'unit aussi avec plusieurs sels métalliques, avec lesquels il forme également des sels triples. Aussi contient-il presque toujours une certaine quantité

de sulfate de fer qui l'alère & le rend nuisible dans la teinture, sur-tout lorsque la proportion de ce sel ferrugineux est un peu forte. On prend donc toutes les précautions possibles, pour lui enlever mêmes les dernières portions de ce sel, comme on le verra dans l'histoire de sa préparation, à l'article du SULFATE ACIDE D'ALUMINE. Il a sur-tout la propriété de décomposer un grand nombre de sels métalliques & de teintures végétales, de précipiter les oxides en même-temps que les parties colorantes, de manière que celles-ci vivées par l'acide sulfurique excédent, & fixées par les oxides blancs ainsi que par l'alumine qui se dépose avec elles, restent plus solidement attachées sur les étoffes : la vertu reserrante n'a pas moins d'utilité par rapport aux matières organiques & animales sur-tout, dont il rapproche les fibres, & conserve intact le tissu. Cette efficacité des propriétés de l'alun suffit, pour en faire concevoir les principaux avantages dans les arts ; on les trouvera toutes exposées en grand détail, à l'article SULFATE ACIDE D'ALUMINE.

ALUN DE PLUME. Il y a trois substances qui ont reçu des minéralogistes le nom d'alun de plume, quoiqu'il n'y en ait qu'une des trois qui mérite ce nom. L'un est le véritable alun ou sulfate acide d'alumine, qui se trouve assez souvent sur des pierres, & sous la forme d'une efflorescence ou de filets comme soyeux & imitant les barbes d'une plume : ce qui lui a fait donner ce nom. On reconnoît ce sel à la saveur forte & acide, & à sa propriété de rougir les couleurs bleues végétales.

On a souvent confondu avec cette espèce d'alun natif, du sulfate de zinc également natif & attaché, comme lui, en efflorescences soyeuses, aux voûtes des cavernes. La saveur acide & âcre de ce sel a été la principale cause & en même-temps une excuse de cette confusion. Mais il est difficile de concevoir comment cette erreur s'est étendue jusqu'à une espèce d'amanthe ou d'asbeste, qui se présente souvent sous la forme de filets analogues à ceux du véritable alun de plume. L'absence de la saveur & de la dissolubilité auroit dû faire promptement reconnoître cette erreur, & rejeter cette nomenclature équivoque.

ALUN DE ROCHE. Il faut se ressouvenir, d'après la remarque de Bergman, que le nom d'alun de roche ne vient point, comme l'avoient dit plusieurs auteurs, de la forme de rocher ou de cristal, ou d'une pierre de roche alumineuse, mais d'une ville de Syrie, nommée autrefois *Roche*, & aujourd'hui *Esdje*, où furent établies

les premières manufactures d'alun. (Voyez SULFATE ACIDE D'ALUMINE.)

ALUN NATIF. C'est le nom que l'on donne à l'alun qu'on trouve tout formé dans la nature, soit cristallisé en filets, soit mêlé avec des terres, ou disséminé dans des pierres. C'est sur-tout dans les terres volcaniques anciennement, ou dans des terres vitrioliques, qu'on trouve cet alun. (Voyez SULFATE ACIDE D'ALUMINE.)

ALUNER. On dit dans les arts & sur-tout dans la teinture, aluner les étoffes, les tissus, les fils, pour exprimer qu'on les passe dans une dissolution d'alun, qu'on les imprègne de ce sel, afin qu'ils deviennent susceptibles de produire les effets de teinture, ou tout autre qu'on en attend. Voyez SULFATE ACIDE D'ALUMINE & TEINTURES.

ALUN. (Métallurgie). L'alun est un sel qui cristallise le plus communément en octaèdre, mais quelquefois en pyramides triangulaires dont les angles sont tronqués, d'autre fois en cubes, &c. Il fond au feu, s'y gonfle considérablement sans y devenir fluide. Il exige pour sa solution quatorze fois son poids d'eau. Nous ne parlerons point ici de l'alun vierge, ni de l'alun de plume, notre objet n'étant que de rendre compte de la manière dont on le retire en grand, des substances qui le contiennent ; comme l'on fait que ce sel est composé d'acide sulfurique & de terre de la nature des argiles, ou si l'on veut d'une espèce de craie, l'on ne fera pas étonné de le trouver dans beaucoup de matières, & notamment dans celles qui sont pyriteuses & argileuses ; car comme pyriteuses, elles contiennent l'acide nécessaire à la génération de ce sel, & comme argileuses, la base qui lui est propre (1). Une compagnie, depuis quelque temps, a formé un établissement considérable de sels minéraux, à Javel près de Paris ; elle y fabrique de très-bel alun iadice, la chimie lui a fourni les moyens de le tirer des terres argileuses, par l'intermède de l'acide sulfurique. Nous ne parlerons point de ce procédé, il ne sera question que de ceux où l'on n'emploie aucun intermède pour retirer le sel dont nous traitons, des substances qui le contiennent : celles qui étant pyriteuses s'effleurissent à l'air, n'ont pas besoin d'être grillées, car l'acide se développant de lui-même, dissout la terre qui lui convient, & en forme l'alun que l'on en retire par la lotion & cristallisation ; celles qui ne s'effleurissent pas, exigent un roûlage pour opérer le développement de l'acide ; le plus souvent l'on est obligé de donner un feu

(1) Les substances qui contiennent ordinairement l'alun, sont : 1^o. les rocs un peu bitumineux ; 2^o. le charbon de terre, &c. toutes les terres combustibles brunes, & feuilletées comme l'ardoise ; 3^o. plusieurs autres terres tant sur le grès bon ; ces matières s'arrivent de leurs mines, soit à tranchées ouvertes, lorsque elles sont près de la surface de la terre, soit par des puits, galeries & autres souterrains, si elles sont à une certaine profondeur.

le grillage aux substances aluminiques, car celles mêmes, qui s'effleurissent, comme celles de Saxe, doivent rester exposées à l'air pendant deux ans, avant de pouvoir les lessiver. Alors le minerai d'alun est décomposé & tombe presque en poussière ; si quelques morceaux conservent leur forme, ils fe brisent aussi-tôt qu'on y touche, & l'on aperçoit l'alun tout formé entre les feuilles minces de ces matières alumineuses ; il en paroît aussi à la surface des tas où il se présente en filets blancs.

La fermentation de ce minerai est souvent si considérable, qu'il s'enflamme, ainsi que cela arrive à certains charbons de terre pyriteux ; comme l'on perdrait beaucoup d'alun si on laissoit gagner le feu dans toutes les parties des tas qui sont très-forts, aussi-tôt que l'on s'aperçoit que le feu est dans un endroit, on l'éteint, & le feu s'éteint par le seul contact de l'air, sans être obligé d'y jeter de l'eau.

Après deux ans d'efflorescence, le minerai, de noirâtre qu'il étoit en sortant du minier, a pris dans l'intérieur des tas, une couleur jaunâtre qui est due à une terre ferrugineuse.

Ce minerai ainsi effleuré est lessivé dans de grandes caisses enterrées, placées à l'air sans toiture ; pour cet effet l'on y porte du minerai, on l'en remplit jusqu'aux deux tiers, & même plus ; on y fait couler de l'eau jusqu'à ce qu'elles en soient pleines, l'on y laisse séjourner cette eau vingt-quatre heures & quelquefois plus, afin qu'elle dissolve autant d'alun qu'il est possible ; après quoi on le fait couler dans le bassin d'entrepôt, où elle est prise pour en faire l'évaporation. Après cette lotion du minerai on le recure des caisses, on en forme successivement de gros tas, semblables à ceux du minerai neuf ou brut, on le laisse pareillement en efflorescence pendant deux ans, on le lessive pour la seconde fois, après quoi il est mis au rebut. Aussi-tôt que le minerai lessivé est sorti des susdites caisses, l'on en met d'autres avec de l'eau, on procède de la même manière.

On compte qu'en Saxe, les matières alumineuses donnent communément deux pour cent de ce sel.

Les Anglois qui font griller les minerais alumineux, après la première lessive, remettent une seconde fois de l'eau, afin qu'elle puisse dissoudre l'alun que la première a pu y laisser ; mais comme cette seconde eau n'est que très-peu chargée de ce sel, on la repasse avec de la nouvelle sur du minerai.

Les Suédois qui font beaucoup d'alun, disposent leurs bassins à lessiver le minerai, (qui ont trente pieds de long, quinze de large, & trois de profondeur), de manière qu'ils sont à double fond ; les planches qui composent le supérieur, sans être jointes, permettent le passage de l'eau, & retiennent le minerai,

qui y est d'environ seize ponces d'épaisseur. L'on y fait couler assez d'eau pour qu'il en soit recouvert de trois pouces, on l'y laisse vingt-quatre heures, après quoi on la fait couler, d'entre les deux fonds dont on vient de parler, dans une citerne, ce qui s'opère par le moyen d'un robinet ; cette eau est de suite reportée sur d'autre minerai, dans une seconde caisse où elle se charge encore de l'alun qu'il contient pendant vingt-quatre heures qu'elle y séjourne, on la fait couler dans la citerne, & elle est ainsi passée quatre fois sur du nouveau minerai, alors, elle est ordinairement suffisamment chargée d'alun ; pour s'en assurer, l'on est dans l'usage de se servir d'une petite bouteille dont on connoît le poids lorsqu'elle est pleine d'eau commune, on l'a remplie de l'eau alumineuse, la différence de ces poids indique fa teneur en alun, qui va à environ fix pour cent.

Après avoir fait les quatre locons, l'eau chargée d'alun passe dans une citerne destinée à la recevoir, où elle se clarifie, jusqu'à ce qu'on la soumette au procédé de l'évaporation.

Les terres alumineuses sont grillées en Suède ainsi qu'en Angleterre, avant d'en faire la lessive ; mais ce qu'il y a de singulier, c'est qu'elles passent jusqu'à douze fois à ces deux opérations, avant d'être mises au rebut.

Ce rocher alumineux, qui, en Suède, est une espèce d'ardoise noire, fe délitant aisément, & contenant des rognons de différentes grosseurs de pyrite martiale, dont la forme est presque généralement sphérique ; ces matières alumineuses, dis-je, sont grillées comme il suit : l'on fait un lit de bois, de fagots & de brossailles ; sur ce lit on en met un de roche d'alun, de deux pieds d'épaisseur, aussi-tôt l'on y met le feu, & on recouvre la surface du minerai avec celui qui a déjà subi cette opération & celle de la lotion ; on en met communément un pied d'épaisseur de ce dernier qui fe grille encore ; à mesure que le feu se communique, l'on forme de nouveau des lits de l'une & de l'autre espèce, ce que l'on continue jusqu'à la hauteur de douze à quinze pieds, ce grillage n'étant que pour former l'acide sulfurique dans le minerai qui contient du soufre, ne doit éprouver qu'un degré de chaleur médiocre, car s'il étoit trop violent, cet acide s'évaporerait en partie, d'où il arriveroit que l'on obtiendrait beaucoup moins d'alun.

L'évaporation des eaux de lessives alumineuses se fait dans des chaudières de plomb plus ou moins grandes ; en Angleterre, elles ont douze pieds de longueur, cinq pieds de largeur, & deux de profondeur ; elles sont placées sur des plaques de fer coulé qui fe joignent, & sont jointes avec des murs en briques ; chaque chaudière est percée au niveau de son fond, afin qu'on puisse la vider entièrement quand on le juge à propos ; l'ouverture se bouche avec un

morceau de bois ; sous cette chaudière sont deux fourneaux à vent, dans lesquels on entretient continuellement deux feux de charbon de terre dont la flamme se rend dans une même cheminée.

Les chaudières en Saxe sont aussi de plomb & de même longueur, mais de sept à huit pieds de large, & de deux pieds dix pouces de profondeur, soutenues par quatre grosses poutres de six à sept pouces en quarré, sur lesquelles l'on place des bandes de fer forgé, de manière que le fond de la chaudière qui repose dessus, en soit garni entièrement. Comme l'on n'y brûle que du bois de corde, la chauffe diffère de celles d'Angleterre en ce qu'il n'y a pas de grille ; le bois se place sur une voûte percée de trous par lesquels les cendres tombent dans le cendrier qui est en dessous de la voûte.

Au-dessus de la chaudière du côté opposé à l'ouverture de la chauffe, en est une autre un peu moins grande, & percée d'un trou au niveau de son fond. Cette chaudière sert à alimenter la grande, ainsi que le détail suivant va le faire voir.

Lorsqu'on veut commencer une évaporation, l'on remplit les deux chaudières de l'eau de lessive alumineuse, l'on fait grand feu dans la chauffe, & à mesure que l'eau s'évapore de la grande chaudière, l'on y fait couler un petit filet de celle qui est contenue dans la petite, afin de l'entretenir pleine ; l'on continue cette opération pendant cinq fois vingt-quatre heures, après quoi la chaudière supérieure qui est vidée se remplit de l'eau de lavage que l'on fait couler peu-à-peu dans l'inférieure, ce qui exige quarante-huit heures ; alors l'on remplit pour la troisième fois la chaudière supérieure, mais celle-ci est de l'eau-mère que l'on fait de même couler dans la grande chaudière, & ce, pendant vingt-quatre heures, de sorte que l'évaporation ne discontinue point durant huit jours ; & comme huit semblables chaudières sont continuellement en évaporation, le travail est réglé de façon que l'on en vide une, & on en remplit une autre chaque jour. Il est bon d'observer ici qu'il se dépose un sédiment au fond des chaudières, que l'on est obligé d'en détacher de temps en temps, sans quoi l'on risquerait de les fondre ; lorsque l'évaporation est achevée, l'on ouvre l'ouverture du fond de la grande chaudière pour en faire couler l'eau dans un grand réservoir, on l'y laisse clarifier pendant quelques heures, & de ce réservoir elle passe dans une caisse enterrée où elle séjourne huit jours, durant lequel temps on l'agite plusieurs fois dans les vingt-quatre heures, alors on y ajoute de la lessive des fabriques de savon, & un peu d'urine putréfiée, que l'on nomme *le fondant*. On nous a assuré que ces additions se faisoient sans proportions déterminées, & que l'on ne pesoit point l'eau, ainsi que cela se pratique en Angleterre, mais que les ouvriers connoissoient à sa couleur le degré

de concentration nécessaire à la cristallisation de l'alun. Par-tout ailleurs l'addition des substances alcalines se fait en raison de la quantité de terre ferrugineuse qu'il y a à précipiter, & on laisse séjourner les eaux concentrées dans les vaisseaux, jusqu'à ce que les cristaux se forment contre leurs parois. L'on agit en Saxe tout différemment, puisqu'aussi-tôt que l'on a fait cette addition, on se contente d'agiter fortement l'eau pendant une demi-heure, & on la fait passer dans le réservoir de l'eau-mère, où l'alun se précipite tout de suite en cristaux qui sont retirés de l'eau-mère pour être lavés dans une caisse, par un petit courant d'eau. On procède ensuite à la purification de cet alun, de la manière suivante.

Les cristaux ci-dessus sont mis dans une chaudière destinée uniquement à cette opération ; on y ajoute la quantité d'eau commune suffisante à leur dissolution, l'on fait bouillir le tout, après quoi on le fait couler dans de grands tonneaux où l'alun se précipite & se cristallise presque tout en une seule masse ; cette cristallisation étant achevée, on démonte les tonneaux, à l'effet d'en retirer l'alun que l'on casse en morceaux pour être vendu en cet état.

Le peu d'eau-mère qui reste dans les tonneaux après la cristallisation, est mise avec l'eau de lessive des minerais.

Dans toutes les fabriques d'alun l'on emploie de l'eau-mère, sans laquelle on ne peut obtenir d'alun. Comme le procédé des Anglois pour l'évaporation & la cristallisation est différent de celui de Saxe, que nous venons de décrire, l'on va en donner le détail.

L'on y distingue deux cuisons ou ébullitions différentes, l'une de quarante-huit heures, & l'autre de vingt-quatre seulement ; lorsqu'on veut procéder à la première, on commence par remplir la chaudière avec de l'eau-mère qu'on laisse diminuer jusqu'à un certain point, & on la recroite ensuite avec de l'eau alumineuse que l'on nomme *liqueur*. On procède à la seconde en remplissant d'abord la chaudière avec de la *liqueur*, & on la recroissant ensuite avec de l'eau-mère, & une addition de la première.

Avant de vider les chaudières, ce qui se fait ordinairement le matin, l'on essie la pesanteur de l'eau concentrée, en se servant d'une petite bouteille que l'on pèse lorsqu'elle en est remplie, ainsi que nous l'avons déjà dit, & suivant son degré de pesanteur spécifique qui est toujours très-fort, l'on y fait couler la quantité requise d'eau alcaline, dont la préparation se fait en plein air, dans de grands réservoirs où l'on met des cendres de plantes marines, qui sont une espèce de soude. Lorsqu'on met cette eau alcaline dans la chaudière, l'on débouche en même temps l'ouverture du fond afin de faire couler ce mélange dans un grand réservoir où il reste pendant trois heures, & y dépose un sédiment

précipité par l'alcali, ce qui rend cette eau alumineuse plus claire & plus légère; on la fait ensuite passer dans un autre réservoir, alors le chef-ouvrier l'essie de nouveau, & comme elle est encore trop pesante, il y mêle une quantité d'urine proportionnée au degré de pesanteur de l'eau que l'on agite fortement pendant un quart-d'heure, après quoi l'on prend encore de cette eau aux deux extrémités du réservoir, pour la peser de nouveau; ordinairement elle est au point qu'on le desire, mais si elle étoit encore trop pesante, l'on y ajouteroit encore de l'urine. L'on celle d'agiter l'eau, & on la laisse tranquille pendant cinq jours; elle dépose en cristaux l'alun qu'elle tenoit en dissolution, ces cristaux sont ensuite lavés à l'eau commune; celle qui reste après la cristallisation dans le réservoir, est l'eau-mère.

Ce sont les cristaux d'alun dont on vient de parler, que l'on fait dissoudre à l'eau bouillante, & cristalliser dans des tonneaux, ainsi que je l'ai dit, à l'effet de le purifier.

Tout ce détail est extrait, en grande partie, des voyages métallurgiques de M. Jars & Duhamel. Ce qui suit l'est de l'ancienne Encyclopédie.

Les mines où se trouve l'alun de Rome sont aux environs de Civita-Vecchia; on les appelle l'aluninière della Tolfa. On y trouve une sorte de pierre fort dure, qui contient l'alun; pour en séparer ce sel, on commence par tirer la pierre de la mine, de même que nous tirons ici la pierre à bâtir ou le marbre de nos carrières. Après avoir brisé ces pierres, on les jette dans un fourneau semblable à nos fourneaux à chaux, on les y fait calciner pendant douze à quatorze heures au plus, on retire du fourneau les pierres calcinées, & on en fait plusieurs tas dans une grande place. Les monceaux ne sont point élevés; on les sépare les uns des autres par un fossé plein d'eau. Cette eau sert à arroser les monceaux trois ou quatre fois pendant l'espace de quarante jours, jusqu'à ce que la pierre calcinée semble fermenter, & se couvrir d'une efflorescence de couleur rouge. Alors on met cette chaux dans des chaudières pleines d'eau que l'on fait bouillir pendant quelque temps pour faire fondre le sel; ensuite on transvase l'eau imprégnée de sel, & on la fait bouillir pour la réduire jusqu'à un certain degré d'épaississement, & sur-le-champ on la fait couler toute chaude dans des vaisseaux de bois de chêne. L'alun se cristallise en huit jours dans ces vaisseaux; il se forme contre leurs parois une croûte de quatre à cinq doigts d'épaisseur, composée de cristaux transparents, & d'un rouge pâle; c'est ce qu'on appelle alun de roche, ou parce qu'il est tiré d'une espèce de roche, ou parce qu'il est presque aussi dur que la roche.

Il y a en Italie une autre mine d'alun, à une demi-lieue de Pouzzol, du côté de Naples. C'est

une montagne appelée le mont d'alun ou les souffrères, ou sulfatari; en latin *sulphureus mont, campi phlegrei*, la demeure de Vulcain, les campagnes ardentes, parce qu'on voit dans cet endroit de la fumée pendant le jour, & des flammes pendant la nuit. Ces exhalaisons sortant d'une fosse longue de quinze cents pieds & large de mille. On en tire beaucoup de soufre & d'alun. L'alun paroît sur la terre en efflorescence. On ramasse tous les jours cette fleur avec des balais, & on la jette dans des fossés remplis d'eau, jusqu'à ce que cette eau soit suffisamment chargée de ce sel, alors on la filtre, & ensuite on la verse dans des baigns de plomb, qui sont enfoncés dans la terre. Après que la chaleur souterraine, qui est considérable dans ce lieu, a fait évaporer une partie de l'eau, on filtre de nouveau le résidu, & on le verse dans des vaisseaux de bois. La liqueur s'y refroidit, & l'alun s'y cristallise. Les cristaux de ce sel sont blancs transparents.

On trouve aussi dans la *sulfatara* des pierres dures, qui contiennent de l'alun. On les travaille de la même façon que celles de l'aluninière della Tolfa.

Les mines d'alun d'Angleterre, qui se trouvent dans les provinces d'York & de Lancashire sont en pierres bleuâtres, assez semblables à l'ardoise. Ces pierres contiennent beaucoup de soufre; c'est une espèce de pyrite qui s'enflamme au feu, & qui s'effleurit à l'air. On pourroit tirer du vitriol de son efflorescence. On fait des monceaux de cette pierre, on y met le feu, pour faire brûler le soufre qu'elle contient. Le feu s'éteint lui-même après cette opération. Alors on met en digestion dans l'eau, pendant vingt-quatre heures la pierre calcinée. Ensuite on verse dans des chaudières de plomb l'eau chargée d'alun. On fait bouillir cette eau avec une lessive d'algue marine, jusqu'à ce qu'elle soit réduite à un certain degré d'épaississement. Alors on y verse une assez grande quantité d'urine, pour précipiter au fond du vaisseau le soufre, le vitriol & les autres matières étrangères. Ensuite on transverse la liqueur dans des baquets de sapin. Peu-à-peu l'alun se cristallise & s'attache aux parois des vaisseaux. On l'en retire en cristaux blancs & transparents, que l'on fait fondre sur le feu dans des chaudières de fer. Lorsque l'alun est en fusion, on le verse dans des tonneaux, il s'y refroidit, & on a des masses d'alun de la même forme, que les tonneaux qui ont servi de moule. On a aussi appelé cet alun, alun de roche, ou parce qu'il est en grandes masses, ou parce qu'il est tiré d'une pierre, comme l'alun de l'aluninière, della Tolfa. Dans ces mines d'alun d'Angleterre, on voit couler sur les pierres alumineuses une eau claire, d'un goût stiptique, on tire de l'alun de cette eau, en la faisant évaporer.

On trouve en Suède une sorte de pierre dont on peut tirer de l'alun, du vitriol & du soufre. C'est une belle pyrite fort pesante & fort dure,

d'une couleur d'or brillante, avec des taches de couleur d'argent. On fait chauffer cette pierre, & on l'arrose avec de l'eau froide, pour la faire fendre & éclater. Ensuite on la casse aisément ; on met les morceaux de cette pierre dans des vaisseaux convenables sur un fourneau de réverbère, le soufre que contient la pierre se fond & coule dans des récipients pleins d'eau ; lorsqu'il ne tombe plus rien, on retire la matière qui reste dans les vaisseaux, & on l'expose à l'air pendant deux ans. Cette matière s'échauffe beaucoup, jette de la fumée & même une petite flamme que l'on aperçoit à peine pendant le jour, enfin elle se réduit en cendres bleuâtres, dont on peut tirer du vitriol par les lotions, les évaporations & les cristallisations. Lorsque le vitriol est cristallisé, il reste une eau crasse & épaisse, que l'on fait bouillir avec une huitième partie d'urine & de lessive de cendres de bois : il se précipite au fond du vaisseau beaucoup de sédiment rouge & grossier. On filtre la liqueur, & on la fait évaporer jusqu'à un certain degré d'épaisseur ; ensuite il s'y forme des cristaux d'alun bien transparents, que l'on appelle alun de Suède.

A Cypsele en Thrace, on prépare l'alun, en faisant calciner lentement les marcasites, & les laissant ensuite dissoudre à l'air par la rosée & la pluie ; après quoi on fait bouillir l'eau, & on laisse cristalliser le sel.

Le reste de l'article de l'alun, dans l'ancienne encyclopédie, ne concerne que les remèdes auxquels il est propre en médecine, qui ne doivent pas faire partie de celui-ci.

L'on voit par tous les détails que nous avons donnés sur la fabrication de l'alun, qu'il y a bien des manières de procéder pour obtenir ce sel des substances où il se trouve que ces substances sont en grand nombre & beaucoup plus communes qu'on ne l'avait pensé jusqu'à présent ; il n'y a pas de provinces en France, qui n'en contiennent & où l'on ne puisse former des établissements semblables à ceux que j'ai décrits : les détails que j'en ai donnés, doivent mettre tout homme, pour peu qu'il soit chimiste, en état de monter de pareilles fabriques, mais elles doivent se faire dans des endroits où le bois soit commun, ou à portée des mines de charbon de terre. L'on compte en Saxe, qu'il faut environ cent pieds cubes de bois de corde, pour obtenir par l'évaporation des eaux alumineuses un quintal d'alun.

AMADOU. L'amadou est une matière végétale, d'un tissu spongieux, le corps du *bolet amadouier*, *boletus ignarius*, séparé des pores & de la peau, battu, imprégné de salpêtre, puis enfin suspendu de poudre à canon & bien desséché. On s'en sert dans les laboratoires de chimie pour plusieurs expériences, & sur-tout 1°. pour allumer le fil de fer tourné en spirale & plongé dans l'air vital, suivant le procédé de M. Ingenhousz ;

2°. pour mettre le feu au charbon placé sous une cloche pleine d'air vital, dans la composition artificielle de l'acide carbonique due à M. Lavoisier. Dans ce dernier procédé, on place sur le charbon un petit morceau d'amadou qu'on recouvre d'un petit grain de phosphore. L'appareil étant bien disposé, on passe un fer recourbé & rouge à travers le mercure ; on l'introduit rapidement sous la cloche, on touche avec son extrémité le phosphore qui s'enflamme, & met le feu à l'amadou qui le communique au charbon. (*Voyez le mot APPAREIL.*) Cette manière de procéder a été un sujet d'objection contre la nouvelle doctrine des chimistes François pour quelques personnes. Elles ont dit que le résultat d'une pareille expérience ne pouvait pas être exact, puisqu'outre le charbon, il entroit du phosphore & de l'amadou dans les matériaux qui y servent. Voici à quoi se réduit cette objection. Quand on brûle depuis trente-six grains jusqu'à quatre gros de charbon, dans suffisante quantité d'air vital bien pur, un demi-grain de phosphore, & un grain d'amadou peuvent-ils changer les résultats & produire plusieurs gros d'acide carbonique ? Il n'est pas nécessaire d'ajouter d'autres considérations à la question ainsi posée.

AMALGAMATION. On nomme en chimie amalgamation, le procédé par lequel on amalgame ces métaux, ou on les unit avec le mercure. On le trouvera décrit aux articles, **AMALGAME**, **MERCURE**, **MÉTAUX**.

AMALGAMATION. (Métallurgie.) Ce mot exprime aujourd'hui dans la métallurgie l'opération par laquelle on extrait à l'aide du mercure les métaux précieux, l'argent & l'or, des mines où ils sont, soit simplement enveloppés, soit même à ce qu'il paroît légèrement combinés. Il y a environ six ans que M. de Born appliqua ce procédé employé depuis long-temps au Pérou, &c., au traitement des mines d'Allemagne, en le réduisant & en le rendant bien plus utile qu'il n'avait été jusques-là. Les expériences qui furent faites en 1786, à Schemnitz, en présence de plusieurs minéralogistes & métallurgistes célèbres, firent beaucoup de bruit. M. de Born publia sur cet objet un ouvrage encore très-peu connu en France. Sa méthode, sans être tombée dans l'oubli, sembla n'avoir pas entièrement répondu à l'espérance qu'on en avoit conçue, & l'éclat qu'elle avoit d'abord répandu, n'a pas produit en France tout le fruit qu'on pouvoit en attendre. Dans l'impossibilité où nous sommes aujourd'hui (octobre 1791) de donner un article étendu de cette faite de la métallurgie dont M. Duhamel ne s'est point occupé, nous nous contenterons d'offrir ici un précis inséré par les auteurs du journal de physique dans le cahier de janvier 1787, tome 30, page 47. On y trouve une comparaison de la méthode d'amalgamer

d'amalgamer en Amérique, avec celle qui est due à M. de Born.

Précis historique de l'amalgamation usitée en Amérique.

Le premier qui s'avisa d'extraire, au moyen du mercure, l'or & l'argent des minerais, où la nature l'avoit caché, fut un Espagnol, nommé D. Pedro Fernandez Velsco, qui, en 1566, introduisit cette méthode dans quelques mines du Mexique, &c. l'année 1571 dans celles du Pérou. Cette découverte se répandit, dès l'année 1580, & l'autre partie de ce grand continent, & depuis lors a été à peu près l'unique méthode d'extraire dans cette hémisphère l'or & l'argent des minerais les moins riches qu'on amalgame, tandis que ceux qui sont vierges y sont affinés par le plomb.

Bowles a raison de prétendre que toute nation que l'Espagne, auroit été vaine & fière de cette importante découverte, mais ne seroit-elle pas l'effet du pur hasard, plutôt que le résultat de quelques épreuves sagement combinées & calculées sur des principes solides ? De tout temps on s'étoit servi du mercure en Europe, & peut-être à l'arrivée de Velsco, s'en servoit-on en Amérique, pour extraire les parcelles d'or, que les rivières rouloient dans leurs sables. La difficulté de bois nécessaire aux fondries, ou la difficulté de tirer partie des minerais les moins riches par un procédé aussi long & aussi coûteux ; peut-être aussi l'heureuse ignorance de l'Espagnol sur les principes de la minéralisation de ces métaux précieux, l'ont porté à faire usage des mêmes moyens qu'il avoit vu employer, pour les séparer des sables & des rivières. Il réussit, & s'il ne parvint pas à en extraire tout l'or & l'argent, son procédé au moins mis en balance avec les fondries de ces temps-là, selon toute apparence très-mal en ordre, peut l'avoir emporté de beaucoup, & à cet égard l'as, il obteint encore une partie du l'argent qui restoit avant cela dans les scories de ces minerais.

C'est qu'on ait, selon les écrivains Espagnols, résisté depuis lors ce procédé d'amalgamation, il semble cependant que ceux qui sont encore aujourd'hui en usage, tant au Mexique qu'au Pérou, ne sont pas suffisants, pour extraire les métaux parais des minerais qui les renferment. Et comment auroit-on pu atteindre à une plus grande perfection, dans un pays où la science des mines & des fondries n'est regardée que comme un ouvrage vil & mécanique, abandonné aux indigènes qui appellent pratique la misérable routine qu'ils se transmettent de père en fils ; dans un pays où des moines superstitieux & ignorants ont de tout temps traversé les projets d'un ministère éclairé, & d'un roi sage & bienfaisant, & aboyé contre les efforts de quelques citoyens, pour s'arracher au joug détestable du préjugé, & sortir des précieuses connaissances de la phy-

Chimie. Tome II.

que & de la chimie, au risque de devenir la victime de ces forcens, dans un pays, dis-je, où depuis la découverte du nouveau monde, aucun métallurgiste n'a osé se produire ni se faire connoître, à l'exception de M. d'Elhuyar, qui vint y porter des connoissances rares, dont les mines riches de cet immense continent peuvent se promettre le plus brillant succès.

Autant il a été difficile aux mineurs Américains de réduire l'art de leur amalgamation en principes, & de découvrir les moyens propres à épurer aux minerais tant leur or & leur argent, autant sera-t-il aisé dans peu aux métallurgistes Européens de la porter au plus haut degré possible de perfection. On comprend à peine comment on a pu négliger jusqu'aujourd'hui ce procédé qui, au premier aspect, présente & promet tant d'avantages. La raison s'en trouve peut-être dans les principes sur la minéralisation des métaux parfaits, dont toutes les chaires académiques ont retenu si long-temps, & dans les fréquentes dissertations appuyées de plusieurs expériences chimiques, quo différentes sociétés littéraires ont si souvent couronnées. On la trouve peut-être aussi dans la politique mal entendue des Espagnols, qui n'ont jamais permis qu'aucun étranger n'approchât de leurs mines.

On a, à la vérité, vu plusieurs Savans, avec des permissions spéciales accordées aux demandes de leurs souverains, parcourir les vastes contrées du Mexique & du Pérou ; mais ils n'étoient que botanistes ou zoologistes, ne cherchoient par conséquent qu'à enrichir & orner les jardins & la ménagerie de leurs souverains, sans s'inquiéter des connoissances qu'ils auroient pu en même-temps recueillir sur les mines & la technologie, pour les rapporter dans leur patrie.

Pour suppléer à la difficulté des renseignements sur les procédés de l'amalgamation américaine, le chevalier de Born donne à la suite de ce précis dans son traité de l'amalgamation, tout ce qu'il a pu recueillir de mémoires & de relations dans toutes les histoires des royaumes qui sont mentionnés, il va même jusqu'à extraire des archives de la chambre impériale & royale des mines à Vienne, les actes des épreuves mal dirigées, mais faites en 1588, en Bohême, par un Espagnol, peu de temps après l'introduction de ce procédé en Amérique ; mais sur un plan tout-à-fait étranger à celui du chevalier de Born, dont voici la théorie.

Théorie de l'amalgamation, selon le système de M. de Born.

Entre les diverses propriétés du mercure on compte spécialement celles qu'il a de s'amalgamer avec d'autres métaux & des demi-métaux, selon les règles que l'expérience & les observations nous ont apprises.

Cc

On fait par exemple que l'or, l'argent, le cuivre, l'étain, le bismuth, le plomb & le zinc s'amalgament aisément à froid avec lui, c'est-à-dire, sans avoir besoin d'être liquéfiés, & qu'il n'a cette même propriété avec les autres métaux & demi-métaux, que pendant leur liquéfaction.

On a aussi observé que le mercure absorbe plus aisément le zinc & le bismuth, que l'or & l'argent, & ceux-ci bien plutôt que le cuivre.

Quoique le mercure ait de lui-même la propriété de s'amalgamer avec les petites parcelles de ces métaux surmenagés & mécaniquement concassés, cette opération se fait cependant bien plutôt, si, d'un côté, par l'action du feu, le mercure comme principe dissolvant est rendu plus fluide & plus actif; & de l'autre, si les pores des corps à dissoudre sont dilatés & agités: en tous sens avec toute la masse, le contact alors & la friction des parties en deviennent nécessairement plus fréquents, & la séparation des métaux se fait avec beaucoup plus de célérité.

Il faut, 1^o, pour cela broyer & concasser les corps que nous voulons dissoudre, & en multipliant ainsi leurs surfaces, les mettre à même d'en présenter plusieurs à la fois à l'action du mercure qui ne s'amalgamera cependant point encore, si la superficie ou celle des métaux avec lesquels il doit s'unir, est enduite de quelques corps hétérogènes.

Les métaux parfaits, ou plutôt leurs parcelles vierges, mais subdivisées à l'infini, sont tellement enveloppées de soufre, d'arsenic ou de quelques autres métaux ou demi-métaux calcinés, qu'on ne peut rien en apercevoir à l'œil. Les demi-métaux & métaux imparfaits sont véritablement oxydés. Il s'ensuit donc qu'il faut employer des moyens appropriés, pour séparer les métaux parfaits de leurs enveloppes pierreuses ou métalliques, & amalgamer les autres, pour les tirer de leur état d'oxydation, & les réduire en véritables métaux, si on veut les traiter en grand, comme on pourra le faire un jour avec les minerais de cuivre.

Pour séparer les parcelles d'or & d'argent de leurs enveloppes, & les rendre susceptibles d'amalgamation, dont il est seulement ici question, on emploie des moyens mécaniques ou chimiques; les premiers quand les petites parcelles absolument invisibles de ces métaux ne sont cachées que dans la pierre ou dans quelque espèce de terre argileuse ou métallique; il suffit alors de les concasser & de les réduire en poudre. Mais il faudra faire usage des seconds, s'il est question d'extraire l'or ou l'argent de quelques minerais arsenicaux & sulfureux, & de les séparer par amalgamation de quelques autres métaux ou demi-métaux. Il faut alors les torréfier pour les séparer de ces corps hétérogènes. Mais il arrive toujours que l'acide sulfurique produit par la destruction du soufre, s'unissant aux parties terreuses alcalines, ob à l'oxide métallique du fer, du cuivre, ou de quel-

qu'autre métal ou demi-métal, en incrustant l'or ou l'argent, le rendent encore impropre à une parfaite amalgamation.

Pour se convaincre de cette vérité, qu'on réduise en poudre très fine quelques minerais indéterminés d'or ou d'argent, & qu'on mêle ce schlich crud avec du mercure, on en tire, à la vérité, une partie d'or et d'argent; on en extraira une plus grande après avoir torréfié de purvérité de nouveau ce même schlich, mais on ne l'extraira tout à fait qu'en employant avant l'amalgamation des moyens chimiques, pour dégager les particules d'or & d'argent de leur enveloppe hétérogène, entretenir leurs surfaces aussi-bien que le mercure, dans une très-grande propriété, & les rendre réciproquement susceptibles d'une prompt union; sans cependant altérer ni l'or, ni l'argent, ni le mercure, ni causer la moindre perte de ces métaux parfaits, qu'il faudroit alors chercher à regagner par des procédés chimiques.

Nous employons donc pour parer à tous ces inconvénients, & cependant arriver à notre but, tous les acides minéraux, dont les effets sont aussi différents qu'ils le sont eux-mêmes relativement aux corps sur lesquels ils opèrent. On peut, pour constater ce que nous avançons, extraire d'une certaine quantité de minerais d'or & d'argent torréfiés sans aucun autre apprêt, une partie de leur aloi d'or & d'argent, ou les arroser simplement après le grillage avec de l'eau matorielle; ce seul agent les entretenant dans une espèce de macération, les dispose à l'amalgame du mercure; mais qu'on ne s'imagine pas on extrairait avec cela seul tout l'or & l'argent; car à la torréfaction, l'acide sulfurique, provenant de la combustion du soufre, s'étant attaché à la chaux, aux terres alcalines, & à l'argent même, ne peut opérer qu'en tant qu'il ne se transforme point en vitriol avec l'oxide métallique, ou qu'il ne s'évapore point tout-à-fait à la continuation du grillage; ou que la terre pesante & calcaire ne le prive point de son activité en l'absorbant entièrement.

L'acide sulfurique a bien, à la vérité, la propriété de dissoudre le cuivre & le fer dans leur état métallique, mais encore dans leur état d'oxydation, & par l'étroite union de ses parties avec celles du cuivre, & de développer les parcelles d'or & d'argent; mais il attaque en même temps la superficie du mercure & y forme une pellicule qui empêche le contact immédiat des métaux parfaits, & ôte par là toute espérance de pouvoir les amalgamer. Observons encore que tous les minerais ne sont pas composés d'une certaine quantité de soufre, qu'on ne peut pas leur donner à tous le même degré de torréfaction, conséquemment que la combustion du soufre, la quantité d'acide sulfurique ne peut aussi toujours être la même, &c., d'après cette proportion, le résultat de l'amalgamation doit toujours être plus ou moins parfait.

Les rapports de l'acide sulfurique aux terres alcalines & aux oxides métalliques, sont tout autres ; avec les premières il forme un sel neutre minéral, qui se fond & se décompose aisément : Avec les seconds (excepté le plume) si le sel neutre qu'il donne ne se fond pas, il se décompose au moins dans l'eau, & développe ainsi les particules d'or & d'argent qu'il contenoit sans altérer ni l'or, ni l'argent, ni le mercure, excepté dans certaines circonstances.

L'our rendre cet acide propre à l'amalgamation de l'or & de l'argent selon les principes de la chimie, & l'ajouter à la masse de minerais torréfiés & triturés, il faudroit admettre un procédé non-seulement fort coûteux, mais, dans plusieurs ren-contrer tout-à-fait impropre & inutile. Pour la disposer cependant de la façon la plus convenable, & le faire servir à une extraction complète de ces métaux purs, par le mercure, il faut préalablement connoître & décider si l'opération doit se faire par le feu ou par l'eau, & si l'on faut employer du sel gemme ou commun.

Préfère-t-on la voie humide ? Il faut torréfier la quantité de minerais qu'on veut triturer, & cela exactement selon les principes que nous donnerons ci-après, & jusqu'à l'entière évaporation des parties sulfureuses, & ne lui donner cependant qu'un certain degré de chaleur, pour ne point, avec le soufre & les demi-métaux, volatiliser l'acide sulfurique nécessaire à la décomposition du sel commun.

Le schlich à amalgamer étant convenablement torréfié, il faut l'arroser d'eau commune pour dissoudre les sels terreux, terreux & métalliques, qui ont été produits par la combustion du soufre ; selon les différents rapports de son alliage avec les minerais ; & la plus ou moins grande quantité d'acide sulfurique qui s'en est formé.

Si on a laissé ainsi une couple de jours ce schlich préparé dans un endroit chaud, & si de temps à autre on le remue bien, cette espèce de macération dilatera encore davantage les particules du minéral déjà rendu spongieux par la torréfaction, & facilitera par là la décomposition & la formation du *virriol martial*, & par conséquent l'oxidation, la séparation des parties ferrugineuses, & le développement des parcelles d'or & d'argent qui y étoient cachées.

Si on y mêle ensuite une quantité proportionnelle de sel gemme ou commun, il se fait incontinent plusieurs fortes de synthèses & d'analyses, selon les différentes espèces de schlich ou la solution la plus ou la moins prompte de sels neutres, terreux & métalliques, parce que les parties alcalines du sel commun ayant plus d'affinité pour l'acide sulfurique, abandonnent les parties terreuses & minérales de l'acide du sel, pour composer avec l'alcali minéral le sel de Glauber, si connu & si facile à dissoudre dans l'eau. Mais si, entre ces différentes analyses, il se formoit par aventure du

sulfate ou vitriol d'arsène, il faudroit, outre le sel commun, recourir à un alcali mêlé d'acide, ou, pour éviter la trop grande dépense, employer une chaux terreuse alcaline pour que les parties développées de l'acide muriatique, faute d'abandonner, n'attachassent point les particules d'argent qui se dégageoient de l'acide sulfurique. A cet effet, on emploie encore avec plus de succès un métal qui a beaucoup d'affinité avec ce sel, comme le cuivre, le fer & le zinc, pour tendre à l'argent, qui on précipite hors de cette solution, la forme métallique & les propriétés nécessaires à l'amalgamation, sans quoi il resteroit dans le résidu.

On a déjà fait mention plus haut qu'il ne se manifestoit du vitriol qu'à la torréfaction des minerais bruts qui contenoient du soufre dans leur alliage, & que, pour décomposer & tendre actif le sel commun dont on fait usage, il falloit une certaine quantité de sel sulfurique pour procéder à l'amalgamation. Il s'ensuit donc qu'il ne faut pas torréfier le schlich à un trop grand feu pour ne point faire évaporer l'acide sulfurique, mais mêler les minerais secs, entièrement privés de soufre, avant la torréfaction, avec de la matte brute, des pyrites, ou quelque autre corps sulfureux ; ou après, quand ils sont arrosés & détremés d'eau commune avec une quantité proportionnelle de *virriol martial* ou de *vitriol de cuivre*, qui est encore infiniment plus efficace pour parvenir d'autant plus vite à décomposer le sel commun. L'expérience de tous les maîtres les plus habiles garantit ce que j'avance. Qu'on mêle, après le procédé d'amalgamation, du vitriol & du sel commun à un schlich, qui contiendra encore quelque chose, & qu'on le laisse quelque temps dans cet état, on en tirera une seconde fois la partie considérable d'argent qu'on n'auroit pu obtenir dans le premier procédé en y ajoutant même beaucoup de sel, & en prolongeant les travaux.

Si au contraire on choisit la voie sèche, il faut, pour procéder à l'analyse du sel commun, avoir égard à des circonstances tout-à-fait étrangères à celles qui se manifestent dans la voie humide. Les minerais bien & dûment broyés & triturés avec les différentes espèces de schlich qu'on destine à l'amalgamation, doivent préalablement être bien mêlés avec une suffisante quantité de sel commun ou de sel gemme bien broyé, & alors l'alliage doit être torréfié tout ensemble à un feu convenable de calcination.

Selon la différente proportion des espèces de mélange, le sel commun se décomposera, ou d'abord, pendant la synthèse du vitriol qui se formera par la combustion du soufre, ou par la continuation de la chaleur de la torréfaction des sels, ou d'autres minerais plus ou moins sulfureux.

Dans le premier de ces cas, savoir dans un mélange de minerais sulfureux, l'acide se manifeste à la volatilisation, ou plutôt à la combus-

tion du soufre par la torréfaction; mais au lieu de s'allier étroitement aux terres alcalines & métalliques du mélange, il ne s'y attache que très-peu; il va décomposer le sel commun, s'unir à son alcali minéral, & produire un sel de Glauber, qui, ainsi que les autres, soit par l'insuffisance du sel alcali-minéral produit de l'acide vitriolique, soit par les sels neutres, terreneux & métalliques nés de la décomposition du sel lui-même, se dissoudra dans l'eau qu'on y jettera, & se conservera dans cette lessive très-composée.

Cet acide de sel ou acide mariatique, développé de la sorte, & transformé, au moyen des terres alcalines & des oxides métalliques, en sels neutres si faciles à dissoudre, dégage paisiblement l'or & l'argent des corps hétérogènes qui les renferment, beaucoup plus complètement qu'on ne pourroit le faire par la trituration mécanique la plus parfaite, pour achever, par l'amalgamation, la séparation de ces métaux, d'autant plus que l'acide du sel peut dissoudre les parties ferrugineuses qui ont été trop oxidées, dissolution que ne pourroit pas faire l'acide sulfurique.

Mais, dans le second cas, savoir quand le mélange des minerais à torréfier ne contient point de soufre, & qu'il n'est composé que de parties terreuses ou d'oxides métalliques, on d'un alliage métallique & demi-métallique, l'absence totale de l'acide sulfurique, empêche la décomposition du sel commun, mais on fait en chimie, qu'on parvient à décomposer le sel marin par l'action seule du feu bien entretenu. Il est néanmoins plus profitable de provoquer & d'accélérer cette décomposition en y ajoutant quelques minerais sulfureux; comme on l'a déjà conseillé dans le procédé par la voie humide. On fera particulièrement usage des pyrites sulfureuses, de la matte d'argent ou matte de cuivre à la torréfaction du *spess* & du cuivre noir, parce que le soufre venant à se développer, contribue à oxidier une partie des métaux & demi-métaux, & l'acide sulfurique qui s'en forme, décompose aussi plus vite & plus parfaitement le sel commun: alors l'acide du sel, de concert avec le feu, & le libre accès de l'air, rompt le résidu des particules métalliques, & dégage les parcelles des métaux purs qui y étoient renfermées. Cette oxidation des métaux imparfaits, est d'autant plus nécessaire aux minerais aurifères de cuivre, & au cuivre vierge, que l'affinité de celui-ci est plus grande avec l'or, & qu'il seroit, par conséquent impossible d'en extraire entièrement l'un par le mercure, sans une parfaite & entière oxidation de l'autre.

Qu'on mêle, par exemple, des *spess* ou du cuivre noir allié avec de l'or ou de l'argent, purement avec du sel commun; ce sel absorbera, à la vérité, quelques parties du cuivre, mais bien plus fortement celles des demi-métaux qui auront

le plus d'affinité avec lui, comme l'antimoine, l'arsenic, & même les parties ferrugineuses; la plus grande partie du cuivre restera cependant intacte à cause de l'insuffisance de l'acide mariatique, & les parcelles d'or qui y sont cachées, ne se développeront point, tandis que celles de l'argent qui y sont développées par la torréfaction, & qui ont, en apparence, cherché à s'allier avec les demi-métaux du mélange des minerais bien plus étroitement qu'avec le cuivre, se trouveront toutes à peu de choses près, dans le mercure de l'amalgame.

Pour prouver ultérieurement que le cuivre qui retient les parcelles d'or qui n'ont pu s'amalgamer, n'a réellement pas été oxidé, qu'on fonde à part le cuivre résidu du procédé d'amalgamation, on aura un véritable *regule* de cuivre qu'on n'auroit pu revivifier sans une réduction préalable, si le metal avoit été entièrement oxidé ou calciné.

Mais qu'on ajoute au mélange des minerais à torréfier, outre le sel, quelques pyrites sulfureuses, alors les parties de cuivre qui renfermoient l'or, seront promptement oxidées par les parties sulfureuses de cet alliage, ainsi que par les acides sulfurique & mariatique unis à l'action combinée du feu & de l'air. La grande affinité du cuivre pour l'or, sera détruite, & du résidu bien trituré & amalgamé on obtiendra plus, sans une réduction prolongée, aucun *regule* de cuivre.

De tous ces préceptes préliminaires & théoriques de l'amalgamation de l'or & de l'argent tirés de toutes sortes de minerais qu'on détaille plus au long dans les procédés qu'exige la pratique, on peut établir les corollaires suivans, relativement à l'amalgamation.

1°. Les minerais à amalgamer doivent être concassés, moulus, laminés, en un mot, mécaniquement divisés pour multiplier leur surface ou leur point de contact.

2°. Ce mélange, dûment pulvérisé, doit être torréfié pour dégager la volatilisation & la combustion du soufre, ainsi que par l'oxidation des métaux imparfaits & des demi-métaux, les parcelles d'or & d'argent qu'il renferme.

3°. Les minerais, ainsi torréfiés, doivent être mêlés avec du sel commun (s'ils ne l'ont point été avant la torréfaction) & une quantité proportionnelle d'eau commune & de mercure, & agités continuellement ensemble pendant un certain temps, pour que le mercure, répandu dans la masse, n'en laisse aucun point sans la toucher, & venant ainsi à rencontrer plusieurs fois les parcelles d'or & d'argent dégagées de leurs minerais, s'y attache fortement & les absorbe.

4°. Celui qui préside aux procédés doit connaître à fond les principes chimiques des corps, pour qu'il puisse, au milieu des synthèses & des analyses, tant mécaniques que chimiques, qui ont lieu dans ces procédés, juger de leurs rap-

ports & lever tous les obstacles qu'il pourroit rencontrer.

L'amalgamation des minerais d'or & d'argent requérant dans les fonderies en grand abîsolument la même manipulation que les procédés en petit : les opérations successives suivantes sont nécessaires.

- A. Concasser, moudre.
- B. Torréfier.
- C. Tamiser.
- D. Amalgamer.
- E. Exprimer le mercure.
- F. Distiller l'amalgame.
- G. Distiller le mercure exprimé.
- H. Affiner l'argent.

- I. Retraiter les résidus qui pourroient encore contenir de l'or & de l'argent.

Tous ces procédés demandent de certains préparatifs, des observations, une sage pratique, qui, dans le traité du chevalier de Born, sont à la suite de ce précis théorique, détaillés & éclaircis de tous les préceptes fondamentaux de la chimie; ils sont, en outre, appuyés de tout ce que l'expérience offre de plus convaincant & de plus solide, & ornés d'un très-grand nombre de planches pour l'intelligence des machines; car ce ne sont point ici des simples spéculations d'un penseur, ce sont des faits & des opérations, qui, depuis plusieurs mois, sont mis en usage à Schemnitz en Hongrie, où le premier moulin d'amalgamation a été établi en Europe, & depuis à Joachimsthal en Bohême. Tout ce que l'auteur observe sur chaque procédé est expérimenté tous les jours, & a été soumis au mois d'août 1786, à l'examen le plus rigide de M. d'Elhuyar, l'erbet, Trebra, Charpentier, Poda, connus dans le monde avant, pour tout se que l'Espagne, l'Allemagne & la Suède, possèdent de plus habiles mineralogistes, que des ordres exprès de leurs souverains, & l'envie de tout voir par eux-mêmes, & de tout savoir, avoient amenés sur les lieux en Hongrie, & réunis par le hasard le plus heureux pour l'auteur, à qui ils ont décerné une espèce de triomphe, en applaudissant unanimement à ses travaux, & recevant précieusement, avec les mineralogistes envoyés par sa majesté catholique, les leçons de pratique qu'il leur donnoit lui-même.

Tel est le détail inféré, il y a bientôt quatre ans, dans le journal de physique. On reconnoît bien qu'il y règne quelques obscurités & quelques incertitudes; mais au moins le fond du procédé & sur-tout de la théorie qui a guidé M. de Born, y est contenu. La science vient de perdre cet illustre mineralogiste il y a quelques mois, on ne fait point exactement ici dans quelle propriété sont les établissements de Schemnitz & de Joachimsthal, & si on en a fait de pareils en Espagne ou au Pérou, j'ai demandé depuis quelques temps des renseignements à cet égard, ainsi que des dé-

tails exacts sur le procédé de M. de Born; j'espère que je pourrai ajouter à cet article dans la suite de ce dictionnaire, aux mots MERCURE ou OR.

AMALGAME. L'amalgame (nom substantif féminin) est en général l'union des métaux avec le mercure, c'est une sorte d'alliage dans lequel le mercure est nécessaire, & dont il détermine la nature générale. On peut aussi considérer l'amalgame comme une dissolution des métaux dans le mercure; elle présente en effet tous les phénomènes des dissolutions, le point de saturation diffère pour chaque métal suivant la température, plus ou moins de liquidité, cristallisabilité, précipitations, par la loi des affinités, &c. MM. les académiciens de Dijon, en ont donné une idée très-exacte, en suivant leur histoire dans le vingtième chapitre de leurs *éléments de chimie*, qu'ils ont intitulé des *dissolutions par le mercure*. On dit aussi amalgamer les métaux, pour indiquer qu'on les combine avec le mercure.

Quoique le détail de chaque amalgame, appartienne véritablement, soit à l'histoire du mercure, soit à celle de tous les métaux en particulier; quoique nous devions traiter chacune d'elles, avec toute l'étendue convenable aux différents articles des substances métalliques, l'importance des phénomènes, des propriétés & des usages des amalgames, réunie à l'existence de loix & de circonstances générales qui appartiennent à toutes les amalgames, nous engageant à donner dans cet article une suite d'observations & de remarques, qui peuvent éclairer, soit la marche de la science, soit son application à un grand nombre d'arts où les amalgames sont employées avec beaucoup d'avantages. Pour traiter cet article avec ordre, il nous a paru nécessaire de considérer dans des paragraphes particuliers, 1°. Les principales époques des découvertes sur les amalgames; 2°. Les procédés par lesquels on fait ces espèces de composés métalliques; 3°. Les phénomènes qui se présentent pendant leur fabrication; 4°. Les propriétés qui caractérisent en général les amalgames; 5°. Les combinaisons & les décompositions réciproques des amalgames; 6°. Enfin, les usages généraux de ces alliages avec le mercure.

§. I. Principales époques des travaux chimiques sur l'amalgame.

Il y a bien long-temps qu'on a reconnu pour la première fois la dissolubilité des métaux dans le mercure; les anciens l'employoient pour fuser & purifier les métaux purs; ils s'avoient que l'or dissolvoit dans le mercure. On trouve dans l'histoire beaucoup de traces de ces connoissances des anciens sur la dissolution de plusieurs métaux dans le mercure. On n'a fait cependant une attention particulière à cette combi-

fon; pour l'employer plus généralement dans les arts, que vers le milieu du seizième siècle; époque où Velsasco l'employa pour travailler les mines d'or & d'argent du Pérou. La découverte de Velsasco est rapportée à l'année 1566. Vers le commencement du dix-septième, il parait qu'Alonso Barba a singulièrement étendu l'usage de l'amalgame dans le traitement des mines de ce pays. On doit même en lisant l'ouvrage de ce dernier, qu'il a découvert lui-même le procédé, en 1600. Mais les usages du mercure pour dissoudre les métaux, n'étoient point encore tournés du côté de la science aux époques dont nous parlons. Il est vraisemblable que Borrichius, Ozander, Beccher & Stahl, sont les premiers qui ont considérés chimiquement les amalgames, & qui en ont tiré quelques axiomes généraux, applicables à la science. Rouelle & Gellert, ont ensuite beaucoup ajouté à ces précieuses observations dans leurs ouvrages & leurs leçons. Ozander, au rapport d'Ulrich Reischius, est le premier qui ait remarqué que les métaux s'oxydent promptement dans les amalgames; Rouelle est un des premiers qui ait montré des amalgames cristallisés dans les cours du jardin des plantes; Lûschet a aussi découvert à Mayence, que le mercure fait cristalliser les métaux; mais M. Sage a beaucoup ajouté à ces observations, & de tous les chimistes, il parait être celui qui a le mieux décrit les singuliers phénomènes qui existent dans les combinaisons du mercure avec les métaux. Depuis la grande extension que la chimie a reçue en France, &c. tous les chimistes modernes ayant fait des expériences répétées sur les diverses amalgames, ils en ont résolu une suite de vérités générales, qui font devenues un domaine, en quelque sorte universel; dont nous nous servons pour rédiger les différens paragraphes de cet article.

§. II. Des procédés par lesquels on prépare les amalgames.

Les amalgames étant de véritables dissolutions des métaux dans le mercure, doivent ressembler aux autres dissolutions quelconques, par rapport aux moyens nécessaires pour les opérer; & ce qui diffère dans les procédés, ne doit être que relatif à l'état particulier de densité des matières métalliques. Il ne faut pas cependant confondre ici les dissolutions métalliques, qui supposent une altération de la part des corps qu'on unit, avec les dissolutions simples de sels dans l'eau qui n'admettent aucune altération pour qu'elles aient lieu; c'est avec les dernières que les amalgames ont une forte analogie. (Voyez le mot DISSOLUTION.) Quelque l'état liquide du mercure ne soit relatif qu'à la grande fusibilité de ce métal, comme cet état est constant dans

le plus grand nombre des lieux, on trouve dans ce liquide une des conditions de la dissolution. Comme aussi cette fluidité tient à la combinaison intime du calorique avec le mercure, on peut encore regarder le calorique comme une des causes de l'union du mercure avec les métaux. Quoi qu'il en soit de ces opinions, pour unir les métaux avec le mercure, ou pour les dissoudre dans ce métal liquide, il faut les présenter en contact avec lui. Souvent l'attraction entre les matières est si considérable, que l'union a lieu avec beaucoup de promptitude, à froid, par la seule trituration, & sans avoir d'autre circonstance à faire naître que de présenter le métal qu'on veut amalgamer dans un état de division marquée. C'est ainsi qu'en triturant dans un mortier de marbre, de verre, de porcelaine, de fer, des lames ou feuilles minces d'or, d'argent, avec du mercure, on opère la combinaison de ces métaux métalliques. Il est au contraire quelques métaux qu'on ne peut unir seulement avec le mercure, qu'en les mettant préalablement eux-mêmes dans un état de fluidité, qu'en les faisant fondre. Lorsqu'ils sont à l'état de fusion, on y projette le mercure sans l'avoir fait chauffer, si les métaux sont très-fusibles, comme le bismuth, l'étain, le plomb; on peut cependant aussi apporter le mercure à une température à-peu-près égale à celle de ces métaux fondus, & l'opération n'en réussit que mieux. Lorsqu'on veut amalgamer les métaux moins fusibles que les précédens, tels que le zinc & l'antimoine, il faut avoir soin de n'y ajouter le mercure que bien chaud, & à une température à-peu-près semblable à celle qu'ils ont dans leur état de fusion. Mais si les métaux exigent pour être fondus une chaleur très-forte qui les tiennent bien rouges & celle que le mercure ne puisse y être exposé sans se réduire en vapeur, il seroit dangereux de tenter une pareille amalgamation; parce que le mercure en coustant les métaux incandescens seroit tout-à-coup vaporisé & produiroit des explosions violentes. Il existe encore une manière de faire des amalgames, c'est celle qu'on pourroit caractériser par l'expression d'amalgamation par la voie humide; elle consiste à présenter un métal en molécules très-fines, au moment où on le sépare, réduite de son dissolvant en lui enlevant l'oxygène, au mercure également à l'état métallique; on en a un exemple dans l'expérience chimique, connue depuis long-temps sous le nom d'arbre de Diane, & qui n'est qu'une union de l'argent précipité & réduit par le mercure, avec le même mercure, au fond de l'acide nitrique qui tenoit auparavant l'argent en dissolution. (Voyez ABBREGE DIANE & ARGENT.) Il seroit utile de multiplier beaucoup plus qu'on ne l'a fait jusqu'aujourd'hui, les essais d'amalgamation par ce procédé. Il est vraisemblable qu'on opéreroit ainsi

les combinaisons plus intimes que celles qu'on a encore opérées par les procédés connus jusqu'à présent. C'est ainsi que M. Sage a parvenu à former une amalgame de cuivre, en décomposant le sulfate de cuivre par le fer, & en présentant au cuivre qui se dépose en petites molécules brillantes, le mercure au fond du vase où s'opéroit cette précipitation.

Pour préparer les amalgames & en bien reconnaître les propriétés distinctives, il est essentiel d'avoir du mercure bien pur, tel que celui qu'on extrait du cinabre; (Voyez MERCURE.) & des métaux également purs; on prend communément au moins six parties de mercure contre une du métal, pour avoir une amalgame liquide, ou une dissolution par le mercure; & quelquefois même on augmente beaucoup la proportion du mercure. Si l'on veut avoir une Amalgame solide, il est des métaux qu'on ne demandant qu'un peu plus de leur poids de mercure pour cela. Il est encore essentiel de ne se point servir de vases métalliques pour faire ces combinaisons, parce que le mercure rongé & dissout les vaisseaux, & forme alors des amalgames impures, ou présente des décompositions intenses; il n'y a que des vaisseaux de fer ou de fonte qui peuvent être employés pour cette opération, parce que le mercure n'agit point sur le fer avec lequel il n'a presque point de tendance à l'union; encore l'adhérence ou l'action des autres métaux pour le fer, peut-elle nuire à la réussite de l'opération; voilà pourquoi nous avons conseillé des mortiers de terre, & de porcelaine ou de nacre.

§. III. Des phénomènes qu'offrent les amalgames pendant leur préparation.

Tous les phénomènes qui ont lieu pendant qu'on ramène les métaux avec le mercure, ou pendant qu'on prépare les amalgames, indiquent que cette opération est une véritable dissolution, & qu'elle est due à l'attraction des corps que l'on unit. Plus un métal tend à s'amalgamer avec le mercure, & de plus il adhère à la surface de celui-ci, lorsqu'on présente une lame du premier suspendue à une balance; plus il faut de poids pour l'enlever. (Voyez l'article ATTRACTION.) Des que le métal qui tend à se dissoudre dans le mercure est mis en contact avec lui, immédiatement il y adhère, mais il lui donne ad quelques fois entrée dans ses pores, entre ses molécules; & il y a une véritable pénétration. C'est ainsi qu'une goutte de mercure qui tombe sur une lame ou une pièce d'or & d'argent, s'étend, s'applatit, se colle à ces métaux, & les mouille véritablement. Si on laisse quelque temps les deux métaux, ainsi collés & adhérens, la pénétration devient plus forte & le frottement l'augmente encore, & l'on trouve bientôt dans l'or ainsi blanchi par le mercure & cassé, la

trace de sa perméabilité par le mercure. En mettant assez de métal fluide, le métal solide partage bientôt la liquidité du premier, & si l'on plonge dans la masse des deux métaux qui s'unissent un thermomètre très-sensible, la liqueur baisse, & annonce que le calorique qui y étoit d'abord libre, & qui en élevoit la température, y entre dans une combinaison plus intime, ce qui doit avoir lieu pour opérer la fusion du métal solide. M. Machy a prouvé que les amalgames produisent du froid en se formant, par les expériences suivantes. Après avoir recouvert d'une feuille d'étain la boule d'un thermomètre, il a enfoncé cette boule dans du mercure; à mesure que l'étain s'est combiné avec ce métal liquide, la liqueur du thermomètre à peu près baissée. En mettant & agitant ensemble les amalgames de plomb & de bismuth, il a observé de même un refroidissement sensible. J'ai fait la même observation en triturant à froid des feuilles d'or & d'argent dans du mercure.

Mais de tous les phénomènes que présente l'amalgamation, aucun n'est plus remarquable & plus singulier que l'oxidation qui a lieu quelquefois dans le moment même où elle se fait, & la disposition constante à s'oxyder que contractent les métaux dans l'instant où ils s'unissent au mercure; cette dernière circonstance ne peut être convenablement appréciée qu'en examinant les propriétés générales des Amalgames, toutes formées; il ne doit être question dans ce paragraphe que de ce qui se passe immédiatement pendant la préparation même des Amalgames. On ne peut pas combiner du bismuth, de l'étain, & du plomb avec le mercure, sans voir dans l'instant même que l'on opère, une poussière noire plus ou moins abondante se séparer des amalgames, & venir nager à leur surface; cette poussière est un véritable oxide métallique, mais on penseroit à tort qu'il n'est dû qu'au métal associé avec le mercure, comme très-oxidable. Le mercure lui-même fait partie de cette poussière; c'est même lui qui lui donne la couleur noire; ainsi l'union du mercure avec les métaux où s'y dissolvent, est accompagnée d'une telle division, d'un tel écartement entre les molécules des deux métaux qui s'unissent, que l'attraction du mercure pour l'oxygène augmente tout-à-coup, qu'elle devient assez forte, pour que sans élévation de température, & même malgré le léger abaissement qui a lieu par le fait même de la combinaison, l'oxygène atmosphérique s'unisse au mercure & au métal qui se tient en dissolution, & produise dans l'un & l'autre un commencement d'oxidation, qui en réduit une petite portion en poussière noire.

Il n'est pas nécessaire d'insister plus long-temps qu'on ne l'a fait sur le changement de propriétés qu'éprouve tout-à-coup le métal dans le moment où il s'unit au mercure; ou devoit que se chaup-

gement dépend de deux causes ; l'une est la combinaison nouvelle qui suivant une des lois les plus constantes des attractions chimiques ; doit modifier les propriétés des composés ; l'autre est la fixation d'une plus grande quantité de calorique , déterminée par la combinaison même qui change de capacité à l'égard de ce corps , & démontre par l'abaissement de la température.

S'il étoit besoin de rassembler ici un plus grand nombre de preuves , pour faire voir que l'amalgame est une véritable dissolution , il seroit aisé d'en trouver une très-forte dans la cristallisabilité de cette espèce de combinaison , dans les cristaux métalliques qui retiennent du mercure comme les cristaux salins retiennent une partie de l'eau de leur dissolution , qui forme alors l'eau de cristallisation. Mais ces phénomènes seroient traités avec plus de détails dans le paragraphe suivant , puisqu'ils appartiennent , ainsi que plusieurs autres qui y seront également traités , aux propriétés des amalgames une fois formés ; hâtons nous donc d'examiner actuellement ces propriétés , & n'oublions pas qu'il ne s'agit ici que du genre de ces combinaisons , & point du tout des espèces en particulier :

§. IV. Des propriétés générales des amalgames.

Les amalgames étant une fois préparés , & leurs combinaisons étant parfaites , elles possèdent des propriétés qui appartiennent à toutes en général , & qui peuvent être considérées comme des caractères génériques , puisqu'elles s'existent d'ailleurs dans aucun autre genre de combinaisons connues. On doit ranger parmi ces propriétés , 1°. La pesanteur spécifique , 2°. La forme & la cristallisabilité , 3°. La conductibilité électrique , & la friabilité , 4°. La fusibilité , 5°. La tendance à s'oxyder ou l'oxidabilité ; 6°. L'adhérence plus ou moins forte de leurs composants. Examinons chacune de ces propriétés en particulier.

Il est d'abord aisé de concevoir que le mercure pénétrant les molécules des divers métaux , & les écartant les uns des autres , éprouvant lui-même de leur part une véritable pénétration , la densité d'une amalgame doit varier non-seulement de celle d'une autre espèce , mais encore différencie plus ou moins de celle du mercure & du métal qui lui est uni. Ainsi tantôt l'amalgame aura une pesanteur spécifique moindre , tantôt plus grande que celle qui devroit résulter de la somme des pesanteurs spécifiques des deux métaux réunis. C'est ainsi que M. Gellert a observé que l'amalgame d'argent a non-seulement une pesanteur spécifique , plus grande qu'elle ne devroit être suivant les règles de l'alliage ; mais plus grande encore que celle du mercure même , quoiqu'on l'argent avec lequel il est allié , soit infiniment plus léger. M. Gellert s'en est assuré , non-seule-

ment parée que l'amalgama d'argent va au fond du mercure , mais encore par la balance hydrostatique. Il paroît cependant que cette pesanteur varie par la température , puisque M. Sage a observé qu'en chauffant cette amalgame , elle vient nager au-dessus du mercure. Au reste il manque à cet égard un grand nombre d'expériences , pour connaître les pesanteurs spécifiques comparées des différentes espèces d'amalgames ; mais cela n'empêche pas que le principe général , qui exprime cette différence de pesanteur en plus ou en moins dans toutes les amalgames , par rapport aux deux métaux qui les forment , ne soit aussi réel qu'il est simple à concevoir.

Si quelque chose rapproche , comme nous l'avons déjà dit , les amalgames des dissolutions salines , c'est la propriété de cristalliser qu'elles acquièrent. Une amalgame solide faite par les procédés ordinaires , présente un amas de petits grains , ou une surface parfaitement grenue ; lorsqu'on la brise. Ces grains ne sont autre chose que de véritables cristaux. Il a déjà été remarqué dans le premier paragraphe de cette dissertation , que MM. Fuschel & Rouelle avoient reconnu les premiers cette propriété de cristalliser dans les amalgames. M. Dampignon avoit aussi découvert il y a plus de vingt ans , que l'amalgame d'étain qu'il employoit , pour inter les plaques de verre sur les bords du cabinet du jardin des plantes , se séparoit sous la forme de petits cubes , qu'il renvoyoit à quelque distance du point où il avoit d'abord placé cette amalgame. Mais ces observations n'étoient en quelque sorte que des aperçus , lorsque M. Sage , après avoir entrepris une suite d'expériences assez nombreuses sur ce point , publia en 1773 dans la collection de ses mémoires , des observations suivies sur la cristallisation des amalgames. Sans entrer ici dans tous les détails qui seront présentés à l'histoire particulière de chaque métal , nous en indiquerons cependant la partie des résultats généraux qui sont à la cristallisation. M. Sage , pour réussir à faire cristalliser régulièrement les amalgames , a été obligé d'employer beaucoup plus de mercure qu'il n'en faut pour former les amalgames mêmes , & se est revien aux dissolutions salines ordinaires , qu'on ne réussit à obtenir en belles cristallisations , qu'à peu d'égard entendu jusqu'à un certain point les dissolutions. On sait qu'alors , lorsqu'elles ne contiennent point assez d'eau , les sels s'en séparent trop promptement , & ne donnent que des masses informes. On chauffe ces amalgames dans des cornues de verres bultes & on en retire par la distillation une portion de mercure qui ne doit aller en général qu'entre le quart & le tiers de celui qu'on a employé ; la corne étant refroidie & bouchée , on trouve l'amalgame régulièrement cristallisée au fond de ce vaisseau. L'amalgame d'argent cristallisée par ce procédé , a présenté à M. Sage des prismes hexaédres réguliers , terminés

terminés par des pyramides à quatre faces & diversement groupés les uns sur les autres. Ces prismes paroissent être formés d'octaèdres implantés les uns sur les autres comme l'alun. Ils imitent l'argent natif en dendrites ou en végétation. L'amalgame de plomb traînée par un procédé analogue, a donné à M. Sage des cristaux également tétraèdres, adhérens les uns aux autres, & formant des prismes à quatre pans, terminés par des pyramides à quatre faces. L'amalgame d'or lui a fourni des cristaux de la même forme, gris, de quatre à cinq lignes de longueur sur un quart de ligne de diamètre. L'amalgame de bismuth lui a présenté des octaèdres, des pyramides à quatre faces, des lames triangulaires entières, d'autres dont les angles étoient incomplets & comme tronqués de biais, des prismes hexagones, striés, comprimés. Celle d'étain lui a offert des cristaux gris, brillans, en lames feuilletées, amincies vers leurs bords, & laissant entr'elles des cavités polygones. Ces lames lui ont paru être le résultat de plusieurs petites feuilles carrées apposées les uns sur les autres. Dans l'amalgame de zinc, il a vu des lames carrées dont tous les bords paroissent arrondis, & qui laissent entr'elles des cavités polygones, comme il les avoit observées dans l'amalgame d'étain. Le cuivre, l'arsenic, l'antimoine ne lui ont point fourni de cristallisation, mais aussi on sait que ces métaux ne s'unissent que difficilement au mercure, & ne forment que des amalgames très-peu solides. Il résulte de ces observations que la propriété de prendre des formes cristallines & régulières, est une de celles qui caractérisent les amalgames. La portion de mercure qui reste unie au métal dans chaque amalgame, varie pour chacune d'elles, & paroît être relative à leur attraction réciproque. Si, comme nous l'avons déjà indiqué, on peut la comparer à la portion d'eau, qui entre comme élément dans les cristaux des sels, & qu'on nomme eau de cristallisation, il ne faut pas pousser cette comparaison trop loin, puisque cette portion de mercure fait partie essentielle de l'amalgame, & conséquemment est plus qu'un simple élément de cristallisation. L'amalgame n'existeroit point sans cette quantité de mercure, tandis que le sel auroit toujours sa nature saline, sans l'eau de cristallisation. Il paroît que la forme qu'affectent les amalgames, est très-analogue à celle qui est propre à chaque métal uni au mercure. Enfin il est vraisemblable que, lorsqu'on multiplie les expériences sur les amalgames & sur l'examen de leurs propriétés, on connoitra la forme de plusieurs amalgames, qui n'a encore été ni observée, ni décrite.

C'est à la pénétration du mercure & des métaux, & à l'état fluide du mercure, ainsi qu'au partage du calorique entre les deux métaux, qu'est due la consistance variable & la friabilité constante qu'on observe dans les amalgames. La proportion

Chimie, Tome II.

du mercure, employée pour ces préparations, fait cependant varier les propriétés dans leur intensité, quoiqu'elles existent toujours dans toutes les amalgames. Il n'est pas une seule de ces combinaisons où le mercure ne perde une portion de sa fluidité, & les métaux qui lui sont unis, une partie de leur ductilité, de leur ténacité. En général le mercure, uni en petite quantité aux métaux, forme des amalgames solides, cassans, friables; une dose un peu plus grande de mercure rend ces combinaisons molles & susceptibles d'être pétries, quoique cette espèce de pâte soit sans liant & sans ductilité. Cette friabilité, cette mollesse, rendent les amalgames très-utiles dans plusieurs arts.

Toutes les amalgames sont fusibles, & en général plus que les métaux qui sont combinés au mercure. Il n'en est aucunes qui ne se ramollissent facilement & promptement par l'action du calorique; si on les laisse refroidir lentement, elles se cristallisent toutes avec plus ou moins de régularité; en considérant la fusibilité des amalgames, on en trouve la raison dans l'état des métaux unis au mercure & dans les phénomènes qui accompagnent leur union. Ces métaux, en partageant le calorique du mercure, perdent leur consistance, & sont dans leurs molécules un écartement qui les dispose singulièrement à la fusion; on peut même regarder l'état de mollesse de ces combinaisons comme un commencement de fusion qui reste dans une sorte de permanence jusqu'à ce qu'elle devienne plus complète par une élévation de température, ou plus difficile par la soustraction du mercure. Au reste, on n'a point encore déterminé le degré de fusibilité de chaque espèce d'amalgame; il y en a qui deviennent plus fusibles lorsqu'on les mêle les uns aux autres. C'est ainsi qu'en triturant ensemble l'amalgame de plomb & l'amalgame de bismuth, elles se fondent presque tout-à-coup, & de solides ou pâteuses qu'elles étoient, elles deviennent fluides & presque aussi coulantes que du mercure seul. Le refroidissement que M. Machy a observé dans cette expérience, prouve que, pendant la combinaison de ces deux amalgames, il se fixe une plus grande quantité de calorique qu'il n'y en avoit auparavant dans chacune d'elles, & c'est sans doute à cette fixation de calorique qu'est due la liquidité de ce triple composé métallique.

Une des propriétés les plus remarquables & les plus singulières des amalgames, c'est, sans contredit, l'oxidabilité qu'elles présentent, & la disposition à s'unir avec l'oxygène atmosphérique qu'elles ont offerte à tous les observateurs. Nous avons déjà dit que dans le moment même de l'union entre les métaux & le mercure, les premiers présentent les traces très-sensibles d'oxidation, & que, lorsqu'on recueille la poussière noire qui se dégage de leur surface, on trouve que cette poussière est un véritable oxide métallique. Ca

DD

n'est pas seulement le métal uni au mercure qui s'oxide ainsi, c'est encore le mercure lui-même; car l'oxide d'étain, de plomb, de zinc, &c., n'a pas par lui-même une couleur noire. Toute amalgame frottée entre les doigts ou sur des corps blancs, les noircit très-promptement & laisse un oxide noir de mercure à leur surface. Il paroît même que l'argent, si difficile à oxider par le contact de l'air, & qu'on n'oxide même point par les moyens ordinaires, éprouve dans ce cas une véritable oxidation comme les autres matières métalliques, puisque M. Sage a trouvé que la poussière noire qui fourne son amalgame présente toutes les propriétés d'un oxide d'argent. On trouve dans les ouvrages alchimiques des Hiac les Hollandois, &c. que les métaux parfaits, c'est-à-dire, l'or & l'argent, deviennent susceptibles d'être calcinés par un feu de réverbère, lorsqu'ils sont unis au mercure. Ces faits, dont plusieurs ont été vérifiés par quelques chimistes modernes, sont d'accord avec ce qu'on sait en général sur la facilité à s'oxider, que présentent les alliages d'une manière plus marquée en général que les métaux seuls & purs; mais il n'en est pas moins difficile de concevoir comment cette facilité s'étend jusque sur les métaux qu'on ne peut point oxider par la simple action simultanée de l'air & du feu. On ne peut en trouver d'autre raison ici que la division qu'éprouvent les métaux dans leur combinaison avec le mercure, & cependant il sembleroit que cette division n'est pas plus forte que celle d'une limaille très-fine d'argent, qu'on ne peut pas plus oxider qu'une lame entière de ce métal par les procédés ordinaires. Il faut ajouter à cette première cause d'oxidabilité, l'état particulier de la combinaison métallique, la nature spéciale de l'amalgame, qui paroît avoir, comme un de ses caractères généraux, une attraction très-augmentée pour l'oxygène. C'est par le même principe sans doute, que, suivant la remarque de M. Tillet, le platine indissoluble par lui-même dans l'acide nitrique, devient susceptible de s'y dissoudre lorsqu'il est allié avec l'argent.

L'expérience a fait voir un grand nombre de fois que le mercure adhère assez fortement aux métaux qui lui sont unis dans les amalgames pour ne pas pouvoir être volatilisé par la chaleur, qui réduit ordinairement ce métal en vapeur. On peut tenir les amalgames dans des cornues rouges au feu, sans que le mercure s'en sépare à une forte chaleur; on n'obtient souvent que des portions de mercure, & la plus grande partie reste fortement unie au métal amalgamé. Cependant, en forçant beaucoup le feu, on finit par décomposer complètement l'amalgame; mais la violence qu'on est obligé d'employer prouve elle-même combien le mercure adhère aux métaux qui lui sont unis, & fait voir que si ces métaux partagent la fluidité & la subtilité du mercure, celui-ci partage assez fortement à son tour leur hâte & leur résistance

à la volatilisation. Quelquefois une amalgame se volatilise toute entière plutôt que de laisser aller le mercure; cela arrive aux métaux qui sont volatils, comme le bismuth & le zinc. On a même trouvé, dans quelques expériences, un peu des métaux les plus fixes & les moins altérables enlevés avec le mercure. L'adhérence des divers métaux au mercure, varie non-seulement dans sa force, mais encore pour la proportion. Cette circonstance de l'attraction est tout-à-fait relative à ce qu'on nomme saturation, dans les sels, & en général dans toutes les combinaisons chimiques. Mais cette saturation ne correspond pas à l'attraction; on ne pourroit pas l'indiquer avec exactitude. Car M. Sage a observé que l'argent retient un quart de plus de mercure que l'or, quoique ce dernier ait, suivant tous les chimistes, plus d'affinité que lui avec le mercure.

§. V. Des combinaisons & des décompositions réciproques des amalgames.

Tout ce qui a été exposé sur les amalgames dans les paragraphes précédents, prouve bien que leur combinaison tient à la force d'attraction du mercure pour les métaux; mais cette attraction n'étant pas la même pour chaque espèce de métal, il doit en résulter que le mercure tient avec une force particulière à chacune de ces espèces, & qu'il peut être séparé réciproquement de l'une par l'autre. Si l'on conçoit deux ou plusieurs métaux ayant à-peu-près la même force pour s'unir au mercure, on trouvera qu'il peut y avoir des amalgames de deux, de trois ou d'un plus grand nombre de métaux. Il est certain, par exemple, qu'en mêlant l'amalgame de plomb avec l'amalgame de bismuth, les deux composés s'unissent sans décomposition, sans séparation, & forment ensemble une amalgame de trois substances métalliques qui est plus fluide que chacune d'elles ne l'étoit séparément. Cependant le plus grand nombre des métaux ayant bien réellement une affinité différente pour le mercure, il doit y avoir une différence dans chaque amalgame pour la quantité de métal unie au mercure à chaud ou à froid, & conséquemment dans la saturation; il doit aussi s'opérer des précipitations de quelques métaux par d'autres, comme cela a lieu pour les dissolutions des sels; mais on n'a encore que peu examiné ces décompositions. Cependant les chimistes, en donnant les affinités du mercure pour les différents métaux dans leurs tables d'affinités, semblent avoir induit ces décompositions, quoiqu'ils n'aient point décrit les expériences sur lesquelles ces attractions sont fondées. Geoffroi a donné l'ordre suivant dans les affinités du mercure; l'or, l'argent, le plomb, le cuivre, le zinc & l'antimoine. Cellert, dans sa table, dispose les métaux dans la série suivante, quant à leur attraction pour le mercure; l'or, l'argent, le bis-

muth, le zinc, l'étain, le plomb, le cuivre & l'antimoine. On voit que Gellert diffère de Geoffroi, en ce qu'il met le zinc avant le cuivre. On est étonné de voir aussi le bismuth bien avant le plomb, tandis que les deux amalgames de ces métaux paroissent s'unir sans décomposition & sans préférence de l'un des deux métaux pour le mercure. Bergman, dans la quarante-huitième colonne de la table des attractions électives simples par la voie sèche, place après le mercure, l'or, l'argent, le platine, le plomb, l'étain, le zinc, le bismuth, le cuivre, l'antimoine, l'arsenic & le fer. Ces deux derniers ne s'unissent point au mercure, non plus que le cobalt, le nickel & le manganèse.

On peut dire, d'après cet exposé, que les chimistes ne sont pas entièrement d'accord entre eux sur l'ordre des affinités de quelques métaux avec le mercure; ce qui dépend de ce qu'ils ont employé diverses manières d'estimer cette puissance. Les uns n'ont eu égard qu'à la facilité de l'union; les autres n'ont considéré que la solidité ou la fermeté de l'amalgame: la plus commune & la moins équivoque, est celle qui mesure l'attraction par la résistance à la décomposition au moyen d'un troisième métal. Il est vrai que cette dernière méthode est la plus difficile dans son application, parce que la précipitation des métaux dans les amalgames ne s'apperoit qu'avec peine. MM. les chimistes de l'académie de Dijon ont remarqué, il y a bientôt 14 ans, que l'attraction prise par la méthode de la décomposition ou de la précipitation, est parfaitement d'accord avec les loix de l'adhésion, & on peut voir cette vérité présentée dans un nouveau jour à l'article ADHESION de ce dictionnaire, rédigé par M. Morveau.

§. VI. Des usages des amalgames.

Les amalgames ou les combinaisons des différents métaux avec le mercure, sont très-utiles dans un grand nombre d'arts & dans les opérations de chimie. On emploie celle d'or pour dorer l'argent, le cuivre, &c.; celle d'argent pour argenter le cuivre, celle d'étain pour étamer les glaces, pour frotter les coussins des machines électriques. L'amalgame de plomb sert dans les cabinets d'histoire naturelle pour boucher les bocal où sont renfermés des objets plongés dans l'alcool, & comme cette amalgame défend exactement l'alcool du contact de l'air, elle en empêche l'évaporation. L'amalgame d'étain étoit autrefois coulée en boules solides, qu'on suspendoit dans l'eau pour la purifier, & pour faire périr les insectes qui y sont souvent contenus; cet usage est abandonné depuis long-temps.

Dans les expériences de chimie on fait des amalgames pour connoître leurs propriétés distinctives & pour apprécier les attractions du mercure; l'arbre de Diane est lui-même une véritable amalgame d'argent cristallisée. On peut encore em-

ployer les dissolutions des métaux par le mercure pour les faire cristalliser, ou pour déterminer les modifications de forme qu'ils sont susceptibles de prendre dans les combinaisons, & la différence qui existe entre ce mode de cristallisation & celle qu'ils affectent seuls sans mercure.

Quant à l'usage de l'amalgame pour traiter les mines d'or & d'argent, & pour extraire ces précieux métaux des différentes gangues ou des divers mélanges dans lesquels la nature les présente, cet objet sera traité dans l'histoire métallurgique de ces deux substances, & il en a déjà été question assez en détail à l'article AMALGAMATION qui a précédé celui-ci.

Sans doute tous les usages des amalgames ne sont pas encore connus ni trouvés; ces combinaisons n'ont pas encore été suffisamment examinées par les chimistes, pour qu'on ait pu en approfondir convenablement toutes les propriétés & les utilités. Ainsi il reste encore beaucoup à faire sur cet objet, comme on peut le voir par le tableau suivant des amalgames considérées en particulier.

AMALGAME D'ANTIMOINE. Elle se fait difficilement, mais elle existe, quoiqu'encore peu connue. (Voyez les mots ANTIMOINE ET MERCURE.)

AMALGAME D'ARGENT. Une des plus faciles, des plus belles & des mieux connues dans toutes ses propriétés. Elle est très-utile dans les arts. (Voyez les mots ARGENT ET MERCURE.)

AMALGAME D'ARSENIC. Niée par les uns, indiquée par les autres; incertaine. (Voyez les mots ARSENIC ET MERCURE.)

AMALGAME DE BISMUTH. Très-facile à faire, une des plus connues; encore inutile. (Voyez BISMUTH ET MERCURE.)

AMALGAME DE COBALT. N'existe pas suivant tous les auteurs; il n'y a point d'affinité entre le cobalt & le mercure. (Voyez ces deux mots.)

AMALGAME DE CUIVRE. Cette amalgame est préparée par des procédés particuliers; on s'en sert à quelques usages remarquables. (Voyez CUIVRE ET MERCURE.)

AMALGAME D'ÉTAIN. On la fait très-aisément; c'est une des plus belles, des mieux connues & des plus employées. (Voyez ÉTAIN & MERCURE.)

AMALGAME DE FER. Il ne paroît point exister d'amalgame de fer; le mercure n'a aucune action sur ce métal. Pour faire des expériences dans le mercure, on fabrique des robinets & des tubes

en fer. On ne connoît point d'union entre ces métaux, malgré les prétentions & les travaux de MM. Desbois, Navier, Crohard, &c. Leurs combinaisons ne contiennent point le fer & le mercure purs ou à l'état métallique; ce sont même souvent de simples mélanges que les médicamens où l'on annonce la présence simultanée du fer & du mercure. (Voyez ces deux mots.)

AMALGAME DE MANGANÈSE. Entièrement inconnue, n'existe vraisemblablement pas; on manque d'expérience à cet égard. (Voyez les mots MANGANÈSE & MERCURE.)

AMALGAME DE MOLYBDÈNE. On n'a rien fait sur la combinaison du molybdène avec le mercure. (Voyez ces deux mots.)

AMALGAME DE NICKEL. Il n'y a rien de connu sur cette amalgame. Peut-être est-elle possible. (Voyez les mots MERCURE & NICKEL.)

AMALGAME D'OR. Une des plus faciles & des plus connues parmi les combinaisons du mercure; c'est aussi, de toutes les amalgames, la plus solide, la plus durable & la plus utile pour plusieurs arts. (Voyez les mots MERCURE & OR.)

AMALGAME DE PLATINE. Admise par quelques chimistes; entièrement niée par d'autres. (Voyez les mots MERCURE & PLATINE.)

AMALGAME DE PLOMB. Très-facile à préparer, & très connue. (Voyez les mots MERCURE & PLOMB.)

AMALGAME DE TUNGSTÈNE. On ne fait pas si elle existe; il n'y a rien de fait sur cette combinaison. (Voyez les mots MERCURE & TUNGSTÈNE.)

AMALGAME DE ZINC. Cette amalgame est une de celles qui réussit le mieux dans les laboratoires de chimie; on en connoît la plupart des propriétés; elle n'est point employée. (Voyez les mots MERCURE & ZINC.)

AMALGAME. (Pharmacie.) La facilité avec laquelle le mercure s'allie à divers métaux, les propriétés nouvelles qu'il acquiert cette combinaison, fournissent, en pharmacie, quelques procédés pour des préparations qui ont été recommandées comme substances médicamenteuses; quoique ces préparations soient peu employées, nous les rapporterons ici, parce qu'elles pourront fournir quelques vues nouvelles, ou servir à confirmer des faits déjà connus.

1°. Plusieurs anciens chimistes ont décrit sous le nom pompeux d'*or horizontal* ou *apote*, un oxyde d'or & de mercure que l'on préparait de la manière

suivante : « On prend une once d'or réduit en lames très-minces qu'on fait chauffer, & qu'on jette dans cet état dans huit onces de mercure qu'on fait aussi chauffer jusqu'au point de faire du bruit sur le feu, on mêle bien le tout ensemble avec une verge de fer, avant que le mercure s'en aille en fumée; on jette cette amalgame dans de l'eau chaude, ensuite on la lave dans du vinaigre, où on a mis du muriate de soude; on continue de laver ainsi cette amalgame, jusqu'à ce qu'elle ne donne plus de couleur noire au vinaigre.

» L'amalgame étant dans cet état, on la broie sur un porphyre ou dans un mortier de verre, pour la mettre en poudre assez fine pour pouvoir passer entièrement au travers d'un linge; enfin on met cette poudre dans un vaisseau de verre, dont le fond soit plat, & on le met dans un bain de sable où la matière prend une couleur rouge semblable à celle de l'horizon. »

Malouin, de qui nous tirons la formule de cette préparation, & qui assure l'avoir faite, remarque expressément eue, par ce procédé, on obtient bien plus promptement l'oxyde de mercure ou *precipité per se* que si l'on eût simplement soumis le mercure seul à l'action de la chaleur & au contact de l'air. Ainsi l'or, ce métal qui s'allie si difficilement facilite l'oxydation du mercure lorsqu'il lui est combiné, circonstance bien propre à confirmer cette vérité, que les corps acquièrent dans leur combinaison des propriétés nouvelles.

2°. L'amalgamation du mercure avec l'étain est employée en pharmacie pour préparer des boules auxquelles on a attribué la propriété de purifier l'eau. Voyez BOULES D'ÉTAÏN, & comme l'alliage du mercure avec les métaux, altère leur tenacité, les rend friables, pulvérisables; on a recours à ce procédé comme un moyen auxiliaire pour réduire quelques métaux en poudre fine; ainsi Saundet, dans son ouvrage intitulé *pharmacopeia in usum studiorum*, Lipsiæ, 1790, donne la formule suivante sous le titre d'amalgame d'étain.

Prenez mercure..... trois gros.
rapure d'étain..... deux onces.

Filez ces deux substances dans un mortier de marbre, jusqu'à ce qu'elles soient réduites en poudre très-fine. Plusieurs médecins, dans ces derniers temps, ont recommandé la rapure ou limaille d'étain, comme un moyen très-efficace pour détruire le ténia ou ver solitaire; mais, comme malgré tous les soins la rapure d'étain n'est jamais en poudre très-fine, quelques-uns ont proposé d'y substituer l'amalgame pulvérisé, dont nous venons de rapporter la formule & le procédé, mais cette préparation n'est pas une simple division ou pulvérisation de l'étain, & aujourd'hui que l'on fait combien est grande l'action de l'air sur les différentes substances avec les-

quelles il est en contact, si nous paroît que dans le procédé indiqué, le mercure & l'étain doivent s'oxyder en partie par la trituration qu'il faut continuer quelque temps; ainsi cette poudre peut avoir des effets bien différens de la simple racine d'érain, qui a été préconisée comme un antihelmintique sûr.

3°. Quelques médecins du siècle dernier ont encore recommandé de frotter une lame de plomb avec du mercure, & de l'appliquer sur des ulcères, dont les bords sont durs & calleux, ou sur des loupes & des tumeurs indolentes, dont il faut procurer la fonte & la résolution; ce moyen est encore indiqué par quelques écrivains modernes; mais l'application de ces sortes d'amalgames est généralement bannie de la pratique de l'art de guérir, ou du moins très-rarement employée.

AMANDES. Il semble que le mot **AMANDES** appartienne beaucoup plus à un dictionnaire de botanique, qu'à un ouvrage de chimie; mais il est aussi dans la structure organique de ces parties végétales, comparée à leur nature intime, des résultats importants qui doivent d'autant plus intéresser les chimistes, qu'ils n'ont point encore été peut-être considérés de cette manière. Les amandes font en général, ou pour le plus grand nombre, composées de deux pièces hémisphériques ou demi-ellipsoïdes, ou d'une autre forme quelconque, qu'on nomme cotylédons, & qui sont destinées à renfermer, défendre & nourrir l'embryon végétal placé vers la pointe, composé de la plantule & de la radicule, & implante dans les cotylédons par deux espèces de ligamens ou de cordons ombilicaux. Tout cet appareil est recouvert de deux enveloppes, l'une extérieure formant un épiderme chargé de poussière, ou couvert d'un vernis, cassant & comme inorganique; l'autre intérieure, blanche, serrée, dense, cornée. Telle est la structure de l'amande proprement dite, semence du fruit de l'amandier, & connue sous ce nom de tout le monde. Ce qu'il y a de chimique en quelque sorte dans cette structure, c'est que chaque partie diversement organisée de l'amande, est d'une nature particulière. En général la matière blanche, qui fait la base des cotylédons, est une sorte de mucilage sec, ou de scum amilacée, contenant une très-grande quantité d'huile fixe, qu'on peut en séparer par la pression, & qu'on en extrait en effet par ce moyen. C'est la partie émulsive, celle qui délayée dans l'eau, forme une liqueur blanche, laiteuse, connue sous le nom de *lait végétal*, *émulsion*, *lait d'amandes*. Elle est la même dans toutes les amandes ou les cotylédons de toutes les graines qui en portent deux. L'embryon est d'une nature fort différente de celle des cotylédons qui l'enveloppent dans le plus grand nombre des semences végétales; il est souvent amer & pur-

gatif, quelquefois même assez âcre pour être vénéneux. Il y a des semences de végétaux, dans lesquelles l'embryon est enveloppé d'un corps particulier, nommé *périsperme* par M. Jussieu. Ce corps est membraneux, huileux, résineux, corné & toujours doué d'une faveur & de propriétés très-différentes de celle des lobes ou cotylédons & de l'embryon. Quelques peuples ont appris ce fait de physique végétale par leur propre expérience, & ont grand soin d'enlever l'embryon âcre, purgatif, drastique ou vénéneux, avant de manger les amandes ou les lobes. Il est digne de remarque que les enveloppes ont aussi une nature différente de celle des autres parties, & également intéressante. La plupart sont amères, odorantes, quelquefois aromatiques, quelquefois acres & brûlantes, ou caustiques. Il est un assez grand nombre de noyaux ou d'écorces d'amandes, qui contiennent une huile fixe, blanche, grise, verte ou brune, qu'on en sépare, en les faisant bouillir dans l'eau. Les graines du *virato sebifera* d'Aublet ou du Queyamadou des naturels de l'Amérique méridionale, celles du *myrica gale* de Linnæus, du *croton sebiferum*, sont dans ce cas. Ces huiles déposées au-dehors des semences & enveloppant entièrement leur écorce, sont toujours concrètes, même lorsque l'huile contenue dans la substance même des lobes de la semence est fluide ou très-soluble. On reconnoît manifestement ici l'influence de l'oxygène atmosphérique. C'est à son absorption par les gouttelettes d'huile déposées au-dehors des graines & en molécules très-petites, qu'est due la forme concrète que prennent ces huiles, & leur différence d'avec les huiles contenues dans l'intérieur des semences; celles-ci sont presque toujours fluides, ou quand elles sont concrètes, leur solidité est toujours moindre que celle des huiles extérieures. Cette différence est surtout très-sensible dans quelques arbres ou plantes voisines de la famille des lauriers & de celle des euphorbes. Les semences du *croton sebiferum* présentent ce phénomène d'une manière très-remarquable. On assure que les Chinois tirent parti de cette observation, & qu'ils extraient séparément ces deux huiles concrètes; celle de l'extérieur de la semence leur sert à faire des bougies plus solides & moins fusibles; celle de l'intérieur ne forme que des espèces de chandelles molles & à bas prix. Ces observations justifient, pour faire voir que la structure des organes des végétaux peut conduire à la connoissance de leur nature, & qu'elle est souvent d'accord avec leur composition. Une seule réflexion fera sentir encore davantage ces rapports, & établira la nécessité de les étudier avec plus de soin qu'on ne l'a encore fait. L'organisation des différentes parties végétales est non seulement déterminée par la structure primitive de ces parties; mais elle exige encore une matière semblable, pour que les organes soient continués avec toutes les propriétés

qui les caractérisent. C'est par cette identité que les racines, les tiges, les feuilles, les fleurs, les fruits & les semences d'un végétal se ressemblent toujours dans les individus qui se succèdent & qui perpétuent l'espèce, & que cette ressemblance est égale dans la nature intime & les propriétés chimiques, telles que la saveur, l'odeur, l'action sur l'économie animale, comme dans la forme qu'ils présentent, & qui constitue des caractères botaniques. Il y a donc des rapprochemens essentiels à faire connoître entre la structure des organes des végétaux, & leur composition chimique. On aura de nouvelles preuves de cette vérité, en consultant les articles, BOIS, ÉCORCES, FEUILLES, FLEURS, SEMENCES, RACINES, &c.

AMANDES. (*Pharmacie.*) Voyez AMANDIER.

AMANDÉ. (*Pharmacie.*) Ce mot AMANDÉ est quelquefois employé en pharmacie, ainsi que celui de *lait d'amandes*, comme synonyme d'émulsion, Voyez les mots AMANDE, AMANDIER, EMULSION.

AMANDIER. *Amygdalus communis.*

Les amandes douces & amères proviennent de cet arbre qui naît spontanément parmi les haies de la Mauritanie. Il fait l'objet des soins des cultivateurs de plusieurs provinces méridionales de France & de quelques contrées de l'Europe. L'amande douce relativement à l'art de guérir, est adoucissante, pectorale, apéritive, émolliente & restaurante. Elle convient dans l'atrophie, la phthisie & l'athisie. C'est sur-tout de son huile recente, tirée sans feu, que les malades retirent souvent un grand soulagement de leurs maux. L'huile d'amande douce convient dans les maladies où il faut adoucir l'acrimonie des humeurs, & amollir les fibres endurcies. Elle ôte les ardeurs & supprime l'urine, les douleurs néphrétiques, les coliques, la dysenterie, la pleurésie, les tranchées des femmes après l'accouchement; elle convient aussi aux enfans nouveaux-nés. Cette huile est véritablement une panacée; elle se prend seule, depuis une once jusqu'à quatre, ou jointe avec quelque sirop, ou autre liquide approprié, qu'en lavemens à très-dose. On emploie extérieurement l'huile d'amandes douces, pour résoudre les tumeurs des amygdales, amollir les durcés, & guérir la fêcherie de la peau; elle enlève les taches du visage, qui proviennent de l'ardeur du soleil; mêlée avec l'huile d'œuf, elle peut empêcher les marques de la petite vérole. On fait aussi un lait d'amandes propre dans l'ardeur d'urines, les fièvres ardentes, l'inflammation des reins ou de la vessie, les dysenteries, les hémorrhagies, les insomnies, la maigreur & la fêcherie de poitrine.

— Siryon Pauli dit que les amandes amères sont

détectives, apéritives & vermifuges, qu'elles emportent les obstructions du foie, de la rate & du méfentère, qu'elles modèrent les douleurs du tête, pilées & appliquées en frontal. Jean Bauhin après Marcellus Virgilius, assure que les amandes amères sont un poison mortel pour les chats, & Lutzius dit qu'elles tuent aussi les poules & autres oiseaux. Iluck atteste dans la toxicologie, que les amandes amères sont délétères pour une infinité d'animaux. On prétend qu'elles empêchent l'ivresse. L'on a remarqué que les amandes amères fournissent de l'huile, aussi douce & de même qualité que celle d'amandes douces. Cette huile est propre à détéger l'humour épaissi dans la cavité des oreilles, qui cause souvent les surdités & les tintemens, mais il convient de n'y en pas trop mettre, de peur de causer un relâchement à la membrane du tambour. Nous avons vu souvent réussir l'application de l'huile d'amandes amères contre les maux d'oreille.

Les amandes entrent dans le sirop d'orgeat & autres préparations, tant alimentaires que pharmaceutiques. Les Russes se servent du fruit de l'amandier nain, au lieu des autres amandes. La pellicule brune des amandes est un peu amère & acre, excite la toux, & irrite le gosier; macérée dans de l'esprit-de-vin, elle donne une jolie teinte rougeâtre.

(M. WILLET).

AMANSES. Mot barbare & fastueux, dont certains alchimistes tantaisés se servent, pour dire, *pierres précieuses contrefaites*, ou *pierres artificielles*, ou *fastides*. (ancienne encyclopédie.) (Voyez les mots, VERRE, VITRIFICATION, PIERRES PRÉCIEUSES ARTIFICIELLES.)

AMARANTHE. *Celofia margaritacea*, L. *Amaranthus purpureus*, J. B. 968.

Ne bornons pas notre travail aux plantes les plus utiles, les plus connues. Il faut au contraire qu'à chaque pas, à chaque instant, nous puissions dire, cette plante possède telle propriété contre telle maladie. Compulsons donc jusque parmi les plantes adonides. Il n'en ne laissons échapper aucune occasion, pour donner des détails utiles, & démontrer les qualités des végétaux.

L'amarante est sans contredit plus connue dans les plates bandes des flurilles, que dans les traités des pharmacologues. Elle est originaire de l'Amérique; on l'éleve facilement de graines. Chomel assure que la décoction de ses fleurs est utile dans le crachement de sang & dans les hémorrhagies; ses fleurs sont réputées rafraichissantes & dessicatives; la semence se donne avec succès à un gros, dans toute forte de cours de ventre. C'est ce qu'il a souvent expérimenté. Comme cette plante est infiniment altérante, il y auroit du danger à la faire prendre aux femmes & aux filles, dans le temps des règles, dont elle pourroit

causer la suppression. Des auteurs prétendent que l'*Amaranthus* queue de renard, l'*Amaranthus cruentus* & la sanguineus, ont les mêmes vertus.

(M. WILLEMET.)

AMBER-HAPPI. (*Pharmacie.*) Nom que l'on donne à une espèce d'électuaire composé de musc, de cachou & d'opium. Cet électuaire dont le goût & l'odeur sont agréables, est un calmant doux, dont l'usage est fort recommandé à Constantinople. (Société royale de médecine, année 1778, page 190.)

AMBRE. (*Pharmacie.*) Les anciens pharmacographes ont compris sous cette dénomination deux substances très-différentes par leur nature & leurs propriétés; l'un que l'on a appelé longtemps *ambre jaune* ou *cirin*, est l'espèce de biume que les Grecs nommoient *elétrum*, les Arabes *karab*, & que nous connoissons aujourd'hui sous le nom de **SUCCIN**. Voyez ce mot.

L'autre espèce que l'on appelle plus ordinairement *ambre* ou *ambre gris*, *ambr* des derniers écrivains Grecs; *ambra*, *ambram* des Latins, & quelquefois *ambaca*, comme l'écrivit l'allope, est une substance odorante, dont la nature, les propriétés & les préparations seront exposées dans l'article suivant.

Quelques pharmacographes, amateurs du merveilleux, & intéressés à cacher sous des dénominations singulières les substances les plus simples, ont aussi donné le nom d'*ambre blanc*, *ambra subalbida*, au blanc de baleine. VERNY, dans le catalogue des substances officinales, ajoute que le blanc de baleine a été aussi nommé *holos anthos*; mais ces synonymes vicieux ne peuvent qu'induire en erreur. Il faut cependant les connoître pour la lecture des auteurs anciens, & l'intelligence des formules qu'ils nous ont laissées. Voyez **HOLOS ANTHOS**.

AMBREE. (*Couleur.*) Il est fort singulier que le mot **AMBRE** appartenant réellement qu'à l'*ambre gris*, & n'étant donné que par une fautive comparaison au succin, on le serve cependant de l'expression **COULEUR AMBREE**, pour désigner une nuance jaune particulière, & accompagnée de transparence & analogue à celle du succin. Il seroit donc important de bannir cette dénomination comparative du langage exact de la chimie moderne; d'autant plus que l'expression **COULEUR AMBREE** est prise au propre, pour annoncer un arôme particulier, qui est plus ou moins semblable à celui de l'*ambre gris*, du véritable *ambre*.

AMBREE. (*Odeur.*) Un des caractères les plus marqués de l'*ambre gris* est une odeur aromatique, vive, forte & tenace qui lui appartient en propre. Il paroît que cette odeur forme ce-

pendant un genre d'arôme dans la nature, puisqu'il y a beaucoup de substances la présentent, ou au moins en offrent une analogue dans les opérations de chimie. On sait que le musc a une odeur assez semblable à celle de l'*ambre*. Un grand nombre de plantes labiées se font remarquer par un arôme manifestement rapproché de celui de l'*ambre*. Les laboratoires de chimie, où l'on travaille des matières animales, offrent souvent des occasions de remarquer la même odeur. J'ai vu l'urine épaisse en extrait, les sels d'urine un peu humectés, la bile humaine & celle de bœuf gardée quelque temps, répandre une odeur d'*ambre* si forte, que plusieurs personnes y ont été trompées, & ne pouvoient pas croire à l'origine de ces singuliers parfums. Dans des maladies bilieuses, la sueur a quelquefois ce caractère odorant; la boue de vache offre la même propriété, & en distillant de l'alcool sur cette substance, on prépare une liqueur odorante qu'on nomme *eau de millefleurs*. Sans doute l'analogie frappante des sensations que ce genre d'arôme produit, en indique une dans la nature; sans doute ses principes sont combinés de la même manière, dans les circonstances naturelles ou artificielles; si différentes en apparence. La chimie n'a encore rien d'exact, rien de connu à l'égard de cette formation de l'odeur d'*ambre*. La nature intime de l'arôme n'est pas connue. On doit donc recueillir soigneusement ces faits, & attendre que leur nombre & leur rapprochement suffisent, pour porter une lumière plus éclairante sur ce point. On entrevoit au moins la possibilité d'imiter par l'art un produit odorant, analogue à l'*ambre*.

AMBRE GRIS. L'histoire de l'*ambre gris* appartient autant à la chimie qu'à la minéralogie, qui n'a point encore de faits certains à offrir à cet égard. Il paroît que c'est à tort que les naturalistes ont placé cette substance parmi les bitumes, elle appartient véritablement aux produits résineux & odorans des animaux à mammelles, *mammalia*.

L'*ambre gris* est une matière concrète, d'une consistance molle & tenace comme la cire, ou solide & cassante comme les gommes résines, d'une couleur grise, marquée de taches jaunes ou noires, d'une odeur presque fétide, & qui n'est suave, quoique très-forte, que lorsqu'on divise beaucoup cette matière. Il est en masses irrégulières, quelquefois arrondies, formées par couches de différente nature, & plus ou moins grosses, suivant qu'il s'en est réuni un plus grand nombre. On en a vu des morceaux pesant plus de deux cents livres. Cette substance a été manifestement liquide, puisqu'elle a enveloppé plusieurs matières étrangères qu'on y rencontre, tels que des becs de fêches, des arêtes de poissons, des coquilles fossiles, & d'autres corps marins. On trouve l'*ambre gris* flottant sur les eaux de

de la Louande, dans son histoire imprimée à Lisbonne, en 1760, affirme qu'on avoit disséqué exprès quelques baleines, & qu'on avoit rencontré des morceaux d'ambre dans l'estomac d'une de ces baleines, & d'autres qui commençoient à se ramollir davantage dans les intestins. Tout cela est nouvellement confirmé par le comte de l'Europe, du 11 janvier dernier, qui raconte que le vaisseau le lord Hawkebury, a rapporté dernièrement une baleine dépécée, de laquelle on a tiré, dit-on, quatre cens onces d'ambre gris, & c'est dans l'œsophage de la baleine que cet ambre a été trouvé.

D'ailleurs, si l'ambre étoit un excrément endurci contre nature, comme le veut M. Swédiaur, il ne seroit pas en couches presque toujours horizontales plus ou moins grosses, & quelquelfois même, de diverses natures. M. Bomaro observe que celui de la vente d'Arient, qu'il a examiné, étoit composé de couches, dont la seconde étoit fibreuse, calcareuse & sale. S'il y a quelques morceaux qui ont des taches & des bords de fêles, il y en a aussi beaucoup d'homogènes & sans taches, & même, M. Pelletier a montré, dans une des échantillons de la société d'histoire naturelle de Paris, un morceau, dont l'intérieur contenoit de petites coquilles (1). Il est probable que les morceaux qui contiennent des bords, sont ceux qui avoient été avalés par des baleines; pourquoi ne les rencontre-t-on dans les rivages qu'après les grandes tempêtes? On dira peut-être alors qu'il est rejeté par les vagues & les vents; mais pourquoi les autres excréments durs & consistants de chaque lot ne seroient-ils pas jetés ensemble? & pourquoi sera-ce seulement l'ambre mou, & sans consistance? Il est bon de remarquer aussi que l'ambre gris des côtes est moins coloré que celui qui est tiré des baleines, ce qui paroit devoit être l'inverse, d'après le sentiment de M. Swédiaur, puisque cet ambre a dû être plus long-temps exposé à la chaleur & à la lumière.

L'auteur d'un ancien manuscrit portugais, sur les choses les plus remarquables du Brésil, de l'année 1680, rapporte, qu'un de ses amis, appelé Antonio Gil, lui avoit montré une source marine qui ressoit à découvert, dans la basse-mer, à l'île de Taparica, dans la baie de tous les Saints, où il avoit, disoit-il, vu naître & augmenter peu-à-peu l'ambre entre les rochers qui l'abordoient. — Simonius de Vascocellos, supérieur des jésuites du Brésil, dans l'introduction de la chronique de cette province,

imprimée à Lisbonne en 1710, affirme, qu'à Taparica, on rencontroit de l'ambre gris fœdile. — Or, toutes les observations & autorités ci-dessus rapportées, sont absolument contraires à l'hypothèse du docteur Swédiaur.

Les analyses, quoiqu'imparfaites de Geoffroy, Newman, Grim & Brown, leur ont donné constamment un même acide liquide & concret, de l'huile & du charbon; mais si l'ambre gris étoit un excrément du chachalot, il devroit donner de l'ammoniaque, & d'autres produits de la chimie animale. En vain, M. Swédiaur prétend-il échapper à cette difficulté. On ne peut nier que tous les excréments des animaux mameliferes la donnent de même, parce qu'ils contiennent de l'hydrogène & de l'azote. Or, l'ambre gris n'a pas donné de ce sel aux chimistes cités; il n'est donc pas l'excrément du chachalot, qui est un animal à mamelles. Si M. Swédiaur a fait lui-même, comme il le dit, cette analyse, pourquoi ne nous a-t-il pas informé de son résultat & de la nature de l'acide retiré? Il lui étoit donc échappé, quand les autres chimistes disoient encore lui, une des meilleures preuves de son opinion. Ces chimistes ont dit, que l'acide obtenu de l'ambre étoit congelé de celui qu'on retire des bismes, c'est-à-dire, de l'acide succinique.

Quelques auteurs s'appuient de l'odeur de l'ambre, pour affirmer son origine animale; mais il ne faut pas confondre cette odeur qui se développe par l'action de l'air & de la lumière, & qui augmente même par son ancienneté, avec l'odeur de la bile, dont les calculs sont ronds & en couches concentriques cristallines. On pourroit aussi s'appuyer, pour défendre de quelque manière cette hypothèse, de la remarque de M. Rômé de Lisse, (journal de phys. 1784, vol. II) qui dit que la fœche étoit appelée par les Grecs *elodon*, ou *masphytis* selon Rondelot, & conclure de là que l'ambre, ou au moins sa base odorante, provient de la fœche digérée; mais il est bon d'observer 1°. que cet aperçu, d'après tout ce que je viens d'exposer, n'est pas vraisemblable; 2°. qu'il faut distinguer l'odeur du ruisc & celle de l'ambre 3°. que la fœche donne une couleur très-noire, qui, sans doute, noirciroit tout les morceaux d'ambre gris; 4°. qu'au Brésil, dans les parages où l'on trouve l'ambre, les fœches sont très-rare, & qu'au contraire, elles sont très-abondantes dans d'autres parages fre-

(1) M. Rômé de Lisse, dans le catalogue du cabinet de M. Davila, avoit dit: « Que les prétendus bords d'ambre n'étoient que des bords de fêles, ambrés, qui seroient sortis de ceux qui produisent l'ambre gris ». Mais il n'a pas dit que toutes les taches fussent des bords de fêles. — Penétrons que le docteur Swédiaur, ou sûrement M. de Lisse, s'est fait illusion quand il croit que tous les morceaux d'ambre gris de grande consistance, tirés du ventre des baleines, ou trouvés à la surface des rochers de la mer qu'il avoit examinés, étoient taches, & devoient des taches aux bords de fêles. — Il seroit bien difficile, & même impossible de savoir à Londres, si les morceaux fussent tirés du ventre des baleines, ou trouvés à la surface de la mer, mais il seroit encore à décider si ceux des côtes & prages l'étoient de même d'ailleurs, il y a des morceaux considérables d'ambres sans taches, & d'une seule couleur.

quantités par les cachalots, &c. où cependant on ne trouve pas d'ambre.

Mais quelle est, dira-t-on, la nature & l'origine de l'ambre gris? D'après ce qui vient d'être exposé, & en considérant la propriété qu'a l'ambre gris, d'adhérer au tranchant du couteau quand on le coupe, comme la cire & les bitumes mous, & d'après son inflammabilité & sa fusion en une huile épaisse & noirâtre, il me semble que je puis hasarder de dire que c'est une espèce de bitume sous marin, propre aux climats chauds, qui, étant rejetée par les vagues sur le rivage, s'y endurecit: ce bitume est quelquefois avalé par des cachalots & par d'autres cétacés qui, ne pouvant le digérer, le rejettent plus ou moins altéré avec leurs autres excréments. L'ambre gris que M. Donadei a trouvé sur les rivages de la mer, aux côtes de Guyenne, qui étoit mou & visqueux, & d'une odeur qu'il appelle urineuse très-forte, & qui, au bout d'un certain temps, l'a perdue, & est devenu solide, ne s'oppose point à mon opinion; il est venu des îles du Cap-Vert ou des Canaries, ainsi que les pierres ponces de ces mêmes îles qu'on rencontre sur les côtes de la Gascogne, & qui y ont été jetées par les courans de l'océan & de la méditerranée. — L'analyse complète de cette substance, & les observations plus nombreuses que je me promets de faire au Brésil & aux îles du cap, pourront peut-être mettre cette matière dans toute l'évidence possible.

Malgré ces réflexions, ces observations de M. Dandrada, il est encore loin d'avoir prouvé que l'ambre gris est un bitume analogue au suc cin, au jayet, au charbon de terre, &c. il y a d'un côté trop de différence entre l'ambre gris & ces vrais bitumes, & de l'autre, trop de rapprochement entre les propriétés de l'ambre, & d'un grand nombre de substances animales, odorantes, ou susceptibles de le devenir par des altérations successives, pour adopter l'opinion de M. Dandrada. Il n'est pas si dénué de vraisemblance que cela lui parût au premier coup-d'œil, de penser que la matière même du corps de la sèche à huit pieds, puisse contribuer à la formation de l'ambre. L'opere de la Chine, qu'on assure être fûte avec le suc noir de ce polype, répand une odeur ambrée très-forte. Il y a des variétés d'ambre qui ont une couleur noire & une très-vive odeur; les parfumeurs ne rejettent point cette variété, & elle ressemble à un suc noir épais: on y trouve même des membranes animales.

M. Donadei, après avoir entendu lire les observations de M. Dandrada, m'adressa quelques jours après sur l'ambre qu'on trouve dans le golfe de Gascogne, la note suivante.

L'ambre gris nous étoit seulement connu, comme venant des deux Indes. Dans le journal de physique du mois de mars 1790, j'ai certifié que cette substance appartenait aussi au golfe

de Gascogne. L'existence de l'ambre sur cette côte, m'avoit paru confirmer les recherches de M. Swediaur, par lesquelles il prouve que l'ambre gris est une production animale appartenante au cachalot.

M. Dandrada, dans une des dernières séances de la société, a été d'une opinion contraire; il soupçonne que l'ambre gris est une espèce de bitume, provenant de quelque volcan sous-marin, & par conséquent, il le regarde comme une substance minérale. Si cette opinion est la vraie, le golfe de Gascogne, ne devoit l'ambre gris qu'aux îles Açores. Celles du Cap-Vert & des Canaries, portent, par des courans très-violens, sur les côtes de Barbarie.

Pour décider une question qui occupe depuis si long-temps les naturalistes, il faudroit, comme la société l'a proposé, avoir une analyse bien faite de cette substance, & que les naturalistes qui se trouveroient aux Açores pussent y faire des recherches capables d'éclaircir sur l'opinion de M. Dandrada.

Pour ce qui me concerne, je regarde toujours l'ambre gris comme une substance animale; 1°. par l'odeur urineuse qu'il exhale quand il est fraîchement rejeté sur le rivage; il est alors assez mou & visqueux; 2°. par l'avidité que les oiseaux de mer ont pour cette substance. Ces animaux ne vivent que de poissons.

Les couches horizontales & de diverses nuances que l'on trouve dans divers morceaux d'ambre, ne peuvent être une preuve pour le système de M. Dandrada; au contraire, une substance rejetée dans un fluide plus dense, & qui ne la dissout pas, ne peut que s'agglomérer, & ne peut point se former par couches horizontales. Il n'en est pas de même de notre opinion, où cette substance peut très-bien prendre un accroissement par couches; l'ancienneté de ses couches, les divers parages où l'animal auroit vécu, pourroient être la cause des diverses nuances.

Les coquilles, les bœcs de sèche, & les autres corps que l'on trouve dans l'ambre gris, ne peuvent être que des corps étrangers à la nature, qui s'y sont joints sur le bord du rivage où cette substance, encore molle, est balotée & froissée par la vague.

Enfin, il réunissant les deux opinions, l'ambre gris étoit véritablement un bitume qui étoit sujet de séjourner quelque temps dans le corps d'une baleine, pour acquiescer toutes les qualités que nous lui demandons, notre question seroit bien difficile à résoudre; mais n'est-ce pas trop pousser les conjectures? Je regarderois donc toujours l'ambre gris comme une espèce de bétail, & je desirerois que, dans l'analyse, on pût en séparer la partie jaune qui n'auroit avoir beaucoup de rapport avec la bale, ou être une matière analogue à la meilleure ambre à un fond gris parsemé de petites taches jaunes.

C'est, sans doute à l'analyse chimique seule, qu'il appartient de prononcer sur cet intéressant objet. Les difficultés élevées par rapport aux produits obtenus par Geoffroi, Neumann, Grim, & Brown, qu'ils ont assurément ceux des bitumes, ne doivent point l'emporter sur les idées nouvellement connues d'après les observations modernes, puisque ces analyses peuvent se résister de l'état d'exactitude où étoit, il y a cinquante ans, la pratique & la théorie de la chimie. Il n'y a malheureusement point en depuis cette époque, d'analyse exacte de l'ambre gris, & il n'est pas possible de le conduire, d'après cette analogie qui nous manque encore.

MM. Vauquelin & Bouvier, deux de nos éleveurs les plus instruits & les plus habiles dans les recherches chimiques, viennent de faire une suite d'expériences sur une espèce d'ambre gris qui leur a été remise par M. Macquart; on va voir que, malgré l'exactitude de ce travail, il est bien difficile de prononcer sur l'origine de cette production.

M. Macquart nous a remis un échantillon d'ambre gris de l'espèce ou de la variété connue des naturalistes sous le nom d'ambre noir. (1) Cet ambre est en fragments qui paroissent avoir appartenu à un pain orbiculaire comprimé. On y voit des couches d'épaisseur & de couleur différentes; la surface extérieure est fauve & fort peu épaisse; immédiatement au-dessous, il y a une couche d'environ deux lignes d'épaisseur, d'une couleur grise, bleuâtre; plus profondément est une troisième couche qui paroît moins dense & moins bise que la précédente, & dont la couleur est fort analogue à celle de la couche extérieure. Quelques-unes de ces couches sont distinctes, & comme séparées par une légère lame blanchâtre, collée ou interposée entre ces couches. Cette matière blanche recouvre comme une efflorescence une sorte de plaque ou de membrane sèche, fort mince, de couleur d'écaille brune, transparente, jouissant d'une certaine élasticité, coriace sous les dents, & faisant l'effet d'une matière muqueuse dans la bouche. Dans certains points de la masse de l'ambre dont il est ici question, on voit manifestement des cristaux blancs, isosés; l'odeur de cet ambre est forte & désagréable; on lui a trouvé quelque rapport par cette propriété avec l'urine de jument, & surtout avec les sels qu'on obtient par l'évaporation de cette liqueur.

Sa pesanteur spécifique a paru peu considérable;

un fragment de cette substance, arrondi & bien solide, nageoit à la surface de l'eau.

On a pris 30 parties de cet ambre grossièrement pulvérisé, on les a fait bouillir dans deux onces d'eau distillée pendant 10 minutes; il s'est répandu une odeur moins désagréable que celle de l'ambre solide ou en masse. L'eau a pris une couleur de paille foncée; l'ambre s'est fondu & s'est étendu à la surface de l'eau, à la température de 60 degrés. L'ambre, ainsi fondu, a une couleur brune demi-transparente.

On a filtré la liqueur afin de l'obtenir à part, elle ne verdissoit point le sirop de violettes; on l'a fait évaporer pour obtenir ce qu'elle avoit dissous, elle a donné un produit jaune, pesant près de deux grains, d'une saveur piquante & salée, entremêlé de cristaux qui faisoient effervescence avec l'acide sulfurique, & d'où il se dégagoit des vapeurs d'acide muriatique: la dissolution verdissoit le sirop de violettes.

On a fait bouillir sur le résidu une once d'alcool, il s'en est dissous une grande partie, l'alcool a pris une couleur brune foncée, & il est resté une matière noire grumeleuse, qui ne s'est point dissoute & qu'on a traitée avec une seconde once d'alcool; ce résidu a encore pris une couleur jaune, mais le résidu n'a point été dissous. Après avoir été séché, il pesoit 5 grains, il étoit presque entièrement formé des plaques que nous avons décrites plus haut; mises sur les charbons ardens, elles ont donné une fumée jaune, fétide & ammoniacale.

L'alcool a déposé, en refroidissant, une grande partie de la matière qu'il avoit prise à l'ambre, & qui est beaucoup plus soluble à chaud qu'à froid.

Une portion de ce résidu, ayant été distillée dans une petite cornue, a donné de l'huile rouge extrêmement fétide & absolument semblable à celle des matières animales, & du carbonate d'ammoniaque, très-reconnoissable par son odeur, sa saveur, la volatilité & les propriétés de verdir le sirop de violettes, & de se répandre une fumée blanche par les vapeurs de l'acide muriatique oxygéné.

L'alcool, avec lequel on avoit dissous une portion de l'ambre, a été évaporé à une chaleur douce; il est resté dans la capsule une matière transparente de couleur de miel jaune, qui se fond facilement, qui s'enflamme & brûle avec beaucoup d'activité; à une certaine température elle est ductile & se manie aisément; quand elle com-

(1) L'ambre gris noirâtre le plus connu vient de Nicobar; le plus mauvais, est apporté de Comoriel & du Bengale; l'ambre dont on donne l'analyse, est de moindre qualité que celui qui est en cabans d'huile naturelle du jardin des plantes sous le nom d'ambre noirâtre; il a moins d'odeur, & celle de l'ambre pur n'y est pas sensible. En brûlant le morceau d'ambre donné par M. Macquart, on a trouvé dans son creux un insecte qu'on a pris pour être le scorpion de la couleur noire, la tête courte, noire, pointu au bord relevé, le du milieu de laquelle s'élevait transversalement deux lances. Il est très-commun dans les lieux de sauter, c'est le petit boîtier noir sans cornes; caput, dorsum de Geoffroi fusco nigro, capite elypeato angulato non serrato; clypeo breviter striato (Labb. hist. nat. Insect.).

mence à se fendre, elle s'attache fortement aux corps qui la touchent.

Dans cet état elle a infiniment moins d'odeur que l'ambre entier, mais elle est plus agreable ou plutôt moins désagréable. Il semble d'après cela que ce n'est point dans la partie résineuse que réside la partie aromatique.

On a séparé mécaniquement, & le plus exactement qu'il a été possible, les plaques ou lames brunes, qui se rencontrent dans la substance de l'ambre noir, on en a mis trois grains dans deux onces d'eau distillée, & on a fait bouillir pendant une demi-heure. L'eau est devenue laiteuse & légèrement jaunâtre; pendant l'ébullition, l'odeur d'ambre s'est répandue, les plaques ne se sont point gonflées, leur couleur brune n'a point été altérée, & la transparence a demeuré absolument la même: elles ont acquis une grande élasticité pendant cette opération.

Quelles sont ces substances? Sont-ce des membranes animales ou quelques débris de fucus, si abondans sur certaines plages maritimes? Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elles présentent beaucoup de caractères des matières animales, quoique leur charbon, développé par l'action du feu, ne soit point léger, ce qui les rapprocherait des algues qui ont d'ailleurs tant d'analogies avec les matières animales.

On a extrait quelques portions des cristaux qui étoient à certaines places dans l'ambre, ils faisoient effervescence avec l'acide muriatique, mais ne se dissolvoient pas entièrement; les résidus croquoient sous les dents comme le quartz: on en a fait bouillir une petite portion dans l'eau, cette dissolution n'a fait éprouver aucun changement aux dissolutions de baryte & d'argent. Nous croyons que c'est un mélange de sable & de terre calcaire.

On a mis une portion de la résine d'ambre, obtenue par l'évaporation de la dissolution alcoolique, avec de l'acide muriatique oxygéné. Cet acide a enlevé la couleur brune à la résine de l'ambre, mais il ne l'a point blanchie parfaitement; elle est restée toujours jaunâtre, elle a perdu entièrement son odeur, & l'a fait également perdre à l'acide muriatique oxygéné. Sa consistance ne nous a pas paru avoir changé par cette opération, sa fusibilité est restée à-peu-près la même, elle a conservé une certaine quantité d'acide muriatique entre ses molécules; en la chauffant à la flamme d'une bougie, il s'en échappoit des bulles d'eau vaporisée, qui entraînoient avec elles une portion de résine qui s'enflammoit.

On a pris cent grains d'ambre, on les a traités d'abord avec six onces d'eau bouillante, & ensuite avec une once & demie d'éther bien rectifié; la plus grande partie s'est dissoute; la portion restante étoit noire & grumeleuse. Cependant on n'y appercevoit point de pellicules, comme cela est arrivé par l'alcool.

On a laissé évaporer spontanément à l'air l'éther uni à la partie résineuse de l'ambre; tant que cette évaporation a duré, l'odeur, qui est propre à la matière dont il est question, s'est répandue dans l'atmosphère. L'orsque ce dissolvant a été entièrement volatilisé, l'odeur n'a pas été si forte; elle étoit même beaucoup plus foible que celle de la matière brute, c'est-à-dire, qui n'a subi aucune opération.

On a pris trois parties d'ambre & douze parties d'oxide d'argent, on les a mêlées exactement & on les a mises dans un tube de verre soufflé en boule à son extrémité, & courbé par l'autre, de manière à plonger, par cette dernière extrémité ouverte, sous une cloche pleine de mercure. Cet appareil est le même que celui qui sert à la préparation du gaz hydrogène phosphoré. On a obtenu au commencement de l'opération, & sans le secours d'une grande chaleur, environ 4 pouces cubiques de gaz acide carbonique pur, mais fur la fin de l'opération, le feu ayant été augmenté, il s'est dégagé à-peu-près un ponce & on quart de gaz hydrogène carboné; l'expérience finie, le tube ayant été cassé, on a trouvé dans l'extrémité renflée de l'appareil, une masse d'argent parfaitement réduit & mêlé d'une petite quantité de carbone.

Comme cette expérience n'a pas eu tout le succès qu'on en attendoit, c'est-à-dire, que l'oxide d'argent n'a pas été employé en quantité assez grande pour faire changer d'état aux principes de cette substance résineuse, on l'a répétée une seconde fois avec 30 parties d'oxide d'argent & 3 parties de matière résineuse, & l'on a opéré, comme ci-dessus; avec peu de chaleur, il s'est dégagé 6 à 7 pouces de gaz acide carbonique sans mélange de gaz hydrogène, comme la première fois, mais il y avoit dans la branche horizontale, & la dernière descendante du tube de l'appareil, plusieurs gouttes d'eau bien claires & transparentes: il est resté dans la boule de verre une masse d'argent à l'état métallique, qui pesoit 21 grains.

Cette expérience, répétée sur des proportions de matière plus considérables, seroit, à ce qu'il me paroît, susceptible de faire connoître le rapport des principes de cette résine ou au moins de l'hydrogène & du carbone, qui en sont la base. Il seroit même possible de connoître la quantité d'oxygène qui y seroit contenu, en déterminant exactement celle de l'oxide d'argent. Cette classe d'oxides métalliques, auxquels on n'a peut-être pas assez pensé pour l'analyse des matières végétales, & peut-être aussi des substances animales, seroient sans doute des moyens qui, s'ils ne changeoient pas entièrement l'équilibre des principes des matières organiques, denoieroient au moins des résultats très-approchans de la vérité; puisqu'on emploieroit un instrument, dont la nature, les doses & l'action des principes seroient bien connues.

Trente-six grains d'ambre noir ont été exposés au feu dans un creuset d'argile pure & ouvert dans l'atmosphère; l'ambre s'est bientôt ramolli & fondus à quelques degrés de chaleur de plus, il s'est enflammé, & répandant d'abord une flamme jaune & blanche, & une odeur désagréable. Cette fumée a bientôt cessée de se dégager, & la flamme est devenue claire & brillante, en répandant une odeur analogue à celle du mastic ou de l'oliban qui brûlent, & en déposant du carbone, extrêmement divisé, comme le sont les matières à Foudre desquelles on compare celle qui s'en dégage.

Il n'est resté dans le creuset, après une combustion très-courte, que trois grains & demi de matière blanche, en grains très-distincts & très-durs, puits qu'ils usèrent fortement l'acier le plus trempé & examinés de plus près, on a trouvé qu'ils étoient composés, pour la plus grande partie, de grains de sable & de carbonate calcaire.

On n'y a plus trouvé de traces de carbonate, de soude, ni de sel marin; il est vraisemblable que ces matières ont été volatilisées par l'action de la chaleur, puisque le lavage de l'ambre entier en a fourni par une légère évaporation.

Les propriétés physiques de la matière ambree, les phénomènes qu'elle a présentés pendant son analyse, n'indiquent pas exactement qu'elle soit d'origine animale; elles semblent plutôt annoncer que c'est un composé factice de résines végétales, de pellicules ou membranes animales, & d'une certaine quantité d'extrêmes de quelques quadrupèdes, & sur-tout de cheval, auxquels il doit son odeur, puisque cette odeur s'est trouvée la même que celle des sels & de l'extrait de l'urine de cet animal.

On voit d'après ces détails, qu'on est encore bien loin de connoître la nature intime de l'ambre gris & de déterminer avec précision son origine. La distinction des diverses espèces de ce produit naturel, faite par tous les minéralogistes, & sur-tout la différence des ambres gris & noir, ne sembleroit-elle pas annoncer qu'il est réellement dans des états très-variés, suivant une foule de circonstances qui n'ont point encore été développées? Il n'y a qu'une analyse suivie d'un grand nombre d'ambres différens, & sur-tout de plusieurs échantillons de l'espèce reconnue pour la plus pure, qui puisse faire reconnaître la véritable origine.

On emploie l'ambre gris en médecine comme calmant & anti-spasmodique.

Mais son plus grand usage est de fournir un parfum pour la toilette, on le mêle ordinairement avec le musc, dont il atténue tellement l'odeur, qu'il la rend plus suave & plus supportable; encore ce mélange ne plaît-il pas à tout le monde.

Comme l'ambre gris est très-cher, on le falsifie & on le mêle avec différentes substances: On reconnoît le véritable aux caractères suivans. Suivant tous les auteurs de matière médicale, il

est écailleux, insipide, d'une odeur suave; il se fond sans donner de bulles ni d'écume, lorsqu'on l'expose à la flamme d'une bougie dans une cuiller d'argent. Il nage au-dessus de l'eau; il n'adhère point au fer chaud. Celui qui ne présente pas toutes ces propriétés est alié & impur.

AMBRE GRIS. (*Pharmacie.*) L'ambre gris entre dans beaucoup de préparations pharmaceutiques, voici celles dont le codex de Paris fait le dénombrement, l'eau de miel royale, l'eau de mille fleurs, les poudres d'ambre, de Zell, la thériaque céleste, le baume apoplectique, le baume du commandeur, le baume de vinccguerre, le baume acoustique, les pastilles odorantes, la teinture ou l'essence royale, le sirop de vipère.

L'ambre gris a donné lui-même naissance à plusieurs médicaments; on a cherché à varier sa forme, à exhaler ou modérer ses effets. Les chimistes qui, comme pharmaciens, se sont occupés de cet objet, ont reconnu que l'alcool n'avoit que peu d'action sur lui. Hoffmann qui a particulièrement fait cette remarque, en a conclu que l'ambre gris étoit un bitume. Il est certain qu'en se contentant de le laisser digérer avec l'alcool, on n'a qu'une teinture peu colorée & peu chargée de matière en dissolution. Aussi Hoffmann recommande-t-il d'ajouter de l'alcali fixe pour faire cette préparation. Voici la formule de cet auteur.

Essence d'ambre d'Hoffmann.

24 Ambre gris.

Sel alcali du tartre ana 3ij.

Broyez-les exactement, mettez les dans un matras & verrez par-dessus.

Alcool de rose tartarisé, 3 viij.

Digérez sur un bain de sable jusqu'à ce que l'ambre soit tout-à-fait dissous.

Cette essence est suivant lui, très-propre à fortifier les nerfs; on la donne à trente gouttes.

Le codex de Paris, en imitant la formule d'Hoffmann, la prescrit ainsi.

Teinture ou essence d'ambre.

24 Ambre gris, 3j.

Alcool rectifié de rose, } aa 3 j.

Vin tartarisé.

Faites digérer sur un bain de sable jusqu'à ce que la teinture soit faite.

Lemery, dans son cours de chimie, remarque que la teinture d'ambre gris se congèle dans l'hiver, que la partie congelée est blanche comme de la graisse; il ajoute que l'ambre gris est presque entièrement dissoluble dans l'alcool, & on voit qu'il diffère beaucoup à cet égard de l'opinion de Hoffmann.

La préparation qu'il donne, sous le nom d'essence d'ambre gris, est un alcool huileux & aromatique composé qu'il prescrit de faire avec l'ambre gris, le sucre candi, le musc & la civette; elle n'est point employée.

Ambrmann, dans sa pharmacopée générale, dit : *c'est sous le nom d'essence d'ambre sèche, essentia ambra secca angustanorum corella*, une préparation qui consiste simplement dans un mélange bien pulvérisé d'un gros d'ambre gris, & d'une once de sucre blanc. La dose de ce remède est d'un demi gros.

On emploie beaucoup chez les parfumeurs la quintessence d'ambre qui n'est qu'un alcool ambre, ou le mèle avec de l'eau, & on distille pour avoir l'*am simple ambre*, que l'on mèle avec tous les parfums. Cette eau simple ambree est préparée en distillant cinq pintes d'eau avec une once de la quintessence, on tire quatre pintes d'eau aromatique par la distillation.

AMBRE JAUNE. On a donné ce nom au succin, à cause de sa subtilité & de l'odeur forte qu'il répand, lorsqu'il est chauffé. Il y a cependant une grande différence entre le succin & l'ambre gris ou l'ambre proprement dit, quoique depuis trop long-temps, on les ait confondus dans leur nature & réunis par une dénomination commune sous le genre des bitumes; l'ambre gris n'est point un bitume. (Voyez AMBRE ET SUCCIN.)

AMBRE LIQUIDE. (Pharmacie.) Synonyme employé pour désigner le baume blanc du Pérou, plus connu sous le nom de *liquidambar* ou *copaïve*.

AMBRETTE. *Hibiscus abelmoschus*, *Alcea aegyptia moschata* Pers.

C'est une plante malvacee des Indes, qui produit une semence grosse comme la lentille, réniforme, de couleur brune, d'une odeur de musc & d'ambre, d'un goût tant soit peu amer. On l'appelle *grainé musqué*. Il faut la choisir nouvelle, entière, bien nourrie, d'une odeur assez forte & suave. Les Egyptiens s'en servent intérieurement, pour fortifier le cœur, l'estomac, le cerveau, pour exciter la semence; elle donne une bonne odeur à la bouche, quand on la mâche; mais elle ne convient pas aux personnes sujettes aux vapeurs. Son infusion & sa décoction sont limpides, de couleur jaunâtre. La *graine musquée*, suivant Linnéus, est érythématique. Elle convient donc par conséquent contre les pétéchies, la teigne & les maladies contagieuses. Elle est employée principalement en parfum. Les Arabes mêlent de cette semence en poudre avec le café & le sorbet, pour les aromatiser agréablement. L'ambrette est un nervin par excellence.

(M. WILLEMET.)

AMBOISIE. *Ambrosia maritima*, L. *Ambrosia* Dod. Pempt. 35.

C'est une plante chantée par les poètes & les historiens qui en faisoient la nourriture des dieux; ce qui les rendoit, suivant eux, immortels. L'ambrosie si admirable dans l'antiquité, est au-

jourd'hui tombée dans un discrédit étonnant; exemple frappant de l'instabilité des choses humaines. Cette plante vient en Éurie, dans la Cappadoce, aux endroits maritimes & sablonneux. Plusieurs curieux en culivent dans les jardins où elle naît facilement de graines, étant annuelle. Quant à ses vertus médicales, elle est céphalique, stomachique, emménagogue, antihistérique, tonique, apéitive, particulièrement pour des menaces d'apoplexie. L'ambrosie est encore un excellent vulnéraire, prise en infusion en forme de thé, ou dans le vin. Extérieurement elle est répulsive, résolutive & empêche les fluxions.

(M. WILLEMET.)

AMBROSIAQUE. C'est un mot adopté depuis long-temps en matière médicale & en histoire naturelle, pour désigner les substances qui répandent une odeur analogue à celle de l'ambre. On dit des plantes, des médicaments, des substances ambrosiaques. Il y a un genre de plantes nommé *ambrosia*, dans le *système végétabilium*, de Linnéus. On pourroit employer la même dénomination en chimie, au lieu de celle d'ODEUR AMBRÉE. Voyez ce mot ci-dessus.

AME DE SATURNE. *Anima saturni*, selon quelques alchimistes, est la partie du plomb la plus parfaite, qui tend à la perfection des métaux variés, à laquelle partie est, selon quelques-uns, la partie teignant. (ancienne encyclopédie.) On voit par cette définition donnée dans l'ancienne encyclopédie, qu'en n'oubliant pas les dénominations alchimiques, les auteurs de ces articles avoient grand soin de prendre le style & l'obscurité des alchimistes. On ne retracé ici toutes ces expressions, que pour en faire connoître la valeur & l'inutilité. Sans doute ce qu'on lira sur toute cette nomenclature barbare, extraite avec un travail bien fastidieux des livres sur le grand œuvre, détournera de leurs lectures ceux qui auroient pu être tentés d'en dévorer l'ennui.

AMELANCHIER. *Mespilus amelanchier*, L. *Diospyros*, J. B. 175. Ber. arbrisseau qui croît aux endroits rudes, montagneux & pierreux de la Suisse, de l'Aurric & de la Froyence. Lorsqu'il est jeune, ses rameaux, ses pétioles, ses pédoncules, ses feuilles, sont cotonneuses, mais il perd ce duvet, lorsque le fruit est mûr; ses fleurs rosacées sont blanchâtres & remarquables par leurs pétales allongés & lancéolés; le fruit bleu noirâtre, d'un goût agréable, est comestible; il est stomachal & cordial.

(M. WILLEMET.)

AMER. La saveur amère est très-généralement répandue dans la nature. C'est une des plus fréquentes qu'on rencontre dans les plantes. Le plus

grand nombre des labiées, des syngénètes ou composées, des gentianes, des lauriers, &c., présentent cette saveur dans un degré plus ou moins marqué. Comme les matières qui en sont douées, ont toutes une action à-peu-près égale ou au moins analogue sur l'économie animale, on a pensé que cette propriété dépendoit d'un même principe, d'une même composition chimique. Comme aussi un grand nombre de plantes amères donnent ce caractère à l'alcool qu'elles colorent plus ou moins fortement, on a attribué cette saveur à la résine ou à un principe gommo-résineux, contenu dans ces végétaux. Mais il n'y a rien d'exact & de positif en chimie sur cet objet. On voit des composés salins neutres, tels que le sulfate de potasse, le sulfate de magnésie, les muriates de soude, de chaux, de magnésie, &c., doués d'une saveur amère, très-forte, & assurément leur nature chimique est singulièrement éloignée de celle des extraits, & des extraits résineux, amers, qu'on retire des végétaux. D'un autre côté on connoît beaucoup de résines & d'huiles résineuses, qui n'ont point de saveur amère. Ainsi l'on ne peut pas dire que la saveur amère soit produite par une composition chimique identique, & une égale impression faite sur nos organes par des substances très-différentes, annonce qu'ellene tient pas toujours à une égalité de principes ou de combinaison chimique. (Voyez le dictionnaire de médecine, & le mot **SAVEUR** dans celui-ci.)

AMER, AMERTUME. (*Pharmacie.*) La saveur amère est tellement importante à considérer dans les médicaments, elle a une telle influence sur leurs effets, qu'on a désigné par ce nom plusieurs préparations pharmaceutiques. On a des gouttes amères, des teintures amères, &c., comme on le verra aux mots **GOUTTES**, **ELIXIRS**, **TEINTURES**. La plupart de ces compositions sont toniques, stomachiques, antihelmintiques. L'alcool en fait presque toujours la base. L'absinthe, la coloquinte y entrent quelquefois & déterminent cette amertume.

Souvent aussi, comme cette sensation est extrêmement désagréable pour les malades, on cherche à masquer la saveur amère par différentes substances, & sur-tout par le sucre, le miel, les sirops, les aromates; mais alors on diminue d'autant l'effet des préparations amères.

AMÉTHYSTE. L'améthyste a été regardée comme une pierre gemme, une pierre précieuse; mais elle n'a ni la dureté, ni le brillant éclat de ce genre de composés naturels. Nous ne dirons rien ici des propriétés physiques ou extérieures de cette pierre; cet objet sera traité en détail dans le dictionnaire de minéralogie; nous ne parlerons que de sa nature chimique. Les chimistes n'ont point encore fait une analyse exacte de l'améthyste; mais comme les plus savans miné-

ralogistes la regardent comme un cristal de roche, de couleur violette, il paroît qu'elle est comme cette pierre composée de beaucoup de silice, d'un peu d'alumine & de chaux. Quant à sa matière colorante, il semble qu'elle n'est point due à une substance métallique, puisqu'elle est volatile & fugace au feu, suivant les expériences de M. Darcet. Elle ne se fond point sans addition; elle domie avec le borax un verre blanc. Elle doit être rangée dans la méthode minéralogique, fondée sur les propriétés chimiques, parmi les pierres filices, infusibles & décolorables par le feu, ou parmi les composés de beaucoup de silice, d'un peu d'alumine & de chaux, sans oxide métallique.

AMÉTHYSTE. (*Pharmacie.*) L'améthyste étoit autrefois employée en pharmacie, & faisoit un des cinq fragments précieux. Depuis longtemps, on ne fait plus entrer ce cristal de roche violet dans les préparations pharmaceutiques; on en craint même avec raison la présence, comme celle d'un corps dur, qui par ses angles tranchans & ses pointes acérées, peut blesser les membranes tendues de l'estomac & des intestins. L'améthyste entroit dans plusieurs électuaires précieux, d'où on l'a exclue depuis assez longtemps.

On nommoit autrefois améthystes, *amethysta pharmacia*, des médicaments propres à détruire l'ivresse produits par des liqueurs fermentées; on employoit spécialement dans cet ordre les acides végétaux, & sur-tout le suc de citron & le vinaigre.

AMIANTE. Il n'est personne qui ne connoisse la pierre singulière qu'on nomme amiante, & qui est formée de fibres ou de fillets flexibles, doux, brillans comme de la soie, ou durs, roides & cassans. Sans entrer ici dans sa description, ni dans ses détails d'histoire naturelle, qui appartiennent au dictionnaire de minéralogie, on se contentera d'exposer les phénomènes lumineux que présente l'amiante, & les résultats de l'analyse qui en a été faite. Elle se fond à une grande chaleur, & coule en un verre plus ou moins coloré en vert. Ce verre corrodé les crucibles, ou y adhère fortement suivant l'observation de M. de Saussure. Le borax, le phosphore de soude, & le carbonate de soude l'entraînent promptement en fusion, & en faisant une effervescence. On assure que ce verre se cristallise en filamens. Les acides agissent à la longue sur l'amiante, & la dissolvent en partie. Berghman a fait une analyse exacte de celle de la rarentaise. La cent parties de cette pierre la retrô 64 parties de silice, 18, 6 de magnésie, 6, 9 de chaux, 6 de baryte, 3, 3 d'alumine, &c. 7, 2 de fer. Berghman & Kirwan, ont rangé l'amiante dans le genre des pierres magnétiques. Cependant la grande proportion de silice qu'elle

contient, semble devoir la faire placer dans le genre *Stice*; il est vrai qu'elle n'est point scintillante, & que la magnésie masque singulièrement les propriétés de cette terre.

AMIANTE. (*Pharmac.*) on s'est quelquefois servi de l'amiante comme médicament; on la répandoit sur la peau après l'avoir réduite en poudre, ou plutôt en petites fibrilles dures & roides, pour irriter cet organe, & y rappeler les humeurs détournées à l'aile de l'inflammation & de la demangeaison qu'elle excite; mais on n'a point eu lieu de s'approuver de ce conseil, comme le remarque Spelman; & on a renoncé, d'après cela, à faire entrer l'amiante dans toutes les préparations pharmaceutiques.

AMIDON. L'amidon est à proprement parler la fécule blanche, fine & pure qu'on retire de la farine de froment, ou plutôt des portions de froment passés au moulin & au bluteau, qui ne peuvent pas servir à la préparation du pain, & qu'on vend aux amidonniers sous le nom de *recoupettes* & de *grists*. Mais en chimie le mot amidon a d'un côté, & comme genre, une dénomination bien plus étendue, puisqu'il s'applique également à la matière amillée, retirée des racines tubéreuses de Bryone, de pomme de terre, de pied de veau, d'alphodole, de manihot, &c. &c.; & d'un autre côté une dénomination très-limitée & très-directe, puisque quand il est employé comme espèce, il désigne une matière particulière, seule de son espèce, de sa nature, de sa composition. Tout ce qui est relatif à l'extraction & à la préparation de l'amidon en grand, quoiqu'appartenant à un art chimique, ne sera point traité ici; cet objet fait la matière d'un article particulier du dictionnaire des arts & métiers; on se contentera de remarquer que l'art de l'amidonnier, considéré chimiquement, consiste à diviser, à détruire & à enlever, soit par une fermentation acide, & en partie putride, soit par des lavages & des espèces de précipitations multiples, tout ce qui n'est pas amidon proprement dit, dans les issues de bled qu'on leur livre. La matière glineuse, la substance muco-fuécée, la partie albumineuse qui accompagnent la fécule amillée, se trouvent détruites par la fermentation, & sont enlevées par les lavages fréquents; l'amidon bien séparé, bien atténué, bien purifié, reste au fond des tonneaux. Après ces opérations, on en sépare l'eau, on le dessèche en le cassant & l'exposant à l'étuve & à l'air, on le broie ensuite grossièrement, & on le vend sous cette forme. Ce n'est pas tout-à-fait ainsi qu'on opère dans les laboratoires de chimie, pour obtenir l'amidon, de beaucoup de substances végétales qui le contiennent, & surtout des racines d'arum, de bryone, d'iris, de gayal, de pivoine, d'orchis, des marrons d'inde,

&c. & mais les détails particuliers relatifs à cette extraction de l'amidon en général, seront présentés à l'article *FECULE*. Il ne faut considérer ici que l'amidon en général, il faut en indiquer les propriétés, les caractères généraux, & le résultat de ses combinaisons, afin qu'il soit présent comme un genre bien distinct de matière végétale. On doit même renvoyer tous les détails des expériences qui prouvent ces propriétés aux articles *FECULE* ET *AMIDON*.

L'amidon ou la fécule amillée, de quelque matière végétale qu'elle ait été extraite, est toujours de la même nature, & jouit toujours des mêmes caractères; c'est une substance blanche, sèche, pulvérulente, très-tendre & très-divisée, sans saveur sensible, sans odeur, s'écraçant facilement & se polissant sous le doigt; lorsqu'elle est en masse, douce & crante par la pression, lorsqu'elle est en poussière, sa tenue est telle qu'elle pénètre par-tout, & s'insinue dans tous les tissus. En trouvant ici la série de ces propriétés chimiques, on se rappellera toujours que le détail des expériences qui les prouvent, sera donné au mot *FECULE*. Au feu, l'amidon répand une odeur piquante, agréable, qu'on connoît bien dans le pain brûlé; il donne à la cornue de l'acide pyro-muqueux, peu d'huile, beaucoup de gaz acide carbonique, & laisse un charbon très-volumineux & très-léger. Il se dissout sans se dissoudre dans l'eau froide, & se dissout dans l'eau bouillante, avec laquelle il forme une gelée, une colle légère lorsque cette dissolution refroidit. L'acide sulfurique brûle l'amidon; l'acide nitrique le convertit en acide carbonique & en acide oxalique. Il est mal-traitable par lui-même, & n'éprouve aucune espèce de fermentation; il paroît être un composé d'hydrogène, de carbone, & d'une certaine proportion d'oxygène. Il a beaucoup d'analogie avec les gommes, c'est une espèce de mucilage sec, qui semble être un des derniers & des plus parfaits produits de la végétation; on ne le trouve guère, ou au moins abondant, qu'à la fin du travail annuel dans les différents végétaux; il fait la base des corydons des semences, la plus grande partie du péricarpe des graminées. L'amidon est la nourriture la plus abondante & la plus recherchée d'un grand nombre d'animaux, & sur-tout des insectes; on sait combien d'espèces de dermes, de bruches, de grillottes, de ténébrions, de charançons & de coléoptères en général, mangent les racines tubéreuses, les fœtesses graminées, & même les grains moulus ou réduits en farine. On peut donc regarder l'amidon comme un des plus importants produits que les machines végétales présentent pour le soutien de la vie des animaux. Il paroît être susceptible de passer suivant certaines circonstances, & par des modifications qui tiennent aux combinaisons végétales, à l'état de matière gommeuse, ou de substance sucrée.

(Voyez

(Voyez les mots VÉGÉTAUX, GOMME, MUGILAGE, FERMENTATION, FECULE, FARINE).

AMIDON. (*Pharmacie.*) Voyez les mots FARINE et FECULE, parce que c'est sous ce nom, & dans cet état, que l'amidon est employé en pharmacie.

AMILACÉE. Matière amilacée c'est une dénomination qu'on a donnée à l'amidon; on s'est quelquefois servi de cette dénomination pour distinguer l'espèce d'amidon retiré des racines, &c. d'avec l'amidon proprement dit, qui provient de la farine de froment. (Voyez le mot AMIDON).

AMMI. *Sison ammi, L. ammi cum epit.* 522. C'est dans la grande famille des ombellifères que se trouve l'ammi, plante qui offre une semence menue, connue en médecine pour une des quatre petites semences chaudes, qui, semées dans nos jardins, y végète assez aisément d'année à autre. Son pays natal est le Portugal; elle vient encore à la Pouille, en Égypte, en Crète, en Syrie, en Éthiopie & en Candie. Souvent les marchands drogistes, ainsi que les auteurs de matière médicale, & même la pharmacopée, confondent cette espèce avec l'ammi majeur, & indiquent qu'on peut en faire usage indistinctement. La semence d'ammi pulvérisée, se donne depuis six grains jusqu'à trente; car à plus grande dose, elle pourroit fatiguer l'estomac, en occasionnant des nausées, & même le vomissement; elle est alexipharmique, diurétique, sudorifique, carminative, incisive, contre les fleurs blanches. Simon Pauli, Mathioli, & autres anciens auteurs la prescrivent privativement à toute autre espèce de médicaments pour la stérilité. La semence d'ammi entre dans la thériaque, l'électuaire des baies de laurier, les onguens, les emplâtres, les épithèmes nervins, stomachiques & carminatifs, & même dans les demi-bains, pour les maladies de matrice.

(M. WILLEMET.)

AMMONIAC. (*Gomme*) *Gummi ammoniacum.* C'est une gomme jaunâtre au-dehors, blanche en dedans, d'une odeur désagréable, d'un goût tirant sur l'amer, qui découle d'une plante ombellifère, dont les botanistes n'ont pas encore déterminé l'espèce. La meilleure gomme ammoniac est en belles larmes pures, sèches, cassantes, s'amollissant au feu, se réduisant facilement en poudre blanche; elle est émolliente, pectorale, résolutive, atténuante, emménagogue, apéritive, diurétique, digestive, déobstruative, contre l'asthme, l'hémorrhée, la strangurie, la gonorrhée virulente. On la fait prendre en pilules, depuis quelques grains jusqu'à un scrupule; une potion excellent pour rappeler la respiration des asthmatiques. Tome II.

quies, se prépare avec quatre onces de lait ammoniacal, en triturant dans un mortier de marbre, un gros de gomme ammoniac en poudre, ajoutant peu-à-peu quatre onces d'eau d'hippocrate distillée, ou d'eau vulnétaire simple. L'on emploie la gomme ammoniac à l'extérieur en emplâtre ou en onguent avec beaucoup de succès contre les corps aux pieds, sur d'autres excroissances, & des tumeurs endurcies. Les marchands apportent cette gomme d'Égypte, des déserts d'Afrique, & des environs du fameux temple de Jupiter Ammon.

L'eau dissout la gomme ammoniac, presque en totalité, ou au moins la tient-elle délayée en suspension, sous l'apparence d'une belle émulsion blanche. Elle se dissout dans le vinaigre, c'est pourquoi on se sert de ce menstrue pour la purifier; l'esprit-de-vin est encore un de ses dissolvans. On prépare un esprit & une huile avec la gomme ammoniac, elle entre dans une foule d'onguens & d'emplâtres, dans les pilules balsamiques de Morton, dans celles de Bonivus & autres.

(M. WILLEMET.)

AMMONIAC. (*sel*) Nom ancien du muriate d'ammoniaque. Voyez ce mot.

AMMONIACAL. Le mot ammoniacal est l'adjectif d'ammoniaque; on s'en sert pour désigner les combinaisons, dont l'ammoniaque fait la base, ou les dissolutions dont cette espèce d'alcali paroît être l'agent. C'est ainsi que l'on dit sels neutres ammoniacaux, sulfatés, nitrates, carbonates, phosphates ammoniacaux, ou bien sulfure ammoniacal, savon ammoniacal, oxyde d'argent, oxyde d'or ammoniacal, &c. Cet adjectif est très-utile pour varier le langage de la science, & pour ne pas toujours dire combinaison d'ammoniaque. (Voyez AMMONIAQUE).

AMMONIAQUE. C'est aujourd'hui le nom d'une matière saline très-connue & très-employée en chimie & dans les arts, qu'on y a pendant long-temps nommée alcali volatil, & qui joue un des principaux rôles dans les phénomènes de la nature & de l'art. L'article destiné à cette substance, étant un des plus importants de toute la chimie, il faut le traiter avec toute l'étendue possible. Rappelons d'abord ici que cet article suppose la connoissance exacte des détails donnés au mot ALCALIS. Il est nécessaire de se souvenir que les alcalis forment un genre de sels reconnoissables par leur saveur acre & urinaire, par la propriété de verdir les couleurs bleues végétales, de se combiner aux acides, avec lesquels ils forment des sels neutres, d'agir avec une grande énergie sur les matières végétales & animales. Ces premières notions bien établies, comme elles le sont en détail au mot ALCALIS, il

F E

faut concevoir que l'ammoniaque est la troisième espèce de ce genre de sels, composé de trois espèces, dont la potasse & la soude forment les deux autres. S'il fustoit dans la chimie, comme dans les méthodes d'histoire naturelle, de présenter dans une phrase courte & expressive, les caractères spécifiques des corps qu'on examine, on pourroit caractériser l'ammoniaque par la phrase suivante, *ALCALI AMMONIAQUE*, très-odorant, très-volatil, prenant facilement & conservant à toutes les températures connues la forme de gaz, sous cette forme se dissolvant dans l'eau avec chaleur, la rendant plus légère qu'un pareil volume d'eau distillée, formant les sels neutres ammoniacaux avec les acides, décomposable par la commotion électrique, l'acide nitrique, l'acide muriatique oxygéné & les oxides métalliques, composé de six parties d'azote & d'une partie d'hydrogène, se formant par la putréfaction & la distillation des matières animales. Cet énoncé rappellera à tous ceux qui savent la chimie, les propriétés distinctives véritablement caractéristiques de l'ammoniaque. Il donnera même à ceux qui commencent à étudier cette science, une idée nette de la nature de cette espèce d'alkali & de la différence d'avec les deux autres espèces; mais cette idée générale est bien loin de suffire. Pour faire bien connoître l'ammoniaque, il faut exposer avec soin tous les faits, toutes les expériences qui ont conduit à cette connoissance; il faut en quelque manière commenter la phrase énonciative ou spécifique. Pour remplir cet objet avec la précision & l'exactitude qu'il demande, on présentera dans six paragraphes, 1°. les dénominations variées de l'espèce de sel, qui fait le sujet de cet article, & une esquisse de l'histoire de la science à son égard, 2°. les divers procédés par lesquels on obtient l'ammoniaque, 3°. l'ensemble de ses propriétés chimiques, 4°. sa nature intime ou sa composition, 5°. les circonstances qui favorisent ou arrêtent sa formation, 6°. enfin ses utilités & ses usages.

§. 1. Des dénominations diverses de l'ammoniaque, & des principales époques de l'histoire de la chimie à l'égard de ce sel.

L'ammoniaque n'a pas toujours porté ce nom. Avant 1787, on la nommoit sous le nom d'*alkali volatil*; on y ajoutoit l'épithète de *fluor*, ou de *caustique*, pour designer son état fluide & sa faveur énergique. Antérieurement à cette dernière dénomination, elle avoit été nommée *esprit volatil de sel ammoniac*, *esprit volatil urinaire*, parce qu'on la tiroit de l'urine & du sel ammoniac sous la forme d'un liquide odorant & volatil. Comme on l'obtenoit aussi de beaucoup de matières animales, on lui donnoit souvent des noms qui exprimoient son origine. Ainsi l'on disoit *esprit volatil du crâne humain*, *des chèvres*, de la

corne de cerf, du pied d'élan, de la soie & de la vipère, &c. &c. Mais comme l'urine étoit la matière qui en fournissoit le plus abondamment, on ajoutoit souvent, pour caractériser ces liqueurs, l'expression d'*URINEUX*, *ESPRIT URINEUX* &c. Il y a long-temps qu'on fait dans les préparations pharmaceutiques & dans les procédés de plusieurs arts, que les substances animales donnent par la distillation une liqueur alcaline, verdissant les couleurs bleues, & semblable à celle que fournit l'urine; mais Geoffroy est le premier qui ait reconnu l'existence de ce sel, comme base dans le sel ammoniac, ou muriate ammoniacal. Bientôt l'identité de l'alkali volatil ou de l'esprit de sel ammoniac, avec les esprits urinaires, fournis par les matières animales distillées, fut bien établie parmi les chimistes, & les travaux de Margraf, de Grosse & Duhamel ne laissent plus aucun doute à cet égard. On peut donc rapporter à notre siècle la gloire d'avoir véritablement découvert l'analogie de ce sel avec les alkalis, & l'identité de cette matière dans les produits de toutes les substances animales. Après les chimistes cités ci-dessus, les recherches & les nombreuses expériences des Rouelle, de Macquet, de Bucquet, de MM. Baumé, Sage & d'un grand nombre d'autres savans qui s'occupent sur-tout pour le complément de leurs démonstrations de chimie, des diverses combinaisons salines de l'alkali volatil, étendront singulièrement les connoissances sur les sels neutres ammoniacaux. J'ai fait aussi depuis quinze ans un grand nombre de recherches sur cet objet, & je les ai consignées, soit dans mes élémens de chimie, soit dans les mémoires particuliers, qui ont été insérés dans les différentes collections académiques & périodiques. Ainsi nos connoissances sur les propriétés des composés, dont l'alkali volatil fait partie, ont successivement augmenté depuis quarante ans sur-tout: mais il falloit une nouvelle carrière ouverte aux chimistes, il falloit qu'on eut découvert l'existence & les propriétés des gaz & sur-tout leur influence dans les phénomènes de la nature & des arts, pour acquiescer de nouvelles notions sur la nature intime de l'ammoniaque. Scheele & Bergman ont entrevu la composition de cet alkali; mais ce n'est qu'en 1785 que M. Berthollet a prouvé avec exactitude cette composition, ainsi que la proportion des principes qui la forment. Deux ans après cette époque, en travaillant à réformer la nomenclature chimique, & à chercher des principes, sur lesquels elle pouvoit être solidement établie, nous avons cru pouvoir tirer partie d'une ancienne dénomination déjà employée, pour designer les sels, dont cet alkali volatil faisoit la base. L'Ammonie, contrée fabuleuse de la Lybie, d'où l'on apportoit le sel ammoniac, lui avoit donné son nom. Par une suite bien naturelle, ce premier objet designé avoit fait nommer les ammo-

niacaux tous ceux dans lesquels entroit l'alcali volatil, bafe du fel ammoniac, le premier connu de ces fels ; nous avons donc propofé le mot AMMONIAQUE, qui ne diffère de l'ancien que par fa terminafion féminine, qu'il falloit rendre du même genre que les deux autres efpèces d'alcalis, la POTASSE & la SODE, pour dénommer l'alcali volatil, & cette nomenclature ayant été adoptée aujourd'hui prefque généralement en France, & par un grand nombre de chimiftes étrangers, nous nous faifons un devoir de la fuivre, & de décrire fous ce nom les propriétés de l'efpèce d'alcali nommé autrefois *alcali volatil fluor, alcali volatil cauftique*, &c.

5. II. *Des divers procédés fuivis, ou qu'on peut fuivre, pour obtenir l'ammoniaque.*

Quoique l'ammoniaque foit bien véritablement un produit de la nature, un composé qu'elle forme dans un grand nombre de circonftances, comme on le dira en détail dans le § V, la tendance à l'union, à la combinaison, l'attraction chimique eft fi forte dans ce fel alcali, qu'on ne la trouve que rarement feule, & jamais affez abondamment, ou affez concentrée, pour fe la procurer facilement & en quantité fuffifante aux befoins des arts. On eft donc obligé de la retirer des combinaifons où elle exifte, ou de mettre en jeu les circonftances naturelles où l'on fait qu'elle fe forme, pour en avoir en abondance. On doit ranger dans la première de ces deux claffes de procédés, tous ceux qui confiftent à décomposer les fels ammoniacaux, & fur-tout le muriate ammoniacal par le moyen de la chaux vive. On verra dans l'histoire du genre de ces fels, que la chaux a en général plus d'affinité avec leurs acides, que n'en a l'ammoniaque. Ainfi en les traitant, & fur-tout le muriate d'ammoniaque avec une fois & demie leur poids de chaux vive, dans une cornue à laquelle on adapte un petit ballon tubulé, & les flacons de l'appareil de Woulfe, (Voyez les mots APPAREIL DE WOULFE, DISTILLATION, GAZ), l'ammoniaque fondue en gaz par le calorique qu'elle abforbe, fe dégage & va fe diffoudre dans l'eau diftillée froide, où elle eft portée par les tubes de cet appareil. Il n'eft pas queftion de décrire ici avec exactitude cette opération, qui doit être expofée avec tous fes détails à l'article du muriate d'ammoniaque ; il n'en faut préfenter que le réfultat. C'eft de cette manière qu'on obtient communément l'ammoniaque bien pure, en obfervant toutefois les précautions qui font indiquées à l'article defigné ci-deffus. Mais il ne fuffit pas de connoître & d'avoir pour les ufages des laboratoires de chimie, un feul & unique procédé, pour obtenir l'ammoniaque ; il faut que la fcience déploye ici toutes fes reflources, & offre toutes fes richelfes pour l'utilité. Quoique ce foit du muriate am-

moniacal qu'on extrait prefque toujours l'ammoniaque, parce que ce muriate eft le fel ammoniacal le plus abondant que l'on croiffe, tous les fels ammoniacaux pourroient au befoin fournir de l'ammoniaque, en les diftillant avec la chaux. Ainfi dans le cas où l'on auroit par exemple du fulfate d'ammoniaque plus abondamment que le muriate, comme cela peut avoir lieu dans le voifinage des volcans où plusieurs minéralogiftes affurent qu'il fe forme beaucoup de fulfate d'ammoniaque, on pourroit traiter ce fel avec la chaux, & en obtenir l'ammoniaque pure. Il en eft de même du carbonate d'ammoniaque, qu'on a fi long-temps regardé comme le véritable alcali volatil, & qu'on défignoit feulement par l'épithète de *concret*. Ce fel nommé auffi autrefois fel volatil d'Angleterre, & qui, malgré fa faturafion par l'acide carbonique, eft toujours avec excès d'ammoniaque, toujours odorant, &c. fi l'on n'avoit pas d'autre fel ammoniacal, ou fi on fe le procuroit avec une grande abondance, on pourroit au befoin s'en fervir, en le diftillant avec de la chaux vive, pour avoir l'ammoniaque pure ; il eft vra que le carbonate ammoniacal ou alcali volatil concret eft plus précieux pour plufieurs arts, que l'ammoniaque pure ou l'alcali volatil fluor & cauftique ; mais auffi nous ne parlons en ce moment que de la circonftance où l'on pourroit fe procurer une plus grande quantité de carbonate ammoniacal, que les befoins du commerce ne l'exigeroient, & où il feroit interféfant de préparer de l'ammoniaque pure ou cauftique. Tel feroit le cas de plufieurs manufactures, où l'on travaille des matières animales, dont fouvern on ne tire pas à beaucoup près tout le parti poffible. L'opération dont il eft queftion ici, peut être fur-tout confidérée comme appartenant à la féconde claffe des procédés qui ont été indiqués au commencement de ce paragraphe. Il a été dit qu'on pouvoit, pour fe procurer l'ammoniaque, réunir les circonftances où l'obfervafion a appris qu'il fe formoit une quantité plus ou moins grande de ce fel. Ces circonftances peuvent en général être rapportées à l'entaffement des matières animales, & à la décompofition fpon-tanée de ces matières. Dans toutes les manufactures où l'on traite des matières animales, & fpécialement dans celles où l'on cuit les boyaux, où l'on fait des cordes d'inftuments, les colles, où l'on travaille les os, les cornes, l'écaille, &c. dans les lieux où l'on dépèce les cadavres des animaux morts, on fait qu'on perd une très-grande quantité de ces matières, & que la putréfaction qui s'empare bientôt d'elles, les rend infupportables à tous les habitans voifins de ces lieux. Auffi a-t-on coutume de placer ces atteliers aux extrémités des villes, dans les fauxbourgs & même dans la campagne. A Paris, les boyau-dépices, les manufactures de colles, les atteliers où l'on cuit les iffues d'animaux, pour en retirer

l'huile, sont placés au haut des fauxbourgs-Saint-Martin, Saint-Marcel, à l'île des cygnes, &c. Les lieux où l'on transporte les immondices, les excréments, & sur-tout Montfaucon situé au nord de Paris, offrent des établissemens où l'on dépèce les cadavres des chevaux, au lieu de les laisser pourrir dans des chemins, comme on le faisoit autrefois, ou de les enfouir dans des fosses qu'on nommoit fosses vétérinaires. Il n'y a pas un de ces ateliers, où il ne soit possible d'établir un fourneau & une grande cornue de fer, & où par la distillation on ne puisse obtenir à peu de frais l'ammoniaque ou le carbonate ammoniacal que le feu en développe. Les lumières de la chimie apprennent qu'on pourroit facilement tirer un grand parti de ces dépouilles animales, qu'on laisse trop souvent se pourrir en pure perte. En ramassant ces matières & les arrosant d'une certaine quantité d'eau, on attendroit qu'elles commençassent à se pourrir; on reconnoitroit facilement à l'odeur la production & le dégagement de l'ammoniaque; alors on les introduiroit dans des cornues avec le huitième ou le dixième de leur poids de chaux vive; on adapteroit au bec de ce vaisseau un canal de verre, ou de grès, qui plongeroit jusqu'au fond, dans un grand tonneau rempli d'eau jusqu'aux deux tiers de sa hauteur; on pourroit même, suivant la capacité de la cornue, multiplier les tonneaux en les faisant communiquer par des tubes de verre, ou même de bois, & en formant ainsi une espèce d'appareil de Woulfe, très-commode & très-simple. Cette distillation chargerait l'eau de gaz ammoniac qui s'y dissoudroit; l'huile qui passeroit en même-temps, se rassembleroit au-dessus de l'eau, & on la recueilleroit pour les usages auxquels on la destineroit. L'espèce d'ammoniaque que l'on obtiendrait ainsi seroit à la vérité huileuse & sale, mais on la rectifieroit très-aisément, soit sur le lieu même dans un appareil distillatoire très-simple, soit dans les lieux où le commerce la porteroit. Il seroit possible de tirer également parti des urines dans les endroits où beaucoup d'hommes vivent rassemblés, tels que les collèges, les pensions, les séminaires, les grands ateliers, &c. Autrefois on n'avoit dans les pharmacies qu'un esprit alcalin retiré de l'urine.

Les Anglois ont depuis long-temps des manufactures analogues à celles qui sont indiquées ici pour le traitement des matières animales, & où ils préparent de grandes quantités de *sel volatil* ou carbonate ammoniacal & d'ammoniaque pur ou d'alcali volatil fixe. Chez eux, on ramasse avec soin les os de bœuf, de mouton, de cheval, &c. on les traite dans certains ateliers par l'eau, par la distillation, ou on en extrait par la décoction de l'huile qui sert à brûler & à fabriquer du savon, un bouillon dont on nourrit des animaux domestiques, de l'ammoniaque em-

ployée soit pure, soit combinée à l'acide carbonique & dans l'état de *sel volatil*, soit unie à l'acide muriatique, qu'ils retirent en même-temps du sel marin pour la fabrication du sel ammoniac, ou muriate ammoniacal. Le charbon des os calcinés sert encore en en retirant l'acide phosphorique à préparer avec la soude extraite du sel marin, du phosphate de soude, qui est fort employé comme un purgatif en Angleterre. Pour se borner à ce qui regarde l'ammoniaque qui nous occupe, combien ne perdons-nous pas ici de matériaux qui nous en fourniroient par la distillation; mais c'est assez parler sur cet objet; il suffit de l'avoir présenté sous ce point de vue pour faire naître le goût de ces établissemens utiles, & pour guider dans le travail très-simple qu'il faudroit entreprendre pour avoir ainsi une source abondante d'ammoniaque. On en concevra encore davantage l'utilité, en observant que le sel ammoniac ou muriate d'ammoniaque qu'on emploie pour retirer l'ammoniaque par le moyen de la chaux, coûte trois livres au moins la livre.

On voit que tous les procédés indiqués pour obtenir l'ammoniaque, se réduisent à séparer cette espèce d'alcali en gaz, par l'action de la chaleur, & dans un appareil distillatoire, & à recevoir ce gaz dans l'eau pure & froide qui s'en sature. C'est sur-tout par ce dernier point, que la chimie moderne diffère de l'ancienne; autrefois, on ne connoissoit ni la propriété qu'a l'ammoniaque de se réduire en gaz invariable par le froid, ni la dissolubilité, ou plutôt la propriété coercible de ce gaz par l'eau froide; on distilloit les matières qui fournissoient de l'ammoniaque dans de simples ballons ajustés les uns aux autres; on étoit obligé d'y laisser une tubulure, pour donner issue à l'air, disoit-on; & par cette issue plus de la moitié du produit ammoniacal s'échappoit dans l'air. Aujourd'hui l'on recueille ce gaz dans de l'eau, on n'en perd point dans l'atmosphère, on obtient l'ammoniaque très-pure & très-concentrée. L'appareil de Woulfe a donc rendu à cet égard un grand service à la chimie, en l'éclairant sur la quantité & la nature des produits; aux arts chimiques en leur fournissant des moyens de ne rien perdre & d'obtenir des produits beaucoup plus purs & plus abondans qu'on ne les avoit autrefois. On peut s'en convaincre par rapport à l'ammoniaque, sur-tout en comparant celle qu'on obtient dans les ballons où se condense la portion que l'eau, qui se volatilise en même-temps, peut retenir, & celle qui existe dans les flacons de l'appareil de Woulfe, qu'on emploie pour la recueillir. La première est souvent sale, d'une couleur jaune, & toujours remarquable par une odeur empyréumatique & comme gâchée; la seconde est constamment sous la forme d'un liquide blanc très-transparent, d'une odeur vive, pénétrante; mais pure & nullement mêlée d'huile animale brûlée. Aussi ce procédé est-il aujourd'hui suivi dans

tous les laboratoires de pharmacie & des arts chimiques. (Voyez pour les détails plus exacts de cette opération les mots APPAREIL DE Woulff, DISTILLATION, & MURIATE D'AMMONIAQUE).

§ III. Des propriétés chimiques de l'ammoniac.

L'ammoniac, comme il a déjà été dit, diffère des deux autres espèces d'alcali, la potasse & la soude, par une odeur vive & suffoquante, & par une volatilité singulière. Il en est de ce sel comme des alcalis fixes; on ne le connoissoit pas dans son état de pureté, avant les expériences ingénieuses de MM. Black & Priestley. On regardoit comme tel une espèce de sel neutre, imparfait, solide & cristallisé, qui à quelques-unes des propriétés de l'alcali volatil; mais qui en diffère en ce qu'il est véritablement composé de deux substances salines: le caractère de faire effervescence avec les acides, qu'on attribuoit autrefois à l'alcali volatil, n'appartient qu'à cette espèce de sel neutre, dont nous parlerons à l'article CARBONATE AMMONICAL.

Ce qu'on connoissoit, il y a quelques années, dans les laboratoires de chimie, sous le nom d'*alcali volatil caustique* ou *fluor*, & dans la pharmacie, sous celui d'*esprit volatil de sel ammoniac*, n'est point encore l'ammoniacque pure; elle n'y est que dissoute & concentrée dans l'eau. M. Priestley a prouvé qu'on peut en extraire un gaz permanent, à l'aide d'une douce chaleur, & que l'eau privée de ce gaz perd peu-à-peu les propriétés alcalines; ce fluide aériforme est véritablement l'ammoniacque pure; il est connu sous le nom de gaz ammoniac. C'est ce corps dont il faut examiner les propriétés, pour connoître celles du véritable *alcali volatil*, ainsi que l'a très-bien fait observer Macquer. C'est lui qui doit présenter toutes les propriétés de l'ammoniacque pure, puisque l'ammoniacque liquide est déjà une combinaison d'ammoniacque & d'eau, dans laquelle ces deux corps ont satisfait déjà par leur union une partie de leur force de combinaison, de leur attraction.

Pour obtenir le gaz ammoniac, on met dans une petite cornue ou dans un matras de verre, une certaine quantité d'ammoniacque liquide; on adapte à l'un ou à l'autre de ces vaisseaux un tube ou siphon recourbé, dont l'extrémité plonge dans une cuve pneumatique, remplie de mercure, & doit être reçue sous des cloches de verre pleines du même fluide métallique, & renversées sur la planche percée placée à l'une des extrémités de la cuve. (Voyez CUVE PNEUMATO-CHIMIQUE) On chauffe le fond de la cornue ou du matras avec quelques charbons allumés, ou avec la flamme de l'alcool, en mettant sous l'appareil un petit fourneau portatif, ou une lampe à esprit-de-vin; on laisse sortir par l'extrémité du tube les premières portions de fluide élastique, qui ne sont que l'air du vaisseau & du tube, & on ne

recueille le gaz dans les cloches que quand l'ébullition du liquide est bien établie. Il ne faut pas pousser cette espèce de distillation pneumatique, jusqu'à faire passer l'eau en vapeurs, ou bien il faut prendre un tube qui soit dilaté en boule au milieu de sa longueur; alors on a soin de refroidir la portion dilatée de ce tube, afin d'y condenser l'eau en vapeur, & par ce moyen on se procure du gaz ammoniac très-sec & très-pur.

M. Priestley a donné un autre procédé pour obtenir le gaz ammoniac, & ce dernier est même moins dispendieux que le premier. Il consiste à mettre dans un matras ou une cornue, un mélange d'une partie de sel ammoniac ou muriate d'ammoniacque & de deux parties de chaux vive. En chauffant ce mélange, la chaux se porte sur l'acide muriatique, & rend libre l'ammoniacque qui se dégage sous la forme de gaz; il vient remplir les cloches placées à l'extrémité du tube qui conduit le gaz ammoniac de la cornue ou du matras jusques dans la cuve pneumatique, & à la surface du mercure.

Le gaz ammoniac ressemble à l'air lorsqu'il est contenu dans une cloche; il a la transparence & son élasticité, il est un peu plus léger que lui; lorsqu'on retourne les cloches qui le contiennent, l'air reprend bientôt sa place. Suivant M. Kirwan, un ponce cube d'air atmosphérique, pesant grains 0,46005, un ponce cube de gaz ammoniac, donne 0,2748; son odeur est pénétrante, il a une saveur acre & caustique. Il verdit promptement la couleur bleue des violettes, de la mauve & des raves, mais sans l'altérer comme les alcalis fixes caustiques.

C'est sur cette propriété du gaz ammoniac qu'est fondée une expérience dont le résultat paroît un phénomène extraordinaire aux personnes peu instruites. On met dans le fond d'un petit vase, destiné à porter les fleurs dont on orne les cheminées, les tables, les consoles, &c., un peu de sel ammoniac & de chaux vive. Le gaz ammoniac, qui se dégage lentement de ce mélange en se répandant dans l'air par le col rétréci du vase où les fleurs sont placées, altère la couleur sensible de leurs pétales. Ainsi, la rose, les œillets, les pavs, les giroflées, &c., perdent peu-à-peu leur couleur rose ou rouge, qui se convertit en une nuance verte; le spectateur, qui ne connoît pas la cause de ce phénomène, est étonné de voir ces fleurs vertes, tandis que la nature ne leur donne jamais cette couleur.

Le gaz ammoniac tue les animaux & corrode la peau, lorsqu'elle est exposée quelque temps à son contact. Si l'on fait pendant quelque temps des expériences avec le gaz ammoniac, les doigts deviennent rouges & douloureux.

Quoiqu'il ne puisse pas servir à la combustion, & qu'il éteigne les corps enflammés, il augmente cependant la flamme d'une bougie avant de l'éteindre

il lui donne un volume un peu plus considérable, & elle prend une couleur jaune pâle à son disque, ce qui prouve que le gaz ammoniac est en partie inflammable. On verra par la suite qu'un grand nombre de combinaisons ammoniacales sont combustibles.

Le gaz ammoniac est absorbé par les corps poreux, comme le charbon, l'éponge, &c.

M. l'ricilley a découvert que l'étincelle électrique, tirée dans le gaz ammoniac, rend son volume trois fois plus considérable & en dégage du gaz hydrogène. Quoiqu'on ne connoisse pas encore bien la cause de ce changement, il paroît que l'ammoniaque est décomposée dans cette expérience, & que les deux matières qui la composent, comme on le verra dans le paragraphe suivant, sont séparées & mises dans l'état de fluide élastique, que chacune d'elles est susceptible de prendre.

C'est ainsi que l'électricité agit sur l'eau, les dissolutions de plusieurs acides, &c.; elle décompose ces corps & en dégage les principes sous forme de gaz; on dirait qu'en rompant le lien qui les unit, elle fournit une quantité considérable de calorique & peut-être de lumière condensés, qui fondent tout-à-coup ces principes jusqu'à l'état de gaz. Au reste, on reviendra sur cet objet, entièrement nouveau en chimie, à l'article ÉLECTRICITÉ.

Le gaz ammoniac est un de ces fluides que la chaleur dilate le plus; cette propriété est une des causes fréquentes des détonations & fulminations qui produisent les composés ammoniacaux.

L'air atmosphérique ne se combine point avec ce gaz, il ne fait que l'étendre & le diviser. On n'a point examiné l'action de l'air vital sur ce fluide élastique. Il est vraisemblable qu'à une température donnée le gaz ammoniac est décomposé par l'air vital, & qu'il se forme de l'eau par l'union de l'hydrogène avec l'oxygène atmosphérique; aucune expérience ne prouve encore directement cette décomposition.

L'eau absorbe promptement le gaz ammoniac & le condense. Si elle est dans l'état de glace, celle-ci se fond sur le champ; on voit la glace remonter rapidement dans les cloches pleines de ce gaz au-dessus du mercure; en même temps la glace devient fluide, il se produit du froid dans cette expérience, tandis que le gaz ammoniac s'échauffe avec l'eau fluide.

Ces différents résultats sont faciles à expliquer. La glace, par son attraction pour l'ammoniaque, l'absorbe tout-à-coup; le calorique, qui abandonne cet alcali dès qu'il devient liquide, est absorbé en même temps par la glace, qui elle-même prend la forme liquide. Ainsi la combinaison d'ammoniaque & d'eau, tient plus de calorique fixe que la glace à 0. Mais elle ne peut en retenir qu'une certaine proportion; aussi lorsqu'on reçoit du gaz ammoniac dans de l'eau à 8 ou 10 degrés

de température, à mesure que l'ammoniaque se combine en le conduisant dans l'eau, le calorique qui se dégage du premier de ces corps devient libre, parce qu'il ne peut rester uni au composé des deux, à l'ammoniaque liquide, & l'eau dans laquelle passe le gaz s'échauffe. C'est ce qu'on remarque dans la préparation de l'ammoniaque liquide; les bulles de gaz qu'on voit au fond de l'eau disparaissent avant d'arriver au haut de ce liquide, parce qu'elles s'y unissent & partagent la liquidité. Lorsque l'eau en est saturée, les bulles la traversent alors sans s'y combiner, & on les voit crever à la surface du liquide. Cela est si constant, que lorsqu'on a mis plusieurs bouteilles de Woulfe les unes après les autres, la première, après s'être échauffée & avoir absorbé tout le gaz qu'elle peut dissoudre, présente une forte ébullition, due au gaz ammoniacal qui la traverse sans s'y dissoudre; la seconde s'échauffe bientôt à mesure que la première se refroidit; les bulles qui y arrivent s'y dissolvent, & une fois saturée à son tour, c'est la troisième qui présente les phénomènes indiqués. Ainsi l'eau qui se combine avec l'ammoniaque en dégage le calorique qui tenoit cet alcali en état de gaz, & elle est la cause de la chaleur qui se développe pendant cette combinaison.

L'eau saturée du gaz ammoniac ou l'ammoniaque liquide, est ce qu'on connoît dans les laboratoires sous le nom d'*alcali volatil fluor*, ou d'*alcali volatil caustique*. On a déjà dit que c'est en recevant ce gaz dans de l'eau distillée, & en en saturant ce liquide, que l'on prépare l'ammoniaque la plus pure & la plus concentrée.

Le gaz ammoniac n'a point d'action sensible sur les terres, ni sur les substances salino-terreuses. Il en a une très-vive sur les acides, & sur-tout sur les acides gazeux auxquels il s'unit avec une grande rapidité, & avec lesquels il forme des sels neutres. Il décompose les sels neutres alumineux & magnésiens. Il s'unit au soufre lorsqu'il le rencontre en vapeur, & il forme un sulfure ammoniacal, qu'on a nommé liqueur fumante de Boyle. Voyez ce mot, ainsi que l'article SOUFRE.

L'action du gaz ammoniac sur les matières métalliques, n'a encore été que peu examinée; on sait cependant qu'il convertit la surface du cuivre en un oxide vert-bleu, ainsi que plusieurs autres métaux; & comme ce n'est point à l'ammoniaque elle-même contenue dans le gaz ammoniac, qu'on peut attribuer cette propriété, ou a pensé avec raison que c'étoit à l'eau dissoute dans ce gaz qu'elle devoit être due. En effet, c'est une chose très-commune & très-bien prouvée aujourd'hui, que tous les gaz tiennent plus ou moins d'eau en dissolution; c'est sur-tout dans les gaz salins que cette eau vaporisée & partageant leur état fluide élastique doit être en plus grande quantité. On verra d'ailleurs dans un instant que l'ammoniaque liquide produit plusieurs effets qui ne sont dus

qu'à la présence de l'eau, tels sur-tout que des espèces de combustion & d'oxidation.

Le gaz ammoniac agit très-rapidement sur la plupart des oxides métalliques, & sur-tout sur ceux de mercure, de plomb, de cuivre, d'argent, d'or & de platine. Son action générale se fait remarquer par la décomposition de ces oxides & par leur rapprochement de l'état métallique. Il éprouve lui-même une décomposition, il se forme de l'eau & quelquefois de l'acide nitrique dans ces expériences. Tout cela sera expliqué dans le paragraphe suivant, où l'on s'occupera de la nature intime de l'ammoniac. Il est de même facile de concevoir, d'après cette première action connue, comment le gaz ammoniac se comporte avec les dissolutions métalliques, qu'en général il décompose, & dont il rapproche les oxides de l'état métallique à mesure qu'il les précipite. Souvent aussi l'ammoniac, précipité du gaz par le contact des dissolutions métalliques, ne décompose qu'en partie ces dissolutions, & se forme, avec une de leurs portions des sels triples à double base métallique & ammoniacale. (Voyez l'article TRI-SULES & MERCURE.)

Le gaz ammoniac n'a en général que peu d'action sur les matières végétales; il est cependant absorbé par les huiles qu'il rapproche de l'état savonneux & par l'alcool, avec lequel il se combine sans décomposition. Il y a peu de combinaisons connues entre ce gaz & les matières animales; il paroît seulement en retarder la décomposition spontanée ou la putréfaction, au lieu de l'accélérer, comme on l'avoit pensé autrefois, d'après des expériences illusoires.

Dans toutes les actions ou les combinaisons du gaz ammoniac, dont il vient d'être question, on voit en général ce gaz perdre la forme de fluide élastique, se fixer, partager la liquidité de certaines substances, & la solidité de quelques-unes; cette fixation, cette condensation ne peut pas avoir lieu sans qu'il se dégage une quantité plus ou moins grande de calorique, suivant la dose de ce corps que peut retenir le nouveau composé qui résulte de cette fixation de l'ammoniac. Telle est quelquefois la quantité de calorique dégagée dans ces combinaisons, que les matières s'échauffent au point de prendre presque feu, & que quelques-unes même présentent de la flamme, comme, par exemple, la combinaison du gaz ammoniac avec le gaz acide muriatique oxigéné; mais dans ce cas, l'ammoniac est décomposée & ne reste point dans son état d'ammoniac ou d'alcali.

Si l'on considère ensuite les propriétés de ce sel dans l'état liquide, c'est-à-dire, de l'eau saturée de gaz ammoniac, qui forme l'alcali volatil multiple des laboratoires, & que nous désignons par le simple nom d'ammoniac, parce que c'est sous cette forme que cette espèce de sel est conservée & presque toujours employée dans les laboratoires de chimie, on y reconnoît, en général les mêmes

propriétés, excepté qu'elles sont en général dans un degré plus marqué; mais de ce que l'ammoniac unie ici à l'eau semble avoir déjà satisfait une partie de sa tendance à la combinaison, il ne faut point en conclure trop généralement que cet alcali volatil liquide n'a pas la même action, la même énergie sous cette forme que dans l'état de gaz. L'expérience montre que souvent cette énergie est plus grande dans l'ammoniac que dans le gaz ammoniac. Quelques réflexions feront connoître la cause de ce phénomène. D'abord si l'on trouve, par le raisonnement que l'eau, en absorbant le gaz ammoniac, a dû épuiser une partie de son attraction par sa combinaison même, pourquoi ne regarderoit-on pas l'union de ce sel avec le calorique, qui le met dans l'état de gaz, comme employant de même une portion de sa force combinatoire, de son attraction? On connoît plusieurs corps gazeux qui s'unissent moins bien sous cette forme que dans l'état liquide; ainsi quoiqu'il soit très-vrai en général que plus l'aggrégation est faible dans les corps & plus leur force de combinaison est grande, il existe beaucoup de circonstances où la fusion des corps dans le calorique s'oppose à leur combinaison avec d'autres corps, par la force qui les tient dans cet état de dissolution aëroforme. L'ammoniac combinée avec l'eau y est beaucoup plus condensée, beaucoup plus saline en quelque sorte que dans l'état de gaz, & comme les matières salines agissent souvent d'autant plus qu'elles sont plus concentrées, sur une foule de substances, la forme liquide favorise cette action dans l'ammoniac, enfin l'eau elle-même exerce son attraction en même-temps que l'ammoniac, sur beaucoup de corps, & c'est encore là une des causes de la grande action que présente l'ammoniac liquide, comparativement à celle qu'offre le gaz ammoniac. D'après ces réflexions générales, on conçoit qu'il est nécessaire de parler des propriétés chimiques de l'ammoniac liquide, après avoir exposé celle du gaz ammoniac, & d'insister sur-tout sur les différences que cet état fait naître dans ses actions sur les corps.

L'ammoniac liquide, contenue, comme il a été dit dans les flacons d'un laboratoire, est blanche, sans couleur, semblable à de l'eau; mais sa pesanteur est moins grande que celle de l'eau distillée. Suivant les expériences de M. Berillon, l'eau distillée pesant 10,000, l'ammoniac ne pèse que 8,970, de sorte qu'un ponce cube de ce liquide pèse quatre gros quarante-sept grains, & un pied cube soixante-deux livres, douze onces, cinq gros, neuf grains. Mais je pense que M. Berillon ne s'est pas procuré l'ammoniac la plus forte & la plus concentrée, dont l'estime le poids à très-peu plus que 8,000, l'eau donnant 10,000. L'odeur vive que nous avons déjà indiquée dans ce liquide, dépend de ce que l'ammoniac tend sans cesse à se dégager de l'eau, & de ce que la portion qui s'en dégage vient frapper les nerfs

des fosses nasales. Cette tendance à se dégager de l'eau est d'autant plus forte, que la chaleur de l'air environnant est plus forte & que la pression de l'atmosphère est moins grande; aussi, lorsqu'on transporte l'ammoniacque sur des lieux élevés, sur des montagnes, elle perd beaucoup de sa force à mesure qu'il s'en dissipe plus de gaz ammoniac par la soustraction d'une partie de la colonne atmosphérique. Ainsi l'on voit bouillir & s'élever en gaz l'ammoniacque mise sous un récipient où l'on fait le vide.

La lumière n'agit point sensiblement, ou au moins d'une manière connue, sur l'ammoniacque.

La chaleur décompose ce liquide & sépare l'ammoniacque en gaz d'avec l'eau; c'est, comme on l'a dit ci-dessus, un des moyens de se procurer le gaz ammoniac; lorsqu'on chauffe l'ammoniacque dans des vaisseaux ouverts, elle bout beaucoup plus vite que l'eau; telle est la raison pour laquelle on a nommé cette espèce d'alcali, *alcali volatil*.

Laisse à l'air, l'ammoniacque perd peu à peu sa force par la volatilisation qui s'en opère par l'air; elle absorbe aussi l'acide carbonique atmosphérique, & par ces deux causes change peu à peu de nature, puisqu'elle est moins alcaline & mêlée de carbonate d'ammoniacque au bout d'un certain temps.

L'ammoniacque s'unit en toutes proportions à l'eau distillée, qui, en la délayant, en diminue l'activité; il faut cependant que la quantité soit bien petite dans de l'eau, pour que celle-ci ne présente pas la faveur désagréable de l'ammoniacque & la propriété de colorer en vert le papier de mauve, &c. Une goutte mise dans quatre onces d'eau, & formant moins d'un deux millièmes du total, suffit encore pour verdir ce papier très-sensible. Ainsi l'on a de l'ammoniacque de toutes les forces en y ajoutant plus ou moins d'eau.

En s'unissant aux acides liquides comme elle, l'ammoniacque dégage une quantité plus ou moins grande de chaleur; elle est souvent si considérable, si ce sont des acides concentrés, qu'il y a de l'eau réduite en vapeur; cette évaporation, trop rapide, forme même quelquefois une détonation, une explosion violente. Il se dégage pendant cette combinaison une odeur grasse, particulière & distincte; & les liquides entrent en une espèce d'ébullition ou d'effervescence, à cause du gaz ammoniac qui s'en élève par la chaleur.

C'est de l'ammoniacque ordinaire ou liquide qu'on se sert dans les laboratoires pour décomposer les sels alumineux & magnésiens; on observe qu'il n'y a qu'une portion de ces sels décomposée; l'autre forme des sels triples ammoniaco-alumineux ou magnésiens, qui restent ordinairement en dissolution dans les liqueurs.

Dans son état liquide, elle n'a nulle action sur le soufre, ni plus que sur les sulfures métalliques.

L'ammoniacque agit mieux sur les substances mé-

tailliques que ne le fait le gaz ammoniac, en raison de l'eau qui lui est unie & qui se décompose souvent de manière à opérer plus ou moins promptement l'oxidation de ces substances; c'est pour cela que le fer & le zinc, sur-tout laissés en digestion avec l'ammoniacque liquide, offrent une effervescence due au dégagement de gaz hydrogène, & qui a été observée par Lavoisier. Lorsque cette effervescence a eu lieu pendant quelque temps, une partie du zinc & du fer est oxidée & reste dissoute dans l'ammoniacque.

Un effet contraire a souvent lieu quand on verse de l'ammoniacque dans des dissolutions métalliques; les oxides se décomposent en partie, ainsi que l'ammoniacque, comme il a déjà été dit ci-dessus, dans l'histoire du gaz ammoniac; cette décomposition ne mérite quelque considération de plus, que parce qu'on l'opère plus souvent avec l'ammoniacque liquide que par le gaz lui-même. Il en sera question dans le paragraphe suivant avec plus de détail, parce que ce genre d'opérations est un de ceux qui a conduit les chimistes modernes à la connoissance des principes de l'ammoniacque.

Il n'y a que très-peu de combinaisons connues entre l'ammoniacque liquide & les matières végétales & animales; elle parait dissoudre les matières extractives, se combiner avec l'arome, s'unir facilement aux huiles volatiles & aux résines, former avec l'alcool & avec l'éther, des espèces de composés peu connus, dissoudre les substances animales de la putréfaction, dissoudre avec énergie les matières albumineuses & caseuses, épaissies ou coagulées.

§. V. De la nature intime de l'ammoniacque, des principes qui entrent dans sa composition, & des différens procédés par lesquels elle se décompose.

C'est un des points les plus intéressans de la chimie moderne, que l'ensemble des expériences & des découvertes que l'on a faites depuis quelques années sur la décomposition de l'ammoniacque. Les chimistes croyoient jusqu'à cette époque que l'alcali volatil étoit formé par l'alcali fixe, uni à une matière grasse. Suivant eux, toutes les fois qu'on chauffoit un alcali fixe avec une huile, il se formoit de l'alcali volatil, & ils ne voyoient dans celui-ci que l'union simple du premier alcali & de l'huile. Mais il n'y avoit qu'une idée vague dans ce simple énoncé, & beaucoup d'expériences où l'on croyoit qu'il se produisoit de l'alcali volatil, ne présentoient que des produits qui avoient entraîné dans leur volatilisation une certaine quantité d'alcali fixe. Scheele & Bergman ont commencé à répandre quelques lumières sur cet objet, jusques-là très-incertain. C'est sur-tout par les phénomènes de la fulmination de l'or fulminant, que le dernier chimiste cité a été conduit à croire qu'il entroit dans la composition de l'ammoniacque une matière combustible & un gaz particu-

hier. M. Priestley s'aperçut aussi qu'on changeoit le gaz ammoniac en gaz inflammable par l'étincelle électrique. Enfin M. Berthollet parvint, en réunissant toutes ces notions, & en faisant une suite de belles expériences sur les combinaisons ammoniacales, à faire voir que l'ammoniaque se décomposoit dans beaucoup de cas, qu'elle étoit formée par la combinaison de l'hydrogène, ou du gaz inflammable de la base, & de l'azote ou de la base du gaz azote atmosphérique, de la *moëuse* athmosphérique. Tous les faits que M. Berthollet a observés & réunis sur cette décomposition, sont si intéressans & si propres à compléter & à éclairer l'histoire des propriétés de l'ammoniaque, qu'il me paroît nécessaire de consigner ici tout entier le mémoire qu'il a inséré parmi ceux de l'Académie pour l'année 1785, en n'y faisant que les légers changemens que la nomenclature & la marche de la science, perfectionnée depuis cette époque, rendent indispensables.

Plusieurs chimistes, dit M. Berthollet, ont pensé que l'ammoniaque devoit son origine à l'alcali fixe, & la plupart ont admis une matière inflammable dans sa composition. M. Priestley, qui nous a appris à donner une forme gazeuse à l'ammoniaque, a remarqué que le gaz ammoniacal aggrandissoit les lumières qu'on y plongeait avant de les éteindre, & il l'a regardé comme inflammable.

Il a fait plusieurs explosions électriques dans le gaz ammoniac, il en a dégagé un gaz qui ne s'est plus laissé absorber par l'eau, mais qui s'est trouvé inflammable. M. Van-Marum a aussi réduit le gaz ammoniac en gaz inflammable. (Description d'une grande machine électrique, &c., page 128.) D'un autre côté, Schéele a observé que l'ammoniaque se décompose, lorsqu'on la tient long-temps en digestion avec l'acide nitrique & l'oxide de manganèse, ou lorsqu'on distille le muriate ammoniacal avec cet oxide métallique. (Dissertation sur la manganèse, page 94.) Il remarque de plus, que l'ammoniaque est décomposée par l'oxide d'or, celui de mercure & d'autres métaux; il a retiré, dans ces différentes décompositions, un gaz *phlogistique*, sans déterminer si ce gaz est un produit de l'opération ou s'il existoit auparavant dans l'ammoniaque. « En général, dit-il, toutes les fois qu'un corps attire le *phlogistique* de l'ammoniaque, l'une de ses parties constituantes, on obtient toujours une espèce d'air. (Traité chimique de l'air & du feu, page 202 & suiv.) Bergman conclut, de ses propres expériences sur l'fulminant, & de celles de Schéele, qu'on vient de rapporter, que l'ammoniaque contient du *phlogistique*, & que, lorsque ce principe lui est ôté par une attraction supérieure, il s'en dégage un *fluide élastique* d'une nature particulière, qui consiste probablement, l'un par la décomposition de l'ammoniaque. M. Kirwan dit patellement, dans ses notes sur

Chimie. Tome II.

le Traité de l'air & du feu de Schéele, que l'oxide d'or enlève le *phlogistique* à l'ammoniaque, & qu'il se forme subitement une sorte d'air, qui, en vertu de ses propriétés découvertes par Schéele, est un air *phlogistique*.

En considérant les différentes expériences & les opinions dont je viens de présenter ici un précis, j'ai espéré que je pourrais parvenir à une connoissance plus exacte de la nature de l'ammoniaque, & que je pourrais, par ce moyen, répandre du jour sur plusieurs opérations de la nature dans lesquelles elle se forme ou se détruit.

J'ai cherché premièrement à déterminer les produits qu'on obtient du nitrate ammoniacal, lorsqu'il se décompose par l'action de la chaleur. J'ai mis pour cet objet deux onces de nitrate ammoniacal séché avec soin, dans une petite cornue de verre, à laquelle étoit adapté un tube recourbé qui s'ouvroit au fond d'un flacon; un autre tube recourbé établisoit une communication entre ce premier flacon & un second, au fond duquel il plongeait également; enfin de ce dernier flacon partoit un tube qui se rendoit à un appareil hydro-pneumatique, les deux flacons étoient vides & environnés de glace. J'ai distillé à un feu bien ménagé, il est resté dans la cornue un gros de nitrate ammoniacal non décomposé, & les deux flacons contenoient une once quarante-trois grains de liqueur. Pendant toute l'opération, il s'est dégagé une grande quantité de ce gaz singulier, qui a la propriété de se dissoudre dans l'eau, sans lui communiquer les propriétés acides, & dans lequel cependant une bougie brûle presque comme dans l'air vital pur. M. Priestley a retiré un gaz semblable dans plusieurs circonstances, & il l'appelle *air nitreux déphlogistique*; il me paroît qu'effectivement on doit le regarder comme un gaz nitreux qui contient un peu plus d'air vital qu'il n'ordinaire.

J'ai distillé, au bain-marie la liqueur obtenue dans l'opération précédente, & qui présentait des indices d'une acidité assez forte; un flacon qui servoit de récipient étoit enveloppé d'un linge mouillé qu'on renouvelloit de temps en temps; il est resté dans la cornue 4 gros 32 grains de nitrate ammoniacal, qui avoit été volatilisé sans se décomposer dans la première distillation. J'ai saturé de potasse la liqueur qui étoit passée dans le flacon; il ne s'est point dégagé d'odeur d'ammoniaque dans cette saturation. Enfin j'ai fait évaporer au bain-marie la liqueur que je venois de saturer; j'en ai obtenu de l'eau parfaitement pure, semblable à de l'eau distillée, & il est resté dans la cornue 54 grains de nitrate de potasse. Ces 54 grains de nitre doivent contenir, selon l'évaluation de Bergman, à-peu-près 27 grains d'alcali, 9 grains d'eau & 18 grains d'acide pur. Voici donc les produits de cette opération, dans

Gg

laquelle on a employé deux onces de nitrate ammoniacal, dont un gros est resté dans la cornue.

once gros grains.

Liquueur contenue dans les flacons.....	1	"	43
Nitre ammoniacal contenu dans cette liquueur.....	"	4	32
Acide nitreux contenu dans la même liquueur.....	"	"	18
Et par conséquent eau formée.....	"	3	65

De sorte que dans cette opération, il s'est décomposé 1 once 2 gros 40 grains de nitrate ammoniacal, & il en est résulté 3 gros 65 grains d'eau.

Il y auroit peut-être une petite déduction à faire, à cause de l'eau de cristallisation du nitrate ammoniacal décomposé, quoiqu'il eût été fortement desséché; mais mon intention est principalement de prouver qu'il s'est formé de l'eau, & non de donner le calcul précédent comme rigoureux; il s'est fait d'ailleurs quelque perte d'eau dans l'opération, de sorte que la quantité de celle qui a été formée, est probablement plus grande que je ne l'ai indiquée.

Les expériences qu'on a faites sur la composition de l'eau, prouvent que l'eau est formée d'environ 6 parties en poids d'oxygène & d'une partie d'hydrogène, & celles qu'on a faites sur la nature de l'acide nitrique, prouvent que cet acide contient environ 0,7 d'air vital. Il faut donc que l'ammoniaque ait donné dans l'expérience précédente, 40 grains 1 septième d'hydrogène, pour former l'eau avec l'oxygène de l'acide nitrique. Donc la base du gaz inflammable de l'eau ou l'hydrogène, est une partie constituante de l'ammoniaque.

Ces expériences que j'avois faites conjointement avec M. de la Place, m'éclairèrent sur un phénomène que me présentait l'acide muriatique oxygéné. Je savais déjà que cette substance étoit due à l'union de l'acide muriatique & de l'oxygène, qu'elle ne se combinait pas directement avec les alcalis fixes & avec les terres absorbantes, & qu'elle n'en chassait pas l'acide carbonique. Cependant, lorsque j'éprouvai cet acide avec le carbonate ammoniacal, & même avec l'ammoniaque, j'observai qu'il faisoit effervescence, & qu'il perdoit à l'instant les propriétés qui le caractérisoient. J'attribuai ces phénomènes à la formation instantanée de l'eau par l'hydrogène, que je savais exister dans l'ammoniaque, & par l'oxygène uni à l'acide muriatique, pareille à celle qui a lieu dans l'expérience précédente. Je conjecturai que le gaz qui occasionnoit l'effervescence avec l'ammoniaque, & que je séparai de l'acide carbonique, après l'effervescence produite par le carbonate d'ammoniaque, étoit l'autre principe qui formoit l'ammoniaque par la combinaison

avec l'hydrogène. J'ai déjà dit d'ailleurs, en annonçant les produits de l'ammoniaque. « L'acide muriatique oxygéné se conduit tout autrement avec l'ammoniaque qu'avec l'alcali fixe. L'effervescence a lieu, même lorsque l'ammoniaque est caustique, parce qu'il se produit un gaz particulier, mais elle est moins considérable. Le sel, ammoniac, qui résulte immédiatement, n'altère pas les couleurs, & est semblable au sel ammoniac ordinaire; mais cette différence de l'ammoniaque avec l'alcali fixe, dépend d'une combinaison qui se forme dans l'instant entre l'ammoniaque & l'air vital : combinaison qui a également lieu dans d'autres circonstances, comme je ne tarderai pas à le faire connoître.

Le gaz obtenu par le mélange de l'ammoniaque & de l'acide muriatique oxygéné, m'avoit présenté toutes les propriétés négatives, qui caractérisent l'air phlogistique, la *mosette atmosphérique* ou le gaz azote, & l'on verra plus bas que je me suis assuré de la nature. J'ai d'ailleurs prouvé que l'acide marin *déphlogistique* n'est qu'une combinaison d'acide muriatique & d'oxygène. Lors donc que l'acide muriatique oxygéné décompose l'ammoniaque, en lui enlevant son gaz inflammable, il ne fait que dégager l'azote qui par conséquent existoit dans l'ammoniaque. Il résulte de-là que l'ammoniaque est une combinaison d'hydrogène & d'azote, & ce résultat sera confirmé par les expériences qui suivront. On voit par-là d'où provenoient les bulles que Scheele a vu s'échapper des gouttes d'ammoniaque, qu'il avoit mises au col du ballon destiné à recevoir le gaz acide muriatique oxygéné, & comment l'ammoniaque qu'il a mis digérer avec l'oxide de manganèse & l'acide nitrique, a pu être décomposée.

L'hydrogène doit former de l'eau, lorsqu'il se combine avec l'oxygène fixé dans les oxides métalliques. Si l'on pouvoit avoir des doutes sur cet objet, ils seroient dissipés par les expériences que le célèbre Priestley vient de publier, quoique la théorie qu'il en donne, soit différente de celle qui me paroît établie incontestablement sur la formation de l'eau. Il a converti en oxides du mercure, du cuivre & du fer dans l'air vital; qui a disparu dans leur oxidation; ensuite il a revivifié ces oxides par le moyen du gaz hydrogène, qui a été employé dans la revivification.

J'ai donc pensé qu'en revivifiant un oxide métallique par l'ammoniaque, l'hydrogène dont l'existence étoit prouvée dans l'ammoniaque par mes premières expériences, devoit former de l'eau en se combinant avec l'oxygène des oxides métalliques, & que par-là l'azote devoit être mis en liberté. J'ai dissous du cuivre dans l'ammoniaque; j'ai fait sécher avec soin le sel résultant de cette combinaison; je l'ai mis dans un tube de verre scellé à l'une de ses extrémités & recourbé par l'autre, de manière à s'adapter à l'ap-

pareil hydro-pneumatique ; en l'exposant ainsi à l'action de la chaleur, il s'en est dégagé de l'eau ; le cuivre s'est complètement revivifié, & j'ai obtenu du gaz azote. L'eau retenoit une portion d'ammoniaque non décomposée, qui tenoit encore un peu d'oxide en cuivre en dissolution.

L'on voit à présent à quelles causes sont dues les propriétés de l'or fulminant. L'or s'y trouve en état d'oxide, c'est-à-dire, qu'il est uni avec de l'oxigène ; il est de plus combiné avec l'ammoniaque, comme l'a si bien prouvé Bergman. L'hydrogène de l'ammoniaque forme de l'eau avec l'oxigène de l'or ; l'azote est soudainement dégagé en gaz ; & le métal est revivifié.

Il me paroit que l'oxigène abandonne d'autant moins du principe de la lumière ou de la chaleur, qu'il est plus faiblement combiné, de sorte qu'ayant peu d'affinité avec l'or, il doit en avoir conservé une certaine quantité, & l'abandonner, en se combinant subitement, d'une manière plus intime, avec l'hydrogène, pour former de l'eau ; & de-là vient qu'on observe une petite lumière dans la détonation de l'or fulminant. J'attribue moins au dégagement de l'azote les grands effets de cette détonation, qu'à l'expansion de l'eau qui vient de se former & qui est réduite en vapeurs.

Je me suis servi du gaz qui se dégage dans la détonation de l'or fulminant, pour m'assurer que c'est réellement de l'azote que contient l'ammoniaque, & pour le retirer bien pur, j'ai rempli d'eau bouillante une petite cornue de verre, dans laquelle j'avois mis de l'or fulminant ; j'ai distillé cette eau à l'appareil pneumatique, lorsque la cornue s'est trouvée sèche, l'or fulminant a détoné pour la plus grande partie, & quoi qu'il y en eut sept grains, la cornue n'a pas éclaté, parce que son issue étoit libre ; j'ai ensuite retiré le gaz qui s'étoit dégagé en plongeant la cornue dans l'eau ; je l'ai mêlé avec les proportions d'air vital indiquées par M. Cavendish ; j'ai soumis ce mélange à l'action de l'électricité, & la diminution qu'il a éprouvée, a été semblable à celle qu'on obtient, lorsqu'on se sert de la mofette atmosphérique, ou du gaz azote contenu dans l'atmosphère.

Dans toutes les décompositions d'ammoniaque caustique que j'ai faites, je n'ai point pu observer qu'il se dégagât d'acide carbonique ou d'air fixe, ainsi que M. Landriani vient de le publier, & j'y ai apporté beaucoup d'attention. Bergman n'a également point obtenu d'acide carbonique de la détonation de l'or fulminant.

J'ai éprouvé que, lorsque j'exposois l'or fulminant à la chaleur avec beaucoup de ménagement, l'ammoniaque se dégageoit de l'or fulminant, sans se décomposer ; dans ce cas, l'or restoit dans l'état d'oxide, & perdoit sa propriété fulminante, ou du moins il ne faisoit que décroître, lorsqu'on le foumetroit à l'action d'une

chaleur un peu plus forte. Cela explique une observation de Bergman, qui a prouvé qu'on pouvoit ôter à l'or la propriété fulminante, en le tenant exposé à une douce chaleur.

On trouve dans les transactions philosophiques, que de l'or fulminant enfermé dans une boule de métal, & exposé ainsi à la chaleur, ne fit point de détonation. Bergman rapporte qu'il a fait deux expériences pareilles ; il est probable que l'oxigène de l'oxide d'or se sera combiné avec l'autre métal, de sorte qu'il n'y aura pu avoir décomposition de l'ammoniaque ; c'est ainsi qu'on revivifie un oxide métallique par un autre métal qui a plus d'affinité avec l'oxigène. Mais si la vapeur qui doit se former, trouve une issue assez libre, la détonation a lieu, comme je m'en suis assuré, en me servant des tubes de cuivre, dans lesquels j'avois placé de l'or fulminant. Je mettois par-dessus du sable bien sec, & je remplissois ensuite de mercure. L'ammoniaque, & plus généralement le gaz hydrogène, ne peuvent point revivifier complètement, par le moyen de la chaleur, les oxides des métaux, qui ont la propriété de décomposer l'eau ; & lorsque M. Priestley dit qu'il a revivifié l'oxide de fer par le gaz inflammable, il est très-probable qu'il n'a fait que lui ôter cette portion de l'oxigène, qui n'avoit avec lui qu'une affinité inférieure à celle que ce principe a pour l'hydrogène. Ainsi l'oxide de manganèse, qui a une forte affinité avec l'oxigène, n'aura pu dans les expériences de Scheele, être privé par l'ammoniaque qu'à peu-près de cette portion qui s'en dégage, lorsqu'on le traite avec les acides.

J'avois cherché à déterminer les proportions de l'hydrogène & de l'azote qui composent l'ammoniaque par le poids de cette dernière, qui se trouve combinée dans l'or fulminant, & par la quantité d'eau qui doit se former à l'instant de sa détonation ; & j'avois déduit cette quantité de l'augmentation de poids qu'acquiert l'or, lorsqu'on le précipite de sa dissolution par la soude pure ou caustique ; car cette augmentation est due à l'oxigène, & l'on connoit qu'elle est la proportion d'hydrogène qu'exige l'oxigène pour former de l'eau. De ces différentes comparaisons, j'avois conclu que l'hydrogène formoit à-peu-près le sixième en poids ou les deux tiers en volume de l'ammoniaque. (Journal de physique. Avril 1786, page 171.)

Mais j'ai cherché depuis à déterminer les proportions des principes de l'ammoniaque par une méthode plus directe & plus précise. J'ai décomposé l'ammoniaque par le moyen de l'électricité, ainsi que l'a fait M. Priestley, & comme je desirois mettre beaucoup de précision dans cette expérience, j'ai prié M. Sarou de vouloir bien y concourir.

Nous avons fait du gaz ammoniacal avec un mélange d'une partie de muriate ammoniacal &c

de trois parties de chaux nouvellement calcinée, de manière qu'il devoit être dépourvu d'eau : nous avons pris les précautions nécessaires, pour qu'il fût bien pur : nous l'avons introduit dans un tube de verre garni d'un excitateur ; l'espace qu'il occupoit, toutes corrections faites, a été évalué par le moyen de l'eau, à dix-sept pouces cubes. On l'a électrisé, jusqu'à ce que l'augmentation du volume n'ait plus été sensible : après cela, on a introduit une petite quantité d'eau dans le tube, & on n'y a point reconnu d'absorption, quoiqu'on l'ait agité, de sorte que le gaz ammoniac a paru entièrement décomposé. L'augmentation de son volume a été de 16 pouces cubes ; ensuite on a introduit ce gaz dans l'eudiomètre de M. Volta, en mêlant successivement chaque mesure avec de l'air vital, & en faisant détoner après chaque addition de la manière suivante :

- 1°. Deux mesures d'air vital.
- Une mesure de gaz ammoniac décomposé.
- 2°. Une mesure d'air vital.
- Une mesure de gaz.
- 3°. Deux mesures d'air vital.
- Une mesure de gaz.
- 4°. Une mesure de gaz.

En total, cinq mesures d'air vital, & quatre mesures de gaz résidu du gaz ammoniac décomposé par l'électricité.

Ces neuf mesures ont été réduites à 4, 6, de sorte qu'il y a eu 4, 4, détruites. On a eu l'attention, dans cette expérience, de mettre une surabondance d'air vital, pour être sûr de détruire toute la partie combustible ; mais on fait que la combustion fait disparaître à-peu-près 145 mesures de gaz hydrogène contre 74 d'air vital. Il résulte de-là que les 4, 4, détruites, en présentent 2, 9 de gaz hydrogène, & 1, 5 d'air vital. Donc les quatre mesures du gaz électrisé qu'on essayoit, représentoient 2, 9 de gaz hydrogène, & 1, 1 de gaz azote ; car les expériences détaillées dans ce mémoire, prouvent bien que la partie de ce gaz, qui n'est pas combustible, est du gaz azote. Si l'on suppose que le poids de celle-ci soit au poids du gaz hydrogène pur comme 11 : 1, le poids de l'azote contenu dans l'ammoniac doit être à celui de l'hydrogène :: 121 : 29.

Les appréciations qu'on vient de faire, s'accordent d'une manière satisfaisante, avec la pesanteur que MM. Fontana & Kirwan ont reconnue dans le gaz ammoniac, qu'ils disent être de 0, 2 grains le pouce cube : l'on peut s'en assurer par un calcul facile.

Suivant M. Priestley, le gaz alcalin augmente à-peu-près de trois fois son volume par le moyen de l'électricité ; mais n'ayant pas eu pour but de déterminer les proportions des principes de l'ammoniac, il n'aura pas pris les précautions

nécessaires, & il aura négligé les corrections qu'exigent cette évaluation.

M. Van-Marum est au contraire au-dessous de notre évaluation. 27 pouces de gaz ammoniac se sont accrus dans l'expérience qu'il décrit, jusqu'à 44, & pendant les quatre minutes suivantes, il s'est fait une diminution d'un quart de pouce. On peut conjecturer qu'il a fournis à l'électricité son gaz ammoniac, avant de lui avoir laissé prendre la température de l'atmosphère, ou plutôt qu'il a laissé passer un peu d'eau dans le tube : car il a reçu ce gaz de l'ammoniac liquide par la chaleur.

Tels sont les faits par lesquels M. Berthollet a établi la nature & la composition intime de l'ammoniac. Ils prouvent tous qu'elle est un composé d'hydrogène & d'azote, que le premier principe en fait environ les cinq sixièmes, & le dernier le sixième. On a vu que c'est sur-tout par les acides nitrique & muriatique oxygéné & par les oxides métalliques, que ce chimiste est parvenu à acquérir cette connaissance. Depuis M. Berthollet, j'ai fait sur cette même composition des expériences, qui en la confirmant, m'ont paru propres à la rendre plus remarquables, & je crois devoir en donner ici un extrait. Deux de ces expériences sont sur-tout très-frappantes par les phénomènes qui les accompagnent, & par la certitude & en quelque sorte l'étendue des résultats qu'elles offrent. Si l'on fait passer du gaz ammoniac tiré du muriate ammoniacal par la chaux, dans une cloche pleine de gaz acide muriatique oxygéné & placée au-dessus du mercure, il se produit tout-à-coup une combustion très-vive ; on voit même dans le jour une flamme blanche éclatante ; une fumée blanche très-épaisse obscurcit en même-temps tout le vase ; ces gaz se pénètrent & se condensent réciproquement ; il se dégage une grande quantité de calorique, & au bout de quelques minutes, les parois de la cloche, auparavant très-sèches, sont chargées de gouttes & de stries d'eau, qui se rassemblent au-dessus du mercure. On trouve ensuite dans la cloche du gaz azote mêlé d'une certaine quantité de gaz acide muriatique oxygéné, lorsqu'on n'a point fait passer assez de gaz ammoniac pour le décomposer entièrement, ce qu'on doit avoir l'attention de faire, afin de ne point avoir de muriate d'ammoniac dans l'eau formée. Il est clair que dans cette expérience, le gaz ammoniac est tout-à-coup décomposé par le gaz acide muriatique oxygéné, l'hydrogène du premier brûle à l'aide de l'oxygène du second, & il se forme de l'eau que l'on retrouve sur les parois de la cloche ; l'azote, autre principe de l'ammoniac, s'unit à une partie du calorique qui se dégage & reste dans l'état de fluide élastique. L'eau formée tient un peu d'acide muriatique en dissolution. On peut dire que cette

expérience, en montrant la nature de l'ammoniaque, prouve aussi la composition de l'eau.

Une seconde expérience qu'on peut faire bien plus en grand, & qui éclaire de la même manière sur la nature de l'ammoniaque, est celle qui consiste à faire passer du gaz acide muriatique oxygéné dans un flacon allongé & étroit, rempli d'ammoniaque, auquel est ajouté un tube qui plonge sous une cloche pleine d'eau. A mesure que le gaz acide muriatique oxygéné touche l'ammoniaque, il en décompose une portion, & le gaz azote devenu libre, pendant que l'hydrogène de l'ammoniaque s'unit à l'oxygène de l'acide muriatique oxygéné, se dégage abondamment & vient se rassembler sous la cloche. J'ai donné cette expérience comme un des moyens prompts de se procurer du gaz azote; à la vérité, ce procédé n'est pas économique, mais il a l'avantage de pouvoir être pratiqué dans tous les temps, dans tous les lieux, au moment même où on en a besoin. Une autre suite d'expériences confirmatives, de la découverte de M. Berthollet, sur la nature de l'ammoniaque qui me sont propres, ont pour objet l'action de cette espèce d'alcali sur les oxides métalliques en général. Elles ont été consignées dans un mémoire lu à l'académie des sciences, en novembre 1788; je n'en présenterai ici que les principaux résultats.

Après avoir fait remarquer que la connoissance de la décomposition réciproque de l'ammoniaque & des oxides métalliques éclaire tous les phénomènes chimiques qui ont lieu dans les précipitations métalliques par l'alcali volatil, & dans l'action encore trop peu examinée de cet alcali sur les oxides métalliques, je me suis particulièrement occupé de ceux dont M. Berthollet n'a point parlé. J'ai déterminé cette action entre l'ammoniaque & les oxides de manganèse, de mercure, de fer & de plusieurs autres substances métalliques. Lorsqu'on verse de l'ammoniaque caustique dans une dissolution de sulfate de manganèse, l'oxide de ce métal se précipite sous la forme de flocons bruns, qui se séparent bientôt les uns des autres, & qui sont agités par des bulles de fluide élastique, qui les élèvent à la surface de la liqueur. Le même phénomène a lieu dans le vide, & le précipité y prend une couleur blanche, que le contact de l'air ne fait pas varier. L'effervescence ou le dégagement d'un fluide élastique, & la réduction de l'oxide de manganèse, sont les deux phénomènes remarquables de cette expérience; les chimistes ne les avoient encore ni observés ni décrits. Pour en connoître la cause, j'ai examiné le fluide élastique qui se dégage, & j'ai trouvé que c'est du gaz azote; ce gaz ne peut appartenir qu'à l'ammoniaque; c'est donc la décomposition de ce sel qui réduit l'oxide de manganèse, & qui produit l'effervescence par le dégagement de l'un de ses principes.

La précipitation du nitrate de mercure par l'ammoniaque, présente un phénomène analogue & qui tient à la même cause. L'oxide de mercure est précipité en gris par l'ammoniaque; on observe une effervescence lente, & le précipité ramassé sur un filtre, se réduit complètement en globules de mercure coulant par son exposition à l'air, & pendant son exsiccation. Si le muriate de mercure corrosif donne par le même sel un précipité blanc, c'est qu'il se forme dans ce cas un sel triple, ou muriate ammoniacomercurel.

Le nitrate de fer précipité par l'ammoniaque, présente un oxide de fer noir, quoique ce métal soit dans l'état d'un oxide brun dans sa combinaison avec l'acide nitrique. Cette réduction du fer dépend de la décomposition de l'ammoniaque, & en effet si on observe avec attention la précipitation, on voit une quantité considérable de petites bulles qui se dégagent lentement, & pendant la séparation desquelles l'oxide de fer passe du rouge au brun.

Ces trois précipitations accompagnées de la réduction, sont confirmées par d'autres expériences. En prenant de l'oxide noir de manganèse, & en l'arrosant d'ammoniaque liquide, il se produit même à la température de 10 ou 12 degrés au-dessus de 0, une légère effervescence, & l'oxide passe lentement à une couleur grise ou blanche; si on aide cette action par une chaleur de 60 à 80 degrés, l'effervescence est très-rapide, on retire une quantité notable de gaz azote, & l'oxide de manganèse se rapproche de l'état métallique. Le même effet a lieu entre l'ammoniaque & l'oxide de fer brun. On voit naître une effervescence; on obtient du gaz azote, & l'oxide de fer brun passe à l'état d'oxide de fer noir.

Dans l'une & l'autre de ces expériences, on reconnoît facilement que l'ammoniaque est décomposée, que son hydrogène se porte sur l'oxygène des oxides métalliques, avec lequel il forme de l'eau, que par une suite de la décomposition réciproque de ces deux composés, les oxides se rapprochent de l'état métallique, & le gaz azote se dégage dans son état de liberté; mais cet effet est encore plus prompt & plus remarquable avec les oxides de mercure. L'ammoniaque liquide versée sur l'oxide de mercure rouge, produit une effervescence très-sensible, & le fait passer au blanc & ensuite au noir; en séchant cet oxide noirci par l'ammoniaque, il se rassemble promptement en globules de mercure; quelquefois le seul contact de l'air sec & d'un peu de lumière suffit pour le remettre ainsi sous sa forme liquide & métallique. Tous les oxides de mercure, lorsqu'ils sont purs, & lorsqu'ils ne contiennent pas d'acide, éprouvent le même changement. Cette expérience m'a même servi avec beaucoup d'avantages, pour nettoyer & aviver la surface du mercure contenu

dans les cuves qui servent aux expériences sur les gaz. Le contact du gaz acide muriatique oxygéné altère la surface du mercure avec une énergie & une rapidité frappantes. Toute cette surface perd tout-à-coup son brillant, se ternit, se nuance des couleurs de l'iris, & forme bientôt une croûte solide & ridée d'oxide de mercure gris. Si l'on faisoit beaucoup d'expériences avec le gaz acide muriatique oxygéné au-dessus du mercure, celui-ci sans cesse altéré, brûlé ou oxydé par ce gaz, deviendrait bientôt incapable de servir à ces expériences, & donnerait lieu à des dépenses considérables, ou à une grande perte de temps, pour le réduire complètement.

Je rétablis & purifie bientôt la surface de ce mercure, en y promenant à plusieurs reprises un papier non collé, imbu d'ammoniaque liquide; on voit alors ce métal s'aviver, reprendre l'éclat & le brillant du mercure le plus pur. Ce procédé peut être utile, sur-tout par sa simplicité, & la facilité qu'il présente dans les manipulations chimiques.

Les oxides de plomb, & sur-tout l'oxide de plomb vitreux (litharge) sont en partie décomposés par l'ammoniaque; il se dégage du gaz azote pendant cette action.

L'acide arsénique, traité à l'aide d'une chaleur douteuse par l'ammoniaque, repasse à l'état d'oxide d'arsenic, en perdant la portion d'oxygène qui l'acidifioit: il en est de même de l'acide molybdique & de l'acide tungstique.

Il n'y a que les oxides de zinc, d'antimoine, de bismuth & de cobalt, qui aient paru être inaltérables par l'ammoniaque, encore les deux derniers ont-ils éprouvé quelque changement par le contact de cette substance saline.

Quant aux précipitations de quelques dissolutions métalliques par l'ammoniaque, dans lesquelles les oxides métalliques paroissent n'avoir pas éprouvé d'altération de la part de ce sel, comme cela a lieu dans la précipitation de quelques dissolutions de mercure, & sur-tout dans celle du muriate de mercure corrosif, il est bien prouvé: que cette inaltérabilité apparente est due aux combinaisons salines triples, qui ont lieu dans ces expériences. (*Voyez SELS TRIPLES, ET MERCURE.*)

§. V. Des circonstances qui favorisent ou arrêtent la formation de l'ammoniaque.

Ce n'est point assez d'avoir fait connoître par les divers décompositions dont l'ammoniaque est susceptible dans un grand nombre d'expériences chimiques, quelle est la nature & la proportion des principes qui composent cette espèce d'alkali, il faut encore déterminer comment l'ammoniaque se forme, quelles sont les circonstances qui déterminent ou favorisent la formation, quelles sont celles qui l'arrêtent ou la

retardent, & assurer ainsi par la synthèse, les conclusions que l'analyse a déjà autorisées. M. Berthollet n'a pas moins éclairé cette partie de la chimie dans les différens mémoires qu'il a publiés depuis 1785; il a sur-tout fait voir comment les matières animales auxquelles on reconnoissoit depuis long-temps comme caractère distinctif la propriété de donner de l'ammoniaque à la distillation, différoient réellement des substances végétales, par la présence de l'azote que M. Priestley y avoit déjà reconnu; comment ce principe étoit la cause de la production de l'ammoniaque, soit par l'action du feu, soit par la putréfaction; comment il s'unissoit à l'hydrogène provenant presque toujours de la décomposition de l'eau. Il a tiré de ces expériences cette induction générale bien remarquable dans l'état actuel de la chimie, que toutes les fois que des matières composées contenoient de l'azote, on pouvoit en conclure qu'elles étoient susceptibles de fournir de l'ammoniaque, & réciproquement que toute matière donnant de l'ammoniaque, soit par la putréfaction, soit par la distillation, contenoit nécessairement de l'azote. Il a été bientôt reconnu qu'aucune matière animale fraîche, ne contenoit d'ammoniaque toute formée, mais seulement les élémens propres à sa formation. Il paroît que la circonstance, vraiment favorable à cette formation, & qui la détermine réellement, c'est la rencontre de l'azote & de l'hydrogène en quantité proportionnelle, & à l'état où chacun de ses principes tend à se dégager dans l'état de gaz. Si l'un ou l'autre se développe séparément, & prend plus promptement la forme de gaz, alors il n'y a point d'ammoniaque de formée. C'est ainsi qu'en chassant l'azote des matières animales par l'action de l'acide nitrique, ces matières ne sont plus propres à donner de l'ammoniaque par la distillation. On trouvera aux articles AZOTE, PUTREFACTION, un grand nombre de preuves nouvelles de toutes ces assertions; tout cela tenant à la nature des substances animales comparée à celle des substances végétales, il seroit superflu de s'étendre ici davantage sur cet objet.

Les compositions artificielles de l'ammoniaque par la combinaison des matières minérales, exige aussi qu'on réunisse ici tout ce que la chimie possède à cet égard. Pour avoir remarqué il y a déjà assez long-temps, qu'en traitant le zinc avec le nitre, il se dégageoit de l'ammoniaque. M. Higgins en a obtenu depuis en broyant avec l'alkali fixe de l'oxide d'étain, précipité spontanément de l'acide nitrique, & M. Morveau a décrit dans le premier volume de ce dictionnaire, une expérience dans laquelle il s'est formé de l'ammoniaque, pendant la dissolution de l'étain dans l'acide nitrique. J'ai moi-même vu plusieurs phénomènes analoges, dans les oxides métalliques précipités spontanément de leurs

dissolutions, dans l'acide nitrique. Un chimiste anglais, M. William Austin, a communiqué en 1788, à la société royale de Londres, une suite d'expériences directes sur la combinaison de l'hydrogène & de l'azote, & sur la formation artificielle de l'ammoniaque. On en donnera ici le résultat, tel qu'il a été inséré dans les annales de chimie 1789, tome 2, p. 260.

M. Austin, cit M. Adet, auteur de cet article, avoit cherché à reconnoître au commencement de l'année 1787, la nature du fluide élastique qu'on obtient, en décomposant l'ammoniaque. Ayant détruit à l'aide de la combustion toute sa partie inflammable, & ayant vu que le fluide élastique qui restoit étoit du *gaz phlogistique*, ou azote, il en conclut que ce fluide élastique entroit dans la composition de l'ammoniaque. Cette découverte l'engagea à faire une suite d'expériences sur le gaz azote & sur le gaz hydrogène, pour chercher à former de l'ammoniaque, par la combinaison immédiate de ces deux substances. Il fut conduit à faire ces recherches, par quelques observations du docteur Priestley, qui avoit remarqué plusieurs fois dans le cours de ses expériences, qu'il se dégagoit une odeur d'ammoniaque, du mélange de différents corps, dans lesquels on ne pouvoit pas supposer son existence.

M. Austin, ayant ensuite acquis plus de lumières sur la composition de l'ammoniaque, à l'aide du travail de M. Berthollet, chercha par des moyens plus certains à former de l'ammoniaque de toutes pièces; il s'est borné dans son empire, à indiquer la route qu'il a suivie pour y parvenir, & à donner quelques observations relatives aux affinités du gaz azote & du gaz hydrogène, sur lesquelles on avoit peu de connaissances précises.

Il essaya de combiner le gaz phlogistique, ou azote, & le gaz inflammable ou hydrogène, en les mêlant dans différentes proportions, & en ajoutant à ces mélanges ce qu'il croyoit pouvoir favoriser leurs combinaisons, & par conséquent la formation de l'ammoniaque. Il mit en conséquence avec les deux fluides élastiques du gaz acide muriatique, de l'acide sulfurique, il y joignit aussi du gaz ammoniac; il essaya les effets du froid, sur ces mélanges, en appliquant sur les tubes qui les contenoient, des linges trempés dans de l'éther. Enfin, il fit passer, quoiqu'avec peu d'espérance de succès, l'électricité électrique à travers le mélange des deux fluides élastiques; il n'a jamais pu produire dans aucun cas, de l'ammoniaque par le simple mélange de l'hydrogène & de l'azote, à l'état de fluide élastique.

On fait pourtant, dit M. Austin, que ces deux corps se combinent ensemble, quand ils ne sont pas sous la forme de fluides élastiques. Ayant qu'on connoît les principes constituans de

l'ammoniaque, le docteur Priestley & M. Kirwan, avoient remarqué dans leurs expériences, qu'il s'étoit formé de l'ammoniaque, sans qu'ils s'y attendissent. Hoffman, a fait la même observation, depuis que la découverte de M. Berthollet est connue. On fit il y a plusieurs années une expérience, chez sir Joseph Banks, dans laquelle il se produisit une quantité d'ammoniaque très-considérable; cette expérience consistoit à humecter quelques onces d'essai en limaille fine, avec de l'acide nitreux médiocrement concentré, & après avoir laissé digérer l'acide sur le métal pendant une minute ou deux, à ajouter au mélange une demi-once environ de potasse, ou alcali fixe; on remarqua aussitôt l'odeur piquante de l'ammoniaque. Cette expérience est suivie du même résultat, si au lieu d'alcali, on se sert de chaux; si on humecte un gros ou deux de limaille de zinc avec du nitrate de cuivre, ou dissolution nitreuse de cuivre, & si on ajoute un peu de carbonate de potasse, lorsque ces deux substances commencent à agir l'une sur l'autre, on verra qu'il se formera alors de l'ammoniaque.

Un mélange d'acide nitreux, ou de nitrate de cuivre & de soufre, ou de limaille de fer, & d'un peu d'eau, exhale une odeur d'ammoniaque, si on le conserve pendant quelques heures dans un vaisseau fermé. Si on plonge dans ce vaisseau un papier coloré en bleu avec une teinture végétale, sa couleur passe au verd. Dans ces diverses expériences, l'eau & l'acide se décomposent; l'oxigène contenu dans ces deux substances se combine avec les substances métalliques, & les autres parties constituantes, c'est-à-dire, l'azote de l'acide & l'hydrogène de l'eau se dégagent au même instant, s'unissent & forment de l'ammoniaque. On pourroit rapporter beaucoup d'autres expériences, semblables à celles dont il vient d'être question; mais ces dernières prouvent d'une manière convaincante, que si l'azote & l'hydrogène, se rencontrent à l'instant qu'ils quittent les substances solides ou liquides, dans lesquelles ils étoient fixés, & avant que leurs molécules aient été écartées les unes des autres; ces deux substances, se combinent & forment de l'ammoniaque.

Il semble que c'est du gaz hydrogène que dépend le succès que l'on a, quand on veut combiner ce fluide élastique, & l'azote dans l'état acériforme; lorsque ces deux fluides élastiques sont combinés, il paroît nécessaire qu'ils se dégagent avec une partie du feu à qui ils doivent leur élasticité, & qu'ils ne s'unissent pas, à moins que leur attraction ne soit supérieure à celle qu'ils ont pour le feu; quand l'azote & l'hydrogène sont réunis sous la forme d'ammoniaque, les parties constituantes se séparent, si on lui fait éprouver l'action de la chaleur; & elle se trouve décomposée. Quand

l'azote & l'hydrogène ne sont point à l'état élastique, leur attraction réciproque est plus grande, en raison du peu de distance de leurs molécules; elle est même alors supérieure à celle que ces substances ont pour le feu, & elles s'unissent. Mais quand ces molécules, sont éloignées les unes des autres, comme dans l'état élastique, alors leur affinité réciproque, cède à celle du feu qui les empêche de se réunir. La pesanteur spécifique du gaz hydrogène étant onze fois moindre que celle du gaz azote, l'écartement de ses molécules doit être plus considérable que celui des molécules du gaz azote, dans le rapport de la racine cubique de 11 à 1, si les molécules de ces deux fluides élastiques ont la même étendue: & les effets de cet écartement sur l'attraction qu'il diminue, sont aux effets de l'écartement des molécules du gaz azote, comme les deux nombres dont il vient d'être question, ou mieux comme les quarrés de ces nombres.

M. Aulstin pense que la combinaison de l'hydrogène avec le gaz azote, & la formation de l'ammoniaque, dépend principalement, si ce n'est uniquement, du rapprochement des molécules du gaz hydrogène, quand il rencontre du gaz azote.

Il cite pour preuve de ce qu'il avance, l'expérience suivante.

Ayant rempli de mercure un tube de verre, & l'ayant plongé dans le mercure, il y introduisit d'abord un peu de gaz azote, & ensuite de la limaille de fer humectée d'eau distillée. Par ce moyen, l'hydrogène que le fer sépare de l'eau, rencontrant du gaz azote à l'instant où il se dégage, se combine avec lui, & forme de l'ammoniaque. Pour reconnoître la plus légère quantité d'ammoniaque qui se reproduiroit dans cette expérience, M. Aulstin mit dans l'intérieur de la cloche, un morceau de papier coloré en bleu avec de la peau de raves; en 24 heures, le papier prit une couleur verte. Pour avoir une nouvelle preuve de la formation de l'ammoniaque, M. Aulstin mit dans le même tube, un morceau de papier qu'il avoit trempé dans une dissolution de nitrate de cuivre; il espéroit que l'ammoniaque qui devoit se former, seroit passer au bleu la couleur verte du papier. En effet, la couleur du papier pâlit par degrés, & se trouva changée en bleu au bout de quelques jours. On a, dans cette expérience, une preuve sensible de la formation de l'ammoniaque; l'eau & la limaille de fer mêlés ensemble donnent du gaz hydrogène; mais si on lui présente, lors de son dégagement du gaz azote, il forme de l'ammoniaque. Cette production de l'ammoniaque dépend du jeu des doubles affinités; tandis que l'oxygène de l'eau est attiré par le fer, son hydrogène est attiré par le gaz azote; l'eau semble se décomposer plus rapidement, en raison

de ces doubles affinités, que quand elle se trouve exposée à l'action du fer seul.

L'ammoniaque se produit en peu de temps, si toutes choses égales d'ailleurs, on se sert du gaz nitreux au lieu du gaz azote. Quand M. Aulstin s'est servi de gaz nitreux, chargé d'une assez grande quantité d'acide pour que le papier bleu qu'il introduisoit dans le tube prit une couleur rouge, la quantité d'ammoniaque qui s'étoit formée dans l'espace de 24 heures, a toujours été suffisante pour faire prendre une couleur verte au papier que l'acide avoit rougi. Si on met de la limaille de fer & de l'eau dans du gaz nitreux, la nature de ce gaz est tellement changée, que si on y plonge une chandelle allumée, elle y brûle avec une flamme plus éclatante que dans l'air atmosphérique, comme l'a remarqué M. Priestley. Cette altération du gaz nitreux dépend de ce qu'une partie de l'azote du gaz nitreux, ayant servi à la production de l'ammoniaque qui se forme dans ce cas, il y a une plus grande quantité d'oxygène dans le fluide élastique qui reste après l'expérience.

On obtient un résultat semblable, si on fait à l'air libre les essais dont il vient d'être question; mais il faut plus de temps pour que le papier change de couleur: cependant l'altération de sa couleur, qui indique la formation de l'ammoniaque, est sensible au bout d'un jour ou deux. On peut conclure d'après cela, que quand le fer & l'eau sont en contact, soit au milieu de l'air atmosphérique, soit dans le sein de la terre, il se forme de l'ammoniaque. Le gaz azote se trouve dans tous les points de notre globe, & la nature sépare constamment le gaz hydrogène de l'eau, & peut-être de beaucoup d'autres corps. Nous pouvons, d'après cela, expliquer la formation de l'ammoniaque qui se présente dans différents endroits de la terre, & sur-tout dans ceux où il y a une grande quantité de matières inflammables.

Quand le fer, l'eau & le soufre agissent l'un sur l'autre dans l'air atmosphérique, il y a production d'ammoniaque. On doit voir d'après cela, que l'eudiomètre de Schéele est inexact. Il s'absorbe du gaz azote, & il se forme de l'ammoniaque. Cette méthode d'analyser l'air a induit ce grand chimiste en erreur, & lui a fait supposer que la proportion du gaz azote étoit seulement $\frac{2}{7}$ de fois plus considérable que celle du gaz oxygène.

Le gaz hydrogène se combinant avec le soufre, forme le gaz hydrogène sulfuré ou héparique. L'illustre M. Kirwan a observé que si on mêloit ce fluide élastique avec du gaz nitreux il se produiroit de l'ammoniaque. M. Aulstin a répété souvent cette expérience, & la couleur verte qu'a prise le papier bleu, lui a indiqué la formation de l'ammoniaque.

M. Aulfin conclut de toutes les expériences que nous avons rapportées, que le gaz azote, soit qu'il jouisse d'une extrême pureté, soit qu'il se rencontre mélangé avec le gaz oxygène, comme dans l'air atmosphérique, soit qu'il s'y trouve combiné comme dans le gaz nitreux, s'unira avec la base du gaz hydrogène ou inflammable toutes les fois qu'elle se trouvera dans un certain état de condensation, & que cette combinaison n'aura pas lieu dans le cas inverse. Il n'y a pas de combinaison entre le gaz hydrogène & le gaz azote du gaz nitreux, quoiqu'on ajoute à leur mélange de l'acide muriatique ou marin, qui par son affinité avec l'oxygène & l'ammoniaque, pouvoit, d'une part, concourir à la décomposition du gaz nitreux, & de l'autre, favoriser la réunion des parties constituantes de l'ammoniaque. La formation de l'ammoniaque n'aura point encore lieu si on ajoute de la limaille de fer au mélange de gaz hydrogène & de gaz nitreux, quoiqu'on ait observé qu'il étoit aisé de former de l'ammoniaque, en présentant du gaz azote au gaz hydrogène à l'instant où le fer le dégage de l'eau.

M. Aulfin termine son mémoire en rapportant les calculs qu'il a faits pour estimer les proportions d'hydrogène & d'azote contenus dans l'ammoniaque. Ses résultats sont presque conformes à ceux que l'expérience a présentés à M. Bertholet, qui a trouvé que, dans l'ammoniaque, l'azote étoit à l'hydrogène :: 121 : 19. Suivant M. Aulfin, l'azote est à l'hydrogène :: 121 : 32.

Tous les détails consignés dans le mémoire de M. Aulfin, contiennent les bases des connoissances acquises par les chimistes modernes sur la formation naturelle ou artificielle de l'ammoniaque, dans les décompositions minérales; les premiers élémens de la formation de cet alcali dans les matières animales soumises à la distillation & à la putréfaction, ont aussi été présentés dans cet article; si l'on compare maintenant les idées vagues, les hypothèses incohérentes qu'on avoit autrefois sur cette formation, on verra bientôt à quelle hauteur s'est élevée la chimie depuis quelques années, & quelle distance, presque incommensurable, sépare cette science au moment où nous en mesurons aujourd'hui l'étendue dans cet ouvrage (1791), de ce qu'elle étoit il y a vingt ans. On trouvera peut-être en comparant un assez grand nombre de passages de ce dictionnaire, que nous répétons souvent & sous des formes variées, cette assertion sur la différence de la chimie actuelle d'avec la chimie telle qu'elle étoit il y a une vingtaine d'années, & à plus forte raison à des époques plus éloignées; mais dans une science dont la marche a été si rapide, en même temps que ses avantages ont été si grands, il n'est pas permis d'oublier d'en faire connoître les progrès & la marche assurée, toutes les fois que l'occasion

Chimie, Tome II.

s'en présente, & aucune partie n'offre une occasion plus belle & plus remarquable de son perfectionnement, que l'histoire de l'ammoniaque. Cette histoire, qui autrefois n'eût demandé que quelques lignes dans des ouvrages de chimie, exige aujourd'hui de longs détails; elle tient à celle des matières animales, à leur rapport avec les substances végétales; elle conduit à la connoissance de l'animalisation, de la putréfaction; elle éclaire une foule de phénomènes qui se présentent dans les dissolutions & les précipitations métalliques, dans la décomposition de l'eau opérée par deux corps à la fois; elle constitue une branche entière des attractions doubles ou affinités doubles; en un mot, elle tient un des premiers rangs dans les forces chimiques, & si l'on négligeoit d'en considérer convenablement les différens points, on perdrait un des moyens les plus utiles & les plus sûrs de pénétrer dans les profondeurs de la science, & de parvenir à de nouvelles découvertes.

§. VI. Des usages de l'ammoniaque.

Dire en général qu'il n'y a pas de produit chimique plus utile & d'un usage plus général que l'ammoniaque, soit dans la médecine, soit dans les arts, soit pour l'avantage de la chimie même, c'est s'enoncer d'une manière vraie, mais trop vague & trop indéterminée. Dans un ouvrage où l'on veut connoître la science avec toute son étendue & toute sa richesse, il faut parcourir en détail les différens usages auxquels l'ammoniaque est employée, & justifier en quelque sorte par l'ensemble des avantages qu'ils présentent, la longueur des discussions où l'on est entré, & la force ainsi que la continuité d'attention qu'on a exigée de ses lecteurs.

Sans faire connoître ici toutes les indications que l'ammoniaque est susceptible de remplir entre les mains d'un médecin instruit pour le traitement des maladies, objet qui regarde le dictionnaire de médecine, il faut au moins faire remarquer que la forte saveur, la grande dissolubilité & la propriété de se réduire promptement en gaz que présente l'ammoniaque, & sur-tout l'énergie singulière avec laquelle elle agit sur les matières animales & dissout un grand nombre de ces matières épaisses, la rendent d'une utilité immédiate, & l'on peut même dire indispensable, dans un grand nombre de cas. Ainsi on l'emploie avec des succès marqués dans les engorgemens des viscères & sur-tout du méfentère, dans les embarras des reins, dans l'engouement du système lymphatique, dans les tumeurs glanduleuses, dans les longs catarrhes, &c.; appliquée à l'extérieur, elle fond & dissout les tumeurs lymphatiques, les emphysemes sous-cutanés, les tumeurs froides & blanches en général. Les effets que l'ammoniaque produit dans tous les cas où elle est bien

Ha

indiquée, ne peuvent être convenablement conçus que par ceux qui ont bien étudié ses propriétés chimiques, & l'on peut assurer que les médecins qui se seront livrés avec zèle à cette étude, tireront de l'usage de l'ammoniac un parti que l'on n'aurait pas pu même soupçonner sans les connoissances chimiques.

Dans les arts l'ammoniac est quelquefois employée à la teinture, dans le traitement de plusieurs métaux, mais spécialement pour la fabrication artificielle du sel ammoniac ou muriate ammoniacal. C'est en distillant les chiffons de laine & d'étoffes faites en général avec des matières animales qu'on ramasse dans les débris des grandes villes, qu'on extrait l'ammoniac, dont on se sert pour combiner avec l'acide muriatique, & composer le sel ammoniac. En Angleterre on obtient l'ammoniac en distillant le charbon de terre & en séparant, par une ingénieuse distribution des différentes régions du récipient, ce sel volatil d'avec l'huile qui passe en même temps que lui dans la distillation. On donnera d'autres détails sur cette fabrication aux articles CHARBON DE TERRE & MURIATE D'AMMONIAQUE. Les personnes qui fabriquent les perles artificielles emploient une dissolution d'écaillés d'ablette dans l'ammoniac pour leur donner l'orient; c'est ce qu'on nomme *essence d'orient*, *essence de perles*. C'est sur-tout en pharmacie qu'on emploie l'ammoniac pour un grand nombre de préparations différentes; cet objet doit être traité dans un article déliné à la pharmacie, & qui suivra celui-ci.

Dans les laboratoires de chimie où cette science est exercée avec activité, où l'on fait une grande suite d'expériences, on conforme de grandes quantités d'ammoniac, & l'on en prépare plus ou moins en grand sept à huit fois par an. On l'emploie d'abord pour neutraliser les vapeurs acides répandus dans les salles d'expériences après les distillations, les dissolutions métalliques, les démonstrations du gaz nitreux, pour décomposer rapidement le gaz acide muriatique oxygéné, qui infecte les lieux où il a été préparé, & incommoder quelquefois fortement les personnes qui y travaillent. On s'en sert pour préparer tous les sels ammoniacaux qu'on emploie fréquemment dans les expériences chimiques; pour précipiter les dissolutions métalliques, & sur-tout pour préparer l'or & l'argent fulminans pour dissoudre & départir plusieurs oxides métalliques, & sur-tout ceux de cuivre & d'argent, en les séparant d'avec ceux qui ne sont point dissolubles dans l'ammoniac; pour dissoudre ou conserver quelques matières végétales & animales. On décompose l'ammoniac par l'acide nitrique, par l'acide muriatique oxygéné, par les oxides de cuivre, de plomb & de mercure, pour en faire connoître la nature, quelquefois même pour en obtenir le gaz azote; on le combine avec le soufre pour préparer le sulfure ammoniacal, nommé autrefois *liqueur*

fumante de Boyle; enfin on emploie à tout moment l'ammoniac dans les laboratoires de chimie, & il faudroit passer en revue toute la science pour détailler ici tous les usages auxquels elle est destinée. Remarquons seulement en terminant cet article, qu'il est indispensable de prendre garde lorsqu'on fait entrer l'ammoniac dans quelques combinaisons nouvelles, si elle se combine entièrement, ou si elle subit en tout ou en partie une décomposition; quoiqu'on ait beaucoup vu de choses nouvelles sur cet objet depuis quelques années, il en reste encore un grand nombre d'autres à voir; par exemple, l'ammoniac sert-elle à la végétation, & est-elle décomposée par les machines végétales, ses deux principes sont-ils absorbés par les végétaux? On connoît bien les usages de l'ammoniac dans les arts chimiques, mais on ignore encore son usage dans la nature, & c'est cependant à ce dernier que nous devons nous élever, si nous voulons édifier la véritable physique.

AMMONIAQUE. (*Pharmac.*) Voyez les mots GAZ AMMONIAQUE & MURIATE D'AMMONIAQUE.

AMOME. (*Pharm.*) Les pharmacologistes ont tant varié sur le vrai amome des officines, la confusion est si grande dans leurs traités sur ce sujet, que nous allons volontiers adopter avec les auteurs des matières médicales du nord & de l'Angleterre, le fruit du piment, qui est connu chez les Anglois, sous le nom de poivre de la Jamaïque. Ce n'est que depuis le commencement du siècle dernier que cette drogue est connue en Europe, malgré cela son usage est presque entièrement oublié; mais elle étoit connue des anciens Grecs. C'est un arbre aromatique des Indes, de la Nouvelle-Espagne, de la Jamaïque, appartenant au genre des mirtes. Il nous offre, selon Lewis, la graine dite *vrai amome*, qui est un fruit rond, qui a environ la grosseur d'un grain de raisin moyen; sous une pellicule membraneuse, se trouve une quantité de petites graines rudes au toucher, anguleuses, d'un brun noirâtre à l'extérieur, & blanchâtres en dedans. Ces graines sont logées dans trois cellules distinctes, celles de chaque cellule sont jointes si étroitement, que quand on ouvre le fruit, il ne paroît pas contenir plus de trois graines. Lix ou douze de ces fruits sont disposés en grappes. Ce fruit est suave & aromatique, on l'emploie pour assaisonner les alimens, il est échauffant, tonique, stomacal, cordial, apéritif, céphalique, incisif, dissipe les vents, pousse les urines, la sueur & les mois, soulage la colique & la passion iliaque, ranime le sang & les esprits, emporte les obstructions, atténue les humeurs épaissies, rétablit l'oscillation des fibres. Les anciens en faisoient principalement usage pour faire des onguents; la pharmacopée de Londres retire une eau distillée de l'amome, il entre dans la thé-

riague. On peut le prescrire en poudre depuis dix grains jusqu'à treize, &c le double en infusion.

(M. WILLEMET.)

AMPELITE. L'ampelite est un schiste alumineux, gras, noir, qui tache les doigts, &c qui est employé comme une espèce de crayon noir par plusieurs ouvriers. C'est un composé d'alumine ferrugineuse & bitumineuse, qui en fait les trois quarts, avec un peu de filice & de craie. On en trouve dans beaucoup d'endroits; mais sur-tout dans la carrière de Bechet, près de Sées en Normandie. Il y en a des variétés qui sont chargées de pyrites, &c qui s'effleurissent fortement. On dit que ce nom d'ampelite lui a été donné, parce qu'on la trouve souvent dans les vignes.

AMULETTES. (*Pharmacie.*) Les amulettes sont toutes les substances qu'on porte suspendues au col, ou appliquées sur la poitrine, sur les poignets, pour préserver ou guérir un grand nombre de maladies. La plupart des amulettes sont des substances simples, naturelles, telles que des pierres polies, des racines, des semences, des concrétions animales, &c. La pharmacie ne faisoit que les préparer, les disposer, pour qu'on pût les suspendre ou les appliquer. Quelques-unes étoient formées de quelques compositions, ou de mélanges de poudres. Le plus grand nombre cependant étoient des matières inodores, inertes, &c qui n'avoient d'action que sur l'imagination des malades. On a dit à cet égard tout ce qu'il est nécessaire de savoir dans le dictionnaire de médecine, auquel nous renverrons, puisque d'ailleurs on ne prépare plus d'amulettes dans les pharmacies.

ANA, (& par abréviation *añ*, ou simplement *ā*.) (*Pharmacie.*)

Ce mot est employé dans les formules, pour désigner qu'il faut mettre *égale quantité* de chaque drogue prescrite. *Ana* est une préposition grecque, qui marque quelque réitération ou continuité. C'est pourquoi elle sert dans cette langue, ou pour signifier le trajet, la durée, ou pour marquer *similitude* & *ressemblance* dans les poids ou dans les mesures, l'*égalité* dans les choix qui se font à plusieurs fois; c'est dans ce dernier sens que cette préposition, (d'après les auteurs grecs), est employée par les auteurs latins dans les formules de médicaments. On remarque que *Sulfone*, auteur latin, s'en est servi de même.

ANACARDE OCCIDENTALE. *Anacardium occidentale.* L. *Acajou.* Pison. Bras. 58.

L'arbre d'acajou naît dans les îles de l'Amérique, le Brésil, les Indes, le Malabar, à Surinam, à Saint-Domingue &c dans la Guiane; il est de la hauteur du pommier, branchu & touffu. L'anacarde occidentale ou plutôt la noix d'acajou,

a la figure d'un rein, la grosseur d'une châtaigne, l'écorce grise, brune, dont le suc est acre & si mordicant, qu'en en frottant légèrement la peau, on y excite la sensation du feu. Si quelqu'un mord imprudemment cette écorce, il souffrira une ardeur vive & brûlante à la langue & aux lèvres. C'est pourquoi l'écorce de la noix d'acajou a été rangée parmi les caustiques, &c l'on peut s'en servir avec succès, pour détruire, dans quelques cas, les taches de la peau & les cors aux pieds. La noix d'acajou est bonne à manger, elle est nourrissante. On la recommande pour exciter l'amour. Les habitants du Brésil comptoient autrefois leur âge par le moyen de ce fruit; ils en serroient un tous les ans. Nous en avons planté dans un jardin botanique, il a germé à notre satisfaction; mais les noirs frimats de l'hiver l'ont fait périr. Peut-être qu'avec beaucoup de soins & des terres chaudes, on pourroit enfin se procurer en France l'arbre acajou, d'autant mieux que transporté à l'île de France, on le cultive avec succès dans les jardins du quartier de la montagne longue. Il y a des forêts de cet arbre dans les plaines sablonneuses, qui sont au bord de la mer, &c qu'on traverse, en allant de Courou à Sinemari, dans la Guiane française. Il est très-utile aux voyageurs, à cause de son fruit avec lequel on se soulage de la soif, parce qu'il ne se rencontre dans cette toute que de l'eau sale. On exprime un suc de ce fruit qui, par la fermentation, devient vineux & enivrant; il est diurétique: on en retire un esprit ardent, fort vif, &c on en fait un excellent vinaigre.

Le bois d'acajou répand beaucoup de gomme rousse, transparente, solide, qui, imbibée d'eau, tient lieu de la meilleure gomme. On s'en sert à Cayenne, pour coller tout ce qu'on veut soustraire à l'humidité & aux insectes. On la passe aussi sur les meubles, pour leur donner un vernis agréable. (M. WILLEMET.)

ANACARDE ORIENTALE. *Avicenna tomentosa.* L. *Anacardium.* C. *Bath.* pin. 511.

L'anacardier est un arbre exotique, grand, beau & droit, qui porte un fruit nourrissant, agréable au goût, dont la double enveloppe fort dure, renferme un suc mielleux, acre & brûlant. Les anciens ne connoissoient pas l'anacarde du levant. On nous l'apporte des Indes orientales, des îles Philippines, de Surate & sur-tout du Malabar. On confit les amandes d'anacarde, soit vertes dans du sel, soit mûres dans du sucre. Ce fruit échauffe & divise les humeurs tenaces & visqueuses: ce qui a déterminé les médecins arabes à le recommander spécialement dans les maladies du cerveau & des nerfs provenantes de causes froides, & comme un vrai spécifique propre à aider tous les sens, la perception, l'intelligence, la mémoire, guérir la paralysie de

FH 2

la langue & des autres parties. C'est dans cette intention qu'on a jadis vanté la confécion anacardine, décorée du beau nom de confécion des fages, mais appelée par Caspard Hoffmann la confécion des fous, parce qu'il prétend que son usage inconsidéré & fréquent a fait perdre la mémoire à un grand nombre de personnes, & les a rendus furieuses. Les arabes préparent un miel anacardin. Camelli, qui a fait connoître les propriétés de cet anacarde, assure qu'étant infusé dans du petit-lait, il offre un médicament excellent contre les vers & l'asthme. Le suc mielleux de l'écorce de ce fruit, est caustique ; introduit dans une dent creuse, la consume & la détruit ; il rongé les excroissances fongueuses qui s'élèvent sur les plaies & les ulcères, les verrues, les condylomes, les dartres vives, le scrophule. Ce même suc est employé avec de la chaux vive, pour marquer les étoffes & autres choses, d'une couleur indélébile. Les Indiens font cuire les fommies jeunes & tendres de l'anacardier, pour les manger.

(M. WILLEMET.)

ANACATHARTIQUES. (*Pharmacie.*) On nomme ainsi les médicaments qui évacuent les différentes humeurs par les émonctoires placés au-dessus du diaphragme. Ainsi les vomitifs, les expectorans, les sternutatoires, les salagogues, sont des anacathartiques. Ce mot est surtout adopté pour les expectorans, comme purgatifs des poulmons. Au reste cette expression regarde plus la thérapeutique que la pharmacie, parce qu'il n'y a que très peu de médicaments composés qui portent cette épithète. *Voyez* le dictionnaire de médecine.

ANAGALLIS. (*Pharmacie.*) *Voyez* MOURON.

ANALEPTIQUES. (*Pharmacie.*) Les analeptiques sont des restaurans qui réparent promptement les forces. On prépare des bouillons, des gelées, des conferves, des poudres, &c. analeptiques. Il en sera question dans ces différens titres de compositions. *Voyez* pour la connoissance des analeptiques en général, ce mot dans le dictionnaire de médecine.

ANALYSE. Il est peu de mots dans un dictionnaire de chimie, qui prêtent autant, ou à de longs détails, ou à des généralités plus simples que le mot ANALYSE. Devenu par des acceptions assez multipliées, une expression figurée dans le langage du monde, ainsi que dans le style d'un grand nombre d'ouvrages fort éloignés par leur nature des traités de chimie, il a toujours conservé sa valeur réelle dans cette dernière science.

A la vérité, l'espèce de grande opération générale qu'il représente, a tellement été perfectionnée par les travaux successifs des chimistes & sur tout depuis vingt ans, qu'on peut avec vérité se servir de ce mot, pour définir le plus grand nombre des opérations particulières de l'art auquel il appartient. Aussi est-il reçu dans le plus grand nombre des ouvrages, comme parmi toutes les personnes qui possèdent bien la langue française, que la chimie peut être définie la science de l'analyse. Cependant il ne faudroit pas prendre cette expression trop à la lettre, car on risquerait de se former des fausses idées de la chimie, & de commettre des erreurs sur les avantages de cette science. Si la chimie peut être regardée comme la science de l'analyse, parce qu'elle tend toujours à séparer les principes des corps, elle doit à aussi juste titre être caractérisée comme science de la synthèse, puisque dans la plupart de ses opérations, & même dans celles où elle cherche à faire des analyses, elle ne parvient souvent à son but, qu'en faisant des synthèses ; mais pour éclaircir ce point, ainsi qu'un grand nombre d'autres objets que cet article présente à notre discussion, il ne faut pas se borner, comme on l'a fait dans un grand nombre d'ouvrages de chimie, à considérer l'analyse d'une manière abstraite, à ne donner que des idées abstraites, souvent aussi vagues & presque aussi inutiles, qu'elles sont générales. Il faut, après avoir défini le mot ANALYSE, entrer dans tous les détails qui concernent ce grand moyen de la science, & faire connoître non-seulement son influence en général & dans les opérations de la chimie, mais encore la manière dont l'analyse procède dans l'examen des différens corps de la nature. Cet article sera donc naturellement partagé en deux sections : dans la première, on définira l'analyse en général ; on en établira les différens espèces, on exposera les forces qui les opèrent, on distinguera les méthodes générales qu'on emploie, les instrumens qui y servent, & on fera voir combien de données l'emploi, l'usage & la connoissance, même de tous les objets généraux, exigent de la part de ceux qui veulent s'occuper avec fruit de ces travaux. La seconde section sera une application plus détaillée des principes généraux présentés dans la première ; on y tracera successivement les méthodes générales qu'on a pratiquées avec succès, & qu'on pratique tous les jours, pour faire l'analyse des différens corps naturels, qu'on divisera en plusieurs classes par rapport à ces considérations. On poussera même les limites de la puissance analytique, s'il est permis de s'exprimer ainsi, jusqu'à faire entrevoir l'existence possible d'analyses plus élevées, plus sublimes que celles qui ont été faites jusqu'à ce jour, & qui s'exerceront sur des corps inattaqués jusqu'à présent par tous les moyens que les chimistes ont eus en leur pouvoir.

SECTION PREMIÈRE.

De l'analyse considérée en général.

L'analyse considérée en général est une séparation, un isolement des principes des corps, qui en opère la décomposition, & qui les réduit à leurs éléments. L'existence de l'analyse qui, comme on voit, est dans ce sens général le vrai synonyme du mot DÉCOMPOSITION, suppose donc que les corps sont composés; & c'est une de ces vérités senties de tous les temps, connue par tous les hommes, que les substances naturelles sont formées de principes ou d'éléments qu'ils composent. Cependant il est encore quelques modifications à admettre dans cette opinion sur la nature générale des corps. Si le raisonnement conduit à croire que tous les corps de la nature sont des composés, l'expérience n'a pas fait voir que tous pussent être décomposés, & qu'on pût conséquemment faire une analyse de toutes les productions naturelles; d'une autre part, la composition des corps est plus ou moins compliquée, & l'analyse plus ou moins difficile, de sorte que les progrès de la science ont dû à cet égard changer à mesure des idées des savans, & leur donner une exactitude plus grande, à mesure qu'ils ont avancé vers une perfection plus marquée.

§ 1. Des diverses espèces d'analyses.

Les idées générales qui ont été données jusqu'ici de l'analyse chimique, conduisent naturellement à distinguer plusieurs espèces d'analyses, celle-ci n'étant considérée en général que comme la séparation des principes des corps. Quatre espèces principales d'analyse se présentent d'abord à la pensée : la première qui pourra être suffisamment distinguée par l'expression d'*analyse mécanique*, est la plus simple à concevoir, & la plus facile à exécuter; elle a spécialement lieu pour la séparation des différentes matières qui composent le corps des végétaux; ainsi lorsqu'on sépare par la pression, la filtration, le repos & suivant l'ordre de la pesanteur, de la liquidité, de la forme, de la grosseur des molécules, de leur tendance à s'isoler par leur propre nature, les sucs, la fécule, les huiles, la partie colorante, la résine, &c. des végétaux, on en fait une espèce d'analyse. Il est vrai que malgré cette dénomination d'analyse mécanique, peu de chimistes ont regardé cette simple opération comme une véritable analyse, parce qu'on n'emploie pas une force chimique pour la faire; mais tous mécaniques que sont les moyens qui servent, ils fussent cependant pour vaincre l'attraction & la cohérence des principes les uns avec les autres, & telle est en dernier ressort l'idée la plus nette & la plus précise qu'on puisse se former d'une analyse. Sans doute

c'est la plus faible & la plus simple des méthodes qui soient capables de séparer les principes; mais ce n'en est pas moins une véritable séparation, & comme telle on y trouve en dernier examen une véritable analyse. On doit sentir que cette espèce de décomposition est une des plus fréquentes & des plus employées dans les arts. Elle est d'usage pour obtenir la plupart des matières végétales; elle diffère beaucoup des espèces suivantes.

Une seconde espèce d'analyse, que l'on doit soigneusement distinguer, est l'*analyse spontanée*. On entend par-là une séparation de principes, une décomposition opérée sans le secours des moyens chimiques, & par les seules forces de la nature. Depuis que la chimie est sortie de ses laboratoires, depuis que, guérie de la folle croyance qu'elle doit tout à ses travaux, elle s'est portée dans les laboratoires de la nature, pour y observer avec soin les phénomènes qu'elle y présente en grand, on a bientôt reconnu qu'il se passoit dans les minéraux même, & au sein des couches & des cavités souterraines, des analyses, des décompositions continuelles, qui en changent ou en modifient la nature. C'est ainsi que les métaux s'oxydent par le contact de l'eau, de l'air & des acides, qui se décomposent au milieu des filons & des cavités des mines, c'est ainsi que se forment & se détruisent sans cesse les acides, les sels neutres, terreux & alcalins, les sels métalliques; en un mot, c'est par une espèce d'analyse minérale spontanée que se développent successivement tous les états si variés des mines que les minéralogistes nomment des *passages*, & qui sont quelquefois si bien imités par les chimistes dans leurs opérations ou analyses artificielles. L'analyse spontanée est encore bien plus manifeste & bien plus rapide dans les composés végétaux & animaux. Abandonnés à eux-mêmes après avoir été d'abord séparés du corps des êtres qui les ont formés, & privés du mouvement dont ils y étoient agités, ces composés ne restent pas long-temps dans leur premier état; bientôt ils éprouvent un mouvement intellin qu'on nomme fermentation, & qui n'est autre chose qu'une véritable analyse spontanée; plusieurs de leurs principes se volatilisent, d'autres se combinent dans une proportion nouvelle, & forment des corps plus simples qu'ils n'étoient d'abord. Peu à-peu, & par les progrès de cette réaction intime, les matériaux primitifs de ces composés s'isolent, se séparent, se réduisent en vapeurs pour la plupart, & présentent ainsi une véritable analyse, dont le résultat est la destruction du corps très-composé qui l'a éprouvée. (Voyez FERMENTATION). On peut dire que toute analyse artificielle est une imitation de cette analyse naturelle, & que l'art ne tend en effet qu'à séparer, qu'à isoler ainsi les divers principes qui sont plus ou moins étroitement unis dans les composés naturels.

Les deux autres espèces d'analyses sont encore

plus importantes à distinguer & à connoître que les précédentes, parce qu'elles conduisent plus précisément encore aux découvertes chimiques, en déterminant avec exactitude la puissance de l'art sur les produits de la nature. De ces deux dernières espèces, l'une doit être nommée *analyse vraie ou simple*; & l'autre, *analyse fausse ou compliquée*.

On appelle *analyse vraie ou simple*, celle par laquelle on obtient les principes d'un corps qu'on décompose, sans qu'ils aient subi d'altération. Le seul caractère auquel on puisse la reconnaître, c'est qu'en unissant les principes qu'elle a fournis, on donne naissance à un composé tout-à-fait semblable à celui qu'on a analysé; le cinabre peut ici servir d'exemple. Lorsque, par des moyens chimiques, on sépare les deux substances qui forment ce composé, c'est-à-dire, le soufre & le mercure, on obtient ces deux principes dans leur état de pureté, & tels qu'ils existoient dans le cinabre; puisqu'en les unissant de nouveau, on forme un être en tout semblable à celui qu'on a d'abord décomposé; cette espèce d'analyse est malheureusement fort rare. Les chimistes ne sont pas assez heureux pour pouvoir l'appliquer à tous les corps qu'ils traitent; puisque, excepté la plupart des corps du règne minéral, toutes les substances animales & végétales ne sont pas susceptibles de se prêter à l'analyse vraie.

L'*analyse fausse ou compliquée*, est celle par le moyen de laquelle on ne sépare d'un corps que des principes qui n'existoient pas tels dans cette composition, & qui, par conséquent, ne peuvent plus, par leur union, reformer le premier composé. Cette espèce de décomposition a lieu pour la plus grande partie des corps que les chimistes analysent; il suffit pour cela qu'il entre plus de deux principes dans leur composition, & que ces principes aient entr'eux quelque tendance à se combiner. Plusieurs minéraux, & toutes les substances animales & végétales, sans en excepter une seule, ne peuvent être analysées que de cette manière. C'est ainsi, par exemple, que le sucre mis dans une cornue, donne à la distillation de l'acide, de l'huile, des gaz & un charbon que l'on tenteroit en vain de recombinaison, pour reproduire cette substance telle qu'elle étoit avant son analyse. Cette sorte de décomposition n'indique point l'état dans lequel se trouvoient les substances unies avant qu'on les eût séparées; elle ne peut donc fournir que très-peu de lumières, & l'on doit même se méfier des résultats qu'elle donne. Ainsi, dans l'exemple cité, on concluroit à tort que l'acide, l'huile, & les gaz obtenus dans la distillation du sucre étoient contenus dans cette matière, & la formoient par leur union directe; c'est cependant cette conclusion que l'on adoptoit autrefois: on disoit qu'une matière contenoit tant de sel volatil & d'huile, parce qu'on les retiroit par la distillation; on alloit même

jusqu'à expliquer ses propriétés médicinales par la proportion de ces prétendus principes. Les ouvrages de Lemery & de Geoffroy sont pleins de pareilles inductions erronées. C'est de-là qu'ont pris naissance les reproches que l'on a faits avec juste raison aux époques indiquées à la chimie. On a dit qu'elle déformoit les corps, & il faut convenir qu'elle méritoit alors ces reproches; elle s'est bien corrigée de ces anciennes erreurs. Elle a depuis assez long-temps reconnu les fautes routes où cette analyse avoit engagé les chimistes; elle a découvert sur-tout depuis une quinzaine d'années, la cause de ces résultats erronés. Elle sait que les prétendus principes qu'on obtient dans les analyses fausses ou compliquées, ne sont que de nouveaux composés, & que lorsqu'une matière contient trois ou quatre principes différens d'un ordre divers de volatilité, deux de ces principes réduits en même temps en vapeurs, se combinent entre eux d'une manière différente de ce qu'ils étoient dans le composé primitif, & donnent naissance, ainsi que les principes qui restent, & s'unissent ensemble au fond des vaisseaux distillatoires, à des combinaisons nouvelles plus ou moins éloignées de la première combinaison générale; en un mot, les chimistes ne voyent, dans ces prétendues analyses, que des synthèses qui sont différens les composés nouveaux qu'on obtient pour produits, par le nombre moins grand, & par la proportion variée des principes qui se séparent. En appliquant cette attention à ce qui arrive dans l'exemple déjà cité du sucre décomposé par la distillation, elle acquerra la clarté nécessaire. Le sucre est un composé végétal d'hydrogène, de carbone & d'oxygène, dans les proportions de huit parties du premier, de vingt-huit du second, & de soixante-quatre du troisième, à peu de choses près suivant les expériences de M. Lavoisier. Ces trois principes restent étroitement unis, & ne tendent point à se séparer, tant qu'on ne présente au sucre aucun corps qui y puisse porter de nouveaux principes, ou échanger, par une nouvelle attraction l'adhérence des premiers. A toutes les températures jusqu'à quelques degrés au-dessus de celle de l'eau bouillante, l'équilibre subsiste encore. Mais lorsque la chaleur qu'on lui applique passe cent degrés, alors l'équilibre est tout-à-coup rompu; l'hydrogène tend à se réduire en gaz par la grande quantité de calorique qu'il absorbe; son attraction pour l'oxygène, porte ce dernier à s'unir à lui à mesure qu'il se volatilise, & il se forme de l'eau; une portion de carbone enlevée par l'hydrogène, & unie à une partie de l'oxygène, constitue l'huile; une autre partie de carbone, combinée à de l'oxygène seule, forme l'acide carbonique qu'on obtient aussi dans cette analyse. Comme il n'y a pas suffisamment d'oxygène pour saturer en particulier tout l'hydrogène, & tout le carbone contenu dans le

sucre, il reste une grande quantité de carbone à nud dans le vaisseau distillatoire. Ainsi l'on voit par ces détails que l'action du feu sur le sucre, ne fait que changer le nombre & la proportion des principes qui le composent; que ce changement donne naissance à de nouveaux composés qui n'étoient pas contenus dans cette matière, & que cette analyse consiste uniquement dans la formation de composés plus simples, & dans le passage d'un composé ternaire à plusieurs compositions binaires. Voilà comment la chimie moderne est parvenue non-seulement à reconnoître une ancienne & trop longue erreur, mais encore, à rendre d'une clarté frappante des phénomènes dont elle n'avoit autrefois aucune connoissance, & à tirer même un parti utile d'une opération jusque-là trompeuse, pour mieux déterminer la nature des corps.

C'est à ces quatre espèces d'analyse, qu'on peut rapporter toutes les différences générales qu'on a mises entre elles; car, on conçoit bien que ce n'est pas dans cet ordre de distinctions spécifiques qu'il faut inscrire les variétés nommées analyse par le feu, analyse par les menstres, analyse par les acides, analyse par l'alcool, analyse immédiate, &c. variétés qui appartiennent à des pratiques, à des moyens particuliers, & dont il ne doit être fait par conséquent mention que dans la section seconde de cet article.

§. II. Des moyens d'analyse en général.

En considérant en général toutes les méthodes d'analyse que les chimistes emploient, tous les moyens dont ils se servent pour parvenir à connoître les principes des corps, & en cherchant sur-tout à rapporter toutes les méthodes, tous les moyens à un principe général, pour en concevoir, s'il est possible, l'unité, on reconnoît bientôt que les chimistes n'ont jamais d'autre but que de mettre en action la force de combinaison qui existe entre tous les corps, & de la développer avec plus ou moins d'énergie, suivant les substances dont ils veulent faire l'analyse. En effet, les matières dont on veut séparer les principes, ne sont composées, ne restent formées ou constituées par les principes, que parce qu'une force naturelle les retient adhérens les uns aux autres. Il est indispensable que cette force, cette attraction soit vaincue, pour que la désunion de ces principes ait lieu, & pour invoquer d'abord un axiome mécanique ou une image sensible de la nécessité d'appliquer une force supérieure à celle qui tient les principes réunis: l'action que les chimistes font naître dans ce cas, ressemble à celle d'un effort, d'une pression nécessaire pour chasser un clou, pour séparer une cheville, pour débarrasser un coin engagé dans un milieu quelconque. Le coup, l'effort, doivent être supérieurs à la force qui tient ces corps adhérens.

Ce principe ainsi posé, doit être plus directement appliqué aux forces chimiques, en rappelant ici la base des connoissances relatives aux affinités. C'n fait en général que l'affinité diffère entre les différents corps, que si on présente à un composé de deux corps, un troisième corps qui ait pour l'un des deux plus d'affinité qu'ils n'en ont ensemble, il faut que les deux premiers soient séparés. De quelque manière qu'on considère l'analyse, quelque moyen qu'on emploie pour la faire, à quelque espèce que se rapporte celle que l'on exécute, c'est toujours en vertu d'une affinité qu'on opère & qu'on réunit. Le feu, l'air, l'eau, les acides, l'alcool &c. tout ce qui est mis en usage par les chimistes pour opérer une analyse, n'agit qu'en attirant plus fortement quelqu'un ou quelques-uns des principes du corps composé avec plus de force qu'ils ne s'attirent eux-mêmes; de sorte qu'il résulte toujours d'une analyse quelque composition ou quelque synthèse, qu'on ne peut pas même faire d'analyse sans employer la synthèse, ou sans former de nouvelles combinaisons, & que la force d'affinité bien observée entre tous les corps naturels, est en dernier résultat la source de toutes les espèces d'analyses quelconques. C'est donc par une loi naturelle que les décompositions ont lieu; les chimistes après l'avoir reconnue ont appris à la mettre en jeu par les différentes méthodes que l'art expérimental leur a peu-à-peu fait découvrir, & qui seront décrites dans les paragraphes suivans.

§. III. De la manière d'agir des différens matériaux ou instrumens qu'on emploie pour faire les analyses.

En partant du principe bien établi dans le paragraphe précédent, que toute analyse est fondée sur l'attraction & les affinités, il ne s'agit plus que de déterminer comment ces affinités agissent en général dans les opérations analytiques des chimistes. Observons d'abord, que pour mettre les affinités en jeu, pour en déterminer l'action, il faut employer des substances quelconques dans lesquelles résident ces forces capables de produire les effets attendus. Ces substances étant considérées ici comme des instrumens généraux d'analyse, il faut en connoître l'action générale. On peut ranger parmi les principaux instrumens d'analyse, le calorique, la lumière, l'air, l'eau, les alcalis, les acides, les sels nitreux, les huiles, l'alcool, le charbon, & les oxides métalliques, &c. On pourroit sans doute multiplier beaucoup ici les agens; on pourroit même regarder tous les corps chimiques comme autant d'instrumens ou d'agens utiles aux analyses, & cela est parfaitement vrai, puisque entre les mains d'un chimiste habile, tout peut devenir un moyen de connoître la nature & les principes des composés qu'il examine; mais il ne doit être ici question que des principaux, des plus connus & des plus employés. Ce qui sera exposé sur ces

grands instrumens, conduira directement à ce qui pourroit regarder tous les autres en particulier.

Le calorique considéré comme instrument d'analyse, agit d'abord en écartant, en tendant à séparer les unes des autres les molécules des corps; si l'on suppose que les composés ont des principes de différence de volatilité, ou, ce qui est la même chose, dont l'affinité pour le calorique soit variée, on voit que l'un ou plusieurs de ces principes diffusés & enlevés en vapeurs ou en gaz par le calorique, se dégageront en abandonnant ceux qui sont fixes, & produiront ainsi la décomposition. Le calorique agit donc d'une triple manière dans les analyses; 1°. mécaniquement & en écartant les molécules des corps, de sorte à diminuer leur attraction pour elles-mêmes; 2°. par son affinité propre, souvent plus considérable pour quelques principes des composés, qu'elle n'est entre ceux-ci; 3°. en augmentant l'attraction des principes d'un composé pour ceux d'un autre corps voisin, comme il se fait pour l'air par rapport à un grand nombre de corps combustibles. Il est donc ou l'agent immédiat, ou le principe déterminant des décompositions ou analyses. Aussi est-il si employé, que les alchimistes le qualifioient autrefois du titre de philosophes par le feu.

La lumière agit depuis long-temps dans plusieurs analyses, sans que les chimistes aient pendant long-temps reconnu ou même soupçonné son influence. Dans les travaux & les découvertes de Scheele, on pourroit même encore l'ignorer; mais depuis cet homme célèbre, M. Berthollet, & beaucoup d'autres chimistes, en ont décrit les phénomènes, & même déterminé l'action. Qui ne sait aujourd'hui qu'une foule de substances, exposées aux rayons du soleil dans les laboratoires & les magasins, s'altèrent, se détériorent, changent de nature, & éprouvent enfin de véritables analyses par l'influence de la lumière? L'acide nitrique devient nitreux en donnant de l'air vital; l'acide muriatique oxygéné passe à l'état d'acide muriatique ordinaire en perdant son gaz oxygène; les oxides d'or, d'argent, de mercure, sont plus ou moins sensiblement réduits, ou rapprochés de l'état métallique, en perdant de même des portions plus ou moins considérables de leur oxygène; l'eau est décomposée par les végétaux, & sur-tout par les feuilles, lorsqu'elles sont en même temps plongées dans les rayons du soleil; en un mot une foule de corps se réduisent en leurs principes, ou en perdent quelques-uns par le contact de la lumière. Il reste même à cet égard un grand nombre de travaux, à faire ou plutôt une nouvelle carrière est ouverte aux chimistes, en employant la lumière comme moyen ou instrument d'analyse. Tout ce qu'on a observé jusqu'aujourd'hui sur cet agent, se réduit à le faire regarder comme un corps qui tend à dégager l'oxygène de toutes les substances qui le contiennent, & à faire passer ces substances oxygénées à l'état de corps combus-

tibles, conséquemment à *débrûler* en quelque sorte les matières qui ont été auparavant brûlées.

L'air, inconnu pendant si long-temps dans sa nature & dans les principes, analysé lui-même & avec une grande exactitude, depuis les nouvelles découvertes chimiques, est devenu un des agens les plus précieux & les plus fréquemment employés des analyses. Souvent son influence le borne, il est vrai, à former comme atmosphère environnante une sorte de récipient, dans lequel les produits ou les principes dégagés des composés s'échappent & s'accumulent; mais il n'en est pas moins dans ce cas un agent précieux puisque sans cet usage, les corps ne seroient pas aussi-bien décomposés, ou aussi promptement réduits à leurs principes. Quelquefois l'action décomposante de l'air, dépend de l'eau qu'il tient en dissolution, & qui est attirée par les corps qu'il laisse à dessein exposés au contact de l'atmosphère. Enfin quand l'air agit comme instrument de décomposition par sa propre nature, ou à raison de ses attractions propres, c'est presque toujours en absorbant l'hydrogène ou le carbone des substances très-composées ou organiques, qui se trouvent plongées dans son milieu. C'est ainsi que les feuilles, les bois, les fruits, &c. exposés à l'air, encore humides, ou contenant encore quelque portion d'humidité, brunissent ou noircissent, par le charbon qui se met à nud à mesure que l'hydrogène qui l'accompagne dans ces composés compliqués se dégage & se combine avec l'oxygène atmosphérique. Dans la plupart des matières minérales qu'on expose à l'air, il ne se passe pas une décomposition comme celle qui vient d'être citée pour les substances végétales & animales; mais au contraire il y a une absorption de quelques-uns des principes contenus dans l'air, qui donne plus souvent lieu à une synthèse qu'à une analyse.

L'eau est de tous les instrumens d'analyse le plus employé & le plus utile, soit dans la nature, soit dans l'art. Tant de substances y sont dissolubles, qu'en appliquant l'eau à une foule de substances, on en sépare souvent plusieurs principes qui s'y dissolvent, & on parvient à faire une analyse plus ou moins exacte. Mais il faut remarquer ici qu'une analyse par simple dissolution dans l'eau, & telle qu'elle est annoncée ici, n'est qu'une séparation simple de matières plus mêlées que combinées, & qu'elle n'équivaut presque qu'à un moyen mécanique, au moins dans un grand nombre de cas, tels particulièrement que l'analyse des terres, des cendres, des résidus d'eaux minérales, &c., que presque jamais l'eau ne sert à séparer les principes fortement unis da quelque composé naturel, au moins en restant elle-même dans son intégrité & sans séparation de principes; que lorsqu'elle opère une pareille séparation, c'est en éprouvant elle-même une décomposition complète, de sorte qu'il y a dans ce cas presque toujours une double analyse en même-

temps

temps qu'une double attraction ; c'est ainsi que paroissent s'opérer plusieurs décompositions spontanées des matières végétales ou animales, & spécialement la putréfaction. On voit donc que les chimistes n'avoient point assez distingué autrefois les espèces d'analyse, lorsqu'ils regardoient l'eau comme un des plus grands moyens qui fussent à la possession de l'art pour les opérer, & qu'ils confondoient presque les analyses mécaniques avec celles qui supposent une attraction plus forte & une action plus puissante en général.

Les alcalis n'ont pas été employés autrefois par les chimistes dans l'intention d'analyser les substances auxquelles ils pouvoient les appliquer ; il est vrai que c'étoit alors faute d'avoir une connoissance exacte du degré de pureté, & sur-tout de l'extrême énergie de ces corps. Aujourd'hui si l'usage des alcalis n'est pas toujours aussi fréquent que celui de l'eau & des acides, c'est que leur force est trop active, c'est qu'ils exercent leur puissance dissolvante sur tout de matériaux à la fois, pour pouvoir éclairer convenablement sur la composition des corps. En appliquant la potasse ou la soude pure ou caustique, aux matières végétales ou animales, ces alcalis dissolvent, s'ils sont très-concentrés, toutes ces matières à la fois, sans en séparer les principes, toute la masse organisée est ramollie, fondue, complètement dissoute, & quoiqu'on sache par des expériences exactes que la partie albumineuse est celle sur laquelle les alcalis purs portent plus volontiers leur action, & qu'ils épargnent en général ou touchent beaucoup moins fortement la matière fibreuse, c'est souvent avec la plus grande difficulté qu'on en tire parti, pour opérer quelque séparation de principes dans les matières organisées ; il faut pour cela les prendre plus ou moins étendus d'eau, & employer différens degrés de chaleur. Ils n'ont encore été que peu adoptés parmi les moyens d'analyse, si ce n'est pour enlever quelques acides contenus dans plusieurs matières de l'un ou de l'autre des trois règnes de la nature. On mesure ou on estime la quantité de ces acides par celle des alcalis qu'on est obligé d'employer pour les saturer. Le plus souvent on les fait servir à la décomposition des sels neutres, ammoniacaux, terreux ou métalliques. Quelquefois les alcalis servent à décomposer quelques substances & à en séparer les premiers principes, soit médiatement, soit immédiatement : c'est ainsi, par exemple, qu'ils tendent à faire décomposer l'eau, lorsqu'on traite par ce liquide tenant un alcali caustique en dissolution, des métaux, des alliages métalliques, des sulfures, &c. Il est vraisemblable que lorsqu'on connoitra mieux la nature intime des alcalis fixes, ils seront encore bien plus utiles aux analyses qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent. Quant à l'ammoniaque, cette espèce d'alcali est devenue entre les mains des chimistes modernes un des instrumens les plus précieux d'analyse, par la fa-

Chimie. Tome II.

cilité que présente son hydrogène de se séparer de l'azote & d'enlever des portions d'oxygène plus ou moins abondantes aux corps qui contiennent ce principe ; ainsi elle sert avec beaucoup d'avantages pour décomposer les oxides métalliques, l'acide muriatique oxygéné, &c.

Les acides sont depuis long-temps à la tête des instrumens mis en usage par les chimistes, pour obtenir la séparation & faire l'analyse d'un grand nombre de corps. On a cependant commis de grandes erreurs par rapport à leur usage, on a pensé depuis l'époque brillante de Stahl, jusqu'à celle des découvertes modernes sur les gaz, que les acides servoient à dégager le phlogistique des métaux, & conséquemment à en faire une véritable analyse, tandis qu'il est au contraire reconnu que ce sont les métaux qui opèrent vraiment la décomposition des acides, & sur-tout de l'acide sulfurique & de l'acide nitrique. Depuis la découverte de ce dernier fait, l'usage des acides dans les opérations analytiques de la chimie, est devenu beaucoup plus clair & beaucoup plus utile en même-temps. En considérant en général l'action que ces sels exercent dans l'analyse de tous les corps à laquelle on les fait servir, on peut partager en deux genres cette action, quelque diverse qu'elle paroisse. Le premier genre comprend tous les cas où les acides n'éprouvent eux-mêmes aucune altération, & ne font que dissoudre ou séparer des principes qui se trouvent dans plusieurs composés ; telle est l'action qu'exercent les acides sulfurique, muriatique, acéteux, &c., sur les terres, les pierres, les résidus d'eaux minérales évaporées, les cendres des matières végétales & animales, toutes substances auxquelles on applique les acides, pour en séparer les principes terreux, alcalins & métalliques, qui y sont souvent contenus en plus ou moins grande quantité, & pour en former des sels neutres qu'on reconnoît ensuite à leurs propriétés ou à leurs caractères distinctifs. Souvent dans ce premier genre d'action qu'on peut rapporter à une simple dissolution, les acides que l'on emploie commencent par en déplacer d'autres plus foibles qu'eux ; c'est sur-tout l'acide carbonique qui, plus fréquemment un à une matières alcalines ou terreuses, cède ces matières aux acides muriatique ou acéteux qu'on y emploie ordinairement, & se dégage en gaz annoncé par une effervescence plus ou moins forte. Le second genre d'actions que produisent les acides dans les décompositions auxquelles on les destine, renferme tous les cas où les acides eux-mêmes sont décomposés & cèdent un de leurs principes qui le plus souvent est l'acidifiant ou l'oxygène ; c'est ainsi qu'agissent en général sur tous les corps combustibles les acides sulfurique & nitrique ; c'est au milieu & par l'effet même de cette décomposition des acides que l'on sépare l'argent de l'or & du platine, l'étain du plomb, le bismuth d'un grand nombre d'autres métaux, & le soufre

de toutes les substances métalliques auxquelles il peut être uni. Tantôt le métal séparé n'a éprouvé aucune altération de la part de l'acide, tandis que ce sel est décomposé, tandis que les autres matières métalliques qui étoient unies au premier métal, sont oxydées ou brûlées par l'oxygène séparé de l'acide; tantôt on n'obtient au contraire le métal isolé des autres qu'en lui faisant éprouver une très-forte oxydation qui le rend indissoluble dans les acides, tandis que les autres métaux s'y dissolvent. Les mêmes principes généraux relatifs à cet état des acides dans les analyses sont applicables au traitement des matières végétales & animales par ces sels, comme on le dira plus en détail dans la section suivante, car on ne doit pas perdre de vue qu'il n'est question dans celle-ci que de déterminer d'une manière générale l'action des différens corps qu'on emploie comme instrumens à l'analyse des matières composées, de quelque nature que soient ces matières.

L'usage des sels neutres dans les analyses n'a pu devenir de quelque importance & de développer tous les avantages dont ils peuvent être susceptibles, que depuis qu'on a étudié toutes les propriétés qui les distinguent, toutes les décompositions qu'ils sont capables d'éprouver, en en faisant en même-temps éprouver d'autres aux corps qui les produisent. Cette partie de la chimie moderne est à cet égard fort au-dessus de l'ancienne, & les ressources de l'art sont si multipliées que l'on ne pourroit, sans de très-grands détails, d'ailleurs étrangers à cet article, & qu'on trouvera épars dans un grand nombre d'autres articles, en présenter le tableau exact. Il suffit donc de choisir quelques exemples principaux des actions des sels neutres, comme instrumens d'analyses, & d'exposer ici les phénomènes généraux de décomposition auxquels ils donnent naissance, pour faire concevoir combien leur application peut devenir avantageuse dans les analyses variées, qui s'offrent souvent dans les laboratoires, & tout le parti que les chimistes instruits peuvent en tirer. C'est une vérité que l'émery a mise il y a plus de cinquante ans dans tout son jour, que des dissolutions de sels neutres deviennent capables de dissoudre d'autres sels plus abondamment qu'elles ne l'auroient fait par l'addition de quelques substances salines, ou, ce qui sera plus clair & plus général en même-temps, que l'attraction de l'eau pour les sels neutres, & la force dissolvante à leur égard est augmentée, ou à des rapports plus étendus quand on lui présente deux ou plusieurs sels, que si on ne lui en présentait qu'un seul à dissoudre. On verra ailleurs que c'est à ce principe qu'est due la difficulté extrême que présente l'analyse de plusieurs masses salines mélangées, & sur-tout des différens sels dont la réunion & le mélange forme le salpêtre brut, fourni par les salpêtriers à l'établissement de la régie où on le raffine. (Voyez *TRAITE DE POTASSE*). D'après ce principe il

peut être utile pour opérer le départ ou l'analyse de plusieurs substances salines mélangées, de se servir de dissolutions saturées, tantôt de nitre, tantôt de sel marin, ou au moins d'être prévenu de l'action simultanée qu'exerceront réciproquement ces deux sels par rapport à leur dissolubilité; mais il faudroit, pour tirer un parti convenable de cette dissolubilité relative, connoître l'influence réciproque de tous les sels neutres, les uns par rapport aux autres, & dans toutes sortes de proportions, ce qui est bien loin d'exister encore dans la science, & ce qui ne pourra être le fruit que d'une suite de travaux & d'expériences, qui sont à peine commencées, & sur lesquelles on trouvera quelques nouvelles vérités, aux articles *DISSOLUTION*, *CRYSTALLISATION* & *SELS NEUTRES*. On peut se servir des sels neutres pour arriver, par une autre voie, à des résultats très-utiles, pour remplir le but d'une analyse, qui est de bien déterminer la nature & les proportions des principes des composés qu'on examine. Les sulfates de potasse & de soude peuvent ainsi indiquer la présence & la quantité des nitrates & muriates de chaux; ceux-ci peuvent à leur tour présenter le même avantage, par rapport aux sulfates de potasse, de soude, de magnésie & d'alumine. Les nitrates, muriates & acétates de baryte, servent pour reconnoître tous les sels sulfuriques, tous les sulfates quelconques, & pour annoncer la quantité d'acide sulfurique contenu dans des composés quelconques. Plusieurs sels métalliques, & en particulier les nitrates d'argent & de mercure, sont employés avec un succès constant pour connoître la présence des acides sulfurique & muriatique, ainsi que leur quantité dans des liqueurs qui les contiennent dans un état quelconque de combinaison. Le muriate d'ammoniaque précipite les sels de platine, & le sulfate de fer décompose le muriate d'or. Enfin il est vrai de dire qu'il n'y a pas un sel neutre terreux, alcalin ou métallique, qui ne puisse être utile à un chimiste instruit pour lui faire connoître la nature de quelques composés, & qui ne devienne entre ses mains un instrument avantageux à l'analyse particulière de beaucoup de substances. Qu'on lise les mémoires ingénieux de l'illustre Schéele, & on sera bientôt convaincu de cette vérité.

Les huiles fixes & volatiles ou *grasses* & *essentielles*, sont également employées comme moyens d'analyses, pour séparer le soufre de quelques composés, le camphre, les résines, l'arôme, la partie colorante de la plupart des végétaux. Mais leur usage est très-borné, & ne ressemble point à beaucoup près à celui des substances qui ont été indiquées ci-dessus, ni même de celles qui restent encore à examiner.

L'alcool, par exemple, est un des dissolvans le plus généralement & le plus avantageusement employés, pour séparer & obtenir à part un grand nombre de matériaux qui appartiennent aux corps

organisés. Les extracto-résineux & les résino-extractifs, les huiles volatiles, les résines molles & sèches, la partie aromatique, la matière colorante des végétaux, sont facilement enlevées aux racines, aux bois, aux écorces, aux feuilles, aux fleurs, aux fruits & aux semences par l'action de l'alcool; il offre le même avantage dans l'analyse des matières animales. Souvent même il sert utilement à séparer quelques-unes des matières salines qui existent dans les minéraux, & sur-tout dans les produits obtenus par l'évaporation des eaux; on fait qu'il dissout facilement les sels déliquescents, le nitrate & le muriate de chaux & de magnésie: il agit encore sur plusieurs sels métalliques, & il peut servir à en opérer le départ. (Voyez le mot ALCOOL.)

Le charbon est un des instrumens d'analyse que les chimistes mettent le plus souvent en usage à la vérité sans s'en douter, car ils croyoient au contraire autrefois que ce corps au lieu de servir à l'analyse d'autres, y portoit au contraire un principe qui en changeoit la nature, mais par une combinaison nouvelle. Ainsi, par exemple, lorsqu'ils traitoient l'acide vitriolique & les chaux métalliques, comme on les appelloit alors, avec du charbon, ils étoient persuadés que celui-ci donnoit à ces corps le principe qu'ils nommoient phlogistique & qui leur rendoit la forme de corps combustibles. Depuis que des expériences exactes ont fait voir que l'acide sulfurique & les oxides métalliques sont de vrais composés de corps combustibles, de soufre & de métaux avec l'oxygène, on fait que le charbon sert à faire leur analyse, à les décomposer en leur enlevant l'oxygène. L'utilité du charbon dans les analyses, est en général établie sur l'affinité très-forte qui existe entre ce corps & l'oxygène; comme cette affinité est la plus forte connue, on conçoit que le charbon doit être employé avec avantage pour enlever l'oxygène à tous les corps qui le contiennent; il n'y a de différences entre eux par rapport à la difficulté plus ou moins grande qu'a le charbon pour les désoxygéner, ou leur enlever l'oxygène, que celle de la température nécessaire à chacun d'eux. Ainsi le charbon est un des principaux instrumens d'analyse pour l'air, l'eau, les acides, les oxides métalliques. On a de plus assuré depuis quelques années, qu'il avoit la propriété d'absorber & de séparer les parties colorantes, les huiles brûlées, les extraits en partie rôtis, & avec toutes les substances végétales qui sont ordinairement brunies & salées par ces corps; on a même proposé de l'employer d'après cela pour purifier & affiner les métaux, les gros syrops, les extraits, les sucres épais, l'eau corrompue elle-même; mais cette influence analytique, comme il est convenable de l'appeler ici, n'est pas encore établie sur un assez grand nombre de faits & d'expériences authentiques pour qu'on puisse la regarder comme bien démontrée. Au reste il sera question de cette

propriété avec beaucoup plus de détails aux articles CARBONE & CHARBON.

Les oxides métalliques peuvent eux-mêmes devenir des instrumens d'analyse à l'aide de leur oxygène qui tend plus ou moins à s'en séparer, & à se porter sur les principes d'autres composés; aussi les chimistes modernes s'en servent-ils souvent pour décomposer plusieurs corps, & en particulier l'ammoniaque. Au reste il est bien facile de voir, par tout ce qui a été exposé jusqu'ici, que toutes les substances possibles sont pour les chimistes instruits, & sur-tout pour ceux qui portent dans leur science cet esprit d'invention sans lequel on ne parvient à aucune découverte, de véritables instrumens qu'ils employent sans cesse aux analyses qu'ils veulent faire; mais il doit être également prouvé pour ceux qui ont lu avec attention les détails déjà donnés ci-dessus, que si tout peut servir aux analyses, le travail qu'elles exigent, les ressources qu'elles supposent, ne peuvent exister qu'avec des connoissances très-étendues dans tout l'ensemble de la science; car les moyens généraux d'analyse sont bientôt épuisés. Une substance nouvelle ou jusques-là inconnue résiste souvent à ces premiers moyens, & les chimistes seroient bientôt arrêtés dans leurs recherches, s'ils s'en tenoient uniquement aux instrumens communs; ce n'est pas dans les routes battues que l'on trouve les découvertes; le génie en s'en écartant au besoin, doit en frayer de nouvelles; & c'est assurément-là ce qui distingue les modernes, & ce qui a élevé la chimie française au degré de splendeur où elle est placée depuis vingt ans.

SECTION SECONDE.

De l'analyse considérée en particulier.

Il n'a été question dans la première section que de l'analyse en général; ce seroit se restreindre dans des bornes trop étroites que de s'en tenir à ces généralités; il faut appliquer actuellement ces principes généraux à des exemples particuliers, & sans entrer cependant dans l'histoire de l'analyse de tous les corps en particulier, & qui renfermeroit alors tous les détails de la chimie dans le mot ANALYSE. Pour éviter ce second excès, nous considérerons les analyses des corps naturels comme formant un certain nombre de classes par rapport à la nature de ces corps eux-mêmes; & comme cette nature différente détermine une diversité de moyens pour l'analyse, on pourra connoître assez exactement cette diversité en partageant tous les corps de la nature en cinq classes générales relativement à leur ordre différent de composition. Ces cinq classes nous donneront autant de variétés générales de méthodes analytiques, savoir 1°. celle de l'air & des gaz; 2°. celle de l'eau & des eaux; 3°. l'analyse des minéraux;

4°. l'analyse végétale ; 5°. l'analyse animale. Dans un sixième & dernier paragraphe , on fera voir qu'outre ces méthodes particulières bornées à cinq classes , la chimie doit s'en créer encore de nouvelles dont on n'a point fourni d'idées , mais qu'on peut entreprendre ou au moins espérer prochainement de l'état d'avancement où est portée aujourd'hui cette belle science.

§. I. De l'analyse de l'air & des gaz.

Il est assez généralement connu que c'est à la chimie moderne qu'est due l'analyse de l'air atmosphérique , qu'il y a 20 ans on ne soupçonnoit pas l'air d'être un corps composé , qu'il étoit au contraire regardé comme un élément indécomposable , indestructible , que c'est en examinant avec soin les phénomènes de la combustion , qu'on est parvenu à reconnoître la composition de l'atmosphère. Toutes les vérités fondamentales , & un grand nombre d'autres qui en sont immédiatement les conséquences , ont été présentées avec tous les détails convenables à l'article AIR. Il ne s'agira donc ici que de rappeler les moyens généraux qui ont été employés par les chimistes modernes pour faire l'analyse de l'air atmosphérique , afin de recueillir l'ensemble de tout ce qui a été imaginé dans cette science pour connoître la nature & les principes des différens corps. Dès qu'on a eu l'heureuse idée de contenir dans des vases jaugés & de mesurer à volonté l'air atmosphérique par les cloches & par tous les appareils pneumatico-chimiques dont la première invention due à Hales a reçu ensuite un grand perfectionnement par les travaux de M. l'riedley , on a tout-à-coup fait les plus singulières & les plus étonnantes découvertes sur ce fluide ; on a reconnu en brûlant des quantités connues de corps combustibles dans des volumes déterminés d'air , qu'une partie de ce fluide étoit absorbée par les corps en combustion , se combinait directement avec eux , & que c'étoit dans cette combinaison de cette partie de l'air que consistoit véritablement toute combustion. Alors on trouva que cette portion de l'air faisoit constamment les $\frac{1}{12}$ de l'atmosphère , & que les $\frac{11}{12}$ qui n'étoient point absorbés par les corps combustibles étoient un fluide élastique fort différent de la première. On a vu à l'article AIR , comment & par quelles expériences ingénieuses M. Lavoisier étoit parvenu à cet heureux résultat ; c'est en *calcinant* , suivant l'ancienne expression , du plomb , du mercure , & brûlant du phosphore , du charbon , &c. dans des quantités déterminées d'air atmosphérique , que ce physicien célébre a fait ces grandes découvertes. Aujourd'hui les mêmes expériences sont devenues si faciles & en quelque sorte si familières , sur-tout au moyen de la combustion du phosphore dans les cloches au-dessus du mercure , qu'elles sont à la portée de tous les hommes qui oc-

cupent de chimie , & qu'on parvient très-promp-tement à connoître les proportions des deux fluides élastiques qui constituent ordinairement en quantités un peu différentes , l'air atmosphérique pris à telle ou telle hauteur , dans tel ou tel lieu , dans telle ou telle circonstance. Il suffit pour obtenir ce résultat si souvent nécessaire aujourd'hui dans des laboratoires de chimie , d'avoir une cloche de verre mince , d'un pouce de diamètre sur cinq à six pouces de hauteur , évacuée vers le bas pour qu'elle puisse être fixement & solidement assujettie sur les côtés des cuves pneumatico-chimiques au mercure , d'y faire passer un morceau de phosphore sec en quantité plus grande qu'il n'en faudroit pour absorber tout l'air vital contenu dans la capacité de toute la cloche , afin d'être sûr d'absorber tout l'air vital contenu dans l'air qu'on veut connoître , on fait ensuite fondre ce phosphore , dont la légèreté l'a élevé au-dessus du mercure & dans le haut de la cloche qui est arrondie à son extrémité , en présentant au-dehors de cette extrémité un charbon bien allumé , quand le phosphore est bien fondu , on fait passer dans la cloche l'air ou le fluide élastique quelconque dont on veut déterminer la proportion d'air vital ; aussi-tôt que ce gaz est en contact avec le phosphore chaud , celui-ci s'allume & brûle avec activité ; on met quelques pouces de ce gaz mesuré auparavant très-exactement. Ce qui reste après la combustion & qui ne peut plus servir à brûler le phosphore , est ou du gaz azote si on examine de l'air atmosphérique , ou un autre gaz quelconque différent de l'air vital , si l'on opère sur un gaz qui n'a point appartenu à l'air atmosphérique. Alors on emploie différens moyens pour déterminer la nature & la proportion de ces gaz différens du gaz azote , & qui consistent en général à les mettre en contact avec l'eau , l'eau de chaux , les dissolutions de potasse ou de soude pure , la teinture de tournesol ; ces matières en absorbant plus ou moins , en offrant un précipité ou un changement de couleur , annoncent de quelle nature est le gaz qui reste après la combustion du phosphore. Souvent même ce gaz est encore mêlé lui-même de plusieurs fluides élastiques , & en particulier d'acide carbonique & de gaz azote ; on détermine les proportions de ces mélanges par la quantité qui reste après l'absorption due aux différens liquides indiqués plus haut , le résidu non absorbé est ordinairement du gaz azote , parce qu'il n'est point susceptible comme le gaz acide carbonique d'être absorbé par l'eau , par les dissolutions alcalines , ni de colorer la teinture de tournesol. Ainsi l'on opère par la combustion du phosphore , par le contact des dissolutions d'alcalis fixes , une suite de départes qui donnent ordinairement un résultat exact sur la nature & la proportion des gaz mêlés ensemble en proportions différentes dans la plupart des fluides élastiques qu'on se propose d'examiner.

On voit bien ici que la forme de fluides élastiques, a pendant long-temps arrêté les pas des chimistes ; que tant qu'ils ont été prévenus de l'idée qu'il n'y avoit que l'air qui eût cette forme, & que ce corps étoit un élément toujours homogène, toujours indestructible & indecomposable, ils n'ont pas même songé à se procurer des appareils propres à en faire reconnoître la nature & les véritables caractères ; qu'enfin tous les progrès de la science dans cette nouvelle manière d'analyser une substance réputée élémentaire depuis un grand nombre de siècles, ont eu pour commune origine l'invention des instrumens capables de renfermer, de coërce, de contenir, & de mesurer les quantités de l'air & des fluides élastiques. Aussi tout ce qu'on peut savoir d'exact à cet égard, est-il compris dans la connoissance approfondie de tous les appareils pneumatochimiques. On doit donc consulter les articles qui contiennent la description de ces appareils, & surtout les mots AIR, APPAREILS, COMBUSTION, EUDIOMETRE & EUDIOMÉTRIE ; on y trouvera tout ce qui peut éclairer l'analyse de l'air & des gaz, objet dont la nature de cet article n'exigeoit qu'un simple aperçu.

5. II. De l'analyse de l'eau & des eaux.

Il en est de l'analyse de l'eau, comme de celle de l'air. Avant les découvertes modernes sur la combustion & les fluides élastiques, on regardoit comme une vérité bien démontrée, & c'étoit un des principaux axiomes de la physique, que l'eau étoit un corps simple, un élément indecomposable, dont il sembloit qu'il n'étoit pas permis à l'homme de connoître jamais la nature. Des idées bien différentes sont sorties des nouvelles découvertes. Il y a bientôt huit ans que MM. Lavoisier & Laplace ont prouvé par des expériences aussi exactes qu'ingénieuses, que l'eau est un composé d'environ 15 parties d'hydrogène & 85 parties d'oxygène ; qu'en combinant ces proportions de ces deux corps tous les deux sous la forme de gaz, on obtient 100 parties d'eau pure ; que le fer & le zinc rouges, le charbon embrasé, les huiles bouillantes décomposent l'eau, en absorbant son oxygène, & en dégageant son hydrogène dans l'état de gaz inflammable pur. L'historie & les détails de cette grande découverte qui a changé la face de la physique, ont déjà été présentés à l'article AIR, & le seront encore sous un autre point de vue à l'article EAU. Il ne s'agit ici que d'indiquer sommairement les moyens d'analyse, aujourd'hui en la possession des chimistes, pour opérer la décomposition de l'eau. Ces moyens sont tous renfermés dans le choix de substances qui aient avec l'oxygène plus d'affinité, que celui-ci n'en a pour l'hydrogène. Pour bien apprécier ici l'action de ces substances, il faut les diviser en deux classes ; ou bien en effet elles ont cette

propriété immédiatement & par elles-mêmes : tels sont le charbon, le fer, le zinc qui décomposent l'eau, sur-tout lorsque leur température est fort élevée ; ou bien elles ne l'acquiescent que lorsqu'elles sont unies plusieurs ensemble, que lorsque l'une trop faible d'affinité pour séparer les deux principes de l'eau, est allouée à une seconde, qui seroit aussi trop peu active, si elle étoit seule. Les cas où l'opère cette décomposition de l'eau par une double affinité, sont beaucoup plus nombreux, qu'on ne l'a d'abord pensé. C'est ainsi que le soufre, le phosphore & plusieurs métaux qui seuls, n'ont point la propriété de décomposer l'eau, en deviennent cependant susceptibles, lorsqu'ils sont unis avec des alcalis, des terres, ou lorsqu'ils agissent en même-temps que des acides : ce dernier fait a lieu, sur-tout pour les métaux.

On entend autre chose par l'expression d'analyse des eaux ; il n'est plus question alors de la décomposition de l'eau, mais de l'examen des différentes espèces d'eaux atmosphériques & terrestres, par rapport aux diverses matières qui peuvent y être tenues en dissolution. Il s'agit ici d'une des parties les plus étendues & les plus difficiles de l'art chimique, puisqu'il faut par tous les moyens que les connoissances théoriques & pratiques de la chimie indiquent, déterminer la nature & la proportion très-petite d'un plus ou moins grand nombre de matières terrestres, salines & métalliques, qui se trouvent dissoutes dans les eaux de neige, de pluie, de mer, de fleuves, de rivières, de lacs, d'étangs, de sources, de fontaines, de ruisseaux, de marre, de puits, &c. La science a fait de très-grands progrès dans cette analyse, depuis trente ans, par les travaux succédés de MM. Monner, Bergman, Marret, Morveau, Gouanetti, &c. Je me suis en particulier beaucoup occupé de ce genre de recherches : on en trouvera tout l'ensemble à l'article EAUX MINÉRALES. On y verra employées toutes les ressources de la chimie la plus profonde, tous les moyens & les instrumens d'analyse, les terres, les acides dans tous les états, les matières colorantes végétales, les alcalis, les sels neutres, les oxides, les dissolutions métalliques, l'influence du calorique & celle de l'air, l'évaporation, la distillation ordinaire & pneumatochimique. Toutes les méthodes expérimentales, y seront encore étayées & par la description topographique des environs de la source, relativement aux minéraux qu'ils fournissent, & par l'imitation de leur nature ou la préparation artificielle des eaux, qui doit faire le complément de leur analyse. Tout ce qu'on peut dire, en résumant ici sur l'analyse des eaux, c'est qu'elle renferme elle seule toutes les variétés de moyens & d'instrumens qu'on peut employer, pour connoître la nature des corps, & qu'elle exige de la part des chimistes qui l'entreprennent, l'étendue

la plus grande des connoissances de leur science, & même le génie d'invention, pour créer de nouvelles méthodes & de nouveaux procédés analytiques.

§. VIII. De l'analyse des minéraux ou de l'analyse minérale.

C'est sur les minéraux que la chimie moderne a fait les plus grandes & les plus brillantes découvertes, relatives à la combustion, à la formation & à la décomposition des acides, aux différens états des métaux, à leur dissolution dans les acides. Ces découvertes ont tellement contribué au perfectionnement de la minéralogie, qu'on peut regarder cette partie de l'histoire naturelle, comme une science entièrement nouvelle. On a découvert cinq acides minéraux inconnus il y a vingt ans, savoir les acides carbonique, fluorique, arsenique, molybdique & tungstique. On s'est élevé à la connoissance générale de la nature des acides; on a mieux apprécié l'action de ces substances salines sur les métaux. On a déterminé avec exactitude l'existence de cinq terres pures, différentes les unes des autres; on a étudié les propriétés d'une foule de sels neutres entièrement inconnus autrefois. Un grand nombre d'attractions élastiques ont été découvertes, en un mot la chimie minérale a changé de forme. Le résultat le plus important & le plus utile de tant de travaux, c'est que les instrumens d'analyse ont été multipliés. La carrière s'est tout-à-coup agrandie, & l'analyse minérale a singulièrement gagné. On peut prouver facilement cette assertion par l'exposé succinct des moyens analytiques, que possède aujourd'hui l'art chimique, pour examiner les terres, les pierres, les sels, les matières métalliques & les bitumes.

A. Les terres, après avoir été considérées par leur friabilité ou leur cohérence, leur pesanteur, la couleur, la saveur, la forme de leurs molécules, sont connues par l'action que le calorique exerce sur elles, par leur fusibilité ou leur infusibilité, leur calcination, leur cohérence, la perte qu'elles font, la densité qu'elles acquièrent, l'espèce de verre qu'elles forment; on les examine au feu, soit dans des creusets de diverse nature & à différentes températures, soit au soufflet d'air vital ou au chalumeau sur différens supports. On les traite seules ou avec différens mélanges de potasse ou de soude, de borax, de phosphate de soude, ou même de terres pures & bien connues. On les expose plus ou moins long-temps à l'air sec ou humide; on les lessive dans l'eau, pour en séparer les portions salines ou végétales qu'elles peuvent contenir; on détermine la forme qu'elles prennent avec ce liquide, la pâte qu'elles consistent, le liant qu'elles prennent, la force nécessaire pour en séparer l'eau. On les traite ensuite par les acides qui en dissolvent des por-

tions différentes; on emploie sur-tout l'acide nitrique qui enlève la craie, la magnésie, l'alumine, ensuite l'acide muriatique qui sépare & dissout l'oxide de fer qui souvent y est contenu. Après ces agens, il reste ordinairement de la filice que l'on reconnoît par le verre transparent qu'elle forme avec le carbonate de soude qui fait effervescence au moment où la vitrification s'opère. Cette analyse qui demande ordinairement du temps & de la patience, est immédiatement utile à la minéralogie, dans laquelle elle détermine la place que doit occuper une terre; aux arts de la porcelaine, de la faïence, de la briquetterie, &c., qu'elle éclaire sur le choix des terres qui leur conviennent, & sur leur purification; à l'agriculture qui acquiert par-là une connoissance exacte de la nature des divers sols confiés à son exploitation. (Voyez le mot TERRES.)

B. L'analyse des pierres est infiniment plus difficile & plus longue que celle des terres, parce qu'elle doit agir sur des substances qui obéissent à une attraction beaucoup plus forte, & parce qu'elle doit détruire des combinaisons très-intimes entre diverses terres & les oxides métalliques, combinaisons auxquelles la nature a employé des siècles entiers, & qui semblent en assurer l'indestructibilité. Aussi cette espèce d'analyse est-elle le fruit des dernières découvertes, des derniers travaux des plus habiles chimistes. Elle exigeoit une foule de découvertes & d'analyses préliminaires, dont la chimie ancienne ne soupçonnoit pas même la possibilité. Port est le premier qui ait entrepris un examen suivi des pierres; encore dans son travail lithogéognosique, n'a-t-il essayé cet examen que par l'action du feu. M. d'Arcet a donné beaucoup plus d'étendue à ce travail dans ses essais sur l'action d'un feu long & égal. Macquer & M. Baume ont poursuivi ces recherches. M. Cadet a examiné les pierres volcaniques ou les laves par plusieurs acides. MM. Bayen & Bergman ont ouvert une nouvelle carrière, en appliquant les acides & les alcalis à l'analyse de toutes les pierres. M. Bayen a commencé à traiter les pierres composées & mélangées par une longue macération dans les acides sulfurique & muriatique; & il a fait voir qu'à l'aide du temps on pouvoit ainsi séparer les différentes espèces de terres contenues dans les pierres, & sur-tout l'alumine & la magnésie qui sont si souvent combinées intimement avec la filice & la chaux dans les composés pierreux. Bergman & M. Acharn ont été encore plus loin, en nous apprenant à analyser les pierres les plus dures, les quartz, les fîxels, les agates & jusqu'aux cristaux gemmes. Les acides les plus forts & aucun dissolvant n'ayant d'action sur les pierres, ces habiles chimistes ont senti qu'il falloit d'abord travailler à diminuer leur forte aggrégation, & ils y ont réussi par la fusion préliminaire avec l'alcali caustique. Quand une fois la pierre a été divisée & atténuée par cette combinaison alcaline, on

réduit la masse en poudre ; on la broye même sur le porphyre ; on la lessive pour enlever tout l'alcali, & alors les acides agissent sur la substance pierreuse qui est réduite par cette opération à l'état d'une espèce de terre. On voit qu'après cette opération préliminaire, l'analyse de la pierre ressemble à celle des terres. Les articles LITHOLOGIE, PIERRES, GEMMES, & ceux de plusieurs des pierres en particulier, offrent les détails des travaux des chimistes sur chacune d'elles.

C. Les substances salines ont été singulièrement examinées par les chimistes, & ont donné naissance à tant de découvertes, que c'est peut-être dans toute la science la partie la plus avancée & la plus complète. Il s'en faut bien encore cependant qu'elle soit terminée : plus on avance dans cette carrière, & plus elle s'agrandit ; mais au moins les pas y sont assurés, la marche y est tracée, & les recherches y conduisent sûrement à des résultats exacts. Toute matière saline à laquelle on avoit autrefois trop légèrement donné, comme caractères exclusifs, la saveur plus ou moins forte & la dissolubilité, puisqu'il y a beaucoup de sels qui ne sont ni sensiblement sapides ni très-manifestement dissolubles, peut promptement & par des moyens simples d'analyse, être rapportée ou aux sels primitifs, ou aux sels secondaires ou neutres. Les premiers sont bientôt reconnus pour des acides ou des alcalis par des expériences décisives. Pour les seconds, il faut par une double analyse en déterminer & l'acide & la base terreuse, alcaline ou métallique. Quant à l'aide de la forme, de la saveur, des divers acides, des alcalis, des terres, des métaux les plus originaux, on est parvenu à déterminer la nature de l'acide & de la base qui forme un sel neutre ; il faut ensuite en composer un de toutes pièces, & voir si celui qu'on a fait, se comporte dans tous les essais, comme celui qu'on a analysé. Ce n'est qu'autant que ces deux résultats se rapportent parfaitement, qu'on peut tirer une conclusion positive de son analyse, & on doit même la pousser jusqu'à déterminer la proportion des deux principes de ce sel. Ainsi, sous ce point de vue, l'examen & la décomposition chimique des sels neutres ne sont pas très-difficiles, & les moyens pour y parvenir, sont très-connus. Il n'en est pas de même de plusieurs acides minéraux. Sur dix de ces sels connus aujourd'hui, il n'y en a que six dont on ait déterminé la nature, savoir l'acide sulfurique, l'acide nitrique, l'acide carbonique, l'acide arsénique, l'acide tartrique & l'acide triolydique. On fait, soit en décomposant & formant à volonté cinq de ces sels, soit en formant seulement de toute pièce l'acide carbonique, qui n'a pas encore pu être décomposé parce qu'on ne connoît pas de corps qui ait plus d'affinité avec l'oxygène qu'en a le carbone, on fait qu'ils sont tous formés par une base ou ra-

dicalacidifiable, ordinairement combustible, différente dans chacun d'eux, unie au principe acidifiant ou à l'oxygène, chacune dans une proportion différente ; le soufre dans l'acide sulfurique, l'azote dans le nitrique, le carbone dans l'acide carbonique, l'arsenic, le tungstène & le molybdène dans les acides arsénique, tartrique & molybdénique. C'est avec des corps combustibles qui ont une tendance très-forte pour absorber l'oxygène, & sur-tout du charbon, du phosphore, de l'hydrogène, des métaux, qu'on parvient à analyser ou à décomposer plus ou moins promptement les acides précédemment indiqués. Il en reste encore quatre sur lesquels les expériences modernes n'ont encore rien offert par rapport à leur nature. Ce sont les acides muriatique, fluorique, boracique & succinique. On pressent que ce dernier rapproché des acides végétaux par beaucoup de caractères, est composé comme eux d'hydrogène, de carbone & d'oxygène. Mais il y a loin de ce soupçon à une démonstration bien établie. On ne fait ni si cette première opinion est vraie, ni s'il n'y a pas d'autres principes unis à ces trois éléments connus des acides végétaux, ni dans quelle proportion ils sont combinés. Il paroît que le radical muriatique est un corps qui a une grande affinité pour l'oxygène, puisqu'aucun de ceux que l'on fait avoir le plus d'attraction pour ce principe, ne peut le séparer, puisqu'au contraire l'acide muriatique enlève l'oxygène à beaucoup d'autres corps, & notamment à l'acide nitrique & à la plupart des oxides métalliques. M. Girtanner vient à la vérité d'écrire à M. Pelletier, (novembre 1791) qu'il étoit parvenu à connoître la nature de l'acide muriatique, que c'étoit un composé d'hydrogène & d'oxygène ; mais cette assertion que j'avois moi-même avancée seulement comme une hypothèse dans un de mes cours, il y a plus de six ans, n'est pas encore appuyée à beaucoup près d'un assez grand nombre de preuves, pour la ranger à côté de celles qui dérogent la nature des autres acides analysés ; ou au moins M. Girtanner n'a encore fait connoître aucune des expériences qui l'ont conduit à ce résultat, & il y a lieu de croire qu'il aura pu être trompé par une décomposition d'eau, qui a souvent lieu dans les diversités d'épreuves que l'on fait subir à l'acide muriatique, même dans l'état de gaz, ou dans celui de sel neutre. Les mêmes difficultés se présentent par rapport aux acides fluorique & boracique. Aucun des moyens ou des instrumens employés jusqu'ici avec succès pour décomposer les acides sulfurique, nitrique, arsénique, &c., n'ont réussi, pour décomposer ces deux acides minéraux, soit qu'on ne les ait point encore convertiblement appliqués aux acides fluorique & boracique, soit qu'ils n'aient réellement pas à leur égard la puissance décomposante. On est donc forcé de les regarder dans l'état actuel de la chimie, comme des composés oxygénés, dont les

radicaux ont plus d'affinité avec l'oxygène, que n'en ont le charbon, l'hydrogène, &c.

Il faut en dire autant des alcalis fixes. Quoi qu'il y ait des raisons, pour penser d'après la décomposition de l'ammoniaque, que l'azote est un des principes de ces sels, comme on l'a dit aux articles *alcalis* & *ammoniaque*; il s'en faut cependant de beaucoup que cette partie de l'analyse soit avancée autant qu'il seroit à désirer qu'elle le fût. On peut même dire que les moyens ou les méthodes d'analyse ne sont point encore trouvées pour ce travail, & que ce ne sera pas par les expériences faites jusqu'à présent sur ces substances qu'on en viendra à bout. Ainsi l'on voit qu'il reste encore beaucoup de choses à faire dans l'analyse des matières salines, en ne parlant même que de celles dont un grand nombre de propriétés sont connues, & sans même y comprendre celles qui pourront être découvertes par la suite dans le règne minéral.

D. La science est bien plus avancée sur les matières métalliques, qu'elle ne l'étoit il y a un demi-siècle. Depuis trente ans, on a découvert un grand nombre de substances métalliques. Il paroît même que les découvertes en ce genre ne sont pas terminées, & qu'on peut espérer de les voir s'accroître tous les jours. Il ne peut pas être question de l'analyse des métaux, puisqu'il faut tout ce qu'on a trouvé de nos jours en chimie, nous porte à penser que ces corps ne sont pas décomposables, & se comportent dans nos expériences comme des matières simples. Ce n'est pas cependant qu'on puisse assurer & que l'on ait jamais dû penser ou dire que les métaux sont en eux-mêmes des corps simples. Une pareille opinion ne nous a jamais été personnelle, & ceux qui l'ont attribuée aux chimistes françois qui ont chargé la face de la science par le rapprochement des nouvelles découvertes & par les inductions générales qu'ils en ont tirées, ne les ont pas sans doute bien compris. De ce qu'ils ont prétendu que les métaux ne sont en aucune manière décomposés dans les diverses opérations qu'on leur fait subir, ils n'en ont pas senti que les métaux sont des corps simples, des éléments, ni même qu'on ne parviendroit pas quelque jour à leur faire subir la décomposition à laquelle ils ont en quelque sorte échappé jusqu'aujourd'hui; mais seulement qu'au lieu de les décomposer, comme on croyoit l'avoir fait autrefois, on les avoit au contraire combinés avec d'autres corps. Ainsi il faut conclure des observations très-exactes des modernes, que les principes inconnus qui composent les métaux, que les éléments qui entrent immédiatement dans leur formation, sont si adhérens, si intimement combinés, qu'aucune autre matière n'a pu encore les désunir, & conséquemment que leur analyse n'a point été faite. Il est même facile d'apercevoir que la méthode propre à faire cette analyse des métaux, est elle-même parmi les objets les

plus inconnus & les plus éloignés de l'état de la science. Mais si les métaux n'ont pas pu être analysés, si la méthode propre à conduire à la connoissance de leurs principes, est loin d'être trouvée, en revanche les compositions métalliques, que la nature offre en si grande quantité dans les entrailles de la terre, & qu'on connoît sous le nom de *mines*, ainsi que celles des compositions si variées, que les procédés des arts créent pour leurs besoins, sont pour les chimistes autant d'objets intéressans d'analyses. Ici l'on doit ranger l'examen chimique de tous les alliages métalliques naturels ou artificiels, des oxides métalliques natifs, des métaux qui existent sous terre dans leur forme métallique, des sels neutres dont ils sont partie, des sulfures si variés & si nombreux qui se présentent dans les mines & qui en sont la plus grande masse. La minéralogie attend de ces analyses bien faites & de la comparaison de leurs résultats, une marche qui puisse guider ses pas, & éclairer ses méthodes dans la classification des mines, & cette partie de la science minéralogique ne sera complète, que lorsque ces analyses auront été répétées sur les principales mines connues & exploitées dans les diverses régions de la terre. On ne peut plus se borner ici comme on le faisoit autrefois en docimafie à traiter les composés métalliques naturels par la calcination ou le grillage, la réduction à travers les charbons, ou dans des creusets, tout doit être fait avec la plus grande précaution. Il faut employer tous les moyens qui peuvent faire connoître la nature, le nombre & la proportion des diverses substances unies aux métaux dans les mines; il faut en aggrandissant encore les ressources de la docimafie humide, dont Bergman a le premier enseigné à faire une partie précieuse de l'art chimique, traiter les mines par les différens acides qui peuvent en isoler ou en dissoudre les divers principes, soit minéralisateurs, soit minéralisés. On ne doit point se contenter de rechercher la métal ou les métaux qui y sont contenus, & négliger la nature & la proportion des minéralisateurs. Sous ce point de vue, l'analyse des mines en présentant à la vérité plus de difficultés, & en exigeant même de la part de ceux qui s'y livrent une grande étendue de lumières & de connoissances chimiques, promet une ample moisson de découvertes, & des progrès rapides dans la minéralogie. Il faut en dire autant de l'examen de tous les alliages qui sont employés avec tant de succès dans une foule d'arts, & qui malheureusement sont souvent faits d'après les seuls indices d'une routine aveugle & chancelante. L'art des différens départis, qui ne sont autre chose que des espèces d'analyses fondées sur les attractions connues des métaux pour l'oxygène, sur leur plus ou moins difficile oxidation, & sur l'adhérence diverse de leurs oxides pour les acides, est aujourd'hui poussé beaucoup plus loin qu'il

ne l'avoit été autrefois. La chimie possède des moyens sûrs, pour séparer les uns des autres toutes les matières métalliques alliées, pour en déterminer la nature & les proportions ; non-seulement on fait départir le cuivre & les métaux volatils de l'argent & de l'or, l'argent pur de l'or lui-même, mais encore séparer l'argent & l'or du platine, l'étain du plomb, le bismuth du plomb & de l'étain, le fer du cuivre, l'arsenic de toutes les autres matières métalliques, auxquelles il peut être uni. Il n'y a donc pas d'alliage, qui ne puisse être départi & exactement connu, quand même les métaux y seroient plus multipliés qu'ils n'ont coutume de l'être dans ces sortes de combinaisons. La chimie est donc au plus haut point de perfection possible pour l'analyse des composés métalliques, & elle n'a que très-peu de chose à désirer sur ce point.

E. Les bitumes sont des corps inflammables, qu'on a voulu en vain comparer entr'eux, & réunir dans un seul genre. Les minéralogistes commencent à être persuadés qu'il y a presque autant de genres parmi les bitumes, qu'on y comptoit autrefois d'espèces, & qu'ils diffèrent singulièrement les uns des autres. L'analyse chimique paroît devoir offrir le même résultat. La distillation sur-tout montre dans la plupart de ces corps une composition analogue à celle des sucs végétaux, résineux ou balsamiques, d'où ils paroissent manifestement tirer leur origine, & le complément de cette analyse fera quelque jour la détermination précise des substances végétales auxquelles les bitumes doivent leur naissance. Déjà cette décomposition comparée de quelques bitumes, a fait penser qu'il en existoit, dont l'origine pourroit bien avoir été due à des matières animales enfoncées dans les terres au milieu des eaux de la mer. C'est ainsi par exemple que plusieurs minéralogistes François soupçonnent que le charbon de terre est formé par les graisses & les huiles des animaux marins ; & sur-tout des cétacés & des poissons. M. Parmentier a été conduit à cette opinion par la fusibilité & l'état huileux de la plupart des charbons de terre, par l'odeur fétide qu'ils répandent en brûlant, & sur-tout par les sels ammoniacaux qu'ils fournissent. La nature de l'huile & des gaz qui s'en dégagent par la distillation peuvent encore autoriser cette assertion, ainsi que la forme de couches très-nombreuses, appliquées les unes sur les autres qu'on observe dans toutes les carrières où la nature a déposé ce bitume. On peut encore joindre aux preuves précédentes, les coquilles, fossiles & les autres productions marines, que l'on trouve à la surface de ces carrières. Depuis quelques années on a soupçonné que l'ambre gris pourroit bien n'être aussi qu'une production animale ; enfin on croit être peu éloigné de connoître l'origine du succin pour une substance végétale extraite en quelque sorte, ou au moins sollicitée dans son excré-

Chimie. Tome II.

par une espèce de fourni qui l'accompagne constamment. Mais toutes ces assertions, pour être confirmées ou détruites, exigent encore une grande suite d'expériences, qu'on est bien loin d'avoir terminées. Il faudra réunir toutes les ressources de l'analyse la plus exacte, tous les secours, tous les moyens de la chimie, pour établir des comparaisons suivies entre les bitumes & les productions végétales ou minérales, auxquelles ils paroissent être le plus analogues. Outre la distillation, qui a fait presque l'unique moyen d'analyse qu'on leur a appliqué jusqu'à présent, il sera nécessaire de traiter les bitumes par les alcalis, par les acides, par les huiles, par l'alcool, par l'éther, & de traiter en même-temps & absolument de la même manière ceux des sucs huileux, végétaux ou animaux, qui paroîtront avoir avec eux les traits de ressemblance les plus frappans dans leurs propriétés extérieures.

§ IV. De l'analyse végétale.

Il n'y a pas encore trente ans, que la partie de la chimie qui comprenoit les végétaux, étoit entièrement & uniquement composée des principaux procédés des arts qui s'exercent sur les différents produits de ces êtres. La chimie végétale, dans les cours & dans les ouvrages, ne confidéroit alors les végétaux, que par les préparations diverses qu'on leur fait subir dans les arts du pharmacien, du vigneron, du sucrier, du confiseur, du savonnier, du boulanger, du teinturier, &c. Au temps de Rouelle on commença à tirer quelques inductions générales, sur ce qu'on appelloit les principes des végétaux, & cette partie de la chimie dont la plus grande section n'examinait que la seule préparation des remèdes tirés du règne végétal, reçut tout-à-coup un nouveau lustre. On fit à cette époque sur les végétaux & sur les considérations chimiques tirées des procédés des arts qui y étoient relatifs, ce qu'on avoit commencé à faire environ cent ans auparavant, sur les minéraux. L'analyse végétale commença donc à exister, & tous les chimistes s'en occupèrent à l'envi. On recueillit & on compara les expériences de Boulduc, de Geoffroy, de Neumann, de Gaubius, de Cartheuser, de Margraf, de Venel, de Model, de Roux, &c. les deux Rouelles, & sur-tout Rouelle le cadet, firent un grand nombre d'expériences sur les matières végétales ; il résulta de tous ces travaux, une suite de données nouvelles & plus exactes sur les matériaux de ces êtres. Bucquet offrit le premier, dans son introduction à l'étude des corps tirés du règne végétal, un tableau exact & aussi complet qu'il étoit possible alors, de toutes les découvertes chimiques faites dans ce règne, & il disposa le premier dans un ordre méthodique, toutes les connoissances acquises dans leur analyse. Depuis ce chimiste, Scheele a trouvé plusieurs

K k

acides nouveaux dans les produits des végétaux. Un grand nombre d'autres découvertes ont encore été faites sur la composition générale des principes des plantes, sur leur différence d'avec ceux des végétaux & des animaux, sur la présence de la matière albumineuse dans ces êtres, sur la nature de leurs extraits & de leurs parties colorantes, sur leur altérabilité par le feu, sur la combinaison de l'oxigène avec leurs divers principes, sur la manière dont se forment ces principes dans la végétation, sur les phénomènes & la cause des fermentations, sur la formation de l'alcool, des éthers, des acides végétaux, &c. Toutes ces découvertes, entièrement dues aux chimistes modernes, & qui ont découlé naturellement de celles qui les avoient précédées sur les gaz, la combustion, la décomposition de l'eau &c. ont fait une science nouvelle de la chimie végétale. Pour bien concevoir la marche actuelle de cette science dans la connoissance du règne végétal, il faut examiner ce qu'on entendoit autrefois par l'analyse des végétaux par le feu, & par l'analyse par les menstrues; ainsi que les distinctions nouvelles, devenues aujourd'hui nécessaires, d'analyse végétale immédiate ou prochaine, & d'analyse végétale primitive ou éloignée. On a commencé par traiter les végétaux par le feu, & déjà l'on a parlé de cette méthode analytique sur des corps très-composés, dans la première section de cet article. Ce ne fut qu'après plus de vingt ans de travaux, & après la distillation d'une grande quantité de matières végétales différentes, faites par les soins de l'académie des sciences de Paris, qu'on s'aperçut que cette analyse étoit capable de faire naître beaucoup d'erreurs, qu'elle ne donnoit pas les vrais principes contenus dans les végétaux, & qu'elle en formoit de nouveaux. Alors on fit succéder l'application des dissolvans, tels que l'eau, à différentes températures, l'alcool, les acides, pour séparer les uns des autres les différens matériaux contenus dans les substances végétales. L'expression ou l'analyse mécanique, fut employée en même-temps que celle par les menstrues ou les dissolvans, & c'est par ces moyens réunis, qu'on parvint à fixer les idées sur les matériaux qui composent les végétaux. C'est d'après cela qu'on a dit qu'ils étoient formés d'extraits, de gomme ou mucilage, de matière sucrée ou de sels essentiels, d'huile fixe ou volatile, d'arôme, de camphre, de résine, de gomme-résine, de sécu, de gluten, de matières colorantes, &c. Mais tous ces détails n'étoient encore que des espèces d'arts plus ou moins perfectionnés, qui consistoient toujours à séparer des végétaux les différentes matières qui y étoient toutes contenues; on n'avoit presque pas songé encore à pousser les découvertes au-delà de ce terme; Les premiers moyens de l'analyse éloignée des végétaux, n'étoient point encore trouvés; on

ne savoit pas comment ces matériaux divers retirés des végétaux, l'extract, le sel, le sucre, la gomme, l'huile, la sécu, le gluten, &c., différoient les uns des autres. On voyoit bien évidemment que ces matières étoient elles-mêmes très-composées; mais on ne s'étoit point occupé de déterminer l'ordre de leur composition, la nature, la proportion & l'arrangement de leurs principes primitifs. Bucquet avoit bien essayé de commencer ce travail, en examinant les divers produits que chacun de ces matériaux fournissoit par l'action du feu, & en indiquant les principales différences qu'il avoit eu occasion d'observer dans ces produits; mais ce moyen infidèle ne pouvoit lui fournir que des résultats incertains ou erronés, quoiqu'il en ait tiré cependant quelque parti utile. Comment d'ailleurs pouvoit-on songer à l'importance de ce travail, quand d'une part on croyoit tout fait dans l'analyse végétale, en séparant exactement les matériaux composés que les plantes contenoient, quand par rapport à la composition de chacun d'eux, on le contrentoit de ces idées vagues sur l'union du feu, de l'air, de l'eau & de la terre, ou de ces élémens auxquels on croyoit qu'on arrivoit toujours par une dernière décomposition? Il falloit avant bien distinguer les propriétés de l'oxigène, de l'hydrogène, du carbone, de l'azote, il falloit trouver les moyens d'en reconnoître l'existence, & d'en déterminer les quantités respectives; ces moyens ne sont trouvés que depuis la découverte de l'action de l'acide nitrique, de l'acide muriatique oxigéné, & sur-tout depuis l'invention des machines destinées à la combustion des huiles, de l'alcool, de l'éther; il n'y a que quelques années qu'on les possède, & à peine a-t-on commencé les expériences très nombreuses qui seront nécessaires pour obtenir des résultats que l'on cherche dans ce genre de travaux: il a donc bien fallu s'en tenir, jusqu'à présent, à extraire seulement les matériaux des végétaux, qu'on a nommés principes immédiats; encore cette première analyse, dont le complément pourroit être si utile aux chimistes & à tous les arts chimiques, est-elle bien loin d'être amenée au point de perfection où en desiré qu'elle parvienne. On n'a guère appliqué encore cette méthode analytique, qu'à quelques végétaux utiles en médecine, ou à quelques seuls extraits des arbres ou des plantes, employés comme remède. Encore si l'on veut porter un jugement exact sur ce qu'on a fait à cet égard, reconnoitra-t-on qu'il s'en faut de beaucoup qu'on ait épuisé toutes les ressources de l'analyse immédiate sur les végétaux les plus utiles. On pourroit même dire que les plantes les plus communes & les plus employées même comme alimens, telles que les choux, les carottes, les navets, les oignons, l'oseille, &c., ne sont pas encore connues, & qu'on n'a que quelques faits chimiques sur chacune d'elles, au lieu d'en posséder

féder une analyse exacte. Pour obtenir ce point si désiré, il faudroit avoir examiné les végétaux par différens degrés de chaleur, par l'eau à différentes doses & à diverses températures, par les acides, les alcalis, &c.; il faudroit en avoir extrait tous les matériaux immédiats, les extraits, la gomme, le sucre, la fécule, les sels, le gluten, la partie colorante, les huiles, &c. en avoir déterminé la proportion; en un mot, il seroit indispensable de comparer tous ces résultats à ceux que fournissent les plantes analogues. N'est-il pas étonnant par exemple que malgré tous les essais d'analyse qu'on a déjà tenté à cet égard, on n'ait rien dit de la plus grande partie de la masse des végétaux fecs, de la partie ligneuse; à la vérité ce travail seroit immense; il exigeroit une foule de collaborateurs, qui fussent en même-temps occupés de l'analyse végétale, & qui suivissent absolument la même marche, la même méthode, pour que leurs résultats fussent comparables Sans prétendre diriger la méthode qu'ils devroient suivre, qu'il me soit permis d'offrir ici le tableau d'une analyse chimique que j'ai faite il y a quelques années sur une espèce de quinquina de S. Dominique, comparée à celle d'une espèce de quinquina du Pérou. Si ce n'est point une méthode que j'ai faite ici, ce sera au moins une esquisse de ce qu'on peut espérer d'un travail exact.

ANALYSE

D'UN NOUVEAU QUINQUINA DE SAINT-DOMINGUE, ET DU QUINQUINA ROUGE DU PÉROU, POUR SERVIR À CELLES DES MATIÈRES VÉGÉTALES SÈCHES EN GÉNÉRAL.

I. Forme & couleur.

Cette écorce est roulée sur elle-même, & forme des cylindres de six à sept pouces de long, & de trois à quatre lignes d'épaisseur; sa surface extérieure est grise, & la demi-transparence de l'épiderme laisse appercevoir une nuance verdâtre. L'intérieur des cylindres présente diverses couleurs; tantôt il est simplement vert, tantôt des bandes pourpres sont marquées sur ce vert; quelquefois il est d'un blanc laiteux comme de la craie de Briançon, & souvent il n'y a qu'une couleur brune. Si on enlève l'épiderme de cette écorce, on aperçoit une matière qui présente aussi plusieurs couleurs; souvent elle est verte, jaunie de jaune, & quelquefois brune; cette matière est facile à ramollir, la chaleur & la pression des doigts suffisent pour cela.

II. Saveur & odeur.

Cette espèce de quinquina a une saveur extrêmement amère, âcre & désagréable; cette saveur a plus d'analogie avec celle de la coloquinte & de l'absynthe qu'avec celle d'aucune

autre substance végétale; & on ne peut pas la comparer à celle du quinquina du Pérou, dont elle n'a point du tout la qualité astringente. L'odeur de cette écorce est aussi très-forte, très-pénétrante; elle est mêlée de celle qu'on nomme en général odeur de vert & d'une odeur nauséuse un peu fétide, qui a la plus grande analogie avec celle que répand l'écorce du nerflier.

III. Dessication.

Une livre de quinquina exposée pendant huit jours sur le four d'un pâtissier, dans un tamis de crin reconvert d'une feuille de papier gris percée de quelques trous, a perdu à cette chaleur de trente à trente-cinq degrés un seizième de son poids. Ce même quinquina, pulvérisé, exposé dans des vaisseaux fermés à la chaleur de cinquante degrés, n'a pas donné une seule goutte de liquide dans le récipient. Le contact de l'air & son attraction pour l'eau est donc le seul agent de la dessication.

IV. Pulvérisation.

On ne parvient que difficilement à le réduire en poudre, il est comme ductile sous le pilon, & forme une masse qui s'attache fortement au mortier; mais après avoir été exposé à la chaleur du four, ses parties intégrantes se séparent & passent par le tissu le plus fin du tamis. L'eau contenue dans cette écorce est donc un moyen de réunion & d'adhérence pour les molécules du quinquina. La poudre du quinquina de Saint-Domingue, desséchée, est d'une couleur verdâtre, & d'une odeur très-forte & très-tenace. En pulvérisant cette écorce sèche, la ténacité de ses molécules est assez grande pour qu'elles soient emportées par l'air, & pour qu'elles répandent à une assez grande distance l'odeur nauséuse, & la saveur amère très-désagréable qui la caractérise, comme cela a lieu dans l'aloes.

V. Première macération dans l'eau.

Une once de cette écorce, grossièrement pulvérisée, a été mise dans un vaie de verre avec quatre onces d'eau distillée, & ce mélange a été abandonné à lui-même l'espace de quarante-huit heures, dans un lieu dont la température étoit de treize degrés au thermomètre de Réaumur. Au bout de vingt-quatre heures, l'eau avait acquis une couleur rouge très-foncée, & une faveur très-amère; les quarante-huit heures écoulées, on a filtré le liquide. Le quinquina avait pris à sa partie supérieure une couleur brune foncée, & une couleur verte à sa partie inférieure. Cette macération ne rougissait point le papier teint avec le tournesol, elle sembloit au contraire le verdit; un morceau de sulfate de fer bien pur

y faisoit naître sur-le-champ une couleur verte foncée, & même noireâtre, qui se précipitoit très-promptement : l'eau de chaux y a fait un précipité verdâtre, & la liqueur éclaircie avoit une couleur fauve. Le suc devient noir par le contact de cette liqueur, & en frottant une lame de ce métal avec la poussière de cette écorce & un peu d'eau, elle prend aussi une couleur noire.

VI. Seconde macération dans l'eau.

Ces faits, semblant annoncer la présence de l'acide gallique dans le quinquina de Saint-Domingue, on a exposé à l'air un mélange de huit onces de cette écorce en poudre, avec six livres d'eau de fontaine froide, afin de savoir si ce n'étoit pas un moyen d'en séparer l'acide gallique pur, comme cela a lieu pour la noix-dégalle dans l'expérience de Scheele. Cette macération, au bout de quelques jours, étoit couverte d'une grande quantité de houpes de mucor vert; il s'est ensuite formé une pellicule noire sur laquelle avoient aussi végété des mucors verts & jaunes. On a enlevé cette pellicule; elle avoit environ une demi-ligne d'épaisseur, & offroit une matière très-gluante en dessous. Un mois après, la même liqueur a offert de nouveau une pellicule noire & cassante, mais sur laquelle il n'y avoit plus de mucor : cette pellicule étoit beaucoup plus mince que la première, la liqueur qu'elle couvroit avoit une couleur noire, & ne paroissloit pas au premier coup d'œil beaucoup plus épaisse qu'avant son exposition à l'air; cependant, elle avoit perdu au moins les trois quarts de son volume, elle n'avoit point de mauvaise odeur, & ne sembloit pas avoir souffert d'altération dans ses principes. Sous cette liqueur étoit une matière brillante des diverses couleurs de l'iris; agitée avec une baguette de verre, elle indiquoit quelque chose de muqueux, & étoit à-peu-près comme une résine liquide. La faveur de cette liqueur évaporée spontanément, étoit beaucoup moins amère qu'avant qu'elle fut épaissie, & qu'on en eut séparé les pellicules. Le liquide réduit au volume de cinq à six onces, par cette évaporation spontanée, a présenté des cristaux cubiques comme ceux du muriate de soude ordinaire, mais dont la faveur étoit plus piquante & plus amère; à cette même époque l'alcool versé dans la liqueur en a séparé une matière grise gluante, formant une masse ductile & tremblante comme du mucilage épais de graine de lin; elle n'avoit qu'une légère faveur amère; elle s'unissoit aisément à l'eau, & ressembloit à une dissolution de gomme. Mises sur un papier immédiatement après sa séparation par l'alcool, elle s'est ramollie, a pris un coup d'œil brillant, & s'est entièrement desséchée en quelques heures. Cette matière est un véritable mucilage, car elle fournit par l'action du feu une grande quantité d'acide pyro-

muqueux, peu d'huile, & point d'ammoniac. En séparant ce mucilage du quinquina macéré, l'alcool avoit dissous une matière qui lui donnoit une couleur rouge très-foncée; l'eau précipitoit de cette dissolution des flocons jaunâtres qui s'élevoient à la partie supérieure de la liqueur. Les pellicules traitées par l'alcool ont fourni les mêmes résultats que la liqueur; une portion s'est unie à l'alcool, l'autre purement gommeuse s'est refusée à cette union, & l'eau séparoit de la dissolution alcoolique des flocons semblables à ceux qu'on vient de décrire. Le quinquina a perdu par cette macération un quart de son poids. Parmi les diverses substances que l'eau, aidée par le contact & la chaleur de l'air atmosphérique, a séparées du quinquina de Saint-Domingue, il ne s'est point présenté à nous des cristaux d'acide gallique, & il ne paroît pas que cet acide, déjà soupçonné dans cette écorce, puisse jamais être mis à nud par une expérience aussi simple : il y est sans doute en trop petite quantité, & il est en partie détruit avant que la liqueur soit assez évaporée pour qu'il cristallise; la distillation a été aussi employée en vain pour l'extraction de l'acide gallique, & l'eau qu'on a obtenue n'avoit d'autre propriété qu'une légère odeur de quinquina.

L'infusion n'offre rien de plus fur la nature du quinquina, si ce n'est qu'elle extrait une plus grande quantité de ses principes, & que l'écorce perd un tiers de son poids, en employant la même quantité d'eau chaude.

VII. Décotion dans l'eau.

Le quinquina de Saint-Domingue, plongé pendant quelques momens dans l'eau bouillante, se déroule, s'étend en tout sens, & son épaisseur est alors au moins d'une ligne, tandis qu'auparavant elle a tout au plus une demi-ligne.

Comme en général il est d'autant plus difficile de séparer les parties des végétaux solubles dans l'eau, que leur aggrégation est plus intime, on a opéré sur ce quinquina réduit en poudre grossière.

On a pris une livre de cette poudre, sur laquelle on a fait bouillir en douce fois successives trois cents vingt livres d'eau distillée; chaque décoction a duré un quart-d'heure. La première s'est fortement colorée en rouge brun; elle a beaucoup écumé, & a présenté en quelque sorte les propriétés d'une dissolution analogue à celle de l'écorce de merisier : sa faveur étoit extrêmement amère. Cette liqueur évaporée à une chaleur douce dans un vase de terre, a fourni cinq onces sept gros d'un extrait rouge brun & bien sec.

La seconde décoction faite avec vingt-six livres douze onces d'eau comme la précédente & les suivantes, s'est moins colorée & a moins écumé; elle étoit trouble & sembloit tenir en suspen-

don une matière rouge pulvérulente : le produit de celle-ci évaporée a été de neuf gros deux grains ; il paroîtroit parfaitement semblable au premier.

La troisième a moins coloré l'eau, a encore moins mouffé que la seconde, & n'exhaloit presque plus l'odeur de l'écorce de nerflier ; elle n'a donné que 1 gros 56 grains d'extraît.

Les phénomènes qu'on présente les neuf autres décoctions ont toujours été les mêmes, ils devenoient seulement moins sensibles à mesure qu'on avançoit ; la dernière décoction n'avoit pas plus de faveur ni de couleur que de l'eau distillée ; la matière enlevée au quinquina par ces neuf dernières décoctions, & obtenue par leur évaporation, pesoit 1 once 6 gros 70 grains. Le produit extrait des douze décoctions successives d'une livre de quinquina de Saint-Domingue, étoit en tout à la quantité de 9 onces 56 grains ; le quinquina avoit pris par ces ébullitions multipliées une couleur rougeâtre, & il ne pesoit plus que 6 3 13 38 gr. après avoir été séché, tandis qu'il auroit dû peser 6 onces 7 gros 16 grains ; il avoit donc perdu par la distillation 5 gros 50 grains.

VIII. Observations sur quelques phénomènes qui ont lieu pendant les décoctions.

A. Le quinquina prit dans sa première décoction une couleur plus verte que celle qu'il avoit dans l'état sec ; mais chaque fois qu'il touchoit à l'air, encore chaud & humide, une couleur rougeâtre remplaçoit la verte, & après avoir subi les douze décoctions, il n'y avoit plus qu'une couleur sauve. A cette époque, on pensoit que ce changement tenoit à la fixation de l'oxygène dans le résidu du quinquina, & des expériences ultérieures ont en effet confirmé cette opinion.

B. D'autres effets ont lieu si on ne fait pas évaporer les décoctions immédiatement après qu'elles sont faites, & si on les laisse tranquillement refroidir. Voici ce que nous ont présenté ces douze décoctions successives, faites sur une livre de quinquina de Saint-Domingue, traité avec la même quantité d'eau à-la-fois, & absolument de la même manière : ces décoctions ont laissé déposer au fond des vases une matière noire, riote & filante, qui ne paroîtroit pas dissoluble dans l'eau froide. La quantité de cette matière a diminué dans chaque décoction successive, & les dernières décoctions n'en ont plus fourni sensiblement ; la première a donné 2 onces de cette matière séchée ; la seconde en a fourni une once 2 gros ; la troisième, 7 gros ; la quatrième, 4 gros ; la cinquième, 2 gros ; la sixième, 1 gros. Les 6 autres n'ont plus rien précipité. Comme la livre de ce quinquina donne par les décoctions évaporées immédiatement, environ 9 onces & quelques grains de produit sec, on voit qu'en laissant refroidir, il reste dans l'eau de ces décoctions une bonne partie des principes enlevés

au quinquina par ce dissolvant ; puisqu'il ne s'en précipite que 5 onces, il doit en rester 4 onces 56 grains dans les liqueurs. On a fait évaporer ces douze décoctions réunies après la précipitation de la matière décrite ci-dessus ; lorsque l'évaporation a été à-peu-près à la moitié de la liqueur, il s'est déposé par le refroidissement une once de matière noire & filante ; évaporée ensuite jusqu'à la réduction de 2 à 3 livres, la liqueur a déposé encore 1 once 2 gros de la même matière. La liqueur avoit alors une consistance assez forte, un aspect mucilagineux, & ne déposoit plus rien par l'évaporation & le refroidissement ; on l'a mêlée avec le double de son poids d'alcool, il s'en est séparé une matière blanchâtre, gluante, manifestement mucqueuse ; lavé à plusieurs reprises avec l'alcool, ce mucilage pesoit une once après avoir été desséché.

C. Il suit de cette manière de séparer par le refroidissement la substance enlevée au quinquina de Saint-Domingue, par les douze décoctions, 1°. que cette substance en a été précipitée à la dose de 7 onces 2 gros, sous la forme d'une matière comme poisseuse lorsqu'elle étoit encore humide ; 2°. que la dernière liqueur évaporée à la quantité de 2 à 3 livres, devoit encore en contenir 1 once 6 gros 56 grains, si nous supposons que ces décoctions faites avec la même quantité d'eau, & absolument par les mêmes procédés que dans la première expérience, devoient contenir la même quantité de matière ; 3°. qu'il y avoit de plus sur cette quantité de 1 3 6 56 grains restans dans la dernière liqueur, une once de mucilage que l'alcool en a séparé. Cette dernière séparation annonçant que la matière dissoute dans l'eau n'étoit pas d'une seule espèce, & que l'alcool pouvoit servir à isoler les uns des autres les différens principes contenus dans le produit dissous ou précipité des décoctions, nous avons traité la substance précipitée de ces liqueurs refroidies par l'alcool.

D. Cette substance séparée par le refroidissement des différentes décoctions sous la forme d'une matière brune & filante, pesoit en tout 7 onces 2 gros après avoir été desséchée. On a versé, sur ces 7 onces 2 gros une livre d'alcool à 39 degrés, on a échauffé cette liqueur jusqu'à l'ébullition ; une grande partie de la matière a été dissoute, il n'est resté que 3 gros d'une poudre du plus beau rouge, laquelle lavée avec 8 onces d'eau, n'a perdu qu'un tiers de son poids, & la couleur est devenue encore beaucoup plus belle ; la substance que l'eau lui avoit enlevée n'avoit presque pas de couleur ; c'étoit un gros de mucilage semblable à celui que l'alcool avoit précipité de la liqueur des décoctions évaporées dont nous avons parlé (serre B). On voit donc déjà que la matière enlevée au quinquina par l'eau bouillante, contenoit trois substances différentes ;

une soluble dans l'alcool, & d'une couleur brune; une seconde dissoluble dans l'eau, & peu colorée, de la nature des mucilages; & une troisième indissoluble dans l'eau & dans l'alcool, & d'une couleur rouge. Ces deux dernières, séparées & sous forme sèche, étoient déjà pures & pouvoient être regardées comme des principes bien isolés; mais il pouvoit n'en être pas de même de la première, qui étoit dissoute dans l'alcool, & il étoit nécessaire de connoître cette dissolution. Comme ce que l'alcool avoit dissous de la matière entière déposée par le refroidissement, devoit être de même nature que celle qui restoit dans la liqueur évaporée des décoctions cui avoit été mêlée avec le double de son poids d'alcool, lettre (B), on a mêlé ces deux dissolutions alcooliques pour les examiner ensemble, & pour avoir une proportion exacte des principes contenus dans la totalité des matières enlevées au quinquina de Saint-Domingue par la décoction dans l'eau. En se rappelant que cette dissolution devoit contenir 9 onces 56 grains de produit, moins 1 once 1 gros de mucilage blanchâtre, & 2 gros de poudre rouge, & conséquemment 7 onces 5 gros 56 grains, nous devions retrouver ce produit. On a employé les procédés suivans pour connoître la nature de cette dissolution alcoolique: on l'a laissée exposée à l'air dans un vase de verre de large ouvert; au bout de quelques jours elle a déposé sur les parois du vase une substance légèrement colorée en jaune, formée de petites molécules cristallines, brillantes & comme salines du poids d'un gros. Après avoir ramassé cette substance, dont l'aspect sembloit annoncer la nature saline, & lorsque la dissolution n'en a plus déposée, on y a mêlé le double de son poids d'eau distillée; d'abord ce mélange n'a présenté aucune précipitation, mais quelques heures après, une grande quantité de flocons d'un blanc jaunâtre s'en séparèrent, & vinrent à la surface de la liqueur. Ces flocons séparés, lavés & séchés, pesoient 1 gros 12 grains; enfin, la dissolution alcoolique, qui ne précipitoit plus du tout par l'eau, a été évaporée à une chaleur douce, elle a donné 7 onces 44 grains de ce résidu, il y a donc eu 3 gros de perte; car on auroit dû avoir 7 onces 3 gros 44 grains: il est vraisemblable que cette perte étoit due à la dessiccation (12). Après avoir analysé, ou plutôt isolé les uns des autres les différens principes contenus dans les décoctions du quinquina de Saint-Domingue, & obtenus par le refroidissement de ces décoctions, nous avons cru devoir faire les mêmes opérations sur le produit entier des décoctions évaporées sans refroidissement préliminaire dans l'expérience décrite précédemment n°. VII. Nous avons traité les 9 onces 56 grains de ce produit par une livre d'alcool chaud; il s'en est dissous plus de 7 onces $\frac{1}{2}$; il est resté pres d'une once & demie de matière indissoluble, de laquelle nous avons séparé à-peu-près une once

de macilage, & deux gros de poudre rouge; la dissolution alcoolique évaporée spontanément a donné de même la matière d'apparence saline d'à-peu-près 1 gros; l'eau en a ensuite également précipité des flocons jaunâtres, & l'évaporation à séché, a fourni plus de 7 onces $\frac{1}{2}$ de résidu. Nous remarquons que cette analyse de ce qu'on a appelé aujourd'hui l'extract de quinquina fait par l'eau bouillante, n'est pas aussi facile que celle des précipités des décoctions; on n'en retire les différens principes qu'avec plus de peine, parce que tous ces principes sont plus intimement liés; mais l'identité de ces principes dans l'un & l'autre cas, & le rapport même assez exact de leur poids, ne peut laisser aucun doute sur leur analogie. Nous concluons donc de ces deux expériences suivies & comparées, 1°. qu'une livre de quinquina de Saint-Domingue sec & épuisé par des décoctions successives avec 320 livres d'eau distillée, donne 9 onces 56 grains d'une matière composée, nommée peut-être très-improprement extrait; 2°. que ce prétendu extrait peut être séparé en plusieurs matières par le moyen de l'alcool chaud; 3°. que ces matières sont au nombre de cinq, dont les proportions sont les suivantes:

1°. Substance dissoluble dans l'alcool.....	7 3 0 34 48.
2°. Mucilage.....	1 1 "
3°. Poudre rouge.....	" 1 "
4°. Matière d'apparence saline.....	" 1 "
5°. Flocons indissolubles dans l'eau.....	" 1 12
Perte.....	" 3 "
	9 3 0 36

Nous n'avons pas cru devoir désigner par des noms particuliers les différentes matières séparées de l'extract entier de ce quinquina; ces noms ne doivent être donnés qu'après avoir examiné les propriétés caractéristiques de chacune d'elles. Nous allons traiter actuellement cet objet, en désignant ces matières par les caractères suivans: 1°. le mucilage; 2°. la substance d'apparence saline; 3°. la matière floconneuse; 4°. la substance en poudre rouge; 5°. la substance brune, filante, & la plus abondante.

IX. Analyse des différentes matières séparées de l'extract par les opérations ci-dessus.

A. La matière que l'alcool a précipitée (le mucilage) des décoctions concentrées (B) n'a voit presque pas de saveur; sa couleur étoit brune après la dessiccation, & elle n'avoit nulle odeur. Elle s'unissoit facilement à l'eau, & sa dissolution moussoit comme celle d'une gomme. Distillée à feu nud, elle a donné un fluide élastique com-

posé de gaz hydrogène &c. d'acide carbonique, une liqueur jaunâtre qui étoit de l'acide pyromurique, & sur laquelle nageoit un peu d'huile. La chaux mise dans ce produit n'a point développé l'odeur d'ammoniaque; son charbon étoit léger, poreux & volumineux.

B. Matière d'apparence saline.

La substance qui s'est séparée spontanément de la dissolution alcoolique de l'extrait, étoit comme on l'a déjà dit, cristalline, brillante comme une substance saline; elle n'a point de saveur bien marquée, elle croque sous les dents, elle ne se combine plus avec l'alcool, elle se dissout dans l'eau chaude, & trois grains ont été parfaitement dissous dans deux onces d'eau bouillante. Cette dissolution étoit très-claire. L'eau de chaux ne la troubloit pas sur le champ, seulement elle en développoit la couleur. Quelques jours après, il s'y étoit formé un précipité fauve. Les alcalis caustiques liquides s'y unissent avec rapidité, & il en résulte une liqueur brune; sa distillation fournit de l'ammoniaque, un sègne jaune, des fluides élastiques, composés de gaz hydrogène & d'acide carbonique, de l'huile. Il reste dans la cornue un charbon volumineux, mais plus dense cependant que celui de la première matière.

C. Substance floconneuse.

La substance floconneuse précipitée par l'eau de la dissolution alcoolique de l'extrait, avoit une couleur blanche grisâtre; elle s'est ramollie promptement sur des charbons allumés, & a exhalé une fumée blanche très-fétide; elle s'est dissoute un peu dans l'alcool, & nullement dans l'eau distillée à une forte chaleur; il s'en est dégagé des fluides élastiques, un liquide jaune, très-fétide, verdissant les couleurs bleues végétales, une huile rouge épaisse; il restoit dans la cornue un charbon assez volumineux.

D. Poudre rouge.

La matière colorée & pulvérulente est du plus beau rouge; elle semble formée de grains; appliquée sur des corps blancs, elle présente une très-belle couleur rouge; les papiers qui en sont peints, ne se décolorent qu'à la longue, même dans l'acide muriatique oxygéné; elle y résiste presque autant que l'indigo. Elle ne s'unit point à l'eau ni à l'alcool, à quelque température que ce soit; les substances alcalines liquides la dissolvent très-vite, & forment dans cette combinaison une liqueur d'un rouge brun, mais il est impossible de la précipiter sous la même couleur qu'auparavant; elle donne à la distillation beaucoup d'huile, de l'ammoniaque assez abondamment, & un peu d'eau: le charbon & les fluides

élastiques que l'on en obtient, sont peu considérables.

E. Matière brune.

Enfin la matière brune est en plus grande quantité que les autres substances, elle fait plus des deux tiers de la masse; sa couleur est d'un rouge brun, sa saveur est très-amère, & il paroît que c'est elle qui en donne aux autres; car aucune n'a d'amertume bien décidée, si elle est parfaitement pure. L'eau froide ne l'attaque point, mais si elle est chaude, la dissolution est d'autant plus rapide & plus parfaite, que la température de l'eau est plus élevée; à mesure que l'eau refroidit, la plus grande partie de cette matière se sépare & se dépose avec les mêmes propriétés qu'auparavant. Il en reste dans l'eau, à raison de la quantité de celle-ci, comme le prouve l'évaporation. Au premier coup-d'œil il paroît étonnant qu'une matière qui n'est nullement disposée à s'unir à l'eau, tant que la température de celle-ci n'excède pas le terme de dix degrés, en devienne susceptible par l'addition de la chaleur; mais c'est un fait de plus qui prouve combien la chaleur change l'équilibre des corps, relatif à leurs combinaisons. 24 parties d'eau chaude sur une de la matière insoluble à froid, ne laissent rien déposer par le refroidissement. L'eau de chaux mise dans cette dissolution y fait naître un changement singulier. Ce changement consiste dans un précipité rougeâtre comme de l'ochre, qui se redissout, si on ajoute beaucoup d'eau. Les acides, ou au moins l'acide muriatique, ne paroissent changer la dissolution aqueuse de cette substance. Un gros de cette matière insoluble, mis dans huit onces d'eau de chaux bouillante, a formé une poudre briquetée, qui n'est pas soluble dans 500 parties d'eau, ni dans les alcalis fixes, tandis qu'elle l'est, lorsqu'on ne l'a point traitée avec l'eau de chaux. L'alcool la dissout parfaitement bien, sur-tout lorsqu'on l'a divisée auparavant, soit par les moyens chimiques, soit par des procédés mécaniques. Lorsqu'elle est en masse, il faut beaucoup de temps pour que la combinaison se fasse. Cette matière se dissout facilement à l'ait; dans cet état, sa couleur paroît noire; elle est d'une grande fragilité, & sa cassure est luisante comme celle de l'aloes. Fortement chauffée dans des vaisseaux fermés, elle donne beaucoup de gaz hydrogène & d'acide carbonique, un produit liquide & de l'huile assez abondamment. Le charbon qu'elle laisse, étoit volumineux; il occupoit dix fois plus de place que la matière entière. Le produit liquide contenoit l'acide que donnent tous les mucilages chauffés, combiné avec de l'ammoniaque, ou du pyromucite d'ammoniaque avec excès d'acide, car il rougissoit fortement les teintures bleues végétales, & il exhaloit de l'ammoniaque par l'intermède de la chaux.

X. *Nature des cinq matières contenues dans l'extrait.*

On voit facilement par ces expériences que la première des matières qui viennent d'être décrites, est parfaitement analogue à une gomme, puisqu'excepté sa couleur brune, elle en a toutes les propriétés ; celle de se dissoudre dans l'eau même froide, de donner à ce fluide la vertu de mousser par l'agitation, celle de fournir de l'acide pyro-muqueux pur à la distillation, celle enfin de ne point produire d'ammoniaque, déterminent très-sûrement sa nature mucilagineuse.

Nos expériences n'indiquent pas d'une manière aussi satisfaisante la nature de la deuxième substance en apparence saline, ou au moins elles n'établissent pas de comparaison avec quelque autre matière végétale connue ; avec la forme, le brillant, l'apparence saline, elle n'a point de saveur ni de dissolubilité dans l'eau froide. L'eau bouillante n'en dissout que très-peu. Nous ne connoissons jusqu'ici aucune matière végétale qui lui ressemble, & nous la regardons comme un principe particulier. Son peu d'abondance nous a empêchés d'en faire une analyse très-exacte ; heureusement qu'elle ne paroît point influer sensiblement sur les vertus du quinquina de Saint-Domingue & de son extrait, c'est peut-être un sel neutre calcaire formé par l'union de la chaux avec un acide végétal.

Quant à la troisième matière, il n'y a point de doute qu'elle ne ressemble entièrement à la partie glumieuse du froment ; sa fécondité en brûlant, son produit ammoniacal & stérile, la rapproche assez de cette substance ; la manière dont elle se comporte avec l'alcool, confirme encore cette analogie. En effet elle se dissout dans un mélange de deux parties d'alcool & d'une partie d'eau, mais deux nouvelles parties d'eau la précipitent. Pour reconnoître cette analogie, nous avons fait chauffer quelques grains de gluten de la farine desséchée & en poudre fine, avec de l'alcool bien sec, après quelques minutes d'ébullition, on a séparé l'alcool de la portion de gluten non dissoute. A mesure que la température de l'alcool diminuoit, la liqueur blanchissoit ; mais la matière qui produisoit l'opacité, ne se ressembloit pas : en y ajoutant deux parties d'eau, elle fit le même effet que la teinture de l'extrait de quinquina, le gluten se sépara sous la forme de flocons blancs qui se rassemblèrent à la surface de la liqueur.

La quatrième substance remarquable par sa forme pulvérulente & sa belle couleur rouge, quoiqu'elle semble au premier coup d'œil, différer de toutes les autres matières connues, a pourtant quelques rapports avec certaines substances végétales, telles que le rocou, l'indigo, &c. Elle diffère cependant de celui-ci, qui ne s'unit aux alcalis, qu'autant

qu'il a perdu une partie de son oxygène, tandis que notre matière s'y unit immédiatement & sans interruption. Si sa parfaite indissolubilité dans l'eau la fait comparer aux résines, on reconnoît bientôt qu'elle ne leur ressemble pas, puisque l'alcool ne l'attaque en aucune manière, & puisqu'elle ne se fond point à une chaleur légère comme ces substances ; mais elle se combine parfaitement bien avec les alcalis, sur-tout quand ils sont purs ; elle perd par cette union sa belle couleur rouge, comme nous l'avons dit. Nous insistons un moment sur cette belle matière colorante, dont les chimistes n'ont point encore reconnu l'existence dans les végétaux. Sa couleur est un rouge brun très-beau ; elle est plus brillante lorsqu'elle est humide que desséchée ; mais dans cet état, elle est très-fixe & très-tenace ; elle s'alère beaucoup moins à l'air, & sur-tout par l'acide muriatique oxygéné, que le carmin, mais plus que l'indigo. Quoique ce ne soit point une résine, elle la devient par l'addition de l'oxygène, & c'est elle que l'on voit souvent dans les décoctions de quinquina refroidies, précipitée sous la forme d'une poudre rougeâtre ; mais nous ferons connoître plus bas que le quinquina du Pérou en contient beaucoup moins. M. Beaumé qui a vu cette matière rouge & insipide, la regardoit comme une résine altérée ; nous verrons bientôt ce qu'il faut penser de cette opinion.

Enfin la dernière des substances que nous avons reconnue dans le produit de la décoction du quinquina de Saint-Domingue, celle qui est la plus abondante, & qu'on auroit nommée autrefois un extrait, n'a pas encore été décrite par les chimistes, qui dans ce genre n'ont pas mis une assez grande précision. Dans les travaux de Rouelle sur l'analyse végétale, & dans la classification de leurs principes d'après les propriétés chimiques, on ne trouve aucune substance qui jouisse des propriétés que réunit cette matière : les gommes s'unissent à l'eau, les extraits savonneux à l'eau & à l'alcool, l'extrait muqueux à l'eau seulement, l'extrait-résineux à l'eau & à l'alcool, le résino-extractif en partie dans l'eau, & totalement dans l'alcool. La matière que nous occupe, offre des propriétés différentes ; l'eau froide, comme nous l'avons vu plus haut, n'y fait rien du tout : l'eau chaude même en petite quantité, s'y unit très-bien, & en fait une dissolution claire, mais qui se trouble en raison de la perte de chaleur, & qui en dépose la plus grande partie. L'alcool forme avec elle une combinaison permanente, & qui ne se trouble point en refroidissant. L'eau à laquelle on a uni cette substance par le moyen de la chaleur, en conserve toujours une certaine quantité après le refroidissement ; une nouvelle évaporation en sépare à la vérité la plus grande portion ; mais il paroît que si l'on prenoit une grande quantité de cette matière, pour dissoudre une petite quantité de cette matière, elle résisterait en dissolution, sans

se précipiter. En effet 24 parties d'eau distillée ne laissent rien déposer d'une partie de cette substance qu'on y a combinée à chaud. Elle est donc entièrement dissoluble dans l'eau, lorsqu'on emploie la chaleur, pour opérer cette dissolution ; car ce seroit en vain que l'on essayeroit d'unir cette substance à l'eau froide ; les molécules de cette espèce d'extrait sont trop adhérentes, leur affinité pour elles-mêmes est trop forte, pour que l'eau froide puisse la détruire. Rappelons encore ici que cette matière donne de l'ammoniaque à la distillation, quoiqu'elle ait été dépouillée d'une certaine quantité de gluten par l'alcool. Il est présumable qu'il en reste sur lequel ce réactif n'a pas de prise, & qui est peut-être essentiel à la formation de cette matière ; il se peut aussi que l'azote dont est formée l'ammoniaque obtenue par la distillation, n'y soit pas unie à des proportions convenables d'hydrogène & de carbone, pour donner naissance à ce véritable gluten, & il ne faut pas croire toujours à la présence du gluten tout formé dans une substance qui donne de l'ammoniaque par le feu. Nous pensons cependant, malgré la singularité de cette matière, qu'elle se rapproche des résino-extractifs de Nouvelle.

XI. Expérience sur le principe résino-extractif.

Parmi les cinq principes qui constituent le produit des décoctions du quinquina de Saint-Domingue, & dont nous avons essayé de déterminer la nature, il est aisé de voir que c'est le dernier qui mérite le plus d'attention, soit par son abondance, puisqu'il fait plus des 7 neuvièmes du total, soit par sa saveur amère & sa dissolubilité dans l'eau chaude & dans l'alcool. En effet ce n'est point le mucilage fide à la proportion d'un neuvième, ni la poudre rouge insipide & indissoluble, ni la petite portion du gluten, ni plus forte raison la petite quantité de matière cristalline & d'apparence saline, qui peuvent être regardés comme ayant une action remarquable sur l'économie animale. Le but de cette analyse étant de découvrir les principes véritablement actifs du quinquina de Saint-Domingue, nous devons porter spécialement notre attention sur la matière amère & analogue à un résino-extractif, que nous en avons tirée. C'est aussi de cette dernière que nous nous sommes spécialement occupés. On se rappelle que cette matière résino-extractive est d'une couleur brune foncée, que lorsqu'elle est bien séchée, elle est cassante, lisse & brillante dans sa cassure, sa saveur amère ne se développe dans la bouche, qu'après qu'elle a été mâchée. On a vu qu'elle ne se dissout que dans l'eau chaude & dans l'alcool ; mise sur un charbon ardent, elle se ramollit sans se fondre, elle se boursouffle & se brûle ; à l'air, elle reste sans altération & sans déliquescence ; les alcalis la dissolvent facilement ; les acides purs ne l'attaquent point, mais s'y sa-

Chimie, Tome II.

turent de terre calcaire. L'acide muriatique oxigéné nous a présenté des phénomènes qui nous ont servi à reconnoître sa nature. Nous avons pris un gros de cette substance bien sèche ; nous l'avons dissoute dans douze onces d'eau distillée bouillante, nous avons filtré cette dissolution qui étoit d'une couleur brune ; nous l'avons mise dans un flacon garni d'un tube qui plongeait dans la liqueur, & qui y conduisoit le gaz muriatique oxigéné ; les premières portions de ce fluide élastique lui ont donné une couleur rousse-claire, & bientôt des flocons de la même couleur se sont séparés. Peu-à-peu la liqueur, ainsi que ces flocons, ont perdu leur couleur. La première est devenue presque blanche, & les derniers n'ont conservé qu'une légère couleur jaune. Une grande quantité de gaz muriatique oxigéné dissous une seconde fois dans cette liqueur, a fait prendre aux flocons précipités une couleur de plus en plus jaune, & a détruit entièrement celle de la liqueur. Enfin, lorsqu'elle parut ne plus absorber l'oxigène de l'acide muriatique, & lorsque celui-ci a passé au travers sans éprouver de décomposition, on a filtré cette liqueur, & il est resté sur le filtre des flocons de la plus belle couleur jaune, ressemblant beaucoup à la gomme-gutte. Cette matière pesoit 30 grains ; elle s'est fondue en une masse ductile qui n'étoit pas dissoluble dans l'alcool à 26 degrés, mais qui s'unissoit facilement à l'alcool à 39 degrés, ainsi qu'aux matières alcalines. L'eau de chaux versée dans la liqueur claire, n'y a produit aucun précipité. Comme d'un gros de matière dissoute, on n'avoit eu que 30 grains de précipité, & qu'il devoit en rester plus de la moitié dans la liqueur, on l'a évaporée. Il s'est déposé 15 grains d'une poudre noire, & l'évaporation a séché à laide 6 grains, dont 4 se sont dissous dans l'eau. Cette portion dissoute, ainsi que la matière noire, avoit une saveur acerbe & âcre ; elle contenoit de l'acide muriatique à nud. Il paroit que cette substance avoit conservé ses propriétés, & n'avoit pas changé de nature. Il y a donc une portion de cette matière, que l'acide muriatique oxigéné n'altère pas, & qui ne contracte qu'une saveur âpre, en absorbant sans doute un peu d'oxigène. Cependant si on la traite une seconde fois par une nouvelle portion de cet acide, elle passe aussi à l'état de matière jaune & résineuse. Pendant l'évaporation, une portion de la matière est précipitée en véritable charbon.

Si l'on arrête l'opération, lorsque les flocons rouges commencent à se précipiter, ces flocons recueillis & séchés ressemblent parfaitement à la poudre rouge que nous avons obtenue de la décoction refroidie. Comme elle, cette matière ne se fond point dans l'eau chaude, ni dans l'alcool ; mais elle se combine parfaitement bien avec la soude, la potasse, &c. Si l'on pousse un peu plus loin l'opération, les flocons deviennent jaunes, & lorsqu'on les fait bouillir dans l'eau, ils se

L I

fondent & se tassent en une seule masse à la surface de la liqueur, en y formant une couche noirâtre. L'acide muriatique oxigéné décompose donc la dissolution de ce résino-extraitif du quinquina de Saint-Domingue; il en sépare d'abord des flocons rouges, ensuite fauves, légèrement jaunes, & enfin d'un très-beau jaune il rend cette dissolution aussi claire que de l'eau distillée. La matière séparée de l'eau prend un caractère très-différent de celui qu'elle avoit d'abord; elle ne se dissout plus dans l'eau bouillante, mais ce liquide chauffé jusqu'à l'ébullition, la fond & la rassemble en une seule masse de couleur jaune. La cause de ce changement n'est pas difficile à apprécier. Il n'est pas douteux que l'acide muriatique cède son oxigène au résino-extraitif, & celui-ci plus oxigéné qu'il n'étoit, devient d'abord la matière colorante rouge, dont nous avons parlé. Une plus grande portion d'oxigène fixée dans cette matière rouge, la fait passer au fauve & de-là au jaune, en la convertissant en véritable résine. Quelques analogies remarquables viennent à l'appui de cette théorie; une dissolution de ce résino-extraitif dans beaucoup d'eau exposée à l'air, se couvre d'une pellicule du plus beau rouge; si on remue le vase, cette pellicule se précipite sous la forme d'une poussière qui a toutes les propriétés de la matière colorante rouge, fournie par la décoction. Une dissolution de cette même matière, en se desséchant en couches minces sur un corps quelconque, prend aussi une couleur rouge & devient insoluble dans l'eau chaude; mais nous n'avons point vu cette matière se convertir à l'air en résine jaune, comme elle fait, lorsqu'on sature sa dissolution d'acide muriatique oxigéné, sans doute parce que le premier procédé n'y fixe point une quantité d'oxigène aussi considérable que l'acide muriatique oxigène. On voit par cette expérience remarquable, 1°. que la substance brune & amère, nommée résino-extraitif, ne diffère de la poudre rouge & insipide, que parce qu'elle contient moins d'oxigène, 2°. que ces deux matières sont de la même nature, & ne varient que par les proportions d'oxigène, 3°. que l'addition de ce principe convertit le résino-extraitif en résine, & lui enlève en même-temps sa saveur, sa couleur & sa dissolubilité. Nous n'insisterons pas ici sur ce que ces résultats présentent de nouveau pour l'analyse végétale en général, pour la connoissance des résines, des couleurs, &c. Nous nous contenterons d'observer que les dépôts bruns & rouges qui se forment dans les décoctions de quinquina, ne sont pas des résines, comme l'ont dit jusqu'ici les chimistes, que la poudre rouge n'est pas non plus une résine décomposée, comme le croyoit M. Baumé, mais au contraire que ces substances passent à l'état résineux en se précipitant, & que c'est parce qu'elles absorbent de l'oxigène, qu'elles s'altèrent ainsi. Nous observerons sur-tout que la matière enlevée par l'eau bouillante au quin-

quina, n'est point du tout un extrait dans le sens strict que les chimistes ont attaché à ce mot, mais une matière qui se rapproche des résines, qu'on ne peut définir qu'imparfaitement par un nom, parce qu'elle n'a pas été encore bien examinée.

XII. Combustion de l'extrait entier.

Il nous restoit à déterminer les matières fixes contenues dans l'extrait entier; on a pris 9 onces 56 grains de cette substance, produit d'une livre de quinquina de Saint-Domingue on l'a mise dans un creuset qu'on a chauffé par degrés, cette matière s'est prodigieusement gonflée; elle a exhalé une fumée jaunâtre, & paroïssoit extrêmement légère; la combustion s'est facilement faite, & il n'est resté qu'une cendre grise qui pesoit deux gros. Sa saveur étoit fort âcre & salée; on l'a traitée avec 2 onces d'eau distillée froide, & on a filtré quelques minutes après. Elle avoit perdu par cette opération, 64 grains. La liqueur a présenté par l'évaporation, des pellicules blanches demi-transparentes, qui, rassemblées & séchées pesoient 4 grains, & n'étoient que de la craie. La liqueur a laissé après l'évaporation un sel blanc, dont la saveur étoit alcaline & salée, & qui pesoit 60 grains: ce sel verdissoit le papier de mauve. On a cherché un moyen d'en séparer l'alcali; ce moyen a été trouvé dans l'acide acétique, dont on a versé quelques gouttes sur la substance saline, il y a eu une légère effervescence; on a fait évaporer jusqu'à siccité, alors on l'a délayé avec un peu d'alcool froid; celui-ci évaporé a donné 18 grains d'acétate de potasse: le sel qui restoit ne pesoit plus alors que 50 grains; le muriate de baryte nous a fait connoître que ces 50 grains de sel contenoient 12 grains de sulfate de potasse, & que les 38 autres grains étoient du muriate de potasse. Les 80 grains restants après l'action de l'eau, ont été réunis avec les 4 autres grains formés par la pellicule déposée pendant l'évaporation de la liqueur; on les a traités avec l'acide muriatique foible, il s'est fait une vive effervescence, & tout a été dissout. Ce sel étoit du muriate calcaire pur, ce qui prouve que ce résidu n'étoit que de la craie.

Cette combustion indique évidemment que les cristaux qui s'étoient présentés dans l'évaporation spontanée de l'infusion de quinquina, n°. 6, & qui répandoient des vapeurs blanches d'acide muriatique par l'acide sulfurique, étoient du muriate de potasse; il paroît aussi que la terre calcaire y existe dans l'état de chaux, & non dans celui de carbonate, car les acides avec lesquels nous avons combiné l'extrait, la lui enlevoient sans produire d'effervescence. Il résulte de cette analyse des gros de cendres fournies par les 9 onces 56 grains d'extrait de quinquina de Saint-Domingue, qu'elle contenoit.

Potasse.....	10 grains.
Sulfate de potasse.....	12
Muriate de potasse.....	38
Craie.....	84
	—
	144

Cette petite quantité de matières salines n'influe pas assez sur les propriétés chimiques & médicales du quinquina de Saint-Domingue, pour nous engager à rechercher à quels principes immédiats de l'extrait chacune appartenoit; nous remarquerons seulement, 1°. que les sels neutres, le sulfate & le muriate de potasse peuvent être considérés comme des corps étrangers faciles à isoler, & n'entrant pas dans la composition de ces principes immédiats; 2°. que la potasse & la chaux obtenues tous les deux dans l'état de carbonate par l'action du feu, mais contenues à l'état pur & caustique dans l'extrait, peuvent en faire un des principes essentiels; mais cette considération n'ayant que peu d'intérêt & d'usage pour la médecine, elle ne doit pas nous occuper ici.

XIII. Examen du résidu du quinquina épuisé par l'eau; traitement par l'alcool & les alcalis.

Le résidu du quinquina épuisé par l'eau bouillante étoit absolument sans saveur; il étoit d'une couleur fauve rougeâtre. Jusque'ici les chimistes le considéroient comme une terre; mais on va voir qu'il présente des propriétés fort différentes. L'alcool bouilli sur ce résidu a pris une couleur verdâtre, & l'eau mêlée à cet alcool n'en a séparé que quelques grains de matière blanche, qui a présenté les caractères de la partie glutineuse du froment.

L'action des alcalis caustiques liquides sur ce résidu est bien plus marquée. L'alcali devient rouge, les molécules du quinquina deviennent transparentes & comme gélatineuses. Après avoir subi l'action de plusieurs lessives successives, & après une dessiccation parfaite, une livre de ce résidu ne pèse plus que 2 3/4 grains. Il est vraisemblable que, si ce traitement eût été continué plus long-temps la dissolution auroit été complète ou presque complète. Ce que l'alcali avoit enlevé au résidu ne différoit en rien du résidu lui-même, & on peut dire que c'est tout simplement une dissolution du résidu entier dans la potasse, car les acides versés dans cette dissolution, le séparent presque pur. Nous n'y avons trouvé que deux différences; l'une que la couleur étoit plus foncée & presque brune, l'autre qu'il ne contenoit pas autant de chaux que la portion du résidu non dissoute par l'alcali.

XIV. Traitement du résidu par l'acide muriatique.

Sur le résidu d'une livre de quinquina épuisé

par l'eau bouillante, & qui pesoit 6 3/4 grains, on a mis 1 liv. d'acide muriatique affoibli; il s'est manifesté une effervescence légère. On a chauffé, & à l'aide d'un appareil pneumatique, on a recueilli 193 pouces cubes d'acide carbonique. Le résidu avoit pris une couleur noire, & ne sembloit plus être qu'un charbon pur; mais cette apparence fut démentie par les produits huileux, ammoniacal & acide qu'on obtint par la distillation de cette substance.

L'acide muriatique avoit acquis un peu de couleur & n'avoit point perdu toute son acidité; évaporé jusqu'à siccité, il a laissé un sel acre, deliquescent à l'air, & qui a donné avec le carbonate de soude 4 gros 4 grains de craie. Ce poids se rapporte parfaitement bien avec la perte du résidu, qui ne pesoit plus après l'opération que 5 3/4 grains, & avec la quantité d'acide carbonique formée par ce résidu, puisque 4 gros 4 grains de craie fournissent de 193 à 195 pouces cubiques d'acide carbonique, à la température de 12 degrés. Il est prouvé par cette expérience que le résidu du quinquina de Saint-Domingue contient de la chaux, & que cette substance y est combinée avec l'acide carbonique. Il n'est pas moins évident que la chaux contenue dans le quinquina entier y est dans deux états, & que celle qui est dans l'extrait n'est pas combinée à un acide. La quantité contenue dans l'extrait réunie avec celle du carbonate calcaire séparé du résidu, forme 130 grains de chaux dans une livre de quinquina, dont 43 grains & 1/2 sont combinés au principe extractif, & 186 grains 1/2 sont combinés, avec l'acide carbonique. Cette craie reste dans le résidu.

XV. Distillation du résidu.

Une livre de ce résidu avant été mise dans une cornue de verre, & chauffée par degrés, il passa d'abord quelques gouttes de liquide presque sans couleur, ensuite une fumée épaisse qui se condensa en une limonée jaune. On recueillit 1700 pouces cubes de fluide élastique, dont 1600 ou plus de la moitié étoient absorbés par l'eau, le reste étoit du gaz hydrogène carboné; l'opération finie & l'appareil défilé, le ballon contenoit une liqueur jaune, dont l'odeur étoit semblable à celle de l'acide pyromaqueux, & qui rougissoit comme lui les couleurs bleues végétales; il contenoit une assez grande quantité d'ammoniacque. Cette liqueur pesoit 43 1/2. On trouva 1 once 54 grains d'huile concrète brune, d'une odeur & d'une saveur très-âcre, tant sur les parois du récipient, que dans le col de la cornue; l'alcool dissolvait la plus grande partie de cette substance huileuse; une certaine quantité refusoit de s'y unir; celle-ci paroissoit se rapprocher des graisses ou des huiles grasses. Le charbon resté dans la cornue ne formoit qu'une seule masse friable; il pesoit 43 1/2; il étoit d'un

assez beau noir, & faisoit une vive effervescence avec les acides, l'acide muriatique en a extrait 2 $\frac{3}{4}$ 42 grains de chaux; & comme il ne pesoit plus après cette opération que 3 $\frac{3}{4}$ 30 grains; il paroît que les 2 gros qui manquoient étoient dus à l'acide carbonique, dégagé de la craie par l'effervescence. En rassemblant les poids de chacun des produits, nous voyons que les 2700 poudes de gaz qu'a fourni cette livre de résidu du quinquina, devoit peser 6 $\frac{3}{4}$ 38 grains; ce qui faisoit 1 grain & $\frac{1}{2}$ à-peu-près le pouce cube; mais ce poids est manifestement trop fort.

XVI. Résidu & acide nitrique.

On a pris une livre de résidu de quinquina épuisé par l'eau, on l'a mêlé avec 16 livres d'eau-forte à 8 degrés, à l'aréomètre de M. l'aumé; ce résidu est devenu rougeâtre. Il faut observer qu'il avoit auparavant une couleur un peu verte, parce que le quinquina avoit bouilli sous l'eau & presque sans le contact de l'air; il n'est pas doux que ce contact & l'absorption de l'oxygène ne soit la cause de la coloration de ce résidu en rouge; c'est la même cause qui produit cette couleur rouge dans le résidu traité par l'acide nitrique. Aussi-tôt qu'il a eu le contact de cet acide, le mélange s'est couvert d'une mousse considérable, & présentoit le dégagement d'un fluide élastique; la matière solide & la liqueur sont devenues peu-à-peu jaunes, comme cela a lieu pour les matières animales traitées par l'acide nitrique. On a soigneusement recueilli le gaz qui se dégagoit par une douce chaleur; sa quantité en volume a été de 504 poudes cubes, dont les $\frac{3}{4}$ environ ou 336 étoient absorbés par l'eau de chaux, & l'autre tiers, ou les 168 poudes cubes, éteignoient les bougies, sans s'enflammer & sans rougir à l'air; ce dernier gaz étoit manifestement du gaz azote. Les $\frac{3}{4}$ 6 poudes cubes d'acide carbonique obtenus par cette opération, appartiennent à la craie que contient ce résidu & ne sont point du tout le résultat des principes de l'acide nitrique avec ceux du quinquina, puisque d'une part, ces fluides ne sont pas dans un rapport de quantité assez grande pour faire naître cette idée, & que dans l'autre, on n'a point eu de gaz nitreux dans les premiers instans de cette opération. Lorsqu'il ne s'est plus rien dégagé à la chaleur de 30 à 40 degrés, on a augmenté le feu; il y a eu tout-à-coup une effervescence violente; & le gaz qui se dégagoit rougissoit à l'air, & troublait l'eau de chaux; cette chaleur a été poussée jusqu'à l'ébullition, & soutenue pendant un quart-d'heure à ce degré. Alors on a cessé l'opération. Le résidu du quinquina avoit pris une couleur de citron, ainsi que la liqueur; on a filtré, & le marc bien lavé & séché ne pesoit plus que cinq onces un gros.

On a évaporé la liqueur au quart de son vo-

lume, & on l'a laissé refroidir. Pendant le refroidissement, il s'est formé une grande quantité de cristaux brillants saïnés qui se font réunis en une masse comme gélatineuse; on les a séparés & séchés; on a fait évaporer de nouveau la liqueur, & on l'a laissé refroidir comme la première fois; on a obtenu de nouveaux cristaux blancs, en aiguilles d'environ une ligne de longueur; on les a séparés lavés & séchés, comme les premiers. Les uns & les autres ne différaient que par la forme, & ils étoient de même nature. Ce sel, insipide & presque insoluble, a été reconnu pour être de l'oxalate de chaux, il pesoit une once cinq gros vingt-deux grains. Une troisième évaporation suivie du refroidissement n'a plus présenté un pareil sel, mais une autre espèce dont les cristaux infiniment plus gros étoient d'une saveur très-acide, & que l'eau dissolvoit facilement: c'étoit de l'acide oxalique pur. Comme il eut été très-long & très-difficile d'obtenir tout le sel contenu dans la liqueur par la cristallisation sans une perte notable, nous avons pris le parti de redissoudre cette portion d'acide oxalique dans la liqueur & de le séparer ensuite par l'eau de chaux, qui a fait naître un précipité abondant qu'on a recueilli sur un filtre, & qu'on a bien lavé & fait sécher. Ensuite on a fait évaporer la liqueur dans laquelle il y avoit un peu de chaux en excès; l'évaporation a présenté un nouveau précipité; lorsqu'il n'a plus resté qu'environ deux onces de liqueur dans le vase, on a séparé le dépôt qu'on a bien lavé & qu'on a réuni avec les deux premiers sels & le précipité précédent; la liqueur qui restoit avoit une couleur jaune très-belle; la saveur étoit un peu sucrée, & l'acide carbonique n'y faisoit point de précipité, preuve qu'il n'y avoit plus de chaux libre. Comme beaucoup d'autres expériences préliminaires sur les substances végétales nous avoient appris que l'acide nitrique y forme souvent plusieurs acides différens, on a versé dans cette liqueur une dissolution de nitrate de plomb; il s'est formé sur le champ un dépôt jaune très-abondant qui ne pouvoit être que du malate de plomb; il pesoit un gros trente-six grains. L'acide sulfurique a séparé de ce sel de plomb, de l'acide malique, reconnaissable par toutes ses propriétés. Après avoir obtenu l'acide malique par le nitrate de plomb, on a saturé la liqueur par la potasse, on l'a évaporé à siccité, & on a trouvé dans le résidu, traité par l'alcool, un gros d'acétie de potasse. Voilà donc déjà trois acides formés dans le résidu du quinquina par l'acide nitrique, & dont les bases ou radicaux étoient contenus dans ce résidu; savoir l'acide oxalique, l'acide malique & l'acide acétique. On va voir que le premier de ces acides contenu dans les premiers sels cristallisés & dans le précipité formé par la chaux, étoit encore accompagné dans ce dernier d'un autre acide végétal.

On se rappelle que la dissolution du résidu par l'acide nitrique avoit donné deux fois de suite des cristaux, que la liqueur qu'on en fournissoit plus, & qui étoit très-acide, a été précipitée par l'eau de chaux; ces cristaux & le précipité réunis pesant dix onces trois gros, ont été traités par l'acide muriatique anéanti; il y a eu une effervescence légère, & la masse saline a perdu une once trois gros, la dissolution muriatique évaporée en consistance de sirop, avoit une couleur jaune brune; elle étoit toujours très-acide, quoiqu'elle n'exhalât plus de vapeurs d'acide muriatique; elle s'est prise en masse cristalline par le refroidissement. Après l'avoir redissoute dans l'eau distillée, on l'a essayée par l'acide oxalique, qui a formé un précipité très-abondant dû à la décomposition du muriate calcaire, & qui a prouvé que l'acide qui y étoit à nud n'étoit point de l'acide oxalique. Pour en connoître la nature, on a versé de l'eau de chaux dans la dissolution; elle y a fait naître un précipité qui pesoit une once, & qu'on a reconnu pour du citrate calcaire (1). Les neuf onces non dissoutes par l'acide muriatique étoient de l'oxalate calcaire.

Comme ces détails sur le traitement du résidu du quinquina de Saint-Domingue par l'acide nitrique, sont très-compiqués, & fondés sur les propriétés diverses des acides végétaux, nous croyons devoir considérer ici l'action de l'acide nitrique sous un autre point de vue; le résidu du quinquina ne contenoit point les acides tous formés, c'est la décomposition de l'acide nitrique & la fixation de son oxygène dans la matière végétale qui leur a donné naissance. Il est bien reconnu aujourd'hui que les acides végétaux sont formés des mêmes principes, savoir, d'hydrogène, de carbone & d'oxygène, & qu'ils ne diffèrent les uns des autres que par les proportions de ces principes. C'est la combinaison spontanée de l'hydrogène & du carbone en diverses portions, qui forme les radicaux de tous ces acides. Cette combinaison existoit dans le résidu du quinquina, & comme elle y étoit sans saveur, sans dissolubilité, sans caractères salins, il falloit l'addition de l'oxygène pour faire naître ces propriétés. L'acide nitrique a joué ce rôle dans cette expérience; il a formé en cedant son oxygène aux bases acidifiables, les acides que nous avons décrits. L'acide oxalique, le même qui se trouve tout formé dans l'oseille, est celui de tous les acides connus qui a le plus d'attraction pour la chaux; & comme l'acide muriatique a prouvé dans ces expériences précédentes (n°. XIV.) la présence de la craie dans le résidu du quinquina, on voit que dans celle-ci l'acide nitrique ayant dégagé l'acide carbonique de cette craie pour s'y unir, a bientôt

cédé la chaux à l'acide oxalique qui s'est formé. De-là le dégagement de l'acide carbonique qui a eu lieu au commencement de l'expérience & en même-temps que le gaz azote, de-là les cristaux d'oxalate calcaire obtenus par l'évaporation de la dissolution nitrée. Mais dans cette opération il s'est formé plus d'acide oxalique que n'en pouvoit absorber la chaux contenue dans le résidu, & en conséquence il s'est déposé des cristaux d'acide oxalique; une fois convaincu que la liqueur contenoit beaucoup de cet acide à nud, il nous a été plus facile de le saturer de chaux pour l'apprécier; on l'a obtenu alors tout entier par l'évaporation; mais comme il s'étoit formé en même-temps des acides citrique, malique & acéteux, la chaux qu'on a mise dans la liqueur a saturé tous ces acides en même-temps; & de ces quatre sels calcaires, deux étant insolubles ou très-difficiles à dissoudre, savoir, l'oxalate & le citrate calcaires, ils ont dû se précipiter en même-temps. Au contraire les malate & acétate calcaires sont restés dans la liqueur, le nitrate de plomb les a décomposés tous les deux, le malate de plomb s'est précipité comme insoluble, & a été reconnu & apprécié; l'acétate de plomb restant encore dans la liqueur a été décomposé à son tour par la potasse, & l'acétate de potasse reconnu & apprécié par l'alcool. Voilà comment à l'aide de ces instrumens exacts, la chimie moderne est parvenue à reconnoître & à séparer plusieurs subitances salines les unes des autres. On voit par le premier résultat de cette analyse du résidu par l'acide nitrique, que cet acide a dégagé l'acide carbonique de la craie qui y est contenue, qu'il en a séparé l'azote sous la forme de gaz, que son oxygène s'est porté sur une portion de charbon de ce résidu, & l'a converti en acide carbonique qui s'est dégagé en même-temps que le gaz nitreux; enfin qu'en se fixant sur des diverses proportions d'hydrogène carboné solide, il en a changé la plus grande partie en quatre acides.

Pour savoir quelle avoit été la quantité de chacun des acides formés par l'action de l'acide nitrique sur le quinquina, nous avons 1°. déterminé combien il falloit d'acide oxalique pour former une quantité donnée d'oxalate calcaire, & par ce moyen il nous a été démontré qu'il s'en étoit formé neuf onces, en le supposant bien cristallisé. La même opération ayant été faite par l'acide citrique, nous avons trouvé qu'il y en avoit eu cinq gros de formé. Nous évaluons, d'après la quantité d'acétate de potasse énoncée plus haut, l'acide acéteux à 40 à 45 grains; & d'après celle du malate de plomb, la proportion de l'acide malique à 36 grains à-peu-près. Outre cela,

(1) Pour bien concevoir la suite de ces phénomènes, il faut observer; 1°. que l'oxalate de chaux n'est presque pas dissoluble dans l'acide muriatique; 2°. que le citrate calcaire est au contraire, facilement & entièrement dissoluble dans cet acide; 3°. que le citrate calcaire ne se sépare de l'eau qui peut le dissoudre, que lorsqu'on met un excès de chaux.

l'acide nitrique a extrait d'une livre de ce résidu, 6 gros de chaux & une quantité d'azote & d'acide carbonique qui n'a été appréciée qu'avec quelques incertitudes; il faudroit encore tenir compte du carbone qui a été enlevé à ce résidu & converti en acide carbonique dégagé avec le gaz nitreux, car la première portion de cet acide qui s'est dégagé en même-temps que la gaz azote, étoit contenue dans la craie de ce résidu. On sentira toutes les difficultés de cette appréciation, en présentant dans un tableau les matières dégagées ou trouvées par l'acide nitrique.

onces. gros. grains.

1 ^o . Acide carbonique.....	"	4	48
2 ^o . Gaz azote.....	"	1	8
3 ^o . Chaux.....	"	6	"
4 ^o . Acide oxalique.....	"	9	"
5 ^o . Acide citrique.....	"	5	"
6 ^o . Acide malique.....	"	"	36
7 ^o . Acide acéteux.....	"	9	45

11 1 65

On a par l'addition des poids connus 11 onces 1 gros 65 grains, mais il manque celui du carbone contenu dans le second acide carbonique, & les quantités des acides végétaux seroient faiblement attribuées au résidu, puisque ces acides n'y étoient point sous formes, & puisque le résidu n'en contenoit que les bases. Nous ne faisons ces réflexions que pour indiquer ici la marche de la chimie moderne, la difficulté de ses procédés, mais en même-temps la certitude de ses résultats, & la possibilité de l'extrême précision dans l'examen des parties végétales qu'il seroit plus important de connaître que le résidu qui nous occupe dans ce moment.

Après avoir trouvé dans les produits de cette analyse un total de 11 $\frac{1}{3}$ 1 $\frac{1}{3}$ 65 grains de produit, auquel il faudroit ajouter le poids inconnu du carbone du second acide carbonique, mais dont il nous faudroit aussi décaler la quantité d'oxygène donnée par l'acide nitrique, le résidu bien lavé & séché pesoit 5 onces 1 gros. Il avoit une couleur jaune citrine, une faveur astringente dépen-

dante ainsi que la couleur, de la portion d'oxygène enlevée à l'acide nitrique & retenue par cette matière végétale. Il étoit indissoluble dans l'eau, très-soluble par les alcalis qui fontent sa couleur; en traitant une partie par l'acide nitrique concentré, elle s'est dissoute & a donné les mêmes produits que dans l'expérience première; une autre portion distillée a fourni beaucoup d'huile concrète, du gaz hydrogène carboné, du gaz acide carbonique, des acides pyro-ligneux & fébacique, mais pas un atome d'ammoniaque, ce qui tient certainement à la séparation complète de l'azote par la première action de l'acide nitrique, comme cela a lieu dans les matières animales, suivant la découverte de M. Berthollet (1).

XVII. Distillation du quinquina entier.

Pour ne pas omettre les différents moyens qui pouvoient répandre quelque jour sur la nature des principes du quinquina de Saint-Domingue, on a cru devoir le soumettre à l'action du feu nud; on a mis dans une cornue de grès une livre de ce quinquina pulvérisé; on a composé l'appareil d'un ballon d'environ 3 pintes, & de 3 flacons de Woulfe, de chacun 2 pintes, remplis d'eau de chaux; du dernier partoit un tube dont l'extrémité plongeait sous une cloche pleine d'eau. Les premiers degrés de chaleur ont fait passer dans le récipient quelques gouttes de liqueur blanche comme de l'eau, mais qui s'est bientôt colorée en jaune. Le fluide élastique qui a passé le premier, a précipité l'eau de chaux des flacons long-temps avant qu'il se dégagât du gaz inflammable. Celui-ci a commencé à paraître en même-temps qu'une huile brune & concrète qui s'est rassemblée dans le ballon. Lorsque la cornue a été bien rouge, & qu'il n'en sortoit plus rien, on a déluté l'appareil; les récipients des fluides élastiques en contenoient 3000 pouces cubes, celui des liquides contenoit 5 onces d'une eau jaune & fétide, & 2 onces d'huile concrète. Le charbon resté dans la cornue étoit en une seule masse, & pesoit 5 onces 50 grains; la craie précipitée dans l'eau de chaux des flacons, pesoit 4 $\frac{1}{3}$ 1 $\frac{1}{3}$ 8 grains, ce qui donne 1 once 8 grains d'acide carbonique, & deux gros & 24 grains de carbone employé à la compo-

(1) D'après tous les faits exposés dans cette analyse du résidu par l'acide nitrique, & qui nous paroissent pouvoir servir à l'avancement de l'analyse végétale, nous pouvons tirer plusieurs corollaires qui sont immédiatement applicables à cette analyse; 1^o. l'acide nitrique est un moyen que l'on peut employer comme pour les matières animales à extraire l'azote des végétaux, en connaissant la quantité, & de là, préjuger celle qu'ils fournissent d'ammoniaque à la distillation; & les, par exemple, en suivant, comme nous l'avons fait, la pesanteur que M. Lavoisier a assignée à ce fluide élastique, & les proportions que M. Berthollet a établies dans l'ammoniaque, nous pourrions lire qu'une livre de ce résidu peut fournir 58 grains d'ammoniaque pure; 2^o. les acides que la nature forme, soit pendant la végétation, la maturation ou la fermentation des fruits, soit formés ici par l'union de l'oxygène de l'acide nitrique avec l'hydrogène & le carbone des matières végétales; 3^o. Le résidu du quinquina, & peut-être celui des écorces & des bois en général, sera plus avantageux que le sucre pour faire de l'acide oxalique, puisque une livre de sucre n'a donné à Bergmann qu'environ 5 onces 7 gros d'acide oxalique; il est vrai que ce résidu du quinquina (& peut-être les parties ligneuses) tiennent-elles toutes dans le même cas; 4^o. le contenu de la chaux qui a précipité une partie de l'acide formé, & qui donne naissance à de l'oxalate calcareux, en enfilant l'oxalate de chaux est très-difficile dans l'acide nitrique; à mesure que celui-ci est volatilisé, et tel se maintient sous une forme régulière très-belle; ce moyen peut servir à déterminer cette même forme.

tion de cet acide. L'acide muriatique mis sur le charbon du quinquina sortant de la cornue, & encore chaud, a fait effervescence, & dégagé presque autant d'acide carbonique que les 130 grains de chaux qu'il devoit contenir d'après nos précédentes analyses en demandant pour être dans l'état de carbonate calcaire; il faut donc retrancher de la quantité de charbon énoncée plus haut, 6 gros 12 grains de carbonate calcaire qui y sont mêlés. Il s'est dégagé aussi avec l'acide carbonique quelques poudres de gaz hydrogène sulfuré, dû, sans-doute, à la réaction du carbone sur le sulfate de potasse contenu dans ce résidu.

Tableau ou poids des produits de cette livre de quinquina.

	onces.	gros.	grains.
1 ^o . Phlegme.....	5	"	"
2 ^o . Huile.....	2	"	"
3 ^o . Charbon.....	4	2	38
4 ^o . Carbonate calcaire.....	"	6	12
5 ^o . Acide carbonique.....	1	"	8
	13	"	58

Si le gaz hydrogène obtenu par cette distillation étoit parfaitement pur, les 3000 poudres cubes ne pèseroient que 1 gros 53 grains; mais comme il est uni à du carbone, & qu'il diminue beaucoup de volume par cette combinaison, il doit peser beaucoup plus; cependant il paroît difficile que son poids réuni à celui des produits connus puisse former la livre de quinquina employé; car tous les produits additionnés ne forment que 13 onces 58 grains. Quelques portions d'humidité ont sans doute été emportées par les gaz jusque dans l'eau de chaux, où il est fort difficile de les retrouver.

XVIII. Court examen des substances fournies par la distillation du quinquina de Saint-Domingue.

1^o. Le gaz hydrogène brûloit en bleu, il ne troubloit point l'eau de chaux & ne laissoit point de gaz azote, après sa combustion avec l'air vital ou gaz oxygène.

2^o. La portion aqueuse que contenoit le ballon avoit une couleur rouge brune, son odeur étoit celle de l'acide pyroigneux, elle rougissoit les couleurs bleues; des expériences exactes ont appris que c'étoit un mélange de pyromucite & pyrolignite d'ammoniaque avec excès d'acide pyromuqueux; que celui-ci paroît avoir moins d'attraction pour l'ammoniaque que l'acide pyroigneux. Une juste appréciation de ces acides fournis dans la distillation d'un végétal quelconque, apprendroit peut-être la quantité de fécule, de sucre ou de gomme, & de fibres ligneuses qu'il contient. La chaux offre un moyen de séparer l'acide pyroigneux de celui des mucages, en

formant avec le premier un sel peu soluble & cristallisable, tandis que le pyromucite de chaux est déliquescant & dissoluble dans l'alcool.

3^o. L'huile étoit concrète, d'une couleur brune, d'une odeur empyreumatique; quelques portions ne se dissolvoient point dans l'alcool, & paroissent de la nature des huiles fixes & concrètes.

Cette distillation du quinquina de Saint-Domingue peut-elle fournir quelque chose d'exact sur la nature, & spécialement sur les proportions des principes qui le composent? La présence de quelques-uns y est facilement démontrée, mais leur quantité n'est pas si facile à déterminer; l'eau, sous ce point de vue, est presque incalculable; il est difficile d'y démontrer l'oxygène, & la quantité ne peut y être annoncée sans crainte d'erreur. Le rapport qui existe entre le gaz acide carbonique & le gaz hydrogène pourroit en fournir le moyen; mais s'il est certain qu'une portion de l'eau est décomposée par cette opération, est-il également sûr que tout son oxygène s'unisse au calorique, & s'échappe sous forme de gaz, avec l'acide carbonique? N'y en a-t-il pas une portion employée à la formation de la matière huileuse? La quantité de l'hydrogène n'est pas plus facile à connoître que celle des substances précédentes; car il se distribue pour la formation de différens produits dont les proportions sont encore entièrement ignorées; les chimistes savent en effet que l'huile, les acides pyromuqueux & pyroigneux lui doivent en partie leur existence; mais l'huile & ces acides empyreumatiques n'ont point été analysés. Il en est de même du charbon, & quoiqu'il ne présente pas autant de difficultés pour être apprécié que l'oxygène & l'hydrogène, la chimie nouvelle ne s'est point encore occupée d'en connoître la dose dans les différens acides végétaux, & particulièrement dans les acides pyromuqueux & pyroigneux, où cependant on sait positivement qu'il existe.

L'azote, matière dont les anciens chimistes n'avoient absolument aucune idée, semble être aujourd'hui celle dont la proportion est la plus facile à connoître dans les végétaux par le moyen de la distillation à feu nud; la quantité de gaz alcalin qu'il est facile d'extraire à l'aide de la chaux, suffit pour l'indiquer. Mais cette estimation ne pourroit encore être regardée comme certaine qu'à quelques conditions: la première, que les proportions des principes de l'ammoniaque seroient bien exactement connus; la seconde, qu'il seroit bien prouvé que cette substance n'entre point pour quelque chose dans la constitution de l'huile ou des acides empyreumatiques. Il y a un grand espoir qu'en s'occupant de l'analyse végétale avec l'attention qu'elle exige, on trouvera les moyens de séparer parfaitement ces quatre ou cinq principes qui constituent la base de tous les corps organiques. Au moins les chimistes mo-

dermes, après avoir bien reconnu l'incertitude de l'analyse végétale par le feu, ont déterminé la cendre à laquelle elle est due, & font aujourd'hui sur la voie de la faire concourir avec les autres moyens d'analyse, à déterminer le nombre, la proportion & la nature des principes qui entrent dans la composition des matières organiques.

XIX. Combustion du quinquina de Saint-Domingue.

Il ne nous restoit plus qu'à connoître les matières fixes contenues dans ce quinquina après sa combustion, & à déterminer par ce moyen les proportions de la cendre & de quelques sels neutres que les autres expériences nous avoient déjà indiqués.

On a brûlé une livre de ce quinquina dans un fourneau neuf; il s'est allumé facilement, & il a brûlé avec une fumée légère & beaucoup de fumée jusqu'à ce qu'il ait été réduit parfaitement en cendre. Celle-ci avoit une couleur blanche très-belle; ramassée avec toute l'exactitude possible, elle pesoit 7 gros. La faveur de cette cendre étoit légèrement âcre & salée; l'eau froide lui a enlevé 60 grains qu'on a retrouvés exactement par l'évaporation. Ils étoient composés, 1°. de carbonate de potasse; 2°. de muriate de potasse; 3°. de sulfate de potasse. Les procédés qu'on a suivis pour séparer ces diverses substances sont semblables à ceux qui ont été employés pour les sels de l'extrait brûlé, entre lesquels il y a une parfaite identité de nature & de quantité. Ces trois sels sont donc enlevés par les décoctions, & n'existent plus dans le charbon du résidu de ce quinquina épuisé par l'eau; nous les avons extrait du charbon de l'extrait du quinquina brûlé, n°. XII.

L'acide muriatique, mis sur la portion insoluble dans l'eau a produit une effervescence, & s'a dissoute presque entièrement. Ce qui restoit ne pesoit que 4 grains, & n'étoit que de la silice; elle provenoit sans doute de la terre du fourneau, car on y remarquoit quelques lames de mica semblable à celui qu'on voyoit briller sur les parois de ce vaisseau. On a fait évaporer la dissolution jusqu'en consistance de sirop; elle a donné en refroidissant des cristaux hexaèdres qui attiroient l'humidité de l'air. Leur dissolution dans l'eau a fourni avec l'acide sulfurique 1 once 1 gros 11 grains de sulfate de chaux, ce qui indique 277 grains de chaux dans cette livre de quinquina. Des expériences antérieures nous ont indiqué 230 grains de chaux dans une livre de cette écorce (n°. XIV.); mais cette différence peut dépendre du dessèchement plus ou moins grand des produits. Comme il est presque impossible de ne pas mettre sur le muriate calciné plus d'acide sulfurique qu'il ne faut pour saturer la chaux, que cet excès d'acide rend une por-

tion de silénite dissoluble, & qu'il est fort difficile de l'en séparer par l'évaporation, on a employé l'alcool pour précipiter ce sel terreux; mais on a eu soin de mettre un peu d'eau sur le dépôt, pour que la présence ou l'absence de la magnésie devint certaine dans la liqueur. Le carbonate de potasse n'indiquoit plus aucune autre substance dans la liqueur d'où le sulfate de chaux avoit été séparé; donc il n'y avoit ni magnésie ni alumine; mais l'eau de chaux y a fait naître un léger précipité qui s'est rassemblé en flocons. On a séparé cette matière par le moyen de la filtration, & après avoir été bien lavée & séchée, elle pesoit 20 grains. Elle ne faisoit point d'effervescence avec les acides en s'y combinant, elle ne se fondoit point à une forte chaleur, & l'eau de chaux formoit de nouveau dans sa dissolution par les acides un précipité comme le premier; enfin, elle offroit toutes les propriétés du phosphate calcaire.

Cette analyse fait voir qu'une livre de quinquina brûlé donne 7 gros de résidu; que ce résidu est composé, 1°. de 60 grains de matière saline soluble, dans laquelle on a trouvé 10 grains de carbonate de potasse, 12 grains de sulfate de potasse, & 38 grains de muriate de potasse; 2°. de 20 grains de phosphate de chaux; 3°. de 277 grains de chaux, & de 143 grains d'acide carbonique; 4°. de 4 grains de silice; la somme de tous ces produits forme les 7 gros de cendre fournie par la livre de quinquina brûlé. Il y a donc dans une livre de quinquina de Saint-Domingue, 15 onces 1 gros de matière, qui peut être réduite en fluide élastique & en liquide par la chaleur; & en dernière analyse, ces 15 onces 1 gros de matière qui avoit une forme si solide & si permanente dans cette écorce, ne sont que de l'hydrogène, du carbone, de l'azote & de l'oxygène; combinés ensemble dans une proportion telle, qu'il ne nous a pas été possible de déterminer exactement.

A N A L Y S E

COMPARÉ DU QUINQUINA ROUGE DU PÉROU.

I. Macération & infusion.

Pour avoir une idée de la ressemblance ou de la différence qui existe entre le quinquina de Saint-Domingue, & celui qui est employé maintenant le plus communément dans la médecine, nous avons fait un léger examen de ce dernier, qui porte le nom de quinquina rouge du Pérou où il croit. Il a une couleur rouge de brique; il est en morceaux de plusieurs pouces de longueur, & de deux à trois lignes d'épaisseur, & qui ne sont point roulés sur eux-mêmes comme le quinquina de Saint-Domingue; la faveur est légèrement amère, tandis que celle de l'autre l'est extrêmement; mais il retient les fibres du palais & de la

la langue beaucoup plus fortement que celui de Saint-Domingue.

Une once de ce quinquina en poudre laissée en infusion pendant plusieurs jours dans 8 onces d'eau distillée, ne lui a presque pas fait prendre de couleur. Cette infusion exposée à l'air, s'y moïstifiait pendant au bout de quelques jours, & paroit contenir une substance mucueuse. Le mélange de plusieurs réactifs nous apprit bientôt que l'eau avoit en effet enlevé quelques principes au quinquina rouge du Pérou. 1°. Elle rougissoit les papiers bleus, ce qu'indiquoit un acide quelconque; 2°. elle précipitoit l'eau de chaux qui a pris une couleur jaune par cette combinaison; 3°. un cristal de sulfate de fer ne la fit point devenir noire; 4°. enfin, la chaux y rendoit sensible l'odeur d'ammoniaque; l'once de quinquina ne perdit que quelques grains par cette macération.

On trouve déjà ici une grande différence entre l'action de l'eau froide sur le quinquina de Saint-Domingue & celui du Pérou; le premier a perdu le quart de son poids & n'a point présenté de traces d'acide sensible, tandis que le second n'a presque rien donné que des traces d'acide & de sel ammoniacal.

II. Résidu du quinquina du Pérou, épuisé par l'eau bouillante, & traité par l'alcool.

Une once de quinquina du Pérou épuisée par l'eau bouillante, a été ensuite traitée avec 12 onces d'alcool qu'on a fait bouillir; il s'est coloré, on l'a filtré & évaporé lorsqu'on a vu qu'il ne se coloroit plus; il a donné par l'évaporation 24 grains d'une matière attachée à la capsule, & qui avoit une couleur rouge assez semblable à celle de quelques oxydes de fer; cette matière ne se combinait nullement avec l'eau froide. Quoique l'eau & l'alcool n'aient extrait que 62 grains, le quinquina du Pérou avoit cependant perdu 1 gros de son poids par ces deux opérations.

Les 7 gros de résidu ne fournissoient plus rien, ni à l'alcool, ni à l'eau; on les a fait bouillir dans une dissolution de 12 onces de lessive de soude caustique; l'alcali a dissous plus des $\frac{1}{2}$ du quinquina, & il n'en restoit plus que 1 gros $\frac{1}{2}$ grains. Ce résidu avoit acquis une espèce de transparence & d'aspect gélatineux, il n'avoit plus aucune saveur, & sa couleur étoit fauve; distillé à feu nu, il a fourni les mêmes produits que celui du quinquina de Saint-Domingue, mais dans des proportions différentes.

La portion que la soude avoit dissoute, avoit pris une couleur rousse, les acides l'en séparoient avec cette même couleur, & sous la forme d'un mucilage qui se fondoît sensiblement dans l'eau chaude. Cette espèce de mucilage soumis à la distillation, a fourni les mêmes produits que le

Chimie. Tome II.

résidu entier, excepté pourtant qu'il sembloit donner moins d'ammoniaque.

On voit par cette expérience que le quinquina du Pérou, épuisé par l'eau, disséroit de celui de Saint-Domingue dans le même cas par le principe colorant & comme résino-extractif que l'alcool lui enlève encore; ce principe paroit être le même que celui qui a été enlevé par l'eau, mais modifié de manière à ce qu'il n'est plus soluble dans ce liquide, devant peut-être cette propriété à une certaine quantité d'oxygène fixé comme nous le dirons plus bas, & presque aussi abondant que celui qui a été enlevé par l'eau. Le résidu complètement épuisé par l'eau & l'alcool, ressemble parfaitement à celui du quinquina de Saint-Domingue; il donne les mêmes produits à la distillation, les mêmes acides par l'action de l'acide nitrique; il est également soluble dans les alcalis, c'est une base ligneuse qu'on retrouvera sans doute de la même nature dans toutes les substances végétales sèches, telles que les écorces, les bois, &c. Il ne nous reste plus qu'à examiner les principes fixes du quinquina du Pérou, & à les comparer à ceux du quinquina de Saint-Domingue.

III. Combustion du quinquina rouge du Pérou.

On a brûlé 6 onces de quinquina rouge du Pérou, avec les mêmes précautions qu'on avoit prises pour celui de Saint-Domingue, & on a obtenu 1 gros 4 grains de cendre grise; cette cendre lessivée avec quatre onces d'eau distillée froide, lui a donné une couleur légèrement jaune, une saveur âcre, & a perdu 18 grains de son poids, la liqueur évaporée jusqu'à siccité, a produit en effet 18 grains d'une substance saline un peu jaune, composée de 11 grains de carbonate de potasse, 3 grains de sulfate de potasse & 4 grains de muriate de potasse. L'acide muriatique s'est uni avec vivacité aux 54 grains restans, & l'acide sulfurique a formé dans cette dissolution 1 gros 12 grains de sulfate de chaux; l'eau de chaux a ensuite séparé de la même dissolution, 5 grains de magnésie pure.

On voit, d'après ces expériences comparatives, que le quinquina du Pérou ne donne pas autant de cendres que celui de Saint-Domingue, puisqu'il livre de celui-ci à fournir 7 gros, tandis que la même quantité de celui du Pérou n'en donne que 2 gros 58 grains. Cependant, cette cendre, quoiqu'un peu moins abondante, contenoit plus de matière saline que celle du quinquina de Saint-Domingue, en effet, 76 grains de cette cendre ont donné 15 grains ou près du quart de sels, tandis que 7 gros de l'autre n'en ont donné que 54 grains, ou un peu plus du neuvième seulement.

M m

RÉSULTATS

DES DEUX ANALYSES COMPARÉES, ET LEUR APPLICATION A LA MÉDECINE.

Le premier & le plus frappant résultat de cette analyse, c'est la différence qu'elle offre entre ce qu'on a dit déjà des principes du quinquina & ce que nous avons trouvé; le second consiste dans la différence des deux quinquinas de Saint-Domingue & du Pérou; le troisième est relatif à l'utilité qui peut résulter de tout ce travail pour la pratique de la médecine. Parcourons ces trois points que nous regardons comme la base de nos recherches, & faisons voir tout ce qu'ils promettent pour les avantages & le perfectionnement de l'art de guérir, relativement à la connaissance exacte de la vertu médicamencieuse en général.

Depuis le tiers du siècle dernier que l'on a commencé à connoître le quinquina en Europe, jusqu'au commencement du nôtre, on s'est contenté d'observer les effets principaux de ce précieux remède, sans s'occuper de la nature & de ses propriétés chimiques. On connoît les premiers essais en ce genre de Geoffroi & Neumann; ils se bornoient à distiller les substances végétales, & à en tirer, par l'eau & l'alcool, des teintures & des extraits dont la nature n'étoit pas même indiquée; la proportion de ces principes varia bientôt entre les mains des différens chimistes, parce que les doses des dissolvans, le manuel des opérations, &c. n'étoient pas fixés. Cartheuser, qui cherchoit mettre plus de précision dans l'analyse des médicamens, s'est contenté d'indiquer ici le rapport de ce qu'il appelloit la partie résineuse & la partie gommeuse du quinquina, & sur-tout la liaison & la cohérence de ces deux principes, qui faisoit qu'on ne pouvoit guérir, suivant lui, obtenir l'un sans l'autre. Il rapporte la différence de son analyse avec celle de Lichner & de Neumann, à la nature diverse du quinquina & la manière d'opérer. Il en conclut qu'il y a plus de matière gommeuse que de résineuse dans le quinquina. La Garaye, avec quelques idées nouvelles sur la manière d'extraire par l'eau les principes actifs du quinquina, & sa nouvelle méthode de préparer le prétendu *sel essentiel* du quinquina, ne fit rien de plus exact sur la véritable analyse de cette écorce que sur les autres médicamens. Rouelle, qui connut toute l'inexactitude des travaux faits jusqu'à lui sur l'analyse végétale, essaya de répandre quelques clartés sur la nature & la différence des extraits, & rangea celui de quinquina sous le titre des extraits favoneux. Poulletier a donné, dans le second volume de la pharmacopée de Londres, de bonnes observations sur les différens extraits de quinquina préparés par l'eau froide, l'eau chaude, la décoction longue; il a décrit les propriétés de ces extraits, leurs proportions, leur saveur distinctive; il a vu la matière rouge dont nous avons parlé, une portion de la résine jaune

formée par une longue décoction; il a insisté sur la précipitation d'une matière qu'il croyoit une résine par le refroidissement de la décoction; il a considéré aussi la matière rouge comme une sorte de terre; enfin il a fait quelques expériences sur le résidu du quinquina épuisé par l'eau & l'alcool. De tous ces travaux, aussi exacts qu'il étoit possible de les faire alors, il conclut simplement que le quinquina étoit formé de parties terreuses, de gommeuses & de résineuses. M. Baume, en décrivant dans sa pharmacie plusieurs phénomènes de la décoction du quinquina, a distingué la matière brune & rouge qu'il a regardée comme une résine dans deux états & décomposée, dont l'une en poudre rouge n'étoit plus soluble dans l'alcool. Enfin on s'étoit toujours contenté de regarder les principes du quinquina comme extraits, résineux & terreux, & de comparer entr'elles les préparations de cette écorce seulement par la proportion diverse des uns & des autres de ces principes.

En portant la précision & l'exactitude de la chimie moderne dans ce travail, & sur-tout à l'aide des instrumens nouveaux que l'art possède, nous avons fait voir que l'eau enlevait au quinquina en général quelques matières salines en petite quantité, un peu de mucilage gommeux & une substance brune ou rouge foncée, qu'on ne peut comparer qu'au résino-extractif de Rouelle, mais dont les propriétés sont très-différentes de celles qu'on a attribuées jusqu'ici à toutes les espèces d'extraits quelconques. Nous avons sur-tout fait voir 1°. que, susceptible de beaucoup de modifications, cette substance se présente sous des formes différentes suivant la proportion d'oxygène qu'elle contient, & cela depuis la nature apparente d'une sorte d'extracto-résineux jusqu'à l'état d'une résine pure; 2°. que ces modifications, dues presque toujours au contact de l'air plus ou moins grand, plus ou moins long, doivent donner beaucoup de différence aux quatuor des infusions, des décoctions & des extraits qu'on y prépare, suivant la forme des vaisseaux, la quantité d'eau & le temps de l'opération, & que telle est la vraie différence des variétés de produits obtenus par les différens auteurs; 3°. que cette matière qui n'est ni un extrait proprement dit, ni un mélange de gomme & de résine, comme on l'a cru, mais une substance particulière absorbant par-tout & toujours l'oxygène, se colorant, devenant insoluble dans l'eau par cette absorption, finit lorsque celle-ci est à son terme, par devenir une véritable résine; 4°. que c'est elle qui est la plus abondante des matières que l'eau enlève au quinquina, que c'est elle qui se précipite des décoctions, tantôt en une masse filante & ductile; c'est son premier état dans lequel elle a le plus de faveur amère & sans doute de vertus; tantôt sous la forme d'une poudre d'un beau brun marron ou pourpre, insoluble dans l'eau & l'alcool, & pendant alors toute

apparence d'extrait ; c'est alors la terre légère que l'ouletier y avoit observée, & que M. Baurand a désignée comme résine décomposée ; 5°. enfin qu'elle prend, quoiqu'elle rarement par la seule décoction long-temps continuée, & la seule exposition à l'air, la forme d'une poudre jaune, insipide, fusible au feu, résineuse.

Nous avons prouvé que le résidu du quinquina, épuisé par les plus longues décoctions, n'est point du tout une terre, mais une matière végétale particulière, formée de charbon, de la base du gaz hydrogène, d'azote & d'une faible portion d'oxygène, & qui en ajoutant à cette dernière, par le moyen de l'acide nitrique que cette base ligneuse ou solide végétale décompose, on convertit ce résidu en acides végétaux, semblables à ceux qui se trouvent tout formés dans l'oselle, dans les pommes, dans le suc de citron, &c. Voilà ce que les moyens fournis par l'analyse nous ont fait connoître sur la nature des principes immédiats du quinquina. Il ne nous resteroit plus qu'à connoître les proportions des principes primitifs de chacun des matériaux de cette écorce. C'n fait bien que l'hydrogène, le carbone, l'oxygène & l'azote, sont presque les seuls principes primitifs qui forment par leur union intime toutes les variétés possibles du ce que l'on appelle les principes immédiats des végétaux, distingués par les noms d'extraits, de pomme, de mucilage, de gluten, d'huile, de sels essentiels, de matière colorante, &c. C'n a bien entrevu que chacun de ces corps constituant immédiatement les végétaux, contient des proportions différentes des principes primitifs, & que ce n'est que par ces proportions qu'ils varient entre eux, mais on n'a point déterminé la diversité de ces proportions ; c'est-là le complément de l'analyse végétale ; c'est à cela que doit servir toutes les recherches des modernes. Les moyens pour y parvenir ne seront peut-être trouvés que par nos successeurs ; heureusement que ces découvertes ne sont pas d'une indispensable nécessité pour les progrès des sciences auxquelles la chimie est liée, & spécialement pour ceux de la médecine ; une connoissance exacte des matériaux immédiats, de leur rapport, de leurs proportions, de leurs propriétés diverses, suffit à cette dernière.

Quant à la comparaison des deux espèces de quinquina que nous avons examinées, elle ne présente pas des résultats moins singuliers que l'analyse générale dont nous venons de parler. La différence de ces deux écorces paroît au premier coup-d'œil être, pour-ainsi-dire, aussi grande qu'elle peut l'être ; en effet, 1°. celui de Saint-Domingue a perdu la moitié de son poids par l'eau bouillante, & celui du Pérou n'a perdu qu'un peu plus d'un seizième ; 2°. le premier, une fois épuisé par l'eau bouillante, n'a plus rien fourni par l'alcool ; le second a donné par ce dissolvant presque autant de principes que par l'eau ; 3°. l'é-

corce de Saint-Domingue a présenté au refroidissement de son poids de mucilage gommeux ; celle du Pérou n'en a presque pas montré de traces ; 4°. on a extrait un cinquième de plus de sels dissolubles du premier que du second ; 5°. le quinquina du Pérou a donné dans la décoction du muriato ammoniacal & du muriate calcaire ; il n'y avoit point de ces sels dans le quinquina de Saint-Domingue ; 6°. celui-ci contenoit plus du double de craie que celui du Pérou, & de plus un peu de phosphate calcaire qu'on n'a point trouvé dans le quinquina du Pérou ; 7°. celui du Pérou a fourni des traces de magnésie, & celui de Saint-Domingue n'en a point offert ; 8°. enfin le résidu du quinquina de nos colonies, épuisé par l'eau & l'alcool, pesoit moins de la moitié & n'avoit aucun saveur, tandis que le résidu du quinquina du Pérou, épuisé par l'eau & par l'alcool, contenoit les $\frac{2}{3}$ de sa masse & conservoit une légère saveur astringente qu'il a été impossible de lui enlever entièrement. Au milieu de toutes ces différences, celle qui nous frappe le plus & sur laquelle il nous paroît le plus important d'insister, c'est la proportion générale de la matière dissoluble avec la substance indissoluble dans l'une & l'autre écorce, ainsi que la différence des propriétés de la matière dissoluble dans l'une & l'autre. Toutes nos expériences prouvent que la substance soluble, nommée jusqu'ici extractive par les chimistes, est huit fois moins abondante dans le quinquina du Pérou que dans celui de Saint-Domingue ; la décoction du premier se décompose presque entièrement par le refroidissement, & laisse déposer presque tout ce qu'elle contient ; celle du second conserve une grande partie de ses principes & ne les dépose que par l'évaporation. Ainsi non-seulement la matière extractive du quinquina du Pérou est moins abondante, elle est encore moins dissoluble que celle du quinquina de Saint-Domingue ; la première se dépose promptement par le refroidissement & sous la forme de poussière ou de flocons d'une couleur marron, sa saveur est aussi astringente qu'amère ; la plus grande partie de la seconde se dépose en matière épaisse, filante & poisseuse, sa saveur est beaucoup plus amère qu'astringente. Si on fait bouillir pendant quelque temps & si on expose long-temps à l'air la décoction du quinquina du Pérou, elle perd beaucoup de ses principes, & son dépôt perd en même temps la plus grande partie de sa saveur. Dans le quinquina de Saint-Domingue, la décoction, quoique prolongée, retient ses principes long-temps, & ce qui se précipite conserve, pendant un terme beaucoup plus long, sa saveur & ses propriétés ; mais ce que nos expériences nous ont appris de plus remarquable à cet égard, c'est qu'en combinant l'oxygène au produit de la décoction du quinquina de Saint-Domingue, on lui enlève sa saveur amère & on se rapproche, soit par sa violence, soit par son indissolubilité, soit

par la qualité acerbe qu'on lui communique, du produit extraict du quinquina rouge du Pérou. Enfin on diroit que celui-ci ne diffère du premier que par la plus grande quantité d'oxigène qui y est fixée, & qui paroît exister également dans ses principes. Ainsi plus d'oxigène contenu dans le quinquina du Pérou, le rend en général moins dissoluble dans l'eau, rapproche son extrait de l'état résineux, donne à ses principes une saveur plus astringente & moins amère que celle du quinquina de Saint-Domingue, même même sur celle du résidu insoluble qui retient toujours un goût acerbe. Ainsi en chargeant les produits extraicts du quinquina de Saint-Domingue d'une certaine quantité d'oxigène, par le moyen de l'acide muriatique oxigéné, l'un des plus précieux instrumens que les chimistes modernes possèdent, on les rapproche de ceux du quinquina du Pérou, on diminue leur saveur amère, on y ajoute de l'astringence, on les rend insolubles, on les convertit, en un mot, presque en ceux du quinquina du Pérou, on diminue leur saveur amère & l'on imite les procédés de la nature, car c'est sans doute par plus d'absorption & de fixation d'oxigène, par les progrès de la végétation, que l'écorce du Pérou acquiert des qualités différentes de celles du quinquina de St.-Domingue. Peut-être même, en prenant ce dernier sur des arbres plus âgés, sur des branches plus grosses, lui trouverait-on des propriétés plus voisines de celles du quinquina du Pérou, car la forme, le peu d'épaisseur & la structure des écorces de St.-Domingue qui nous ont été remises, comparées au quinquina rouge du Pérou qui existe actuellement dans le commerce, annoncent qu'elles appartiennent à des branches plus petites & à un arbre plus jeune que celui du Pérou, qui sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus épaisses & plus ligneuses. Par la même raison, si l'on apportoit des écorces du quinquina du Pérou prises sur des arbres plus jeunes, il est très-vraisemblable qu'elles nous offrieroient dans leur analyse des phénomènes & des matières plus rapprochées de celles que nous offrent les écorces du quinquina de Saint-Domingue.

En rapportant ces connoissances & ces résultats aux propriétés médicinales de ces deux différens quinquina, il nous est permis d'espérer que l'art de guérir en tirera des lumières que les anciennes analyses ne pouvoient pas lui fournir. De tous les principes qui ont été extraits de ces deux écorces, il n'y a que la substance résino-extractive amère & astringente, dissoluble dans l'eau bouillante, qui nous paroisse avoir des propriétés tonique & fébrifuge; les fels neutres amers qui sont en très-petite quantité dans le quinquina, & qui d'ailleurs y sont masqués par la substance résino-extractive, ne peuvent pas influer sensiblement sur les vertus de cette écorce; le résidu, regardé autrefois comme terreux, ne paroît point avoir en effet plus de propriétés médicinales qu'une terre indissoluble n'en auroit. Il n'y a donc vraiment que

la matière extracto-résineuse qui puisse être regardée comme active dans le quinquina; mais les propriétés que nous avons déconvertes dans ce principe immédiat, & les altérations dont cette matière peu connue jusqu'ici nous a paru susceptible, suivant les proportions d'oxigène qu'elle contient naturellement dans cette écorce plus ou moins âgée, folide, rapide, &c., ou qu'elle absorbe avec une sorte d'avidité pendant la macération, l'infusion & sur-tout la décoction, & l'évaporation qu'on fait subir au quinquina, peuvent jetter le plus grand jour sur les propriétés & l'administration de cette écorce, soit en substance, soit en décoction, soit sous la forme des différens extraits qu'on prépare. Considérons d'abord le quinquina le plus utile, celui du Pérou, qui existe actuellement dans le commerce. En faisant prendre cette écorce en poudre, on conçoit que les $\frac{2}{3}$ de matière inerte, ligneuse, folide & insoluble qu'elle contient, n'ont d'autre action sur l'estomac & les intestins que celle de leur masse & de leur pression. Aussi a-t-on observé depuis long-temps que le quinquina en substance, pèse souvent sur l'estomac, excite des douleurs & des nausées, quelquefois même le vomissement, en un mot, qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas en supporter l'usage. Les médecins Anglois, pour diminuer ces inconvéniens, ont eu soin de faire réduire ce médicament en poudre d'une finesse extrême. Mais quelque ténuité qu'on lui donne, il est difficile de croire qu'un seizième de cette matière vraiment active & peu dissoluble, enveloppée par $\frac{15}{16}$ d'une substance laide, lourde, indigeste, puisse agir sur les fibres & sur les humeurs sans être préalablement extraite & séparée. Il paroît donc que les liquides de l'estomac & des intestins dissolvent & extraient la matière extracto-résineuse, & comme cette espèce de digestion demande des viscères robustes & un suc gastrique très-énergique, telle paroît être la cause pour laquelle ce remède en substance ne convient point à tous les hommes. Cependan il est d'observation que lorsque ce médicament passe, il agit beaucoup mieux de cette manière que sous une autre forme; nous croyons que la raison de cette supériorité d'action dépend de ce que la substance extracto-résineuse du quinquina est pure & sans altération, & de ce que ne pouvant pas absorber l'oxigène dans les premières voies où elle est extraite par les sucs de l'estomac & des intestins, elle y conserve & y porte toute l'énergie qui la distingue. Ainsi, lorsque l'op a à traiter des personnes robustes, le saisonnement, appuyé de nos expériences, & d'accord avec les observations médicinales, doit engager les médecins à l'administrer en substance. Les fels alcalis ou les terres alcalines, comme la magnésie, que plusieurs médecins Anglois ont proposé d'ajouter au quinquina ou avec lesquels ils aiguisent la décoction de cette écorce, peuvent être utiles en favori-

fant l'extraction de la matière active, qui, comme nous l'avons vu, est très-dissoluble dans ces sels; les inconvénients qui résultent souvent du quinquina donné en substance, ont frappé depuis long-temps les médecins & les ont portés à en extraire la partie active par l'eau, & même par différents dissolvans. On a sur-tout fait usage de cette écorce en décoction; mais cette opération n'a point encore été convenablement appréciée dans ses effets, car plusieurs praticiens ont remarqué qu'elle n'avait souvent que très-peu de propriété fébrifuge. Bergius assure que ces décoctions ont beaucoup moins de vertus que le quinquina entier. Elle dépend absolument de la manière dont on fait la décoction. M. Baumé a dit qu'en faisant bouillir long-temps le quinquina dans l'eau on décompose sa résine, & on ne fait que rendre sa décoction plus trouble & plus dégouttante qu'elle n'a de vertu; mais il n'a pas fait tout ce qui se passe dans cette opération. Une décoction d'une once de quinquina dans deux pintes d'eau réduites à une, & sur-tout dans quatre pintes de ce liquide réduites à une, comme le prescrivait Rouelle, ne contient rien du tout, ou au moins presque rien en dissolution lorsqu'elle est refroidie; en conservant cette décoction on la trouve deux ou trois heures après toute trouble, & la matière qui s'en dépose en flocons & en poudre rouge est si abondante & si complètement indissoluble, que l'eau qui la surmante est presque entièrement sans couleur; nous avons filtré bien des fois de pareilles décoctions du quinquina du Pérou, l'eau n'avait qu'une couleur jaune pâillée, ne fournissait presque rien par l'évaporation, & la matière déposée étoit en poudre brune rouge presque sans saveur & insoluble même dans l'eau chaude. On se rappelle ici les propriétés de cette substance résino-extractive; on la voit se séparer de l'eau, & devenir peu sapide & peu dissoluble à mesure qu'elle absorbe l'oxigène atmosphérique; on reconnoît que ces propriétés augmentent par les progrès de la décoction; cela est sur-tout sensible lorsqu'on fait l'observation dans un vase plat & qui laisse un grand contact à l'air; en prolongeant assez la décoction, toute la matière résino-extractive à mesure qu'elle absorbe l'oxigène atmosphérique devient indissoluble, presque insipide & se dépose toute entière; il ne reste absolument rien de l'eau. On conçoit qu'une pareille décoction n'a presque point de vertus, & que les observations des médecins sur son efficacité sont très-inexactes. La même chose a lieu sur des infusions de quinquina même dans l'eau froide, laissées long-temps à l'air dans des vases plats, la substance résino-extractive absorbe peu à peu l'oxigène & se sépare de la liqueur sous la forme de plaques rouges qui en forment la surface; si on la brise & si l'on agite le liquide, cette matière se précipite en flocons ou en poudre grossière; il s'en forme une nouvelle couche avec le temps, & cela continue jusqu'à

ce que l'eau ne contienne plus rien du tout. Nous invitons les médecins à donner cette matière déposée, soit pendant la décoction du quinquina du Pérou, soit par la longue exposition à l'air d'une infusion de cette écorce dans l'eau froide.

Il résulte des faits que nous avons recueillis, que la décoction du quinquina du Pérou n'est que très-peu fébrifuge; que si on veut qu'elle produise cet effet, & lorsque des circonstances pressantes obligent d'employer ce médicament sous cette forme, il est nécessaire de prescrire une décoction très-rapide & de quelques minutes seulement dans des vases fermés ou au moins de petite ouverture; qu'on ne doit point exposer cette décoction à l'air, mais la tenir dans des vaisseaux fermés, pendant l'usage que les malades en font, & jusqu'à ce qu'elle soit tout-à-fait prise par ces malades.

Quant aux extraits préparés par différents procédés avec le quinquina du Pérou, on doit juger facilement quels effets on peut attendre de celui qui est préparé par les longues décoctions. Plus des deux tiers de sa substance sont insolubles; c'est un médicament de peu de valeur. La Garaye, en multipliant les contacts & les frottements, est parvenue à extraire la substance résino-extractive du quinquina par l'eau froide; cette liqueur évaporée cependant avec précaution à la chaleur douce d'une étuve dans des vases plats, qui ont une grande communication avec l'air, donne un produit déjà fort altéré, déjà fort différent de ce qu'il étoit dans l'eau. En effet cet extrait fausement nommé *sul essentiel*, ne se dissout plus du tout dans l'eau froide: l'eau bouillante n'en prend qu'une partie qui, par l'évaporation & l'exposition à l'air, devient bientôt insoluble. Les preuves de l'altérabilité de cette substance sapide & active du quinquina par l'air & par son union avec l'oxigène, s'accroissent toujours, & sont en quelque sorte de cet objet la base de tout notre travail sur cette écorce médicaméteuse.

Si nous essayons maintenant de comparer le quinquina de Saint-Domingue à celui du Pérou, qui est employé aujourd'hui, nous verrons que la matière résino-extractive du premier étant beaucoup plus abondante & beaucoup plus sapide que celle du dernier, sa vertu doit être beaucoup plus énergique; aussi l'expérience médicale a-t-elle déjà avancé ce résultat de nos expériences. Cette écorce du quinquina de Saint-Domingue est émettique & purgative; son effet fébrifuge ou plutôt sa propriété anti-périodique, paroît être d'abord plus faible, que sa qualité évacuante est plus forte. C'est par cette comparaison que nous pourrions établir ce que l'influence de l'analyse chimique a de réel pour la connoissance & l'administration exacte des médicaments. Si cette influence est directe, comme nous le pensons, il doit résulter de nos expériences, 1°. que l'extrait en-

tier du quinquina de Saint-Domingue produira un effet analogue à celui du quinquina du Pérou, en le donnant à la proportion d'un seizième de la dose à laquelle on a prescrit ce dernier ; 2°. que la vertu de ce quinquina réside dans la substance résino-extractive seule ; 3°. que l'on peut espérer d'obtenir tous les effets de cette écorce, en employant la matière brune & ductile, qui se dépose par le refroidissement de la décoction ; 4°. que la saveur amère & la propriété vomitive qu'on reproche à ce quinquina, pourra être affoiblie, en combinant avec cette substance une certaine quantité d'oxigène par le moyen de l'acide muriatique oxigéné. Il seroit même possible qu'en affoiblissant ainsi la propriété émetique de la substance résino-extractive du quinquina de Saint-Domingue par l'addition de l'oxigène, on augmentât la propriété anti-périodique ; car n'oublions pas de rappeler encore ici que la seule différence réelle, essentielle aux progrès de l'art, que nous avons trouvée entre le quinquina de Saint-Domingue & celui du Pérou, consiste dans ce que le premier contient moins d'oxigène que le second, qu'on peut rapprocher leur substance active, en ajoutant ce principe à l'extrait du premier, & que puisque l'analyse ne nous a point offert autre différence entre ces deux quinquina, il est naturel de penser que celle de leur propriété tient à la proportion variée de ce principe.

Nous proposerions donc aux gens de l'art, & sur-tout à ceux qui habitent en Amérique, de rassembler ou d'insinuer ces idées par des expériences ; si cette proposition leur paroit utile aux progrès de la médecine, nous les prions de suivre les effets médicamenteux des différentes substances énoncées dans notre travail. Pour cela, il s'agit de faire préparer en quantités convenables pour les comparaisons expérimentales, 1°. la substance extractive altérée que déposent les décoctions du quinquina du Pérou, pendant leur refroidissement ; 2°. les plaques de la même matière, qui se rassemblent à la surface de l'infusion ou de la macération du même quinquina exposé à l'air ; 3°. la matière résino-extractive séparée pendant le refroidissement & l'évaporation des décoctions du quinquina de Saint-Domingue, matière qui ne diffère bien certainement du quinquina du Pérou, que par moins d'oxigène ; 4°. la poudre que l'on sépare de la précédente matière, poudre qui est insoufflée, insipide, que nous croyons sans vertu, & dans laquelle cependant il nous a paru qu'on convertit entièrement la substance active du meilleur quinquina, par les longues décoctions, évaporations, &c. 5°. la même substance active tirée soit du quinquina du Pérou, & surchargée d'oxigène par nos évaporations, (nous croyons lui enlever les vertus par ces évaporations), ou extraite du quinquina de Saint-Domingue, & unie à une grande quantité d'oxigène ; nous pensons que cette addition lui ôtera la qualité émetique,

& la rapprochera de la vraie substance active du quinquina du Pérou ; 6°. la même matière entièrement saturée d'oxigène convertie en résine fusible, insipide, &c. Nous pensons que cette matière ainsi altérée n'aura plus de vertus à quel-que espèce de quinquina qu'elle ait d'abord appartenu ; 7°. enfin les résidus autrefois nommés terreux des quinquina du Pérou & de Saint-Domingue, bien épuisés de ce qu'ils contiennent de sapide.

Ces expériences faites avec soin, assez multipliées, & dont on départira autant qu'il sera possible, les événements naturels des maladies, les guérisons spontanées, donneront certainement des lumières sur un des médicaments les plus précieux, que la médecine possède. Elles jetteront peut-être aussi quelque jour sur une découverte dont nos recherches nous ont fait entrevoir la possibilité ; celle d'une substance anti-périodique, fébrifuge, qui, une fois connue, pourroit être trouvée & extraite dans d'autres végétaux. Nous faisons des vœux, pour que de pareils travaux soient entrepris sur les grands médicaments que l'art possède, & dont il tireroit sans doute un parti bien plus avantageux encore, si leurs principes étoient mieux connus. Si nos forces pouvoient nous le permettre, nous ébaucherions au moins ces travaux sur l'opium, le camphre, les cantharides, les plantes anti-scorbutiques, l'ipécacuanha, les plantes dépurantes, les narcotiques & les vireux.

Telle est l'analyse d'une matière végétale sèche qui a depuis long-temps fixé l'attention des médecins chimistes, dont les efforts sont très-actifs sur l'économie animale ; il m'est permis de dire qu'aucun travail n'a encore été fait avec autant d'exactitude sur une écorce ou un bois, que celui qui se présente ici. On pourroit peut-être y trouver trop de longueur, mais qu'on réfléchisse qu'elle est nécessaire dans un premier travail fait de cette manière, que lorsqu'on en aura entrepris plusieurs avec cette étendue, on pourra élucider beaucoup de ces détails, mais qu'il étoit indispensable ici d'être long pour être clair.

On conçoit bien que l'analyse des substances végétales, molles & succulentes doit exiger une marche & des moyens différents de celle des substances végétales sèches. L'expression des sucs est la première opération qu'on doit leur faire subir. On examine ensuite ces sucs par l'action de l'air, qui en sépare plus ou moins promptement la fécule, l'extrait, la partie colorante, &c., par des évaporations ménagées qui donnent successivement les sels, le mucilage, la résine, l'extrait ; par l'alcool qui isole les divers principes contenus dans les sucs entièrement épaissis en extraits ; par les acides qui opèrent également des séparations quel-quefois inattendues ; par l'acide muriatique oxigéné qui modifie l'extrait, de manière à le rendre insoluble dans l'eau, &c., par les alcalis qui ab-

forbent les acides, &c., lorsqu'on a épuisé tout ce que l'analyse par dissolution ou l'analyse par altération peuvent offrir de ressources pour connoître & déterminer la nature & la proportion des divers matériaux dissous ou mêlés aux sucs, il faut ensuite porter toute son attention sur la substance végétale solide, privée des liquides. Il faut en la traitant d'abord par l'eau froide, & par la macération, par l'eau chaude employée en infusion, & par l'eau bouillante, jusqu'à ce qu'elle cesse d'en dissoudre quelque principe, ensuite par l'alcool & l'éther, en retirer les portions d'extrait, de mucilage, de sels essentiels, de résine & de gomme-résine que la nutrition végétale y a collés aux divers tissus fibreux. Cette seconde tentative étant terminée, il ne reste plus ensuite que la partie ligneuse, le squelette végétal, dont la base est, comme on l'a vu par l'analyse du quinquina formée en très-grande partie de matière charbonneuse, unie, à ce qu'il paroît, avec le moins possible d'hydrogène & d'azote.

Un des moyens d'analyse végétale qui n'a point encore été autant employé qu'il pourra l'être quelque jour, est relatif aux changemens produits par la fermentation. On ne connoît pas encore à beaucoup près toutes les ressources de cette analyse naturelle ou spontanée. On ne fait que prévoir les résultats utiles qu'elle offrira, lorsqu'on la tentera avec les instrumens imaginés par M. Lavoisier, pour obtenir tous les produits & apprécier toutes les conversions de principes qui ont lieu pendant cette décomposition & cette recomposition. Il en sera question aux mots APPAREILS & FERMENTATION. Elle n'est indiquée ici que comme une des méthodes générales d'analyse végétale, & pour ne rien oublier de ce qui peut être utile à cette analyse.

§. V. De l'analyse des matières animales.

L'analyse des substances animales est la partie de la chimie la plus difficile & la moins avancée; les chimistes anciens se sont contentés de distiller à feu nu ces matières, & l'on fait aujourd'hui que cette opération altère & dénature entièrement les corps aussi composés que le sont les substances solides ou fluides des animaux. On n'a encore soumis à l'analyse que quelques-unes des humeurs de l'homme & celles de certains quadrupèdes.

Beaucoup de raisons se sont opposées à l'avancement de cette branche de la chimie; la difficulté & le désagrément de ces travaux, le peu de ressources que la science offroit il y a quelques années, pour traiter les matières animales, sans leur faire éprouver de grandes altérations, l'impossibilité de trouver la synthèse même la plus éloignée de la nature, pour reproduire ces matières, & sur-tout le peu d'intérêt que la plupart des chimistes non médecins ont eu jusqu'à présent pour les connoissances que cette analyse peut fournir,

sont les principaux motifs qui ont arrêté les progrès de la science sur cet objet. Cependant les recherches de quelques modernes, sur-tout de M. Rouelle, Macquer, Ruquet, Poulletier, Berthollet, Proust, Scheele & Bergman, ont ouvert une carrière nouvelle, & annoncent que l'art de guérir pourra retirer de grands avantages de ce genre de travail.

Le corps des principaux animaux & sur-tout de l'homme & des quadrupèdes, est formé de fluides & de solides. On distingue les humeurs des animaux en trois classes, relativement à leur usage. La première classe renferme les humeurs récemment sécrétées, destinées à nourrir quelques organes; la seconde comprend les humeurs excrémentielles, qui sont rejetées hors du corps par quelques exhalatoires, comme inutiles & même comme susceptibles de nuire, si elles étoient retenues trop long-temps, dans la troisième, on range les humeurs qui tiennent des deux précédentes, & dont une partie est récrémentielle & l'autre excrémentielle. Les premières sont le sang, la lymphe, la gelée ou gélatine, la partie fibreuse ou glutineuse, la graisse, la moëlle, la matière de la perspiration intérieure & le suc osseux. Les secondes comprennent le fluide de la transpiration, celui de la sueur, le mucus des nases, le cérumen des oreilles, la chassée des yeux, l'urine & les excréments. Les dernières sont la salive, les larmes, la bile, le suc pancréatique, le suc gastrique & intestinal, le lait & la liqueur féminale. Il s'en faut de beaucoup que toutes ces liqueurs aient été convenablement examinées. On a fait beaucoup d'expériences & de découvertes sur le sang, le lait, la bile & l'urine; la graisse est assez bien connue. Nous avons examiné avec soin les larmes & le mucus nasal, M. Vauquelin & moi. M. Vauquelin vient de donner, il y a quelques mois une analyse très-détaillée & très-bien faite de la liqueur féminale; il a donné, il y a quelques années, conjointement avec M. Macquart, une analyse du suc gastrique.

Les solides des animaux, qui forment le parenchyme de leurs différens organes, peuvent être divisés en trois classes. Je range dans la première les parties molles & blanches, comme les lames du tissu cellulaire, les membranes, les viscères membraneux, les aponeuroses, les ligamens, les tendons, la peau. Les parties molles & rouges forment une seconde classe fort distincte de la première. Ils sont en particulier les muscles, & une partie des organes qui contiennent des fibres musculaires, comme l'estomach, les intestins, la vessie, la matrice, &c. Enfin la troisième classe comprend les solides osseux.

L'analyse animale est aujourd'hui fort différente de ce qu'elle étoit il y a quelques années. On n'a plus recouru à la décomposition par le feu. On traite les matières animales par les réactifs, & en particulier par les acides, par les alcalis, par

l'alcool, &c. On sépare par le repos, par la décantation, par les filtrations, par l'expression, les différens fluides mêlés les uns avec les autres, ou contenus dans les mailles & dans les vésicules des différens tissus. On examine l'action de ces substances sur les matières colorantes; on observe les changemens divers qu'elles éprouvent à des températures différentes. On évapore avec soin les liqueurs animales, & l'on en retire sans altération les différens sels qu'elles contiennent.

C'est en employant ces moyens d'analyse que les chimistes modernes ont fait plusieurs découvertes importantes sur les substances animales. Schéele y a trouvé quelques acides différens de tous ceux qui étoient connus, & sur-tout les acides lactique, saccho-lactique, lithique, &c. M. Berthollet a démontré la présence de l'acide phosphorique à nu dans l'urine & dans la sueur; il a aussi trouvé dans les matières animales une quantité remarquable d'azote. Cette dernière découverte est un des points les plus importants de l'analyse animale; la présence de l'azote dans ces substances, & sur-tout dans les parties fibreuses, explique la différence de nature qui existe entre ces substances & les matières végétales. Il suffit pour en retirer ce corps en fluide élastique, ou en gaz azote, de traiter la chair des muscles avec l'acide nitrique; il se dégage en quantité assez considérable, même sans le secours d'une chaleur étrangère; & ce gaz passe avant le gaz nitreux, & l'on doit interrompre l'opération, & changer de cloches, lorsque ce dernier commence à se dégager; c'est-à-dire, lorsque l'acide nitrique commence à se décomposer.

M. Berthollet explique par cette découverte la formation de l'ammoniaque, que donnent les substances animales par l'action du feu, la production & le dégagement de ce sel par la putréfaction, le rapport qui existe entre ces substances & celles des matières végétales qui sont susceptibles de se pourrir, & qui fournissent comme elles de l'ammoniaque par la distillation. Il paroît en effet que cet alcali se forme dans l'un & dans l'autre cas par la combinaison de l'hydrogène avec l'azote. Je crois ne pouvoir mieux faire que de donner ici ce que M. Berthollet a exposé sur la nature générale des substances animales dans un mémoire lu à une séance publique de la faculté de médecine, & inséré dans le journal de physique, tome 28, page 172. Je laisserai l'auteur parler.

Les corps organisés sont principalement composés de deux substances qui ont des caractères distinctifs très-marqués. Les uns donnent de l'acide, lorsqu'on les décompose par l'action du feu, & les autres de l'ammoniaque; les uns sont propres à former de l'alcool par la fermentation, les autres se putréfient immédiatement, & donnent encore de l'ammoniaque; les uns laissent par la calcination, un charbon qui se brûle facilement, les autres se réduisent en un charbon dont la

combustion est difficile; enfin les unes forment la plus grande partie des substances végétales, & les autres, la plus grande partie des substances animales, & de là vient qu'on les distingue par ces deux dénominations.

M. Bergman avait formé, par le moyen du sucre & de l'acide nitreux, un acide qu'il nomma *acide saccharis*, & qui a des propriétés remarquables; j'appliquai aux substances animales cette espèce d'analyse par l'acide nitreux, & je trouvai que toutes donnoient une quantité plus ou moins grande d'acide saccharis ou oxalique; mais toujours accompagné d'une huile particulière; j'observai qu'on ne retiroit point de sel ammoniacal; mais qu'il restoit un résidu que l'on ne retrouvait pas dans les substances végétales. Je conclus de ces premières expériences, *mémoires de l'académie 1780*, que ces substances contenoient une matière analogue au sucre, & une huile que je regardois comme propre aux substances animales. Mes expériences m'apprennent encore que l'ammoniaque n'existoit pas dans les substances animales; mais qu'il étoit dû à une combinaison qui se formoit ou par l'action de la chaleur, ou par l'influence de la putréfaction, & enfin, le résidu sur lequel je ne m'expliquai point dans ce mémoire, contient de l'acide phosphorique en excès, combiné avec la terre calcaire.

J'examinai ensuite l'action que la chaux & les sels métalliques exercent sur les substances animales, & je prouvai que cette action à laquelle est due leur causticité, est une suite des affinités chimiques des oxides métalliques qui tendent à se revivifier avec plus ou moins de force; de sorte que ceux qui se revivifient très-facilement, telles que les oxides d'argent, de mercure, ont beaucoup de causticité & forment des sels très-caustiques. Il résulte de là, en appliquant les découvertes modernes des physiciens à la théorie que j'avois donnée, que c'est l'oxigène combiné dans les oxides métalliques & privé du principe de l'élasticité, qui tend à s'unir avec un principe des substances animales, & ce principe me paroît être l'huile qu'elles contiennent; mais la causticité des alcalis ne pouvant être attribuée à la même cause, elle devoit être l'effet d'une autre affinité. J'ai prouvé dans les mémoires de l'académie de 1782, que l'alcali fixe caustique dissolvait les substances animales, sans dénuier leurs principes; j'ai fait connoître les propriétés de cette combinaison, & je m'en suis servi pour unir ensuite la substance animale avec les différens oxides métalliques; il en est résulté plusieurs combinaisons qui étoient inconnues aux chimistes, mais l'alcali caustique traité de même avec les substances végétales n'a point formé de combinaison avec elles.

En suivant mes recherches, je suis parvenu à déterminer les principes de l'ammoniaque; j'ai fait voir que cette espèce d'alcali étoit un composé d'hydrogène

d'hydrogène de l'azote ou *mofate*, de sorte que l'hydrogène fait à-peu-près le sixième en poids des deux tiers en volume de l'ammoniaque, lorsqu'il est sous la forme déjà inflammable. J'ai ensuite déterminé comment l'ammoniaque peut être produit par la putréfaction ou par l'action du feu. Toutes les substances qui ont le caractère de substance animale contiennent de l'azote, qu'on peut en séparer abondamment par le moyen de l'acide nitrique : il faut donc, lorsqu'on distille ces substances, que leur azote passe dans quelque combinaison, ou qu'on la retrouve dans les produits aëriiformes ; or on ne la retrouve point dans ces derniers ainsi que je m'en suis assuré en faisant détoner le gaz inflammable qu'on obtient par ce moyen, dans l'eudiomètre de M. Voïta, & en le comparant avec le gaz inflammable, qu'on obtient par la distillation du charbon & celle des substances végétales ; il n'y a dans les autres produits de la distillation que l'ammoniaque qui ait pu recevoir l'azote dans sa composition. Lors donc qu'il se forme de l'ammoniaque, l'azote des substances animales se combine avec l'hydrogène qui se sépare de l'huile, ou plus probablement avec celui qui provient de la décomposition de l'eau, dont l'oxygène se combine en même-temps avec du carbone pour former de l'acide carbonique. Dans la putréfaction l'hydrogène se combine avec l'azote, au lieu que dans la fermentation vineuse, ce même principe se combine avec une huile végétale & du sucre pour former l'alcool, dans lequel j'ai retrouvé & séparé ces substances par le moyen de l'acide muriatique oxygéné.

Il résulte de ces différentes observations, que les substances animales sont beaucoup plus composées que les substances purement végétales ; elles contiennent une matière analogue au sucre, une huile particulière, de l'acide phosphorique combiné avec un peu de terre calcaire, de l'azote, & très-probablement de l'acide carbonique ; c'est l'acide phosphorique qui se retrouve dans les charbons des substances animales, combiné avec une portion de véritable charbon, d'huile & de terre, qui me paroît former la différence qu'on remarque entre les charbons des substances végétales & ceux des substances animales.

Telle est la manière claire & lumineuse dont M. Berthollet a connu & exprimé il y a quelques années la nature générale des substances animales.

Lorsqu'on compare ces résultats précis aux idées vagues que l'on avoit présentées jusqu'ici sur la différence des matières animales & végétales, on est frappé des progrès que la chimie a faits depuis quelque temps, par les recherches des chimistes Suédois & François. Il y a tout lieu d'espérer que des travaux suivis sur les matières animales d'après le plan tracé par les plus célèbres chimistes, depuis Margraf & Rouelle jusqu'au moment actuel, donneront beaucoup de connois-

Chimie, Tome II.

sances sur ces substances, sur leur formation, leur altération & leur destruction, & seront spécialement très-utiles à l'art de guérir.

Il y a actuellement quinze ans que je ne cesse de traiter par tous les moyens que l'art fournit les diverses substances animales ; ou a du déjà voir dans l'article albumine à quelles découvertes peut conduire l'analyse chimique telle qu'elle existe aujourd'hui. J'ai trouvé la cause de la concrétibilité de la matière albumineuse dans la fixation & la combinaison de l'oxygène. En traitant les calculs biliaires, le parenchyme du foie humain exposé pendant long-temps à l'air, la matière des cadavres déposés dans la terre & convertie en *gras*, j'ai découvert la présence d'une très-grande quantité de substance huileuse analogue au blanc de baleine dans un grand nombre de produits animaux. Les calculs ou les concrétions pierreuses de l'homme & des animaux, situés dans plusieurs régions différentes ; celles de la vessie, des reins, des intestins, les incrustations & dépôts taphacées des articulations dans les gouteux, m'ont offert des résultats utiles pour la physique animale ; les calculs biliaires que l'analyse chimique que j'en ai faite m'a permis de distinguer en plusieurs espèces m'ont également présenté des indications d'un grand intérêt, pour la formation de la bile, & pour la connoissance des maladies du foie. On doit rapporter ici l'analyse du foie de la rate, faite par M. Vauquelin, & dans laquelle il a eu occasion de faire quelques observations immédiatement applicables à la physique animale, & notamment à la découverte des fonctions encore trop peu connues du système biliaire. Une analyse nouvelle du sang, de diverses espèces de lait & de leurs produits, m'a offert il y a deux ans un assez grand nombre de faits qui doivent contribuer à l'avancement de la physique animale. J'ai fait voir il y a déjà long-temps que l'analyse exacte des différents tissus du corps des animaux & surtout des muscles, du parenchyme des viscères, des lames membraneuses, pourroient jeter un grand jour sur la nutrition, sur la formation de chacun de ces organes, qui a sa composition différente & qui doit avoir de même sa nutrition & son influence particulière dans le système animal. Un examen détaillé de la substance cérébrale dont on trouvera l'exposé au mot CERVEAU, confirme aujourd'hui ce premier résultat. On connoît tout le mérite du travail de Scheele sur les os, & de sa découverte relative au phosphate de chaux qui les forme ; on ne doute point de l'utilité de ce travail pour la connoissance de l'ostéogénie & des maladies des os. M. Berthollet a ouvert également par sa découverte de la variété de l'acidité des urines chez les gouteux, un champ très-étendu aux découvertes médicales sur la nature & la cause de la goutte. Plus récemment un autre champ de recherches importantes & de découvertes immédiatement utiles aux progrès de l'art

N a

de génier, vient de s'offrir par les travaux de M.M. l'avoiser & Séguin, sur la respiration & la transpiration. Ainsi tout annonce les grands avantages de l'analyse chimique pour l'agrandissement de la physique animale. Tout est disposé pour la poursuite de ces grands travaux, & l'on peut dire qu'il ne manque que des travailleurs dont le nombre ne sauroit être trop considérable, pour aggrandir ces importantes recherches. Quelques physiciens ont révoqué en doute une partie des découvertes modernes sur la chimie animale; cette belle différence trouvée par M. Berthollet entre les substances animales & les végétales, dans la présence de l'azote pour les premières, & d'où il a fait découler si naturellement & si heureusement toutes les différences de leurs analyses, n'a pas paru bien prouvée à M. Keir qui a fait connaître ses objections à cet égard dans son édition du dictionnaire de chimie de Macquer. Mais M. Berthollet en examinant les assertions sur lesquelles le chimiste Anglois se fonde, y a répondu d'une manière victorieuse: il est indispensable d'insérer ici la refutation que M. Berthollet en a faite dans les annales de chimie, tome X page. 131.

M. Keir élève, dit-il, plusieurs difficultés sur l'existence de l'azote dans les substances animales; il insiste particulièrement sur ce que l'acide sulfurique & l'acide muriatique n'en dégagent pas: on dirait qu'il a examiné l'action de ces acides; mais il me paroît qu'il s'est contenté de l'imaginer: je vais exposer ce que j'ai observé.

J'ai mis de la laine dégraissée dans l'acide sulfurique, elle s'est dissoute à une légère chaleur; la dissolution étoit d'abord sans couleur, mais en augmentant la chaleur elle a bientôt noirci.

J'ai mis dans une cornue de l'acide sulfurique avec une portion de laine que l'expérience précédente m'avoit indiqué pouvoir se dissoudre, & j'ai fait la distillation à un appareil pneumatique. Il s'est dégagé une assez grande quantité de gaz, dont à-peu-près les $\frac{2}{3}$ étoient de l'acide carbonique. Après avoir absorbé tout cet acide, le résidu étoit inflammable, il contenoit peut-être du gaz azote, & je me proposois de m'en assurer par les moyens que j'ai décrits (1), si la suite de l'expérience ne me donnoit pas des lumières suffisantes. A la fin de la distillation il s'est sublimé une quantité considérable de sulfate d'ammoniaque tr.s-blanc; il n'est resté dans la cornue qu'un enduit charbonneux. J'ai répété l'opération en retenant dans un récipient l'acide sulfureux qui se forme: la première moitié éprouvée avec la chaux donnoit des nutres blancs, lorsqu'on promettoit à sa surface un tube de verre humecté d'acide nitrique; la seconde moitié produisoit encore plus cet effet. L'acide sulfureux qui

se forme dans cette opération contient donc de l'ammoniaque.

J'avois essayé autrefois la distillation de l'acide muriatique sur une substance animale; mais sans prendre les précautions suffisantes, & j'avois obtenu un gaz inflammable que je m'étois proposé d'examiner. Il y a apparence que je n'avois pas employé une assez grande proportion d'acide muriatique, & que le gaz que j'obtiens étoit dû à l'action du feu sur la substance animale même.

J'ai examiné l'action de l'acide muriatique sur la laine dans une capsule placée sur un bain de sable: elle s'y dissout même plus facilement que dans l'acide sulfurique; mais il faut une chaleur continuée plus long-temps pour que la dissolution prenne une couleur foncée: elle finit par être noire.

J'ai mis dans une cornue de l'acide muriatique, & la proportion de laine que l'expérience précédente m'avoit appris pouvoir s'y dissoudre; mais lorsque l'appareil a été privé d'air, les vapeurs d'acide muriatique en se combinant d'une manière soudaine avec l'eau, ont pu produire une résorption qui a fait passer l'eau dans la cornue. Une seconde épreuve, faite avec des précautions nouvelles, ne m'a pas mieux réussi; alors j'ai fait l'expérience en adaptant simplement un récipient à la cornue. Sur la fin, il s'est sublimé une proportion considérable de sulfate ammoniacal, dont une partie étoit brune, & celle qui étoit la plus avancée dans le col de la cornue étoit très-blanche. Il est resté dans la cornue une quantité de charbon beaucoup plus considérable que dans l'expérience avec l'acide sulfurique: le charbon lessivé a donné une dissolution qui contenoit une quantité notable de fer. A en juger par l'odeur des vapeurs qui s'échappoient sur la fin de l'opération, il a dû se dégager du gaz hydrogène.

Nous retrouvons donc, en traitant une substance animale avec l'acide sulfurique & l'acide muriatique, le principe qui se sépare sous la forme de gaz azote, lorsqu'on la dissout par le moyen de l'acide nitrique. Si l'on demandoit pourquoi dans une circonstance il entre en combinaison & forme de l'ammoniaque, & dans l'autre il se dégage en gaz, je pourrais dire qu'il me suffit que l'existence de ce principe dans les substances animales, loin d'être démentie par l'action de l'acide sulfurique & de l'acide muriatique, en reçoive au contraire une nouvelle confirmation. Mais je proposerais une conjecture.

L'acide sulfurique & l'acide muriatique exerçant une action moins vive sur les substances animales que l'acide nitrique suffisamment concentré, & ayant besoin d'une chaleur assez forte pour opérer leur décomposition, l'azote se trouve dans des circonstances semblables à celles de la distilla-

(1) Suite des observations sur la nature des substances animales. Mémoires de l'Académie, 1785.

tion à feu nud, pour se combiner avec l'hydrogène, & former avec l'acide un sel ammoniacal; une partie surabondante de l'hydrogène est obligée de prendre l'état élastique.

Il faut remarquer qu'avec l'acide sulfurique il reste très-peu de charbon, mais qu'on retire beaucoup d'acide carbonique; avec l'acide muriatique on a une beaucoup plus grande proportion de charbon, & on peut conclure qu'il doit se dégager très-peu d'acide carbonique.

Lors la distillation à feu nud, on retire certainement beaucoup plus de gaz hydrogène que dans la distillation avec l'acide sulfurique; il est probable qu'une partie de l'hydrogène est détruite par sa combinaison avec l'oxygène qui se sépare de l'acide sulfurique, lorsqu'il est changé en acide sulfureux, & qu'une partie de l'hydrogène est due, dans la distillation à feu nud, à la décomposition de l'eau.

Je suis convenu (Annales de chimie, tom. 3, page 107) que l'expérience par laquelle j'ai prouvé l'existence de l'azote dans les substances animales n'avait pas d'abord l'exactitude que l'on a droit d'exiger. Pourquoi a-t-elle obtenu l'assentiment des anti-phlogistiques? c'est qu'elle s'accordait avec l'idée qu'ils avoient de l'azote, de la composition de l'ammoniaque qu'ils regardoient comme bien établie, de celle de l'acide nitrique, des produits de la distillation & de la putréfaction; c'est qu'elle s'étoit sur un grand nombre de phénomènes qu'elle expliquoit, ou qui lui servoient de preuves. Examinons quelques circonstances de cette expérience.

Lorsque l'acide nitrique est décomposé par une substance, il donne du gaz nitrique ou du gaz azote, selon la vivacité de la décomposition; si elle se fait rapidement & d'une manière tumultueuse, si la substance qui s'empare de l'oxygène a une plus grande affinité avec ce principe, alors c'est du gaz azote pur, ou mêlé avec du gaz nitreux, qui se dégage; si au contraire la décomposition est moins vive, c'est du gaz nitreux (Voyez mém. de l'acad. 1. 85, p. 336, l'expérience que j'ai décrite sur la soie traitée avec l'acide nitrique. Ibid. page 332). C'est dans le commencement de l'opération & sans feu que le gaz azote se dégage, ce n'est qu'après ce dégagement paisible, lorsque l'effervescence est animée par le moyen de la chaleur, & dans le moment par conséquent où l'on auroit pu soupçonner la séparation de l'azote de l'acide, que j'ai obtenu le gaz nitreux.

Ces observations de M. Bertholot, sur les objections de M. Kir, sont claires & tellement fondées sur l'expérience, qu'on doit s'attendre à ne plus voir reproduire des difficultés de cette nature, & que la masse des faits recueillis sur l'analyse animale, & sur la nature composée des substances de ce règne avec celles du règne végétal, par les travaux des chimistes français, doit être

regardée comme une base solide sur laquelle repose la théorie qu'ils ont présentée. On doit voir manifestement que toutes ces découvertes éclaircissent la physique animale, & qu'elles en changent presque entièrement les bases; de là leur application a été tentée par plusieurs physiiciens à la respiration, à la digestion & à la nutrition. Voyez l'article ANIMALISATION, qu'on considère dans ce dictionnaire comme une opération chimique.

Il n'est pas nécessaire sans doute d'insister longtemps sur les avantages que promet cette marche nouvelle de l'analyse animale, lorsqu'elle prendra pour sujet de ses travaux les matières altérées, changées, modifiées ou entièrement formées par les effets des maladies. Il n'est pas permis de douter qu'il en sortira tout - à - coup de grandes vérités, qui conduiront non seulement à connoître la nature des maladies, les changements, les conversions qu'elles éprouvent si souvent, mais même les véritables moyens de les traiter. On a déjà reconnu la vérité de cette assertion, par rapport aux prétendus lithontriptiques, pour l'usage des absorbans, dans le traitement des empoisonnés, dans l'administration des cautiques, &c. Ce sera dans des hôpitaux peu nombreux en maladies, mais où l'on rassemblera un certain nombre de sujets affectés de la même maladie pour en bien observer tous les phénomènes & les symptômes, pour en bien saisir les nuances & les différences, & qui seront destinés au perfectionnement de l'art de guérir, qu'il faudra multiplier les travaux en ce genre, & que l'on pourra reconnoître une foule de phénomènes chimiques dont on n'a encore nulle idée exacte. Les maladies qui attachent le tissu des os, soit en les ramollissant, soit en les desséchant, soit en augmentant leurs diminutions par les exostoses, soit en corrodant leur tissu par la carie, soit en les renouvelant par les séquestres, tiennent manifestement à des changemens chimiques dans le suc osseux, que des analyses bien faites de ces organes malades comparées à celles des os sains feront certainement découvrir. Les caractères intimes de l'urine qui offre des connoissances jusqu'ici trop incertaines pour le diagnostic & le pronostic des maladies, qu'ils accompagnent, deviendront infiniment plus utiles qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent. La nature de la goutte, du calcul, du rhumatisme, du cancer, qu'on a vainement cherchée dans l'observation clinique seule, ne sera peut-être un problème que jusqu'au moment où une analyse chimique bien faite des concrétions arthritiques, calculeuses, du humeur & des organes infectés du cancer, réunie à celle de l'urine, de la sueur & des autres évacuations des malades qui éprouvent ces affections, donnera des lumières, qu'on attendroit en vain de l'observation muette & silencieuse de ces organes de la vie humaine. En un mot, s'il existe une route faite pour conduire l'art de guérir à une exactitude qu'il a trop méconue jusqu'ici, tout

annonce que la chimie seule, telle qu'elle est aujourd'hui, peut la faire découvrir; car il y a déjà long-temps que les bornes de l'anatomie sont posées, & que cette science a fini de donner tout ce qu'elle étoit capable de fournir pour la connoissance des maladies. *Voyez les mots BILE, BLANC DE DALEINE, CALCUL, CERVEAU, FOIE, LAIT, MUSCLES, OS, PUTREFACTION, MUCUS, SALIVE, SPERME, URINE, &c. &c.*

§. VI. *Vues sur l'avancement de l'art de l'analyse.*

On a donné un tableau assez complet de tout ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui sur la décomposition ou l'analyse des corps naturels, dans les paragraphes précédens. On a déterminé sur-tout les obstacles que l'art d'analyser les corps a rencontrés & qui l'ont arrêté. Il résulte de ce qui a été exposé, que si cet art singulièrement perfectionné a su faire trouver la nature d'un grand nombre de corps qu'on avoit ignorés autrefois, & a même fait ranger parmi les matières composées quelques-unes de celles qu'on avoit pendant long-temps comptées au nombre des corps simples, il a fait connoître en même temps que beaucoup de corps qu'on avoit regardés comme composés & qu'on avoit cru avoir décomposés, n'en sont réellement pas susceptibles. Ainsi l'analyse n'a pas pu agir sur la lumière, le calorique, l'oxigène, l'azote, l'hydrogène, le carbone, le soufre, le phosphore & les substances métalliques. Toutes ces substances n'éprouvent aucune décomposition de la part de tous les agens connus; elles ont jusqu'ici résisté à tous les instrumens qu'on leur a appliqués, à toutes les méthodes auxquelles on les a soumis. On ne peut cependant pas croire, comme nous l'avons déjà fait soupçonner précédemment, que ces corps soient des matières simples, des élémens dans le sens qu'on leur donnoit autrefois; tout annonce au contraire qu'ils sont formés de principes plus simples qu'eux; mais il paroît que la force de leur adhérence est telle, qu'il n'y a encore aucun effort connu capable de les séparer. On ne doit point conclure de l'état actuel de l'art chimique, qu'on ne parviendra point à les analyser quelque jour. Il y a au contraire lieu de présumer que l'art en se perfectionnant encore, s'élèvera jusqu'à décomposer des corps qui sont pour nous des êtres simples ou indécomposables. Mais il n'est pas douteux qu'avant d'en venir là, il faudra créer de nouvelles méthodes d'analyse entièrement différentes de celles que nous possédons, comme il a fallu imaginer tous les appareils pneumatiques, pour travailler à analyser l'air & les fluides élastiques. Il y a vingt ans qu'on n'avoit nulle idée de ces derniers appareils & des moyens ingénieux qu'ils ont fait naître. On n'a donc de même nulle idée encore de ceux qui pourront servir quelque jour à nous éclairer sur la nature de la lumière, du calorique, de l'hydrogène,

de l'oxigène, de l'azote, du carbone, du soufre, du phosphore & des métaux. Tout ce qu'on a dit sur ce point, est entièrement hypothétique. Cependant parmi les faits que l'on cite, pour appuyer quelques-unes de ces hypothèses, il faut distinguer quelques expériences ingénieuses qui sortent de la route commune, & qui ne s'accordant pas, ou plutôt ne se liant point encore assez étroitement avec la doctrine adoptée aujourd'hui des chimistes françois, semblent donner des vues pour pousser plus loin & nos connoissances & nos moyens. Telles sont les expériences sur la chaleur ardente & rayonnante, ainsi que sur la lumière, conignée dans le traité de l'air & du feu de Scheele. On y trouve des phénomènes incohérens avec ce que nous savons; mais qui, si je ne me trompe, serviront quelque jour à enrichir les méthodes d'analyses; car on ne peut plus espérer de découvertes dans ce genre, que par l'application des moyens trop peu examinés jusqu'ici, & d'un ordre supérieur, en quelque sorte, à ceux qui ont été mis en usage. Telles sont les machines destinées à faire passer, à condenser, à épargner, à décomposer & à recomposer la lumière; les appareils appropriés à l'examen des phénomènes & des combinaisons du calorique, les grandes machines électriques. Voilà les nouvelles sources où l'on pourra puiser pour accroître les moyens, & augmenter les ressources de la chimie; on voit qu'elles ne seront ouvertes que par un heureux accord des parties les plus sublimes de la physique expérimentale avec les connoissances chimiques. (*Voyez les mots LUMIÈRE, CALORIQUE, FLUIDE ELECTRIQUE.*)

ANANAS. *Bromela ananas.* L. L'ananas est le plus gracieux de tous les fruits. Aussi est-il fait pour orner la table des rois, des riches, & des heureux de ce siècle. Né dans les Indes orientales, transplanté dans les occidentales & depuis peu en Europe, où il n'a réussi qu'avec les secours des terres chaudes & d'une culture dispendieuse & recherchée, il faut trois années au moins pour voir sa tige fleurir, & près de six mois pour la voir parvenir à son point de maturité. Ce fruit est d'abord vert, ensuite en mûrissant, il prend une belle couleur orange. On le mange coupé par tranches & trempé dans un peu de sucre ou même sans sucre, ou trempé dans du vin & de l'eau-de-vie. Son goût est mêlé de celui du citron, de l'orange, de l'abricot & du melon; il surpasse tous ces fruits par son odeur & sa saveur. Ce fruit n'est pas seulement agréable au goût, il est aussi fort salutaire. Il facilite la digestion sans la précipiter, il ramène l'estomach sans l'échauffer: c'est un analeptique par excellence. On en fait un sirop très-bon pour la coqueluche des enfans.

Lemery dit qu'on tire par expression de l'ananas un suc dont on fait un vin excellent, qui vaut

presque le Malvoïse, & qui enivre ; il fortifie, arrête les nausées, réveille les esprits abatus, provoque les urines ; on dit que les femmes enceintes doivent s'en abstenir. On confit les ananas, & cette confiture est bonne pour les personnes d'un tempérament foible.

Michel-Bernard Valentin, dans son histoire réformée des plantes exotiques, rapporte que l'ananas passe pour être diurétique & un lithontriptique très-puissant.

J'ai souvent avec les ananas, dit Chevalier, médecin de Paris, dans son traité des plantes de Saint-Domingue, fait de la limonade pour les fièvres ardentes & même malignes. On les coupe par tranches que l'on met dans l'eau avec un peu de sucre : je crois qu'il est préférable au citron du pays, qui est fort acré.

Un botaniste, habitant des îles occidentales de l'Amérique a annoncé le jus d'ananas à demi-mûr, comme un bon spécifique contre la gravelle.

Les Italiens préparent une liqueur spiritueuse très-agréable avec l'ananas, qu'ils nomment *naraja*.

La plante qui donne ce fruit délicieux a la feuille qui ressemble à celle de l'aloë, ordinairement dentelée comme elle, mais moins épaisse & moins succulente : elle a plusieurs variétés. Quant à la culture il faut consulter le dictionnaire du jardinier par Miller, dont nous devons la traduction à M. de Chazal de Metz. Nous avons vu à la maison de campagne de ce fâveur, des ananas aussi parfaits que ceux des Indes.

Les habitants des Indes orientales font macérer dans l'eau les feuilles de cette plante, comme nous faisons pour le chanvre & le lin, pour en retirer le fil, qu'ils tissent ensuite avec le coton.

Les médecins qui ont le mieux écrit sur l'ananas, sont Michel-Frédéric Lochner, A. Taylor & André Cleyer.

(M. WILLEMET.)

ANAPLEROTIQUES. (*Pharmacie.*) Remèdes qui opèrent, dit-on, la cicatrisation. On a nommé des onguents, des emplâtres, des fomentations, &c. anaplerotiques. Il n'y a point de remèdes qui aient véritablement cette puissance. Voyez ce mot dans le dictionnaire de médecine.

ANCILLAIRES. (*Opérations.*) (*Pharmacie.*) Dans le temps où la chimie étoit confondue avec la pharmacie, comme ne s'occupant que de la préparation des médicaments, on nommoit *opérations ancillaires* toutes celles qui n'étoient en quelque sorte que préparatoires, disposantes, & qu'on confioit à des serviteurs, à des apprentis. Telles étoient la pulvérisation, la porphyrisation, les lavages, le tamisage, le nettoyage des vases, des ustensiles, la disposition des filtres, le soin des fourneaux, des soufflets, &c. Aujourd'hui on ne distingue plus aucune des opérations chimiques ou pharmaceutiques par le nom d'*ancillaires*. Elles

sont toutes pratiquées par des mêmes hommes. Comme on y trouve une égale utilité avec toutes les autres, on s'en occupe à l'envi dans un laboratoire en activité. Souvent même c'est de l'exacritude scrupuleuse dans les premières opérations, que dépendent les succès que l'on obtient dans toutes les expériences : car on fait que les moindres fautes, les corps étraniers, les ordures laissées dans les vases, font manœuvrer beaucoup d'opérations chimiques ou pharmaceutiques, & donnent des résultats différents de ceux que l'on cherche à obtenir. Voyez les mots **LABORATOIRES**, **OPÉRATIONS**.

ANCOLIE. *Aquilegia vulgaris*, L. *Aquilegia* Dod. pempt. 181. La plante qui fait l'objet de cet article, se rencontre spontanément, non-seulement dans toutes les contrées de l'Europe, mais bien encore au Japon & autres pays éloignés ; elle est pérennelle, fait l'ornement des jardins, où elle offre des fleurs simples & doubles de différentes couleurs, bleues, rouges, incarnates, violettes, blanches, vertes, chataignes. elles varient à l'infini. L'ancolie est estimée dans la médecine par notre grand l'ournefort, & par une foule de médecins tant anciens que modernes. Cependant Linnéus dans sa matière médicale, croit qu'elle est un peu vénéneuse ; il fonde son sentiment, sur le caractère botanique de la fleur ; mais l'expérience ne l'a nullement démontré. On se sert en médecine de la racine, des feuilles, des fleurs & de la semence d'ancolie.

Les Asturiens en Espagne usent de la racine pulvérisée, pour atténuer & briser le calcul. Tragus en faisoit prendre un gros délayé dans un verre de vin, pour guérir les coliques. Etmuller rapporte qu'il s'en est servi avec un succès éclatant contre le scorbut & l'hydropisie. On la donne à la dose d'une once dans la médecine vétérinaire.

Eysel qui a publié une monographie sur l'ancolie, dit qu'il s'est servi très-avantageusement du suc de cette plante dans la fièvre héctique avec toux & le scorbut. J'ai écrit que la décoction des feuilles est en usage en Angleterre contre les chaleurs du gosier & de la trachée-artère, d'autres la recommandant pour se gargariser la bouche, pour déterger les ulcères scorbutiques.

Les fleurs bleues donnent une belle teinture fort vantée par Etmuller pour la rougeole, on les fait macérer dans l'eau chaude ; on y ajoute quelques gouttes d'esprit de vitriol, afin de donner une belle couleur rouge. On en fait prendre un verre le matin, & autant le soir. Tournefort propose la teinture de ces mêmes fleurs extraite par l'esprit-de-vin, pour déterger les aphtes scorbutiques de la bouche, affermir les dents & fortifier les gencives. L'obel l'estime bonne contre l'angine. L'eau distillée & la décoction étoient en usage chez les anciens contre l'ictère. Blair dit que son infusion est bonne contre l'esquinancie. Alston assure que

cette infusion a un certain goût légumineux, qui ressemble à celui de l'asperge. Les fleurs de l'ancolie sont aimées des abeilles. L'on en prépare un sirop qui peut remplacer celui de violettes; il est anodin & antispasmodique: les anciens préparaient un miel & un vinaigre avec les mêmes fleurs.

La pharmacopée de Paris offre la formule de pilules excellentes contre la jaunisse, dont la semence d'ancolie était la base. Trajus & Matthioli recommandent la même graine en poudre à la dose d'un gros dans du vin blanc, pour exciter la sueur. Simon l'autil tiré des portes de la mort de pauvres enfans atteints de la rougeole & de la petite vérole, en leur administrant de cette graine en poudre, au poids de demi gros, délayée dans une eau d'illéc. L'émulsion préparée avec la graine d'ancolie est recommandée contre les maladies malines. L'on n'a vanté beaucoup cette graine, lorsqu'elle est ucrée, pour les accouchemens difficiles. Camerarius assure qu'elle guérit des vertiges.

L'ancolie peut servir à la nourriture des chèvres & des brebis. Dans l'antiquité, l'on composoit un onguent avec les feuilles & les fleurs. Cette plante n'est plus guères d'usage en médecine.

(M. WILLEMET.)

ANDAAL. (*Pharmacie.*) Expression des arabes, répétée par quelques-uns de leurs copistes, pour désigner la coloquinte: c'est de ce mot que vient la dénomination de *trochisque alhandal*.

ANDROMEDE. *Andromeda polifolia*. L. *Polifolia* Bruux, art. 2. page 145. cent. 5. p. 28. t. 49. f. 1. C'est un sous arbrisseau assez joli, dont les feuilles sont alternes, linéaires, lancéolées. On la trouve communément dans les terrains tourbeux en Europe. On dit qu'on en fait un thé, qui est bon pour le rhumatisme, en usage dans l'Amérique septentrionale.

(M. WILLEMET.)

ANDROSACE. *Androsace maxima*. L. Plante qui annonce les beaux jours. Elle commence à se montrer en février, pour fleurir en mars: son aspect est agréable; elle est annuelle; c'est, dit-on, un puissant apéritif: sa semence est diurétique. Nous cultivons cette androsace dans un jardin botanique, où elle se resemme annuellement. Elle croît spontanément dans les champs de bled en Autriche, en Suisse, en Allemagne & en Prusse.

(M. WILLEMET.)

ANDROSEMUM. (*Pharmacie.*) Espèce de plante du genre du millepertuis, nommée ainsi, comme qui dirait sang d'homme, parce que, dit-on, ses feuilles & ses fleurs broyées prennent une couleur rouge de sang. On la nomme aussi *route saignée*, à cause des vertus qu'on lui a attribuées. Quelques auteurs, & entre autres Chomel, la con-

fondent avec le millepertuis ordinaire. On en fait plusieurs préparations pharmaceutiques. Voyez le mot MILLEPERTUIS.

ANEMIS FURNUS, en français, *fourneau à vent*, *fourneau de fusion*, est un fourneau qui par l'élevation, la forme pyramidale de son cendrier, (& une tuyère qui y porte le vent ou la vapeur d'eau,) est capable de donner le degré de chaleur le plus fort. Ajoutez y la forme pyramidale du dôme dont on le couvre, qui est percé à sa partie supérieure, pour laisser un courant libre de bas en haut: ce fourneau est principalement destiné à la fusion des métaux, à la vitrification des sables, &c.

Ce fourneau dont parle M. Julliot dans son dictionnaire interprète de matière médicale, est plus relatif aux arts qu'à la chimie proprement dite; c'est pourquoi nous n'en parlerons pas en détail ici. On verra au mot FOURNEAU la forme & les dimensions qu'exigent ces instrumens relativement à leur usage. Voyez FOURNEAU.

ANEMONE. *Anemone coronaria*. — L. La nature déploie sur la fleur de cette plante la beauté & la richesse de ses couleurs. Aussi a-t-elle excité & animé la verve d'Ovide & du père Rapsin; il y en a d'incarnates, de blanches, de couleur de fen: les nuances sont rares; les veloutées sont les plus belles. Toutes ces fleurs disposées suivant l'harmonie des couleurs, font un très-bel effet dans une plate-bande. Pour en conserver leur beauté, il faut les garantir du vent & de la pluie. Elle demande une terre légère, veut être seule, & exige peu d'eau.

Cette plante est acre, un peu escarrotique, détersive, dessicative, vulnérinaire, céphalique, contre les maladies de la matrice, propre à faire venir le lait aux nourrices. Les anciens en faisoient prendre intérieurement, & l'appliquoient à l'extérieur; ses racines attirent les phlegmes & la salive, maintiennent les dents saines: leur décoction est bonne contre les inflammations des yeux; elle sert aussi comme errhine.

L'anémone est originaire du Levant. Ses plus belles variétés ont été apportées des Indes orientales par flachellier en 1660: on la cultive partout où il y a des fleuristes.

L'anémone des jardins, (*Anemone hortensis*. L.) doit être confondue avec celle-ci.

(M. WILLEMET.)

ANET. *Anethum graveolens*. Plante ombellifère annuelle, dont l'odeur est forte, mais cependant suave & agréable, qu'il est facile de cultiver dans les jardins, car il arrive souvent qu'étant semée une fois elle repartit tous les ans par le moyen de sa graine. Elle est stomachique, carminative, anodine, lactifère, narcotique; on l'emploie contre le hoquet, le vomisse-

ment, les tranchées, la toux, la cardialgie, pour exciter les urines & les mois. La semence d'anet est encore vantée à l'extérieur contre les ulcères sanieux & les humeurs froides; pilée & appliquée sur le front & les tempes des enfans, elle leur procure le sommeil: l'on en retire une huile essentielle par la distillation & une autre par expression; c'est une des quatre grandes semences carminatives. La dose ordinaire est d'un gros. Un naturaliste de Stralsund, a observé que cette semence est nuisible à plusieurs espèces d'oiseaux, notamment au *Brauer*.

Les feuilles & les sommets possèdent plusieurs des propriétés spécifiques ci-dessus; elles sont résolutive, avancent la suppuration des tumeurs appliquées par-dessus.

Les fleurs sont vomitives, plaisent aux abeilles; forment une des quatre fleurs carminatives: l'ombelle est jaune.

On retire de toute la plante, une eau par le moyen de la distillation, une huile par la coccion; elle entre dans beaucoup de compositions officinales. L'anet est culinaire, sur-tout lorsqu'il est jeune & tendre; il sert à assaisonner les anguilles, les écrevisses, le faver croust & dans la salade des corrichons.

Jean-Lapierre Karcher a publié une dissertation qui est uniquement consacrée à cette plante.

L'anet doit se trouver dans les jardins de plantes utiles.

(M. WILLEMET.)

ANÉTIQUES. (*Pharmacie.*) Ce mot est quelquefois employé dans les auteurs de matière médicale & de pharmacie, comme synonyme du mot ANODYNS, Voyez ce dernier.

ANGÉLIQUE. (*Pharmacie.*) Epithète pompeuse donnée par le charlatanisme à quelques préparations pharmaceutiques, très-différentes & quelquefois très-dangereuses: ainsi les pilules d'aloës ont été désignées sous le nom de *pilules angéliques*; l'oxide précipité du muriate sublimé d'antimoine a été nommé *poudre angélique*; Nicolas Massa donne aussi ce nom à l'oxide de mercure rouge par l'acide nitrique, &c.

ANGÉLIQUE. *Angelica archangelica*, L. *Angelica sativa*, Dec. *empt.* 318. L'angélique est ainsi nommée à cause de ses grandes vertus. C'est une belle grande plante, intéressante, bisannuelle, à ombelles, qui croît spontanément sur les hautes montagnes d'Europe, & que l'on cultive facilement dans les jardins. Elle étoit inconnue aux anciens Grecs.

La racine, la tige, les feuilles & la semence de cette plante sont d'usage, mais la racine l'emporte en vertus sur les autres parties.

La racine d'angélique prise en substance est regardée comme stomachique, cordiale, sudorifique,

alexipharmame, vulnéraire, anodine, céphalique, balsamique, carminative, apéritive; elle convient contre les vices du poulmon, dans toutes les maladies de la matrice, résiste au venin, aux fièvres malignes, purpées, intermittentes, à l'hydrophobie, au scorbut, remède à l'haleine puante, à l'anorexie, tue les vers & autres insectes, excite les règles, la sortie du fœtus, adoucit les douleurs de l'enfantement, fortifie l'esprit. La dose est un gros. Réduite en poudre, jetée sur les habits, elle préserve de la contagion; macérée dans du vinaigre, on la mâche, on l'approche des narines, ou bien on boit le vinaigre, pour se préserver de la peste; on pourroit la substituer au *costus*. Cette racine doit être recueillie au commencement du printemps; la meilleure est celle qui a une odeur suave, d'un goût âcre & aromatique, résineuse, entiere, grosse, longue, brune, entièrement blanche à l'intérieur, car elle est sujette à la carie: la meilleure est celle du Bohême. On peut encore l'employer extérieurement contre les ulcères fongides, les tumeurs, les maux de dents. Les Japonais mangent cette racine, qui croît dans les endroits pierreux; les Norvégiens en mêlent dans leur pain.

On attribue à la semence & aux feuillés d'angélique, quelques-unes des propriétés précédentes, elles entrent dans les eaux alexitère, vulnéraire & générale, dans l'esprit carminatif de Syllius.

On prépare avec la semence une liqueur à l'eau-de-vie & le sucre, agréable, contre les flatuosités, & pour faciliter la digestion. Les feuilles sont antispéptiques: suivant les expériences de Pringle, desséchées elles perdent leurs vertus.

On confit la tige de l'angélique verte & récente. Linnéus, dit que les peuples de l'Islande & de Laponie se nourrissent des tiges vertes de cette plante sans en être incommodés. Il y a des Danois qui en font autant. L'on fait aussi du ratafia d'angélique.

L'on retire par la distillation une eau de ses feuilles, fleurs, semences & racines, on prépare une conserve & un extrait de la racine, on entre dans les eaux théiacale, impériale, magistrale, de melisse, le baume de commandeur, les orviétans, l'essence alexipharmace de Sthal.

L'angélique doit se trouver dans les jardins botaniques de plantes utiles. Elle se plaît à l'ombre, à l'humidité, près des murs; l'envia voudroit-on employer l'art pour l'ensemencer & la propager, il faut que ce soit la nature seule; elle se resème d'elle-même.

Cette plante entre dans la médecine vétérinaire. (M. WILLEMET.)

ANGÉLIQUE LUISANTE. *Angelica lucida*, L. Les Canadiens assurent que la racine de cette angélique est excellente pour chasser le venin, elle a les mêmes propriétés que l'angélique officinale;

elle excite la sueur, la salive; les Américains la regardent comme un puissant carminatif. Ils en font usage contre les tranchées, les maladies de l'estomac & des intestins provenant de cause froide, principalement contre les coliques ventueuses & hystériques, les pâles couleurs, la suppression des menstrues.

(M. WILLEMET.)

ANGÉLIQUE POURPRE. *Angelica atropurpurea*. Les habitants du Canada regardent la racine de cette angélique comme le plus excellent antidote contre toutes sortes de venin & de malignité.

(M. WILLEMET.)

ANGÉLIQUE SAUVAGE. *Angelica sylvestris*. L. Cette plante est vivace, & commune dans les prairies humides & les bois taillés de toute l'Europe, de Virginie & de la nouvelle York.

Tournefort estimoit sa racine sudorifique infusée dans le vin, elle possède les vertus de l'angélique officinale, & de plus anti-épileptique; elle est remplie d'un suc jaune, acre & résineux. Boerhaave la recommande dans les maladies du cheval & des bestiaux. Les feuilles appliquées sur les loupes, font un grand résolatif; elles soulagent aussi les douleurs arthritiques. C'est un mauvais fourrage qui donne un mauvais goût au foin.

L'on se sert dans l'Amérique septentrionale de la racine, des feuilles, de la semence & de l'eau distillée d'angélique sauvage. L'on en retire un baume, un extrait, une huile & un esprit. Ces peuples estiment cette plante pour être alexitère, résolutive, carminative, emménagogue.

Sa semence foudroyée sur la tête tue les poux. Gmelin rapporte que cette angélique sert de nourriture aux Russes.

(M. WILLEMET.)

ANICETON. (*Pharmacie*) surnom donné à un emplâtre que Galien décrit, d'après Criton (lib. VI. de la compo. des médicaments par genres) cet emplâtre étoit composé de pyrethre, de staphysaigre, de moutarde, de cumin, d'oxide de cuivre, de nitre, de muriate d'ammoniaque, d'iris, de bayes de laurier, de manne, & différentes autres substances dont on faisoit d'abord une pâte avec du vinaigre, & à laquelle on ajoutoit ensuite de la cire & de la résine pour donner à la masse une consistance emplâtrique; cet emplâtre dont la composition & la préparation sont très-complicquées, étoit vanté comme un topique propre à guérir les affections les plus graves, & c'est d'après ces prétentions qu'on lui avoit donné le nom d'*aniceton*; c'est-à-dire insurmontable; *quasi insuperabile*.

ANIL, ou INDIGOTIER. *Indigofera tinctoria* L. C'est un arbrisseau précieux des Indes orientales, qui se trouve à Ceylan, à Java, & à Madagascar. M. Thunberg rapporte qu'il varie

dans chacun de ces trois endroits. Il a été autrefois cultivé à l'île de France, où il s'est naturalisé.

L'indigo est une féculle bleue très en usage dans la teinture, qui se retire avec ses feuilles.

Les feuilles de l'indigotier sont d'un goût piquant & amer; elles sont adoucissantes, vulnérinaires, déboustruatives, contre la diarrhée, la dysenterie & les lochies trop abondantes. On s'en sert pour les douleurs de tête.

La décoction de sa racine est propre contre la colique néphrétique.

(M. WILLEMET.)

ANIMALISATION. Ce mot qui désigne le phénomène par lequel les substances étrangères d'abord au corps des animaux, en prennent peu-à-peu les caractères, & finissent par en faire partie constitutive, auroit été cherché envain autrefois dans toute la science chimique, & n'auroit pas pu se trouver dans un dictionnaire destiné à offrir les principes de cette science. Aujourd'hui comme il est reconnu que ce changement produit par les organes & les fluides des animaux, est entièrement dû à des combinaisons chimiques, comme on commence à saisir les principales causes & les principaux modes de ces combinaisons formées dans les corps animés, il est devenu indispensable de traiter de l'animalisation dans un ouvrage de chimie, ou en donnant l'état exact de la science chimique, on a en même-temps pour but de faire voir quelles lumières on peut encore attendre de cette science pour l'accroissement de beaucoup d'autres connaissances humaines. Il ne faut qu'une légère réflexion, fondée sur l'observation attentive de ce qui se passe dans l'économie animale vivante, pour sentir que beaucoup de ses fonctions sont dues à des opérations chimiques. On n'y voit par-tout que des dissolutions, des décompositions, des recompositions successives, & si toutes ces opérations y sont soumises à la sensibilité, à l'irritabilité, & aux mouvements de l'organe nerveux dont nous connaissons encore si peu l'influence & le mode d'agir, il suffit qu'il soit prouvé qu'elles existent, pour nous inviter à en rechercher les phénomènes, les causes & les produits. Et certes au milieu de tous les actes de l'animalité, il n'en est aucun qui ressemble plus à une action chimique, que le changement successif qu'éprouvent les aliments depuis l'instant où ils sont reçus dans l'estomac, jusqu'à celui, où arrivés dans le système de la circulation après avoir parcouru l'organe de la respiration, ils ne sont plus qu'un liquide homogène, le sang, devenu propre à nourrir & à réparer toutes les parties diverses du corps des animaux. C'est sans doute un des plus beaux & des plus singuliers spectacles offerts par la machine animale vivante, que cette conversion de la nourriture, en sa propre substance, & c'est un de ceux qui a toujours paru aux physiciens renfermer le mystère

myſtère le plus difficile à concevoir de tout ce que préſente la vie. On étoit même loin de prévoir il y a quelques années que la chimie pût fournir des moyens &c. des données auſſi exactes ou auſſi utiles pour expliquer le mécaniſme de cette fonction, qui offre dans ſon intégrité la reproduction ſuccéſſive & non interrompue de toutes les parties de l'animal. Il falloit que la nature de l'air atmosphérique fût connue, qu'on eût apprécié avec précision ce qui ſe paſſe dans la reſpiration, qu'on eût perfectionné l'analyſe des matières animales, &c. trouvé ſur-tout en quoi ces matières diſſèrent des ſubſtances végétales. Auſſi-tôt que ces divers points ont été éclaircis, on a ſenti qu'il n'y avoit plus qu'un pas à faire pour déterminer en quoi conſiſtoit l'aſſimilation des ali-mens, &c. diverſes idées ont été propoſées par ceux des chimiſtes qui s'occupoient de cet objet. On a vu à l'article de l'ANALYSE ANIMALE que l'air étoit ſur-tout par la préſence de l'azote que les matières de ce règne diſſérent du règne végétal. Il s'agit donc de ſavoir d'abord comment l'azote ſe trouve plus abondamment dans les animaux, &c. cet objet une fois rempli formera déjà une des baſes de nos connoiſſances ſur l'animaliſation. On ſent bien que la difficulté d'acquérir cette connoiſſance ne peut être relative qu'à ceux des animaux qui vivent de matières végétales; car pour ceux qui ſe nourrissent de ſubſtances animales, la ſource du principe qui y eſt déjà abondant ne peut pas nous embarraſſer.

Quoiqu'il y ait ſur l'animaliſation conſidérée comme opération chimique, un grand nombre de données conſignées dans beaucoup d'articles de ce dictionnaire, &c. entre autres aux mots, AIR, SANG, LILLE, RESPIRATION, &c. il eſt eſſentiel de faire connoître ici l'enſemble de tous les faits qui concernent cette fonction; & comme on ne les a point encore rasſemblés dans les ouvrages de chimie, je crois devoir inſérer ici un mémoire que M. Hallé a lu ſur cet objet à la ſociété de médecine. On y verra combien les lumières de la chimie peuvent éclaircir l'étude de la phyſique animale. Je me permettrai ſeulement d'y ajouter quelques notes, en avertiſſant qu'il a lui-même donné plus de précision &c. de netteté à ce travail dans les annales de chimie, tome XI, p. 158, &c. dans le tome II, p. 295, d'un journal que je publie ſous le titre de médecine éclairée par les ſciences phyſiques, &c.

On ſe plaint ſouvent, dit M. Hallé, de ce que la médecine ne paroît pas avoir fait des progrès auſſi rapides que les autres ſciences phyſiques. A-t-on droit de lui en faire un reproche?

Les autres ſciences ont deux grands moyens pour favoriser leurs progrès, l'observation & l'expérience. La médecine eſt preſque réduite à l'observation. Si elle appelle à ſon aide l'expérience, ce n'eſt qu'en tremblant, ce n'eſt que quand par

une multitude d'analogies elle eſt parvenue à ſ'afſurer autant qu'il eſt en elle du ſuccès de ſes tentatives, parce que ni le temps ni le ſujet ne lui appartiennent; la nature a compté l'un, la ſociété demandera compte de l'autre.

Voilà pourquoi tout l'art du médecin s'eſt preſque borné depuis Hippocrate juſqu'à nos jours, à l'observation de la nature, à l'étude de ſes loix &c. à l'imitation plus ou moins parfaite de ſes opérations. Auſſi ne voit-on dans aucune ſcience, répéter avec plus d'uniformité &c. une plus religieuſe exactitude les préceptes des anciens; &c. la médecine d'Hippocrate eſt encore à beaucoup d'égards celle de nos jours &c. ſera long-temps ſans doute celle des ſiècles qui nous ſuivront. Les inſtruments de l'art ont ſeulement changé, ils ſe ſont multipliés, la méthode &c. les opérations ſont preſque toujours reſtées les mêmes.

Les anciens en général, ont été au moins auſſi habiles que les modernes dans l'observation, les modernes ont été plus hardis & plus heureux dans l'expérience; mais preſque tout l'avantage en eſt reſté aux ſciences acceſſoires à la médecine; celle-ci ne s'eſt preſque enrichie que de leurs découvertes, &c. rarement lui ont-elles fourni juſqu'à cette heure autre choſe que des théories brillantes. Si même nous remontons aux âges qui nous ont précédés, il faudra convenir que beaucoup de médecins ont eu plus à rougir qu'à s'applaudir de l'uſage qu'ils ont fait de ce commerce. Ainſi la médecine à ſon tour auroit peut-être un reproche à faire aux ſciences phyſiques, &c. l'on pourroit dire, pourquoi ces ſciences ont-elles ſeu fait pour la médecine? La réponſe paroît ſimple, &c. l'on me dira, les phyſiciens ont trop peu connu la médecine, &c. un grand nombre de médecins ont trop peu connu les ſciences phyſiques.

Cependant comme les Boerhaaves &c. les Gaubius ne ſe ſont pas certainement rendus coupables de cette négligence, &c. qu'ils n'ont rien oublié pour faire tourner leurs connoiſſances en chimie &c. en phyſique à l'utilité de l'art qu'ils profeſſoient, il en ſaut conclure que juſqu'à cette heure, ces ſciences étoient bien éloignées de la perfection néceſſaire pour les rendre applicables à la médecine.

Mais les temps ſont changés, &c. un petit nombre d'années ont ſeulement parcouru à la chimie un eſpace immenſe. Neſt donc temps, &c. eſt le devoir du médecin, de réclamer les droits de l'homme à ſon attention, &c. de lui demander ce que peuvent ſes travaux pour le connoître &c. pour le conſerver.

En eſſet l'exiſtence phyſique de l'homme étant évidemment liée avec tous les objets qui l'environnent, le médecin ne doit pas cefſer d'atteſſer aux progrès des autres ſciences; &c. comme il eſt ſûr que de l'intelligence parfaite de l'économie animale reſulteroit une marche plus aſſurée vers la perfection de l'art de guérir, il ne doit négli-

ger aucun moyen de s'éclairer par leurs secours, & de profiter de leurs lumières.

Une nouvelle carrière s'est ouverte par la connoissance des fluides élastiques, & par les nouveaux progrès de l'analyse animale; c'est-là que la médecine doit fixer les regards. La mémoire des erreurs dans lesquelles l'a entraînée trop souvent l'enthousiasme des chimistes, doit sans doute la rendre circonspecte sur l'usage qu'elle fait de leurs travaux, mais la perfection qu'on acquiert par leurs expériences, l'exactitude à laquelle sont parvenues leurs analyses, doit diminuer un peu cette réserve.

A la vérité le médecin ne peut pas toujours partager son temps, entre les devoirs impérieux de sa profession, & l'exercice assidu des travaux auxquels est dû l'avancement des sciences physiques. Mais il est un autre genre de travail qui lui convient en tout sens, c'est celui qui seconde pour ainsi dire les vérités acquises par les travaux des autres; c'est cet art de faire éclore de nouvelles vérités en rapprochant & unissant ensemble les vérités d'expérience; cet art qui est aux sciences physiques, ce que les mathématiques sont à celles de calcul, & qu'on peut nommer la logique des sciences expérimentales.

C'est en suivant cette marche que j'ai cru voir dans les faits importants consilés par les travaux des chimistes modernes, la source de nouvelles vérités qui jettent un plus grand jour sur les fonctions les plus importantes de l'économie animale, la nutrition & la respiration. Il en résulte une théorie que je crois nouvelle, & qui m'a paru digne d'être développée, sur l'influence de l'air, dans le mécanisme par lequel les aliments se changent en notre substance.

Je me contenterai dans ce premier mémoire de poser les bases de ce travail, & de les placer dans le rapprochement nécessaire pour en faire sentir la liaison & les conséquences. J'en présenterai les développemens & les détails dans une suite d'autres mémoires dont celui-ci ne contient pour ainsi dire que le plan ou le sommaire.

Ces premiers bases consistent dans deux ordres de faits, les uns résultant de la comparaison établie entre la nature de nos aliments & celle de nos organes, les autres de l'observation des phénomènes qui caractérisent l'action de l'air, & les changemens qu'il éprouve dans les organes de la digestion, dans ceux de la respiration, & dans le contact de la peau. De ces rapprochemens résultent des conséquences qui sont au moins très-probables, & qui forment la théorie que je me propose d'établir.

PREMIER ORDRE DE FAITS.

Comparaison des substances qui entrent dans la composition de nos aliments, & dans celle de nos organes.

L'idée d'un aliment ou d'un corps susceptible

de se transformer au-dedans de nous en une substance absolument semblable à celle de nos organes, suppose entre les principes qui constituent nos corps & ceux qui constituent nos aliments, des analogies & des différences.

Je ne ferai qu'énoncer ici les principaux faits, sans entrer dans les détails, parce que je ne suis en ce moment que poser la question dont je donnerai le développement par la suite.

On sait maintenant que les matières dont sont formés nos solides, coulent véritablement dissoutes par un véhicule commun dans tous les fluides nourriciers qui pénètrent toutes les parties de notre corps.

On sait que ces mêmes substances se retrouvent toutes dans nos aliments. Les aliments animaux les contiennent toutes formées; les végétaux en contiennent les analogues.

La gelatine ou gelée animale, a pour analogues les gélées végétales, soit sous forme liquide, comme dans les sucs d'une multitude de fruits; soit sous forme sèche comme dans les féculs, cet aliment si répandu dans le règne végétal, & qui fait la base la plus universelle des substances qui nous nourrissent.

On ne doute plus aujourd'hui, qu'à quelques différences près dans les proportions, la matière glutineuse végétale si connue dans la farine du froment, démontrée existante dans la substance de presque toutes les herbes, ne soit absolument de même nature que la partie fibreuse du sang & la fibre de nos muscles.

Diverses autres analogies dont il seroit trop long d'exposer ici les détails, seroient également sentir à quel point nos aliments & nos corps se correspondent dans toutes leurs parties.

Mais voici un caractère de ressemblance bien plus important, & dont nous devons la connoissance aux travaux des chimistes modernes, & principalement à ceux de M. Berthollet. Toutes les substances végétales qui nous servent d'aliment, toutes celles que nous tirons des animaux pour le même usage, toutes celles qui composent nos solides & nos fluides, toutes, à peu d'exceptions près, sont composées d'une base commune, différemment combinée suivant la diversité de ces substances, & susceptibles de changer de combinaison par un grand nombre d'opérations différentes. Cette base est celle de l'acide oxalique, c'est-à-dire, cette substance qui combinée avec le principe qui forme les acides, (la base de l'air vital l'oxygène) donne naissance à l'acide connu autrefois sous le nom d'acide saccharin & maintenant sous celui d'acide oxalique.

Le sucre, les mucilages, les féculs, les sucs gélutineux & mucueux des végétaux, la matière glutineuse végétale, un grand nombre d'acides végétaux, & pareillement tous les mucilages animaux, leurs gélées, leur partie fibreuse, leur substance albumineuse, la matière caillée du

lait, ont toutes pour base la même substance, la base de l'acide oxalique.

Bien plus, les huiles grasses des végétaux, les beurres, les graisses animales dont l'analyse ne présente pas le même résultat, paroissent, comme le prouvent plusieurs phénomènes de l'économie animale, pouvoir se transformer en base de l'acide oxalique; & ce que l'on a pu acquies de connoissances sur l'état de cette base isolée, fait présumer que s'il n'y a pas entre elle & les huiles grasses une parfaite identité, il n'y a au moins qu'une différence de combinaison dont M. Lavoisier paroît même avoir à-peu-près déterminé la nature.

Voilà les analogies, voyons les différences. Rendons en passant hommage aux génies immortels de Schœlle & de Bergman. Ce sont eux qui ont donné les premiers exemples de ces analyses ingénieuses auxquelles nous devons aujourd'hui un grand nombre de vérités utiles.

C'est à l'aide de leur méthode que M. Berthollet a démontré les différens principes auxquels la base oxalique est combinée dans les substances végétales & animales, & M. Fourcroy a aussi contribué à augmenter les connoissances que nous a procurées cette analyse importante.

Il est démontré par leurs travaux que dans toutes ces substances la base oxalique, sans changer de nature, est combinée sur-tout avec deux principes différens. L'un est le principe du charbon (*le carbone*), c'est le même qui, combiné avec la base de l'air vital, donne naissance à ce gaz acide, le premier qui nous ait été connu, autrefois appelé gaz méphitique, & désigné par les nomenclateurs modernes sous le nom d'*acide carbonique*. L'autre est un des principes constituans de l'alcali volatil, le même qui forme la base de ce gaz, autrefois connu sous le nom de moissette, aujourd'hui sous celui de *gaz azote*.

Le premier (*le carbone*) est plus abondant dans les substances végétales. Le second (*l'azote*) est en plus grande proportion dans les substances animales.

Celles qui contiennent le premier en grande abondance, & peu ou point du second, sont aussi celles qui, dans leur décomposition spontanée, donnent d'abord des signes d'acrescence; & celles au contraire qui contiennent une grande portion du second, deviennent promptement alcaliscentes.

Ainsi quand les substances végétales s'animalisent, quand nos alimens qui sont en général moins animalisés que nous s'affimilent à notre substance, nous pouvons dire que le changement qui s'opère alors en eux consiste en grande partie en ce que leur base oxalique se combine avec une plus grande proportion, de la base du gaz azote, & qu'elle perd au contraire une partie du principe du charbon auquel elle pouvoit être unie.

Si maintenant l'on réfléchit que quand, par l'analyse, on sépare l'un ou l'autre de ces principes de la base oxalique à laquelle ils sont unis, les

combinaisons dans lesquelles ils passent donnent presque toujours naissance à des fluides élastiques, on concevra combien la considération de ces fluides dans l'économie animale doit attirer l'attention des médecins, & combien elle peut nous faciliter l'intelligence des phénomènes les plus importans de nos fonctions.

Il est nécessaire d'observer ici qu'en rapportant toutes les substances composées du règne végétal & du règne animal, à ce que M. Hallé nomme la *base oxalique* ou le *radical oxalique*, ce physicien ne peut avoir eu en vue que de fixer une analogie frappante entre toutes les substances. Mais comme cette assertion pourroit paroître peu d'accord avec d'autres idées présentées dans un grand nombre d'articles de ce dictionnaire, il faut expliquer en quoi elle est vraie, & présenter en même-temps quelques modifications sur le fond de ce premier énoncé. On entend par base ou radical oxalique, une matière composée d'hydrogène & de carbone qui, unie à une grande proportion d'oxygène, donne naissance à l'acide oxalique, & qui joue dans cet acide le même rôle que le soufre, le phosphore, le carbone, l'arsénic, dans les acides sulfurique, phosphorique, carbonique & arsenique. Si toutes les matières végétales & animales peuvent être considérées comme base oxalique, ce ne peut être que comme contenant la combinaison *hydrogène-carbone* qui constitue cette base. Mais ce seroit se tromper que de penser que cet hydrogène carboné est également composé, quant à la proportion de ces deux principes, & conséquemment également prêt à former l'acide oxalique par l'addition de l'oxygène, dans toutes ces matières.

Cette idée seroit inexacte & même fautive. La combinaison d'hydrogène & de carbone, qui fait la base générale des substances organiques, n'est point homogène dans toutes ces substances; elle diffère, soit par la proportion de l'un & de l'autre de ces principes primitifs, soit par l'addition d'une plus ou moins grande quantité d'azote, soit enfin par la proportion de l'oxygène qu'elle contient déjà; en sorte que pour qu'elle puisse être convertie en acide oxalique, il ne suffit pas constamment de lui ajouter de l'oxygène & une égale quantité d'oxygène. Il faut pour les unes, qu'il se dégage une certaine proportion d'hydrogène ou de carbone, suivant que l'un ou l'autre excède la quantité qui doit former le véritable radical oxalique; pour les autres dégagez une portion de ces deux principes; pour un troisième ordre de ces substances, enlever, séparer d'abord l'azote qui paroît ne pas entrer dans l'acide oxalique. Ainsi, quand au moyen de l'acide nitrique, on convertit les gommes, le sucre, l'amidon, en acide oxalique, il se dégage beaucoup d'acide carbonique, parce que ces matières contiennent bien plus de carbone qu'il n'en faut pour le radical oxalique; lorsqu'à l'aide du même acide nitrique on fait la même opération sur les huiles, les beurres, les graisses,

les résines, &c., il se dégage beaucoup de gaz hydrogène & de gaz acide carbonique, preuve qu'il y a plus d'hydrogène & de carbone qu'il n'en faut pour le radical oxalique; enfin, quand on fait agir l'acide nitrique sur le gluten végétal, la gomme élastique, la chair musculaire, & toutes les matières animales, ces matières ne se convertissent en acide oxalique qu'après avoir donné du gaz azote & du gaz acide carbonique, parce qu'elles contiennent de l'azote qui n'entre pas dans la formation de l'acide oxalique, & plus de carbone que cet acide n'en recèle. C'est de cette manière, & avec ces modifications qu'il faut concevoir l'énoncé de M. Hallé sur le radical oxalique, tel qu'il en conçoit la présence dans toutes les matières considérées ici comme aliments. Cet énoncé doit être seulement rapporté à la proposition suivante, toutes les matières alimentaires contiennent ce qui forme l'acide oxalique en y ajoutant de l'oxygène.

SECOND ORDRE DE FAITS.

Comprenant, 1°. l'état des fluides élastiques contenus dans le canal alimentaire. 2°. Les changements que l'air éprouve dans la respiration. 3°. Les altérations qu'il éprouve dans le contact de la peau.

Les premières expériences sur l'air qui sert à l'entretien de notre vie, ont été faites d'abord par Boyle & Hales, ensuite d'une manière bien plus exacte & d'après des connaissances bien plus précises par M.M. Priestley, Fontana, Lavoisier, de la Place, Ingenhousz, &c. Cependant ces célèbres physiciens n'ont encore fait qu'ouvrir la carrière; de nouveaux essais l'ont agrandie, & ces essais sont consignés dans un mémoire sur l'eudiométrie, qu'on imprime en ce moment, & qui a été couronné par la société de médecine.

Ce mémoire est de M. Jurine, chirurgien en chef de l'hôpital de Genève; aucun physicien n'a donné sur les altérations que l'air éprouve dans le corps humain, sur les mélanges qu'il reçoit dans le poulmon & à la surface de la peau, des expériences plus précises, plus circonstanciées, faites avec plus de soin pour éviter l'erreur, & sur-tout plus applicables à la médecine.

Je ne présenterai pas ici le détail des faits constatés par ces célèbres physiciens; je n'en offrirai qu'un résultat sommaire.

Les observations de M. Jurine sur l'état des fluides élastiques contenus dans le canal intestinal, ont été faites sur un sujet fou, mort subitement en une nuit très-froide; elles ont été comparées avec celles que lui ont offertes plusieurs autres ouvertures de cadavres.

Elles présentent ce résultat remarquable, que dans les fluides élastiques contenus dans le tube intestinal; 1°. la proportion respective d'air vital diminue progressivement de l'estomac aux gros intestins; 2°. la proportion respective du gaz azote augmente progressivement de l'estomac aux gros intestins; 3°. la proportion du gaz inflammable

ou gaz hydrogène, augmente de l'estomac aux intestins grêles, & diminue de ceux-ci aux gros intestins; 4°. la proportion de gaz acide carbonique, très-variable en général dans les différents sujets, étoit dans l'homme mort subitement très-forte dans l'estomac & beaucoup moindre dans le reste du tube intestinal; 5°. il paroît qu'il existe un peu de gaz alcalin ou ammoniac dans le canal des derniers intestins. Je dois ici remarquer que ce ne sont pas-là les expressions propres ni les conclusions de M. Jurine, mais seulement le résultat évident de ses expériences, en sorte qu'on ne peut pas lui supposer, pour arriver à ce résultat, d'avoir vu les faits ou de les avoir expliqués suivant ses idées ni selon la manière de penser avant l'observation.

A l'égard de la respiration, M. Priestley avoit remarqué qu'elle produisoit du gaz azote. M.M. Lavoisier & de la Place ont prouvé, par de célèbres expériences, qu'il s'y formoit aux dépens de l'air vital du gaz acide carbonique, & ces dernières observations avoient fait presque oublier celles de Priestley. M. Jurine a répété leurs expériences avec le soin qui paroît nécessaire pour ne rien perdre, & tout observer.

Il en résulte que dans la respiration, l'air atmosphérique est altéré de trois manières; 1°. la portion d'air vital qui fait un peu plus du quart de ce fluide est sensiblement diminuée; 2°. il s'y forme de l'acide carbonique en proportion de cette diminution de l'air vital; 3°. il s'y unit une nouvelle quantité de gaz azote qui ne doit point être attribuée uniquement au changement de proportion qui a lieu entre les deux parties constituantes de l'atmosphère, mais qui est réellement une quantité additionnelle de ce gaz.

Ces altérations, dans l'air respiré, ne se font pas toutes dans le même instant. Les deux premières, absolument simultanées, se font d'abord; elles dépendent absolument l'une de l'autre. Quand la proportion d'air vital diminue dans l'air respirable; alors la quantité d'acide carbonique produit par la respiration, diminue aussi; mais au contraire, le dégagement du gaz azote augmente progressivement, & s'accroît d'autant plus, qu'il se forme moins d'acide carbonique, en sorte que les premières portions de l'air vital paroissent employées à dégager l'acide carbonique, & les dernières, à dégager l'azote.

Cet effet n'a pas seulement lieu dans l'air atmosphérique ordinaire qui contient naturellement plus des deux tiers de gaz azote; il a lieu également dans l'air vital, dans lequel la production du gaz azote ne peut-être que le produit de la respiration.

On a encore observé que dans le mouvement qui finit la digestion, l'air respiré recevoit une plus grande proportion d'acide carbonique, & que, dans le mouvement de la fièvre, au contraire, il recevoit une plus grande proportion de gaz azote.

Enfin, dans le contact de la peau, M. Ju-

n'ine a mis hors de doute qu'il se forme de l'acide carbonique, & qu'il s'en forme d'autant plus, que les fonctions de l'organe cutané sont dans une plus grande activité. Quand on compare aux expériences de M. Jurine, sur cet objet, la manière dont M. Ingenhoufz a fait ses observations sur la même matière, on sent aisément comment on peut concilier parfaitement les résultats obtenus par ces deux physiciens, & à quoi tient la différence qui existe entre les conclusions qu'ils en ont tirées. On voit que la manière dont M. Ingenhoufz a fait ces expériences, a dû faire disparaître l'acide carbonique.

A ces faits recueillis & rapprochés par M. Hallé, il faut ajouter qu'on fait aujourd'hui plus de choses exactes sur la respiration, depuis que M. Lavoisier a lu son dernier travail, fait conjointement avec M. Séguin. Il n'est plus douteux qu'il ne se forme de l'eau pendant la respiration, & qu'il ne se dégage de l'hydrogène en même-temps que du carbone du sang. Cet effet ressemble à celui qui a lieu dans toutes les matières végétales exposées à l'air. Il paroît même que l'hydrogène brûle plus facilement que le carbone, en suivant au moins cette analogie des matières végétales. Mais il faut avouer que cette formation d'acide carbonique & d'eau pendant la respiration n'est pas encore appuyée par des expériences positives. Il y a même des physiciens qui pensent que l'air vital est absorbé en entier par le sang, qu'il se convertit peu-à-peu par la circulation en acide carbonique, & qu'il sort ensuite par le poulmon; on voit que cette opinion est bien différente de celle qui regarde l'acide carbonique comme formé par l'organe même pulmonaire, & dû au carbone dégagé du sang, uni ensuite à l'oxygène atmosphérique. L'observation de M. Vanquelin, sur ce qui se passe dans la respiration de la grande autruche, *locusta vermiculata* de Geoffroi semble autoriser cette dernière opinion. Il a trouvé un canal qui, des trachées, conduit l'air immédiatement dans l'estomac, & il croit, avec beaucoup de vraisemblance que l'air sert à l'assimilation des aliments. Si la combustion immédiate avec la masse des aliments ou du chile est nécessaire à la digestion définitive ou à l'assimilation, comme quelques faits semblent le faire croire, & comme le pensent plusieurs physiciens, il paroît que l'air vital pénètre véritablement à travers le poulmon, & se combine au sang, qui exhale en même-temps de l'acide carbonique. Au reste, on verra, que de quelque manière que les choses se passent, il suffit, pour les conclusions tirées par M. Hallé, qu'il y ait un moyen quelconque dans la respiration d'exhaler du carbone. M. Lavoisier a confirmé par ses expériences confirmées dans son dernier mémoire sur la respiration & sur la transpiration, le résultat de celles de M. Jurine. Il paroît incontestable qu'il se passe à la peau un phénomène analogue à celui

qui a lieu dans les poulmons; il se forme ou il se dégage de l'acide carbonique. Il seroit possible que trois effets concourussent en même-temps dans ce travail de l'assimilation auquel il est prouvé que les organes pulmonaire & cutané sont en grande partie destinés. Peut-être sort-il du carbone & de l'hydrogène, du poulmon; pénètre-t-il en même-temps de l'oxygène, qui, uni peu-à-peu au carbone du sang pendant la respiration, ressort ensuite en torrens par les vaisseaux de toute la surface de la peau?

Conséquences résultantes du rapprochement des faits qui viennent d'être exposés de l'assimilation des aliments.

Nous avons remarqué que la base oxalique, principe commun de presque toutes les substances nutritives, ainsi que de celles qui composent nos organes, étoit combinée principalement dans les unes, avec la base de l'acide carbonique, ou avec le charbon proprement dit, (*le carbone*) dans les autres, avec la base du gaz azote ou l'azote. Nous avons vu que la proportion de ce dernier formoit un des premiers caractères de l'animalisation.

On sait qu'il est divers moyens de séparer ces deux principes de la base oxalique avec laquelle ils sont unis, soit dans nos organes, soit dans nos aliments.

Que cette séparation s'opère principalement à l'aide des corps qui contiennent la base de l'air vital autrement nommée *l'oxygène*.

Dans les analyses chimiques ordinaires, on se sert de l'acide nitrique pour fournir cette base avec plus de facilité.

Dans les grandes opérations de la nature elle est fournie par l'air atmosphérique, & par l'eau.

Par-tout où le principe du charbon est dégagé par l'air, il se développe de l'acide carbonique.

Par-tout où c'est l'eau qui fournit la base de l'air vital, il se dégage de l'air inflammable ou gaz hydrogène.

Par-tout où la base de l'air inflammable ou l'hydrogène se dégageant au même temps que l'azote, se combine avec elle, il se développe de l'ammoniaque ou alcali volatil.

Qu'on examine maintenant ce qui se passe dans le corps humain.

Dans la cavité intestinale, la proportion d'air vital diminue successivement depuis l'estomac jusqu'à l'extrémité du canal, & à cette extrémité, il n'en reste plus de trace, ainsi l'air vital ou la base l'oxygène, se combine dans ce trajet. Qu'en résulte-t-il?

Dans l'estomac où les aliments ont encore leur première qualité, & se mêlent avec des sucs sur la nature desquels il y a encore beaucoup d'incertitude, il se dégage une portion d'acide carbonique. Le principe du charbon qui s'unit à l'air

vital, pour former ce gaz, paroît venir des alimens, & si la proportion n'en est pas constante, c'est parce que les alimens ne sont pas toujours les mêmes.

Dans les intestins grêles, où coule avec plusieurs autres sécrétions la bile, une des humeurs connues, qui porte le plus évidemment le caractère animal, & où les alimens incontinent pénétrés de ces humeurs, forment une bouillie fort liquide, il se dégage de la mofette ou gaz azote & du gaz inflammable ou gaz hydrogène. Une partie des matières contenues dans ce canal est du nombre de celles qui contiennent la base de la mofette ou l'azote, & qui peuvent donner lieu par conséquent au développement du gaz azote. Ces mêmes matières formant une masse échauffée & dans un état liquide, sont dans l'état le plus propre à opérer la décomposition de l'eau. L'eau décomposée donne naissance au gaz inflammable, & fournit en même temps à la masse composée des sucs animaux & des alimens une portion de la base de l'air vital ou de l'oxygène qui s'y combine, en dégageant l'azote.

Enfin dans les gros intestins où la masse excrémentielle par son odeur & par ses produits annonce le caractère animal, la quantité de gaz azote augmente; mais le gaz inflammable diminue un peu, soit parce que les matières moins liquides favorisent moins la décomposition de l'eau, soit parce qu'une partie du hydrogène combinée avec l'azote forme du gaz ammoniac ou alcalin. Dans certaines diarrhées au contraire les vents portant avec eux une odeur hépatique annoncent qu'il se forme alors dans les gros intestins une assez forte proportion de gaz hydrogène sulfuré. Mais alors ces matières étant plus liquides, la décomposition de l'eau continue de se faire au-delà des intestins grêles.

Ainsi dans le canal alimentaire, l'air vital, soit libre & venant de l'air atmosphérique avalé avec les alimens, soit dégagé ensuite par la décomposition de l'eau, se combine & aux sécrétions animales & aux alimens confondus avec elles dans le canal intestinal, & d'abord sépare des matières alimentaires une portion de leur carbone auquel il s'unit pour former l'acide carbonique; ensuite dégageant l'azote des sécrétions intestinales, il favorise la combinaison avec les matières alimentaires qui la reçoivent au lieu du carbone dont elles ont perdu une partie. De cette manière, les substances alimentaires prennent un commencement d'animalisation dont on pourroit estimer le degré, si l'on connoissoit parfaitement la nature du chyle qui en résulte.

M. Hallé attribue ici en grande partie le commencement d'assimilation qui s'opère dans l'estomach & les intestins à la décomposition de l'eau; mais il ne peut appuyer cette conjecture, car il ne la donne lui-même que comme telle, que sur la présence du gaz acide carbonique, du gaz hydrogène & du gaz ammoniacal dans la cavité de ces viscères. Il faut remarquer qu'il n'a pu se fonder

que sur l'observation de M. Jurine faite dans un seul cas, qu'il est bien difficile de raisonner avec précision pour tous les hommes, d'après ce qui n'a été vu que sur un seul. A la vérité il est permis de présumer que l'existence des gaz est à-peu-près la même dans le trajet du canal alimentaire chez tous les hommes, que celle qui a été trouvée dans celui du fœtus mortellement, où M. Jurine l'a observé; mais il n'est pas prouvé que la production de ces gaz intestinaux soit due à la décomposition de l'eau: il ne l'est pas sur-tout que la différence de ces gaz dans divers points du canal alimentaire dépende de l'état de l'eau. On pourroit même expliquer les premiers effets de la digestion qui ne doivent point être confondus avec ceux de l'assimilation proprement dite, sans avoir recours à la décomposition de l'eau. Quatre principaux phénomènes ont lieu dans les alimens pendant leur séjour dans l'estomach & les intestins. 1°. Les alimens sont ramollis & dissous en une espèce de pulpe homogène dans les intestins; 2°. Leur caractère est changé par le dissolvant gastrique; 3°. dans les intestins grêles, la bile décompose cette dissolution & sépare la partie alimentaire d'avec l'excrémentielle; 4°. dans les gros intestins la substance chyleuse est absorbée par les lymphatiques, & la matière excrémentielle se précipite en entraînant la matière grasse & colorante de la bile. La bile portée dans le sang, subit, comme il va être dit plus bas, un changement dans le poudon. Les alimens, eux-mêmes, peuvent être la source des gaz contenus dans le tube alimentaire. Voyez DIGESTION.

La respiration agit ensuite sur ce chyle versé dans le sang, & mêlé avec lui comme les matières alimentaires étoient mêlées aux sécrétions animales dans les intestins. Là, l'air vital se combine encore, il dégage de même & de l'acide carbonique & de l'azote, mais l'un & l'autre ne se manifestent point à la fois au-dehors. Le gaz azote ne paroît que quand la quantité d'acide carbonique formé par l'air vital, & mêlé à l'air respiré diminue dans cet air la propriété de dégager du poudon de nouvel acide, ce qui arrive quand on respire de mauvais air. Alors l'azote qui, probablement se dégageoit aussi, mais qui se combinoit à mesure avec le chyle, à proportion que celui-ci perdoit de son principe carbonique, ne trouvant plus à se combiner, sort avec l'air sous forme de gaz.

Il est donc probable qu'ici le principe du charbon est fourni par le chyle, & l'azote par le sang, & qu'il se fait comme dans le travail de la digestion un véritable échange, en ce que le chyle, en perdant une partie de son charbon, reçoit en place l'azote séparé du sang, & par ce mécanisme s'animalise & s'assimile.

On pourroit dire que le sang s'assimile aussi, parce que, sans cet échange qui le prive d'un excès d'azote, il s'animaliseroit trop, & finiroit

par s'alcaliser, ce qui arrive en effet toutes les fois qu'une longue abstinence, ou des aliments trop animalisés empêchent les humeurs de prendre, par le mélange d'un chyle doux, la température qui leur est nécessaire.

Sans doute on me demandera si, par l'effet d'un long jeûne, la respiration cesserait de produire du gaz acide carbonique, & finirait par produire uniquement du gaz azote, ce qui semblerait devoir être la conséquence du système que je viens d'établir. Je répondrai que je n'en fais rien, parce que je n'ai point eu d'expériences qui me l'aient appris; mais je le présume, & deux faits constatés par M. Jurine, me le feront presque assurer. Par l'un, il est démontré que dans le travail qui suit la digestion des aliments, & qui est accompagné d'une augmentation sensible de chaleur, & d'une accélération du pouls, la proportion d'acide carbonique que forme la respiration est beaucoup plus grande dans une même quantité d'air. Par l'autre, il est constaté que, dans les fièvres, le contraire arrive; la proportion d'acide carbonique est diminuée, & celle du gaz azote augmentée.

Après ce mécanisme important, vient celui qui résulte des fonctions de la peau. A la surface de cet organe, l'air vital dégage encore une portion du principe du charbon avec lequel il forme de l'acide carbonique, & s'il étoit vrai, comme le pourroit être une expérience de M. Pristley, contredite cependant par celles de M. Cruikshank & de M. Jurine, que l'air qui a séjourné dans le contact de la peau, paroit meilleur à l'esai du gaz nitreux, en sorte qu'il eût perdu dans ce contact une partie du gaz azote, il en résulteroit encore, que dans la peau, les humeurs s'animalisent aussi par un mécanisme analogue à ceux de la digestion & de la respiration; au moins paroît-il bien prouvé que, dans cet organe, il se fait un dégagement du principe du charbon. L'ignorance où nous sommes de la véritable nature de la transpiration cutanée contribue encore à répandre de l'obscurité sur cette matière.

Conclusion.

Il paroît donc qu'une grande partie de l'opération d'où résulte l'assimilation des aliments se passe dans le canal intestinal, dans les organes de la respiration & à la surface de la peau; que cette opération peut être divisée par conséquent en trois temps qui nous rappellent les trois coctions admises par nos anciens médecins; que dans ces trois temps également l'air atmosphérique, & particulièrement la partie vitale de cet air, est le principal instrument des combinaisons par lesquelles l'assimilation s'opère; qu'il agit probablement en enlevant à la matière alimentaire une portion de son principe charbonéux, & en facilitant sa combinaison avec l'azote excédant dans

les humeurs animales; & que par conséquent dans ce travail commun dont l'exécution est partagée entre trois organes différens, mais est fondée dans tous sur les mêmes principes, il se fait à-la-fois un changement réciproque tant dans la substance de l'aliment que dans celle des humeurs animales, par lequel l'une étant animalisée, les autres perdant, pour ainsi dire, l'excès de leur animalisation, toutes sont amenées comme à un même niveau, & paroissent mutuellement assimilées.

Je sens que cette théorie n'explique pas la formation de tous les produits de l'assimilation animale, qu'on n'y reconnoit ni la production des sels phlogistiques, ni celle la matière grasse analogue au blanc de baleine que M. Fourcroy a trouvée dans le foie & la bile, qu'à plus forte raison l'on n'y voit pas la manière dont se modifient les autres produits animaux sur lesquels la chimie medetne n'a point encore jeté de jour; que par conséquent elle est incomplète: ma réponse est toute simple. Les faits connus & les observations publiées jusqu'à ce jour, n'ont pas pu me mener plus loin; mais la combinaison de l'azote dans les substances animales est déjà un objet assez important pour que le mécanisme de cette combinaison puisse être regardé comme un des objets les plus intéressans de l'économie animale.

Telle est la manière dont M. Hallé croit pouvoir expliquer le mécanisme de l'assimilation des aliments, de leur changement de nature; on voit qu'il a tiré beaucoup de parti des découvertes faites par MM. Scheele, Bergman, Lavoisier, Priestley, Berthollet; on conçoit par là quelles lumières on peut attendre aujourd'hui de l'application de la chimie à la physique animale, & combien la marche de cette science, guidée par les connoissances nouvelles, sur l'analyse de l'air & des matières animales, diffère en ce moment de ce qu'elle étoit il y a quelques années. Il seroit difficile de ne pas convenir qu'à la place de systèmes vagues, d'hypothèses incertaines, qui ont rempli jusqu'à présent tant d'ouvrages inutiles sur la physiologie, la science peut au moins compter aujourd'hui quelques pas assurés, quant aux travaux des chimistes. On doit considérer que l'ouvrage de M. Hallé est un des premiers en ce genre, qu'il embrasse une grande étendue d'opérations ou de fonctions animales à-la-fois, qu'il est presque irapossible par conséquent qu'il ait résolu l'ensemble du problème extrêmement compliqué qu'elles présentent. Peut-être même a-t-il fait comme ceux qui parcourent une route peu connue, peu frayée; il a pris des détours & suivi le chemin le plus long; peut-être le mécanisme de l'assimilation n'est-il pas aussi compliqué qu'il l'a cru; mais au moins il est difficile de le concevoir autrement qu'il l'a exposé dans l'état actuel de la science, sans les modifications

qu'il y a apportées depuis , & les observations que j'ai présentées dans les additions faites à ce mémoire. Quant à ce qui manque encore pour concevoir la formation de chaque humeur animale en particulier, & l'espèce d'assimilation qui forme dans chaque région du corps des animaux les liqueurs ou les solides qui y sont, il s'en faut encore de beaucoup qu'on puisse déterminer ce que la science chimique pourra fournir à cet égard ; mais on verra dans tous les articles de ce dictionnaire qui comprennent les liquides & les solides animaux, ce que l'on possède déjà sur cet objet, & ce que l'on peut espérer encore. *Voyez* les mots, BILE, LAIT, LYMPHE, GRAISSE, URINE, LARMES, SALIVE, CHYLE, SPERME, OS, MUSCLES, &c. en général tous les articles dépendans du règne animal.

ANIMALES. (*Substances*). Les substances animales ont toutes ensemble & sans distinction des caractères chimiques, ou des propriétés constantes qui les rapprochent les unes des autres, & qui les distinguent des matières minérales & même des matières végétales. Les principales de ces propriétés sont, 1°. de donner beaucoup d'ammoniaque par la distillation ; 2°. de se pourrir très-vite, & de fournir également de l'ammoniac comme un des produits de leur décomposition spontanée ; 3°. de devenir jaunes par le contact de l'acide nitrique ; 4°. d'exhaler du gaz azote pendant que l'acide nitrique les dissout & avant qu'il les convertisse en acide oxalique ; 5°. de lasser après leur décomposition par le feu un charbon très-difficile à incinérer, & qui contient plusieurs espèces de phosphates fixes ; 6°. de donner beaucoup d'acide prussique, soit par la simple action de la chaleur lente, soit par la combustion rapide, soit par la réaction de l'acide nitrique. Une analyse complète prouve que les matières animales sont formées de carbone, d'hydrogène, d'azote & d'oxygène unis intimement, & auxquels se trouvent souvent associés la chaux, la soude, l'acide phosphorique & le fer. Elles diffèrent des substances minérales par leur ordre de composition plus compliquée, & par leurs changemens bien plus rapides, bien plus fréquens, & des matières végétales par la présence de l'azote. Il est cependant plusieurs de ces dernières qui se rapprochent des substances animales, & qui comme elles recèlent l'azote, dont la présence produit la plupart des propriétés désignées ci-dessus. Telle sont le glutineux qu'on trouve dans la farine de froment, la gomme ou la résine élastique, les tuniques cornées des fœtus, les graines des crucifères, les plantes des marais, &c. Ces matières végéto-animales contiennent en même-temps de l'acide & des sels phosphoriques, ce qui établit une analogie de plus entre elles & les matières animales. On a réuni à l'article ANALYSE tout ce qui est connu aujourd'hui sur la nature de ces

matières, & sur les divers moyens d'en déterminer la composition. L'article ANIMALISATION expose également ce qu'on sait en ce moment sur la formation des substances animales, sur les changemens qu'éprouvent dans les corps des animaux les matières végétales pour se convertir en leur propre substance. Ainsi toutes les questions qu'on pourroit agiter sur les propriétés intimes des matières animales, étant traitées dans ces deux articles, j'y renverrai le lecteur, qui n'aura trouvé ici que l'énoncé des principaux traits caractéristiques qui distinguent ces matières.

ANIMANS, ANIMÉS ; (*Pharmacie*). On dit souvent des médicamens animans ou animés, pour exprimer soit leur nature irritante stimulante propre, soit pour indiquer qu'on leur a réuni quelque substance de cette nature ; on dit une potion, une boisson animée, un onguent, un emplâtre animé.

ANIMÉ. (*gomme ou résine*) *Hymenaea corbaril*. La résine animée découle d'un très-grand arbre du Brésil, de la nouvelle Espagne, des îles d'Amérique, de la Guiane. Elle doit être citrine, quelquefois blanchâtre, claire, transparente, brillante, sèche, friable, en larmes difficile à dissoudre, assez semblable au succin, de bonne odeur.

ANIS. *Pimpinella anisum*. L. *Anisum*. J. B. 2. 72. C'est une plante annuelle, ombellifère, indigène à la Syrie, à l'Égypte, au Japon, mais elle y est rare suivant le rapport de M. Thunberg, qu'on cultive en France dans la Touraine ; en Allemagne, dans la Thuringe, dans la Saxe, & dans le territoire de Bamberg ; elle offre une semence pedunculée, striée, un peu ovale, d'un verd brun, d'un goût agréable, doux, aromatique, qu'il faut choisir non rôtie ; elle fait un des objets du commerce des épiciers ; c'est la première des quatre grandes semences carminatives & chaudes, qui est douée d'une infinité d'excellentes qualités. On l'emploie avec avantage lorsque la digestion est difficile, & que la difficulté vient des crudités de l'estomac, comme dans la colique, le hoquet, le mal de tête, le coque-mal, le vertige, les diarrhées, la difficulté de respirer ; elle empêche le lait de se coaguler dans les mamelles des nourrices, aigrit la vaine & l'ouie, convient dans l'enrouement, la toux ; c'est ce qui l'a fait appeler par quelques-uns *l'ami des pourceaux*, contre le tintement d'oreille ; elle excite les urines & les règles. On la mêle souvent avec les purgatifs pour en corriger l'acrimonie. Cullen assure que les semences d'anis semblent être particulièrement destinées aux maladies des enfans, parce qu'ils sont sujets à des douleurs & des coliques qui proviennent de l'accescence du lait qu'ils prennent ; elles sont très-propres à ces incommodités, parce qu'elles agissent en très-petite dose

petite dose; elles sont conséquemment très-saines, en ce qu'elles ne font point risquer de contracter de mauvaises habitudes ou de stimuler trop fort. Ce sont-là leurs vertus réelles; on dit qu'elles sont propres à augmenter le lait des nourrices; leurs saveurs passent effectivement dans le lait sans avoir subi de changement; & je les ai vu, continue Cullen, quelquefois donner à des nourrices en forme d'allaitement, & passer d'elles à leurs nourrissons qui avoient des coliques provenant de leur disposition naturelle, ou de la nature du lait, au point de remédier entièrement aux coliques dont ils étoient affectés. On peut supposer que comme leurs propriétés passent sans être altérées, elles peuvent stimuler les organes excrétoires, & donner du lait. Heurnius les prescrivait aux enfants à la dose d'un scrupule dans leur bouillie sucrée, afin d'évacuer le meconium, ce qui les purge autant que la rhubarbe. Vanhelmont les appelle le soulagement des intestins; appliquées à l'extérieur, elles dissipent les ecchymoses & les contusions.

La dose de la semence d'anis en poudre est depuis un scrupule jusqu'à un gros, seule ou mêlée avec du sucre, ou en infusion. Les confiseurs en font de petites dragées; ceux de Verdun excellent dans cette fabrication. Son huile diluée se fige facilement; c'est le contre-poison de l'arsenic. Son huile, par expression, son esprit, sont aussi en usage: la pharmacopée de Wirtemberg fait grand cas de son eau distillée.

La semence d'anis entre dans une seule étonnante de compositions pharmaceutiques dont l'énumération deviendrait fastidieuse; les principales sont l'esprit carminatif de Sylvius, le rossolis de 6 graines, l'essence carminative de Wedelius, la décoction carminative. Nous avons vu un religieux amasser des sommes très-considérables en vendant de la liqueur préparée avec l'anis. L'huile d'anis fait la base du baume de soufre anisé; cette huile entre dans les trochisques béchiques noirs. Vogel assure que c'est un poison subtil pour les pigeons.

La semence d'anis se sert sur des assiettes pour en manger au repas, & cela en Allemagne. On en fait entrer dans le pain aux environs de Rome: les traiteurs & les pâtisseries d'Angleterre en font grand usage. Sa propriété sur l'organe de la vue a occasionné le vers suivant de Salerne:

Emetas visum, stomachum confortas anisum.

Le meilleur historien de l'anis est Henningue, médecin allemand.

(M. WILLÉMET.)

ANISÉ. (*Pharmacie.*) Anisé se dit d'une préparation pharmaceutique dans laquelle on fait entrer l'huile volatile d'anis, pour communiquer un parfum agréable à cette préparation. Ainsi l'on dit

Chimie. Tome II,

jus de réglisse anisé, cachou anisé. Ce mot s'emploie encore, pour indiquer que l'huile volatile d'anis fait un des principaux ingrédients d'une composition pharmaceutique, sans qu'elle ait seulement pour utilité de lui communiquer fort parfum. C'est ainsi que l'on a nommé *baume de soufre anisé*, une dissolution de soufre dans l'huile volatile d'anis. Les propriétés médicinales de ce composé sont bien plus dues à cette huile qu'en fait la base, qu'au soufre, qui n'y est que très-peu abondant; car il ne se dissout qu'en petite quantité dans la plupart des huiles volatiles. Voyez les mots **CACHOU**, **RÉGLISSE** & **SULFURES HUILEUX**, &c.

ANODYN MINÉRAL. (*Pharmacie.*) Dénomination employée par quelques anciens chimistes & adoptée par plusieurs pharmacographes, pour désigner une masse saline que l'on prépare en projetant sur du nitrate de potasse en fusion une petite quantité de soufre. Ce sel est encore connu sous le nom de *crystal minéral, sel de prunelle*. Mais d'après les principes de la nomenclature méthodique, nous le connoissons aujourd'hui sous le nom de *nitrate de potasse*, mêlé de sulfate de potasse. Voyez ce mot.

ANODYN UNIVERSEL. (*Pharmacie.*) Quincy dans sa pharmacopée, décrit sous ce titre une dissolution d'opium dans l'alcool foible, & à laquelle on ajoute du carbonate ammoniacal & quelques substances aromatiques; cette préparation est un alcool ammoniacal d'opium. Voyez ce mot.

ANTHORE. *Aconitum anthora. L. Anchora Lob. ic. 677.* De toutes les espèces d'aconits, il n'y a que l'anthore qui ait la réputation d'être bienfaisant, non seulement comme l'antidote des autres aconits, mais bien encore de tous les venins possibles. Plusieurs botanistes, & nous sommes du nombre, croient que cette plante étant revêtue du même caractère que les poisons végétaux les plus subtils, il ne faut pas s'en servir inconsidérément.

On estime la racine d'anthore propre contre la morsure des vipères & autres animaux venimeux. Elle est alexitère contre les fièvres malignes, le pourpre, la peste, la rage, le tœnia, pour apaiser les tranchées des intestins. On s'en sert en Dauphiné pour faire mourir les vers: si on la miche, elle brûle le gosier; son amertume, son acreté sont cause qu'on ne la prescrit que sous la forme de bol, depuis un scrupule jusqu'à un gros; elle est vomitive & purgative. Le savant auteur des démonstrations botaniques à l'usage de l'art vétérinaire, prescrit la poudre de cette racine aux animaux, à la dose d'une once. On l'emploie dans l'ortéan ou antidote thériaque de la pharmacopée de Toulouse. Marcellus faisoit un mélange de feuilles récentes d'anthore & de thora, & recommandoit le suc exprimé de ce mélange,

Pp

pour dissiper les taves des yeux. On trouve l'anthere dans les montagnes de la Suisse, de l'Italie, de la Provence & des Pyrénées.

(M. WILLEMET).

ANTHOS. (*Pharmacie.*) Le mot *anthos*, qui signifie fleur d'après sa racine grecque immédiate, a eu trois significations en pharmacie.

1°. On l'employoit pour désigner la fleur de romarin, à laquelle on attribuoit de très-grandes propriétés, comme si on vouloit dire par-là que c'étoit la fleur par excellence.

2°. Il servoit à dénommer une quintessence alchimique faite avec de l'or, une espèce d'élixir d'or ou d'or potable.

3°. Dans le même langage figuré ou mystique, on l'employoit pour nommer un médicament précieux tiré des perles.

Cette expression a été abandonnée avec d'autant plus de raison, qu'elle étoit en même-temps adoptée par les alchimistes, pour indiquer un des moyens de transmutation, qui s'opéroient, disoit-on, par le vitriol, & par les médecins qui nommoient ainsi des crachats mêlés de filets de sang.

ANTHOSAT. (*Pharmacie.*) C'est le nom qu'on donne au miel qu'on a fait digérer pendant quelques jours avec des sommités de romarin. Voyez ROMARIN.

ANTI. (*Pharmacie.*) Ce mot qu'on a beaucoup employé en médecine, pour désigner tous les médicaments qu'on oppose à diverses maladies, & qu'on a regardés comme propres à les combattre par une propriété spécifique, en y ajoutant les noms de chaque maladie, comme antiapoplectiques, antiarthritiques, anticancéreux, antidartreux, antiepileptiques, antiangreneux, antilaiteux, antilysses, antiloimiques, antihystériques, antiscorbutiques, antispasmodiques, antivénériens, &c. un grand nombre d'autres, n'a de rapport avec la pharmacie, que parce que plusieurs préparations magistrales ont été ainsi désignées, dans les recueils de formules ou dans des ouvrages de médecine, où l'on traite de ces diverses maladies en particulier. Mais comme ces remèdes ordinairement très-mêlés peuvent être variés à l'infini & au gré de chaque médecin, comme ils sont déjà extrêmement multipliés, & qu'il seroit impossible de les décrire tous, sans grossir inutilement & faiblement ce dictionnaire, on se contentera d'insérer celles de ces préparations désignées ou caractérisées par ces épithètes médicales qui ont reçu la sanction du temps & de l'expérience; mais on ne les présentera que sous leur dénomination pharmaceutique primitive, telles que les MOUS CONFECTIONS, LECTUAIRES, ELIXIRS, TISANNES, FOLS, PIEULES, POTIONS, SIROPS, MIXTURES, PASTILLES, TABLETTES, EMPLA-

TRES, ONGUENS, &c. &c. On prendra ce parti d'autant plus volontiers & avec d'autant plus de raison, que toutes les propriétés de ces spécifiques ont été discutées & examinées avec tout le détail convenable dans le dictionnaire de médecine, & qu'il n'y a rien à ajouter à ce qui a été dit dans cet ouvrage.

ANTIDOTE, ANTIDOTAIRE. (*Pharmacie.*) Les antidotes sont toutes les compositions pharmaceutiques propres à s'opposer à l'effet des poisons. Comme ces médicaments étoient autrefois très-nombreux, on nommoit *antidotaire* les recueils qui les contenoient réunis. Aujourd'hui ces dénominations sont presque généralement abandonnées. Voyez le dictionnaire de médecine.

ANTIHECTIQUE DELAPOTERIE. (*Pharmacie.*) Ce remède qui a été beaucoup employé autrefois, mais qui ne l'est presque plus aujourd'hui, est une espèce d'oxide d'antimoine & d'étain, préparé par la détonation du nitre. Il est fort voisin de l'antimoine diaphorétique. Comme cette préparation a été décrite avec beaucoup d'étendue dans le dictionnaire de médecine, il seroit inutile de présenter dans celui-ci les mêmes détails, d'autant plus que cette préparation est maintenant abandonnée des praticiens les plus instruits. Il suffira de dire que c'est un mélange d'oxide d'antimoine & d'oxide d'étain, fait avec le nitre & par la détonation, qui est lavé avec assez de soin, pour qu'il ne reste rien d'alcalin dans le résidu. C'est un remède très-peu actif & auquel on a presque généralement renoncé, malgré les éloges qu'on lui avoit autrefois prodigués. Voyez le dictionnaire de médecine encyclopédique, où cette préparation est décrite en détail.

ANTIMOINE. Le nom d'antimoine a été donné pendant long-temps à la combinaison naturelle du métal cassant que nous nommons ainsi aujourd'hui, & du soufre, combinaison qui en est la mine la plus abondante. On pretend que le mot antimoine vient de ce que ce minéral s'étoit trouvé dans un jardin où l'on cultivoit des légumes pour l'usage d'un couvent, les moines en ont été empoisonnés. Quoique cette étymologie soit manifestement fautive, ce ne seroit pas la première fois qu'une fable auroit été la source d'une ancienne nomenclature.

Il n'y a pas de substances naturelles qui aient été autant travaillées par les alchimistes & les chimistes que la mine d'antimoine. Les uns & les autres en ont fait l'objet des recherches les plus longues & les plus patientes. Les alchimistes l'ont tourmentée de mille manières, parce qu'ils y voyoient un des éléments de l'or; les médecins ne l'ont pas moins travaillée, à cause des grandes propriétés qu'ils lui attribuoient. On se rappelle

encore toutes les disputes qui se sont élevées à l'occasion des préparations de ce métal. Heureusement que ces guerres indécises & ridicules sont depuis long-temps tombées dans l'oubli. Une foule de prétendues opérations & de préparations antimonialles n'ont pas été plus ménagées depuis le renouvellement de la chimie. Si l'on vouloit recueillir tout ce qui a été dit & fait sur cette matière, depuis Dioscoride & Pline jusqu'à nos jours, & sur-tout les travaux de Basile Valentin, de Paracelse, de Vanhelmont, de Kerkringius & d'une foule d'alchimistes; si l'on y joignoit l'histoire des préparations antimonialles, proposées par les différents chimistes pharmacographes, il faudroit plusieurs volumes in-4^{to}, & la lecture d'un pareil recueil seroit insupportable. Heureusement que la chimie a depuis long-temps désavoué & rejeté ce fatras, & que la marche méthodique qu'on peut suivre rend l'histoire de ce métal aussi claire & aussi simple que celle de tous les autres métaux. Avant de la commencer, on doit ne pas perdre de vue que le nom d'antimoine est donné aujourd'hui au métal qu'on nommoit auparavant *régule d'antimoine*, & que sa mine qu'on désignoit autrefois par le nom simple d'antimoine, est nommée actuellement sulfure d'antimoine.

L'antimoine, *stibium*, est un métal fragile, pesant, d'une couleur blanche brillante, assez semblable à celle de l'érain ou de l'argent. Sa fragilité l'avoit fait ranger parmi les demi-métaux, dénomination qu'on doit bannir aujourd'hui d'un langage exact. Voyez DEMI-MÉTAUX.

L'antimoine, paroît formé de lames appliquées les unes sur les autres, & présente à sa surface une sorte de cristallisation en étoiles ou feuilles de fougères, ou en espèces de dendrites, lorsqu'il a été refroidi lentement. Il est encore susceptible de cristalliser en pyramides trièdres, formées par des espèces de trémiées implantées par leurs angles les unes sur les autres; ces trémiées paroissent être elles-mêmes le résultat de l'aggrégation de pyramides quadrangulaires ou d'octaèdres, qui semblent être la forme primitive de l'antimoine. On parvient à lui faire prendre cette forme en le tenant quelque temps dans un creuset plat, & en le laissant figer à sa surface; alors on le perce, on fait couler la portion encore liquide, & le reste se trouve cristallisé. L'antimoine perd dans l'eau $\frac{1}{4}$ de son poids. On le pulvérise très-facilement. Il paroît avoir une action très-sensible sur l'estomac, puisqu'il est fortement émétique & purgatif, pour peu à la vérité qu'il soit oxydé. Suivant M. Brisson la pesanteur spécifique de l'antimoine, l'eau étant 10,000, est 67,011; le pouce cube pèse 4 onces 2 gros 54 grains, & le pied cube 469 livres 2 onces 2 gros 5 grains.

L'antimoine se rencontre rarement natif; il a été découvert par M. Antoine Shwab, à Sahlberg en Suède. M. Schreiber, directeur des mines d'Allemagne en Dauphiné, en a trouvé dans ces

mines. Cet *antimoine natif* forme un filon de près de deux pouces d'épaisseur; il est en grandes lames conchoïdes, & présente toutes les propriétés de celui que l'on extrait de sa mine; il contient seulement $\frac{1}{17}$ ou $\frac{1}{15}$ d'arsénic.

M. Mongez le jeune a découvert un oxyde d'antimoine natif en aiguilles fines & blanches, mêlées avec de l'antimoine ou groupées à la manière de la zéolite. Il a trouvé cet oxyde sur de l'antimoine natif, des chalanges en Dauphiné.

Ce métal est le plus souvent combiné avec le soufre, & il forme alors ce que l'on a appelé improprement antimoine, & ce qu'on doit appeler mine ou sulfure d'antimoine. Ce minéral est alors d'un gris noirâtre, en lames ou en aiguilles plus ou moins grosses, friables, dispersées ou réunies sous différentes formes. Il est quelquefois mêlé avec d'autres métaux, & particulièrement avec le plomb & le fer; il est commun en Hongrie, en France, dans le Bourbonnois, l'Auvergne, le Poitou. Les naturalistes ont multiplié les variétés de cette mine, suivant que ses filets sont parallèles, étoilés, irréguliers, charoyans, &c. Lorsqu'elle est mêlée d'une portion d'arsénic, ou qu'elle a été altérée par des vapeurs alcalines ou combustibles, elle est alors, dit-on, en aiguilles d'un rouge foncé, assez semblables aux belles fleurs de cobalt, mais un peu plus opaques. Enfin quelques naturalistes ont admis un oxyde d'antimoine sulfuré rouge, au lieu du sulfure d'antimoine rouge dont on vient de parler. On peut, d'après ces détails, reconnoître les quatre sortes suivantes de mines ou d'états de l'antimoine dans la nature.

Première sorte, antimoine natif pur.

Deuxième sorte, antimoine arsénical, combinaison naturelle d'antimoine & d'arsénic.

Troisième sorte, oxyde d'antimoine blanc natif en cristaux prismatiques ou aiguillés.

Quatrième sorte, sulfure d'antimoine qui contient les variétés de formes suivantes.

Variétés.

1. Sulfure d'antimoine cristallisé en prismes à six pans, terminés par des pyramides tétraèdres, obtuses & isolées.
2. Sulfure d'antimoine strié ou formé de grosses aiguilles informes, appliquées & réunies en faisceaux irréguliers.
3. Sulfure d'antimoine à stries étoilées; ses aiguilles vont en divergeant d'un centre commun.
4. Sulfure d'antimoine lamelleux; il est formé de lames plus ou moins étendues, qui imitent la mine de plomb nommée galène. Quelquefois cette variété est brillante, on la nomme alors *antimoine spéculaire*.
5. Sulfure d'antimoine rouge. Il est en efflorescence grumeleuse à la surface des aiguilles.

d'antimoine, quelquefois il est cristallisé en aiguilles ou prismes d'un rouge brillant & foncé. Quelques naturalistes le nomment en cet état *vermis & soufre dorés netifs*. Si l'on trouve par une analyse exacte que l'antimoine est à l'état d'oxide dans cette mine, il faudra en faire une cinquième sorte sous le nom d'*oxide d'antimoine sulfuré rouge ratif*.

On ne traite point le sulfure d'antimoine dans ses mines pour en obtenir le métal pur, comme on le fait pour la plupart des métaux, on se contente de fondre ce minéral pour le séparer de sa gangue & des autres matières métalliques auxquelles il peut être lié. A cet effet on prend deux pots de terre, dont l'un est percé de plusieurs trous dans son fond, c'est dans celui-là que l'on met la mine à fondre; l'autre pot, placé au dessous du premier, & destiné à recevoir le sulfure d'antimoine à mesure qu'il se fond, est enfoncé dans la terre. On fait du feu autour du pot supérieur; on ne donne qu'une chaleur douce dans le commencement, parce que cette mine est très-fusible; mais fur la fin on augmente le feu, afin de retirer du minéral tout ce qu'il contient, il passe alors une portion des autres métaux, & notamment du fer qui se trouve dans la mine; ces métaux forment une couche de scories à la surface du sulfure d'antimoine. Quoique ce minéral, tiré de la Hongrie, passe pour le plus pur, il est certain que tout sulfure d'antimoine fondu, lorsqu'il est bien aiguillé & sans mélange de scories, est également parfait & propre à tous les usages auxquels on a coutume d'employer ce minéral. Il faut seulement observer que le sulfure d'antimoine paroit différer suivant les lieux d'où on le tire par la quantité respective de soufre & d'antimoine qu'il contient, & qu'il est très-important de faire l'essai de celui dont on se sert pour préparer les médicaments antimoniaux, dont il seroit fort à désirer que la force fût toujours la même. On verra plus bas quels sont les moyens à la disposition de l'art pour faire cette analyse.

Le sulfure d'antimoine est très-fusible, ainsi qu'on peut le voir d'après le procédé employé pour le séparer de sa gangue; si on le pousse au feu, lorsqu'il est fondu dans des vaisseaux ouverts, il perd son soufre qui se dissipe en vapeurs jaunes; la partie métallique s'oxide aussi très-facilement, & se dissipe en vapeurs blanches; mais à une chaleur douce & incapable de fondre le sulfure d'antimoine, le soufre de ce minéral se dissipe lentement & par degrés; le métal s'unit peu-à-peu à l'oxigène atmosphérique & forme l'oxide gris d'antimoine sulfuré, qu'on nommoit autrefois *chaux grise d'antimoine*. Cette opération ne peut bien se faire qu'autant que le sulfure d'antimoine très-divisé présente une grande surface à l'air. Pour cela, on le met en poudre & on l'expose à un feu très-doux sur une terrine de verre vernissée. Il faut aussi procéder avec lenteur au com-

mencement de l'opération, parce que ce minéral est très-fusible; mais à mesure qu'on avance dans cette opération & que le soufre se dissipe, l'antimoine devenant plus réfractaire, on peut élever le feu jusqu'à faire rougir le fond de la capsule qui contient ce minéral. On s'aperçoit qu'on opère bien lorsqu'on ne sent d'autre odeur que celle du soufre qui se sublime pendant le grillage, & que la matière ne se pelotonne pas; mais lorsque le sulfure d'antimoine se grumele & que le soufre se brûle & forme de l'acide sulfureux en se volatilissant, ce qu'on sent par l'odeur suffoquante qui se dégage, alors la chaleur est trop grande, il faut la diminuer.

Quoique le soufre ne paroisse pas très-adhérent à l'antimoine dans sa mine, il n'est cependant pas possible de l'enlever tout entier par le grillage, & l'oxide gris d'antimoine préparé par ce procédé, en retient toujours une assez grande quantité malgré qu'il ait été calciné au point d'ôter au métal les propriétés métalliques; c'est pour cela qu'il doit être nommé oxide gris d'antimoine sulfuré.

L'oxide sulfuré & gris d'antimoine, poussé au feu sans addition, se fond en un verre plus ou moins transparent, suivant que le minéral qui a servi à le former étoit plus ou moins oxidé. Si cet oxide contient peu de soufre & beaucoup d'oxigène, le verre qu'il donne est opaque; il forme une espèce de soie d'antimoine ou oxide d'antimoine sulfuré vitreux. Si l'oxide d'antimoine contient beaucoup de soufre, & s'il se rapproche encore du caractère métallique, il produit un verre transparent plus fusible, qu'on nomme *verre d'antimoine* ou oxide d'antimoine sulfuré vitreux & transparent. On peut obtenir celui-ci plus facilement & plus promptement, en ajoutant à la *chaux grise* trop calcinée un peu de soufre ou de sulfure d'antimoine, la matière entre en fusion dans l'instant.

L'oxide gris d'antimoine & le même oxide vitreux, chauffés dans un creuset avec leurs poids de flux noir & un peu de savon noir ou d'huile, se réduisent & donnent de l'antimoine pur. Le flux noir dans cette opération sert à deux usages; l'alcali qu'il contient s'unit au soufre que ces matières n'ont pu perdre par la seule action du feu, & la matière carbonieuse favorise la réduction de l'oxide métallique; c'est de cette manière que se prépare l'antimoine en grand dans le commerce; on l'appelle *régule*. On coule ce métal cassant en pains orbiculaires & aplatis, ces pains présentent à leur surface une cristallisation en forme de feuilles de soufre. On n'a décrit ici la manière dont le sulfure d'antimoine est altéré par l'action du feu & de l'air, que pour arriver à la connoissance du procédé le plus utile pour se procurer le métal nommé antimoine. On fera connoître plus bas un grand nombre d'autres propriétés du sulfure d'antimoine, & plusieurs autres procédés pour en obtenir le métal. Il faut d'abord examiner ici les

caractères & les actions chimiques de l'antimoine, qu'on nommoit autrefois régule.

L'antimoine n'est que peu altéré par le contact de la lumière, il ne se fond au feu que lorsqu'il est rouge; & si on le chauffe fortement dans des vaisseaux clos, il se volatilise en entier sans être décomposé. Si on le laisse refroidir lentement lorsqu'il est fondu, & qu'on décante la portion fluide lorsque sa surface est figée, on trouve le reste cristallisé en pyramides ou en trémies, comme nous l'avons déjà dit plus haut : telle est la cause des étoiles ou des feuilles de fougère qu'on voit sur les pains de ce métal.

Ce métal, fondu dans des vaisseaux ouverts, s'oxide promptement; lorsqu'il est bien rouge, bien pénétré de feu, il s'en élève des fumées blanches, épaisses qui, en se condensant, se précipitent à la surface du métal fondu, ou s'attachent au couvercle du creuset sous la forme de prismes allongés ou de petites aiguilles blanches. C'est un oxide métallique sublimé, auquel on a donné le nom impropre de *fleurs argentines de régule d'antimoine*, ou celui de *neige d'antimoine*.

Pour en préparer une certaine quantité, on place un creuset horizontalement dans un fourneau, de sorte que ses bords s'ajustent avec la porte du foyer, à laquelle on le lutte à l'aide de la terre à four. On met dans ce creuset de l'antimoine, on fait écouler de feu pour faire fondre & fumer ce métal. On reçoit cette fumée dans un second creuset qui s'adapte au premier, elle s'y condense en aiguilles très-déliées, blanches & brillantes, qui paroissent être des prismes à quatre pans. Les cristaux, attachés de toutes parts au patio du creuset extérieur, y prennent dans leur ensemble la forme de buisson ou de neige. On en voit qui ont jusqu'à deux ou trois poices de long; mais leur diamètre n'est pas plus que celui des fractions de ligne, & ne permet pas à l'œil de déterminer avec précision leur forme.

L'oxide d'antimoine blanc & sublimé n'est pas seulement susceptible de se volatiliser dans le temps de la déflagration du métal; mais il se sublime seul lorsqu'on le pousse au feu.

Cet oxide peut aussi se fondre en un verre de couleur orangée; ce verre est plus pâle & plus transparent que celui que l'on fait avec l'oxide gris & sulfuré d'antimoine. Mais aussi il est beaucoup plus difficile à fondre. L'oxide sublimé en aiguilles a plus de poids que n'en avoit l'antimoine qui l'a formé, ce qui dépend de l'addition de l'oxygène. Ce métal paroît en être si avide, que lorsqu'on le chauffe très-fortement il s'enflamme en produisant même des espèces d'explosions ou de fulgurations.

L'antimoine n'éprouve aucune altération de la part des matières combustibles; mais les oxides d'antimoine peuvent être décomposés par ces sub-

tances & reprendre l'état métallique. Comme la plupart sont très-oxides ou chargés de beaucoup d'oxygène, & que ce principe y adhère fortement, ils ne passent que très-difficilement à l'état métallique; & comme ils sont en même temps plus ou moins volatils, on ne peut faire cette réduction que dans des vaisseaux fermés. Il paroît que l'oxide blanc sublimé est dissoluble dans l'eau, & qu'il a pris quelques caractères salins. Rouelle est le premier qui ait fait cette observation, sur un autre oxide d'antimoine qui sera bientôt traité dans cet article. Quelques oxides métalliques & en particulier ceux d'arsenic, de molybdène & de tungstène, passent à l'état salin & acide, lorsqu'ils sont saturés d'oxygène; peut-être découvrirait-on par la suite la même propriété dans l'oxide d'antimoine. M. Berthollet pense à cette occasion que les oxides métalliques qui ne sont point sensiblement acides, exercent les fonctions d'un alcali avec les acides, & celles d'un acide avec les alcalis; il les considère comme un terme qui donne naissance à deux progressions opposées. On verra plus bas qu'il a examiné en particulier la combinaison d'un oxide d'antimoine avec la potasse, où cet oxide paroît jouer le rôle d'un véritable acide.

L'antimoine n'est que fort peu altéré par l'air; on observe seulement que la surface de ce métal se ternit. Il ne se dissout pas dans l'eau, cependant quelques médecins soupçonnent qu'il communique à ce fluide une qualité émétique très-marquée. Les oxides blancs d'antimoine dissous dans l'eau, donnent à ce fluide une propriété émétique. Cette action, jointe à leur dissolubilité dans l'eau & à leur volatilité, présente une sorte d'analogie avec l'oxide d'arsenic. Plusieurs minéralogistes ont pensé que la mine d'antimoine n'étoit jamais exempte d'arsenic; il est certain que, jetée en poudre sur les charbons, ainsi que le métal lui-même, elle exhale une odeur légèrement arsenicale, & que lorsqu'on s'expose à cette vapeur, on est purgé & on éprouve les effets d'un empoisonnement léger, comme je l'ai observé plusieurs fois dans mon laboratoire. En 1784, faisant dans mon laboratoire, une des leçons sur l'antimoine, un grand nombre de détonations ayant été opérées sous la cheminée vaste que j'y ai fait construire, il s'en échappa cependant quelques bouffées de vapeurs, parce qu'on approcha plusieurs creusets près des bords extérieurs de la hotte pour mieux faire voir l'effet & les phénomènes des détonations. Le laboratoire se remplit bientôt d'une vapeur un peu épaisse, dans laquelle plus de 50 personnes restèrent plongées environ une heure, sans qu'elles en fussent aucunement affectées. Mais le soir, & sur-tout la nuit, plus de vingt personnes éprouvèrent de la toux, de l'oppression, de la douleur à la poitrine, de la cuisson & de la douleur aux yeux, de la chaleur à la peau, un mouvement fébrile très-marké; cette scène se termina par une sueur

abondante chez quelques-uns & par une purgation assez violente chez le plus grand nombre. Quelques étudiants en médecine qui s'observèrent avec plus de soin que les autres, crurent avoir une fluxion de poitrine, car il y eut un léger crachement de sang chez plusieurs. Depuis cette expérience qui prouve bien l'effet de l'oxide d'antimoine répandu dans l'air sur les poulmons, & qu'on ne doit pas attribuer à l'arsenic dont on n'a point démontré exactement la présence dans ce métal, j'ai soin de faire faire toutes les expériences de détonations d'antimoine au-dehors de mon laboratoire.

Les substances terreuses n'ont point d'action sur l'antimoine; son oxide entre facilement dans les virrifications, & donne aux verres des couleurs orangées plus ou moins semblables à celle de l'hyacinthe.

On ne connoit point l'action des substances salino-terreuses & des alcalis sur l'antimoine; on a même apprécié celle des acides sur ce métal.

L'acide sulfurique n'agit point à froid sur l'antimoine; mais lorsqu'on le fait bouillir lentement sur ce métal, il est décomposé, & en oxide une grande partie. Il s'exhale une grande quantité de gaz sulfureux, & sur la fin il se sublime un peu de soufre. La masse qui reste après la décomposition de l'acide est un composé de beaucoup d'oxide métallique & d'une petite portion du métal combiné à l'acide dans l'état de sulfate d'antimoine. On sépare la partie saline par le moyen de l'eau distillée. Ce sel, fortement évaporé, est très-déliquescent, & n'est pas susceptible de cristallisation; il se décompose facilement au feu. L'eau pure, les substances salino-terreuses & les alcalis en séparent aussi les principes. L'oxide d'antimoine formé par l'acide sulfurique & précipité de cet acide, est très-difficile à rappeler à l'état métallique; il paroît être très-chargé d'oxigène, & sur-tout très-adhérent à ce principe de la combustion. Lorsqu'on précipite cet oxide de l'acide sulfurique par les alcalis, il s'unit en-partie à ceux-ci, & paroît former des sels triples.

L'acide nitrique attaque à froid & avec vivacité l'antimoine; il est fortement décomposé par ce métal, il en oxide une très-grande quantité & en dissout une petite portion. Cette dissolution se fait bien à froid; le sel qui en résulte, séparé par la lessive de la portion oxidée, donne par l'évaporation un nitrate d'antimoine qui est fort déliquescent, qui se décompose au feu, & par les mêmes intermédiaires que le sulfate de ce métal. L'oxide d'antimoine, formé par l'acide nitrique, est très-blanc; il est en même-temps un des plus refractaires & des plus difficiles à réduire de tous les oxides métalliques. On diroit qu'il n'est plus possible de lui faire reprendre la forme métallique; en vain on le chauffe avec le charbon, les huiles,

le suif; il acquiert une couleur noire sans reprendre facilement l'état métallique par aucun procédé connu. On n'obtient qu'avec la plus grande peine quelques globules d'antimoine. Aussi tous les chimistes disent-ils, d'un commun accord, que cet oxide est irréductible. Il seroit très-utile de faire des recherches suivies sur ce singulier oxide d'antimoine.

L'acide muriatique paroît agir plus difficilement sur l'antimoine que les autres acides. Cependant il le dissout à l'aide d'une digestion longue, & l'oxide moins que ne font les acides sulfurique & nitrique. J'ai observé qu'en laissant pendant long-temps cet acide sur de l'antimoine en poudre, il agit lentement sur ce métal & en dissout une bonne quantité; le muriate d'antimoine qu'on obtient en petites aiguilles par une forte évaporation, est très-déliquescent. Il se fond au feu; il se volatilise, & il se décompose par l'eau distillée, comme le muriate d'antimoine sublimé, nommé *heurre d'antimoine*, que nous connoissons par la suite, & dont il ne diffère que très-peu. M. Monnet, qui a bien décrit cette combinaison opérée par une chaleur assez forte, observe que celle que l'on fait avec un oxide d'antimoine, diffère beaucoup de celle qui est préparée avec le métal par sa fixité & sa manière de cristalliser en lames, comme le sulfate de chaux & l'acide boracique. D'ailleurs cette espèce de sel est décomposable par l'eau. J'ai eu occasion d'observer que dans les dissolutions d'antimoine par l'acide muriatique & au moyen de la distillation, il y a toujours une portion saline qui se volatilise par l'action du feu & qui ressemble à celle dont M. Monnet a fait mention, cela dépend de ce qu'elle a été fortement oxidée par l'acide. Cette observation peut être également appliquée à presque toutes les dissolutions métalliques qui se trouvent dans plusieurs états différens, suivant qu'elles contiennent le métal plus ou moins brûlé ou oxidé. Bergman dit que l'acide muriatique a plus d'affinité avec l'antimoine que n'en ont les autres acides. On voit bien que dans cette dissolution de l'antimoine par l'acide muriatique, l'eau est décomposée, son oxigène se porte sur le métal, l'oxide & le rend dissoluble par l'acide muriatique; car on sait que cet acide ne peut pas être décomposé par les corps combustibles.

L'acide muriatique oxigéné brûle l'antimoine avec la plus grande facilité. M. Vestrumb a découvert que l'antimoine en poudre, jeté dans du gaz acide muriatique oxigéné, brûle rapidement & avec une flamme blanche très-brillante. J'ai répété cette expérience un grand nombre de fois avec succès; la cloche fe remplir d'une vapeur blanche très-épaisse, & l'on trouve sur les parois du muriate d'antimoine solide; si l'on y verse de l'eau, il se précipite une grande quantité d'oxide d'antimoine, comme cela a lieu pour l'espèce de muriate d'antimoine sublimé, qu'on

nomme beurre d'antimoine. En faisant passer du gaz acide muriatique oxygéné dans de l'eau au fond de laquelle est contenu de l'antimoine en poudre agité à l'acide d'un mouffoir de verre, jusqu'à ce que ce métal oxydé par les premières portions de l'acide soit dissous par celles qui arrivent ensuite, on n'aurait plus qu'à évaporer & concentrer cette liqueur, pour avoir sous forme solide & cristalline le muriate d'antimoine caustique, qu'on nomme beurre d'antimoine & qu'on prépare à si grand frais par la décomposition du muriate de mercure corrosif distillé avec de l'antimoine, comme on l'exposera dans l'histoire du mercure. Le procédé que j'indique ici est très-économique & très-avantageux pour les pharmacies.

L'eau régale, ou l'acide nitro-muriatique, dissout l'antimoine plus efficacement que chacun des acides qui le composent, parce que l'activité de l'acide muriatique est augmentée en raison de son union avec l'oxygène séparé de l'acide nitrique. Le nitro-muriate d'antimoine est fort déliquescent, & peut être décomposé comme les autres combinaisons salines de ce métal. En l'évaporant suffisamment on le convertit en muriate pur d'antimoine ou beurre d'antimoine.

On ne connoît pas les combinaisons des acides fluorique, boracique & carbonique avec l'antimoine. On fait seulement que ces acides n'ont pas d'action sur ce métal.

Aucun acide végétal n'a d'action sur l'antimoine, mais tous paroissent en avoir sur ses oxydes. On ne connoît cependant presque point l'union du plus grand nombre de ces acides avec les oxydes de ce métal; on fait seulement que l'acide benzoïque dissout facilement l'oxyde d'antimoine, que l'acide oxalique forme avec l'oxyde d'antimoine un sel en petits cristaux grenus, que le vin en dissout une portion & qu'il prend les caractères d'un émétique plus ou moins violent par cette combinaison; enfin que l'acide acétique dissout également une portion de cet oxyde, puisqu'avant la connoissance du tartre d'antimoine, Angelus Sala avoit conseillé, comme vomitive, une préparation d'acétate d'antimonie. Quant à l'action de l'acide & de l'acide tartareux sur l'oxyde d'antimoine, il en sera question à la fin de cet article, parce qu'on ne combine cet acide qu'avec plusieurs préparations antimoniques, qui ne sont point encore décrites & qui appartiennent à l'histoire du sulfure d'antimoine, dont on ne doit s'occuper ici qu'après avoir fait celle du métal lui-même.

On a de même peu examiné l'action des acides animaux sur l'antimoine, ainsi que les combinaisons de ces acides avec les oxydes de ce métal. Suivant Bergman l'acide sebacique a une forte attraction pour l'oxyde d'antimoine, puisqu'il le place dans le premier rang de la colonne qu'il a destinée aux attractions de ce métal.

On trouve ensuite, & dans l'ordre suivant, les

autres acides, le muriatique, l'oxalique, le sulfurique, le pyromarqueux, le nitrique, le tartareux, le saccharique, le phosphorique, le citrique, le succinique, le fluorique, l'arsénique, le formique, le lactique, l'acétique, le pyrolique, le malique, le runstique, le boracique, le prussique, & pour le dernier l'acide carbonique. Il ne faut pas regarder ces attractions comme entièrement & complètement connues; Bergman en a soupçonné seulement le plus grand nombre; voici comment il s'explique lui-même à cet égard. Les affinités de l'antimoine ont été peu examinées jusqu'à présent; elles présentent aussi beaucoup de difficultés, parce que les combinaisons de ce métal ne sont solubles qu'à la faveur d'un excès d'acide. Le premier rang appartient à l'acide sebacique, & le second à l'acide muriatique. L'acide oxalique chasse le sulfurique; celui-ci & les acides nitrique & muriatique l'emportent sur l'acide arsénique, qui est cependant plus puissant que l'acide acétique. Je n'en ai pas encore pu déterminer davantage d'une manière sûre.

Le sulfure d'antimoine ou la combinaison naturelle du soufre avec le métal, se dissout mieux en général, & s'oxyde moins que le métal lui-même. On a cru que cela dépendoit de ce que le soufre défend en partie l'antimoine de l'action des substances salines, & on a considéré alors le soufre comme une espèce de vernis recouvrant le métal; mais il y a là un autre phénomène chimique. Le soufre a de l'attraction pour l'oxygène; il tend à brûler & à se décomposer pour cela les acides. Il épuise donc ainsi une partie de l'action de ces sels, ou plutôt il balance l'attraction du métal pour leur oxygène; & souvent même il en enlève une partie qui le brûle & le convertit en acide sulfurique. C'est ce qui arrive, quand on jette du sulfure d'antimoine dans de l'acide nitrique assez fort & mêlé d'acide nitreux.

L'acide nitro-muriatique agit doucement sur ce minéral; c'est un très-bon moyen d'en séparer le soufre, qui se précipite sous la forme de poudre blanche. M. Baumé conseille d'employer pour cette opération une eau régale, composée de quatre parties d'acide nitrique & d'une d'acide muriatique, mais il n'a pas déterminé la force de ces acides. Lorsque l'action de cet acide mixte est apaisée, on filtre la dissolution, on lave avec son le soufre resté sur le filtre, on le pèse; & l'on sait ainsi qu'elle est la quantité respective de soufre & d'antimoine contenue dans la mine qu'on analyse; mais il faut observer que le soufre est toujours mêlé d'une petite quantité d'oxyde d'antimoine, de sorte qu'on ne doit pas regarder cette expérience comme d'une très-grande exactitude, à moins qu'on n'ait séparé auparavant par les acides la portion d'oxyde mêlée au soufre. Il y a encore une autre source d'erreur, c'est que le soufre en agissant de son côté sur l'acide nitrique, est en partie converti en acide sulfurique, & se trouve

manquer alors à celui qui reste, de sorte que les auteurs qui ont en général négligé de corriger ces erreurs, ont presque tous donné un résultat infidèle, & forcé la proportion de soufre ou de métal, suivant la manière dont ils ont fait leurs expériences, la force de l'acide qu'ils ont pris, &c. J'emploie pour cette analyse l'acide nitrique pur en grande quantité; je la fais dans une cornue dont le bec plonge sous le mercure; j'aide l'action par la chaleur; je brûle en entier le soufre & l'antimoine: le premier forme de l'acide sulfurique qui reste liquide avec la portion d'acide nitrique qui échappe à la décomposition; j'en détermine la quantité par le nitrate de baryte qui le précipite, & j'ai par ce moyen celle du soufre; l'oxide d'antimoine bien lavé me donne celle du métal. Il faut s'assurer que tout le soufre est brûlé, en chauffant au chalumeau un peu de l'oxide qui reste, qui éprouve une grande chaleur, sans exhaler d'odeur sulfureuse; il faut encore être sûr qu'il ne reste point d'oxide d'antimoine dans l'acide fumageant, ce qui a lieu lorsqu'on l'a chauffé long-temps; enfin il faut compter la portion de gaz acide sulfureux qui s'exhale; mais l'habitude fait promptement surmonter toutes ces difficultés apparentes, qui d'ailleurs existent dans toutes les méthodes.

L'acide muriatique en dissolvant le sulfure d'antimoine, forme un peu de *kermès*, ce qui prouve que l'eau est décomposée, & que le kermès ne contient pas d'alcali. Bergman a très-bien décrit ces phénomènes, comme on le verra plus bas. L'antimoine décompose facilement plusieurs sels neutres. M. Monnet a décrit dans son traité de la dissolution des métaux, une expérience par laquelle il démontre que l'antimoine décompose le sulfate de potasse. Il a fait fondre dans un creuset un mélange d'une once de ce sel & d'une demi-once du métal qui fait le sujet de cet article. Il en a résulté une masse jaune, vitreuse, très-caustique, qui n'étoit qu'un sulfure de potasse antimonisé; cette masse délayée dans l'eau chaude, a donné par le refroidissement un oxide d'antimoine sulfuré rougeâtre, ou du véritable *kermès*. On conçoit, suivant la nouvelle doctrine, que dans cette opération le métal s'est emparé de l'oxygène de l'acide sulfurique, qui a passé par-là à l'état de soufre, & qui uni à la potasse & à l'oxide d'antimoine, forme le sulfure de potasse antimonisé qu'on obtient pour résultat de l'expérience. Une suite d'essais que j'ai faits sur cet objet, m'a prouvé que plusieurs substances métalliques décomposent de même les sels sulfuriques, comme je le ferai voir dans les articles relatifs aux différens métaux.

Le nitrate de potasse est décomposé très-rapidement par l'antimoine. En projetant dans un creuset rouge au feu une partie de ce métal & deux parties de nitre en poudre, ce sel détone vivement, & brûle le métal à l'aide de l'oxygène qu'il fournit; après cette opération, on trouve dans

le creuset l'alcali fixe qui servoit de base au nitre; & l'antimoine dans l'état d'oxide blanc: on a donné à cet oxide le nom d'*antimoine diaphorétique*. On le nomme *oxide d'antimoine par le nitre*. Le plus ordinairement on n'emploie pas l'antimoine, pour faire cette préparation; mais on se sert du sulfure d'antimoine natif ou de sa mine. On ajoute seulement une plus grande quantité, comme trois parties, de nitre, contre une de ce minéral, afin de brûler non-seulement le métal, mais encore le soufre qui lui est uni; la raison de la préférence qu'on donne ici à la mine sur le métal, c'est que le soufre rend la détonation du nitre plus rapide & plus complète, & facilite singulièrement la combustion de l'antimoine; mais beaucoup de chimistes préfèrent l'antimoine au sulfure, parce qu'il en résulte un oxide plus pur.

La matière qui reste dans le creuset après la détonation du nitre & du sulfure d'antimoine, est composée de l'oxide d'antimoine uni en partie à l'alcali fixe du nitre, & d'une portion du nitre qui a échappé à la détonation; elle contient aussi un peu de sulfate de potasse formé par l'acide du soufre & l'alcali fixe du nitre. Ce composé a été nommé *fondant de Retz*, ou *antimoine diaphorétique non lavé*; on jette cette matière dans de l'eau bien chaude; elle s'y délaie, la partie saline s'y dissout, & l'oxide métallique y reste suspendu; on décante l'eau trouble, on laisse déposer cet oxide blanc & fixe, c'est ce qu'on appelle *antimoine diaphorétique lavé*, on le sèche avec précaution après l'avoir réduit en petits trochisques. L'eau qui fumage le dépôt tient en dissolution les parties salines qui étoient dans le mélange, & une portion d'oxide métallique presque acidifié, unie à la potasse du nitre; cette espèce d'antimoniate de potasse est susceptible de cristalliser, suivant M. Berthollet, & les acides le décomposent & en précipitent un oxide d'antimoine nommé *crasse d'antimoine* ou matière perlée de *Kerkringius*. La liqueur qui fumage ce précipité contient un peu de nitre échappé à la détonation, un peu de sulfate de potasse produit pendant la détonation & le sel neutre formé par l'union de l'acide avec l'alcali qui tenoit l'oxide métallique en dissolution. Quoique ce dernier sel varie suivant l'acide qu'on a employé, il porte le nom très-impropre de *nitre antimonisé* de Stahl; le plus souvent ce sel n'est point du nitre, puisqu'on peut le servir des acides sulfurique ou muriatique, pour précipiter l'oxide d'antimoine, & lorsque la précipitation est bien faite, il ne contient point du tout de cet oxide.

Les oxides d'antimoine obtenus par le nitre, peuvent être fondus en verre, comme tous les précédents; mais comme ils sont très-oxidés, on a bien de la peine à les fondre, par la même raison, ils sont difficiles à réduire en métal; ils paroissent même plus irréductibles que l'oxide d'antimoine fait par le feu & sublimé. On ne fait

pas encore s'ils sont moins dissolubles dans l'eau & dans les acides.

Geoffroy a décrit dans son quatrième mémoire sur l'antimoine, (académie des sciences, 1747,) un phénomène remarquable. En traitant l'oxide d'antimoine fait par le nitre avec le savon noir, dans l'intention de le réduire, il se forme une matière pyrophorique. Après avoir réussi à réduire le *verre d'antimoine par le savon*, on le traitant commela *chaux grise*, il a cru réussir de même avec l'antimoine diaphorétique, à quelque différence près, qui n'auroit regardé que le poids. Mais l'antimoine diaphorétique fait suivant les formules ordinaires, ayant été mélangé avec le savon noir, puis poussé au feu comme la *chaux grise* de ce minéral, s'est converti en une masse qu'il a laissée refroidir, dans l'espérance de trouver un *régalé* au fond du creuset, après l'avoir cassé. L'ayant examiné presque froid dans un endroit exposé au grand air, il s'est aperçu que la masse s'échauffoit à mesure qu'elle prenoit de l'humidité de l'air, il en a porté quelques morceaux à la flamme d'une bougie où ils s'allumèrent en pétillant. Il rejeta quelques-uns de ces morceaux allumés dans un creuset, où ils allumèrent le reste de la masse qui périt de même en brûlant.

Geoffroy refit l'opération précédente, & se servit d'un oxide d'antimoine ou diaphorétique minéral très-beau préparé quelques jours auparavant avec deux parties d'antimoine, & trois parties de nitre de potasse, une once de cet oxide fut mêlée avec deux onces de savon noir. Ce mélange mis peu-à-peu dans un creuset ardent, s'y alluma, & se boursoüffoit beaucoup; lorsque la flamme finissoit, la masse s'affaîsoit & devenoit d'un rouge de charbon embrasé; il s'en élevait des vapeurs lumineuses d'un verd bleuâtre. Tous ces phénomènes ont eu lieu constamment à chaque projection de la matière. Lorsque tout le mélange fut projeté, & eut cessé de jeter des flammes & des vapeurs lumineuses, il se forma une espèce de champignon renversé, creux, poreux & noir. Après en avoir rabattu les bords, on mit dessus une nouvelle once de savon noir, afin de mieux couvrir la matière que Geoffroy vouloit réduire. Quand ce dernier savon fut brûlé, & qu'il se fut élevé une petite flamme bleuâtre sur la masse, on couvrit le creuset de son couvercle & de beaucoup de charbon, on donna une chaude vive d'environ cent coups de soufflets; mais malgré la violence du feu, il ne se forma pas de scories fluides, & la masse resta spongieuse. On a laissé éteindre le feu, & on a porté le creuset dans un coin du laboratoire, où il a resté plus de cinq heures, sans qu'on y touchât. Vers le soir, Geoffroy voulant examiner cette matière, on prit ce creuset qui étoit très-froid; la personne qui le tenoit, sans avoir pris de précaution contre un effet qu'on ne pouvoit prévoir, voulut dé-

Chimie. Tome II.

couvrir le dessus de la masse avec un morceau de fer, mais dans l'instant que l'air y eut accès, le feu y prit, & il se fit une explosion très-vive, & avec bruit, qui lui lança sur les habits une gerbe de feu très-considérable, & y fit plusieurs trous; il se répandit une forte odeur de soufre semblable à celle de ces phosphores en poudre, dont feu M. Lémery le cadet, a donné plusieurs descriptions dans son mémoire de 1714.

Je n'ai point eu, dit Geoffroy, la réduction du diaphorétique que je cherchois, & le hasard m'a donné un phosphore très-singulier que je ne cherchois pas; je l'ai fait cinq ou six fois depuis avec le même succès, soit en me servant du diaphorétique des formules ordinaires, soit en employant mon diaphorétique de résale. Il est vrai que ce dernier réussit mieux que les autres. pourvu qu'on ne donne ni trop ni trop peu de chaleur après qu'on a ajouté la dernière once de savon. Depuis cette découverte de Geoffroy, on a trouvé un grand nombre d'autres matières pyrophoriques. M. l'roust a vu que le tartre d'antimoine & de potasse distillé fournit un résidu qui s'allume de même par le contact de l'air; & il paroît qu'il suffit qu'un oxide métallique ou une terre très-fine & très-divisée, se trouvent mêlés à du charbon extrêmement atténué, pour que ce mélange prenne feu à l'air. Voyez les mots ALUN, PYROPHORE, &c. Il résulte des expériences de Geoffroy, qu'on ne peut pas réduire facilement en métal les oxides d'antimoine faits par le nitre, & que l'oxigène tient très-fortement à ce métal.

L'antimoine paroît susceptible de décomposer le muriate de soude, puisque si l'on chauffe dans une cornue, un mélange de ces deux substances, il passe, suivant M. Monnet, du muriate d'antimoine sublimé ou beurre d'antimoine dans le récipient. Ce chimiste ne décrit point le résidu de cette opération.

L'antimoine ne décompose pas bien le muriate ammoniacal, suivant Eucquet, & l'on n'obtient point de *saure* ou muriate d'antimoine sublimé de cette décomposition, comme l'avoit avancé Sanchez.

Toutes les matières combustibles ont une action plus ou moins marquée sur l'antimoine. Le gaz hydrogène altère sa surface & la colore. Il agit d'une manière plus énergique sur les dissolutions dans les acides. J'ai fait passer ce gaz obtenu du fer & de l'acide sulfurique aqueux, dans une dissolution nitro-muriatique d'antimoine; & cette dernière s'est troublée sur le champ; & elle a déposé une matière d'un jaune orangé, semblable à du *soufre aisé*, mais jamais semblable à du *verre*. Les oxides d'antimoine blancs, exposés de même au gaz hydrogène, soit à sec, soit délayés dans l'eau, n'ont pas été altérés; mais le gaz hydrogène sulfuré agit sur tous les oxides d'antimoine & sur toutes les dissolutions de ce métal.

Le soufre se combine très-bien avec l'antimoine,

Q q

& forme une mine artificielle, qui imite parfaitement le sulfure d'antimoine natif. Pour obtenir cette combinaison, on fond promptement dans un creuset une partie de soufre & deux d'antimoine, & il en résulte un minéral aiguillé d'un gris sombre, qui ne contient jamais tout le soufre employé, quand même on en auroit mêlé une partie & demie contre une partie de métal. J'ai même observé qu'une once d'antimoine fondu dans une cornue avec une once de soufre, a donné dix gros & quelques grains de sulfure d'antimoine, qui ne cont. noit par conséquent que deux gros & quelques grains de soufre. Le reste de cette matière combustible étoit parvenue, en se boursoffant par la fusion, jusques dans le récipient.

Il ne faut donc qu'une partie de soufre pour donner à quatre parties d'antimoine les caractères de mine, & l'on voit d'après cela combien il est important de faire l'essai de celle dont on se sert en pharmacie, afin d'apprécier l'effet des diverses substances qu'on combine avec ce minéral.

Les sulfures alcalins ou *soies de soufre*, dissolvent complètement l'antimoine, & forment une matière jaunâtre. d'où l'on peut précipiter le soufre antimonisé par un acide qui lui donne sur le champ une couleur orangée.

Le soufre se combine dans différentes proportions aux oxides d'antimoine par la voie sèche, & il résulte de ces combinaisons, suivant les doses & l'état de l'antimoine oxidé, du verre ou du *soie d'antimoine*, qui sont précieuses, parce qu'on en connoit bien la nature & la composition, à toutes les préparations du commerce qui sont faites avec le sulfure d'antimoine plus ou moins oxidé & toujours variable.

M. Pelletier, dans son travail très-complet sur les combinaisons du phosphore avec les métaux, a décrit soigneusement celle de l'antimoine avec ce corps combustible.

Un mélange d'une once d'antimoine, d'une once de verre phosphorique, & d'un gros de poudre de charbon, fournit par la fusion, une substance métallique, blanche, fragile, ayant une cassure lamelleuse, mais à petites facettes qui paroissent cubiques, c'est de l'antimoine, phosphoré ou du phosphore d'antimoine; si l'on en met un petit morceau sur un charbon bien allumé, il se fond, & donne, au moment de la fusion, une petite flamme verte; il continue ensuite à se volatiliser sous la forme de sublimé blanc.

En procédant à la fusion d'un mélange de parties égales de verre phosphorique & d'antimoine, l'on obtient aussi une substance métallique, une espèce de mine à petites facettes, telles que celles que je viens de décrire, qui est de même de l'antimoine phosphoré.

En projetant du phosphore sur de l'antimoine tenu en fusion dans un creuset, l'on parvient à unir du phosphore à ce métal, & l'antimoine phosphoré par ce dernier procédé est absolument sem-

blable à celui que l'on obtient par ceux dont je viens de parler. Il faut avoir attention de retirer le creuset du feu, aussitôt après les dernières projections de phosphore. Sans cette attention, presque tout le phosphore se volatiliserait.

C'n observe dans la phosphoration de plusieurs métaux, particulièrement de l'étain, du cuivre, du platine, &c., que le phosphore s'y unissant, donne des produits qui ont quelques analogies, quant aux apparences extérieures avec ceux que l'arsenic forme, lorsqu'il est uni à ces mêmes métaux. L'antimoine nous fournit encore un exemple d'un phénomène semblable. L'on fait que l'arsenic uni à ce mélange, nous donne une substance métallique à facette, comme nous l'avons observé dans l'antimoine phosphoré.

L'antimoine s'unit à l'arsenic, au bismuth, au zinc, au plomb, au fer, au cuivre, à l'argent, à l'or & au platine. En général il n'y a point de métal qui entre dans un plus grand nombre d'alliages & qui se combine plus facilement aux autres métaux.

Bergman dans la cinquante-huitième colonne de sa table des attractions électives simples donne la liste de celles de l'antimoine pour les métaux par la voie sèche : car on sait que ce n'est que par ce moyen que l'on peut unir les matières métalliques. Il place dans le premier rang le fer qui se sépare en effet l'antimoine de tous les autres métaux qui lui sont unis. Il met ensuite le cuivre, l'étain, le plomb, le nickel, l'argent, le bismuth, le zinc, l'or & le platine à puis dans un dernier rang, & rapproches les uns des autres, le mercure, l'arsenic & le cobalt, parce que ces métaux se combinent moins bien avec l'antimoine, que tous les précédens. Le sulfure alcalin & le soufre lui-même sont placés les derniers dans cette colonne, comme ayant moins d'affinité avec l'antimoine que tous les métaux, & en effet toutes les matières métalliques séparent le soufre de l'antimoine.

Telles sont les principales propriétés de ce métal. Il est nécessaire maintenant de considérer en particulier sa mine, à laquelle on a donné le nom impropre d'*antimoine*. Comme c'est de ce minéral que l'on se sert le plus communément, pour faire un grand nombre de préparations pharmaceutiques très-importantes, on conçoit que les propriétés doivent être beaucoup mieux connues que celles du métal qu'il contient. Les alchimistes qui s'en sont très-occupés, ont multiplié nos connoissances sur cette matière, & aucune substance n'a été le sujet d'un plus grand nombre d'expériences que le sulfure d'antimoine. Nous avons déjà vu que l'on peut à l'aide de la chaleur, en séparer une portion du soufre, & oxidier plus ou moins le métal qu'il contient; qu'il résulte de cette opération un oxide gris, qui peut se fondre en verre ou en *soie d'antimoine*, suivant son oxidation & son désoxydation plus ou moins avancée; que le nitre en brûlant le soufre, oxide aussi la matière métallique. Mais le grillage & la combustion par le nitre, ne sont

pas les seuls moyens d'enlever le soufre à l'antimoine. On y parvient encore, en présentant à ce minéral un corps qui ait plus d'affinité avec le métal que n'en a le soufre, ou qui ait plus de rapport avec le soufre que n'en a le métal.

On a un exemple de la première décomposition en appliquant les acides au sulfure d'antimoine crudi; ces sels, & sur-tout l'acide nitro-muriatique, dissolvent le métal & en séparent le soufre qui vient nager au-dessus de la dissolution. Le métal paroît même plus aisé à dissoudre complètement dans le sulfure d'antimoine, que lorsqu'il est pur, ainsi qu'on l'a déjà fait remarquer plus haut.

Le fer & quelques autres substances métalliques enlèvent le soufre à l'antimoine.

Le nitre est employé avec succès, pour préparer avec le sulfure d'antimoine plusieurs médicaments assez importants. On a déjà dit que lorsqu'on fait détoner une partie de cette mine avec trois parties de nitre, le soufre & le métal se trouvent brûlés, & il ne reste plus qu'un oxide d'antimoine presque acidifié, uni à l'alcali. Si l'on fait détoner parties égales de nitre & de sulfure d'antimoine, cette détonation est moins vive, parce qu'il y a moins de nitre : aussi est-on obligé de projeter ce mélange par cuillerées dans un creuset rougi, tandis que celui qui est destiné à former l'oxide blanc, ou l'*antimoine diaphorétique*, n'a besoin que d'être allumé une fois, & détone ensuite tout seul, jusqu'à ce qu'il soit entièrement réduit en une masse d'un blanc jaunâtre. Lorsque la détonation de sulfure d'antimoine & du nitre à parties égales est finie, on pousse le tout à la fonte, & au lieu d'*antimoine diaphorétique*, on trouve dans le creuset une masse brune opaque, brillante, très-cassante, en un mot un *oxide d'antimoine sulfuré*, vitreux, brun & opaque, couvert de scories. On conçoit que dans cette opération, le nitre n'a pas été en assez grande quantité, pour brûler tout le soufre. La portion de ce dernier, qui n'est pas détruite, a entraîné l'oxide d'antimoine dans sa fusion. Lorsqu'on ne pousse pas ce mélange à la fonte, on n'obtient qu'une scorie vitreuse, à laquelle on donne le nom de *flux fixe d'antimoine de Ruland*; cette matière réduite en poudre & lavée dans l'eau, forme le *sulfate de métaux*, qui n'est que de l'oxide d'antimoine sulfuré, vitreux, pulvérisé & séparé des matières salines résidues de la détonation du nitre.

On fait encore deux préparations analogues à la précédente, & qui sont de véritables verres d'antimoine sulfuré. L'une est la rubine d'antimoine ou *magnesia opalina*, que l'on obtient en fondant dans un creuset parties égales de muriate de soude décrepité, de nitre & de sulfure d'an-

timoine. Cette fonte qui a lieu sans détonation, fournit une masse vitreuse, d'un brun peu foncé, très-brillante & couverte de scories blanches. L'autre appelée très-improprement *régule médicinal*, est préparée par la fusion d'un mélange de 15 onces de sulfure d'antimoine, de 12 onces de muriate de soude décrepité & de trois onces de tartre. Il en résulte un verre noir, luisant, très-opaque, très-dense, qui n'a nullement l'aspect métallique. Ces deux espèces de composés qui diffèrent du vrai *flux d'antimoine* par quelques propriétés extérieures, doivent sans doute leurs différences au sel marin qui entre dans leur préparation, mais dont on n'a point encore apprécié les effets sur ce minéral.

Si l'on veut extraire l'antimoine de sa mine en petit dans les laboratoires, on doit n'employer que ce qu'il faut de nitre pour brûler le soufre, & ajouter au mélange une matière capable de favoriser la réduction de la partie de métal qui est réduite à l'état d'oxide dans cette expérience. Pour cela, on prend 8 onces de sulfure d'antimoine en poudre, 6 onces de tartre & 3 de nitre, on mêle exactement ces matières, on les projette par cuillerées dans un creuset rougi au feu; le nitre détone avec le tartre & le sulfure d'antimoine; il se forme du flux noir, & l'antimoine se fond. Lorsque la matière est bien fondue, on la verse dans un cône de fer chauffé & graissé, on frappe quelques coups sur le cône, pendant qu'on verse le mélange; on le laisse refroidir, & l'on trouve le métal sous la forme pyramidale au fond de ce vaisseau. Ce métal est recouvert de scories noires & rougâtres, qui attirent facilement l'humidité de l'air. Le *régule* est jugé pur, lorsque sa surface supérieure est convexe & qu'elle présente une étoile régulière. Cette étoile qui avoit exalté l'imagination des alchimistes, ne dépend que de la manière dont le métal cristallise en refroidissant. Ce refroidissement commence par le bord, & la matière fluide étant rejetée du centre à la circonférence, produit cette cristallisation qui n'a lieu que dans les petites masses d'antimoine : car dans les grands pains de ce métal, comme l'ondulation de la matière fluide part de plusieurs centres au lieu d'une étoile, on trouve des empreintes en forme de feuilles de fougère, qui se cristallisent sous différents angles. Réaumur a fait voir qu'un refroidissement subit empêche cette sorte de cristallisation en forme d'étoile, & que si on refroidit brusquement un des côtés du cône, on n'obtient que la moitié de l'étoile (1). La quantité de métal qu'on retire par ce procédé, ne fait pas la moitié du sulfure antimonisé qu'on a employé, quoique ce minéral contienne plus de métal que

(1) Il y a sans doute un rapport entre la manière dont les culots métalliques cristallisent à leur surface, & la forme qu'ils affectent lorsque l'art parvient à les dissoudre en cristaux isolés, par le refroidissement bien ménagé, & par la situation de la portion fluide d'avec celle qui est égale. L'abbé Monge s'est occupé de ce rapport dans ses recherches sur la cristallisation des métaux. (Voyez MŒURS.)

de soufre, parce qu'une portion de l'antimoine est combinée avec les matières salines qui forment les scories.

Les scories qui fumagent l'antimoine, extrait de sa mine par ce procédé, sont très-composées. On y trouve l'alcali fixe du nitre & du tartre uni au soufre de l'antimoine, & dans l'état de sulfure alcalin ou d'*hémar*. Ce sulfure tient en dissolution une portion d'oxide d'antimoine, & il est mêlé d'un peu de sulfure de potasse formé par l'acide sulfurique produit par la combustion du soufre, & uni à une portion de l'alcali du nitre. Enfin ces scories contiennent une matière charbonneuse fournie par le tartre. Si on les fait bouillir dans une grande quantité d'eau, & si on filtre la liqueur bouillante, elle laisse sur le filtre la portion charbonneuse. Cette dissolution qui est claire, tant qu'elle est chaude, se trouble par le refroidissement, & dépose une matière rougeâtre qu'on a regardée pendant long-temps comme un sulfure de potasse antimonisé. Ce précipité est nommé *kermès minéral* par la voie sèche. Lorsque la liqueur n'en précipite plus, on peut la faire évaporer, & on en obtient une matière moins colorée que le *kermès*, & qui est un véritable sulfure de potasse antimonisé. Il fournit aussi du sulfate de potasse. Si, au lieu d'évaporer cette liqueur, on y verse un acide quelconque, il y produit un précipité jaune orangé d'oxide d'antimoine sulfuré, auquel on donne le nom de *soufre doré d'antimoine*, & qui paroît peu différent du *kermès*.

Si l'on fait bouillir quelques instans du sulfure d'antimoine réduit en poudre, dans de l'eau chargée de potasse ou de soude, l'un ou l'autre de ces alcalis dissout le soufre, & forme un sulfure alcalin qui tient en dissolution une partie d'oxide d'antimoine. On filtre la liqueur bouillante; elle laisse précipiter par le refroidissement la portion d'oxide d'antimoine sulfuré brun ou de *kermès minéral* qu'elle contient. Cette liqueur étant refroidie & filtrée, on peut en précipiter de nouvel oxide d'antimoine sulfuré orangé, par le moyen des acides; si on fait bouillir de nouvelle lessive alcaline sur le résidu, on peut encore tirer du *kermès*; mais celui-ci est plus pâle que le premier, & plus on réitère l'opération, moins on obtient du vrai *kermès*; il paroît que l'alcali dissout plus de soufre que d'oxide d'antimoine, & qu'on ne devroit faire subir au sulfure d'antimoine qu'une ou deux décoctions dans l'alcali. Cette opération se nomme en général préparation du *kermès* par la voie humide.

Ce nom lui a été donné par le frère Simon, chartreux, sans doute à cause de sa couleur semblable à celle de la coque animale ou de l'infusée appelée *kermès*, qu'on emploie dans la teinture. Le *kermès minéral* a été aussi appelé *poudre des chartreux*, parce qu'il a d'abord été préparé dans la pharmacie de ces religieux. La dé-

couverte de ce médicament paroît être due à Glauber, qui le préparoit avec le sulfure d'antimoine & la liqueur de nitre fixé par les charbons; mais il a décrit son procédé d'une manière intelligible, & presque sous les emblèmes alchimiques. Lemery qui a beaucoup travaillé sur l'antimoine, & qui a donné sous un autre nom une préparation analogue au *kermès minéral*, peut en être regardé comme le véritable inventeur. Cependant ce remède a été présenté comme entièrement nouveau plusieurs années après la publication de l'ouvrage de ce chimiste, & il n'a dû en effet sa célébrité qu'aux cures singulières qu'il paroît avoir opérées entre les mains du frère Simon. Ce religieux tenoit cette composition d'un chirurgien nommé la Ligerie, qui n'en étoit pas lui-même l'auteur. Ce dernier disoit l'avoir reçu de M. Chastelay, lieutenant du roi à Landau, à qui elle avoit, disoit-on, été communiquée par un apothicaire, prétendu élève de Glauber. D'abord, alors premier médecin du roi, s'adressa à la Ligerie, pour faire publier la recette du *kermès minéral*, & elle le fut en effet par ce chirurgien en 1720. Lemery le fils revint à la découverte pour son père, dans les mémoires de l'académie, & avec d'autant plus de justice, que la plupart des pharmaciens suivent encore le procédé inouï par cet habile chimiste, pour faire cette préparation.

Le procédé décrit par la Ligerie, consiste à faire bouillir pendant deux heures une pinte d'eau de pluie avec quatre onces de liqueur de nitre fixé par les charbons, & une livre de sulfure d'antimoine cassée par petits morceaux; à filtrer la liqueur bouillante; à faire bouillir la même liqueur avec trois onces de nouvelle liqueur de nitre fixé, étendue dans une pinte d'eau de pluie; enfin à faire subir au second résidu une troisième ébullition avec les lessives précédentes, en y ajoutant deux onces de liqueur de nitre fixé, & une pinte d'eau de pluie. On filtre & on laisse déposer le *kermès*: on le lave, jusqu'à ce qu'il soit insipide, on le fait sécher, on fait brûler de l'eau-de-vie dessus, & on pulvérise. Ce procédé est long, il ne fournit que très-peu de *kermès*, puisqu'on n'en obtient tout au plus que quelques gros d'une livre de sulfure d'antimoine. Il est d'ailleurs embarrassant, à cause de la longue ébullition & de l'évaporation de l'eau. Enfin il fait perdre plus des trois quarts de la mine d'antimoine, en raison de la petite quantité d'alcali que l'on emploie relativement à celle de ce minéral.

M. Rauné qui a adopté celui de Lemery, donne deux méthodes pour préparer facilement & en peu de temps une grande quantité d'oxide d'antimoine sulfuré rouge ou de *kermès minéral*, l'une par la voie sèche, & l'autre par la voie humide. Suivant la première, on fait fondre dans une creusette un mélange d'une livre de sulfure d'antimoine, de deux livres d'alcali du tartre bien pur & d'une

once de soufre, le tout bien pulvérisé. On coule ce mélange fondu dans un mortier de fer, on le pulvérisé grossièrement, quand il est refroidi ; on le fait bouillir dans une suffisante quantité d'eau ; on filtre la liqueur au papier gris ; elle donne un *kermès minéral* d'un rouge brun par son refroidissement ; on le lave d'abord avec l'eau froide, & ensuite avec l'eau bouillante, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment desséché ; on le fait sécher.

Pour préparer le *kermès minéral* par la voie humide, suivant le même chimiste, on fait bouillir une lessive de 5 à 6 livres d'alcali fixe put en liqueur, avec 15 ou 20 livres d'eau de rivière ; on jette dans cette liqueur bouillante quatre ou cinq onces de sulfure d'antimoine porphyrisé ; on agite bien le mélange, & lorsqu'il a bouilli un instant, on le filtre. Cette liqueur dépose beaucoup de *kermès* par le refroidissement ; on le lave de la même manière que celui qui est fait par la fusion. Ce procédé fournit, suivant M. l'abbé, 12 à 13 onces de *kermès* par livre d'antimoine. Ce chimiste assure que ces deux *kermès* sont parfaitement semblables.

La théorie de cette opération & la nature du *kermès* ne font peut être pas encore parfaitement connues, malgré les travaux de plusieurs chimistes célèbres. On pense généralement que l'alcali dissout le soufre de la mine, & que le sulfure qui se forme, dissout aussi l'antimoine. Ce métal n'est cependant pas dissout en totalité, puisque dans le procédé de Lemery par la voie humide, il se précipite pendant l'ébullition une poudre grise qui se fond sans addition en un véritable antimoine. La préparation du *kermès* par le refroidissement de la lessive qui est d'abord rougeâtre & transparente, & qui perd sa couleur à mesure que le *kermès* se dépose, est encore un phénomène singulier. On a pensé que ce composé étoit une sorte d'antimoine surchargé de soufre, & soluble à chaud dans l'alcali fixe. En effet si l'on fait bouillir une lessive qui contient du *kermès* déposé, cette substance se redissout par la chaleur. La lessive qui a précipité du *kermès* par le refroidissement, contient encore du sulfure de potasse ammoniac ; lorsqu'on y verse un acide, il s'en précipite une matière orangée nommée *soufre doré d'antimoine*, & qui est beaucoup plus émetique que le *kermès*. Plusieurs chimistes croyent qu'il contient moins de soufre & plus d'oxide métallique que ce dernier.

Geoffroy qui a donné à l'académie en 1734 & 1735 plusieurs mémoires sur le *kermès*, a procédé par beaucoup d'expériences à son analyse. L'action des acides est regardée comme le moyen le plus efficace qu'on puisse employer pour cela, on croit que cesels dissolvent le métal, & laissent le soufre à nud, & que l'on peut par ce moyen apprécier la quantité respective de ces deux substances. Un gros de *kermès* contient, suivant Geoffroy, 16 à 17 grains de métal, 13 à 14 grains d'alcali fixe & 40 à 41 grains de soufre. Il y a manifeste-

ment de l'erreur dans cette analyse. L'alcali que Geoffroy a retiré de son *kermès*, paroît ne provenir que de ce qu'il étoit mal lavé. Tous les chimistes pensent aujourd'hui que le *kermès minéral* ne contient pas un atome d'alcali. M. Baumé dit que ce sel n'est pas un de ses principes constituans, & qu'on peut le lui enlever par le seul lavage dans beaucoup d'eau bouillante. M. L'écuyer qui a fait des recherches sur cet objet, est du même sentiment. Dans des travaux suivis sur le *kermès*, j'ai eu occasion de voir la même chose. D'ailleurs Bergman a vu se former le véritable *kermès* sans alcali pendant la dissolution du sulfure d'antimoine dans l'acide muriatique.

Mais ce qu'il y a de plus important sur cet objet, c'est que le *kermès minéral* paroît être très-différent de lui-même, suivant plusieurs circonstances de sa préparation. Il contient plus ou moins de soufre & d'oxide métallique, & l'on conçoit que ses effets doivent varier à l'infini, d'après ces différences. En général il paroît que l'état de sulfure d'antimoine, la variété des proportions de ses principes, sa plus ou moins grande division, l'état de l'alcali plus ou moins cultive, sa quantité, celle de l'eau, le temps de l'ébullition, & plusieurs autres circonstances analogues, sont singulièrement variés le *kermès*. Pour l'avoir uniforme, il faut le préparer avec des substances toujours égales à elles-mêmes & dans des circonstances parfaitement semblables. Sans entrer dans beaucoup de détails sur les phénomènes que m'a offert la préparation du *kermès* & le *kermès* lui-même traité par un grand nombre d'intermèdes différens, j'ajouterai seulement, 1°. que les alcalis caustiques l'altèrent singulièrement & le dissolvent même à froid ; 2°. que les acides agissent avec une énergie très-variée sur cette substance, & qu'il est très-difficile de déterminer d'une manière exacte par leur moyen, la quantité de l'oxide d'antimoine, & celle du soufre qui entrent dans sa composition, parce que le soufre qui en est séparé retient toujours une certaine quantité d'oxide d'antimoine ; 3°. que le *kermès minéral* est un composé intime d'oxide d'antimoine & de soufre, dans lequel l'état d'oxidation du métal & la quantité du soufre sont tels, que sa couleur est foncée & son énergie assez grande pour agir à de très petites doses sur l'économie animale.

Les alcalis caustiques agissent avec beaucoup plus d'énergie sur le sulfure d'antimoine, que les alcalis effervescens ou que les alcalis en partie à l'état de carbonates, tels qu'on les a employés jusqu'ici ; ils forment un *kermès* beaucoup plus abondant & beaucoup plus foncé en couleur. La chaux, l'eau de chaux, mise en digestion sur l'antimoine en poudre, donne même à froid au bout de quelques jours une espèce de *kermès* ou de soufre doré d'une belle couleur rouge. L'ammoniaque s'altère de la même manière. En dissolvant du muriate d'am-

moniaque avec le sulfure d'antimoine, on obtient un sublimé pourpre paillévirent, qui paroît être une sorte de sulfure antimonisé à base d'ammoniaque.

Enfin, pour terminer l'histoire de la décomposition du sulfure d'antimoine, plusieurs substances métalliques ont la propriété de lui enlever son soufre, avec lequel elles ont plus d'affinité que n'en a ce métal, comme on l'a déjà indiqué ci-dessus.

L'étain, le fer, le cuivre & l'argent peuvent opérer ces décompositions. Il suffit de chauffer & de faire fondre l'étain & l'argent avec cette mine, ces deux métaux s'unissent au soufre & laissent l'antimoine. Le fer, le cuivre produisent le même effet, lorsqu'après les avoir réduits en limaille & les avoir fait rougir dans un creuset, on y ajoute le sulfure d'antimoine. Ce minéral accélère leur fusion, & l'antimoine s'en sépare. A la vérité ce métal, obtenu par ces procédés, n'est pas pur, il retient une partie des substances métalliques que l'on a employées pour le séparer du soufre; sa couleur & sa forme indiquent constamment cet alliage; on l'a distingué sous le nom de chaque métal avec lequel il s'est allié; c'est ainsi qu'on a dit le *régule jovial*, le *régule martial*, le *régule de Vénus*, &c.

Quoique les principales propriétés du sulfure d'antimoine & des diverses préparations auxquelles il donne lieu soient exposées dans ce qui vient d'être dit, il nous paroit utile de faire connoître ici les recherches dues à Bergman sur les antimonies sulfurées & consignées dans un des mémoires qui composent les *opuscules*, tom. III, afin d'exécuter sur ces matières importantes tout ce que l'art possède de plus parfait.

Dans cette dissertation, Bergman, toujours exact & méthodique, va du simple au composé, & arrive presque constamment à une conclusion naturelle & aussi vraie que le raisonnement humain peut le permettre; son ouvrage est partagé en plusieurs paragraphes, dans lesquels il traite successivement de l'antimoine crud, (sulfure d'antimoine) du verre d'antimoine, (oxide d'antimoine sulfure vitreux), du soie du même métal, (oxide d'antimoine sulfuré vitreux opaque), du soufre doré, (oxide d'antimoine sulfuré orangé), du kermès, (oxide d'antimoine sulfuré brun). Il établit ensuite sur les expériences faites avec chacune de ces substances, plusieurs corollaires très-intéressants.

Du sulfure d'antimoine, ou antimoine crud.

EXPÉRIENCE I.

Le sulfure d'antimoine exposé dans un creux de charbon à la flamme d'une bougie excitée par le chalumeau, se fond, répand des fumées & se dissipe en entier, excepté un léger nuage blanc qui recouvre les bords du creux d'un charbon.

EXPÉRIENCE II.

A un feu augmenté par degrés il se réduit dans

l'espace de 18 heures en un chaux grise (oxide gris d'antimoine) dans laquelle il paroît encore quelques points brillans & très-susceptibles; le sulfure d'antimoine perd pendant cette opération 21 liv. $\frac{1}{2}$ par quintal.

EXPÉRIENCE III.

Quatre quintaux docimastiques (400 grains) de cet oxide gris mis dans un creuset enroulé de charbon ardent, & dont la combustion est aidée par un soufflet pendant environ deux minutes, se fondent en un verre transparent & de couleur d'hyacinthe. L'ergman remarque que si l'oxidation du métal a été trop avancée, on n'obtient qu'une scorie opaque, qui peut cependant devenir transparente par l'addition d'un peu de soufre ou de sulfure d'antimoine.

EXPÉRIENCE IV.

Un quintal du même oxide donne avec le double de son poids de 78 à 79 liv. de régule d'antimoine (antimoine) si l'opération a été conduite suivant les règles de l'art de la docimastie.

Bergman donne la préférence au flux blanc.

EXPÉRIENCE V.

L'acide du nitre (acide nitrique), sur-tout lorsqu'il est aidé de la chaleur, attaque vivement le sulfure d'antimoine; il l'oxide le métal tellement qu'il n'en retient qu'une très-légère portion.

L'auteur observe que dans cette opération il se développe beaucoup de gaz nitreux, mais point de gaz hydrogène sulfuré, & que si la chaleur est continuée long-temps, il y a beaucoup de soufre de brûlé.

EXPÉRIENCE VI.

L'acide sulfurique agit à peine sur le sulfure d'antimoine, s'il n'est aidé d'une chaleur étrangère, & il semble produire plus de gaz sulfureux que de gaz hydrogène sulfuré.

EXPÉRIENCE VII.

L'acide muriatique dissout à froid le sulfure d'antimoine, & il se dégage pendant cette dissolution beaucoup de gaz hydrogène sulfuré. 100 grains de cette substance ont fourni à l'appareil pneumatique chimique 11 pouces cubiques de gaz hydrogène sulfuré, sans compter celui qui s'est absorbé par l'eau.

Une observation bien intéressante pour la formation du kermès ou oxide d'antimoine sulfuré brun, c'est qu'il s'est formé une portion de cette substance qui a été portée par le gaz dans l'intérieur du tube qui établisoit une communication entre les deux parties de l'appareil.

EXPÉRIENCE VIII.

Un mélange de trois parties d'acide muriatique & d'une d'acide nitrique, dissout très-prompement le sulfure d'antimoine; il reste une grande quantité de soufre. L'ergman observe qu'il se dégage une forte odeur de gaz hydrogène sulfuré,

mais que le volume en est moins grand que celui qui est dégagé par l'acide muriatique seul.

La raison de ce phénomène est simple ; dans le premier cas c'est l'acide muriatique qui agit seul sur l'antimoine , mais , comme cet acide ne peut pas lui-même oxidier les métaux , il faut que l'eau à laquelle on l'associe toujours dans ces sortes d'opérations fournisse l'oxygène pour qu'il puisse ensuite s'unir à leurs oxides , &c c'est l'hydrogène de la portion d'eau décomposée qui en prenant un certain degré de fluidité élastique , emporte avec lui une petite quantité de soufre ; dans ce cas-ci , au contraire , l'eau de l'acide muriatique ne se décompose , qu'autant qu'il n'y a pas assez d'acide nitrique pour oxidier tout le métal ; & telle est la cause de la quantité de gaz hydrogène sulfuré obtenu dans ces deux expériences. Lorsque les signes de la dissolution cessent , on ramasse le soufre , on le lave , & l'on voit que 100 livres de sulfure d'antimoine en fournissent 22 livres dans cet état. Il faut cependant observer qu'il est très-difficile d'obtenir par le moyen des acides le soufre parfaitement pur du sulfure d'antimoine , comme le dit ici Bergman : on s'est souvent trompé sur l'aspect extérieur du soufre dont la couleur annonce la pureté ; en effet , si l'on fait chauffer le soufre obtenu par cette opération , on s'aperçoit bientôt qu'il est uni à une certaine quantité d'oxide d'antimoine , qui reste dans le vase où s'est faite l'opération , sous la forme d'oxide sulfuré jaune d'antimoine.

Du verre d'antimoine (oxide d'antimoine sulfuré vitreux transparent.)

Bergman pense que l'antimoine est à l'état métallique dans le sulfure d'antimoine ; que l'on parvient en chauffant cette dernière substance à en dégager le soufre & à en oxidier le métal , & que si on a enlevé tout le soufre , on n'obtient par la fusion de la matière qu'une scorie opaque , &c non un verre tel qu'il est prescrit dans les pharmacopées.

L'auteur tire déjà ici une conclusion particulière , en disant que le verre d'antimoine (oxide d'antimoine sulfuré vitreux) n'est autre chose que de l'oxide d'antimoine uni à une petite quantité de soufre , puisque , dit-il , une petite dose de soufre ou de sulfure d'antimoine peut faire passer cette scorie opaque à l'état de verre transparent.

EXPÉRIENCE IX.

Deux cens livres d'antimoine diaphorétique (oxide blanc d'antimoine par le nitrate de potasse) mêlé exactement avec vingt-cinq liv. de soufre , donne au bout de sept minutes à l'aide d'une chaleur vive , cent trente-sept liv. $\frac{1}{2}$ de véritable verre d'antimoine.

EXPÉRIENCE X.

Le soufre & l'oxide d'antimoine sont dans une parfaite combinaison dans le verre d'antimoine ,

puisque'un simple mélange de ces deux substances traitées par l'acide muriatique ne développe point d'odeur de gaz hydrogène sulfuré , tandis que l'oxide d'antimoine sulfuré , vitreux en laisse dégager.

EXPÉRIENCE XI.

Deux parties d'oxide blanc d'antimoine par le nitre & une de soufre , traitées de la même manière qu'il a été dit dans l'expérience IX , se volatilisent entièrement.

EXPÉRIENCE XII.

Quatre parties du même oxide & une de soufre chauffée toujours de la même manière , forment une masse noire fibreuse.

EXPÉRIENCE XIII.

Seize parties du même oxide & une de soufre , se fondent en un verre de couleur verte. L'auteur fait remarquer que le verre fait par le procédé décrit dans l'expérience IX , seroit d'un usage plus sûr dans la pratique de la médecine que le verre d'antimoine ordinaire , qui n'est jamais semblable à lui-même , & il ajoute que tous ces verres sont dissolubles dans les acides même les plus froids.

Du foie d'antimoine (oxide d'antimoine sulfuré vitreux opaque.)

EXPÉRIENCE XIV.

En faisant détoner partie égale de nitre & de sulfure d'antimoine , & en faisant fondre promptement le mélange dans un creuset bien bouché , il en résulte une masse vitriforme brillante , de couleur rouge connue sous le nom de foie d'antimoine (oxide d'antimoine sulfuré vitreux opaque) qui est recouverte de scories que l'on en peut separer facilement. Ce foie d'antimoine contient 1°. de l'alcali du nitre , (de la potasse combinée avec l'acide sulfureux) ; 2°. le même alcali uni à de l'acide nitreux , ces deux sont connus , l'un sous le nom de *sulfate de potasse* , & l'autre sous le nom de *nitrate de potasse*. L'oxide d'antimoine sulfuré opaque mis dans l'eau , lui cède les sels qu'il tient , & alors il porte le nom de *safran des métaux*. Les acides précipitent du soufre doré de la dissolution de ces matières , parce qu'elle contient une petite quantité de sulfure de potasse. Le foie d'antimoine ainsi lavé est une espèce de *hermès* , d'où l'on dégage du gaz hydrogène sulfuré lorsqu'on le chauffe avec l'acide muriatique.

EXPÉRIENCE XV.

Les scories qui se forment dans cette opération lessivées avec de l'eau , fournissent un sel cristallisable , qui se fond au feu & se dissipe en faisant un bruit semblable à une détonation. Bergman pensoit que ce sel est un mélange de sulfate & de nitrate de potasse.

Du soufre doré d'antimoine , (ou oxide d'antimoine sulfuré orangé.)

On précipite , dit Bergman , le soufre doré

d'antimoine (oxyde d'antimoine sulfuré orangé) par les acides, des scories du régule d'antimoine lessivées dans l'eau. Mais comme les portions qui se séparent des premières sont plus émétiques que celles qui les suivent, on fracture l'opération en plusieurs temps, & on se sert ordinairement du troisième précipité. L'antimoine dissout par le sulfure de potasse, n'est point séparé du soufre comme l'est l'or uni à cette substance, & voici la raison que l'auteur en donne, « l'or n'est uni au soufre que par le moyen d'un alcali, & cette union de soufre & d'alcali étant rompue, la combinaison ternaire de l'or ne peut plus avoir lieu ». Cette différence dépend du peu d'attraction de l'oxyde pour le soufre, & comme celui de l'antimoine a beaucoup d'adhérence pour ce corps, il est tout simple qu'il ne le quitte pas pour s'unir aux acides avec lesquels il en a moins.

EXPÉRIENCE XVII.

L'oxyde sulfuré orangé d'antimoine mis sur un charbon allumé, se fond, fume & est absorbé dans l'instant; dans une cuiller d'or, il prend une couleur noire ayant le brillant métallique.

EXPÉRIENCE XVII.

Parties égales de nitrate de potasse & de ces oxydes sulfurés, ne détonent que très-légèrement.

EXPÉRIENCE XVIII.

Les trois acides minéraux produisent en général avec la même substance, du gaz hydrogène sulfuré, mais l'acide sulfurique développe beaucoup de calorique, peu de gaz hydrogène sulfuré; l'acide nitrique produit aussi beaucoup de chaleur & presque pas de gaz hydrogène sulfuré; l'acide muriatique au contraire ne dégage presque point de calorique, mais beaucoup de gaz hydrogène sulfuré.

EXPÉRIENCE XIX.

L'oxyde d'antimoine des trois précipitations rassemblées, se comporte avec les acides de la même manière que le kermès.

EXPÉRIENCE XX.

Le même oxyde sulfuré de la première précipitation, donne avec l'acide muriatique $\frac{1}{2}$ de gaz hydrogène sulfuré de plus qu'un pareil poids de kermès.

EXPÉRIENCE XXI.

Cent grains de la même substance de la troisième précipitation, fournissent avec le même acide quarante-un pouces cubiques de gaz hydrogène sulfuré.

EXPÉRIENCE XXII.

Cent grains d'oxyde sulfuré orangé d'antimoine de la troisième précipitation préparée à la manière de Goering, ne donnent que cinq pouces $\frac{1}{2}$ de gaz.

EXPÉRIENCE XXIII.

Cent grains du même composé traités par

l'acide muriatique, fournissent soixante-quatre parties de soufre & vingt-cinq d'oxyde d'antimoine blanc: on obtient le même résultat par la voie sèche.

Du kermès minéral (ou oxyde d'antimoine sulfuré brun.)

Cette substance, dit l'auteur, faite suivant le procédé de la pharmacopée, est adoucie par sa couleur brune rouffâtre au soufre doré d'antimoine des trois précipitations.

EXPÉRIENCE XXIV.

Il se fond sur un charbon à l'aide du chalumeau, il coule à sa surface & il se dissipe en fumée, dans une cuiller d'or, il forme une masse noire éclatante & qui a le brillant métallique.

EXPÉRIENCE XXV.

Il ne détone, de même que le soufre doré, que très-légèrement avec le nitre; les acides se comportent avec cette substance comme avec l'oxyde sulfuré orangé d'antimoine, cependant l'acide sulfurique étendu d'eau s'en altère point la couleur, tandis que le même acide concentré lui fait prendre une couleur blanche cendrée, ainsi que l'acide muriatique; l'acide acétique ne lui fait éprouver aucun changement.

EXPÉRIENCE XXVI.

Un quintal de kermès ne fournit que dix-neuf onces de gaz hydrogène sulfuré par l'acide muriatique, & on obtient cinquante-deux grains d'oxyde d'antimoine & 8 de soufre.

Il faut qu'il y ait eu une grande quantité de soufre convertie en acide sulfurique, car, comme on verra plus bas, le kermès en contient beaucoup, & la petite quantité employée à former du gaz hydrogène sulfuré est insuffisante pour remplir cette lacune.

En faisant le kermès par la voie sèche, Bergman a obtenu de douze quintaux de sulfure d'antimoine fondus avec autant de nitrate de potasse, y compris les scories, un peu moins de dix-neuf quintaux d'une matière brune. Pour obtenir le kermès contenu dans cette masse, on l'a fait bouillir dans environ huit onces d'eau; après l'avoir pulvérisé, on laisse déposer la liqueur & on la filtre au travers d'un papier double, on fait bouillir la masse une seconde fois pendant quinze minutes dans la moitié de l'eau employée ci-dessus, on verse ensuite le tout sur le filtre, la liqueur passe claire & laisse déposer en refroidissant trente-six de kermès; & le résidu des métaux, qui reste sur le filtre, pèse un peu plus de dix quintaux.

L'oxyde sulfuré brun d'antimoine ainsi préparé, se comporte de la manière suivante avec les différents réactifs.

EXPÉRIENCE XXVII.

Au chalumeau il présente les mêmes phénomènes que celui qui est fait par la voie humide.

EXPÉRIENCE

E X P É R I E N C E XXVIII.

Avec le nitrate de potasse il n'offre point de différence.

E X P É R I E N C E XXIX.

Les acides lui font éprouver les mêmes altérations que celui auquel nous le comparons.

E X P É R I E N C E XXX.

L'oxide blanc d'antimoine par le nitrate de potasse bien lavé, fondu avec autant de soufre, fournit un kermès parfaitement semblable aux précédents, si l'on n'a employé dans cette dernière opération que la chaleur suffisante pour ramollir la masse.

C O R O L L A I R E.

La plupart des métaux, dit Bergman, s'unissent au soufre dans un état très-voisin de la métallicité parfaite; c'est ce qui fait douter à quelques personnes qu'étant plus oxydés, ces substances fussent encore susceptibles de contracter la même union; mais M. Monnet a fait des expériences dont plusieurs ont levé tout doute à cet égard. L'antimoine dans son état presque métallique avec le soufre forme ce que l'on appelle le sulfure d'antimoine, sur lequel l'acide muriatique agit plus facilement que sur l'antimoine isolé, ce qui indique qu'il contient déjà un peu d'oxygène. Le verre d'antimoine (oxide d'antimoine sulfuré vitreux) est formé d'oxide d'antimoine & de soufre; le soufre doré, le kermès & le safran des métaux sont aussi des combinaisons de soufre & d'oxide d'antimoine; mais qui diffèrent non-seulement par la quantité d'oxygène, mais encore par celle du soufre; & c'est sur-tout le dernier qui fait varier leur couleur. Celles de ces préparations, qui en contiennent beaucoup, ont une belle couleur, & celles où ce corps est plus abondant ont une couleur brune, roussâtre. Bergman croit, avec raison sans doute, que c'est de la quantité plus ou moins grande d'oxygène que dépend l'action variée de ces préparations sur l'économie animale, & il dit à l'appui de cette assertion, que l'antimoine exempt d'oxygène a à peine une vertu sensible en médecine, que le sulfure d'antimoine est simplement diaphorétique & diurétique, que le kermès agit plus lentement que le soufre doré, & le safran des métaux & l'oxide sulfuré vitreux, & que l'oxide blanc qui est très-chargé de ce principe est tout-à-fait inerte. « Ceci nous fait voir, ajoute-t-il, que l'antimoine est innocent tant qu'il est pur, » que la moindre addition d'oxygène le rend actif, » que quand cette quantité augmente beaucoup

Chimie, Tome II.

» il devient un purgatif violent, ou émétique, » & que quand enfin il est entièrement saturé » de ce principe, il devient de nouveau passif » relativement aux organes des animaux ». Le soufre, comme on le fait, est un remède qui n'a pas d'effets violents : est-il combiné avec l'oxide d'antimoine, il en augmente la vertu; mais ce n'est pas seulement par la combinaison qu'il produit cet effet, c'est sur-tout en partageant l'oxygène que l'antimoine contient; & l'oxide blanc d'antimoine & le soufre donnent un verre émétique, quoique l'un & l'autre séparément ne le fussent pas. « Personne n'ignore, continue l'auteur, que toutes les préparations que nous » venons d'indiquer ne contiennent du soufre »; mais quelques chimistes ont pensé que d'entretelles, (le kermès) contenoit aussi de l'alcali, ce qui à la vérité arrive souvent; mais cette substance est-elle un principe nécessaire? c'est ce que Bergman croit être en droit de nier, & le kermès formé dans l'expérience VII par l'acide muriatique, est un argument bien fort pour son sentiment. Que l'on n'objecte pas à cette assertion la formation du gaz hydrogène sulfuré qui a lieu avec les acides & le kermès, puisque nous avons vu que l'oxide d'antimoine pur combiné par la fusion avec le soufre a offert le même phénomène; il suffit pour cela qu'il y ait entre ces deux substances une combinaison intime; c'est sans doute cette expérience qui aura induit les chimistes en erreur.

La formation du gaz hydrogène sulfuré n'exige point la présence d'un sulfure alcalin quelconque; il suffit qu'il y ait ensemble du soufre, de l'eau & une substance dont l'attraction pour l'acide sulfurique soit plus grande que pour le soufre, & il arrivera ce qui arrive à tout sulfure qui a le contact du calorique & de l'eau, ou de l'eau & d'un acide, excepté cependant l'acide nitrique. Dans l'un & l'autre cas, l'oxygène de l'eau se porte souvent en même-temps sur le métal & sur une portion du soufre; mais l'hydrogène dont la séparation a lieu en même-temps, s'empare d'une autre portion du soufre, absorbe du calorique, & prend la forme d'un fluide élastique.

Une autre question que Bergman se propose, c'est de savoir si l'antimoine demande différentes doses de soufre pour être saturé, suivant qu'il est plus ou moins chargé d'oxygène.

Il interroge les expériences, & il n'offre pour réponse que leurs résultats simples. Un quintal de sulfure d'antimoine contient 74 livres de métal, (expér. VIII) le kermès préparé suivant l'apharmacopée de Stockholm en contient 52 livres, (expér. XXX) & le soufre doré 25 livres. (expér. XXIV & XXV) Il suit naturellement de ces faits que le soufre est exprimé relativement par 26, 48 & 75 livres; car le nombre qui dans le premier cas, indique la quantité de métal, détermine dans celui-ci celle du soufre, & que plus l'antimoine

Rr

est oxydé, & plus il lui faut de soufre pour être saturé.

D'après ces données Bergman essaie de trouver la cause pour laquelle certains médicaments antimonialaux ont plus d'énergie que d'autres, qui semblent au premier coup-d'œil n'en différer que très-légèrement. Si l'on précipite, dit-il, à plusieurs reprises une dissolution métallique par le même précipitant, les molécules séparées les premières seront très-énergiques, ensuite un peu moins fortes & enfin d'autant plus inertes que le nombre des précipitations sera plus grand. Ce sont sans doute des phénomènes dignes d'admiration, cependant ils ont leurs analogues. En effet, pour que les métaux s'unissent aux acides il faut nécessairement qu'ils absorbent une portion d'oxygène; mais si la proportion de ce principe excède certaines limites, l'attraction du métal pour les acides diminue & finit même quelquefois par se détruire entièrement. Alors les molécules métalliques se précipitent; & c'est ce qu'on remarque sur-tout pour l'étain, l'antimoine & le fer. On fait qu'une dissolution de sulfate de fer très-limpide exposée à l'air libre, laisse déposer spontanément à la longue des molécules de fer à qui l'air a fourni une portion d'oxygène de plus.

De même si l'on verse une dissolution de potasse dans une dissolution qui a été ainsi exposée à l'air, & dont quelques-unes des molécules soient encore dans leur état primitif, les autres plus chargées d'oxygène qu'il est nécessaire pour que l'attraction entre elles & l'acide soit la plus forte possible, on verra d'abord celles-ci se précipiter avec la couleur de l'ochre, & ensuite sous une couleur verte celles qui sont moins chargées d'oxygène. La dissolution de l'antimoine dans le sulfure de potasse, dit l'auteur, paroît se comporter comme celle de fer dans l'acide sulfurique; les portions les plus oxydées se précipitent les premières & ainsi de suite; mais l'oxydation poussée jusqu'à un certain point augmente, comme nous avons dit, la vertu de ces précipités; donc les précipités sont d'autant plus doux qu'ils ont lieu plus tard.

Une lessive caustique bouillante tenant en dissolution tout le soufre doré qu'elle est susceptible de dissoudre à ce degré de chaleur, en abandonne une certaine quantité en refroidissant; d'après les principes que nous avons établis plus haut, dit l'auteur, la portion du soufre doré qui se précipite spontanément doit être plus douce que celle qui reste en dissolution dans la liqueur refroidie.

Il est aisé de voir ici dans Bergman une opposition de principes, entre cette conclusion exacte & ce qui précède, en effet, il pose d'abord pour principe que celles des molécules métalliques dissoutes dans un acide qui sont le plus oxydées se séparent les premières. Il dit ensuite que cette

oxydation augmente leur vertu, & cependant il conclut que la portion du soufre doré qui se précipite la première est la plus douce; elle devroit, au contraire, être la plus active, si c'est en raison d'un excès d'oxygène qu'elle se précipite la première; je ne serois pas éloigné de croire qu'il y eût là une faute d'impression, car la contradiction est trop marquée pour être de Bergman.

Les effets violents que produisent ces préparations étant dues à la présence de l'oxygène, se trouvent en partie adoucis par une plus grande quantité de soufre qui partage leur oxygène & le divise entre une plus grande quantité de molécules, d'où il résulte que leur véritable efficacité gir dans le terme moyen entre l'état métallique & celui de l'oxydation parfaite.

Bergman finit cette dissertation par donner quelques préceptes sur la manière de préparer le verre d'antimoine, le kermès. Un procédé très-facile pour faire le verre d'antimoine est de fondre ensemble l'oxide blanc de ce métal par le nitrate & le soufre comme dans l'expérience IX. Par ce moyen on s'épargne l'ennui d'une longue oxydation, & on a l'avantage d'avoir un oxide sulfuré vitreux, toujours semblable à lui-même, & dont l'usage en médecine est beaucoup plus sûr que celui du commerce.

Le carbonate de potasse n'a point d'action à froid sur le soufre; mais lorsqu'il bout sur du sulfure d'antimoine, il devient en quelque sorte caustique, & l'attaque. La chaleur de l'ébullition de l'eau n'est pas capable de séparer l'acide carbonique de la potasse, mais la présence du soufre pour lequel cet alcali a beaucoup d'attraction, favorise cette séparation; l'action de la potasse dans cet état, sur le sulfure d'antimoine, est à la vérité beaucoup plus lente.

Le procédé que Bergman a donné pour faire le kermès (expérience XXVI), lui semble de beaucoup préférable à celui par la voie humide, tant à cause de la moindre dépense, que du temps moins long & du travail moins pénible.

Il ne nous reste plus, pour compléter l'histoire chimique de l'antimoine, qu'à parler de l'espèce de sel antimoné si souvent & si heureusement employé en médecine, sous le nom impropre de *tartre stibié* ou *tartre émétique*. Il a paru plus convenable de n'en traiter qu'à la fin de cet article, parce que pour bien concevoir ses propriétés, il est indispensable de bien connoître la nature des différentes substances antimonialles, & sur-tout des divers sulfures antimonialaux que l'on emploie pour les combiner avec l'acidule tartareux.

La combinaison d'acidule tartareux & d'oxide d'antimoine porte le nom de tartre stibié ou antimoné. C'est du tartre d'antimoine & de potasse. Comme c'est un des remèdes les plus importants que la chimie ait fourni à la médecine, il faut en examiner avec soin la préparation & les pro-

piétés. Depuis Adrien de Mynsicht, qui, le premier l'a fait connoître en 1631, on a beaucoup varié sur la manière de le préparer. Les pharmacopées & les ouvrages des chimistes diffèrent tous, soit sur les substances antimonioïales qu'on doit employer pour cette préparation, soit sur leur quantité, ainsi que sur celle de l'eau & de l'acide tartareux, soit enfin sur la manière de la faire. On a successivement conseillé les oxides blancs sublimes & vitreux transparent ou opaque; les uns ont prescrit de faire bouillir ces substances avec l'acide tartareux, & une plus ou moins grande quantité d'eau, pendant dix à douze heures; d'autres ne demandent qu'une ébullition d'une demi-heure; enfin il est des auteurs qui veulent qu'on évapore la lessive filtrée à siccité, & il en est d'autres qui exigent qu'on la fasse cristalliser & qu'on n'emploie que les cristaux. Il arrive de ces différentes préparations, que le tartre d'antimoine n'est jamais le même, & qu'il jouit de divers degrés d'énergie, de sorte qu'on ne peut jamais être sûr de ses effets. Aussi Geoffroy, qui a examiné plusieurs *cortex stibii* de différents degrés de force, a-t-il prouvé par l'analyse que les plus foibles contiennent par once depuis 30 grains jusqu'à 1 gros 18 grains d'oxide d'antimoine; ceux d'une émétiécité moyenne, 1 gros & demi, & les plus actifs jusqu'à 2 gros 10 grains. L'oxide d'antimoine sulfuré vitreux a été choisi préférentiellement aux autres substances antimonioïales, parce qu'il est un des plus solubles par l'acide de tartre; ce verre métallique peut contenir l'antimoine plus ou moins oxidé, & ces degrés divers d'oxidation doivent nécessairement influer sur son émétiécité; cependant en prenant un oxide vitreux d'antimoine bien transparent porphyrisé, en le faisant bouillir dans l'eau avec partie égale d'acide tartareux, jusqu'à ce que le dernier soit saturé, filtrant & faisant évaporer à une chaleur douce cette dissolution, on obtient par le repos & le refroidissement des cristaux de tartre antimonial, dont les degrés d'émétiécité paroissent être assez constants. On décante la liqueur, on la fait évaporer, & elle fournit par plusieurs évaporations successives de nouveaux cristaux. L'eau-mère contient du tartre antimonial, du soufre, & une certaine quantité de sulfure alcalin antimonial. Lorsqu'on filtre le mélange d'acide tartareux, d'oxide vitreux d'antimoine & d'eau qu'on a fait bouillir pour la préparation du tartre antimonial, il reste sur le filtre une matière comme gélatineuse, jaune ou brune, que Rouelle a fait connoître, & qui paroît être du tartre d'antimoine: cette gelée distillée donne un pyrophore très-inflammable, suivant M. Proust.

Macquer a proposé de substituer à l'oxide sulfuré vitreux d'antimoine, l'oxide blanc précipité du muriate d'antimoine par l'eau; cet oxide est un émetique violent que Macquer croyoit être toujours le même. Bergman a adopté l'opinion

de Macquer, & on prépare depuis, dans le laboratoire de l'académie de Dijon, un tartre d'antimoine suivant la méthode de ce chimiste & celle de Laffone. Ce médicament a été employé avec le plus grand succès; il opère à la dose de 3 grains sans fatiguer l'estomac ni les intestins.

Le tartre d'antimoine se cristallise en pyramides trièdres transparentes; il se décompose au feu & devient charbonneux; il est efflorescent à l'air, & devient d'un blanc mat & farineux; il se dissout dans 60 parties d'eau froide, & dans beaucoup moins d'eau bouillante; il se cristallise par refroidissement; les alcalis & la chaux le décomposent. La terre calcaire & l'eau pure en grande dose sont susceptibles de le décomposer, d'où il suit qu'on ne doit l'administrer que dans l'eau distillée. Les sulfures alcalins & le gaz hydrogène sulfuré le précipitent en une poudre rouge ou espèce d'antimoine sulfuré, & peuvent servir à faire reconnoître ce sel dans toutes les liqueurs où il se trouve. Le fer s'empare de l'acide tartareux, & sépare l'oxide d'antimoine; on ne doit donc pas préparer le tartre stibié dans des vaisseaux de ce métal. M. Durande, médecin & professeur de Dijon, a proposé de faire préparer ce médicament publiquement, & par un procédé uniforme, comme on a coutume de faire pour la thériaque. Cette disposition ne pourroit qu'être fort utile en procurant un tartre d'antimoine uniforme, & sur les effets duquel le médecin pourroit toujours compter. Il paroît que le tartre d'antimoine contient la portion de tartre de potasse qui fait partie de l'acide tartareux, & que c'est une sorte de sel triple. Tel est le précis des principaux faits sur la combinaison de l'acide tartareux avec l'oxide d'antimoine, que j'avois consignés dans mes éléments de chimie; mais cette importante combinaison exige d'autres détails pour être connue à fond dans un ouvrage destiné à présenter l'ensemble des connoissances acquises dans la science. Je crois donc devoir ajouter ici un extrait détaillé des recherches de Bergman sur le tartre de potasse antimonial, & une notice des expériences faites par MM. Vauquelin & L'grand sur ce sel trop peu connu en raison de ses importants usages.

Les remèdes héroïques, dit Bergman, doivent être constamment les mêmes, pour ne compromettre ni la médecine ni le médecin. Cela est extrêmement vrai, sur-tout par rapport aux antimonioïaux. On préfère les préparations salines de l'antimoine pour avoir des remèdes doués toujours de la même force; rien n'est cependant plus différent que les diverses formules décrites dans les différens dispensaires pour la préparation du tartre d'antimoine & de potasse: si presque tous préfèrent le tartre ou la crème de tartre, les pharmacopées d'Ausbourg, (1734) d'Utrecht (1749), de Wurttemberg (1750), d'Edimbourg

Rr 2

(1756), indiquent le safran des métaux ; celles de l'huile (1758), & de Londres (1758) y ajoutent le verre d'antimoine, que celles de Stockholm (1686) & de Ratisbonne (1727) prescrivent seul. Celle de Paris (1738) conseille le verre & le foie d'antimoine à parties égales ; celle de Bath (1688), les fleurs d'antimoine. Le plus grand nombre de pharmacopées prescrivoient parties égales de crème de tartre & de matière antimoniale ; celles d'Edimbourg & de Paris exigent le double de tartre. Ces ouvrages diffèrent encore par la quantité d'eau & par le temps de l'ébullition. A Londres on prescrit une ébullition d'une demi-heure ; à Paris on en veut une de douze heures ; enfin suivant les uns il faut faire cristalliser la décoction, suivant les autres on doit l'évaporer à siccité.

Au lieu de toutes ces variétés de procédés, il seroit utile d'en fixer un qui donnât toujours la même tartre d'antimoine ; & pour cela il faut faire un choix exact de la base & du dissolvant. On doit rechercher si les matières antimoniques qu'on prend ordinairement pour faire cette préparation, sont constamment les mêmes par la manière dont on les prépare elles-mêmes. Le foie d'antimoine préparé avec le nitre varie suivant une foule de circonstances, telles que la proportion & le mélange plus ou moins régulier de ce sel, la chaleur qu'on donne, la manière dont on opère la détonation, soit en projetant les matières dans un creuset rouge, soit en les allumant dans un vaisseau froid avec un charbon embrasé ; le foie d'antimoine doit donc être rejeté comme variable. Il en est de même, & par la même cause, du safran des métaux. Le verre d'antimoine n'est pas plus constant dans sa nature, puisqu'on prend pour le faire un sulfure d'antimoine plus ou moins brûlé, & contenant plus ou moins de soufre. Les meilleurs auteurs sont à cet égard parfaitement d'accord avec Bergman, & sur-tout Macquer, Poulletier de la Salle. L'antimoine même, quand il seroit facilement attaqué par le tartre, ne devroit pas être choisi, puisqu'on n'est jamais sûr de sa parfaite identité dans toutes les boutiques : la poudre d'*Algaroth* ou l'oxide d'antimoine précipité par l'eau du muriate d'antimoine sublimé, paroît à Bergman remplir toutes les conditions qu'on desire pour la préparation du tartre d'antimoine ; elle est toujours la même, parce que l'antimoine combiné avec l'acide muriatique, est toujours dans le même état d'oxidation ; à la vérité elle contient un peu d'acide muriatique, mais on l'en débarrasse par une lessive alcaline.

Le choix des matières antimoniques ainsi fixé sur la poudre d'*Algaroth*, Bergman passe à celui du dissolvant ; ce dernier est éclairé par un plus grand nombre d'expériences, parce que Bergman a traité en particulier de la nature des antimoniaux sulfurés dans une dissertation dont on a exposé ci-dessus les résultats les plus importants.

Comme l'action du tartre recommandé par la plupart des dispensaires, sur les oxides d'antimoine, n'est pas encore bien connue, & comme il n'est pas décidé si c'est son acide surabondant qui dissout ces oxides, ou si toutes les parties de cet acide contribuent à leur dissolution, Bergman examine cette action, soit de la part de l'acide tartareux pur, soit du tartre de potasse qui uni à une portion de cet acide constitue l'acide tartareux, soit l'acide tartareux lui-même. Une partie d'antimoine préparé suivant le procédé de la pharmacopée de Londres, ayant bouilli pendant 20 minutes avec 25 parties d'acide tartareux pur obtenu par le procédé de M. Retzius, a donné de petits groupes de cristaux qui se sont comportés au chalumeau comme ceux de l'acide tartareux pur, & sans donner de vapeurs antimoniales ; ainsi cet acide ne dissout point & n'attaque point l'antimoine. Il en a été de même du foie d'antimoine traité avec le même acide & de la même manière. Le safran des métaux tenu en digestion dans 6 parties de cet acide pendant deux heures, a donné des cristaux rayonnés qui, traités au chalumeau, ont jeté quelque fumée d'antimoine. Le verre d'antimoine traité pendant 30 minutes avec 25 parties d'acide tartareux, a fourni des cristaux grenus qui ont donné au chalumeau & une fumée très-forte d'antimoine, & quelques globules d'antimoine ; une partie qui étoit sous forme de gomme, a présenté les mêmes phénomènes. Une partie d'antimoine diaphorétique tenue en digestion avec vingt-cinq parties d'acide pendant trente minutes, a donné un sel blanc qui a répandu un peu de fumée antimoniale au chalumeau. Une partie de poudre d'*Algaroth* bouillie pendant trente minutes avec neuf parties d'acide tartareux, s'est convertie par le refroidissement en une substance gélatineuse qui, humectée par l'air, présente des ramifications agréables. Exposée au chalumeau, cette gelée se boursouffla beaucoup, & répandit une abondante fumée antimoniale, sans donner de globules métalliques. Dans une autre expérience, une partie de la même poudre fut complètement dissoute par cinq parties d'acide, & à l'aide d'une ébullition d'une heure. Bergman n'a jamais pu parvenir à saturer cet acide d'oxide d'antimoine ; la dissolution étoit toujours acide. Il conclut de toutes ces expériences, que le métal de l'antimoine n'est pas dissoluble par l'acide tartareux ; mais qu'il le devient à mesure qu'il est oxidé, & cependant jusqu'à une certaine limite d'oxidation, puisque l'oxide, par le nitre, est moins dissoluble que l'oxide vitreux qui contient moins d'oxigène.

Bergman examine ensuite l'action du tartre de potasse sur les antimoniaux ; & quoiqu'il fût raisonnable qu'un sel neutre n'agiroit pas sur des oxides métalliques, il prouve cependant qu'il y a une véritable union entre ces substances.

L'antimoine, le *foie d'antimoine*, traités avec huit parties de tartre de potasse, on donne des cristaux qui se sont consumés sans trace d'antimoine. Le *foie des métaux* & l'antimoine diaphorétique traités avec ce sel, à la même dose, a donné au chalumeau des signes équivoques d'antimoine. Le *verre d'antimoine* a donné avec huit parties de tartre de potasse de petites aiguilles qui, sur le chalumeau, ont répandu une fumée abondante d'antimoine. La *poudre d'Algaroth* bouillie dans l'eau avec cinq parties de ce sel pendant vingt minutes, a donné deux genres de cristaux, les uns en tétraèdres, les autres en aiguilles. Les premiers exposés au chalumeau ont offert une grande fumée antimoniale & beaucoup de globules de ce métal : ainsi le tartre de potasse bien saturé, & même avec excès d'alcali, dissout comme l'acide tartareux & dans des proportions correspondantes les divers oxides d'antimoine. Cette découverte de Bergman semble annoncer que ces oxides agissent ici à la manière d'un acide, qu'ils décomposent en partie le tartre de potasse, & qu'ils forment un sel triple à deux espèces d'acides & à une seule base.

Les mêmes matières antimoniales traitées par l'acide tartareux, ont offert les résultats suivants. Deux parties de *foie d'antimoine* bouillies avec une partie de tartre, n'ont formé qu'un sel gommeux insipide. Une partie de *foie des métaux* avec huit parties de cet acide, ont offert le même résultat. Le *verre d'antimoine* exige trois parties de tartre acide de potasse pour être saturé, & donne des cristaux. Trois parties d'antimoine diaphorétique fait avec l'antimoine, mises en digestion avec deux parties de tartre, ont donné quelques cristaux ; mais la plus grande portion a pris la forme gommeuse. Cent parties de poudre d'Algaroth demandent soixante-dix parties de l'acide tartareux pour leur dissolution ; s'il y a plus de tartre, il se forme avec des cristaux une gelée transparente ; une grande quantité d'eau la décompose, & en précipite l'oxide d'antimoine. Les alcalis & le borax facilitent la dissolution des antimoniaux par l'acide tartareux. Trois parties d'une composition formée d'une partie de tartre & d'une demi-partie d'acide boracique, dissolvent une partie de *verre d'antimoine*, & forment une matière gommeuse qui se change en une poudre jaunâtre par la dessiccation. Cette poudre est indiquée comme très-supérieure au tartre d'antimoine & de potasse.

Ces recherches préliminaires conduisent Bergman à prescrire la préparation du tartre d'antimoine & de potasse de la manière suivante. Prenez, dit-il, cinq onces de crème de tartre réduite en poudre, & deux onces deux dragmes de poudre d'Algaroth précipitée par l'eau chaude, lavée & séchée, ajoutez une demi-canne d'eau, & faites bouillir doucement pendant une demi-heure. Après cela, il reste ordinairement

un peu de poudre noire mercurelle. Je ne sature pas absolument le tartre, parce qu'alors une partie de la dissolution se concrétise volontier en gelée, & que le sel qui est formé demeurant long-temps suspendu dans l'eau se dépose plus facilement ; c'est un inconvénient dans la pratique qu'il est bon d'éviter, d'ailleurs le remède étant moins adif, la dose sera plus forte, on pourra le pester plus exactement, & la distribuer en plusieurs prises, sans craindre aucun accident. Après avoir filtré la dissolution, faites-la évaporer jusqu'à pellicule dans un vaisseau de cuivre (on ne doit pas se servir de vaisseaux de métal), tenez-la ensuite à la chaleur de la digestion, pour que les cristaux se forment & se précipitent insensiblement ; vous les dessécherez ensuite sur du papier gris que vous aurez mouillé auparavant. Ces cristaux sont nets & brillants ; ils égalent le poids du tartre que l'on a employé. Les croûtes salines les plus pures qui se sont attachées aux bords des vaisseaux, vont environ à une demi-once ; on les lavera dans l'eau froide, & on les gardera séparément. La dernière lessive rouille & épaisse, doit être jetée.

Bergman termine sa dissertation par examiner les propriétés du tartre d'antimoine & de potasse. Ce sel cristallise en octaèdres, dont les pyramides sont plus allongées que celles de l'alun. M. Morveau observe à cet égard, que le plus souvent il est en cristaux tétraèdres. Ces cristaux contiennent un tiers de leur poids d'antimoine ; ils ne s'effleurissent ni ne s'humectent à l'air, ils décrépitent au chalumeau, exhalent beaucoup de fumée antimoniale, & laissent sur le charbon des grains métalliques. L'eau distillée à quinze degrés en dissout $\frac{1}{10}$, cette dissolution rougit le tournesol ; les alcalis en précipitent un oxide blanc très-divisé, qui s'attache fortement au verre. La première liqueur préparée pour la cristallisation du tartre antimonie se comporte autrement que la dissolution pure de ce sel. Les alcalis caustiques ne séparent l'oxide qu'en poudre. Le précipité fait par les carbonates, offre, au bout de quelques heures, des cristaux rayonnés qui disparaissent, & ne laissent qu'une simple poussière, lorsqu'on chauffe jusqu'à trente degrés la liqueur qui les contient. L'acide sulfurique concentré forme dans la dissolution de tartre d'antimoine & de potasse un précipité blanc abondant, qui disparaît par l'agitation, & qui, au chalumeau, se dissipe en fumée antimoniale. Le sulfure alcalin y forme un précipité orange de *soufre doré d'antimoine*.

À ces détails, Bergman ajoute un procédé pour préparer le tartre de potasse antimonie, ou la combinaison de l'oxide d'antimoine au tartre de potasse neutre, qu'il a trouvé susceptible, comme il a été dit ci-dessus, de dissoudre ces oxides. Faites bouillir, dit-il, dans un vaisseau de verre pendant une demi-heure dix onces de tartre de potasse, & treize onces de poudre d'Algaroth

ou oxide d'antimoine blanc précipité par l'eau du muriate d'antimoine sublimé, avec environ trois livres d'eau ; filtrez, faites évaporer jusqu'à pelli-cule cette dissolution qui est d'une couleur rousse brunâtre ; laissez-là ensuite exposée à la chaleur de la digestion pour qu'elle donne ses cristaux, & vous les dessécherez enfin sur le papier gris humecté. Ces cristaux rassemblés ne font que la moitié du poids du dissolvant ; les croutes salines que l'on peut purifier par le lavage, n'excèdent guère la dixième partie du tartre de potasse employé ; les autres doivent être jetées avec la lessive rousse obscure. Ce sel que Bergman nomme *tartre tartarisé antimonisé*, pour le distinguer du premier qu'il nomme improprement *tartre antimonisé*, puisqu'il contient essentiellement de la potasse, diffère spécialement de ce dernier, en raison de la grande quantité de potasse & de la plus petite portion d'oxide d'antimoine qui le forme : je le désigne par le nom de *tartre de potasse antimonisé*, qui le distingue suffisamment du tartre d'antimoine & de potasse. Bergman lui assigne pour caractère, les propriétés suivantes ; il donne quelquefois des cristaux tétraédres, mais plus souvent des octaédres ; les uns sont transparents & sans couleur, les autres blancs & un peu opaques ; l'oxide d'antimoine en fait le cinquième, tandis qu'il est pour un tiers dans le tartre d'antimoine & de potasse ; l'eau distillée en dissout un quarantième de son poids, tandis qu'elle ne dissout qu'un quatre-vingtième du premier ; les alcalis & l'acide sulfurique le décomposent de même ; mais les précipités qu'ils y forment, sont & moins abondans & plus lentement déposés. La dissolution première de ce sel & son eau mère sont toujours rousses. Bergman a trouvé que cette couleur étoit toujours due à du fer très-oxidé. Cet oxide semble l'embarrasser dans des sels pour la préparation desquels il a pris des matériaux très-purs, & qui paroissent en être exempts ; mais cette difficulté est moins pressante quand on considère le peu de fer qu'il faut pour produire quelques effets dans une liqueur.

Il résulte de toutes les expériences de Bergman, qu'il y a trois sels tartareux antimoniés ; 1°. le tartre d'antimoine fait avec l'acide tartareux pur, qui se prend en gelée au lieu de cristalliser, qui est déliquescent, très-dissoluble, toujours acide, très-émétique, en raison de la grande quantité d'oxide d'antimoine qu'il contient ; il seroit très-utile de bien connoître les propriétés médicales de ce sel, qui, peut-être, sera quelque jour préféré en raison de sa constance, de son identité. 2°. Le tartre d'antimoine & de potasse, qu'on peut regarder comme une espèce de sel triple à deux bases, ou plutôt comme un composé ternaire dont la potasse adhère à l'oxide d'antimoine presque acidifié comme à l'acide tartareux, c'est le *tartre libéré* des boutiques. Bien

préparé il contient moins d'antimoine que le précédent, mais plus que le suivant. 3°. Enfin le tartre de potasse antimonie, plus dissoluble, moins chargé d'antimoine que le dernier, moins émétique ou plus doux, & qui pourroit être employé à sa place, dans les cas où l'on a besoin d'un émétique moins fort. Cette singulière combinaison d'un sel neutre avec l'oxide d'antimoine semble annoncer que cet oxide partage avec l'acide tartareux la potasse, & y adhère comme une espèce d'acide. Les expériences de MM. Vauquelin & Legendre qui suivent, étendront encore cette considération sur le singulier effet de l'oxide d'antimoine dans les diverses combinaisons tartareuses.

En répétant les expériences de Bergman, sur le tartre d'antimoine & de potasse, je les ai trouvées parfaitement d'accord avec son discours, il est donc inutile de les rappeler ; mais comme il est rare, qu'en répétant des expériences, en y portant quelque attention, on n'aperçoive pas quelques phénomènes nouveaux, je vais faire connoître ceux qui se sont présentés pendant le cours de ce travail sur le tartre d'antimoine & de potasse.

1°. L'émétique le mieux cristallisé, & par conséquent le plus pur, rougit constamment les couleurs bleues des végétaux.

2°. L'acide sulfurique le décompose en s'emparant de l'oxide d'antimoine avec lequel il forme un sel peu soluble qui se précipite, & en laissant le tartre acide de potasse libre.

3°. L'acide muriatique le décompose aussi ; mais sans former de précipité dans la dissolution.

4°. Le carbonate de chaux décompose l'émétique ; des dissolutions de ces substances mêlées ensemble ne laissent appercevoir rien de sensible sur-le-champ ; mais au bout de quelques heures, il se forme un nuage blanc fort épais, qui commence à paroître à la partie supérieure de la liqueur ; c'est du tartre de chaux & du carbonate d'antimoine.

5°. L'acétite de plomb le décompose, il se forme du tartre de plomb & de l'acétite d'antimoine & de potasse.

6°. M. Berthollet vient de découvrir que plusieurs substances végétales, & entr'autres le quinquina & la noix de Galles décomposent l'émétique. Sans expériences directes sur la manière dont se font ces décompositions, M. Berthollet a pensé que c'étoit en absorbant une portion de l'oxygène des oxides d'antimoine, que ces infusions végétales décomposent ce sel, & que, par conséquent, l'oxide étoit rapproché de l'état métallique. Pour vérifier cette assertion qui paroît assez bien fondée, j'ai fait quelques expériences que voici. J'ai précipité une dissolution de cent parties d'émétique par la quantité nécessaire d'infusion de quinquina ; il en a fallu quatre onces infusées plus de dix fois de suite. J'ai mis sur le précipité rouge pâle,

obtenue par cette opération, de l'acide muriatique affoibli, & j'ai obtenu tout l'oxide d'antimoine que le précipité contenoit. Le précipité a pris une couleur rouge superbe, & il se ramollissoit dans l'eau comme une résine. Cependant il ne fondoit point seul à sec, il se charbonnoit plutôt.

La dissolution de l'oxide d'antimoine dans l'acide muriatique s'est faite sans mouvement & sans effervescence; ce qui prouve qu'il étoit contenu dans le précipité tel qu'il étoit dans l'émétique même, & qu'il n'a pas changé de nature avec l'extrait de quinquina.

La liqueur qui surmène le précipité dont je viens de parler, est claire comme de l'eau, quand on a fait les proportions exactement; cette dissolution ne contient du quinquina qu'une portion d'extrait muqueux légèrement amère, mêlée au tartre acide de potasse que j'ai obtenu à part & que j'ai reconnu par toutes ses propriétés. Ce n'est donc que par une double attraction que s'opère cette décomposition; savoir, l'oxide d'antimoine pour la matière végétale, & la potasse pour la masse entière de l'acide tartareux.

7^o. Je n'ai point suivi aussi en détail la manière dont se conduit la noix de Galles sur l'émétique, mais je pense qu'elle est la même que celle du quinquina. Je n'ai pas remarqué qu'il se fit des changements entre l'émétique & les infusions de séné, de follicules, de rhubarbe, de chicorée, de cerfeuil, de poire, de bourache, &c. Je n'en ai pas remarqué davantage avec le sulfate de soude, le nitrate de potasse & le sulfate de magnésie. J'ai été curieux d'essayer l'émétique avec toutes ces choses, parce que c'est avec elles qu'on l'administre souvent.

8^o. Bergmann n'ayant point soumis le tartre d'antimoine & de potasse à l'action du feu dans des vases clos, j'ai cru devoir le faire & j'ai obtenu vingt-neuf parties d'acide carbonique en gaz, douze d'une liqueur légèrement acide, une de gaz hydrogène & cinquante-huit de résidu. Les cinquante-huit de résidu étoient composées de seizo du carbonate de potasse, de dix de charbon & de trente-deux d'oxide d'antimoine.

Cent parties d'émétique ordinaire sont donc composées de trente-deux parties d'oxide d'antimoine, de treize de potasse, de quarante-huit d'acide tartareux & de sept d'eau.

Cette subtilité ne nous a point fourni d'huile, & les essais les plus exacts n'ont pu découvrir de traces d'ammoniaque dans le produit liquide de la distillation.

En faisant quelques légères suppositions cette expérience donneroit à-peu-près les proportions de l'acide tartareux, ainsi que la quantité de potasse qu'il demande pour être dans l'état de crème de tartre, mais comme ces proportions ne sont pas encore exactement établies, nous n'en parlons pas en détail, nous dirons seulement que le principe qui y est le plus abondant est le carbone,

que l'oxigène le suit, & que l'hydrogène n'y est qu'en très-petite quantité.

9^o. L'émétique étant un sel triple composé d'acide tartareux, de potasse & d'oxide d'antimoine, j'ai voulu savoir si en mêlant à une dissolution d'oxide d'antimoine dans la potasse une quantité d'acide tartareux capable de saturer cet alcali & l'oxide d'antimoine, on auroit de l'émétique semblable à celui qu'on obtient par la méthode ordinaire.

Voici ce qui arrive dans cette expérience.

1^o. Les liqueurs deviennent laiteuses & il se dépose de l'oxide d'antimoine; mais à l'aide de la chaleur elles s'éclaircissent de nouveau;

2^o. Il se dépose des cristaux de tartre acide de potasse pur & sans mélange d'oxide d'antimoine.

3^o. Il reste dans la liqueur après l'évaporation un véritable émétique, semblable à celui qui est employé ordinairement en médecine.

Ce tartre stibé étoit légèrement acide, il contenoit quelque portion de tartre acide de potasse; aussi lorsque je l'ai essayé par la dissolution de sulfure de chaux, il s'est fait un précipité blanc, ce qui auroit pu faire penser qu'il n'y avoit point d'oxide d'antimoine, mais j'ai découvert qu'en y versant de l'acide muriatique le précipité devenoit d'un jaune orangé superbe, & tel que le donnent ordinairement les dissolutions d'antimoine avec les sulfures ou le gaz hydrogène sulfuré. Comme la dissolution d'oxide d'antimoine dans la potasse provenoit de l'opération par laquelle on oxide l'antimoine au moyen du nitrate de potasse, il restoit dans la dissolution un peu de nitrate de potasse qui a été décomposé par l'acide tartareux, & l'acide nitreux s'est réduit en vapeur. Pour être sûr de cette dissolution d'oxide d'antimoine, j'en ai fait une immédiatement avec de la potasse & des fleurs argentes d'antimoine, c'est-à-dire de l'oxide d'antimoine fait par l'action combinée du calorique & de l'air; j'ai vu qu'une livre de dissolution de potasse donnant 19 degrés, a dissout 20 grains de cet oxide après une demi-heure d'ébullition. J'ai mis dans cette dissolution peu-à-peu de l'acide tartareux pur, dans le premier instant il ne s'est rien produit; une portion d'acide tartareux de plus a troublé la dissolution par un nuage blanc qui s'est diffusé à l'aide de la chaleur de l'ébullition. Cette combinaison a donné par l'évaporation des cristaux très-petits, d'une faveur acide, à-peu-près analogue à ceux de la crème de tartre, qui contenoient un peu d'oxide d'antimoine, qui ne se dissolvoient que peu dans l'eau simple & froide, mais qui se dissolvoient abondamment dans cette même alcalisée; la dernière portion de cristaux obtenus par l'évaporation donnoit moins de cristaux & contenoit plus d'oxide d'antimoine, mais n'en contenoit cependant pas autant que l'émétique. Si j'avois mis moins d'acide il auroit été possible que la potasse seulement se fût unie à l'acide tartareux, & j'aurois

obtenus du tartre de potasse dans la liqueur & de l'oxide d'antimoine à part; mais pour cela il n'auroit pas fallu chauffer, car alors le tartre de potasse auroit dissous l'oxide d'antimoine & formé un éauque particulier, & tel qu'on le prépare dans certains pays. Il en auroit différencié seulement par la petite quantité d'oxide d'antimoine. Il m'eût été possible aussi de ne produire aucun précipité dans la liqueur en n'ajoutant pas assez d'acide tartareux pour saturer toute la potasse, il y auroit eu alors dans la liqueur du tartre de potasse & de l'antimoniate de potasse. C'est en effet ce qui m'est arrivé plusieurs fois.

En traitant l'oxide blanc d'antimoine par les alcalis, j'ai remarqué que leur combinaison étoit d'autant plus rapide que ces derniers étoient plus concentrés & plus parfaitement dépouillés d'acide carbonique, & que quand ils en étoient entièrement saturés il n'y avoit alors aucune action entrecroisée. L'alcali volatil ou ammoniacal dissout aussi cet oxide, mais d'une manière moins marquée que la potasse & la soude; peut-être cela vient-il de ce qu'on ne peut pas donner au mélange le même degré de chaleur sans opérer la volatilisation de l'alcali. Quand on met quelques gouttes de dissolution de sulfure calcareux dans une dissolution d'oxide d'antimoine par la potasse, il se fait un précipité blanc en raison sans doute d'une portion d'acide carbonique que la potasse a conservée malgré l'ébullition, & ce seul moyen ne rend pas l'antimoine sensible; mais si l'on y ajoute de l'acide muriatique, il se forme sur-le-champ un précipité jaune orangé.

Le sulfure de potasse n'occasionne non plus qu'un léger précipité blanc, & quelquefois point du tout dans la dissolution d'oxide d'antimoine par la potasse; si on y ajoute de l'acide muriatique il se fait un précipité jaune comme le soufre doré d'antimoine.

10°. Bergman avoir observé que l'acide tartareux pur donnoit avec les oxides d'antimoine des sels qui étoient très-différens de ceux qu'on obtenoit avec le tartre acide de potasse; & cela devoit être, puisque il y a un principe de moins. Il a suivi ces essais sur l'oxide d'antimoine dans tous les états d'oxidation connus, ainsi que dans quelques-uns de ses combinaisons avec le soufre, & il a observé quelques différences, comme on l'a vu plus haut. Je n'ai pas beaucoup multiplié les expériences sur les préparations antimoniales par l'acide tartareux pur, je n'ai employé que l'oxide d'antimoine forme par le nitrate de potasse & l'oxide d'antimoine sulfuré vitreux. J'ai remarqué, 1°. que l'acide tartareux ne perd jamais entièrement son acidité dans ces opérations, quelle que soit la quantité d'antimoine & l'espace du temps pendant lequel on le fait bouillir sur ces substances; 2°. que l'oxide d'antimoine sulfuré vitreux est dissous par cet acide infiniment plus promptement que l'oxide d'antimoine préparé par le nitrate de

potasse, qu'il se dissout en plus grande quantité, & que par conséquent il arrive plus près du point de saturation de l'acide tartareux.

En évaporant ces dissolutions d'oxide d'antimoine dans l'acide tartareux pur, j'ai obtenu par le refroidissement de la liqueur, comme l'a annoncé Bergman, une masse blanche gélatineuse & transparente comme du cristal; en continuant de chauffer cette masse elle se dessèche en se boursouflant comme de l'alun que l'on calcine.

Cet émétique ainsi préparé, a une saveur acide assez agréable au commencement & nauséuse au bout d'un certain temps. Il rougit fortement les couleurs bleues végétales. Il attire l'humidité de l'air & se convertit en masse gluante comme du mucilage. Il faut donc le conserver dans des vases fermés. Ce tartre d'antimoine agit à-peu-près de la même manière que l'émétique ordinaire sur les autres substances. Il est décomposé par l'acide sulfurique, par le carbonate de chaux, par les infusions de quinquina & de noix de Galles.

Lorsqu'on y combine en quantité convenable de la potasse, il se forme un sel parfaitement semblable à celui qui est préparé avec le tartre acide de potasse & l'oxide d'antimoine.

Ce tartre d'antimoine paroît avoir les mêmes propriétés sur l'économie animale que l'émétique; j'en ai donné deux grains dans trois verres d'eau à un jeune homme de 15 ans, chez lequel les symptômes de la petite-verole se déclaraient. Il ne vomit point, mais il fut abondamment purgé sans éprouver de nausées ni de tranchées. Trois grains du même émétique administrés à un homme de 40 ans qui avoit l'estomac chargé & qui manquoit d'appétit depuis quelque temps, l'ont fait vomir cinq à six fois, & l'ont évacué par les selles à-peu-près autant de fois sans être fatigué.

Je crois que cet émétique auroit de l'avantage sur l'autre dans les maladies bilieuses & putrides; au reste c'est à l'expérience à prouver cette assertion.

ANTIMOINE CRUD. On désigneoit autrefois par ce nom le sulfure d'antimoine, pour le distinguer d'avec le métal qu'on en retiroit, & qu'on nommoit aussi regule d'antimoine. Cette expression annonce qu'on sentoit déjà l'incertitude & l'incohérence d'une nomenclature qui confondoit beaucoup de substances différentes, ou en éloignoit un grand nombre d'analogues par des dénominations insignifiantes ou barbares. L'épithète de crud qu'on ajoutoit ici étoit destinée à faire sentir que le sulfure d'antimoine n'avoit point éprouvé encore l'action du feu, ou l'espèce de coction nécessaire pour en extraire le métal. Cependant cette mine est fondue dans le feu où on l'extrait de la terre pour la purifier & la séparer de sa gangue. Voyez le mot **ANTIMOINE**.

ANTIMOINE DIAPHORÉTIQUE. La chimie ayant d'abord

d'abord été entre les mains d'un grand nombre de ceux qui l'ont cultivée, l'art seulement de préparer les médicaments; on conçoit que le produit de la plupart de ses opérations devoit être appliqué à la médecine. De là routes les dénominations médicales données aux diverses combinaisons & aux opérations qu'on faisoit. C'est à une pareille origine qu'est due la dénomination d'antimoine diaphorétique; on a cru que l'oxide de ce métal préparé par la dénotation avec le nitre, avoit la propriété d'exciter la transpiration, & on l'a nommé à cause de cela antimoine diaphorétique. Nous le nommons aujourd'hui oxide d'antimoine par le nitre. (*Voyez le mot ANTIMOINE.*)

ANTIMOINE (*Métallurgie.*) Art de traiter le minéral d'antimoine en grand, pour en obtenir le régule, le crocus & le verre.

Les minerais d'antimoine sont assez communs par-tout; il y en a en plusieurs endroits d'Allemagne & en Hongrie; la majeure partie des provinces de France en contiennent, notamment l'Auvergne & le Limosin, où plusieurs mines de ce demi-métal sont en exploitation. Dans la Marche on en exploite aussi. Les minerais d'antimoine se trouvent dans le sein de la terre, soit par couches, soit par filons ou veines, soit enfin par rognons, ainsi que tous les minéraux métalliques. *Voyez le mot FILONS.* Le demi métal dont nous traitons, étant commun & à bon marché, l'exploitation de ses mines ne s'en fait pas toujours avec régularité, & on le fait rarement dans une grande profondeur, qui occasionneroit des frais que le peu de valeur de la matière ne pourroit pas supporter.

Quand le minéral d'antimoine est sorti de sa mine, on le sépare de la gangue ou matrice, aussi exactement qu'il est possible, en le cassant & le triant. Étant réduit en morceaux, il est fondu dans des creusets; il résulte de cette fonte, ce qu'on appelle antimoine crud. Comme cette opération est assez passablement exécutée en Auvergne, nous allons la détailler d'après un mémoire que M. Jars nous a communiqué.

Le fourneau employé à cette fonte est une espèce de réverbère placé en plein air sans toiture; la masse de ce four a environ vingt pieds de longueur sur dix de largeur; deux massifs de maçonnerie d'environ quatre pieds d'épaisseur chacun, & de deux pieds de hauteur, forment les côtés longs du four; entre ces deux massifs est un espace de deux pieds de largeur, qui, de sa partie antérieure va jusqu'au fond: c'est le cendrier. Sur les deux massifs ci-dessus, s'élève un arceau en voûte dont la clef n'est que d'environ trente pouces au-dessus de la grille qui est pour porter le bois, cette grille, qui n'est composée que de cinq barreaux de fer, est de niveau avec les massifs qui servent de tablettes ou aires pour recevoir les pots; ces tablettes ont chacune environ vingt pouces de largeur. Dans la voûte ou arceau dont

nous avons parlé, sont plusieurs trous comme aux fours des fayenciers, qui servent au passage de la flamme. Cette première voûte ainsi faite, on en élève une pareille au-dessus qui forme un second four, mais celle-ci n'a point de trous pour le passage de la flamme, qui ayant passé par les trous de la voûte inférieure, n'a d'autre issue que par une porte qui est au-dessus de celle de la chauffe, qui elle-même n'est séparée d'avec le cendrier, que par la première barre de fer qui forme la grille. Il y a donc trois ouvertures dans la partie antérieure de ce four, savoir le cendrier, le passage du bois & la porte supérieure qui sert à entrer dans le four le plus élevé, pour y ranger les pots & les en sortir, & aussi de passage à la flamme & à la fumée; la partie postérieure de ces deux fourneaux qui ne sont qu'une seule masse, est maçonnée en entier & quelquefois appuyée contre un rocher. Les fours dont nous venons de rendre compte sont assez mal construits, & le supérieur ne chauffe pas aussi bien que l'inférieur: c'est par cette raison que, très-souvent, l'on est obligé de remettre une seconde fois à la fonte les matières qui n'ont pas rendu tout leur antimoine.

Les pots de terre dont on se sert pour l'antimoine, sont de deux différentes grandeurs; les plus grands ont environ un pied de hauteur, quatre pouces de diamètre à leur orifice & autant dans leur fond, qui est percé d'un ou plusieurs trous suivant l'idée des entrepreneurs; le milieu de ces pots est renflé en forme de toupie, dont le plus grand diamètre est de neuf à dix pouces: ces grands pots sont ceux dans lesquels on met le minéral cassé en morceaux pour y être fondu.

Les petits pots qui sont destinés à recevoir l'antimoine à mesure qu'il fond dans les grands, n'ont que sept pouces de hauteur, six pouces d'ouverture & évasés dans le milieu de leur hauteur.

C'est dans l'ouverture de ces petits pots (qu'on nomme boulets vraisemblablement à cause de leur forme) que s'emboîte la partie inférieure des grands pots; chaque boulet, qui sert de récipient, reçoit son grand pot chargé de minéral.

On ajoute quelquefois à cet appareil, un troisième petit pot que l'on place sur le grand, après l'avoir aussi rempli de minéral; le fond de ce petit pot doit être aussi percé, afin que l'antimoine s'écoule dans le grand & de celui-ci dans l'inférieur nommé le boulet. Les entrepreneurs qui dans tous les cas pourroient ajouter le troisième pot, n'en font usage que quand le minéral se trouve, après le triage, encore mêlé de parties pierreuses, afin d'obtenir à-peu-près autant d'antimoine crud, que si le minéral étoit pur.

Les pots préparés ainsi qu'on vient de le dire, sont placés en ordre sur chacune des aires du fourneau, savoir trente de chaque côté de la chauffe disposés en deux rangées de quinze chacune, ce qui fait soixante qui occupent le four inférieur; on

en place le même nombre dans le supérieur, en observant qu'ils ne bouchent pas les trous de la voûte, ce qui empêcherait le passage de la flamme & retarderait la fusion du minéral. Il entre dans chacun des pots environ 45 livres de minéral, ce qui fait pour les 120 placis dans les deux fours, environ cinquante-quatre quintaux pour chaque fonte, dont on obtient communément la moitié en antimoine crud.

Les pots étant rangés dans les fours, on fait le feu dans la chauffe, communément avec des pièces de bois de pin refendu d'environ dix pieds de longueur; elles se placent sur les cinq barres de fer qui forment la grille & qui séparent la chauffe d'avec le cendrier. On a grand soin de donner un feu très-doux pendant les deux ou trois premières heures, on l'augmente ensuite en ajoutant du bois dans la chauffe, & l'on conserve le même degré de chaleur pendant huit heures, après quoi on cesse de faire du feu. Cette fonte exige donc dix à onze heures d'un feu suivi.

Le fourneau étant refroidi, l'on en sort les pots, on casse ceux que nous avons nommés boulets, afin d'en avoir l'antimoine crud qui en a pris la forme. Comme il arrive quelquefois que l'antimoine s'y attache, & qu'il en reste d'adhérent à leurs parois, on est dans l'usage d'ajouter les morceaux qui en contiennent avec le minéral de la fonte suivante.

On ne trouve plus dans les grands pots qui contiennent le minéral, qu'une matière blanchâtre & spongieuse, ces pots peuvent servir à plusieurs fontes.

L'antimoine crud, résultant du procédé que nous venons de décrire, est, comme tous les antimoines de cette espèce, en lames friables, & il contient beaucoup de soufre. Les entrepreneurs des mines de l'Auvergne, le vendent en cet état à ceux qui font ce commerce; ils en livrent beaucoup à Clermont, capitale de cette province, où il est réduit en règle, par deux procédés que nous allons décrire; savoir la calcination, à l'effet de lui enlever une partie de son soufre, & ensuite par la fonte.)

Le fourneau servant à la calcination de l'antimoine cru, est un réverbère à deux chaufes, il a huit pieds de longueur ou profondeur & cinq de largeur dans œuvre; il est divisé en trois parties sur cette dernière dimension, savoir une aire où l'on met l'antimoine, qui occupe le milieu du fourneau dans toute sa longueur, & en deux chaufes pratiquées aux deux côtés latéraux du four & divisées de l'aire du milieu, par deux petites murs de cinq pouces d'épaisseur chacun & qui s'élèvent d'environ huit pouces au-dessus de l'aire du milieu ainsi que du sol des chaufes qui est au même niveau, le tout bien pavé en briques; les petits murs de séparation ci-dessus sont construits en briques placées de champ, qui pour leur solidité

prennent liaison dans deux rainures ménagées dans deux pierres de taille qui sont à chacune des extrémités du fourneau & qui sont scellées dans la maçonnerie, enfin ces petits murs sont soutenus de chaque côté par une bande de fer fixée à chacune de ses extrémités, aux mêmes pierres de taille.

L'aire du milieu de ce fourneau a trente pouces de largeur, & chacune des deux chaufes a dix pouces, ce qui, avec les dix pouces des deux petits murs de séparation, fait en totalité cinq pieds de largeur, ainsi que nous l'avons dit. Une voûte en briques, qui en-dessous de sa clef n'est élevée au-dessus de l'aire que de deux pieds, couvre toutes les parties que nous venons de détailler. Au-devant de ce fourneau, sont trois ouvertures ou portes; celle du milieu qui sert à y introduire l'antimoine, a vingt-deux pouces de largeur & seize de hauteur dans le milieu de son arc: de chaque côté de cette principale porte, en est une autre dont la largeur est égale à celle de la chauffe à laquelle elle répond, & d'environ un pied de hauteur; ces petites portes servent au passage du bois dans les chaufes; la partie inférieure de la principale porte est couverte d'une plaque de fer coulé qui avance un peu dans l'intérieur du fourneau & qui se joint au pavé en briques de son aire ou sol, ce qui vaut mieux que des briques, qui seraient sujettes à se déranter. Au-devant de ce fourneau est une cheminée qui reçoit les vapeurs sulfureuses de l'antimoine durant sa calcination, & qui en sortant par la porte du milieu, sont conduites au-dessus du toit du bâtiment qui couvre ce fourneau.

Grille ou calcination de l'antimoine crud.

L'antimoine crud se grille dans le fourneau dont on vient de donner la description; mais avant que de le soumettre à cette opération, on le pile grossièrement dans un grand mortier de pierre, puis on en met 120 ou au plus 130 livres sur l'aire du fourneau que l'on y étend uniment, alors on met du petit bois refendu dans les deux chaufes, on y met le feu. Comme dans cette opération on n'a besoin que d'une chaleur suffisante pour faire évaporer les parties sulfureuses de l'antimoine sans le faire entrer en fusion, on a le plus grand soin de donner le degré de chaleur convenable & de manière que la matière ne se mette point en grumeaux; afin d'accélérer la dissipation des substances volatiles, un ouvrier la remue sans cesse à l'aide d'un rabot de fer dont le manche de même métal, est assez long pour aller jusqu'au fond du fourneau. Mais afin de rendre cette manipulation plus aisée à l'ouvrier, on a placé au-dessus d'une chaîne de fer placée au-devant de la bouche dudit fourneau. Cette calcination n'est finie que quand il ne sort plus de fumée: ce terme n'arrive qu'après 12 à 15 heures de feu & d'agitation continue de la matière qu'on sort alors du four-

nesu pour y en substituer d'autre, à laquelle on fait subir la même calcination : ainsi de suite. Les 220 ou 230 livres d'antimoine crud, soumis au grillage, ne rendent, après les deux fontes que nous allons détailler que 95 à 100 livres de régule, ce qui fait que dans ces trois opérations du grillage & de fonte, l'antimoine crud perd plus de la moitié de son poids, déchet qui vient de la grande quantité de soufre que ce demi-métal contenoit avant sa calcination.

ANTIMOINE, RÉGULE D'ANTIMOINE. (Métall.)
Avant que de donner le détail du procédé par lequel on obtient ce régule, il convient de faire connoître le fourneau employé à cet objet ; c'est une espèce de fourneau à vent placé contre l'un des murs de la fonderie ; son intérieur forme un parallélogramme de dix pieds de longueur & d'un pied de largeur, sa profondeur ou hauteur totale est de vingt pouces ; à environ cinq pouces au-dessus de son fond, qui est au niveau de l'aire de la fonderie, sont placés transversalement les barreaux de fer qui forment la grille qui reçoit les creusets où s'opère la fonte ; cette grille se trouve donc de quinze pouces plus bas que la partie supérieure des quatre murs qui sont le pourtour de ce fourneau ; la partie inférieure de la grille forme le cendrier dont le foyouil est de la même longueur. Ce fourneau est placé sous le manteau d'une grande cheminée.

C'est dans ce fourneau, exécuté à Clermont, que se placent dix creusets pour chaque fonte de dix pouces de haut & huit de diamètre ; on pèse 6 à 7 livres de l'antimoine grillé comme nous l'avons rapporté ci dessus, on le réduit en poudre, on y ajoute 3 livres de tarre, & après avoir bien mêlé le tout, on met ce mélange dans l'un des creusets, on en fait autant pour les autres, alors l'on place ces dix creusets, à distance égale, sur la grille ; on les couvre tous de leurs couvercles, sans les entrer, afin que l'air puisse y passer librement ; ces couvercles n'ont pour objet que d'empêcher les charbons, dont on entoure les creusets jusqu'à leur partie supérieure, de tomber dedans ; on allume ces charbons, & l'on y en ajoute à mesure de leur consommation. Afin que la matière s'épure mieux, on l'agite plusieurs fois lorsqu'elle est en fusion. Après deux heures & demie d'un feu égal, l'opération est finie. Alors le fondeur sort successivement les creusets du fourneau, & il en verse la matière fondue dans des moules ronds de fer coulé, d'environ six pouces de diamètre, dont le régule d'antimoine prend la forme. Ces culors étant refroidis, on les retire des moules & on en sépare les scories qui sont à la surface d'environ deux lignes d'épaisseur ; leur couleur est jaunâtre.

Dans cette première fonte l'antimoine éprouve un déchet d'environ le tiers de son poids ; en cet

état il est encore imparfait, & l'on est obligé de le refondre pour l'avoir bien pur.

Cette seconde fonte a lieu dans le même fourneau & dans de semblables creusets, mais après l'avoir cassé en morceaux, & en le mêlant simplement avec les scories de la première fonte, la proportion est de onze à douze livres d'antimoine & trois livres de ces scories par chaque creuset, dont on obtient environ dix livres de véritable régule tel qu'il se vend dans le commerce. On procède comme dans la première fonte, & on coule la matière dans les mêmes moules. Les nouvelles scories qui en proviennent sont enfuire fondues seules, & ne donnent qu'un régule imparfait & en petite quantité.

ANTIMOINE, VERRE D'ANTIMOINE. Le procédé que l'on suit pour obtenir le verre d'antimoine diffère de celui du régule, en ce qu'on n'y emploie que du minerai tel qu'il est extrait de la mine, bien trié & le plus pur, & non de celui qui a déjà été fondu ; ce minerai après avoir été grillé ou calciné de la même manière que l'antimoine crud est fondu sans aucun mélange dans les mêmes creusets ; le degré de chaleur que doit éprouver la matière, est le point important de ce procédé. Lorsque l'ouvrier juge qu'elle est dans sa parfaite fusion & au point désiré, il se saisit d'une cuiller, dont le manche est recourbé, puisse cette matière dans les creusets & la verse dans des espèces de casseroles de cuivre, où elle s'étend : c'est le verre d'antimoine de couleur jaune & transparent.

Le crocus & le verre d'antimoine ayant peu de consommation, on n'en fabrique que par commission.

L'antimoine crud se vend par les entrepreneurs des mines douze, quinze jusqu'à dix-huit livres le quintal ; le régule, à la fabrique de Clermont, communément quatre-vingt livres aussi le quintal ; le verre soixante-cinq livres, & le crocus moins en proportion.

Vocabulaire de l'art de fondre le minerai d'antimoine.

Antimoine, demi-métal, traitement de ses minerais.

Boulet, nom qu'on donne à une espèce de pot de terre pour la fonte du minerai d'antimoine.

Crocus d'antimoine, résultat de la fonte de parties égales d'antimoine crud & de celui qui a été calciné.

Fourneau de calcination de l'antimoine crud.

Fourneau à fondre l'antimoine en régule.

Fourneau de réverbère pour fournir le minerai d'antimoine.

Grillage de l'antimoine, c'est calciner l'antimoine crud pour en dissiper une partie du soufre.

Régule d'antimoine, est de l'antimoine débar-

raffé de son soufre par le grillage & fondu ensuite avec du flux.

Verre d'antimoine, est le résultat de la fonte du minerai d'antimoine après avoir été bien calciné.

ANTIMOINE, CROCUS D'ANTIMOINE. (Métall.) On obtient ce crocus en mêlant parties égales d'antimoine crud & de celui qui a été calciné, d'où il résulte une matière de couleur brune & plombée, que l'on coule dans les mêmes moules après avoir fondu ce mélange dans des creusets placés dans le fourneau servant à la fonte du régule d'antimoine.

ANTIMONIATES. C'est le nom que l'on pourroit donner, suivant les principes de la nomenclature chimique moderne, aux combinaisons de l'oxide d'antimoine avec les bases terreuses, métalliques ou alcalines auxquelles il paroît susceptible de s'unir, & dans lesquelles il paroît, lorsqu'il a été fortement oxidé, jouer le rôle d'un acide. C'est ainsi que M. Berthollet a proposé de nommer antimoniate de potasse l'espèce de sel cristallisable & dissoluble, qu'on obtient par la lessive de l'antimoine oxidé avec trois fois son poids de nitre. C'est ainsi qu'on pourroit nommer antimoniate d'ammoniac l'espèce de combinaison saline qui résulte de la lessive du même oxide d'antimoine par l'ammoniac, dont l'action dissolvante par rapport à cet oxide a été manifestement prouvée par les expériences de M. Vauquelin sur le tartre d'antimoine & de potasse. A la vérité cette dénomination d'antimoniates suppose l'existence d'un acide antimonique, & il n'y a point encore de faits positifs qui prouvent que l'oxide d'antimoine soit un acide, dans quelque état d'oxidation qu'il ait été mis. Les seules propriétés qu'on puisse invoquer pour concevoir l'existence d'un acide antimonique, sont, 1°. que la plupart des acides, & en particulier l'acide tartareux, saturés de la plus grande quantité possible d'oxide d'antimoine, ne perdent point leur acidité; 2°. que l'oxide de ce métal fait par le nitre nu précipité du muriate d'antimoine sublimé, s'unit aux alcalis comme un acide, foible. Il est vrai qu'on ne voit point cet oxide rougir les couleurs bleues végétales, & qu'on ne lui connaît pas la saveur aigre. Ce seroit donc sous ce point de vue le plus foible des acides métalliques que l'acide antimonique, en supposant qu'on range, d'après les propriétés indiquées, l'oxide d'antimoine dans cette classe de sels; il pourroit être regardé encore comme une sorte de corps moyen entre les acides proprement dits & les oxides; mais il faut convenir qu'il est nécessaire, de multiplier les expériences sur les combinaisons de cet oxide, avant d'admettre l'existence d'un acide antimonique. (Voyez le mot **ANTIMOINE.**)

ANTIMONIAUX. On nomme antimoniaux les différens composés, & sur-tout les remèdes qui

sont préparés avec l'antimoine, ou dont ce métal le plus souvent à l'état d'oxide fait la base. (Voyez le mot **ANTIMOINE.**)

ANTIMONIAUX SULFURÉS. Perman a désigné par le nom d'antimoniaux sulfurés toutes les combinaisons de l'antimoine métallique ou oxidé avec le soufre, telles que le sulfure d'antimoine, & tous les oxides d'antimoine sulfurés, connus sous les noms particuliers de *verre d'antimoine*, de *foie d'antimoine*, de *sulfure des métaux*, de *terme de soufre dort*, &c. Voyez l'extrait de la dissertation sur les antimoniaux sulfurés à l'article **ANTIMOINE.**

ANTIMONIÉES. On dit quelquefois substances antimoniques, teintures antimoniques, préparations antimoniques, sels antimonies, pour désigner les combinaisons de l'antimoine. Mais le mot antimoniaux est aujourd'hui plus souvent employé.

ANTIMONIQUE. Suivant les principes de la nomenclature méthodique adoptée aujourd'hui par le plus grand nombre des chimistes français, cette expression seroit employée pour nommer l'oxide d'antimoine devenu acide par une forte oxidation, ou jouant le rôle d'un acide dans ses diverses combinaisons. Voyez les mots **ANTIMOINE** & **ANTIMONIATES.**

ANTIMOINE. (Pharmacie.) Il reste peu de choses à dire à la pharmacie proprement dite, après les détails consignés dans l'article précédent. La préparation des médicamens qu'on tire de l'antimoine est entièrement du ressort de la chimie, & elle a été indiquée pour le plus grand nombre dans l'article précédent. C'est à cause de ce rapport intime des médicamens antimoniaux avec la chimie proprement dite, que presque tous les auteurs qui ont fait des ouvrages plus ou moins généraux ou complets sur la pharmacie, n'y ont point compris la plupart des préparations antimoniques. Lémery, Raume, Spelman, en ont usé ainsi. Ils n'ont point indiqué dans leurs pharmacies que les mélanges divers & les formes variées que reçoivent les préparations antimoniales, lorsqu'on les fait prendre aux malades. On se bornera donc ici, comme dans tous les articles d'une importance égale, après avoir décrit en détail comme opérations chimiques les diverses préparations auxquelles sont soumises les matières qu'on y traite, à offrir un dénombrement méthodique, une classification des médicamens antimoniques, & quelques réflexions sur leurs propriétés & leurs usages, ainsi que sur plusieurs de ces préparations qui ne sont qu'indiquées légèrement dans l'article *Chimique*, à cause de leur peu d'importance pour la science & de leur peu d'usage en médecine.

Tous les médicamens que l'on tire de l'antimoine, ou plutôt que l'on prépare avec l'antimoine

& avec le sulfure d'antimoine, peuvent être partagés en 6 genres. Le premier contient le métal lui-même, & sans qu'on lui ait fait subir aucune préparation. On en faisoit autrefois des gobelets & des pilules. Les premiers servoient à y laisser séjourner du vin, de la bière, du cidre ou d'autre liqueur, pendant un ou plusieurs jours; on avoit ensuite ce verre de liqueur, & on étoit plus ou moins purgé & évacué, suivant que le liquide étoit plus ou moins acide & avoit dissous plus ou moins d'antimoine. On s'est bientôt aperçu que ces remèdes étoient inconstans & infidèles, & qu'on ne pouvoit pas compter sur leurs effets; on les a donc abandonnés. Il en a été de même des pilules d'antimoine fondu, qu'on nommoit pilules perpétuelles, parce qu'on conceit bien qu'elles pouvoient servir perpétuellement en les lavant après qu'elles avoient parcouru le canal intestinal & qu'elles avoient été rendues par les malades. Elles n'avoient d'effet que par le séjour qu'elles faisoient dans le canal, & en raison des fucs qu'elles y rencontroient, aussi les uns étoient-elles fortement purgées par ce singulier médicament; les autres n'en éprouvoient presque aucun effet. On a donc bien fait de renoncer à ce médicament.

Le second genre renferme les oxides d'antimoine purs. Ceux-ci, préparés avec le métal par différens procédés oxidans, ont des vertus différentes, suivant les diverses doses d'oxygène qu'ils contiennent. Peu d'oxygène leur donne peu de propriétés; une proportion un peu plus grande de ce principe les rend très-actifs, & une grande proportion les remet de nouveau dans la classe des médicamens peu énergiques. Les diverses espèces d'oxides d'antimoine purs jouissent de l'un ou de l'autre état que nous indiquons. Tels sont, 1°. l'oxide d'antimoine préparé immédiatement par le feu & l'air, & qui, en se sublimant sous la forme de prismes blancs & brillans, forme ce qu'on nommoit autrefois *steurs argentines de régule d'antimoine*, *neige de régule d'antimoine*, &c. Ce médicament n'est plus employé; on le croit très-émétique & très-purgatif.

2°. L'oxide préparé avec le métal & le nitre, & qui bien lavé porte le nom d'*antimoine diaphorétique lavé*. Au rapport de la plupart des praticiens habiles, ce remède est presque inerte. On l'emploie à la dose de quelques grains pendant long-temps dans les maladies de la peau, & sur-tout dans les dartres anciennes. Plusieurs médecins assurent que ce remède guérit ces maladies par un long usage; on le donne en pilules avec des extraits amers des mucilages, &c.

3°. *La poudre de la Chevalerie*, qui n'est qu'un oxide d'antimoine, fait par le nitre, comme l'antimoine diaphorétique, rebéliné en quelque sorte par de nouvelles doses de nitre, & prive de son alcali par la deliquescence qu'on lui fait éprouver en le laissant plusieurs mois à la cave, & en le séchant après en avoir décanté la portion de li-

queur. J'ai vu ce médicament fort employé par plusieurs médecins; ils le prescrivoient comme un grand dépuratif dans les maladies longues de la peau, de la lympe, &c. Il n'est plus employé aujourd'hui.

4°. *La poudre de James*, remède anglois fort vanté en France depuis quelques années, qui a trouvé des partisans zélés dans quelques médecins qui semblent faire profession de blâmer la médecine française, & d'établir sur ses débris, les méthodes étrangères. Il paroît que ce n'est qu'une espèce d'antimoine diaphorétique calciné avec de la corne de cerf. On l'emploie en Angleterre comme émétique, purgatif, sudorifique, dépurant dans presque toutes les maladies. Il y joue presque la même rôle que le tartre d'antimoine chez nous, & l'on doit y avoir peu de confiance quand on possède le dernier remède. Que penser donc de quelques médecins qui, non-seulement prennent ce remède anglois, & le présentent à notre tartre antimonial, mais le proposent même comme un moyen puissant, une panacée, sur-tout dans les cas les plus graves, & même désespérés, comme si notre sel métallique ne méritoit pas une égale confiance, & ne pouvoit pas être employé avec plus de succès.

5°. *La poudre d'Algarotti*, espèce d'oxide d'antimoine très-furchargé d'oxygène précipité par l'eau du muriate d'antimoine subligné. On faisoit autrefois beaucoup d'usage de cette préparation; on l'employoit comme émétique & purgative. On la faisoit entrer dans toutes sortes de médicamens composés. Après avoir été bien convaincus par l'expérience, qu'elle agissoit très-inégalement sur différens individus, on a renoncé à son usage.

Le troisième genre des préparations antimoniales pharmaceutiques renferme les sels antimoniaux; il n'y en a plus que deux espèces employées aujourd'hui, savoir, le muriate d'antimoine subligné ou beurre d'antimoine, & le tartre d'antimoine & de potasse: tout ce qu'on fait sur les diverses préparations, la nature & les propriétés chimiques de ces deux sels, ayant été exposé dans l'article précédent, nous nous contenterons d'indiquer ici quelques propriétés pharmaceutiques de ces sels. Le muriate d'antimoine subligné est un caustique très-puissant; comme il est très-deliquescant, on ne l'emploie guère que sous la forme de liquide, on en frotte avec un pinceau, les parties qu'on veut cancériser. C'est sur-tout sur les régions mordues par des animaux enragés, qu'on fait cette application, pour y détruire le virus hydrophobique; la partie animale qui a été touchée par ce caustique, tombe en escarre, & il s'établit ensuite une forte supuration.

Il y a peu de médicamens aussi importans & aussi utiles que le tartre d'antimoine & de potasse, les médecins français en font un usage

si multiplié & si heureux, que si les idées exagérées qu'on avoit autrefois sur tous les remèdes subsistoient encore, on pourroit le nommer à bien plus juste titre que beaucoup d'autres médicaments, une panacée ou un remède universel. En France, & sur-tout à Paris, le tartre d'antimoine & de potasse fait à lui seul, presque une grande matière médicale. Il est émétique, purgatif, sudorifique, diurétique, expectorant, incisif, fondant, apéritif. Il fait vomir, il purge, il stimule, il excite dans différens degrés, suivant la dose, la forme sous lesquelles on le prescrit, & sur-tout, suivant l'état des nerfs, du système lymphatique, de l'estomac & des intestins des malades. Il joint à ces utiles propriétés, celle de n'avoir que peu de saveur, & conséquemment de ne point déplaire aux malades, celle de pouvoir être administré sous toutes les formes, dissous dans toutes sortes de liquides. Il faut savoir sur-tout parmi ses propriétés directement applicables à la pharmacie ; 1°. qu'il est important, & même presque toujours nécessaire de le faire dissoudre dans l'eau distillée ; 2°. de ne le point donner avec des eaux scéléuteuses & calcaires qui le décomposent ; 3°. de ne point le donner avec des boissons acides ou alcalines, qui en altèrent la nature, & en détruisent plus ou moins les effets ; 4°. que s'il est nécessaire d'en reconnoître la présence & la nature dans des boissons où on ne devoit pas l'administrer, & où il se seroit glissé par erreur, on a toujours un moyen prompt, facile & inmanquable d'arriver à ce but en employant la précipitation à l'aide des sulfures de chaux & de potasse qui y forment du *soufre doré*, reconnoissable par sa couleur orangée. 5°. Qu'on peut détruire tout-à-coup ses effets violens & sur-tout son émeticité, dans le cas où il auroit été donné mal-à-propos, par erreur ou en trop grande quantité, en faisant prendre aux malades une décoction de quinquina qui le décompose tout-à-coup, suivant la découverte de M. Berthollet. Ajoutons encore à ces détails que le tartre d'antimoine & de potasse peut être combiné avec d'autres sels, & sur-tout avec le muriate d'ammoniaque, avec lequel il forme un sel triple qui paroît avoir une grande activité. L'assone a employé cette combinaison avec succès dans les maladies chroniques, comme *fondante & apéritive*. Le tartre d'antimoine & de potasse peut encore servir comme topique, & on l'a déjà vu produire sous cette forme des effets fondans assez marqués.

On ne parlera point ici d'autres sels antimoniaux qui ne sont plus mis en usage, tels que l'acétate d'antimoine, employé avant qu'on connût le tartre, &c.

Le quatrième genre des préparations antimoniales qu'on employoit en pharmacie, comprend les antimoniaux sulfurés, dont on a fait une histoire détaillée dans les articles précédens. On compte dans ce genre, 1°. le sulfure d'antimoine,

qu'on désigne encore sous le nom d'*antimoine* dans beaucoup d'ouvrages pharmaceutiques ; on le prend purifié par la fusion ; on le porphyrisé avec l'eau & jusqu'à ce qu'il soit réduit en une poudre impalpable ; on fait entrer cette poudre dans des bols, des pillules, des opiat, &c. &c. &c. beaucoup de praticiens croyent même que c'est la forme la plus avantageuse sous laquelle on puisse employer ce médicament. On a encore coutume d'entremêler une certaine quantité de sulfure d'antimoine en poudre dans un nouet de lingé que l'on suspend au milieu d'une décoction végétale faite particulièrement avec des bois, des racines & des écorces sudorifiques. Cette pratique pressée depuis longtemps en usage, est regardée comme très-propre à augmenter la vertu de ces décoctions ; mais il n'est pas possible de douter que c'est un préjugé : car ni l'eau seule, ni les substances végétales sur lesquelles elle agit, ne peuvent ni altérer ni dissoudre le sulfure d'antimoine qu'on y tient plongé. Il n'y a que le cas où quelques substances alcalines ou acides soit ajoutées aux végétaux, soit contenues dans ces végétaux mêmes, pourroient enlever quelques parties de soufre & d'antimoine, & ces cas sont très-rare dans les prescriptions des médecins. Il est donc certain que dans les formules ordinaires le sulfure d'antimoine suspendu dans un nouet au milieu des décoctions, ne sert absolument à rien. Cependant quand une décoction dure très-longtemps, & qu'une grande quantité de matière végétale & sur-tout d'extrait se dissout dans l'eau, & attire l'oxygène atmosphérique, il n'est pas hors de vraisemblance qu'un peu de soufre & d'oxide d'antimoine peuvent passer dans la liqueur ; mais on doit toujours se rappeler que cela ne peut avoir lieu qu'après un temps très-long & dans des circonstances rares.

2°. L'oxide d'antimoine sulfuré vitreux transparent, ou *verre d'antimoine*, contenant, comme on fait, peu d'oxygène & beaucoup de soufre. Ce médicament beaucoup plus employé autrefois qu'aujourd'hui, au moins isolé & dans son état de pureté, est fortement émetique & purgatif ; mais ces propriétés y varient suivant la nature, son état d'oxidation & la quantité de soufre qu'il contient. Voilà pourquoi on ne l'employe presque plus aussi que beaucoup d'autres préparations antimoniales, sur-tout depuis qu'on possède le tartre d'antimoine & de potasse. Le verre d'antimoine est encore ordonné dans quelques cas rares, comme un purgatif stimulant, en le mêlant avec de la cire fondue ; c'est ce qu'on appelle le *verre d'antimoine cire*. On le donne dans la paralysie, l'apoplexie, les maladies comateuses, la colique des peintres. On employe aussi le verre d'antimoine mêlé ou délayé dans du vin, soit qu'on tire celui-ci à clair, & alors il n'a pas tant d'action, soit qu'on l'administre dans l'état trouble & avec beaucoup plus de substance antimoniale ; dans ce dernier état on ne le prescrit qu'en lavement. Le verre d'antimoine entre dans la

préparation du tartre d'antimoine & de potasse.
 3°. L'oxide d'antimoine sulfuré, vitreux, opaque, c'est le *foie d'antimoine*. Il contient moins de soufre & plus d'oxygène que le verre ; il est plus infusible ; il est aussi plus variable dans ses propriétés, eu raison des proportions plus variées d'oxygène & de soufre qu'il contient. Il est rare qu'on l'emploie seul, excepté dans la médecine vétérinaire ; il entre dans plusieurs préparations pharmaceutiques, & sur-tout dans celle du tartre d'antimoine & de potasse.

4°. Le *sulfure des métaux*, *erucus metallorum*, est une espèce de verre ou plutôt de foie d'antimoine, fait, comme on l'a dit dans l'article précédent, par le nitre & lavé ; il a les vertus de ces deux composés, & elles y varient comme dans ces préparations. On ne l'emploie que dans la médecine vétérinaire ; il entre dans le vin émétique.

5°. L'oxide d'antimoine sulfuré brun ou le *kermès minéral*. Ce composé dont on a fait une histoire détaillée dans l'article de *Chimie*, est avec le tartre d'antimoine & de potasse le plus employé de tous les médicaments antimoniaux. On le donne comme fondant, béchique, incisif, sudorifique ; il divise sur-tout les humeurs visqueuses des poulmons ; il facilite l'expectoration. Voilà pourquoi on le prescrit avec succès dans les catarrhes, les fluxions de poitrine catarrhales, l'asthme humide, les rhumes opiniâtres ; on le donne aussi avec avantage dans les maladies de l'estomac, des intestins, du système lymphatique, &c. On le mêle avec la scille, l'ipécacuanha, &c., dans des pillules, ou bien on l'ajoute à des potions huileuses. Il faut avoir soin dans ce dernier cas de recommander qu'on agite le mélange, afin qu'il soit pris également par les malades : sans cela le kermès se sépare & se précipite ; les malades courent le risque d'en prendre trop dans les dernières cuillerées des potions, tandis qu'ils n'en auroient presque point pris dans les premières. Le kermès n'est point dissoluble dans la plupart des liqueurs avec lesquelles on le mêle ; il le délaye mieux dans les huiles que dans d'autres liquides ; il n'y a que les alcalis qui sont susceptibles de le dissoudre, & on ne le donne point avec ces sels. Le kermès produit souvent l'effet émétique même à une petite dose ; souvent aussi il est purgatif, & toujours il porte à la peau : on peut donc remplir plusieurs indications importantes à la fois avec ce médicament.

6°. L'oxide d'antimoine sulfuré orangé ou le *soufre doré d'antimoine*. Autrefois on faisoit un grand cas & un grand usage de cette préparation, on en varioit les couleurs & les propriétés par les différentes portions qu'on en séparait de l'eau-mère du kermès, ou du sulfure de potasse antimonisé liquide, par le moyen des acides, & en employant en doses ou en portions fractionnées la quantité d'acide nécessaire pour la précipitation complète. On nommoit les différents précipités *soufre doré de la première*, *de la seconde*, *de la troisième précipitation*,

On les donnoit comme vomitifs, purgatifs & sur-tout comme sudorifiques. Mais depuis qu'on s'est aperçu que ces remèdes étoient fort incertains & fort incertains dans leurs effets, on y a presque entièrement renoncé. Il y a cependant encore quelques hommes avides & ignorans qui vendent ridiculement cher des préparations antimoniques, plus ridiculement encore nommées *soufres surdors* ; le nom seul de ces préparations prouve l'ignorance & la stupidité de ceux qui les vantent.

7°. C'est dans la classe des antimoniaux sulfurés qu'il faut placer les *fleurs rouges d'antimoine*, comme on va le voir par l'exposé de leur préparation, telle qu'elle est donnée dans le codex de Paris. Prenez quatre onces de sulfure d'antimoine & autant de muriate d'ammoniaque ; triturez-les ensemble, mettez-les dans une cucurbitte de terre, adaptez un chapiteau de verre & un récipient, puis sublimez pendant deux ou trois heures jusqu'à ce que presque toute la masse soit sublimée ; lavez les fleurs avec de l'eau tiède, filtrez & séchez la poussière qui reste sur le papier. On voit ici l'antimoine décomposer un peu de muriate d'ammoniaque, s'oxider & s'unir avec une portion du soufre qui se sublime ; l'ammoniaque contribue à faire passer le soufre à l'état de sulfure ; mais ce médicament est trop incertain & trop peu connu, pour pouvoir être employé avec sécurité ; il peut même contenir du muriate d'antimoine.

8°. Je ne parlerai point ici de quelques autres préparations d'oxides d'antimoine sulfurés qui portent des noms barbares & qui ne sont d'aucun usage aujourd'hui, tels que la magnésie opaline, la rubine d'arsenic, le *magnes arsenicalis*, &c.

Le cinquième genre de préparations antimoniales usitées en pharmacie renferme les diverses espèces de teintures antimoniales dont on a donné tant de recettes dans les dispensaires ; le codex de Paris n'en prescrit qu'une qui est très-simple & très-bonne, & à laquelle il seroit inutile d'en substituer d'autres. On prend trois onces de sulfure d'antimoine en poudre & six onces d'alcali de tartre ; on les met en poudre dans un creuset, & on les fait rougir & fondre pendant une heure ; après ce temps on jette la matière dans un mortier de fer chaud, on la pulvérise, on l'introduit dans un matras, & on y jette assez d'alcool rectifié, pour qu'elle en soit bien recouverte ; on laisse digérer ce mélange au bain de sable pendant quelques jours ; la liqueur rouge foncée qui en résulte, est la teinture d'antimoine. C'est une dissolution de sulfure de potasse antimonisé dans l'alcool. Ce médicament est très-énergique, très-fondant, émétique, purgatif, sudorifique, &c. On le donne à la dose de quelques gouttes ; on ne doit point le mêler avec des acides.

Dans le sixième & dernier genre des compositions antimoniales pharmaceutiques, nous ne ferons qu'indiquer les alliages de l'antimoine métallique avec d'autres métaux, tels que ce qu'on nommoit le *regule jovial*, le *regule martial* &c. le

rigale de Vénus, alliages d'antimoine avec l'étain, le fer &c le cuivre qu'on employoit pour la préparation du lithium de Paracelse qui n'est que de l'alcool de potasse, &c dont le premier servoit à la préparation de l'antihéctique de la l'oterie; ces médicaments ne sont plus employés par les hommes instruits.

ANTISPODE. (*Pharmacie.*) L'antispode que les médecins arabes nommoient *spode*, est à ce qu'il paroît la cendre d'un roseau ou au moins d'une plante aquatique. C'est pour distinguer cette cendre du spode proprement dit ou de l'ivoire brûlé & calciné, qu'on a pris cette dénomination d'antispode. Cependant le mot *spode*, *sprodium*, veut dire cendre en général. Chez les Grecs, on employoit ce mot, pour désigner l'oxide de zinc sublimé, nommé depuis *pompholyx* &c *tutty*. Ainsi cette expression nommoit une substance minérale chez les Grecs; elle étoit donnée à une cendre végétale chez les Arabes, & elle désigne une cendre animale chez les modernes. Voyez IVOIRE. On ne sait donc pas positivement ce que c'est que l'antispode. Aussi aucun médicament n'est-il employé ou prescrit sous ce nom, dans la pharmacie de nos jours.

ANTOFFLES. (*Pharmacie.*) Ce sont les cloux de girofles parvenus à leur maturité, ou les fruits qui succèdent aux fleurs de giroflier, dont les cloux sont les fleurs non encore épanouies. Les antoffles moins aromatiques & moins acres que les cloux, étoient employés comme eux. On les préferoit même dans les affections hystériques. Ils entroient autrefois dans plusieurs compositions sèmeuses, on leur substitue les cloux ordinaires. Voyez GIROFLES.

APATITE. M. Werner a nommé apatite une espèce de pierre qui, en la considérant minéralement, &c suivant l'analyse qui en a été faite par M. Klaproth, contient de l'acide phosphorique &c de la chaux. (Voyez PHOSPHATE DE CHAUX.)

APÉRITIFS. (*Pharmacie.*) La remarque générale qu'on a insérée dans l'article ANTI, doit être appliquée ici. Ce n'est pas sous des dénominations de médecine ou de matière médicale, sous celles qui n'expriment que des vertus ou des propriétés malheureusement plus souvent imaginaires que réelles, qu'il est permis aujourd'hui de décrire les compositions pharmaceutiques. On se contentera donc de dire que plusieurs formules ont reçu le nom d'*apéritifs*, en raison de leurs propriétés médicales; mais on ne doit les faire connoître que sous leurs dénominations primitives pharmaceutiques, telles que TISANES, SALS, SIROPS, &c.

APHRODISIAQUES. (*Pharmacie.*) Voyez les mots ANTI & APÉRITIFS. Les raisons qui ont

été exposées dans ces articles, ne permettent pas de donner ici la notice des diverses compositions aphrodisiaques, proposées par les auteurs de formules ou de recettes. Il en sera question dans les articles pharmaceutiques auxquels elles appartiennent. Voyez l'ASTILLES, TABLETTES, PILULES, MIXTURES, &c.

APHRONITRUM. (*Pharmacie.*) Ce mot signifie trois choses différentes dans les ouvrages de pharmacie. Tantôt il est employé pour désigner le salpêtre de houffage, le salpêtre superficiel qui croît sur la terre ou à la surface des pierres; tantôt il sert à désigner le sel qui se sépare en écumes des cuites du nitre ou même du verre dans les creusets où on le fond. Enfin il s'applique souvent au carbonate de soude qui se trouve souvent à la surface de la terre. Alors il est synonyme du mot NATRUM.

APIOS. (*Pharmacie.*) Ce mot signifie dans beaucoup d'auteurs anciens de médecine, une boisson fade, insipide, une espèce d'aliment sans saveur, comme une farine de riz ou d'orge, détrempée ou cuite dans l'eau. On l'a ensuite employé dans la synonymie botanique, pour désigner trois ou quatre espèces de plantes. Suivant Blancard (*Lexicon éair. de Lippie*, 1777, premier volume.) Il signifie 1°. une espèce de rithymale, 2°. le glycine apios de Linnéus, 3°. le lathyrus tuberosus du même auteur. Cette dénomination générale, & par conséquent vague & indéterminée, avoit, à ce qu'il paroît, été donnée en raison de la racine allongée & turbinée en forme de poire. Elle est aujourd'hui abandonnée, & on ne la donne à aucune substance médicamenteuse particulière, ce qui est la seule manière d'éviter les équivoques & les qui-proquo.

APOCHLYME. (*Pharmacie.*) Voyez ROB, CONSERVE, SUCS ÉPAISSIS.

APOCROUSTIQUE. (*Pharmacie.*) Remède, dit Blancard, qui en resserant & refroidissant, repoussé les humeurs amassées dans quelques parties du corps. C'est un répercutif ou un discutif. Voyez ces mots dans le dictionnaire de médecine.

APOCIN. (*Pharmacie.*) *Aclepias lyriacum* L. *Apoecynum lyriacum* Claf. Hist. L. 87. C'est une plante vivace, traçante, très multiplante, d'un bel aspect, ayant les feuilles & les ombelles des fleurs, jolies, son port majestueux, originaire de Candie, de Virginie, près d'Alfrazan, on la trouve dans les jardins botaniques. Son fruit est rempli d'une substance soyeuse, appelée *muque*, qui est employée pour fourrer les habits, à fabriquer des étoffes. Les habitants des contrées où cet apocin croît, en mettent dans leurs lits. On s'en sert encore en place d'amadou, pour recouvrir le feu de la pierre à fufil. Schoepf rapporte que les Américains man-

gent les jeunes poussees de cette plante, fricassées comme les asperges ; l'on retire par expression des fleurs un suc brun, dont la saveur est assez ingrate. Prosper Alpin assure que les feuilles pilées, soit crues, soit cuites dans l'eau en forme de topique, guérissent les humeurs froides, & apaisent les douleurs.

Toute cette plante est remplie d'un lait très-caustique, cui, dit-on, est un excellent remède pour guérir la dartre vive, & plusieurs autres maladies de la peau, ou pour en effacer les taches ; on en frotte les parties affectées : c'est un bon dépuratoire.

L'opocin est un purgatif très-usité en Afrique, au dit de M. Adanion.

(M. WILLEMET.)

APOCIN DES INDES. *Apocynum caliculatum.* *Oliv. cradum. Rumph. amb. 5. p. 75. tab. 40. f. 2.* Les Indiens mangent les feuilles de cette plante, soit crues, soit crues & mêlées avec d'autres alimens, sur-tout avec le poisson. Ils les regardent comme salutaires à l'estomach.

(M. WILLEMET.)

APOPHLEGMATILAMES ou APOPHLEGMATISANS. (*Pharmacie.*) Ce sont tous les remèdes capables par leur saveur piquante & acre, sans être caustique, de faire couler la salive & toutes les humeurs muqueuses de la bouche, lorsqu'on les mâche. Ces mots appartiennent plus à la matière médicale & à la thérapeutique qu'à la pharmacie ; il n'est nécessaire à celle-ci que d'en connoître la définition.

APOPHLEGMATISME. (*Pharmacie.*) On nomme ainsi toute préparation liquide, molle ou sèche, destinée à opérer en la retenant, la recevant, la conservant & l'agitant dans la bouche, un écoulement plus ou moins considérable de la salive & de toutes les humeurs buccales. Les décoctions relâchantes, émollientes, quelquefois piquantes & aigres, les mélanges d'extraits ou d'éléctuaires de plantes acres, les mixtures d'alcools réfineux, de sels piquans & de végétaux en poudre, les poudres mélangées de la même nature, les rotules, les nouets, les trochisques dont le mastic & la cire sont la base, les vapeurs de végétaux brûlés & sur-tout la fumée de tabac ; telles sont les principales formes des apophlegmatismes. Comme cet objet est plus relatif à l'art de formuler, qu'à celui de préparer les médicaments, comme d'ailleurs il a été traité avec beaucoup d'étendue dans le dictionnaire de médecine, nous renverrons à cet ouvrage.

APOPLECTIQUES. (*Pharmacie.*) On a donné le nom d'*apoplectiques* à plusieurs préparations pharmaceutiques qu'on a crues propres à prévenir ou à

Chimie. Tome II.

guérir l'apoplexie. Il y a un baume apoplectique, des amulettes, des épithèmes connus sous la même dénomination ; mais ils sont dus souvent à la crédulité ou au charlatanisme. Voyez le dictionnaire de médecine, & dans celui-ci les mots BAUMES, ÉPITHÈMES, &c.

APOZEME. (*Pharmacie.*) Ce mot dérivé du grec & qui signifie proprement *décoction*, est généralement adopté en pharmacie pour désigner une espèce de remède destiné pour l'intérieur, ou boisson médicamentieuse toujours chargée de la partie extractive de différentes plantes, racines, feuilles, fleurs, fruits, semences, bois, &c. souvent aiguillée par l'addition d'un sel, quelquefois édulcorée avec du sucre, du miel, ou un sirop ; c'étoit ordinairement par la décoction dans l'eau que l'on préparoit les apozèmes. Cependant par la suite on se borna souvent à la simple infusion, & quelques médecins au lieu d'eau prescrivirent d'employer le petit-lait, une eau minérale ou saline, suivant l'objet qu'ils se proposoient. Quelquefois on recommandoit d'exprimer fortement les plantes qui avoient servi à la préparation des apozèmes, d'autres fois on prescrivait de les clarifier avec le blanc-d'œuf &c, d'y ajouter quelque eau aromatique.

L'objet du médecin dans la préparation des apozèmes, étoit de faire prendre au malade une liqueur plus ou moins chargée de la partie extractive des plantes qu'il jugeoit nécessaires à son état, & on donnoit ces boissons par verrée de quatre ou six onces, deux, trois, ou quatre fois par jour ; ainsi on distinguoit les apozèmes des tisanes, parce que non-seulement ils étoient plus chargés que les tisanes, mais encore parce qu'ils étoient donnés à des heures déterminées, tandis que les tisanes servoient de boisson ordinaire. On distinguoit aussi les apozèmes suivant leurs effets, en purgatifs, & en alterans, &c. Ainsi on trouve dans les dispensaires & les pharmacographes anciens, un grand nombre de formules sous les titres d'*apozèmes fébrifuges, apéritifs, amers, béciques, céphaliques, &c.* Mais comme ces décoctions ou infusions chargées sont toujours épaisses, répugnantes, on en fait très-rarement usage de nos jours, & on y a substitué dans la pratique de la médecine les extraits des plantes que l'on donne en bois, & par-dessus lesquels on fait prendre une ou plusieurs tasses d'un bouillon ou d'une tisane appropriée à l'état de la maladie & à l'objet qu'on se propose.

APOTICAIRE, APOTICAIERIE. Ces mots nous viennent du mot *apotheca*, qui, d'après son origine grecque, veut dire vase, poterie, ou boîte, dans laquelle on renfermoit des médicaments ; on y a substitué, aujourd'hui ceux de pharmacie & de pharmacien. Ce dernier est très-bien nommé ; mais le mot pharmacie désignant

T t

ordinairement la science & l'art de préparer les médicamens, ne devoit pas être employé pour désigner le lieu où on les prépare, ou celui où on les garde. Voyez les mots PHARMACIE & PHARMACIEN.

APPAREIL. On pourroit ranger sous ce mot tous les vaisseaux de la chimie que l'on divisoit en autant de genres qu'ils ont d'usages ; & sous ce point de vue, l'on auroit des appareils pour la calcination, la combustion, &c. c'est-là l'ordre qu'a suivi M. Lavoisier dans ses élémens de chimie. Mais comme dans chacun de ces mots les usages des instrumens seront énoncés, & que ce seroit tomber dans des redites inutiles & fastidieuses, nous avons pris le parti de ne décrire à ce mot que les instrumens qui n'ont pas de nom particulier. Nous croyons que cette méthode qui paroît déjà avoir été adoptée par M. de Morveau, aura plus d'avantages pour les lecteurs. Si nous en jugeons d'après nos sens, nous serons convaincus que celui qui aura besoin de renseignemens sur un vaisseau quelconque, ira plutôt les chercher à son nom, qu'à les usages qu'il ne connoît souvent pas, ou dont il ne connoît qu'une partie ; car il n'est peut-être pas un seul instrumens qui ne serve, ou qui ne puisse servir à plusieurs fins. D'après ces considérations qui nous paroissent déterminantes, nous nous bornerons seulement à faire ici l'explication des vaisseaux qui n'ont pas de nom particulier, ou qui sont connus depuis long-temps sous le nom d'appareil. Enfin quoiqu'il importe peu que les moyens de la chimie fondés sur des vases soient décrits sous un nom ou sous un autre, pourvu que l'on parvienne à en donner une connoissance exacte, nous pensons cependant qu'il est bon d'écartier d'ici tout ce qui pourroit se ranger ailleurs, afin de ne point nous traîner trop long-temps sur le mot, & de n'être point fastidieux en répétant toujours la même chose. Cette diversité dans le travail sera en même-temps agréable au lecteur & à l'auteur.

Les appareils sont une partie de la chimie, sans laquelle cette science n'existeroit véritablement point ; car ce n'est qu'avec eux que l'homme peut avoir recours à l'expérience, pour assurer la marche de ses idées, ou pour prouver le résultat de son raisonnement, qui dénué d'expériences ne doit être regardé que comme une hypothèse plus ou moins vraisemblable. Dans les siècles passés, les appareils chimiques étoient fort inexactes & ne donnoient presque jamais de résultats vrais, c'est pourquoi la théorie de cette science a été entièrement fautive jusqu'à nos jours. Une logique nouvelle, mieux suivie & plus conséquente, résista les appareils ; ceux-ci à leur tour en fournissant des données plus certaines, appuyèrent le raisonnement & le conduisirent à de nouvelles combinaisons, & à des opérations plus compliquées. Ce fut sur tout lorsqu'on

sentit la nécessité de ne rien perdre pendant les analyses des corps pour avoir des idées exactes de leur nature ; quand on voulut déterminer l'influence des corps environnans sur celui qui faisoit l'objet du travail, qu'il fallut des instrumens capables de séparer les élémens les uns des autres, de les retenir séparément, d'en faire connoître les propriétés, la quantité, &c. C'est à l'aide de la géométrie, de la mécanique & de la physique réunies, que la chimie est parvenue au point d'exactitude où elle est aujourd'hui à cet égard.

On entend en chimie par le mot *appareil*, la réunion de plusieurs vases. Les appareils varient sans cesse, par la forme, le nombre & la nature des parties qui les composent, suivant que les opérations auxquelles ils sont destinés varient elles-mêmes. Il est rare qu'une expérience nouvelle n'exige pas un appareil nouveau, soit dans la forme, l'arrangement ou la nature ; c'est le raisonnement, ce sont les indices que l'on a sur la nature des corps que l'on soumet à l'analyse, ou que l'on veut unir, & les résultats que l'on étoit en obtenir, qui guident le chimiste dans la préparation des appareils. Par rapport à la forme, elle ne doit pas être la même pour les fluides élastiques que pour les liquides, & pour les liquides que pour les solides. Par rapport au nombre des parties, c'est souvent la quantité de matière sur laquelle on agit qui le gouverne, quelquefois aussi c'est la nature ou les propriétés ; quant à la nature des appareils c'est toujours les propriétés des corps qui la dirigent ; car l'on fait aisément que cherchant à connoître l'action de deux ou de plusieurs corps les uns sur les autres, il faut éviter le plus soigneusement possible celle d'un autre qui compliqueroit l'opération, & rendroit le résultat faux. Il est des appareils qui doivent subir un grand degré de chaleur sans se fondre, d'autres au contraire sont exposés à un grand froid ; les autres doivent réagir sur des substances très-fixes, & d'autres sur des corps volatils ; d'autres doivent supporter un grand poids, résister à une force considérable, & d'autres n'ont point d'effort à faire ; d'autres enfin sont destinés à contenir des matières très-actives, & d'autres des corps très-inerts. Voilà en général quelles sont les principales causes qui nécessitent de la variété dans les appareils chimiques. L'application de ces principes ne peut pas être faite ici, c'est dans la description des opérations, & dans l'explication de chaque appareil en particulier qu'elle se trouvera.

Les parties des appareils se communiquent quelquefois immédiatement, & souvent par des moyens plus ou moins différens ; lorsqu'elles ont été disposées de manière que leurs capacités puissent s'en faire plus qu'une, alors on les nomme *vaisseaux de rencontre*. Mais communément ces vaisseaux ne peuvent être réunis sans corps intermédiaires ; on se sert alors de tubes disposés à propos, soit de verre, de métal ou de toute autre matière, suivant que l'exige l'opération. Quelquefois deux ou plusieurs

vases se réunissent exactement comme un flacon de cristal avec son bouchon, souvent aussi c'est le contraire & l'on est obligé d'employer un corps étranger pour séparer leurs capacités d'avec l'atmosphère & de tous les corps extérieurs environnans. Ces corps étrangers de quelque nature qu'il soit est appelé *lut*, & l'action de l'appliquer est appelée *lutter*. On s'en sert aussi pour réunir les vases avec les tubes intermédiaires. On en donnera la composition & la manière de le préparer au mot *Lut*.

Quoique notre intention ne soit pas de remonter à l'origine des appareils chimiques anciens ni de faire perdre le temps des lecteurs à la recherche des phases & des progrès de la chimie, cependant il nous paroît utile de faire connoître quelques-uns des anciens appareils qui portent l'empreinte du génie, qui ont fait faire quelques pas de plus à la science, & qui ont insensiblement conduit au degré d'exactitude où sont ceux que l'on emploie aujourd'hui.

Avant que la chimie des proportions fut établie, à l'époque où les fluides élastiques n'entroient que comme zéro dans le calcul des chimistes, leurs appareils étoient aussi simples qu'inexactes. C'étoit souvent un assemblage mal fait d'une cornue avec un ballon, ou de deux matras renfermés l'un dans l'autre appellés *vaisseaux de rencontre*, ou bien un vase unique disposé de manière que les matières parcouroient sans cesse le même cercle en revenant sur elles-mêmes.

Cependant les vaisseaux simples ont été connus des plus anciens chimistes, & c'est plutôt par des formes mieux entendues & par un arrangement mieux combiné que par des nouveaux vaisseaux, que la chimie nouvelle diffère de l'ancienne.

En effet les appareils de la distillation, de la macération, de la sublimation, de la fusion, des dissolutions, des cristallisations, des fermentations, des digestions, des cohobations, &c. existent depuis long-temps. De-là les bains de sable, d'eau, de fumier, les alambics, les cornues, les matras, les ballons, les creusets, les fourneaux, ont pris naissance.

Mais les chimistes devenant plus exacts, voulant simplifier leurs opérations pour mieux les entendre, tenant un compte égal des principes qui se dégagent, & de ceux qui se combinent, voulant sur-tout appliquer la balance à leurs opérations, & la rendre pour ainsi-dire responsable des résultats, ont imaginé des appareils à l'aide desquels ils ne perdroient rien & pourroient tout apprécier, en recueillant chaque principe à mesure qu'il se sépareroit de ceux auxquels il est uni dans le composé qui est soumis à l'analyse, ou déterminer la quantité & la nature d'un inconnu, par le résultat de sa combinaison avec un corps connu.

Si Hales n'a pas apporté dans ses travaux, une précision rigoureuse, au moins il est le premier qui en ait senti la nécessité, & qui ait fait les es-

forts pour y parvenir. L'action de l'air dans les opérations de la nature & de l'art, qui n'avoit pas été aperçue, ou qui avoit été négligée avant lui, fixa son attention. Il pensa que l'air entroit dans la combinaison de beaucoup de corps, & qu'il y influoit par sa nature & par la masse. Convaincu de cette vérité, il constitua des appareils pour recueillir ce principe à mesure qu'il se dégageoit des corps par différents moyens.

Avant de décrire les appareils de Hales qui sont déjà assez compliqués, nous décrirons un appareil simple tel qu'on s'en sert pour distiller ou sublimer des matières sans les altérer, & qui repassent dans le vase qui les reçoit au même état que celui où ils étoient auparavant.

La figure 1. *Classe 6 des instrumens pour les distillations*, est un appareil simple. Cet appareil est composé d'une cornue tubulée A. posée sur un paillason. Son bec B. entre dans un ballon F. percé d'un petit trou T. Ce trou étoit autrefois destiné à donner issue aux fluides élastiques ou aux vapeurs qui n'avoient pas le temps de se condenser, ou qui n'étoient point de nature à l'être par le froid.

Quelquefois il arrive que le bec de la cornue ne peut entrer dans le ballon, alors on emploie un corps intermédiaire nommé allonge, tel qu'on le voit figure 10 de la classe 6 des instrumens pour la distillation, cet instrument a été décrit à son mot & se voit isolé figure 8 de la même classe.

Ces appareils servent principalement à distiller des corps qui s'élèvent facilement en vapeurs, & qui se condensent demême, comme l'eau, l'éther, l'alcool, les acides, &c. Afin de ne rien perdre, on plonge le ballon dans l'eau fraîche, & on le recouvre d'un linge mouillé. Comme les vapeurs qui s'élèvent du fond de la cornue, se réduisent en liquide ou en solide sur le bec de la cornue avant d'être dans le ballon, il est nécessaire que le col de la cornue ait une pente décidée vers la pointe.

Nous reviendrons plus particulièrement au mot *DISTILLATION* sur l'usage de ces appareils.

Appareil pour augmenter l'action du calorique.

M. Lavoisier considérant la cherté & les difficultés des moyens que les chimistes ont employés jusqu'à ce jour pour produire un grand degré de chaleur, a cherché à y en substituer d'autres plus commodes, moins chers & à la portée de tout le monde; ces moyens consistent dans l'emploi du gaz oxygène, au lieu d'air atmosphérique, pour la combustion, & des rayons du soleil rassemblés par un verre ardent. Il produit par-là une chaleur trois ou quatre fois plus intense qu'avec l'air atmosphérique: elle est même supérieure à celle qu'on obtenoit par les appareils, qui coûtoient beaucoup d'argent.

On se sert pour cela d'une table ABCD, fig. 19. cl. 7, percée en F d'un trou, à-travers lequel on

T 2

fait passer un tube de cuivre FG, terminé en G par une très-petite ouverture qu'on peut ouvrir ou fermer par le moyen d'un robinet H. Ce tube se continue par-dessous la table en L M N O, & va s'adapter à un gazomètre avec l'intérieur duquel il communique.

Lorsqu'on veut opérer, on fait avec un des anneaux d'une paire de ciseaux un trou dans le milieu d'un charbon bien solide, de cette manière on fait le trou rond & bien uni. On place dans ce creux de charbon le corps que l'on veut fondre. On allume ensuite le charbon sur la partie creuse avec un chalumeau à la flamme d'une bougie, après quoi on l'expose au courant du gaz oxygène qui doit sortir avec rapidité par l'extrémité G du tube FG. Ce procédé ne peut être employé que pour les corps qui ne souffrent point d'altération de la part du charbon, tels les métaux, les substances terreuses, &c. Cependant on pourroit aussi en tirer un grand parti pour l'essai des mines réfractaires, & dont les principes ne sont pas parfaitement connus; les résultats qu'on obtiendrait, donneroient sans doute des connoissances exactes: car il seroit facile d'apprécier les changemens qu'elles auroient subis par le double effet du charbon & du calorique. Il seroit possible qu'on formât à cette haute température entre les principes mêmes du minéral de nouveaux composés utiles ou curieux & inconnus jusques-là.

À l'égard des corps dont quelques-uns des principes ont de l'affinité avec le charbon, & que celui-ci décompose, comme les sulfates, quelques phosphates, les nitrates, les verres métalliques, les chaux, &c. On se sert de la lampe d'émailleur, au travers de laquelle on fait passer un courant de gaz oxygène. Alors au lieu de l'ajutage recourbé EG, on se sert de celui coudé ST, qu'on vise à la place, & qui dirige le courant de gaz oxygène à travers de la flamme de la lampe. La chaleur que l'on produit par ce second moyen, n'est pas aussi forte que celle qu'on obtient par le premier, & ce n'est qu'avec beaucoup de peine que M. Lavoisier est parvenu à fondre le platine.

Les supports dont on se sert dans cette seconde manière d'opérer, sont ou des coupelles d'os calcinés, ou de petites capsules de porcelaines; ou même des cuillers de métal comme de platine ou d'or, pourvu que ces dernières ne soient pas trop petites; elles ne se fondent pas, parce que les métaux sont bons conducteurs de chaleur, que le calorique se répartit en conséquence promptement dans toute leur masse, & n'en chauffe que médiocrement chacune des parties. Il faut avouer aussi que ces supports enlèvent une grande quantité de chaleur à la matière que l'on chauffe, & ne lui permettent pas de s'élever à une température aussi haute que dans d'autres supports.

Il seroit encore un autre moyen d'augmenter davantage la chaleur dont M. Lavoisier parle &

dont M. Achar d a eu la première idée. L'appareil qui seroit nécessaire pour cela, consisteroit dans un fourneau ou espèce de forge d'une terre extrêmement réfractaire: sa figure seroit à-peu-près semblable à celle du fourneau représenté, fig. 10, *cl.* 1.

Il devroit seulement être moins élevé & en général construit sur de plus petites dimensions. Il auroit deux ouvertures, l'une à laquelle s'adapteroit le bout du soufflet, & une seconde toute semblable, à laquelle s'ajusteroit un tuyau qui communiqueroit avec le gazomètre; on pousseroit d'abord le feu aussi loin qu'il seroit possible par le vent du soufflet, & quand on seroit parvenu à ce point, on rempliroit entièrement le fourneau de charbons embrasés; puis interceptant tout-à-coup le vent du soufflet, on donneroit par l'ouverture d'un robinet accès au gaz oxygène du gazomètre, & on le seroit arriver avec une forte pression. On pourroit ainsi réunir le gaz oxygène de plusieurs gazomètres, de manière à en faire passer une grande quantité de pieds cubes dans le fourneau en peu de temps, on produiroit par-là une intensité de chaleur certainement très-supérieure à tout ce que l'on connoit. Ces idées sont de M. Lavoisier.

1^{er}. appareil pour réduire les liquides en gaz.

On remplit avec de l'eau, à 35 ou 36 degrés du thermomètre un grand vase ABCD, fig. 13, *bis*, *class.* 5. On le suppose transparent, pour mieux faire sentir ce qui se passe dans son intérieur. On peut encore tenir les mains assez long-temps à ce degré, sans s'incommoder. On plonge les bouteilles à goulot renversé FG, qui s'y remplissent, après quoi on les retourne de manière qu'elles aient le goulot en en bas appliqué sur le fond du vase. On introduit ensuite de l'éther sulfurique dans un très-petit matras dont le col ABC étoit doublement recourbé; on plonge ce matras dans l'eau du vase ABCD, & on engage, comme on le voit représenté dans la figure, l'extrémité de son col AB C dans le goulot d'une des bouteilles F; dès que l'éther commence à ressentir l'impression de la chaleur, il entre en ébullition; le calorique qui se combine avec lui le transforme en un gaz, dont on peut remplir successivement plusieurs bouteilles.

Ces expériences réussissent encore mieux avec l'éther nitreux, parce qu'il se vaporise à un degré de chaleur moindre que l'éther sulfurique. À l'égard de l'alcool ou esprit-de-vin, l'expérience pour l'obtenir dans l'état aériforme, présente un peu plus de difficulté, parce que ce liquide n'étant susceptible de se vaporiser qu'à 67 degrés du thermomètre de Réaumur, il faut que l'eau du bain soit entretenue presque bouillante, & qu'à

ce degré il n'est plus possible d'y plonger les mains.

Il est évident que la même chose devoit arriver à l'eau, que ce liquide devoit également se transformer en gaz, en l'exposant à un degré de chaleur égal à celui qui le fait bouillir ; mais qu'on convaincus de cette vérité, MM. Lavoisier & Laplace crurent cependant devoir la confirmer par une expérience directe, dont voici le résultat. Ils ont rempli de mercure une jarre de verre A, fig. 24, *cl. 5*, dont l'ouverture étoit retournée en en bas ; & ils ont passé dessous une capsule B également remplie de mercure. Ils ont ensuite introduit dans cette jarre deux gros d'eau qui a gagné la partie supérieure à la surface du mercure, & ils ont plongé le tout dans une grande chaudière de fer E F G H placée sur un fourneau G H I K ; cette chaudière étoit remplie d'eau salée en ébullition, dont la température excédoit 85 degrés du thermomètre. Les deux gros d'eau ont atteint la température de 80 degrés, ils font entrés en ébullition, & au lieu d'occuper le petit espace A B C, ils se font convertis en un gaz qui a rempli la cloche, & a fait descendre le mercure au-dessous de son niveau. Aussi-tôt qu'on retire la jarre du bain d'eau salée bouillante, elle reprend en quelques instans sa forme liquide, & le mercure remonte.

Appareil pour réduire l'éther en gaz.

On remplit d'éther sulfurique un petit vase de verre étroit A, fig. 15, *cl. 7*, monté sur un pied. Ce vase ne doit pas avoir plus de 12 à 15 lignes de diamètre & environ 2 pouces de hauteur. On enivre ce vase avec une vessie humectée, qu'on assujettit au col du vase par plusieurs tours de gros fil bien serrés ; pour plus grande sûreté, on remet une seconde vessie par-dessus la première, & on l'assujettit de la même manière. Ce vase doit être tellement rempli d'éther, qu'il ne reste aucune portion d'air entre la liqueur & la vessie ; on le place ensuite sur le récipient B C D d'une machine pneumatique, dont le haut B doit être garni d'une boîte à cuir, traversée par une tige E F, dont l'extrémité F se termine en une pointe ou lame très-aiguë : à ce même récipient doit être adapté un baromètre G H.

Lorsque tout est ainsi disposé, on fait le vuide dans le récipient ; puis en faisant descendre la tige pointue F, on crève la vessie.

Aussi-tôt l'éther commence à brouiller avec beaucoup de rapidité ; il se vaporise & se transforme en un fluide élastique aëroforme qui occupe tout le récipient.

Si la quantité d'éther est assez considérable pour que la vaporisation finie, il en reste encore quelques gouttes dans la paille, le fluide éthéré qui s'est formé est susceptible de soutenir le baromètre adapté à la machine pneumatique à 8 à 10 pouces

environ pendant l'hiver & à 25 pendant les chaleurs de l'été. On peut pour rendre cette expérience plus complète, introduire un petit thermomètre dans le vase A, qui contient l'éther, & on s'aperçoit qu'il descend considérablement pendant tout le temps que dure la vaporisation.

On ne fait autre chose dans cette expérience que de supprimer le poids de l'atmosphère qui, dans l'état ordinaire, pèse sur la surface de l'éther & les effets qui en résultent, prouvent évidemment deux choses, la première qu'au degré de température où nous vivons, l'éther seroit constamment dans l'état d'un fluide aëroforme, si la pression de l'atmosphère n'y mettoit obstacle ; la seconde que ce passage de l'état liquide à l'état aëroforme est accompagné d'un refroidissement considérable, par la raison que pendant la vaporisation une partie du calorique qui étoit dans un état de liberté, ou au moins d'équilibre avec les corps environnans, se combine avec l'éther, pour le réduire à l'état aëroforme. La même expérience réussit avec tous les liquides évaporables, tels que l'alcool, l'eau, le mercure même : avec cette différence cependant que l'atmosphère d'alcool qui se forme sous le récipient, ne peut soutenir le baromètre adapté à la machine pneumatique en hiver qu'à un pouce au-dessus & à 4 ou 5 en été ; que l'eau ne le soutient qu'à quelques lignes, & le mercure à quelques fractions de lignes.

Appareil de Hales.

Hales a inventé plusieurs appareils. M. de Morveau en a déjà décrit deux dans le premier volume qu'il a publié à l'article AIR, & dont les figures sont les numéros 1 & 2 de la huitième classe des instrumens pour les gaz. La figure 1 est composée d'un bocal XX rempli d'eau, d'un matras à long col B, qui est recouvert d'une espèce de cloche allongée A Y. Cet appareil étoit destiné à recueillir le produit des effervescences. Lorsqu'il vouloit s'en servir, il mettoit dans le matras un mélange propre à produire une effervescence, il renvertoit la cloche sur ce matras, & par un trou pratiqué à cette cloche, il élevoit l'eau avec la bouche jusqu'à une hauteur déterminée, & il fermoit ensuite l'ouverture. A mesure que le fluide élastique se dégageoit, il prenoit la partie supérieure, & déplaçoit l'eau qui redescendoit dans le sceau. Lorsque l'effervescence cessoit, il faisoit une marque à l'endroit où l'eau s'étoit arrêtée, & en mesurant l'espace contenu entre ces deux marques, il savoit à-peu-près la quantité de gaz qui s'étoit dégagée.

La figure 2. est formée d'une cornue de métal, placée dans un fourneau, & dont le col R courbé descend dans un sceau rempli d'eau r, & remonte dans l'intérieur de la bouteille A B, suspendue à un bâton par le moyen d'une ficelle.

Ces appareils de Hales, quoique fort inégalement pour le temps, sont bien loin de l'exactitude où

sont portés aujourd'hui les appareils dirigés par la nouvelle théorie de la chimie.

En effet Hales ne pouvant faire un vuide parfait dans son appareil, il avoit toujours un mélange d'air atmosphérique avec celui qui se dégageoit des matières qu'il examinoit; ce qui compliquoit les résultats, sans compter qu'il pouvoit arriver quelquefois que l'air de l'atmosphère décomposât celui qu'il obtenoit pendant son opération. D'un autre côté, dans la distillation des matières végétales & animales &c dans la plupart des effervescences, c'est de l'acide carbonique qui se forme ou qui se dégage, &c une très-grande quantité de ce gaz est absorbée par l'eau, soit pendant son passage au travers ce liquide, soit pendant son séjour à sa surface; il perdoit aussi une portion d'air, pendant qu'il disposoit son appareil, puisqu'il étoit obligé de faire le mélange effervescent, avant de faire le vuide, de sorte que s'il est permis de connoître la nature des gaz à l'aide de ses appareils, il n'est jamais possible d'en apprécier la quantité.

Nous décrivons par la suite des appareils qui n'ont aucun de ces inconvéniens.

Quoique M. de Morveau ait déjà dit quelque chose des premiers appareils de Hales, à l'article AIR FIXE, nous avons cru qu'il seroit avantageux d'en reparler ici. Il est rare qu'en présentant les objets sous deux aspects différens, il n'en résulte pas quelque connoissance nouvelle pour celui qui étudie, &c même pour ceux qui savent déjà.

Appareil de Hales corrigé par Rouelle.

Cet appareil A, *fig. 45, et. 6* des distillations simples, est composé 1°. d'une cornue de verre de terre, ou métallique suivant l'exigence des cas; 2°. d'un matras B à deux ouvertures; l'une C à l'extrémité du col du matras; l'autre D pratiquée horizontalement, à laquelle est lutré un tube de verre E, qui monte sous certain angle &c qui est courbé en F sous une autre inclination correspondante à celle du col de la cornue qu'il doit recevoir; 3°. d'un support de cuivre G, formé de quatre branches montantes (gg) fixées à des distances égales, à la partie inférieure, par deux traverses (hh) disposées l'une sur l'autre en croix, &c dont les extrémités passent à travers les montans, &c y sont retenues en (iii) par des vis, à la partie supérieure par un cercle de cuivre K, retenu par des vis (ll). Sur ces deux traverses (hh) il y a un cercle (mm) placé sur son bord le plus étroit, &c qui forme une espèce de vase un peu évasé, qui reçoit le cul du matras B. A quelque distance de la partie supérieure des montans (gg) sont quatre bras aplatis, attachés à la partie intérieure des montans (gg), qui peuvent se mouvoir de haut en bas au moyen d'une charnière, &c qui sont terminés par une espèce de croissant destiné à former entre eux un anneau autour du col du matras,

pour le retenir. Lorsque le matras B est placé dans cette espèce de cage de cuivre, on assujettit chacun de ces bras horizontaux par le moyen des vis (nn) qui percent les montans (gg), &c qui s'étendent dans l'intérieur à la surface de ces bras à quelques lignes au-delà de leur articulation, de sorte que le matras se trouve fixé, sans pouvoir vaciller dans aucun sens; 4°. d'une cloche H qui s'assied sur l'extrémité des quatre montans qui ont été échancrez exprès pour la recevoir. Cette cloche doit être percée d'un petit trou, on porte une boîte à cuir avec un robinet pour l'usage que nous allons faire connoître.

Quand on veut se servir de cet appareil, on plonge la cage dans l'eau jusqu'au-dessus du cerceau supérieur. On adapte la cornue A au tube E; on pose la cloche sur la cage de cuivre, &c ensuite on pompe l'air contenu dans la cloche par le petit trou &c plus facilement avec un robinet; on élève l'eau presque jusqu'à l'extrémité du col du matras, &c on fait une marque à l'endroit où l'eau s'arrête dans la cloche.

L'appareil étant disposé ainsi, on chauffe les matières contenues dans la cornue; &c quand il se sépare des principes liquides, ils descendent par le tube E, jusques dans le fond du matras où ils restent; s'il se dégage en même-temps des gaz, ils vont se loger dans la cloche, d'où ils chassent l'eau, &c la font descendre dans le réservoir.

On mesure après cette opération de combien l'eau est descendue dans la cloche, &c l'on a par-là à-peu-près la quantité de gaz dégagé. En laissant l'appareil, en contact avec l'eau, on voit s'il contenoit quelque chose de dissoluble dans le liquide, &c dans quelle proportion.

C'est ainsi que Rouelle avoit essayé d'obtenir, de mesurer &c de connoître les fluides élastiques qui se dégageoient des matières qu'il distilloit. Il avoit aperçu que quelques-uns se dissolvoient dans l'eau, &c lui donnoient des propriétés nouvelles, que d'autres ne s'y dissolvoient pas, &c ne pouvoient pas servir à la combustion, &c que d'autres rougissoient par le contact de l'air &c se condensaient en liquide.

Cet appareil fort ingénieux pour le temps où il a été imaginé, est bien éloigné du degré de perfection de ceux qu'on emploie aujourd'hui pour les opérations de chimie, dans lesquelles on cherche des résultats exacts. Mais on ne peut se dispenser de rendre hommage à son auteur, d'avoir le premier cherché à connoître la nature des airs qui se dégagent par l'action des corps les uns sur les autres, &c d'avoir senti qu'il devoit y avoir une différence entre eux, dont la connoissance apporteroit une grande lumière sur la composition des corps. C'est peut-être à lui que nous sommes redevables du pas immense que la chimie a fait dans ces derniers temps sur les fluides élastiques &c sur les appareils qui y ont conduit.

Appareil de Woulfe.

Il est des corps qui après avoir été réduits en gaz par leur combinaison avec le calorique, cessent bientôt d'exister en cet état, si le même degré de chaleur auquel ils ont été formés ne subsiste pas toujours, & ils redeviennent liquides ou solides, comme ils étoient auparavant. C'est le cas que nous avons cité ci-dessus, où il n'est besoin que d'un appareil simple & peu soigné.

Quoique les chimistes anciens ne se soient servis dans toutes leurs expériences que d'appareils de cette nature, il y a cependant des corps qui réduits en gaz ne repassent point à leur premier état par le simple froid ou par la soustraction d'une portion de chaleur, & qu'on ne peut obtenir par ces moyens.

C'est pourquoi autrefois dans certaines opérations on n'obtenoit point ou presque point de produit, parce que c'étoit un gaz qu'ils ne savaient point condenser.

M. Baume, comme chimiste marchand, avoit cherché à augmenter le produit de ses opérations, en ajoutant aux matières qu'il traitoit, une substance propre à la fixer, mais il n'y est parvenu que très-imparfaitement.

C'est à M. Woulfe seul qu'il faut reporter véritablement la découverte des appareils propres à recueillir tout ce qui se sépare des corps que l'on soumet à l'analyse.

L'appareil que ce chimiste a imaginé à cet effet porte son nom, la figure 20, classe 6 des instruments pour les distillations simples & pneumatiques, représente une cornue de verre tubulée en H, dont le col B s'ajuste avec un ballon CC à deux pointes. A la tubulure supérieure D de ce ballon s'ajuste un tube de verre D E f g, qui vient plonger par son extrémité g dans la liqueur contenue dans la bouteille L. A la suite de la bouteille L qui est tubulée en xxx, sont trois autres bouteilles L' L'' L''' qui ont de même trois tubulures ou goulots x', x'', x'''; x' x'' x''' x'' x''' x'' x'''. Chaque bouteille est liée par un tube de verre x y z' x' y' z'', x' y' z''' ; enfin à la dernière tubulure de la bouteille E'' est adapté un tube x'' R M, qui aboutit sous une cloche de verre placée sur la tablette de l'appareil pneumatique.

Communément on met dans la première bouteille un poids bien connu d'eau distillée, & dans les trois autres de la potasse caustique étendue d'eau (1) ; la tarre de ces bouteilles & le poids de la liqueur alcaline qu'elles contiennent doivent être déterminés avec un très-grand soin.

Tout étant ainsi disposé, on lute toutes les jointures, savoir celle B de la cornue au ballon, & celle D de la tubulure supérieure du ballon avec du lut gras, recouvert de toile imbibée de chaux & de blanc d'œuf, & toutes les autres avec un lut de térébenthine & de cire fondues ensemble.

On voit d'après ces dispositions que lorsqu'on a mis le feu sous la cornue A & que la substance qu'elle contient a commencé à se décomposer, les produits les moins volatils doivent se condenser & se sublimer dans le col de la cornue, & que c'est principalement là que doivent se rassembler les substances concrètes ; que les substances plus volatiles, telles que les huiles légères, l'ammoniaque & beaucoup d'autres matières, doivent se rassembler dans le ballon CC ; que les gaz au contraire qui ne peuvent être condensés par le froid, doivent bouillonner à travers les liqueurs dans les bouteilles L L' L'' L''' ; que tout ce qui est absorbable par l'eau doit rester dans la bouteille L ; que tout ce qui est susceptible d'être absorbé par l'alcali doit rester dans les bouteilles L' L'' L''' ; enfin que les gaz qui ne sont point absorbables par l'eau ni par les alcalis doivent s'échapper par le tube R M, à la sortie duquel ils peuvent être remis dans des cloches de verre. Enfin ce qu'on appelloit autrefois le *caput mortuum*, le charbon & la terre, comme absolument fixes, doivent demeurer dans la cornue.

Par cette manière d'opérer on doit toujours avoir un résultat exact, car le poids des matières doit être le même après & avant l'opération. Je suppose que l'on ait opéré, par exemple, sur huit onces de sucre, le poids du résidu charbonneux qui restera dans la cornue A après l'opération, plus celui des produits rassemblés dans le ballon CC, plus celui du gaz rassemblé dans la cloche M, plus enfin l'augmentation de poids acquis par les bouteilles L L' L'' L''' , doivent égaux la masse de sucre employée & former un total de huit onces. S'il y a plus ou moins, il y a erreur, & il faut recommencer l'expérience jusqu'à ce que le rapport existe au moins à quelques fractions près.

Tel étoit l'appareil de Woulfe & le degré d'exactitude qu'il fournissait dans les opérations de la chimie ; on conçoit qu'il ne ressemble en aucune manière à tous ceux qui étoient employés avant lui. Il procure en même-temps aux savans & aux artistes des avantages extrêmement grands & multipliés ; les premiers peuvent connoître & le nombre & la proportion des principes qui se dégagent d'un corps pendant l'opération, & par-là parvenir à la connoissance exacte de sa nature. Les seconds ont ainsi un plus grand nombre de produits, dans des quantités plus considérables, & dans un état de pureté infiniment au-dessus de celui où ils étoient obtenus par les appareils anciens.

Malgré la supériorité de cet appareil sur tous les autres, il étoit sujet à de grands inconvénients, qui ont été corrigés successivement par différentes personnes.

Presque toujours lorsque l'opération étoit sur la fin, & que la chaleur diminuoit sous la cornue, le gaz qu'elle contenoit, ainsi que celui du ballon

(1) On suppose que c'est d'une matière végétale ou animale que l'on fait ici l'analyse, & c'est le sucre que M. Lavoisier a pris pour exemple dans les étimens de chimie à l'art de l'ANALYSE VÉGÉTALE.

qui la fait, diminue de volume & par conséquent il se faisoit un vuide, ou plutôt le gaz cessoit d'être en équilibre avec l'air extérieur; alors l'eau ou la liqueur des bouteilles étoit repoussée vers la cornue par le poids de l'atmosphère, & elle se mêloit avec le résidu; & le produit d'une opération qui avoit coûté beaucoup de temps & d'argent étoit perdu si l'on n'étoit pas présent pour donner de l'air, soit en ôtant le bouchon de la cornue, soit en perçant le lut quand la cornue n'étoit pas tubulée.

M. Bucquet avoit cherché à remédier à ce défaut, en mettant immédiatement après le ballon une grande bouteille vuide, dans laquelle le tube communiquant du ballon ne s'enfonçoit pas à plus d'un pouce; par ce moyen les produits ne retournoient point d'où ils étoient sortis, & ne se mêloient point avec le résidu; mais ces produits étant souvent d'une concentration différente, souvent même d'une nature diverse suivant l'espèce de matière qui les avoit fournis, il résultoit encore un dommage de leur mélange. On prévient aujourd'hui ces accidens en employant des bouteilles à trois tubulures, & en adaptant à chacune d'elles un tube capillaire, *st*, *st'*, *st''*, *st'''*, dont le bec doit plonger dans la liqueur des bouteilles. Il faut pour que ce moyen, dont M. Hassenfratz a donné la première idée, réussisse, que le tube qui part du ballon CC ne plonge point profondément dans la première bouteille, & que celle-ci ne contienne d'eau que ce qu'il en faut pour faire plonger à la hauteur de deux ou trois lignes le premier tube de sûreté; car c'est ainsi qu'on les appelle, à cause de la fonction essentielle qu'ils remplissent.

S'il y a absorption, soit dans la cornue, soit dans quelques-unes des bouteilles, il rentre par ces tubes de l'air atmosphérique qui remplace le vuide qui s'est formé, & on est quitte pour avoir un petit mélange d'air atmosphérique dans les produits; mais au moins l'expérience n'est pas entièrement manquée. Ces tubes peuvent bien admettre l'air extérieur, mais ils ne permettent pas à celui de l'intérieur de s'échapper, parce qu'ils sont toujours bouchés par leur partie inférieure *st*, *st'*, *st''* par la liqueur des bouteilles. On conçoit que pendant le cours de l'expérience la liqueur doit se lever dans les tubes à une hauteur relative à la résistance que les fluides élastiques éprouvent de la part des liqueurs des bouteilles. Cette résistance & cette élévation de la liqueur dans les tubes de sûreté, qui est déterminée par le poids & par la hauteur de la colonne de ce liquide, augmentent souvent à mesure que l'opération avance, parce qu'il est rare que ces liquides n'absorbent pas les produits de la distillation en tout ou en partie, & ne deviennent par conséquent tant d'une manière absolue ou spécifique, plus pesans qu'ils n'étoient auparavant. En supposant donc qu'il y ait trois

pouces de liqueur dans chaque bouteille, que la hauteur de l'eau de la cuve lorsqu'on s'en sert soit également de trois pouces au-dessus de l'orifice du tube qui y plonge RM; enfin que la pesanteur des liqueurs des bouteilles ne diffère pas sensiblement de celle de l'eau, l'air de la bouteille L sera comprimé par un poids égal à une colonne d'eau de douze pouces de haut. L'eau s'élèvera donc à douze pouces de haut dans le premier tube de sûreté *st*, d'où il résulte qu'il faut donner à ce tube plus de douze pouces de longueur au-dessus du niveau du liquide *ab*. Le tube *st'* doit en conséquence avoir plus de neuf pouces de haut. Le *st''* plus de six, & le tube *st'''* plus de trois pouces. On doit toujours donner à ces tubes plus que moins de longueur, à cause des oscillations que fait naître le passage des bulles de fluides élastiques au travers des liqueurs.

Cet appareil ne peut pas être employé dans des expériences dont le résultat doit être rigoureux, toutes les fois que les matières qu'on se propose de traiter ont une action trop rapide l'une sur l'autre, ou lorsque l'une doit être introduite successivement & par parties, comme dans les mélanges qui font une vive effervescence. On se sert alors d'une cornue tubulée, *fig. 2* des instrumens pour les distillations simples & pneumatochimiques, &c., classe 6. On introduit une ou plusieurs des substances, & de préférence celles qui sont concrètes, & puis on adapte un tube recourbé, *fig. 3*, même classe, BCDA terminé par la partie supérieure B en un entonnoir, & par son extrémité inférieure A par une ouverture rétrécie; c'est par l'entonnoir BC qu'on verse la liqueur; il faut que la hauteur BC soit assez grande pour que la liqueur qu'on introduit puisse vaincre la résistance occasionnée par celles des bouteilles LL', L'L'', même classe, *fig. 20*.

Il est possible que ceux qui n'ont pas l'habitude de se servir de l'appareil que nous venons de décrire, s'effrayent de la grande quantité d'ouvertures qu'il faut fermer, & du temps qu'exigent les préliminaires d'expériences de cette nature. En effet, si l'on fait entrer en compte les peccées exactes qu'il est nécessaire de faire avant l'expérience & de répéter après, les préparatifs sont beaucoup plus longs que l'expérience elle-même. Mais aussi on est bien dédommagé de ses peines quand elle réussit, & on acquiert en une seule fois plus de connoissance sur la substance qu'on examine que par plusieurs semaines de travail assidu moins exact.

À défaut de bouteilles triplement tubulées, on se sert de bouteilles à deux goulots; il est même possible de mettre les trois tubes dans la même ouverture, & de se servir de bouteilles simples à goulots renversés, pourvu qu'ils soient assez grands; il faut ajuster à l'ouverture de ces bouteilles des bouchons qu'on use avec une lime douce,

douce, & qu'on fût tremper dans un mélange d'huile, de cire & de térébenthine. On perce dans ces bouchons avec une lime nommée *œgne de rat* (Voyez fig. 16 des instrumens pour diviser les corps, classe 4.) autant de trous que l'on veut y introduire de tubes. On voit un de ces bouchons représenté fig. 52, classe 6.

Il est bien à cas où on n'emploie pas l'appareil pneumatochimique, sur lequel nous reviendrons aux articles *CUIVE*, *CLOCHE*, &c. Il y a beaucoup d'opérations de chimie & de pharmacie dans lesquelles il ne se dégage point de gaz insolubles dans l'eau; telles sont les distillations des acides minéraux, de l'alcali volatil, &c. Quand on connoît les proportions des corps sur lesquels on opère, & le degré de dissolubilité des gaz qui doivent se dégager dans une opération, l'on peut aisément mettre la quantité d'eau nécessaire pour les absorber; mais quand ces données manquent, on ne peut établir que des à-peu-près, cependant on ne risque jamais rien d'ajouter plus d'eau qu'il n'en faut, en la divisant dans plusieurs bouteilles successives, au lieu de la mettre dans une seule, comme dans le cas premier. Par cette disposition, lorsque la première portion qui doit être plus forte que celle qui la suit & ainsi de suite, est saturée, le gaz surabondant passera dans la seconde & ne sera pas perdu; il y a même un avantage à multiplier ainsi les vases contenant l'eau, parce que cette multiplicité de bouteilles forme une colonne plus haute, qui, en offrant plus de résistance au gaz, le fait dissoudre en plus grande quantité dans l'eau, & l'on obtient une combinaison plus concentrée, la température étant d'ailleurs la même.

Quand les matières que l'on traite ne réagissent point subitement à froid au moment de leur mélange, comme cela a lieu pour la préparation de l'acide nitrique, on se sert tout simplement d'une cornue ordinaire sans tubulures, & on n'ajoute au ballon que deux bouteilles, la première pour éviter l'absorption, & l'autre pour arrêter quelques vapeurs d'acide nitreux qui se forment pendant l'opération, & sur-tout vers la fin; c'est ici le ballon qui est le plus nécessaire, parce que l'acide nitrique ne se met point en gaz à la température de l'atmosphère.

Il seroit possible, à la rigueur, de se servir du tube, fig. 11, pour introduire un liquide dans une cornue non tubulée, même après que toutes les parties de l'appareil sont luttées; il faut pour cela que l'ouverture du ballon soit beaucoup plus large que le bec de la cornue, que l'on introduit le bec de la cornue dans un bouchon percé au milieu, que sur le bord du bouchon qui sépare le col de la cornue de la paroi interne de l'ouverture du ballon, on pratique un trou pour passer l'extrémité inférieure du tube, qui doit être courbé de manière à aller jusques dans la panse de la cornue, lorsque les choses sont disposées de cette manière,

on lute bien cette jointure, comme il a été dit plus haut, & l'on verse la liqueur dans l'entonnoir de ce tube, d'où elle passe dans la cornue comme par une tubulure. L'on peut donc ainsi faire passer de cornues tubulées, qui sont deux fois plus chères que les autres, même dans les opérations les plus délicates. Au lieu de cornue on emploie quelquefois un matras dans l'appareil de Woulfe; c'est sur tout lorsqu'on ne veut obtenir qu'un gaz sans mélange de liquides; l'appareil, fig. 50, des instrumens pour les distillations simples & pneumatochimiques, &c. en est un exemple.

On place dans le fourneau A le matras B, rempli à moitié des substances qui doivent y subir une altération, & dont le bec sort par la cheminée du fourneau; à l'ouverture de ce col sont adaptés deux tubes, l'un courbé en S C, qui s'élève dans l'atmosphère & qui porte un entonnoir à sa partie supérieure, est destiné à porter le liquide que l'on veut faire agir sur le corps mis d'avance dans le matras; l'autre deux fois courbé à angle droit D, communiquant à une petite bouteille E, au fond de laquelle il y a environ un ponce de haut d'eau, est destiné à porter le gaz qui sort du ballon dans les flacons *fig. h*. Les flacons sont ordinairement percés de quatre ouvertures, l'une (i) pour admettre le gaz qui vient du ballon, l'autre (k) qui doit en évacuer l'excédent, la troisième (l) qui est occupée par un tube de sûreté qui porte par en haut un entonnoir dont nous exposerons l'usage dans un moment, & la quatrième (m) est pratiquée sur le côté de leur partie inférieure, & doit être fermée par un bouchon de cristal. Lorsque cet appareil est ainsi monté, on peut continuer pendant plusieurs semaines & même pendant plusieurs mois d'y faire des opérations sans être obligé de le désaisir, on n'a simplement qu'à débiter la jointure du ballon, chaque fois qu'on veut y remettre de nouvelle matière; quand la liqueur des vases *fig. h* est saturée, ce que l'on apperçoit par plusieurs phénomènes différens, suivant la nature des substances sur lesquelles on opère, on ouvre le robinet (m), & on retire la liqueur, & ensuite on le remplit par le tube qui fuit en même-temps du tube de sûreté.

Ce seroit sur-tout dans les manufactures où l'on prépare des drogues en grand que cet appareil seroit utile, on s'épargneroit de cette manière beaucoup de peine, de temps & d'argent, sans compter que l'on est beaucoup moins sujet à casser les vases, accident qui est presque inévitable dans ces sortes de travaux. Pour les substances gazeuses peu dissolubles dans l'eau, tel que l'acide muriatique oxigéné, opération dans laquelle on est obligé d'employer une grande quantité d'eau, on est forcé d'en changer souvent pour ne pas perdre de gaz & de ne pas infecter les lieux & les personnes qui les voient, l'usage de cet appareil seroit encore excellent.

V v

Appareil pour l'acide muriatique oxigéné.

L'acide muriatique oxigéné ayant pris entre les mains de M. Berthollet un grand degré d'importance par son application au blanchissement des tissus végétaux, il fut nécessaire d'en préparer des quantités considérables; les vases ordinaires de la chimie étoient incapables de servir à sa préparation; on en chercha qui réuniroient à la fois une grande capacité, de la solidité & un prix modéré. On a d'abord employé à cet effet des tonneaux enduits intérieurement d'une légère couche de cire ou de suif, afin que l'action de l'acide muriatique ne s'épuisât pas, & qu'il s'y conservât toujours propre aux opérations auxquelles on le destinoit. Cet instrument quoique présentant une grande quantité de points de contact au gaz qui le traversoit, & que celui-ci fût fortement comprimé par la hauteur de la colonne d'eau qu'il contenoit, cependant il s'échappoit constamment dans l'atmosphère une portion de ce gaz qui ne s'étoit point dissoute en passant à travers l'eau.

M. Bonjour, élève de M. Berthollet, imagina de faire construire dans ces tonneaux plusieurs fonds percés à des endroits diamétralement opposés, afin que le gaz eût un plus long chemin à parcourir. Chaque planche à un petit tuyau de bois d'environ un pouce & demi de longueur, dont on dira l'usage tout-à-l'heure. L'orifice du mer en usage cet appareil, on fait descendre le tube de verre qui vient de la cornue ou du matras jusqu'au fond du tonneau; on le fait passer par une ouverture qui est pratiquée à sa partie supérieure, & on remplit le tonneau aux trois quarts d'eau. Après avoir bien luté les jointures du tube avec la cornue & le tonneau, on met le feu sous l'appareil, & le gaz en y arrivant fait refluer l'eau dans la partie supérieure, & s'amasse au-dessous de chaque diaphragme en une couche de la longueur des tuyaux de bois. Il présente donc une grande surface à l'eau, & est comprimé par une grande masse de ce liquide, au-dessus duquel il ne peut monter à cause de la disposition des fonds du tonneau; enfin on a porté dans cet appareil le dernier degré d'exactitude, en y adaptant une espèce de manivelle extérieure qui porte dans chaque division du tonneau un morceau de bois applati destiné à agiter la liqueur, & qui y produit en effet autant de mouvemens qu'on en fait faire à l'extérieur à la manivelle elle-même. A la partie inférieure de ce tonneau il y a un robinet par lequel on tire la liqueur quand on en a besoin, ou quand elle est saturée & qu'on veut recommencer l'opération.

Quoique cet appareil ait beaucoup d'analogie avec l'appareil de Woulfe qui a déjà été décrit, son utilité dans les arts de première nécessité, & quelques détails très-ingénieux qui y ont été ajoutés nous obligent d'en donner une explication complète.

La figure 46 représente un fourneau de réverbère ordinaire ABCD, ayant en B plusieurs ouvertures *f* dans sa circonférence, pour servir de cheminée; on a placé dans l'intérieur sur un bain de sable B, un matras C, dont le col passe au-dessus du fourneau à travers l'ouverture D qu'on achève de fermer avec de la terre. L'orifice F du col du matras est fermé par un bouchon de liège G au milieu duquel passe un tube H, qui communique de l'intérieur du matras B dans le vase intermédiaire K, où il traverse de même un bouchon de liège I, qui ferme une des trois tubulures de ce vase. Les bouchons de liège G I doivent être préparés d'avance & bien ajustés à chacune des extrémités du tube de communication H, qu'on dispose de manière à pouvoir le placer promptement lorsqu'on a fait le mélange dans le matras.

Le vase intermédiaire K, contient de l'eau environ le huitième de sa capacité, où l'on plonge un tube de sûreté L, pour empêcher l'absorption. Ce tube doit être assez élevé pour que le poids de l'eau qui y entrera par la pression du gaz, soit assez grand pour le faire passer dans le tonneau pneumatique *no 1*, par le tube de communication M qui y plonge jusqu'au fond, où il se recule horizontalement pour que la sortie du gaz se fasse sous la première des trois ouvertures en bois, où en grès (lorsqu'on peut s'en procurer) qui sont placées dans l'intérieur du tonneau l'une au-dessus de l'autre. O est une manivelle qui sert à faire tourner un agitateur E, dont le mouvement facilite la combinaison du gaz avec l'eau. P est une canule pour sortir la liqueur.

Figure 47. représente la partie supérieure du tonneau. QRS T sont 4 douves plus épaisses que les autres, & qui débordent intérieurement où elles sont entaillées de manière à recevoir les extrémités des deux barres U V en bois qui affermissent les fonds de chaque cuvette.

Figure 48. représente la coupe du tonneau pneumatique dans le milieu de son élévation. Chaque cuvette X est construite de manière à contenir le gaz à mesure qu'il sort en *g* du tube de communication M; il forme d'abord une couche sous la première cuvette, qui augmente jusqu'à ce qu'il passe par l'entonnoir Z, sous la seconde cuvette & ensuite sous la troisième; l'ouverture qui donne passage à l'agitateur E dans le milieu de chaque cuvette X est en forme d'entonnoir qui empêche le gaz de s'échapper le long de l'agitateur, lequel est formé de trois branches transversales P affermies chacune par un coin QRS; représentent une de ces branches dans le sens horizontal. Le tube T recourbé sert à retirer l'air atmosphérique qui est contenu sous chaque cuvette, après qu'on a rempli d'eau le tonneau pneumatique. Pour faire usage de ce tube, on introduit la partie recourbée au-dessous de chaque cuvette, comme on le voit en T, ensuite on souffle par l'extrémité V pour faire sortir l'eau

dedans le tube T V. Alors de dessous la cuvette il s'échapperaient.

Figure 49. représente un appareil dont on se sert communément pour la distillation de l'acide muriatique ordinaire. A est une cornue qu'on place dans un fourneau de réverbère; l'orifice du bec de cette cornue est fermé par un bouchon de liège B perce de deux trous, dans l'un desquels passe le tube D recourbé en E & terminé à la partie supérieure par un entonnoir F, au moyen duquel on introduit de l'acide sulfurique dans la cornue après y avoir introduit le muriate de soude; l'autre trou du bouchon B reçoit l'extrémité d'un tube G qui communique de la cornue dans le vase H à 3 tubulures contenant de l'eau environ $\frac{1}{2}$ de sa capacité, dans laquelle plonge un ruber de sûreté K pour empêcher l'absorption; ce vase communique à un second vase P par le moyen du tube N: ce second vase est à moitié plein d'eau, & il communique à un troisième vase où est le tube de sûreté, & ce dernier à un quatrième.

L'on conçoit facilement par ce que l'on a dit jusqu'ici, que l'appareil de Woulfe dans des mains intelligentes, peut prendre beaucoup de formes différentes, & servir à une foule d'usages divers, soit en augmentant, soit en diminuant le nombre des vases, soit en leur donnant des formes nouvelles, soit enfin en mettant dans les flacons des matières propres à retenir certains principes, à en purifier d'autres, & les obtenir chacun séparément.

Appareil pour la préparation du gaz hydrogène phosphoré.

L'appareil dont on se sert pour cette opération, est représenté figure 51, classe 6. C'est un tube de verre soufflé en boule à son extrémité A, courbé à angle droit en B à 3 ou 4 pouces de la boule; la branche perpendiculaire à la première, doit avoir une longueur plus ou moins grande relativement à l'épaisseur de la cuve dans laquelle il doit plonger par l'autre extrémité; on fait donc une courbure en C parallèle à la première; on ploye en demi-cercle l'extrémité descendante D, afin de pouvoir recueillir le gaz qui se dégagera en y posant une cloche. Il doit y avoir en B une ouverture qui s'élève verticalement & qui doit recevoir un petit bouchon de liège après qu'on y a introduit les matières.

Pour faire le gaz hydrogène phosphoré, voici comment on s'y prend. Comme cette opération est délicate à conduire nous demandons la permission d'entrer dans quelques détails à ce sujet, quoiqu'il ne soit pas entièrement de notre ressort. On commence par couper au fond de l'eau dans une assiette ou autre vase plat, le phosphore en petites morceaux; on les introduit dans la boule de l'appareil par une ouverture pratiquée en B on verse ensuite par la même ouverture la dissolution de po-

taffa caustique dans la boule qui doit en être remplie aux trois quarts. On bouche l'ouverture B avec un bouchon de liège; que l'on assujettit avec de la vessie mouillée.

Lorsque l'appareil est arrangé ainsi, on plonge son extrémité recourbée en demi-cercle dans une cuve remplie de mercure, on chauffe la boule qui contient le phosphore & l'alcali, à la flamme d'une bougie. Il faut dans le commencement de l'opération éloigner la bougie assez pour que les bulles qui se détachent du phosphore ne soient pas plus grosses que la tête d'une épingle, & qu'elles ne se succèdent pas trop promptement; par ce moyen on dilate par degrés l'air contenu au-dessus du mélange, & on l'évacue peu-à-peu; & on fait que les bulles de gaz hydrogène qui se dégagent, ne produisent en brûlant qu'un léger bruit qui ne permet pas au mercure de la cuve de remonter jusque dans l'appareil, comme cela arriveroit certainement sans cela. Il faut avoir soin aussi d'agiter l'appareil, qui doit être tenu avec la main, afin de l'approcher & de l'éloigner de la chaleur suivant la nécessité. Par cette agitation, les bulles de gaz hydrogène brûlent à mesure qu'elles arrivent dans l'air tant que celui-ci peut servir à leur combustion; lorsque tout l'air vital est consumé, le gaz hydrogène pousse devant lui le gaz azote résidu, & il le sort lui-même à travers le mercure dans l'air où il s'enflamme, c'est alors qu'il faut mettre une cloche sur l'extrémité de l'appareil pour le recueillir.

Appareil sans lut.

MM. Lavoisier & Séguin cherchant à éviter les inconvéniens que présente l'usage du lut dans les opérations de la chimie, & sur tout dans celles où les vaisseaux subissent un certain degré de chaleur, ont imaginé un appareil, à l'aide duquel on peut se passer de ce moyen de réunion entre les pièces d'un appareil. Il consiste dans une bouteille A, fig. 35, classe 6, des instrumens pour les distillations; elle est à double goulot; l'un interne b c, communique avec le dedans de la bouteille; l'autre externe d e, qui laisse un intervalle entre lui & le précédent, & qui forme tout autour une profonde rigole d b c e destinée à recevoir du mercure; c'est dans cette rigole qu'entre & s'ajuste le couvercle de verre B. Il a par en bas des échancrures pour le passage des tubes de verre destinés au dégagement des gaz; ces tubes au lieu de plonger directement dans la bouteille A comme dans les appareils ordinaires, se contournent auparavant pour s'enfoncer dans la rigole, & pour passer par-dessus les échancrures du couvercle B. Ils remontent ensuite pour entrer dans la bouteille en passant par-dessus les bords du goulot intérieur.

Il est aisé de voir que lorsque les tubes ont été mis en place, que le couvercle B a été solidement assujetti, & que la rigole d b c e a été remplie de

mercure, la bouteille se trouve fermée & ne communique plus à l'extérieur que par les tubes. Pour ne faire entrer en aucune manière le lut gras, ni tout autre espèce de lut, M. Lavoisier propose de se servir de cornues jointes hermétiquement avec le récipient; on voit même *figure* un appareil monté d'après les principes qu'on vient d'exposer.

Si cette manière d'intercepter la communication de l'air d'avec l'intérieur des appareils, a quelques avantages sur les autres, elle a cependant ses inconvénients. 1°. Les vases qui y sont nécessaires sont d'une forme assez difficile à exécuter, & par conséquent sont beaucoup plus chers que les vases ordinaires; 2°. le mercure qui sert de lut est une matière précieuse qui augmenteroit beaucoup le prix des expériences par la perte continuelle & indispensable qu'on en feroit; 4°. il ne peut être employé que dans les opérations où les gaz formés n'ont point d'action sur le mercure; 5°. quoique M. Lavoisier ait dit que le lut gras se fond à une forte chaleur, le mercure est aussi sensible à fondaison & il se volatilise; 6°. il faut que le couvercle B soit assujéti par une force égale, à la résistance qu'opposeroient les liqueurs des flacons, l'eau de l'appareil pneumatochimique & le poids du mercure qui cherche à l'élever à la surface. On voit donc qu'en total, cet appareil a au moins autant de défauts que ceux dont on se sert communément, & qu'il ne sera employé que dans quelques opérations rares. 7°. Ces couvercles conservent une portion d'air commun qui se mêle avec le produit & en altère la pureté, & complice le résultat si l'on cherche de l'exactitude.

Appareil de Boerhaave.

Cet appareil, *figure 11* est composé d'un petit pied de bois A qui porte un gobelet élevé B. A la partie supérieure du pied de bois, est une échancrure dans laquelle marchent horizontalement deux branches de cuivre CC, qui supportent à angle droit chacune une tige de cuivre DD, qui se divisent à leur partie supérieure en deux bras EE, percés pour recevoir des vis. Ces vis sont destinées à retenir les deux bouteilles FF, en s'enfonçant dans un petit trou qu'elles ont dans l'anneau placé à leur col.

Quand on veut se servir de cet appareil, on le place sur la platine de la machine pneumatique, on le couvre d'une cloche garnie d'une boîte à cuir, cuir, traversée par une tige de cuivre à l'extrémité de laquelle est vissé un croissant. Le vuide ayant été fait, on place dans le vuide du mercure, une matière d'où l'on veut extraire un fluide élastique quelconque, on enfonce la tige du croissant dans la cloche, on comprend dans le croissant, le col de la bouteille remplie d'un liquide approprié à l'expérience, & dont le point de suspension est mobile; on incline le bec de la bouteille sur le

goutet, & le liquide tombe sur la substance effervescente. En partant d'un vuide connu, on connoît plus exactement par le moyen de cet appareil, que par ceux de l'air la quantité de fluide élastique produit ou simplement dégazé. Mais s'il est plus facile de l'apprécier dans cette expérience qui ne peut être faite que sur des matières effervescentes, il n'est pas aussi aisé d'isoler le fluide élastique, & de le débarrasser à part pour l'examiner. Ainsi cette méthode ne peut non plus servir qu'à démontrer la vérité générale d'un air, sans pouvoir être appliqué aux vérités particulières qui doivent en découler. Ces expériences, & les appareils qui y servent, avoient été imaginés dans un temps où la plus grande partie des savans ne faisoient point entrer l'air dans la composition des corps, où ils ne pensoient qu'à la matière de la chaleur, au phlogistique, à la terre, &c. Et malgré les belles expériences de Hales, de Vanhelmont, de Boerhaave, la doctrine du phlogistique qui fut soutenue avec beaucoup d'adresse par Stahl, son inventeur, eût le dessus & l'emporta, en entraînant par son attrait tous les chimistes & les physiciens.

Appareil pour les fermentations alcooliques.

Les hommes en observant les phénomènes naturels qui se passent sous leurs yeux, ont cherché à en approfondir les causes, d'abord par le raisonnement simple, mais cette voie les a souvent conduits à l'erreur; ensuite par l'imitation de la nature, en reproduisant, par l'expérience, les phénomènes analogues; pour les mieux examiner, & avoir des données plus certaines pour arriver à la démonstration. C'est par cette dernière méthode qu'on est parvenu à connoître, si non parfaitement au moins en grande partie, la cause, les phénomènes & les résultats de la fermentation & de la destruction des êtres organiques. Un grand nombre de savans se sont occupés de cette partie essentielle de la chimie, & chacun avec les instrumens particuliers; mais comme jusqu'à nos jours ces moyens n'ont découvert aucune vérité fondamentale sur la nature des matières organiques, nous passerons immédiatement à ceux qui ont été employés avec succès à ce genre d'opérations, & qui ont tout-à-coup jeté une lumière éclatante sur la composition des substances végétales animales. C'est à MM. Lavoisier & Berthollet & Fourcroy, que sont véritablement dus ces appareils ingénieux.

Je ne décrirai l'appareil de M. Lavoisier, qui réunit à lui seul, tout ce que ceux qui ont été inventés auparavant, avoient d'utile.

Cet appareil, *figure 16*, est composé de six instrumens pour les distillations simples &c., est formé d'un matras A plus ou moins grand, suivant la quantité de matière que l'on veut analyser; d'une virole *ab* de cuivre qui y est solidement matiquée, & dans laquelle se vitte un tuyau coudé *c d* garni d'un robinet *e*

à ce tuyau s'adapte une espèce de récipient de verre à trois pointes B, au dessous duquel est placée une bouteille C, à laquelle il communique. A la suite du récipient il est un tube de verre ghi, muni d'un bouchon en g & en i avec des viroles de cuivre : il est destiné à recevoir un sel concret très-déliquescent, tel que du nitrate de chaux, ou du muriate de chaux, de l'acétite du potasse, &c.

Enfin succèdent à ce tube deux bouteilles DE remplies jusqu'en xy d'alcali dissout dans l'eau, & bien dépouillé d'acide carbonique.

Toutes les parties de cet appareil, sont réunies les unes avec les autres par le moyen de vis & d'écrous qui se serrent. Les jointures sont garnies de cuir gras qui empêche le passage de l'air. Enfin chaque pièce est garnie de deux robinets, de manière qu'on peut la fermer par ses deux extrémités, & poser ainsi chacune séparément à toutes les époques de l'expérience que l'on juge à propos. C'est dans le ballon A qu'on met la matière fermentescible, du sucre par exemple & de la levure de bière délayée d'eau, & dont le poids est bien déterminé. Quelquefois la fermentation est trop rapide, il se forme une quantité considérable d'écume, qui non-seulement rompt le col du ballon, mais qui passe dans le récipient B, & coule dans la bouteille C. C'est pour recueillir cette mousse & empêcher qu'elle ne passe dans le tube déliquescent, que M. Lavoisier a donné une capacité considérable au récipient B, & à la bouteille C.

Il ne se dégage dans la fermentation du sucre, c'est-à-dire dans la fermentation vineuse, que de l'acide carbonique, qui emporte avec lui un peu d'eau, qu'il tient en dissolution. Il en dépose une grande partie en passant dans le tube ghi qui contient un sel déliquescent en poudre grossière, & l'on en connoît la quantité par l'augmentation de poids acquis par le sel. Ensuite l'acide carbonique passe à travers la liqueur alcaline de la bouteille D, dans laquelle il est conduit par le tube klm ; la petite portion qui n'a point été absorbée par l'alcali contenu dans cette première bouteille n'échappe point à la seconde E, & ordinairement il ne parvient absolument rien sous la cloche F, si ce n'est l'air commun qui étoit contenu au commencement de l'expérience dans la capacité des vaisseaux.

Le même appareil peut servir également pour les fermentations putrides, mais alors il passe une quantité considérable de gaz hydrogène par le tube grstu, lequel est reçu dans la cloche F, & comme le dégagement est rapide sur-tout en été, il faut changer fréquemment de cloche. D'où l'on voit que cette opération exige une surveillance continuelle, tandis que la fermentation des matières végétales n'en demande que très-peu.

Au moyen de cet appareil on peut connoître avec précision le poids des matériaux mis à fermenter, & celui de tous les produits liquides ou aériformes qui se sont dégagés. On peut voir les

détails dans lesquels M. Lavoisier est entré sur le résultat de la fermentation vineuse, dans le chapitre XIII de la première partie de son ouvrage, page 139.

Appareil pour brûler le phosphore.

On prend un grand ballon de verre blanc ou de cristallin A, figure 4, classe 7, des instrumens pour la combustion, dont l'ouverture EF, doit avoir 2 pouces & demi à 3 pouces de diamètre. Cette ouverture se recouvre avec des plaques de cuivre jaune ou laiton nité à l'émery, & qui est percé de deux trous pour le passage des tuyaux xxx, yyy. Avant de fermer l'ouverture du ballon, on introduit dans son intérieur un support BC, surmonté d'une capsule D de porcelaine, sur laquelle on place le phosphore. On lute ensuite la plaque de cuivre au ballon EF, avec du lut gras, qu'on recouvre avec des bandes de linga imbibées de blanc d'œuf & de chaux.

On laisse sécher pendant plusieurs jours, & on pèse le tout avec une bonne balance. Ces préparatifs achevés, on adapte une pompe pneumatique au tuyau xxx, & on fait le vide dans le ballon, ensuite on introduit du gaz oxygène par le tuyau yyy, au moyen de gazomètre. Alors on allume le phosphore avec un verre ardent, & on le laisse brûler jusqu'à ce que la nuée d'acide phosphorique concret qui se forme arrête la combustion. On délute, & on pèse le ballon ; son poids, diminué de celui du lut, donne celui de l'acide phosphorique forme qu'il contient.

Il est bon pour plus d'exactitude, d'examiner l'air ou le gaz contenu dans le ballon après la combustion, parce qu'il peut être plus ou moins pesant que l'air ordinaire, & qu'il faut tenir compte dans les calculs relatifs à l'expérience de cette différence de pesanteur.

Les corps donnent naissance à des phénomènes, & à des résultats différens, suivant les proportions dans lesquelles ils sont. C'est ainsi qu'à une température basse, le phosphore brûle tranquillement avec peu de chaleur & peu de lumière, & qu'il donne un acide particulier ; tandis qu'exposé à une chaleur plus élevée, il brûle avec une rapidité considérable, une flamme éclatante & une chaleur énorme, & que l'acide qui en résulte a des caractères spécifiques. Nous n'entre-rons point ici sur les causes & les résultats de ces deux opérations, ils seront exposés ailleurs.

Chacune de ces opérations demande un appareil approprié ; celui que nous avons décrit plus haut, quoique à la rigueur il puisse servir à l'une & à l'autre, ne sert le plus ordinairement qu'à la combustion vive.

Celui qui est employé à la combustion lente du phosphore, est très-simple & très-commode ; on en doit l'invention à M. Sage. Il consiste en un flacon A. figure 16 des instrumens pour la détonation &

la combustion B, placé fut un vase de fayance d'un pouce de profondeur; fut ce flacon est reçu un entonnoir C, dans lequel, il y a un bâton de phosphore; ces objets sont recouverts par une cloche D. Lorsque le tout est ainsi disposé, on met une certaine quantité d'eau dans la cuvette, afin de circonferire le phosphore dans une quantité déterminée d'air, & empêcher que l'air extérieur n'y ait accès, & qu'il ne puisse s'en échapper de vapeurs d'acide phosphorique.

Bientôt après que le phosphore est enfermé sous la cloche, on voit s'en détacher une fumée blanche, qui s'élève jusqu'au haut de cette cloche, à quelques distances des parois, & qui redescend en décrivant une courbe plus ou moins grande, suivant que l'est aussi le récipient; cette fumée retombe quelquefois dans l'entonnoir même, & souvent elle passe à côté & descend dans l'eau du récipient de fayance où elle se dissout. L'on peut faire changer de direction à cette fumée, & la faire tourner tout autour de la cloche, en occasionnant successivement à différents points de ce vase, un changement de température, soit en l'élevant soit en l'abaissant. Ce phénomène tout simple, paroît étonnant à ceux qui le voient pour la première fois, sur-tout quand on n'y applique que la chaleur de la main sans y toucher.

A mesure que le phosphore brûle, il se fait un vuide dans l'intérieur de la cloche, l'eau remonte dans la même proportion, jusqu'à ce que tout le gaz oxygène soit consumé. Il est essentiel que le volume de l'eau ne soit point plus grand que celui du gaz oxygène, parce que ce principe rentre à mesure qu'il est absorbé, & l'opération se fait spontanément sans qu'on y soit.

Quand l'air contenu dans la cloche, n'est pas suffisant pour brûler la masse de phosphore qu'on y a exposé, il ne s'agit point la faire continuer que d'enlever la cloche, & de réjandre le résidu pour prendre de nouvel air, & de la placer comme auparavant, & l'opération recommence de nouveau.

L'opération finie, on a dans le flacon A une liqueur claire, épaisse & onctueuse comme de l'huile, c'est ce que les chimistes modernes appellent acide phosphoreux, parce qu'il n'est point encore saturé d'oxygène. L'eau du sceau contient, si l'on a brûlé beaucoup de phosphore, une grande quantité d'acide, mais qui diffère du premier par un peu plus d'oxygène; en faisant évaporer l'eau, on l'obtient aussi concentré que le premier & même solide si l'on veut. Cet acide doit être conservé dans des vases exactement fermés, parce que sans cela il se convertirait peu-à-peu en acide phosphorique. Cet appareil, quoique très-simple & peu dispendieux, est susceptible pourtant de donner quelque précision dans les résultats. L'on peut en effet peser l'air resté après l'opération, l'acide formé & le phosphore s'il en reste, & connoître

conséquemment les proportions des principes qui constituent l'acide phosphorique.

Appareil pour la combustion de l'alcool.

La combustion de l'alcool peut à la rigueur se faire dans l'appareil qui a été décrit ci-dessus pour celle du phosphore. On place sous une cloche A, fig. 1, classe 7, des instrumens pour la combustion, une lampe remplie d'alcool, on attache à la même un atome de phosphore, qu'on allume avec un fer chaud recourbé, en le passant par-dessous la cloche; mais cette manière d'opérer est susceptible de grands inconvénients. Il seroit par exemple très-imprudent d'y employer du gaz oxygène, par la crainte de la détonation; on n'est pas même entièrement à l'abri de ce risque, lorsque l'on emploie de l'air atmosphérique, & M. Lavoisier en a fait une épreuve qui a pensé lui être funeste. Au lieu de préparer l'expérience au moment de la faire, il l'a voit disposée dans la veille, l'air atmosphérique contenu dans la cloche, avoit eu le temps de diffoudre de l'alcool: la vaporisation de ce corps avoit même été favorisée par la hauteur de la colonne de mercure qu'il avoit élevée en EE, fig. 1. En conséquence lorsqu'il alluma le phosphore, il se fit une détonation violente qui enleva la cloche, & la brisa en mille pièces contre le plancher du laboratoire. L'impossibilité de brûler l'alcool dans le gaz oxygène, fait qu'on ne peut agir que sur de très-petites quantités, & les erreurs que l'on peut commettre, jettent une grande incertitude sur la proportion des principes de l'alcool. M. Lavoisier a essayé de prolonger la durée de la combustion, en allumant la lampe d'alcool dans l'air ordinaire, & fournissant ensuite du gaz oxygène sous la cloche, à mesure qu'il se consumoit; mais le gaz acide carbonique qui se forme met obstacle à la combustion, parce que l'alcool est peu combustible, & ne brûle que très-difficilement dans un air moins pur que celui de l'atmosphère, il pense que cette combustion réussiroit peut-être dans l'appareil représenté fig. 8, classe 7, pour la combustion; mais il n'a pas encore osé l'y tenter. Le bocal A, où se fait la combustion, a environ 1400 pouces cubiques de capacité, s'il se faisoit une détonation dans un aussi grand vaisseau, elle pourroit avoir des suites dangereuses, dont il seroit difficile de se garantir.

Ce sont ces difficultés qui l'ont forcé jusqu'ici à n'opérer que sur de très-petites quantités d'alcool, ou bien de se servir de vaisseaux ouverts décrits par M. de Morveau.

Appareil pour la combustion de l'éther.

Quoique tous les essais, tous les efforts de M. Lavoisier pour imaginer un appareil propre à la combustion de l'éther, n'aient pas encore été suivis d'un succès complet, cependant nous croyons qu'il pourroit être utile de faire connoître la route

qu'il a tenue & le résultat auquel il est arrivé à cet égard, cela pourra guider les chimistes, & leur faire naître des idées nouvelles sur le perfectionnement de cet appareil.

Il avoit d'abord cru pouvoir profiter, pour cette combustion, de la propriété qu'a l'éther de se dissoudre dans l'air atmosphérique, & de brûler sans détonation; il a fait construire d'après cette idée un réservoir à éther *abc d*, *fig. 12, cl. 7*, auquel l'air du gazomètre est amené par un tuyau 1, 2, 3, 4, &c. air se répand d'abord dans un double fond pratiqué à la partie supérieure *ab* du réservoir. Là il se distribue par 7 tuyaux descendants *e*, *f*, *g*, *h*, *i*, *k*, &c. &c. La pression qu'il reçoit du gazomètre, l'oblige de bouillonner à travers l'éther contenu dans le vase *a*, *b*, *e*, *d*.

On peut, à mesure que l'éther est ainsi dissous & emporté par l'air, en rendre au réservoir *abc d*, au moyen d'un réservoir supplémentaire *E*, porté par un tuyau de cuivre *o*, *p*, de 15 à 18 pouces de haut, & qui se ferme au moyen d'un robinet; il a été obligé de donner une assez grande hauteur, à ce tuyau, afin que l'éther contenu dans le flacon *E* puisse vaincre la résistance occasionnée par la pression exercée par le gazomètre.

L'air ainsi chargé de vapeurs d'éther est repris par le tuyau 5, 6, 7, 8, 9, & conduit dans le bocal *A*, où il s'échappe par un adjutoir très fin à l'extrémité duquel on allume, ce même air, après avoir servi à la combustion, passe par la bouteille *figure 16, cloffe 8*, par le serpent 17 & 18 & par le tube deliquescent où il dépose l'eau dont il s'étoit chargé; le gaz acide carbonique est ensuite absorbé par l'alcali contenu dans la bouteille 22 & 23, même *figure*.

Il supposoit, lorsqu'il a fait construire cet appareil, que la combinaison d'air atmosphérique & d'éther qui s'opère dans le réservoir *abc d*, *fig. 12, cl. 7*, étoit dans la juste proportion qui convient à la combustion, mais il s'est aperçu de son erreur, en observant qu'il y avoit un excès d'éther très-considérable, & qu'il falloit en conséquence une nouvelle combinaison d'air atmosphérique pour opérer la combustion totale. Il en résulte qu'une lampe construite de cette manière brûle dans l'air ordinaire qui fournit la quantité d'oxygène manquante pour la combustion, mais qu'elle ne peut brûler dans les vaisseaux où l'air ne se renouvelle pas. Aussi la lampe s'éteignoit-elle peu de temps après qu'elle étoit renfermée dans le bocal *A*, *fig. 12*. Pour remédier à cet inconvénient, il a essayé d'amener à cette lampe de l'air atmosphérique par un tuyau latéral 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15, & il le distribue circulairement autour de la mèche; mais quelque léger que fût le courant d'air, la flamme étoit si mobile, & se tenoit si peu à la mèche, qu'il suffisoit pour la souffler, en sorte qu'il n'a point encore pu réduire à la combustion de l'éther. Il ne désespère cependant pas d'y parvenir, au

moyen de quelques changemens qu'il lui fasse à cet appareil.

Appareil pour la combustion des huiles.

Les huiles étant composées de plusieurs principes, elles ont demandé pour brûler & pour fournir des résultats exacts, des appareils plus compliqués que le charbon, le phosphore, qui sont des êtres simples.

L'appareil dont se sert M. Lavoisier pour cette opération, est formé d'un grand bocal *A*, *fig. 9, cl. 7*, & de son couvercle, *fig. 10, cl. idem*. Ce bocal est garni d'une virole de fer BCDE, qui s'applique exactement sur le bocal en DE, & qui y est solidement mâtiquée. Cette virole prend un plus grand diamètre en BC, & laisse entre elle & les parois du bocal un intervalle ou rigole *xxxx*, qu'on remplit de mercure. Le couvercle représenté *fig. 10*, a de son côté en *fg* une virole de fer qui s'ajuste dans la rigole *xxxx* du bocal, & qui plonge dans le mercure.

Le bocal *A* peut par ce moyen se fermer en un instant hermétiquement & sans lut; & comme la rigole peut contenir une hauteur de mercure de deux pouces, on voit qu'on peut faire éprouver à l'air contenu dans le bocal, une pression de plus de deux pieds d'eau, sans risquer qu'elle surmonte la résistance du mercure.

Le couvercle, *figure 10*, est percé de 4 trous destinés au passage d'un égal nombre de tuyaux. L'ouverture *F* est d'abord garnie d'une boîte à cuir, à travers laquelle doit passer la tige représentée, *fig. 11, cl. idem*. Cette tige est destinée à remonter ou à descendre la mèche de la lampe, comme je l'expliquerai ci-après; les trois autres trous *h i k*, sont destinés savoir, le premier au passage du tuyau qui doit amener l'huile; le second, au passage du tuyau qui doit amener l'air à la lampe pour entretenir la combustion; le troisième, au passage du tuyau qui doit donner issue à ce même air, lorsqu'il a servi à la combustion.

La lampe destinée à brûler l'huile dans le bocal, est représentée séparément, *fig. 12, cl. idem*. On y voit le réservoir à l'huile avec une espèce d'enroulement par lequel on le remplit, le syphon *b c d e f g h*, qui fournit l'huile à la lampe, le tuyau 7, 8, 9, 10, qui amène l'air du gazomètre à la même lampe.

Le tuyau *b c* est tarabudé extérieurement dans sa partie inférieure *b*, & se visse dans un écrou contenu dans le couvercle du réservoir, on peut le faire monter ou descendre, & amener l'huile à la lampe, au niveau où on le juge à propos.

Quand on veut remplir le syphon, & établir les communications entre l'huile du réservoir *a* & celle de la lampe 11, on ferme d'abord le robinet *c*, on ouvre celui *e*, & on verse de l'huile par l'ouverture *f*, qui est au haut du syphon. Dès qu'on voit paraître l'huile dans la lampe 11, à un niveau convenable, c'est-à-dire, à 3 ou 4 lignes des bords,

on ferme le robinet *k* ; on continue à verser de l'huile par l'ouverture *e*, pour remplir la branche *bcc*. Quand elle est remplie, on ferme le robinet *f*, & alors les deux branches du siphon étant pleines d'huile sans interruption, la communication du réservoir à la lampe est établie. La figure 13, c. *idem*, représente la coupe de la lampe profilée pour rendre les détails plus frappans & plus sensibles. On y voit le tuyau *ic* qui apporte l'huile *aaaa*, la capacité qu'occupe la mèche *g* & *io*, le tuyau qui apporte l'air à la lampe. Cet air se répand dans la capacité *ddda* ; puis il se distribue par le canal *cccc* & par celui *bbb*, en dedans & en dehors de la mèche, à la manière des lampes d'Argand, Quinquet & Lange.

Pour mieux faire connoître l'ensemble de cet appareil, & pour que sa description même rende plus facile l'intelligence de tous les autres de même genre, on l'a représenté tout entier en perspective, fig. 8, c. *idem*. On y voit le gazomètre *a* qui fournit l'air ; l'ajutage *i* & *2* par lequel il sort, & qui est garni d'un robinet *1, 2* & *3*, un tuyau qui communique de ce premier gazomètre à un second que l'on emplit, pendant que le premier se vuide, afin que l'émission de l'air se fasse sans interruption ; pendant tout le temps que doit durer l'opération ; *4* & *5* un tube de verre plein d'un sel deliquescent, en morceaux médiocrement gros, afin que l'air, en se distribuant dans les interstices, y dépose une grande partie de l'eau qu'il tenoit en dissolution. Comme on connoît le poids du rubs & celui du sel deliquescent qu'il contient, il est toujours facile de connoître la quantité d'eau qu'il a absorbée.

Du tube *4* & *5* que M. Lavoisier a nommé *tube alléguant*, l'air est conduit à la lampe *11* par le tube *5, 6, 7, 8, 9, 10*. Là il se divise : une partie vient alimenter la flamme par dehors, l'autre par dedans, à la manière des lampes d'Argand. Cet air dont une partie a servi à la combustion de l'huile, en l'oxygénant forme avec elle du gaz acide carbonique & de l'eau. Une partie de cette eau se condense fur les parois du bocal *A*, une autre partie est tenue en dissolution dans l'air par la chaleur de la combustion ; mais cet air qui est poussé par la pression qu'il reçoit du gazomètre, est obligé de passer par le tuyau *12, 13, 14* & *15*, d'où il est conduit dans la bouteille *16* & dans le serpentin *17* & *18*, où l'eau achève de se condenser, à mesure que l'air se refroidit. Enfin si quelque peu d'eau restoit encore en dissolution dans l'air, elle seroit absorbée par le sel deliquescent contenu dans le tube *19* & *20*.

Toutes les précautions qu'on vient d'indiquer, n'ont d'autre objet que de recueillir l'eau qui s'est formée, & d'en déterminer la quantité ; il reste ensuite à évaluer l'acide carbonique & le gaz azote. On y parvient au moyen des bouteilles *21* & *25* qui ont à moitié pleines de potasse en liqueur, & de potasse d'acide carbonique par la chaux. L'air

qui a servi à la combustion est conduit par les tuyaux *20, 21, 23* & *24*, & il y dépose le gaz acide carbonique qu'il contient. On n'a représenté dans cette figure pour la simplifier que deux bouteilles remplies de dissolution de potasse ; mais il en faut beaucoup davantage, & M. Lavoisier croit qu'on ne peut pas en employer moins de neuf. Il est bon de mettre dans la dernière de l'eau de chaux, qui est le réactif le plus sûr, pour reconnoître l'acide carbonique. Si elle ne le trouble pas, on peut être assuré qu'il ne rest. pas de gaz acide carbonique dans l'air, du moins en quantité sensible. Il ne faut pas croire que l'air qui a servi à la combustion lorsqu'il a traversé les neuf bouteilles ne contient plus que du gaz azote ; il est encore mêlé d'une assez grande quantité de gaz oxygène qui a échappé à la combustion. On fait passer ce mélange à travers un sel deliquescent contenu dans le tube *28* & *29*, afin de le dépouiller d'eau qu'il auroit pu dissoudre en traversant les bouteilles de potasse & d'eau de chaux. Enfin on conduit le résidu d'air à un gazomètre par le tuyau *29* & *30* ; on en détermine la quantité, on prend des échantillons qu'on essaye par le sulfure de potasse ou par le phosphore, à la manière de M. Secuin, comme nous le terons connoître au mot EUDIOMETRE, & on fait par la quantité du résidu la quantité de gaz oxygéné qui étoit contenu dans le gaz azote.

On fait que dans la combustion des huiles la mèche se charbonne au bout d'un certain temps & qu'elle s'obstrue. Il y a d'ailleurs une longueur déterminée de mèche qu'il faut attendre, mais qu'il ne faut pas outrepasser, sans quoi il monte par les tuyaux capillaires de la mèche plus d'huile que le courant d'air n'en peut consumer, & la lampe fume ; il étoit donc nécessaire qu'on pût allonger ou raccourcir la mèche de dehors & sans ouvrir l'appareil ; c'est à quoi M. Lavoisier est parvenu au moyen de la tige *31, 32, 33* & *34* qui passe à travers une boîte à cuir & qui répond au porte-mèche. On donne à cette tige un mouvement très-doux, au moyen d'un pignon qui engraine dans une crémaillère. On voit cette tige & ses accessoires représentés séparément, fig. 11, classe *id.* Il a semblé à M. Lavoisier qu'en enveloppant la flamme de la lampe avec un petit bocal de verre ouvert par les deux bouts, la combustion en alloit mieux ; ce bocal est en place dans la fig. 8, classe *id.* Lorsqu'on veut opérer avec cet appareil, on commence par peser la lampe avec son réservoir & l'huile qu'elle contient, on la met en place, on l'allume, on place le bocal *A* après avoir donné de l'air en ouvrant le robinet ; on assujéti ce bocal au moyen d'une petite planche *BC*, sur laquelle il repose, & de deux riges de fer qui la traversent & qui se visent au couvercle. Il y a de cette manière un peu d'huile brûlée pendant qu'on ajuste le couvercle, & l'on en perd le produit ; il y a également une petite portion d'air qui s'échappe du gazomètre, & qu'on peut

peut recueillir ; mais ces quantités sont peu considérables dans des expériences en grand.

M. Lavoisier annonce que cet appareil n'est point encore porté à son point de perfection, qu'il renferme quelques difficultés qu'il doit faire connoître ainsi que des moyens de les lever. Ces difficultés ne lui ont pas encore permis d'obtenir des résultats rigoureux sur la proportion des principes des huiles.

Appareil pour la combustion du charbon.

Les motifs qui ont engagé M. Lavoisier à construire un appareil particulier pour la combustion du phosphore, l'ont également déterminé à l'égard du charbon.

Cet appareil consiste en un petit fourneau conique fait en cuivre battu, représenté en perspective fig. 20, classe 7, & vu intérieurement, fig. 21, même classe. On y distingue le fourneau, proprement dit, ABC, où doit se faire la combustion du charbon, la grille *de* & le cendrier F. Au milieu du fourneau est un tuyau GH, par lequel on introduit le charbon, & qui sert en même-temps de cheminée pour évacuer l'air qui a servi à la combustion.

C'est par le tuyau *lmn* qui communique avec le gazomètre, qu'est amené l'air qui est destiné à entretenir la combustion ; cet air se répand dans la cavité du cendrier F, & la pression qui lui est communiquée par le gazomètre l'oblige à passer par la grille *de* & à souffler les charbons qui sont posés immédiatement dessus.

Le gaz qui entre pour les 0,28 ou à-peu-près dans la composition de l'air de l'atmosphère, se convertit, comme l'on sait, en gaz acide carbonique dans la combustion du charbon. Le gaz azote au contraire ne change point d'état ; il doit donc rester après la combustion un mélange de gaz azote & de gaz acide carbonique. Pour donner issue à ce mélange on a adapté à la cheminée GH un tuyau *op* qui s'y vifie en G, de manière à ne laisser échapper aucune portion d'air. Le mélange des deux gaz est conduit par ce tuyau à des bouteilles remplies de potasse en liqueur & bien dépouillée d'acide carbonique, à travers laquelle il bouillonne ; le gaz acide carbonique est absorbé par la potasse & il ne reste que du gaz azote, qu'on reçoit dans un second gazomètre pour en déterminer la quantité. Une des difficultés qui présente l'usage de cet appareil, est d'allumer le charbon & de commencer la combustion. Voici le moyen que donne M. Lavoisier pour y parvenir. Avant d'emplit de charbon le fourneau ABC, on en détermine le poids avec une bonne balance, & de manière qu'on soit sûr de ne point commettre une erreur de plus d'un ou deux grains ; on introduit ensuite dans la cheminée GH le tuyau RS, fig. 22, dont le poids doit

avoir été bien déterminé. Ce tuyau est creux & ouvert par les deux bouts ; son extrémité S doit descendre jusqu'au fond du fourneau ; elle doit porter sur la grille (*de*), & l'occuper toute entière. Ce n'est qu'après que le tuyau RS a été ainsi placé qu'on introduit le charbon dans le fourneau. On le pèse alors de nouveau pour connoître la quantité de charbon qui y a été introduite ; ces travaux préliminaires achevés, on met en place le fourneau, on vifie le tuyau *emn*, fig. 20, avec celui qui communique avec le gazomètre ; on vifie le tuyau *op* avec celui qui conduit aux bouteilles remplies de potasse ; enfin au moment où l'on veut commencer la combustion on ouvre le robinet du gazomètre, & on jette un petit charbon allumé par l'extrémité R du tuyau RS. Ce charbon tombe sur la grille où le courant d'air le maintient allumé. Alors on retire promptement le tuyau RS, on vifie à la cheminée le tuyau *op*, destiné à évacuer l'air, & on continue la combustion. Pour s'assurer qu'elle est vraiment commencée & que l'opération a réussi on ménage un tuyau *grs*, garni à son extrémité S d'un verre mastiqué, à travers lequel on peut voir si le charbon est allumé. Il faut observer que ce fourneau & ses dépendances sont plongés dans une espèce de baquet allongé TVXY, fig. 23, qui est rempli d'eau & même de glace, afin de diminuer autant que l'on veut la chaleur de la combustion.

Cette chaleur au reste n'est jamais très-vive, parce qu'il ne peut y avoir de combustion qu'en proportion de l'air qui est fourni par le gazomètre, & qu'il n'y a d'ailleurs de charbon qui brûle que celui qui porte immédiatement sur la grille. A mesure qu'une molécule de charbon est consumée, il en retombe une autre en raison de l'inclinaison des parois du fourneau ; elle se présente au courant d'air qui traverse la grille *de*, & elle brûle comme la première.

Quant à l'air qui a servi à la combustion, il traverse la masse qui n'a pas encore brûlé, & la pression exercée par le gazomètre l'oblige de s'échapper par le tuyau *op*, & de traverser les bouteilles remplies d'alcali.

Par ce bel appareil de M. Lavoisier, on peut avoir toutes les données nécessaires pour l'analyse complète du charbon. En effet, on connoît le poids du charbon, on a par le moyen du gazomètre la mesure de la quantité d'air employé à la combustion. On peut déterminer la qualité & la quantité de celui qui reste après la combustion ; on a le poids de la cendre qui s'est rassemblée dans le cendrier ; enfin l'augmentation de poids de la liqueur des bouteilles qui contiennent la potasse en liqueur, donne l'acide carbonique qui s'est formé. On peut également connoître avec beaucoup de précision par cette opération la portion de carbone & d'oxygène dont cet acide est composé.

X x

Appareil pour la combustion du fer dans le gaz oxygène.

Cet appareil (figure 14) dû à M. Ingenhouz, est composé simplement d'une bouteille D E F G. Pour opérer la combustion du fer dans cet appareil, on prend un bout de fil de fer très-fin B C, tourné, en spirale, on fixe à l'une de ses extrémités B dans un bouchon de liège A, destiné à boucher la bouteille D E F G. On attache à l'autre extrémité un petit morceau d'amadou C. Les choses ainsi disposées, on emplit d'air vital la bouteille dont on vient de parler. On allume l'amadou C, puis on l'introduit promptement, ainsi que le fil de fer B C, dans la bouteille, & on la bouche, comme on le voit dans la figure que nous avons indiquée. Aussi-tôt que l'amadou est plongée dans l'air vital, le gaz oxygène la brûle avec un éclat éblouissant; elle communique le calorique au fer qui s'enflamme à son tour avec beaucoup d'activité, & en répandant à quelque distance de lui des portions de fer en étincelles brillantes, qui tombent après avoir brûlé en globules noirs au fond du vase. Pour éviter la fracture de la bouteille qui ne manquera pas d'avoir lieu par le contact des globules de fer chaud, il faut laisser au fond une colonne au moins d'un pouce de hauteur d'eau. Malgré cette masse refroidissante, il arrive souvent lorsqu'on brûle du fil de fer un peu gros, que les globules qui s'en détachent ont encore assez de chaleur après avoir traversé l'eau quelquefois très-froide, pour fondre la surface du verre, & s'enfoncer dans sa substance jusqu'à la moitié de leur volume.

Ces inconvénients ont obligé les personnes qui font des démonstrations de physique & de chimie de faire faire à la bouteille de verre un fond de métal, tel que du cuivre & du fer; par ce moyen on n'est point obligé de le renouveler si souvent.

Cette expérience est sujette à quelques inconvénients, dont il est bon qu'on soit prévenu; il se fait quelquefois une détonation à l'instant où l'on plonge l'amadou dans le gaz oxygène, & souvent l'appareil est brisé en éclats qui peuvent être à craindre. Pour éviter ces dangers il ne faut mettre qu'une très-petite quantité d'amadou, l'employer bien sec, & le laisser brûler un petit moment avant de le plonger dans l'air vital.

Il ne doit pas être question ici de la cause de cette détonation, on la trouvera ailleurs; il nous suffit d'avoir donné les moyens de la prévenir, quoiqu'elle soit rare.

II°. Appareil pour la combustion du phosphore.

On n'auroit jamais connu la nature des corps si l'on avoit toujours continué de les traiter dans le vague de l'atmosphère, où quelques-uns de leurs principes se répandoient, & où ils en prenoient

continuellement d'autres sans qu'on pût s'en apercevoir.

Ce n'étoit donc qu'en renfermant les corps dans une atmosphère bornée, & dans laquelle il fut permis de rechercher les changements arrivés à ces corps, ainsi qu'à l'air lui-même, que l'on parviendroit à connoître leur nature & le résultat des changements qu'ils se font éprouver réciproquement. C'est encore au célèbre Lavoisier que l'on doit la démonstration de cette sublime vérité chimique. C'est par cette logique, cette précision dans les expériences, & par une grande exactitude dans les instrumens, qu'il a découvert non-seulement la nature de l'air, de l'eau, des matières végétales & animales, mais qu'il a même déterminé le rapport de leurs principes.

Pour brûler du phosphore ou du charbon, on remplit de gaz oxygène dans l'appareil pneumatique à l'eau, fig. 21 et 6 une cloche de six pouces au moins de capacité. Lorsqu'elle est entièrement pleine, & que le gaz commence à sortir par-dessus, on transporte une cloche A sur l'appareil au mercure, fig. 7, classée des instrumens pour la combustion, à l'aide d'un vase de verre ou de faïence très-plat, qu'on passe par-dessous. Cette opération faite, on sèche bien avec du papier gris la surface du mercure, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la cloche. Cette opération demande quelques précautions: si, par exemple, on n'avoit pas l'attention de tenir le papier dont on se sert pour dessécher l'intérieur de la cloche, quelque temps profondément plongé dans le mercure, on porteroit dans le gaz oxygène une certaine quantité d'air commun, attaché à la surface du papier & entre ses molécules, & l'on auroit un faux résultat. On a d'un autre côté une petite capsule D de fer ou de porcelaine plate & évaisée, sur laquelle on place le corps que l'on veut brûler, après en avoir très-exactement déterminé le poids à la balance d'essai. On recouvre ensuite cette capsule d'une autre un peu plus grande P, qui fait à son égard, l'office de la cloche du plongeur, & on fait passer le tout à travers le mercure. Ensuite on retire à travers le mercure la capsule P, qui ne seroit que de couvercle, & qui nuirait dans la suite de l'opération. On peut éviter l'embarras & la difficulté de faire passer les matières à travers, en soulevant un des côtés de la cloche pendant un instant presque indivisible, & en introduisant ainsi par le passage qu'on s'est fait la capsule avec le corps combustible. Il se mêle dans cette seconde manière d'opérer un peu d'air commun avec le gaz oxygène; mais ce mélange est peu considérable, & ne nuit ni au succès ni à l'exactitude de l'expérience. Dans le cas où l'on se sert de la réunion des deux capsules, il y a aussi une portion d'air commun contenu dans leur capacité, qui est porté dans le gaz oxygène; il est vraisemblable que cette dernière méthode réunir plus de facilité & plus d'exactitude. Lorsque la capsule D y

fig. 1, classe 7, est introduite sous la cloche, on suce une partie du gaz oxygène que cette cloche contient pour élever le mercure jusqu'en E F. Sans cette précaution, dès que le corps combustible seroit allumé, la chaleur dilateroit l'air, elle en seroit fortir une portion par-dessous la cloche, & on ne pourroit plus faire aucun calcul sur les quantités. On se sert pour sucer l'air d'un siphon GHI, qu'on passe par-dessous la cloche; & pour qu'il ne se remplisse pas de mercure, on tortille à son extrémité I un petit morceau de papier non collé.

C'est un art que l'habitude seule peut apprendre que d'élever ainsi le mercure au-dessus de son niveau par la succion. Si on se bernoit dans cette opération à la force pulmonaire, on n'atteindroit qu'une médiocre élévation, par exemple, d'un pouce ou d'un pouce & demi au plus, encore n'y parviendrait-on qu'avec beaucoup de peine, tandis que par l'action des muscles de la bouche on peut élever, sans se fatiguer, le mercure à fix à sept pouces. Un moyen plus commode encore est de se servir d'une petite pompe qu'on adapte au siphon GHI; on élève alors le mercure à telle hauteur que l'on juge à propos, pourvu cependant qu'elle n'excede pas vingt-huit pouces; si le corps combustible est fort inflammable, comme le phosphore, on l'allume avec le fer recourbé MN, *fig. 3*, classe 7 des instrumens pour la combustion, &c., qu'on fait rougir au feu & qu'on passe promptement sous la cloche: dès qu'il a le contact du phosphore il l'allume. Pour les corps moins combustibles ou plutôt qui veulent être élevés à une température plus haute pour se combiner avec l'oxygène, on suit une méthode un peu différente. On place sur ces substances un petit morceau d'amadou sur lequel on fixe un atome de phosphore; on allume ce dernier avec le fer rouge; l'inflammation se communique à l'amadou, puis au corps combustible.

Dans le premier instant de la combustion l'air se dilate & le mercure descend; mais lorsqu'il n'y a point de fluide élastique formé, comme dans la combustion du fer, du phosphore, &c., l'absorption devient bientôt sensible. En conséquence il ne faut point brûler une très-grande quantité de phosphore ou de tout autre corps combustible dans une quantité donnée d'air. Car la capsule sur la fin de l'opération s'approcherait trop du dôme de la cloche, & pourroit en occasionner la fracture.

L'appareil que nous venons de décrire peut être employé avec succès pour la combustion de toutes les substances concrètes, & même pour celle des huiles fixes. On brûle ces dernières dans des lampes, & on les allume assez facilement par le moyen de l'amadou, du phosphore & du fer chaud; mais ce moyen n'est pas sans danger pour les substances qui sont susceptibles de se réduire en vapeurs à un degré de chaleur moyen, tel que l'éther, l'al-

cool & les huiles volatiles ou essentielles. Ces substances se dissolvent en assez grande quantité dans le gaz oxygène, de sorte que lorsqu'on les allume, il se fait quelque fois une détonation subite qui enlève la cloche à une grande hauteur & la brise en éclats. M. Lavoisier & plusieurs autres membres de l'académie, ont manqué d'être les victimes d'une expérience de cette nature.

Cette manière d'opérer a d'ailleurs un grand inconvénient: elle suffit bien pour déterminer la quantité de gaz oxygène absorbé, & celle de l'acide carbonique formé; mais ces produits ne sont pas les seuls qui se forment dans la combustion des matières végétales & animales; il se forme aussi de l'eau, parce qu'elles contiennent toutes de l'hydrogène, & cet appareil ne permet ni de la rassembler ni d'en déterminer la quantité. Enfin, pour l'acide phosphorique même, l'expérience est incomplète, puisqu'il est impossible de démontrer que le poids de l'acide est égal à celui du phosphore & de l'oxygène qui l'ont formé.

Ce sont toutes ces difficultés qui ont déterminé M. Lavoisier à varier les appareils relatifs à la combustion & à en employer de différentes combinaisons, dont nous allons présenter successivement la description.

Appareil pour la décomposition de l'eau.

Lorsque M. Lavoisier, par le raisonnement & quelques faits préliminaires, fut conduit à la connoissance des principes de l'eau, qui avoit été regardée avant lui par tous les philosophes comme un être simple, il crut devoir chercher les moyens de se démontrer cette vérité à lui-même & à tous les savans. En conséquence il imagina l'appareil *figure 18 bis*, de la classe I des instrumens & fourneaux, dont la description suit. C'est un canon de fusil dont on a oté la culasse; il doit être long & fort; on peut lorsqu'il est trop court y faire souder en soudure forte un bout de tuyau de cuivre. On place ce canon de fer dans un fourneau allongé C D E F, en lui donnant une inclinaison de quelques degrés d'E en F. On adapte à la partie supérieure E de ce tuyau une cornue de verre qui contient de l'eau, & qui est placée sur le fourneau V V X X; on le lute par son extrémité supérieure F avec le serpentín S S, qui se joint lui-même avec un flacon tubulé H, où se rassemble l'eau qui a échappé de la décomposition. Enfin le gaz qui se dégage est porté à la cuve, où il est reçu sous des cloches par le tube K K, adapté à la tubulure K du flacon H. Au lieu d'une cornue, on peut employer un entonnoir de fer blanc fermé d'un robinet par le bas, & par lequel on laisse tomber l'eau goutte à goutte. L'emploi de cet entonnoir nécessite la réunion d'un canal de cuivre au canon de fusil, qui s'élève dans l'atmosphère en décrivant une courbe, jusqu'à une ligne verticale.

M. Lavoisier desirant ne laisser aucune prise aux

objections qu'il sentoit bien qu'on ne manquera pas de lui faire, n'a rien négligé pour obtenir la plus grande précision dans ses résultats. On peut voir dans son mémoire publié parmi ceux de l'académie, quelles précautions il a pris pour peser les matières & les instrumens, pour écarter l'action des corps étrangers du tube de fer, & sur-tout celle de l'air tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, &c.

Dans plusieurs expériences où l'on veut démontrer l'action de l'eau sur d'autres matières, on est obligé de substituer au canon de fusil, ceux de verre, de cuivre & de porcelaine, mais les premiers ont l'inconvénient de se fondre facilement : les tubes de porcelaine sont la plupart percés d'une infinité de trous imperceptibles par lesquels le gaz s'échappe, sur-tout s'il est comprimé par une colonne d'eau.

Ce sont des défauts dans ces tubes qui ont déterminé M. Lavoisier à employer un tube de cuivre rouge que M. Labriche lui avoit fait fondre tout d'une pièce & forer sous ses yeux à Strasbourg. Ce tube est fort commode pour opérer la décomposition de l'alcool, qui se refout dans cette opération, en carbone, en acide carbonique & en gaz hydrogène. Il peut même servir à la décomposition de l'eau par le charbon & beaucoup d'autres corps.

Appareil pour les dissolutions métalliques.

La dissolution des métaux dans les acides, ne se fait pas de la même manière que celle des sels dans l'eau. Dans ces dernières combinaisons, il n'y a jamais qu'absorption ou dégagement de calorique, & expulsion de l'air contenu en dissolution dans l'eau qui y sert ; il n'est donc pas nécessaire d'employer d'appareils particuliers pour ces sortes d'opérations. Mais dans la dissolution des métaux par les acides, il y a ou décomposition d'une portion de l'acide même, ou de l'eau, ou de tous les deux à la fois, & une séparation des principes de ces corps ; comme dans cette séparation le principe mis à part, se réduit presque constamment à l'état de gaz, il a fallu des vaisseaux pour le recueillir, & en examiner la nature & la quantité. Dans toute dissolution métallique, il y a toujours transport de l'oxygène sur le métal, soit qu'il vienne de l'acide, soit de l'eau ou de tous les deux à la fois ; le métal augmente de poids & les matières dissolvantes diminuent dans la même proportion. Or, d'après cela, il est évident que dans les cas où les dissolutions métalliques se font aux dépens des acides, ces acides servent à deux usages, à oxidier le métal, & à le dissoudre quand il a pris la quantité d'oxygène qui lui est nécessaire ; que dans ceux où c'est l'eau qui fournit l'oxygène au métal, il faut toujours employer l'acide étendu d'eau, sans quoi il n'y auroit pas de dissolution.

MM. Cavendish & Priestley sont les premiers qui aient imaginé des appareils simples pour re-

cueillir les fluides élastiques qui se dégagent pendant les dissolutions des métaux dans les acides. Celui de M. Priestley consiste en une bouteille A, figure 13, classe 6, des instrumens pour les distillations simples &c. bouchée en B, avec un bouchon de liège troué dans son milieu, & qui laisse passer un tube de verre recourbé en BC, qui s'engage sous des cloches remplies d'eau, & renversées dans un bassin plein d'eau. On commence par introduire le métal dans la bouteille A, on verse de l'acide par-dessus, & puis on bouche avec le bouchon garni de son tube B. Cet appareil n'est pas sans inconvénient, du moins pour des expériences très-exactes. I remièrement lorsque l'acide est très-concentré, & que le métal est très-divisé, l'effervescence commence avant qu'on ait eu le temps de boucher la bouteille ; il se fait une perte de gaz, & l'on ne peut plus déterminer les quantités avec exactitude. Secondement, dans les opérations où l'on a besoin de chaleur extérieure, il y a une partie de l'acide qui se volatilise, & qui se mêle avec l'eau de la cuve ; ensuite qu'on se trompe dans le calcul des quantités d'acide décomposées. Troisièmement enfin, l'eau de la cuve absorbe tous les gaz qui sont susceptibles de se combiner avec l'eau, & il est impossible de les recueillir sans perte.

M. Lavoisier a imaginé pour remédier à ces inconvéniens, d'adapter à une bouteille à deux goulots A, figure 15, même classe, &c., un entonnoir de verre BC, qu'on y lute de manière à ne laisser aucune issue à l'air. Dans cet entonnoir, est une tige de cristal DE, usée en D à l'émeril avec l'entonnoir, de manière à le fermer comme le bouchon d'un flacon.

Lorsqu'on veut opérer, on met dans la bouteille A, la matière à dissoudre. On lute l'entonnoir, on le bouche avec la tige de cristal DE. puis on y verse de l'acide en aussi petite quantité que l'on veut en soulevant doucement la tige ; on répète successivement cette manœuvre jusqu'à ce qu'on soit arrivé au point de saturation.

On a employé depuis un autre appareil qui remplit le même objet, & qui dans certains cas est préférable. Il est formé d'une bouteille A, figure 14, même classe, à 3 tubulures, dans l'une desquelles on adapte un tube recourbé DEFG, terminé en D par une petite ouverture, & en G par un entonnoir toudé avec lui. On le lute solidement dans la tubulure C. Lorsqu'on verse une petite quantité de liqueur dans ce tube par l'entonnoir G, elle tombe dans la partie F ; si on en ajoute davantage, elle parvient à dépasser la courbure E, & à s'introduire dans la bouteille A. L'écoulement se fait tant qu'on fournit de nouvelle liqueur G. On conçoit qu'elle ne peut jamais être chassée hors du tube EFG, & qu'il ne peut jamais sortir d'air ni de gaz de la bouteille par le poids de liqueur dont la colonne doit toujours être plus haute, que celle

de l'eau de l'appareil pneumatique-chimique, lui empêche, & fait l'office d'un bouchon.

Pour remédier au second inconvénient de la distillation de l'acide qui s'opère sur-tout dans les dissolutions qui sont accompagnées de chalcure, on adapte à la cornue A, figure 6, un petit matras tubulé M, qui reçoit la liqueur qui se condense.

Enfin pour séparer les gaz absorbables par l'eau, tel que le gaz acide carbonique, on ajoute une bouteille L à 2 goulots, dans laquelle on met de l'alcali pur étendu d'eau, l'alcali absorbe tout le gaz acide carbonique, & il ne passe plus communément sous la cloche par le tube N O, qu'une ou deux espèces de gaz tout-à-plus. Si une bouteille d'alcali ne suffit pas, on en ajoute jusqu'à 3 & 4.

Appareil pour l'oxidation des métaux.

Avant que l'oxidation des métaux fût connue dans son résultat, il n'y avoit point d'appareil pour cette opération; on la faisoit au milieu de l'atmosphère, dans des vases de terre évasés; tels que des plats, des soucoupes, des réts à rôtir, &c., que l'on plaçoit dans un fourneau, comme on le voit figure 19, classe 1.

Ce ne fut que lorsqu'on s'aperçut que l'air étoit absolument nécessaire à la combustion ou à la calcination des métaux, que lorsqu'on avoit qu'une portion de cet élément se combinait avec le métal, & que le désir de connoître exactement ce qui se passoit dans cette opération, & quels étoient les changemens qu'éprouvoit l'air qui la favorise se fit sentir que les appareils ont pris naissance. C'est à M. Priestley que nous sommes redevables de la première idée à cet égard. Il mit le métal qu'il se proposoit d'examiner sur une capsule N, de porcelaine, fig. 7, classe des instrumens pour la détonation & la combustion, placée sur un support un peu élevé I K; il le recouvrit avec une cloche de cristallin A plongée dans un bassin plein d'eau B C D E, & il éleva l'eau jusqu'en G H, en suçant l'air de la cloche avec un siphon qu'on passe par-dessous. Il fit ensuite toucher sur le métal le foyer du verre ardent. Alors la température du métal s'éleva, son attraction pour la base de l'air augmenta, il enleva celle-ci au calorique qui le dissolvait, & cela continue ainsi jusqu'à ce qu'il y ait équilibre entre l'attraction des métaux pour l'oxygène & de celui-ci pour le calorique à la température où se fait l'opération. Le métal perd son aggrégation, il se réduit en une poussière qu'on a autrefois appelée chaux métallique, & qui porte aujourd'hui avec beaucoup plus de raison le nom d'oxide métallique. L'air devient incapable de servir à une nouvelle opération, si la quantité de métal qui y a brûlé est suffisante pour absorber la plus grande partie du gaz oxygène, il ne reste plus que le gaz azote, mêlé à la vérité d'une petite portion de gaz oxygène, parce que l'attraction du métal diminue à mesure qu'il se combine à ce principe; & celui-ci est d'autant moins facilement absorbé, qu'il

est retenu plus fortement par le gaz azote devenu prépondérant, par lequel il est environné de toutes parts. C'est avec cet appareil qu'on a commencé à connoître ce que c'étoit que l'oxidation ou la calcination des métaux, qu'on s'est aperçu que l'air entroit dans la composition des oxides métalliques, qu'il y avoit une partie de l'air qui ne s'y combinait pas, & que l'on a appelé air phlogistique, & aujourd'hui gaz azote, parce qu'il ne peut servir à la respiration. On a pu aussi comparer les proportions de métal, & de la base de l'air qui entrent dans chaque oxide métallique, par l'augmentation du métal, soit seule, soit réunie, avec la perte éprouvée de la part de l'air.

M. Lavoisier s'est quelquefois servi pour oxider les métaux, & sur-tout le mercure, de l'appareil figure 17, classe 7, des instrumens pour la détonation & la combustion; cet appareil est composé d'une cornue qu'il remplit de gaz oxygène, & dans laquelle il a mis une certaine quantité de mercure; il y adapte une vessie à moitié pleine de gaz oxygène, & il fait ensuite chauffer le mercure de la cornue & continuant long-temps l'opération, il est parvenu à en oxider une petite portion, en oxide rouge. La quantité d'oxide que M. Lavoisier a obtenu par ce moyen, étoit si petite, qu'il n'a pas cru devoir compter sur cet appareil pour apprécier la quantité d'oxygène qui se fixe dans le mercure pour le convertir en oxide rouge; il comptoit peu d'ailleurs sur l'imperméabilité de la vessie, quoiqu'il eût soin de la tenir humide par le moyen de linges mouillés.

On employe aussi pour oxider les métaux, & spécialement le mercure, d'une cornue A, figure 18, classe 7 des instrumens pour la détonation & la combustion, au bec de laquelle on a soudé un tuyau de verre recourbé B C D E, de 10 à 12 lignes de diamètre, qui s'engage sous une cloche F contenue & retournée dans un bassin plein d'eau ou de mercure, cette cornue est soutenue sur les barres d'un fourneau M M N N: on peut aussi se servir d'un bain de sable: on peut obtenir avec cet appareil en plusieurs jours un peu d'oxide de mercure dans l'air ordinaire; on peut même le recueillir & le réduire pour comparer les quantités de gaz oxygène obtenu avec celui absorbé pendant la calcination. Mais ces opérations n'ayant lieu que sur de très-petites masses, on ne doit guère compter sur des résultats rigoureux, car la plus petite erreur écarteroit beaucoup de la vérité lorsqu'on en feroit le rapport sur de grandes quantités.

APPAREILS. (Pharmacie.) Les appareils qui servent en pharmacie, sont les mêmes que ceux qu'on emploie pour les opérations de chimie, puisque cet art est fondé sur les principes de cette science. On y fait des fusions, des cristallisations, des dissolutions, des évaporations, des distillations, des sublimations, & tous les divers usens qui servent à ces opérations sont employés avec plus

ou moins d'exactitude en pharmacie comme en chimie ; seulement , comme on n'a pas besoin d'un résultat aussi exact , on n'est pas obligé d'avoir des appareils aussi bien faits & aussi soignés que pour les expériences de recherches. On trouvera aux différens articles qui concernent les opérations désignées ci-dessus , la description des appareils qui servent aux manipulations pharmaceutiques ; il n'y a pas ici la même raison que dans les articles de chimie , pour faire connoître une suite d'appareils particuliers , puisqu'on peut facilement en joindre l'exposé à celui des principes généraux qui doivent guider l'artiste dans les manipulations nécessaires à telles ou telles opérations pharmaceutiques.

On se contentera d'indiquer seulement ici quelques vérités générales dont l'application est essentielle au pharmacien , & dont la négligence peut nuire beaucoup aux progrès de son art.

1°. Un appareil étant l'ensemble , la disposition relative des vaisseaux & des utensiles qui servent à faire des opérations de pharmacie , on ne peut que gagner , pour mieux la comprendre & l'exécuter , à bien connoître les divers appareils dont on se sert en chimie. Les élèves en pharmacie doivent donc regarder comme une des bases de leur instruction , de demeurer & de travailler quelque temps dans un laboratoire de chimie en grande activité , de se rendre familier l'usage & l'art des appareils les plus difficiles au premier coup d'œil , mais souvent les plus utiles , pour parvenir au but qu'on se propose dans les opérations.

2°. Quoique les résultats qu'on veut obtenir en pharmacie soient différens de ceux que l'on cherche en chimie ; quoique d'après cela on n'ait pas besoin pour les opérations pharmaceutiques d'appareils aussi exacts que ceux qui sont aujourd'hui nécessaires pour les recherches chimiques , il y a cependant quelques appareils chimiques qui , transportés dans les laboratoires de pharmacie , peuvent y rendre de grands services , par la certitude de leur travail , la pureté des produits qu'ils font obtenir , la brièveté du temps qu'ils ménagent , & la sûreté qu'ils apportent dans les opérations. Tels sont l'appareil de Woulle , & l'absorption des gaz salins par l'eau , appliqués à la préparation de l'ammoniac ou alcali volatil , & l'acide muriatique.

3°. D'après les deux considérations précédentes , il n'est pas douteux qu'on doit attendre les plus grands avantages pour l'amélioration des opérations pharmaceutiques , de la connoissance exacte des différens appareils employés aujourd'hui dans les laboratoires de chimie , & sur-tout de la possession des ressources sans nombre que présentent les variétés de ces appareils , pour une seule des considérations qui peuvent offrir continuellement dans les procédés de la pharmacie. On doit donc regarder les descriptions insérées dans l'article précédent comme essentielles au pharmacien ; celui qui s'occupe du perfectionnement de cet art si important , doit lire & méditer ces descriptions.

Quant au détail des principaux appareils nécessaires pour les opérations pharmaceutiques , on les trouvera décrits soit dans les articles de chaque instrument , soit dans ceux des opérations.

4°. Malgré toutes les ressources que le pharmacien peut tirer des connoissances de tous les appareils de la chimie pour la préparation d'un grand nombre de composés pharmaceutiques ; il ne doit jamais perdre de vue qu'il y a entre la pharmacie & la chimie une différence essentielle , par rapport à l'emploi des appareils. En chimie , on a pour but d'obtenir des résultats nouveaux & parfaitement exacts ; on ne doit rien ménager pour remplir ce but , la cherté des appareils n'est pas un obstacle à leur emploi , & cette considération n'est jamais relative qu'aux moyens & à la fortune de ceux qui font les recherches. En pharmacie , au contraire , c'est pour les autres que l'on travaille , on connoît les produits qu'on doit obtenir , on doit tout faire pour qu'ils puissent être utiles aux pauvres comme aux riches , on est donc borné par les frais qu'on doit toujours diminuer le plus qu'il est possible , pour ne pas rendre les drogues d'un prix excessif. Il faut donc choisir les appareils les plus simples , les moins dispendieux & les plus durables. Une seule circonstance peut quelquefois permettre de s'écarter de cette règle , c'est lorsqu'un appareil fort coûteux conduit à préparer plus promptement , & en plus grande quantité , ainsi qu'avec plus de certitude & de succès , un médicament qui est toujours cher , en raison de la longueur ordinaire de sa préparation , & des soins extraordinaires qu'elle exige.

APYRES. On a nommé apyres , toutes les substances naturelles qui n'éprouvent aucune altération de la part du feu , & sur-tout qui n'entrent point en fusion par la plus grande chaleur connue. Ainsi le cristal de roche , les agates pures & blanches , les silex , plusieurs pierres gemmes , &c. sont des substances apyres ; mais ce mot , dont la signification n'est rien moins que facile à déterminer , & qui porte avec lui , ainsi que tant d'autres de l'ancien langage chimique , ce caractère vague qui les rendoit si obscurs & d'un usage si abusif doit être aujourd'hui banni de la nomenclature méthodique ; 1°. parce qu'il n'y a véritablement plus de corps apyres dans le sens où on l'entendoit autrefois ; les pierres les plus réfractaires , les plus inaltérables ne restent pas sans altération , comme ce mot semble le dire ; il n'en est pas une qui ne soit susceptible de perdre une portion de sa cohérence , de son poli , de sa transparence , & ce n'est véritablement pas à être apyre. D'ailleurs , on sait , plus que jamais , aujourd'hui , que certains corps n'ont été inaltérables & insusceptibles , que parce qu'on ne leur applique pas une assez forte chaleur ; puisqu'à l'aide des feux plus forts que nous employons depuis que la théorie de la combustion plus avancée

a rendu la combustion des fourneaux plus exacte & plus sûre, & sur-tout depuis qu'en fait servir l'air vital aux fournaux, on ramollit on fait fondre même plusieurs corps qui passaient autrefois pour être absolument réfractaires. La liste des corps aptes diminue donc à mesure que les fourneaux sont perfectionnés, & que la théorie de la combustion fait des progrès; on ne compte guères plus dans cette liste que les pierres scintillantes, blanches & cristallines, & les terres purifiées par les procédés chimiques, savoir la silice, l'alumine, la baryte, la magnésie & la chaux. Voyez les mots FEU, FOURNEAUX, CANDÉFACTION, FUSION, FUSIBILITÉ, PIERRES, TERRES, &c.

AQUA STYGIA. Quoique ce mot ait été employé par les alchimistes, pour désigner l'eau-forte, l'acide nitrique, ou tout dissolvant acide minéral très-puissant & très-âcre, il a été plus spécialement adopté pour l'acide nitro-muriatique ou l'eau régale. On la nommoit aussi *chrysolca*, du mot grec *chrysol*, qui signifie or, à cause de sa propriété de dissoudre l'or. Ces dénominations figurées sont depuis assez long-temps entièrement abandonnées.

AQUA HERMAPHRODITICA. La Poterie ou Poteries, qui a proposé plusieurs préparations chimiques, comme des médicaments très-importants, & sur-tout une préparation d'étain qu'il a nommée *anticholique*, désigne, en traitant de la composition de ce dernier, le nitre en fusion dont il se sert, sous le nom d'*aqua hermaphroditica*. Rien n'est plus barbare & plus tidielle que tous les noms donnés dans le siècle dernier aux composés & aux opérations chimiques.

AQUILA ALBA. Les alchimistes ayant donné en général le nom d'*aquila* aux matières qui sont volatiles, quoique leur pesanteur semble devoir leur donner de la fixité, ils ont adopté les mots d'*aquila alba*, pour désigner le muriate de mercure doux ou le sublimé doux, qui est & volatil & blanc, & d'une saveur douce, en comparaison du muriate sublimé corrosif avec lequel on le prépare. On verra à l'article du MERCURE, que c'est en partageant l'oxygène à une plus grande quantité de mercure, qu'on change le muriate corrosif en muriate doux de ce métal.

AQUEUX. (*Pharmacie.*) On désigne souvent par le nom de *remèdes aqueux* ceux dont l'eau fait la base; lorsque les substances qui y sont combinées par la nature ou ajoutées par l'art, n'ont que peu de faveur & de propriétés par elles-mêmes; lorsqu'elles n'empêchent pas que l'eau n'agisse par sa propre nature, sa saveur, sa qualité dissolvante, délayante, &c. Ainsi le nom de *remèdes aqueux* adopté en pharmacie, convient à tous les sucres

plantes fades & insipides, à la sève qui découle des jeunes arbres au printemps, & spécialement aux eaux distillées des plantes inodores, aux macérations ou infusions faites avec l'eau & des substances qui ne lui fournissent rien, ou au moins qu'une très-petite quantité d'un mucilage léger. Cet objet a été présenté sous un point de vue un peu plus étendu dans le dictionnaire de médecine, par rapport à la thérapeutique, à laquelle il appartient beaucoup plus qu'à la pharmacie.

ARABIQUE. (*Pharmacie.*) Sur-nom donné à une espèce d'onguent décrit par les anciens pharmacographes, & qui n'est plus employé de nos jours.

ARABIQUE. (*Pharmacie.*) On donne le nom de *gomme arabique* à un suc gommeux, très-connu dans le commerce & dans les arts, & qui est fort employé en pharmacie. On en trouvera les différents usages pharmaceutiques au mot GOMME.

ARACK. (*Pharmacie.*) Quoique l'arack soit regardé par beaucoup d'auteurs uniquement comme l'eau-de-vie de riz, préparée en Tartarie & aux grandes Indes, ce nom est donné à plusieurs espèces d'alcool préparées avec le lait, les racines fermentées, la liqueur du coco, &c. Il paroît qu'il est adopté dans plusieurs pays. L'arack des Tartares Tangutes, est fait avec le lait de jument ou d'ânesse; celui des Moxes en Amérique avec des racines & de l'eau. Les Mexicains ont un arack fait avec la vanille. Au Brésil, on prépare un arack avec le lait des cocos. Ce mot est donc commun à différentes nations, & il exprime en général une liqueur alcoolique faite avec différentes substances, & non avec le jus de raisin.

On peut employer l'arack des divers pays où il est préparé, pour la composition des différents espèces d'alcools pharmaceutiques ou médicaments. Il faut seulement être prévenu qu'il est nécessaire de le distiller avec assez de soin, pour qu'il ne retienne rien de l'odeur & de la nature particulière des substances qui ont servi à sa fabrication.

ARALIE DE CANADA. *Aralia racemosa*, L. *Angelica baccifera*, Mant. tab. 99. Cette plante peu connue en Europe, peut s'y naturaliser; ses racines & ses feuilles, au rapport de M. la Marck, possèdent un peu le goût de celles du panais. M. Sarrasin dit que les racines de cette plante bien bouillies & appliquées en cataplasme, sont excellentes pour les ulcères invétérés, & que la décoction ne s'en emploie pas avec moins de succès sur les plaies qu'il faut baigner souvent. Les baies sont en usage en Amérique dans les maladies de poitrine, les douleurs des lombes, la cardialgie & autres maladies de l'estomac.

(M. WILLEMIT.)

ARALIE DE VIRGINIE. *Aralia nudicaulis*. L. Si nous manquions de plantes utiles dans la médecine, nous pourrions admettre celle-ci dans la matière médicale : car M. Sarrazin recommande la décoction de ses racines pour guérir la leucophtalmie. C'est un dépuratif du sang, aussi efficace que la salsepaille vulgaire. Les chirurgiens d'Amérique l'emploient à l'extérieur contre les dartres, l'éczéma, & les ulcères impurs. La racine concassée & mêlée avec la poix-résine appliquée sur les mammelles ulcérées, les guérit. L'écorce de la racine concassée est très-bonne pour les plaies.

(M. WILLEMET.)

ARALIE ou ANGÉLIQUE ÉPINEUSE. *Aralia spinosa*. L. Si les fleurs de l'aralie, arbrisseau de huit à dix pieds, de New-York & de la Virginie, ont quelque mérite, c'est plutôt par leur masse, dit M. le baron de Tschoudi, que par leur couleur. Ses feuilles prodigieuses sont d'un très-bel effet : comme elles sont encore très-vertes en octobre, il convient d'employer cet arbrisseau dans les boquets d'été & d'automne.

La matière médicale Américaine fait usage de l'écorce, du péricarpe & des feuilles de l'angélique épineuse, comme sudorifiques, contre l'hydropisie, le rhumatisme, la toux, la vérole. La décoction dans l'eau est vantée contre les rhumatismes chroniques.

L'on retire encore de cette écorce une excellente teinture spiritueuse.

(M. WILLEMET.)

ARBOUSIER. *Arbutus unedo*. L. *Arbutus*. Cam. épit. 168. C'est un bel arbrisseau, toujours vert, qui présente plusieurs charmantes variétés, dont le fruit nommé *arbutus* est semblable aux fraises, mais plus gros, d'un goût un peu austère, difficile à digérer. Les merles & les grives en sont friands ; aussi les oiseaux Espagnols s'en servent. On le trouve en Italie, en Espagne, en Sicile, en Provence, en Languedoc, dans l'Irlande occidentale, à l'île de Corse, aux environs d'Africain, aux lieux montagneux, dans les bois, parmi les broussailles, d'où on le tire pour en décorer les boquets d'hiver de nos jardins d'agrément. On le voit dans toutes les saisons en fleur, ou chargé de fruits, & cette décoration est d'autant plus agréable à la vue, qu'elle se fait apercevoir avec éclat au milieu des noirs frimats.

L'arbousser est peu employé en médecine, quoique ses feuilles, ses fleurs, son écorce & son fruit aient une qualité astringente, & puissent convenir dans les flux de ventre, ainsi qu'en gargarisme, suivant Amatus Lusitanus. L'eau distillée des fleurs & des feuilles, est bonne contre la peste, si l'on en fait usage au commencement de la maladie : cette eau est encore recommandée pour résister à la malignité des humeurs.

Les feuilles sont employées au tan & à la teinture ; les chevreaux en mangent. Le bois est propre aux tourneurs ; ses fleurs, sans éclat, sont aimées des abeilles.

(M. WILLEMET.)

ARBRE A BATON ou BOURREAU DES ARBRES. *Celastrus scandens*. L. Ce n'est pas sans raison, dit M. Marshall, qu'on a donné à cette plante le nom de *bourreau des arbres* ; quelquefois elle s'attache avec tant de force autour d'eux, & les serre si étroitement, qu'elle les fait périr en peu de temps. Elle croît spontanément dans beaucoup d'endroits de l'Amérique septentrionale, parmi les arbres & les arbrisseaux, où elle fait le plus bel effet. Elle peut servir, suivant Dithamel, à garnir des tonnelles & des terrasses ; ses feuilles sont d'un beau verd.

Au rapport de M. Adanson, les nègres du Sénégal emploient la poudre des racines de cette plante, pour guérir les gonorrhées, qu'elle arrête en huit jours, & souvent au bout de trois jours.

(M. WILLEMET.)

ARBRE A BAUME. *Clusia flava*. L. Le genre qui offre cette espèce, a un nom qui dérive de *Charles Clusius* ou de l'Ecluse, botaniste d'Arras. L'arbre à baume qui fait l'objet de cet article, est assez commun dans les îles américaines, spécialement à la Jamaïque. Il découle de son tronc, & de toutes ses branches, une espèce de térébenthine, que les insulaires nomment *Gomme de cochon*, parce qu'ils prétendent que les sangliers se guérissent de leurs blessures, en se frottant contre ces arbres, jusqu'à ce que cette térébenthine ait couvert leurs plaies ; cette substance balsamique est aussi regardée comme un très-bon remède pour guérir les douleurs de sciaticque ; on l'applique sur un linge, & on en couvre la partie malade. Hans-Sloane qui a donné l'histoire naturelle de la Jamaïque, a observé cet arbre, qu'il range parmi les térébinthes.

(M. WILLEMET.)

ARBRE A BOUTON. *Conocarpus erecta*. L. Si nous rejetons, ou plutôt si nous n'admettons pas certains végétaux des grandes Indes, dont l'ancien dictionnaire encyclopédique fait mention, relativement à leurs propriétés, c'est parce qu'il est infiniment difficile de se les procurer, pour ne pas dire impossible ; d'ailleurs inconnus au grand Linnéus, aux autres botanistes européens ; mais en revanche, nos lecteurs trouveront une foule de nouveaux articles dans cette lexicographie médicale qu'ils chercheront inutilement ailleurs. Les amateurs seront toujours guidés par le nom spécifique de chaque plante, pris avec une grande exactitude, d'après le botaniste Suédois.

La matière médicale Américaine annonce l'écorce

cotte du *conocarpe* droit, être un médicament antivenérien, & pris en décoction. C'est un arbre indigène à la Jamaïque, au Brésil, aux îles Bahama & Bermudes.

(M. WILLETET.)

ARBRE A POIS. *Robinia caragana*, L. *Caragana Sibirica*, Royal Lugot 537. Un arbre qui réunit l'utile à l'agréable, est celui qui fait l'objet de cet article ; ses belles fleurs jaunes papillonacées annoncent le retour du printemps. On le cultive pour l'ornement & pour les bons services, car ses feuilles offrent une excellente & délicieuse nourriture au bétail, & peuvent servir à la teinture ; le fruit se mange comme les pois ordinaires ; le bois est d'un très-beau jaune, extrêmement dur, propre à toutes sortes d'ouvrages de tour. On peut substituer dans la médecine, sa racine jaune douce, à la réglisse, c'est par cette propriété que nous l'admettons volontiers dans cette lexiconographie. Cet arbre est originaire de Sibérie, on le trouve dans beaucoup d'endroits de l'Asie septentrionale ; il est facile à cultiver, résiste au plus grand froid des hivers. Il est dans notre jardin des plantes.

(M. WILLETET.)

ARBRE DE CORAIL A GOUSSES PLANES. *Erythrina planifolia*, L. C'est un arbrisseau de la Guinée Française, de Saint-Domingue & de l'Amérique, dont les insulaires emploient les racines dans les tisanes sudorifiques, & les fleurs dans les infusions béchiques.

(M. WILLETET.)

ARBRE DE CORAIL, ou BOIS IMMORTEL. *Erythrina Corallodendron*, L. *Coral arbor* Claf. hist. 2. p. 253. M. Chevalier dit dans l'histoire des plantes de Saint-Domingue, que cet arbre se multiplie facilement de graine & de bouture, que par ses foins il est à présent commun à Saint-Domingue. Kai assure que les feuilles de corail pulvérisées & bouillies avec la noix d'Inde, lorsqu'elle est mûre, ou avec le cacao, consomment les bubons vénériens & calment les douleurs des os. Broyées & appliquées sur les tempes, elles guérissent la céphalalgie ; son écorce broyée dans du vinaigre, ou l'amande de son fruit dépouillée de sa pellicule rouge & avalée, apaise les tranchées des femmes ; le suc de ses feuilles pris dans de l'eau de riz arrête le flux de ventre, les feuilles cuites battues avec de l'huile guérissent la galle.

Plumier dit que l'arbre de corail forme de très-bonnes haies. On le trouve aux Indes, aux Antilles, & à Saint-Domingue.

(M. WILLETET.)

ARBRE DE DIANE. L'argent ayant été désigné par les alchimistes sous le nom de Diane, on a nommé arbre de Diane, le précipité cristallisé en forme de buisson ou de branches entrelacées, qui

Chimie, Tome II.

se rassemble dans une dissolution d'argent, au fond de laquelle on place du mercure tenant un peu d'argent en dissolution. Cette cristallisation métallique, qui est très-remarquable par la beauté des prismes allongés, ou des aiguilles qui s'arrangent entr'elles comme des branchages entrelacés, est une véritable amalgame d'argent. On décrit la manière de l'obtenir, ainsi que les propriétés à l'article de l'ARGENT. Voyez aussi les mots AMALGAME en général & AMALGAME D'ARGENT.

ARBRE DE MARS. On a prétendu qu'on obtenoit une cristallisation de fer par le même procédé que l'arbre de Diane ; il est certain que le fer attirant bien plus l'oxygène que l'argent, doit précipiter celui-ci, & que l'argent peut en fer déposant former avec une partie du fer une cristallisation en herborisation. Mais ce n'est point ainsi que les auteurs entendent l'arbre de Mars ; ils veulent dire par ce nom un précipité de fer. Blancard à l'article ARBRE DIANE s'exprime ainsi : *fenilis produci potest cristallisatio ex solutione ferri, quæ vocatur arbor Martis*. Or il ne dit pas comment on obtient le fer précipité ; & comme aucun métal, si l'on en excepte le manganèse, ne peut pas séparer le fer des acides, & que ce n'est pas de celui-ci inconnu aux anciens chimistes qu'ils ont voulu parler, il semble que ce n'est qu'à l'aide de terres ou d'acides qu'ils ont pu produire cet effet ; mais alors la dénomination d'arbre de Mars ne convient plus à une pareille précipitation, si on la compare à celle d'arbre de Diane.

ARBRE DE NEIGE, ou AMELANCHIER DE VIRGINIE. *Chionanthus Virginica*, L. Cet arbrisseau, commun dans plusieurs parties de l'Amérique septentrionale, produit une si grande quantité de fleurs, qu'il ressemble en quelque façon à un arbre couvert de neige, d'où lui est venu son nom.

L'écorce de sa racine, broyée & appliquée sur les blessures nouvelles, est regardée par les Américains, comme un spécifique propre à les guérir sans suppuration. Il peut servir à décorer les bosquets de la fin du printemps.

Nous cultivons cet arbrisseau depuis plusieurs années, & nous n'avons pas encore vu ses fleurs, malgré que nous le préservons du froid pendant l'hiver.

(M. WILLETET.)

ARBRE DE VIE. *Thuja occidentalis*. *Arbor vita* Claf. Hist. 1. p. 36. L'arbre de vie est originaire du Canada, d'où le premier qu'on ait vu en Europe, fut apporté au Roi François premier. Il est toujours vert, résiste au froid de l'hiver. On le cultive dans les jardins ; il présente plusieurs variétés qui embellissent les bosquets. Les feuilles sont résolutives, desiccatives, carminatives, sudorifiques. Les Américains emploient leur décoction

Y y

tion contre la toux, les fièvres, la cacochimie scorbutique, les rhumatismes & autres maladies, ils préparent, avec un onguent ses feuilles propre à calmer les douleurs de rhumatisme. Boerhaave estime l'eau distillée contre l'hydropisie. Duhamel prétend que ses jeunes branches & ses feuilles, produisent à-peu-près les mêmes effets que la sabine. Parkinson rapporte que ses feuilles crues & tendres, mangées avec des tartines de beurre, font exsaler les humeurs muqueuses & tenaces. Le bois de l'arbre de vie, est détersif, céphalique, sudorifique, propre à résister au venin, contre les maladies des yeux & des oreilles, soit en substance, soit en infusion. On retire de ce bois & des feuilles, une eau & une huile, qui sont très-utiles pour adoucir les douleurs de la goutte. Ce bois est presque incorruptible; il peut servir à divers usages économiques. Les sommets des rameaux concassés, misés dans les narines, arrêtent les hémorrhagies. Linnéus dit qu'on trouve cet arbre au Canada, dans les endroits humides. Schoepf rapporte qu'il croît spontanément en Virginie, dans les lieux uligineux & caillouteux. Castor-Durante rapporte à son occasion les vers suivants :

*Arbor odore suo vehementi hæc nomina visa
Nalla est, abstergit, ac digerit, & amara
Pauisger valde tenuisq; in paribus ipsa est.*

Nous cultivons également en pleine terre le rhuia du Levant; il ne paroît pas être plus délicat que le précédent: on doit cet arbre à des missionnaires qui en envoyèrent la semence.

(M. WILLEMET.)

ARBRE TRISTE. *Nidanthus arbor tristis* L. *arbor tristis*, Gars. C'est un arbre des Indes qui croît en Malabar, à Goa, à Sumatra: comme ses fleurs fuient l'éclat de la lumière, on l'a nommé arbre triste; ses fleurs ressemblent à celles de l'oranger, elles sont mêmes plus belles & plus odoriférantes; leur calice est rougeâtre. Les Indiens s'en servent pour colorer leur viande. Ses fleurs sont estimées cordiales, & donnent aux alimens une bonne odeur & un goût agréable.

(M. WILLEMET.)

ARBRE PHILOSOPHIQUE. C'est une des dénominations de l'arbre de Diane. (Voyez ce mot.)

ARCANE, ARCANUM. La chimie ayant été longtemps une science mystérieuse, ou plutôt ayant d'abord consisté en pratiques mystérieuses, & alliées à la superstition, au désir de s'enrichir & de se rendre immortel, tout ce qu'on faisoit & qu'on croyoit toujours être une préparation à la réussite du grand œuvre, étoit un arcane, un secret. Quoiqu'on ait dans ce siècle banni tous les prétendus secrets, il y a encore quelques substances qui ont retenu

jusqu'à ces derniers temps le nom d'arcanes; tels sont L'ARCANE CORALLIN & L'ARCANUM DUPLICATIONUM.

ARCANE. (*Pharmacie*) On s'est assez long-temps servi de ce mot pour désigner des compositions ou préparations pharmaceutiques dont la nature étoit gardée secrète; autrefois beaucoup de médicaments pharmaceutiques portoient ce titre, & ce qu'il y a de singulier, c'est qu'ils sembloient être d'autant plus précieux qu'ils étoient plus cachés.

ARCANE CORALLIN. L'arcane corallin décrit avec tant de détails & de pratiques minutieuses dans les livres d'un grand nombre d'alchimistes, est un oxide de mercure rouge, ou un précipité rouge, fait par l'acide nitrique, & qu'on croyoit adoucir en brûlant de l'alcool à sa surface; cet oxide est très-acre malgré l'opération secondaire qu'on employoit pour l'adoucir; aussi ne l'emploie-t-on plus depuis long-temps en médecine. Voyez MERCURE.

ARCANE CORALLIN. (*Pharmacie*) On a vu dans l'article précédent, que ce nom a été donné à un oxide de mercure par l'acide nitrique, sur lequel on a brûlé un peu d'alcool. Il faut remarquer que les oxides métalliques sont en général des substances acres vénéneuses, & quelquefois même caustiques. Ceux de mercure sur-tout, ont ce caractère, car on les emploie avec succès comme catartiques. L'arcane corallin ne doit donc être prescrit qu'avec beaucoup de précautions; aussi a-t-on renoncé depuis long-temps à son usage. Voyez MERCURE.

ARCANE DE TARTRE. (*Pharmacie*) On a nommé en pharmacie arcane de tartre, un véritable acétite de potasse; fait en précipitant le sulfure de potasse antimonie par l'acide acétueux ou le vinaigre distillé, & en évaporant la liqueur qui surnage le soufre doré; on laisse ordinairement tomber ce sel en deliquium pour avoir l'arcane de tartre; on lui attribuoit autrefois de grandes propriétés, mais il n'en a pas davantage que l'acétite de potasse, & il est inutile de le préparer par un procédé si compliqué. Voyez ACÉTITE DE POTASSE. (*Pharmacie*.)

ARCANUM DUPLICATIONUM. On est étonné de trouver dans plusieurs dispensaires, & entr'autres dans le codex de Paris, sous le nom de double arcane, la préparation compliquée & vraiment ridicule d'un sulfate de potasse, immédiatement après celle du tartre vitriolé, qui est le même sel. A la vérité on prépare l'arcanum duplication d'une manière bien différente, suivant ce dispensaire; mais lorsque l'opération est bien faite, on a du sulfate de potasse pur, qu'on doit préparer tout autrement & avec bien plus de sim-

placité, comme on le dira à son article. Voici comment le codex prescrit de faire l'arcum duplicatum. On prend parties égales de nitre & de sulfate de fer ou vitriol martial; on les calcine à feu ouvert, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs, & que la masse ait pris la couleur rouge de l'oxide de fer, qu'on nomme en cet état colcothar; on la dissout dans suffisante quantité d'eau bouillante; on filtre, & on ajoute quelques gouttes de potasse, pour précipiter toutes les molécules métalliques; s'il en reste dans la liqueur, on filtre une seconde fois & on fait évaporer la liqueur jusqu'à pellicule, pour obtenir des cristaux. Il est difficile de trouver une préparation plus compliquée & plus ridicule que celle-là, aussi l'a-t-on abandonnée depuis long-temps. (Voyez SULFATE DE POTASSE.)

ARCANUM JOVIS. (*Pharmacie.*) Plusieurs pharmacopées, & sur-tout celle de Bath, *pharmacopœa Batæana*, recommande comme sudorifique, sous le nom d'*arcum jovis*, un oxide de mercure mêlé d'oxide d'étain, préparé par la dissolution d'une amalgame d'étain dans l'acide nitrique, ou plutôt en oxidant cette amalgame par l'acide indiqué; on dessèche cet oxide dans une cornue, on en sépare tout l'acide; ensuite on verse dessus de l'alcool, qu'on y renouvelle jusqu'à ce que la poudre devienne insipide. Ce remède analogue à l'arcane corallin est aussi dangereux que lui pour l'économie animale; on n'en fait aucun usage.

ARDOISE. L'ardoise est une sorte de schiste ou de pierre alumineuse, dont le caractère principal est de pouvoir se diviser en lames minces, susceptibles d'être raillées, & même de prendre une espèce de poli. Ces propriétés sont très-sensibles dans l'ardoise que tout le monde connoît, & dont on se sert pour faire les couvertures des maisons. L'ardoise est d'une couleur bleue plus ou moins foncée, & tirant souvent sur le noir.

M. Mongez, dans son Commentaire de la sciagraphie de Bergman, place l'ardoise dans le genre alumineux & dans l'espèce qui est un mélange d'alumine, de silice, de pyrite & de pétrole, S. CXVIII. G. Il distingue trois variétés de cette pierre.

1°. L'ardoise solide noire, qui reçoit un mauvais poli & dont on fait des tables sur lesquelles on trace des caractères de géométrie; elle est connue dans les cabinets sous le nom d'ardoise de table. Sa poussière est blanche & fait un peu d'effervescence avec les acides; elle se fond à un grand feu en une scorie poreuse, légère, d'un vert obscur.

2°. L'ardoise feuilletée des toits; elle se divise facilement en lames, & on s'en sert pour couvrir les maisons; elle est aussi sonore quand on la frappe avec des instrumens d'acier. Sa poussière

est grise; elle décrépite au feu, elle y devient rougeâtre & se réduit en une scorie grise brillante.

3°. L'ardoise grasse d'une consistance friable; c'est une sorte de schiste alumineux; sa poussière est fine & noire; elle répand au feu une odeur de pétrole, quelquefois même elle prend feu & brûle comme du charbon de terre; elle se fond en une scorie poreuse, légère, &c.

M. Kirwan, qui a suivi la marche de Bergman dans ses élémens de minéralogie, & qui a beaucoup insisté sur les propriétés & les caractères chimiques des minéraux, dit en traitant des ardoises dont il forme la sixième espèce du genre alumineux, il y a bien des variétés de cette espèce, dont on n'a jusqu'ici analysé aucune, si ce n'est l'ardoise pourpre bleuâtre, dont on se sert principalement ici (à Londres), que j'ai examinée depuis peu, à laquelle je rapporterai les autres sortes. L'ardoise pourpre bleuâtre dont M. Kirwan a fait l'analyse, ne fait point feu avec le briquet; elle se laisse entamer par l'ongle; elle est très-fragile & d'un tissu lamelleux. Sa pesanteur spécifique est de 2,876. Son grain est médiocrement fin; en poudre elle fait effervescence avec les acides; en rougissant elle perd deux centièmes de son poids; la calcination ne la rend point attirable; elle fait détoner le nitre & devient d'un rouge brun. Elle se fond à un grand feu en une scorie noire. La sonde ne la dissout que difficilement par la fusion; le borax la dissout mieux quoiqu'avec peu d'effervescence. Cent-grains de cette pierre contiennent, suivant l'analyse faite par M. Kirwan, 46 de silice, 26 d'alumine, 8 de magnésie, 4 de chaux, & 14 de fer. Une partie du fer paroît être à l'état métallique & unie à l'huile bitumineuse, & une autre partie est manifestement en état d'oxide, uni à l'alumine & à la silice: il est très-difficile de l'en séparer.

L'ardoise bleue foncée que M. Kirwan compte parmi les variétés de cette sorte, fait, suivant lui, plus vivement effervescence avec les acides, & semble contenir plus de magnésie & moins de fer que la précédente. Sa pesanteur spécifique est de 2,701.

Il y a certaines ardoises qui contiennent une assez grande quantité de magnésie & de pyrites, pour qu'après leur exposition à l'air & leur efflorescence, on en retire du sulfate de magnésie, en même-temps que du sulfate d'alumine; c'est ce qu'a fait M. Tingry, chimiste de Genève, sur une pierre de cette nature.

Les ardoises sont assez fusibles pour se scorifier & se fondre par la chaleur des incendies. On a vu celles qui recouvraient les bâtimens de l'abbaye de Foyamont se fondre dans l'incendie qui a ravagé cette abbaye.

Il y a plusieurs auteurs penient que les ardoises chauffées par le feu des volcans, & calcinées de manière à ce que le fer qu'elles contiennent y soit

fortement oxidé, deviennent rouges, friables & très-poreuses, forment en un mot les tripolis. (Voyez le mot SCHISTES.)

ARECA. (*Pharmacie.*) L'areca est une espèce de palmier, dont on a cru que les fruits fournissent le cachou. (Voyez le mot CACHOU.) Dans l'Inde on mange les feuilles & les fruits d'areca avec le bétel. L'areca, regardé aujourd'hui par les botanistes comme un genre de palmiers, contient parmi ses espèces, celle dont le bourgeon ou la cime jeune & non développée, est nommé chou palmiste. (Voyez le mot ARÉQUIER.)

ARÉGON. (*Pharmacie.*) Surnom donné à une espèce d'onguent, décrit par Nicolas de Salerne, & qui a long-temps été préparé dans nos pharmacies; cet onguent étoit composé de feuilles de lauréole, de concombre sauvage, de fabine, de rhue, de racines de bryone, d'arum & de différentes plantes acres, aromatiques & chaudes, que l'on faisoit bouillir dans une certaine quantité d'huile, auxquelles on ajoutoit, après l'expression, des graisses, de la cire, de l'euphorbe, & différentes espèces de gommes-résines; cet onguent étoit principalement employé pour faire des frictions ou onctions sur différentes parties; on le recommandoit sur-tout pour faire des frictions sur l'épine du dos, sur les membres paralysés, affoiblis ou relâchés; on en faisoit aussi des onctions sur l'abdomen, pour dissiper les vents, procurer des évacuations par les selles & même pour exciter l'accouchement: l'expérience n'a pas confirmé toutes ces belles propriétés, aussi cet onguent ne se trouve plus dans nos pharmacies.

Cette dénomination d'arégon vient du Grec, & signifie proprement *aidant, donnant des secours*. Joubert remarque que, par corruption, on a quelquefois nommé cet onguent *arragon*.

ARÉOMÈTRE. On distingue dans les corps deux espèces de pesanteur, l'une que l'on appelle pesanteur absolue, & l'autre pesanteur spécifique. On connoît la première en la comparant, par le moyen d'un instrument exact nommé *balance*, à un autre corps que les hommes sont convenus de prendre, afin de s'entendre en tous lieux, pour point de comparaison ou pour unité. Nous reviendrons ailleurs sur les poids & les balances, ne devant nous occuper ici que du moyen de mesurer la pesanteur particulière de chaque corps. Ces moyens font différents selon l'état des corps.

L'our s'entendre sur la pesanteur spécifique des corps, les savans ont choisi un autre corps qui fût facile à mesurer, à peser, qui ne fût point susceptible de s'altérer, & que par-tout ou pût se procurer aisément dans l'état de pureté. Ce corps est l'eau. On a donc pris un volume connu de cette substance, on en a déterminé le poids avec une balance bien sensible, à une tem-

pérature & à une pression données; c'est ordinairement le dixième degré au-dessus de la congélation du thermomètre à mercure pour la température; & pour la pression c'est l'élevation de 28 pouces de mercure dans le baromètre; on y plonge ensuite des corps exactement pesés, & à l'aide d'une balance sensible, on voit quel est le rapport entre ces deux corps; s'il est en équilibre avec l'eau, on dit qu'il est de la même pesanteur spécifique qu'elle, ou que ses molécules sont également écartées les unes des autres; s'il est plus pesant, on examine de combien, & l'on dit, ce corps est à l'eau comme tant est à tant. S'il perd la moitié de son poids, il est clair qu'il est moitié plus lourd sous le même volume; s'il perd le quart, il est trois fois plus lourd, &c. De-là on voit que la pesanteur spécifique d'un corps, est égale à sa masse divisée par son volume.

Mais cette méthode ne peut être employée que pour les substances solides, nous y reviendrons à l'article *BALANCE*. Les liquides exigent d'autres instrumens pour donner leur pesanteur spécifique; ces instrumens sont nommés *aréomètres*, de deux mots grecs qui signifient *mesure de la pesanteur*. Comme les liquides ont leurs molécules assez écartées les unes des autres pour glisser facilement & s'agiter en tout sens lorsqu'on leur communique le plus léger mouvement, & qu'ils se mettent en équilibre avec les corps qu'on y plonge, on est parti de cette propriété pour construire les aréomètres.

Le plus simple & le plus employé de ces instrumens, est une petite bouteille de verre mince A (figures 7 & 2, de la classe 2,) soufflée à la lampe, & dont le col B C, long & étroit, est divisé dans toute sa longueur en parties égales. Pour que cet instrument puisse se contenir dans une situation verticale, au milieu des liquides où on le plonge, on place le centre de gravité le plus près possible de l'extrémité inférieure, à l'aide d'une petite boule D soufflée qu'on y soude, & dans laquelle on met du mercure, ou un autre corps quelconque plus pesant que l'eau. Il n'en faut pas mettre assez pour que l'instrument soit plus pesant qu'un volume d'eau pareil au sien, car alors il se précipiteroit au fond.

L'aréomètre étant construit sur ces principes, on le plonge dans des liqueurs dont on veut connoître le rapport. Si son poids est tel qu'il s'enfonce dans l'eau jusqu'en E, il s'enfoncera dans l'alcool jusqu'en G; mais si l'aréomètre est plongé dans des liqueurs plus pesantes que l'eau, il ne descendra pas jusqu'en E: dans la bière, par exemple, il s'arrêtera en H, & toujours dans des raisons inverses de la densité ou de la pesanteur des liquides. Avec ce simple instrument, l'on connoît en général le rapport de pesanteur des liquides que l'on compare entr'eux, en observant de combien de degrés il s'enfonce dans l'une plus que dans l'autre. Mais si l'on veut obtenir quelque exactitude dans les résul-

tats que l'on cherche, il faut fabriquer cet instrument avec les précautions suivantes. 1°. Il est nécessaire que les liqueurs dans lesquelles on le plonge, soient au même degré de température.

2°. Que la tige de l'instrument sur laquelle doivent être marqués les degrés, soit parfaitement cylindrique & égale dans toutes ses parties, car les divisions étant inégales elles ne mesureroient pas des volumes égaux; il seroit plus exact de construire cette échelle en chargeant successivement l'aréomètre de poids égaux, dont chacun produiroit un degré.

3°. Quel immersion se fasse bien perpendiculairement dans les liqueurs, car l'obliquité de l'instrument empêcheroit d'observer exactement le degré d'enfoncement.

4°. Que comme cet aréomètre est destiné à comparer des liqueurs dont la pesanteur est peu différente, la partie qui sert de tige doit être parfaitement exempte de tout corps étranger: il faut avoir aussi grand soin après avoir plongé l'aréomètre dans un liquide quelconque, d'attendre que ses oscillations soient finies, & que le liquide qui peut rester à la partie surnageante soit descendu, avant que de fixer le terme de son équilibre. Cette attention est sur-tout nécessaire relativement aux liqueurs très-pesantes, tenaces, & dont l'attraction pour le verre est forte. On évite cette erreur en laissant tomber doucement l'aréomètre dans la liqueur que l'on veut peser: il n'est pas nécessaire de dire que l'on doit laver & essuyer avec soin l'instrument lorsqu'on le sort d'une liqueur pour le mettre dans une autre; malgré toutes ces précautions il reste encore beaucoup de difficultés à vaincre pour obtenir des données exactes; certaines liqueurs s'appliquent mieux au verre que d'autres, & s'élèvent plus ou moins sur la tige de l'instrument suivant leur degré d'attraction pour le verre.

5°. Enfin que le poids de l'aréomètre doit être exactement connu en le pesant à une balance bien juste. Il faut le plonger d'abord dans la liqueur la moins pesante, & remarquer jusqu'à quel degré l'instrument s'y plonge; on le plonge ensuite dans la liqueur la plus dense, & on charge le haut de la tige, de poids connus, jusqu'à ce que le degré d'enfoncement soit égal au premier. La somme des poids qu'on aura ajoutés pour rendre la seconde immersion égale à la première, fera la différence entre la pesanteur des deux liquides. Supposons, par exemple, que l'aréomètre pèse 500 grains, & qu'il ait fallu pour rendre la seconde immersion égale à la première, ajouter 20 grains, on peut conclure avec certitude que la pesanteur spécifique de la liqueur la moins dense, est à la pesanteur de la liqueur la plus dense comme 500 est à 520, ou 25 est à 26.

Homborg, sentant tous les inconvénients de l'aréomètre que nous venons de décrire, en imagina un autre qui n'est pas non plus sans inconvénient, & qui consiste en un vaisseau de verre

A B C D, *figure 8*, classé 2, semblable à un petit matras dont le col est si étroit qu'une goutte d'eau y occupe une longueur de 5 à 6 lignes; il est nécessaire d'éviter un peu l'extrémité A du tube de ce vase, afin de pouvoir y verser plus facilement la liqueur. A côté de ce col A B, il sort de la panse C du vaisseau, un petit tuyau D parallèle au col A B, de la même capacité de ce col, & de la longueur d'environ 6 lignes. Ce tuyau sert à donner issue à l'air qui est contenu dans le vaisseau, à mesure qu'on y met de l'eau ou une autre liqueur. La petitesse de ce tube est nécessaire pour obtenir plus d'exactitude dans le volume des liquides, qu'on éprouve en le remplissant toujours à la même marque que l'on a faite auparavant sur le col.

Pour le servir de cette espèce d'aréomètre il faut le peser exactement, le remplir ensuite d'une liqueur jusqu'à la marque & tracer sur son col, le pèse de nouveau à une bonne balance, & comparer ainsi le poids de cette liqueur au poids d'une autre qu'on aura essayée de la même manière; on connoîtra par-là, dit Homborg, la différence qu'il y a entre la pesanteur de tel ou tel liquide, parce qu'une goutte d'eau occupant l'espace de 5 à 6 lignes, s'il arrivoit qu'on en versât une ligne de trop ou de trop peu, l'erreur ne seroit que d'un sixième de goutte de plus ou de moins, sur la totalité qu'on auroit pesée, ce qui peut être négligé: encore pourroit-on la corriger en ajoutant un peu d'eau si n'y en a pas assez, ou en frappant sur l'entonnoir de la tige, pour en faire sortir s'il y en a trop.

Cet aréomètre est encore sujet à plusieurs inconvénients; le plus grand de tous, & celui auquel il n'y a point de remède, c'est que le col A B est capillaire, & par cette raison les liqueurs s'y élèvent plus qu'elles ne devroient, & que cette élévation n'est pas la même pour toutes.

Un aréomètre plus exact que ceux dont il vient d'être parlé, & qui conséquemment mérite la préférence, est celui de l'arenheit (*fig. 5*, classe 2.) Il est composé d'une petite bouteille de verre mince A, soufflée à la lampe, dont le col B C très-mince est surmonté d'un petit bassin D E, destiné à porter des poids. Il est lesté d'une petite boule de verre F, adaptée à la partie inférieure de cet instrument, & dans laquelle on a mis du mercure; on soude sur la tige un petit grain d'émail a, & l'instrument est construit.

Pour faire usage de cet aréomètre, il faut déterminer exactement son poids & le marquer sur l'instrument, afin de ne le point oublier. On le plonge ensuite dans de l'eau distillée, & le chargeant de poids, on le fait enfoncer jusqu'au grain d'émail a. La somme des poids qu'on a mis dans le bassin D E pour produire cet enfoncement, jointe au poids de l'instrument, donne le volume d'eau qu'il déplace: en faisant la même opération pour telle liqueur que l'on voudra, on aura exactement le poids du volume de cette liqueur mesuré par l'aréomètre. Les volumes étant parfaitement

égaux, la différence de leur poids donnera celle de leur pesanteur spécifique, ou le rapport de leur densité. Pour connoître ce rapport on fera le raisonnement suivant. *La pesanteur spécifique de cette liqueur, est à celle de l'eau, comme le poids au volume de cette liqueur, mesuré par l'aréomètre, est au poids du volume de l'eau, mesuré par le même aréomètre.* Lorsqu'on connoît exactement la densité de l'une, on doit connoître aussi celle de l'autre, ainsi que celle de toutes les liqueurs que l'on soumettra à cette épreuve.

M. Lavoisier a fait des applications de l'aréomètre de Fahrenheit pour les eaux minérales, &c. comme ces liquides ne contiennent ordinairement que très-peu de matières, les aréomètres, tels qu'on les construit pour les usages ordinaires, n'indiquent pas entre ces eaux & l'eau pure une différence bien sensible.

M. Lavoisier a proposé de les faire beaucoup plus grands afin qu'ils déplacent une plus grande quantité d'eau, & que par ce moyen la plus petite quantité de matière soit appréciée. Voici comment il recommande qu'ils soient faits. Un cylindre creux (ABC*F*, figure 4, classe 2.) de cuivre jaune ou mieux d'argent, & lesté par le bas *b*, *c*, *f*, par de l'étain. (ce pèse-liqueur est représenté naïvement dans un bocal rempli d'eau.) A la partie supérieure du cylindre est adaptée une tige de fil d'argent de $\frac{1}{2}$ de ligne de diamètre tout au plus, & surmontée d'un petit bassin destiné à recevoir des poids; on fait sur cette tige une marque en 9. On peut faire cet instrument de différentes grandeurs, mais il n'est suffisamment exact que quand il déplace quatre livres d'eau. Le poids de l'étain dont cet instrument est lesté, doit être tel qu'il soit presque en équilibre dans l'eau distillée, & qu'il ne faille plus y ajouter pour le faire enfoncer jusqu'à la marque, qu'un demi-gros ou un gros tout au plus.

On commence par déterminer une première fois avec beaucoup d'exactitude le poids de cet instrument, & le nombre de gros ou de grains dont il faut le charger dans l'eau distillée, pour le faire entrer jusqu'à la marque 9. On fait la même opération sur toutes les eaux dont on veut connoître la pesanteur spécifique, & on rapporte ensuite, par le calcul, les différences en pied cube, à la pinte, à la livre, ou bien on les réduit en fractions décimales. Cette méthode, jointe à quelques essais, par les réactifs, est une des meilleures pour déterminer les qualités des eaux, & on y aperçoit des différences qui auroient échappé aux analyses chimiques les plus exactes.

Les pèse-liqueurs métalliques ne peuvent servir que pour déterminer la pesanteur spécifique des eaux qui ne contiennent que des sels neutres ou des substances alcalines. On peut aussi en faire construire de particuliers lestés par l'alcool & toutes les liqueurs volatiles & alcooliques quelconques; mais toutes les fois qu'il est ques-

tion de déterminer la pesanteur spécifique des acides, on ne peut employer que du verre.

Dans ces derniers temps, M. le Ratz proposa un aréomètre, qui est construit sur les mêmes principes que celui de Fahrenheit, mais qui est d'une construction plus difficile. 1°. Cet aréomètre doit peser exactement mille grains; quel que soit son volume, la tige doit être marquée à l'endroit où s'arrête son immersion dans l'eau distillée. On le plonge une seconde fois dans l'eau, en le chargeant d'un poids connu, comme par exemple de quarante grains; on divise en quarante parties égales l'intervalle qui est contenu entre les points des deux immersions, ce qui servira d'échelle pour graduer le reste de la tige. On sent que pour que ses degrés ou divisions mesurent des quantités égales de liqueur, & qu'elles déterminent exactement le poids de ces liqueurs, il faut que la tige soit bien égale dans toutes ses parties. 2°. Que si l'instrument pèse plus ou moins de mille grains, il faut que les poids dont on le charge, pour former l'échelle de quarante degrés, soient proportionnels au poids de l'aréomètre: proportion difficile à établir dans l'exécution de l'instrument, mais que les ouvriers adroits trouvent en tâtonnant un peu.

En 1768, M. Baumé imagina un aréomètre, pour connoître le degré de rectification de l'alcool, & dont il a donné la description dans les papiers publics, (avant-coureur, ann. 1768, n°. 45, 50, 51 & 52. année 1769, n°. 2.) Il annonce que cet instrument est également propre à déterminer exactement la pesanteur spécifique de ces liqueurs. Nous allons voir qu'il s'en faut de beaucoup que l'aréomètre de M. Baumé remplisse ces deux objets. Il gradue son aréomètre, en le plongeant d'abord dans neuf parties d'eau dans laquelle il a fait dissoudre une partie de sel marin bien sec. La partie de la tige, à laquelle il s'arrête, est marquée 0; il plonge ensuite l'instrument dans de l'eau distillée, ce qui lui donne le dixième degré. Il divise l'espace contenu entre ces deux termes en dix parties égales qui forment autant de degrés. Il se sert ensuite de cette première division, pour former l'échelle entière, dont le nombre de degrés s'élève jusqu'à cinquante. La figure 6, classe 2, représente cet aréomètre.

On voit combien cette graduation est défectueuse. 1°. L'aréomètre est gradué au moyen de l'eau chargée de sel, pour essayer des alcools. Il est vrai que dans le mélange de l'eau, soit avec les sels, soit avec les alcools, il y a pénétration dans les deux cas; mais elle n'est ni égale ni proportionnelle. D'ailleurs à quoi sert ce mélange de sel & d'eau? Est-ce qu'il y a jamais eu des mélanges d'eau & d'alcool aussi lourds? Est-ce que toute combinaison d'alcool & d'eau n'est pas plus légère que l'eau pure? Pourquoi donc ne paroit-il pas du terme de l'eau, au dessous duquel toute liqueur n'est plus considérée comme alcool?

2°. Les degrés sont des parties égales, & sont

par conséquent destinés à mesurer des quantités de liqueur semblables : mais il faut pour cela que la tige de son aréomètre soit parfaitement cylindrique & égale elle-même dans toutes ses parties, ce qui arrive rarement.

Quand bien même cette tige seroit parfaitement identifiée dans toute sa longueur, l'instrument s'éloigneroit encore beaucoup du degré d'exactitude que M. Baumé lui attribue ; car ses degrés d'enfoncement étant proportionnels à la densité de la liqueur alcoolique, ne le sont pas au degré de rectification, comme l'a fait connoître M. Brisson dans un mémoire sur le rapport des différentes densités de l'alcool avec ses différents degrés de pureté. Il est vrai que M. Baumé a donné une table qui indique les degrés d'enfoncement de l'aréomètre dans différents mélanges d'eau & d'alcool, à l'aide de laquelle les erreurs de son instrument sont un peu rectifiées. Mais cette table est-elle exacte ? Il est difficile de le croire, lorsqu'on voit que dans quelques-uns des mélanges, elle marque l'enfoncement de l'aréomètre toujours au même degré, soit que ces mélanges soient refroidis par la glace, soit qu'ils soient à 5, à 10 & même à 15 au-dessous de 0, ou soit enfin qu'ils soient échauffés à 5, à 10, à 15, à 20 & même à 25 au-dessus de la congélation ; comme si 40 degrés de différence dans la température de ces liqueurs ne causoient aucun changement dans leurs densités ; ce qui n'est ni vrai ni vraisemblable.

L'aréomètre de M. Baumé pour l'alcool, a encore un autre défaut, c'est son peu de sensibilité ; son échelle, quoique marquant 50 degrés, n'en a véritablement que 40 : car les dix premiers qui sont le résultat de la différence de la densité de l'eau salée à celle de l'eau pure, ne peuvent servir à rien : or en élevant la pesanteur de l'eau à 10000, nous avons 8293 pour l'alcool le mieux rectifié, & en divisant 1707, qui est la différence entre le poids de ces deux liqueurs, chaque degré de l'aréomètre de M. Baumé ne donne le terme exact, qu'à 42 parties & demie près ; ce qui est, comme on voit, une grande latitude.

M. Baumé a aussi construit sur le même principe un aréomètre pour connoître la quantité de sel contenue en dissolution dans l'eau. Pour parvenir à la confection de cet instrument, il prend un pèse-liqueur ordinaire de verre, qui a à-peu-près la figure d'un thermomètre, avec la différence seulement qu'on soude à la partie inférieure de la boule une petite tige, au bout de laquelle on a pratiqué une seconde boule beaucoup plus petite que la première, dans laquelle on a mis du mercure pour lester l'instrument, le faire tenir droit & le faire enfoncer dans l'eau pure presque jusqu'au haut du tube marqué 0 ; à l'endroit où l'instrument cesse de s'enfoncer dans cette eau pure, c'est-là le premier terme. Cet aréomètre que l'on voit représenté, (figure 6, classe 2), étant disposé, comme

il vient d'être dit, M. Baumé prépare une eau salée, en faisant dissoudre 5 livres de sel marin mariate de soude, dans 85 livres d'eau ; il plonge son aréomètre dans cette dissolution à dix degrés de température, & le point qui est de niveau avec la surface de liquide, forme son second terme qui est exprimé par 15 degrés. Il divise ensuite l'espace qui est contenu entre ces deux termes, en quinze parties égales qui forment autant de degrés. Cette première division lui sert de base pour la graduation totale de la tige de son instrument, en prenant avec un compas la distance du point 0 à 15, & en la portant de 15 en 15 vers la partie inférieure de la tige qu'il suppose suffisamment longue. On peut ainsi multiplier le nombre, des degrés autant que l'on veut, en prenant un aréomètre dont le tube soit long.

M. Baumé ayant senti qu'il étoit difficile de se procurer des aréomètres dont le tube fût parfaitement cylindrique & le diamètre égal dans toute sa longueur, propose pour éviter les causes d'erreur où cela pourroit mener, de former les degrés du tube les uns après les autres, en dissolvant d'abord dans 99 livres d'eau une livre de sel, & l'endroit où l'aréomètre s'arrêtera dans cette dissolution, sera le premier degré. On aura le second, en diminuant une livre d'eau, & en augmentant d'une livre de sel, c'est-à-dire, en dissolvant dans 78 livres d'eau 2 livres de sel. On continuera ainsi à graduer l'instrument, en augmentant le sel d'une livre, & en diminuant l'eau dans la même proportion, jusqu'à ce que l'on ait parcouru toute la longueur du tube.

Il est facile de s'apercevoir que la méthode de M. Baumé, pour construire des aréomètres propres à faire connoître la quantité de sel dans l'eau, est extrêmement vicieuse. 1^o. Il divise dans un cas la tige de son instrument en parties égales, pour éviter les inégalités qui pourroient se rencontrer sur sa longueur. Mais en supposant même que cette tige eût toutes les conditions nécessaires, pour mesurer dans toutes les parties de sa longueur des quantités égales de liquides, elle seroit encore défectueuse ; car il est bien démontré qu'un sel ne suit pas les mêmes rapports en se dissolvant dans l'eau depuis son *minimum* jusqu'à son *maximum*, c'est-à-dire que les premières portions de sel n'occasionneront pas dans la liqueur le même changement que celles qui les suivent, & qui achèvent de saturer l'eau.

On fait que les attractions des corps varient suivant leur quantité, que le rapprochement ou l'écartement qui a lieu dans leurs molécules pendant leurs combinaisons, varie aussi suivant la force de cette attraction, & qu'ainsi on ne peut pas faire de table proportionnelle, pour connoître leur volume d'après une seule expérience, une donnée simple.

En supposant maintenant que l'échelle de l'aréomètre de M. Baumé soit formée, degré par degré,

par la dissolution successive de livres de sels dans les quantités d'eau indiquées, il est toujours un instrument fort grossier, puisqu'il n'indique que des centièmes, tandis qu'un bon aréomètre doit indiquer exactement jusqu'à des dix millièmes.

Si l'aréomètre de M. Baumé peut à peine donner quelques résultats plus ou moins éloignés de la vérité, on sent qu'il doit être bien plus éloigné encore de pouvoir servir pour toutes les dissolutions salines, comme son auteur le prétend, & comme l'annonce le nom qu'il lui a donné de pèse-liqueur pour les sels. Il est vraisemblable que M. Baumé ignoroit que chaque sel a pour l'eau une affinité particulière, que quand ils sont secs, ils solidifient une quantité plus ou moins grande de ce liquide en s'y dissolvant, & forment avec lui une composition dont les molécules hétérogènes sont plus rapprochées que le résultat des pesanteurs spécifiques des deux corps, supposés unis sans changement intérieur.

M. Baumé a aussi proposé son aréomètre, pour connoître la pesanteur spécifique des acides. Il a pris pour premier terme l'eau distillée qu'il nomme 0, & qu'il place au haut du tube; pour l'autre terme, c'est l'acide sulfurique le plus concentré, & l'espace contenu entre ces deux termes est divisé en 70 parties égales. L'usage de cet aréomètre appliqué aux acides, est sujet aux mêmes inconvénients que pour l'alcool & les sels; mais ses erreurs sont exprimées d'une manière inverse de celle des sels neutres; car ici il indique toujours plus d'acide qu'il n'y en a réellement, tandis qu'il annonce constamment dans l'autre cas moins de sel que l'eau n'en contient, puisque l'eau en se combinant à l'acide, perd du calorique & diminue de volume, & que le sel absorbe ce principe & augmente de volume. De-là il ne faut pas croire qu'un acide qui donnera 35 à l'aréomètre, contiendra la moitié de l'acide de celui qui donne 70 degrés. Quelques essais sur cet objet mettront cette assertion hors de doute; parties égales d'eau & d'acide sulfurique à 70 degrés qu'il, s'ils s'étoient combinés sans changement intérieur, auroient dû donner 35 degrés, en ont donné 41. L'aréomètre est donc ici en erreur de six degrés: erreur très-grande, puisque chaque degré exprime environ onze grains & demi. Il est vrai que cette inexactitude diminue à mesure que la proportion d'acide diminue elle-même.

L'application de cet instrument à la connoissance du poids des acides est infiniment plus difficile que pour les sels & l'alcool: car il est impossible d'obtenir tous ces corps dans l'état de pureté & entièrement privés d'eau, pour les combiner à différentes quantités de ce liquide & former une table, à moins que l'on se contentât d'employer pour cela les acides les plus purs & les plus concentrés; mais l'on ne connoitroit par-là que le rapport d'une combinaison intime d'eau &

d'acide réel avec l'eau qu'on auroit ajoutée, & non pas la véritable quantité d'acide.

Il en seroit d'ailleurs de cet instrument pour les acides, comme à l'égard des sels, il ne pourroit servir que pour un seul acide, car tel acide ne se conduit pas avec l'eau comme tel autre, & le résultat de leur combinaison ne garde point entre les molécules la même quantité respective de calorique.

L'aréomètre de M. Baumé pour les acides, est donc absolument à rejeter de toute opération qui demande de l'exactitude dans les résultats.

Dans ces derniers temps M. Briffon a proposé un aréomètre, à l'aide duquel on peut sans calcul, par la seule immersion, connoître le rapport de pesanteur de toutes sortes de liquides à celle de l'eau distillée.

Il est fondé sur ce principe, qu'un corps plongé dans des liqueurs de différentes densités, en mesure des volumes qui sont en raison inverse du leur pesanteur spécifique.

Ainsi pour construire un aréomètre qui, par la seule immersion, fit connoître le rapport de densité d'un liquide quelconque à celle de l'eau, il a déterminé exactement le rapport du volume de la partie plongée dans l'eau, au volume de la partie plongée dans ce liquide.

Comme un aréomètre, dont le poids ne change point, s'enfonce dans une liqueur moins dense plus que dans une liqueur plus dense, & que l'excédent est constamment en raison inverse de la densité de ces liqueurs, un aréomètre qu'on charge successivement de différents poids, s'enfonce davantage dans la même liqueur, à mesure qu'il est plus chargé; & la quantité dont il s'enfonce dans ce dernier cas, est toujours proportionnelle au poids dont il est chargé. Si donc, dit M. Briffon, on plonge dans l'eau un aréomètre qui pèse par exemple, d'abord 9 gros, & ensuite 10 gros, le volume de la partie plongée dans le premier cas, sera au volume de la partie plongée dans le second, comme 9 est à 10. Si ensuite l'aréomètre réduit à son premier poids qu'il appelle *poids primitif*, favoir 9 gros, on le plonge dans une liqueur moins dense que l'eau, & qu'il s'y enfonce jusqu'au point où il étoit dans l'eau, lorsqu'il pesoit 10 gros, il est clair que le volume de cette liqueur mesuré par l'aréomètre, sera au volume de l'eau mesuré par le même instrument, comme 10 est à 9; & puisque les densités sont en raison inverse des volumes, on peut conclure avec certitude que le poids de cette liqueur est à celle de l'eau, comme 9 est à 10. Ce raisonnement incontestable sert de base à Monsieur Briffon, pour graduer son aréomètre qui donne par l'immersion simple, & sans exiger de calcul, le rapport de pesanteur spécifique des différentes liqueurs à celle de l'eau distillée.

En ajoutant donc au poids primitif de l'aréomètre, ou en retranchant de ce poids dans un rapport convenable pour chaque degré avec ce poids primitif,

primitif, & en plongeant l'aréomètre ainsi chargé ou déchargé dans l'eau distillée, il en détermine exactement chaque degré. C'est de ces quantités convenables pour chaque degré qu'il a formé des tables qui peuvent servir à graduer des aréomètres de cette nature.

Voici la règle qu'il suit pour la confection de ces tables.

Le poids de l'aréomètre étant exactement connu.

Soit a le poids primitif de l'aréomètre ou la densité de l'eau.

Soit b , le volume d'eau qu'il déplace.

Soit x , le volume qu'il déplaceroit de plus que le volume b , dans un fluide dont la densité seroit à celle de l'eau :: $n : a$, n étant plus petit que a .

Le poids absolu du nouveau fluide déplacé étant égal au poids absolu de l'aréomètre, c'est-à-dire, au poids de l'eau qu'il déplace, le volume déplacé dans le fluide dont la densité est n , sera $b + x$ par la supposition. Donc la densité étant n , son poids absolu est $(b + x) \times n$.

Par la même raison, le poids absolu de l'aréomètre ou du volume d'eau qu'il déplace, est $b \times a$; il faut donc que $(b + x) \times n = b \times a$, ou que $b n + n x = b a$, d'où l'on tire $x = \frac{b(a-n)}{n}$ que l'on

peut changer en $x = b \times \frac{a-n}{n}$.

Cette règle fait voir que la quantité dont l'aréomètre doit plonger, de plus dans la liqueur, est une portion du volume qu'il déplace dans l'eau, exprimée par une fraction qui a pour numérateur la différence des densités de l'eau & du fluide dont il s'agit, & pour dénominateur, la densité de ce dernier.

n étant supposé plus petit que a , l'aréomètre alors y plongeroit plus que dans l'eau. Si n étoit plus grand que a , il est évident à l'inspection de la valeur de $x = b \times \frac{a-n}{n}$, que la valeur de x seroit négative, ce qui doit être en effet, puisqu'alors l'aréomètre doit moins plonger que dans l'eau. Toute la différence qu'il y a est donc, qu'au lieu d'ajouter au volume déplacé dans l'eau, ou ce qui est la même chose, au poids primitif de l'aréomètre, il faut au contraire en retrancher; mais la quantité que l'on doit retrancher se détermine toujours par la même règle.

Ainsi la quantité qu'il faut ajouter au poids primitif de l'aréomètre, ou qu'il en faut retrancher, est une fraction de ce poids, qui a pour dénominateur la densité que doit indiquer l'aréomètre ou le degré que l'on cherche; & pour numérateur la différence de cette densité à la densité de l'eau.

En supposant donc, comme le fait M. Brisson, que la densité de l'eau est égale à 1000, le dénominateur de cette fraction est le degré que l'on cherche, & le numérateur est ce qui manque au dénominateur pour faire 1000, ou

Chimie, Tome II.

l'excès du dénominateur sur 1000, & quand le dénominateur est moindre que 1000, qui est le cas où n est plus petit que a , la quantité exprimée par la fraction est additive; mais lorsque le dénominateur excède 1000, qui est le cas où n est plus grand que a , cette quantité est soustractive. On prendra donc un aréomètre de verre AB, (fig. 7, claf. 2,) convenablement lesté de mercure en f , & dont la tige sera suffisamment longue pour contenir le nombre de degrés que l'on veut y tracer. On introduira dans la tige le petit rouleau de papier qui doit porter cette graduation, l'instrument sera ensuite exactement pesé, on notera son poids, qui est celui que M. Brisson appelle *poids primitif*. L'aréomètre ainsi disposé doit être plongé dans de l'eau distillée, & le point C, où il s'arrêtera, sera marqué 1000; les autres degrés se forment en ajoutant ou en retranchant pour chacun des quantités indiquées par les tables.

Bien entendu, qu'il faut, comme en avertit M. Brisson, que la température de l'eau qui sert d'échelle à l'instrument, reste toujours la même pendant sa construction; & il pense que c'est le 14 X ° de l'échelle de Réaumur qui est le plus convenable, comme étant celui qu'on peut avoir la plus grande partie de l'année.

Il suffit, dit M. Brisson, de chetcher, par l'expérience, les termes de 10 en 10, & de diviser ensuite ces espaces en parties égales, qui seront autant de degrés. Cette méthode est, comme l'observe l'auteur lui-même, un peu défectueuse, mais elle ne peut pas causer une grande erreur, & peut être négligée.

Comme il n'est pas possible que le même aréomètre puisse servir pour toutes les liqueurs, il faut en construire, l'un qui soit destiné à peser les fluides qui sont plus denses que l'eau, & l'autre pour peser ceux qui sont plus légers. Les premiers, (fig. 7,) seront assez lestés pour s'enfoncer dans l'eau à quelques lignes de l'extrémité supérieure de leur tige, & sur cet endroit, on marquera le nombre 1000. La communication de la grosse boule à la petite, doit rester ouverte pour ajouter à son poids primitif. Les seconds (figure 7 bis.), doivent s'enfoncer dans l'eau à quelques lignes seulement au-dessus de la boule, on marquera là 1000; dans ce cas, la communication de la grosse boule avec la petite peut être fermée, car on n'a rien à ajouter au poids primitif, on n'a qu'à en retrancher.

M. Brisson a donné à sa table beaucoup d'étendue, afin qu'elle pût servir pour toutes les liqueurs, depuis les plus lourdes jusqu'aux plus légères; & pour la rendre d'un usage plus commode, il a réduit les fractions à leur plus simple expression.

Les degrés de l'échelle de l'aréomètre de M. Brisson ne sont point égaux comme ceux des aréomètres à échelles; ils sont d'autant étendus

Z 2

vers l'endroit qui doit indiquer une pesanteur moins grande, & vice versa.

Pour rendre la graduation plus facile & plus exacte, il s'est servi d'un moyen que M. de Montigny a employé dans la construction d'un aréomètre qu'il a destiné aux eaux-de-vie. Voici quel est ce moyen : sur le bord d'un vase *vv*, (fig. 9, classe 2.) de verre ou de métal, dont la longueur doit être un peu plus grande que celle de l'aréomètre *A B*, on fixe verticalement une tige quarrée d'ivoire *G D*, plus longue au moins d'un pouce que la tige de l'aréomètre, & sur laquelle glissera un curseur de cuivre *E F* — perpendiculaire à la tige quarrée, & dressé sur la partie inférieure. On remplit ce vase d'eau distillée, dont on le tient toujours également rempli. On y plonge l'aréomètre ; s'il est destiné uniquement pour les liqueurs moins denses que l'eau, il ne s'y enfoncera qu'à quelques lignes au-dessus de la boule, comme en *C*, le curseur étant en *g*, & touchant immédiatement l'extrémité supérieure *A* de la tige ; on tire un trait de crayon *g* que l'on marque 1000. On ajoute ensuite au poids primitif de l'aréomètre une quantité de lest qui égale $\frac{1}{10}$ de ce poids ; il s'enfoncera encore d'une certaine quantité jusqu'en *H*. Par exemple, le curseur doit descendre d'autant, & étant fixé en *h*, on tire encore un trait que l'on marque 990. Ayant ôté le mercure qu'on y avoit mis, on ajoute de nouveau au poids de l'aréomètre une quantité de mercure qui égale $\frac{1}{10}$ de ce poids. L'aréomètre renfoncera encore d'une certaine quantité, par exemple en *I*, on opérera pour cette fois, comme précédemment, en ajoutant pour chaque dixième, la quantité de poids indiquée par la totalité.

Après l'opération, la graduation se trouvera sur la tige quarrée *G D* ; il faut la transporter sur un rouleau de papier qu'en aura mis dans la tige de son instrument, ce à quoi on parvient au

moyen d'un compas, mais il faut avoir attention qu'elle soit placée d'une manière inversée ; c'est-à-dire, que le terme 1000, au lieu d'être en haut, soit vers le bas en *G*, & les autres termes en montant, comme on le voit, *C, D, E, F*, (fig. 7, classe 2.), ensuite en enfonçant plus ou moins le rouleau de papier dans la tige de l'aréomètre, on fera répondre exactement le terme 1000 au point *G* de la tige qui se trouvera à la surface de l'eau, l'aréomètre n'étant chargé que de son poids primitif. Si l'on veut graver un aréomètre destiné à peser les liqueurs plus denses que l'eau, son lest doit le faire enfoncer jusqu'à quelques lignes de la partie supérieure *A* de la tige, on fera donc glisser le curseur *E F*, jusqu'à ce qu'il touche immédiatement l'extrémité de la tige de l'aréomètre, & là, on tirera un trait de crayon que l'on marquera 1000, ensuite en retranchant du poids primitif de l'aréomètre $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{10}$, &c. on marquera en montant sur la tige quarrée *G D*, 1010, 1020, 1030, &c. La graduation étant achevée, on la transportera sur le rouleau de papier, en observant, comme il a été dit plus haut, pour l'autre aréomètre, de la placer dans un sens inversé à celui dans lequel elle est sur la tige quarrée, comme on le voit en *C, H, I, K*, (fig. 7 bis.) Il est essentiel que le pied du curseur n'embrasse la tige quarrée d'ivoire que sur trois côtés, en portant seulement aux rebords, qui fassent ressort sur le quatrième, afin qu'en le faisant glisser le long de la tige quarrée on n'efface point les traits qu'on y aura marqués auparavant.

Cette graduation étant très-délicate à faire, & demandant beaucoup de soins & d'attention, M. Brisson conseille de n'en point confier l'exécution à des ouvriers ordinaires ; elle doit être réservée aux physiciens eux-mêmes, sur-tout lorsqu'ils desinent mettre de l'exactitude dans leurs travaux.

TABLE des quantités qu'il faut ajouter aux poids de l'aréomètre, ou retrancher de ce poids, pour le graduer de 10 en 10 degrés.

Pour ajouter	Pour ôter	Pour ôter	Pour ôter
700 ^{de} $\frac{100}{700}$ ou $\frac{1}{7}$ du poids de l'aréomètre.	1030 $\frac{30}{1030}$ $\frac{3}{103}$	1360 $\frac{360}{1360}$ $\frac{9}{34}$	1690 $\frac{690}{1690}$ $\frac{36}{179}$
710 $\frac{100}{710}$ $\frac{10}{71}$	1040 $\frac{40}{1040}$ $\frac{1}{104}$	1370 $\frac{370}{1370}$ $\frac{37}{137}$	1700 $\frac{700}{1700}$ $\frac{7}{17}$
720 $\frac{100}{720}$ $\frac{10}{72}$	1050 $\frac{50}{1050}$ $\frac{1}{105}$	1380 $\frac{380}{1380}$ $\frac{19}{69}$	1710 $\frac{710}{1710}$ $\frac{71}{171}$
730 $\frac{100}{730}$ $\frac{10}{73}$	1060 $\frac{60}{1060}$ $\frac{3}{106}$	1390 $\frac{390}{1390}$ $\frac{19}{139}$	1720 $\frac{720}{1720}$ $\frac{18}{43}$
740 $\frac{100}{740}$ $\frac{10}{74}$	1070 $\frac{70}{1070}$ $\frac{7}{107}$	1400 $\frac{400}{1400}$ $\frac{2}{70}$	1730 $\frac{730}{1730}$ $\frac{73}{173}$
750 $\frac{100}{750}$ $\frac{10}{75}$	1080 $\frac{80}{1080}$ $\frac{1}{108}$	1410 $\frac{410}{1410}$ $\frac{41}{141}$	1740 $\frac{740}{1740}$ $\frac{37}{43}$
760 $\frac{100}{760}$ $\frac{10}{76}$	1090 $\frac{90}{1090}$ $\frac{9}{109}$	1420 $\frac{420}{1420}$ $\frac{21}{71}$	1750 $\frac{750}{1750}$ $\frac{7}{35}$
770 $\frac{100}{770}$ $\frac{10}{77}$	1100 $\frac{100}{1100}$ $\frac{1}{110}$	1430 $\frac{430}{1430}$ $\frac{43}{143}$	1760 $\frac{760}{1760}$ $\frac{19}{44}$
780 $\frac{100}{780}$ $\frac{10}{78}$	1110 $\frac{110}{1110}$ $\frac{11}{111}$	1440 $\frac{440}{1440}$ $\frac{11}{36}$	1770 $\frac{770}{1770}$ $\frac{77}{177}$
790 $\frac{100}{790}$ $\frac{10}{79}$	1120 $\frac{120}{1120}$ $\frac{1}{112}$	1450 $\frac{450}{1450}$ $\frac{9}{37}$	1780 $\frac{780}{1780}$ $\frac{39}{45}$
800 $\frac{100}{800}$ $\frac{10}{80}$	1130 $\frac{130}{1130}$ $\frac{13}{113}$	1460 $\frac{460}{1460}$ $\frac{23}{63}$	1790 $\frac{790}{1790}$ $\frac{79}{179}$
810 $\frac{100}{810}$ $\frac{10}{81}$	1140 $\frac{140}{1140}$ $\frac{7}{126}$	1470 $\frac{470}{1470}$ $\frac{47}{147}$	1800 $\frac{800}{1800}$ $\frac{4}{90}$
820 $\frac{100}{820}$ $\frac{10}{82}$	1150 $\frac{150}{1150}$ $\frac{1}{115}$	1480 $\frac{480}{1480}$ $\frac{12}{37}$	1810 $\frac{810}{1810}$ $\frac{81}{181}$
830 $\frac{100}{830}$ $\frac{10}{83}$	1160 $\frac{160}{1160}$ $\frac{4}{29}$	1490 $\frac{490}{1490}$ $\frac{49}{149}$	1820 $\frac{820}{1820}$ $\frac{41}{45}$
840 $\frac{100}{840}$ $\frac{10}{84}$	1170 $\frac{170}{1170}$ $\frac{17}{117}$	1500 $\frac{500}{1500}$ $\frac{1}{30}$	1830 $\frac{830}{1830}$ $\frac{83}{183}$
850 $\frac{100}{850}$ $\frac{10}{85}$	1180 $\frac{180}{1180}$ $\frac{9}{130}$	1510 $\frac{510}{1510}$ $\frac{51}{151}$	1840 $\frac{840}{1840}$ $\frac{42}{46}$
860 $\frac{100}{860}$ $\frac{10}{86}$	1190 $\frac{190}{1190}$ $\frac{19}{119}$	1520 $\frac{520}{1520}$ $\frac{13}{38}$	1850 $\frac{850}{1850}$ $\frac{17}{47}$
870 $\frac{100}{870}$ $\frac{10}{87}$	1200 $\frac{200}{1200}$ $\frac{1}{60}$	1530 $\frac{530}{1530}$ $\frac{53}{153}$	1860 $\frac{860}{1860}$ $\frac{43}{48}$
880 $\frac{100}{880}$ $\frac{10}{88}$	1210 $\frac{210}{1210}$ $\frac{21}{121}$	1540 $\frac{540}{1540}$ $\frac{27}{58}$	1870 $\frac{870}{1870}$ $\frac{87}{187}$
890 $\frac{100}{890}$ $\frac{10}{89}$	1220 $\frac{220}{1220}$ $\frac{11}{61}$	1550 $\frac{550}{1550}$ $\frac{11}{73}$	1880 $\frac{880}{1880}$ $\frac{44}{49}$
900 $\frac{100}{900}$ $\frac{10}{90}$	1230 $\frac{230}{1230}$ $\frac{23}{123}$	1560 $\frac{560}{1560}$ $\frac{14}{42}$	1890 $\frac{890}{1890}$ $\frac{45}{49}$
910 $\frac{100}{910}$ $\frac{10}{91}$	1240 $\frac{240}{1240}$ $\frac{6}{31}$	1570 $\frac{570}{1570}$ $\frac{57}{157}$	1900 $\frac{900}{1900}$ $\frac{9}{190}$
920 $\frac{100}{920}$ $\frac{10}{92}$	1250 $\frac{250}{1250}$ $\frac{1}{50}$	1580 $\frac{580}{1580}$ $\frac{29}{55}$	1910 $\frac{910}{1910}$ $\frac{91}{191}$
930 $\frac{100}{930}$ $\frac{10}{93}$	1260 $\frac{260}{1260}$ $\frac{13}{97}$	1590 $\frac{590}{1590}$ $\frac{59}{159}$	1920 $\frac{920}{1920}$ $\frac{46}{48}$
940 $\frac{100}{940}$ $\frac{10}{94}$	1270 $\frac{270}{1270}$ $\frac{27}{127}$	1600 $\frac{600}{1600}$ $\frac{1}{40}$	1930 $\frac{930}{1930}$ $\frac{93}{193}$
950 $\frac{100}{950}$ $\frac{10}{95}$	1280 $\frac{280}{1280}$ $\frac{14}{91}$	1610 $\frac{610}{1610}$ $\frac{61}{161}$	1940 $\frac{940}{1940}$ $\frac{47}{49}$
960 $\frac{100}{960}$ $\frac{10}{96}$	1290 $\frac{290}{1290}$ $\frac{29}{129}$	1620 $\frac{620}{1620}$ $\frac{31}{81}$	1950 $\frac{950}{1950}$ $\frac{19}{195}$
970 $\frac{100}{970}$ $\frac{10}{97}$	1300 $\frac{300}{1300}$ $\frac{1}{33}$	1630 $\frac{630}{1630}$ $\frac{63}{163}$	1960 $\frac{960}{1960}$ $\frac{48}{50}$
980 $\frac{100}{980}$ $\frac{10}{98}$	1310 $\frac{310}{1310}$ $\frac{31}{131}$	1640 $\frac{640}{1640}$ $\frac{16}{102}$	1970 $\frac{970}{1970}$ $\frac{97}{197}$
990 $\frac{100}{990}$ $\frac{10}{99}$	1320 $\frac{320}{1320}$ $\frac{8}{165}$	1650 $\frac{650}{1650}$ $\frac{11}{150}$	1980 $\frac{980}{1980}$ $\frac{49}{50}$
1000 direct	1330 $\frac{330}{1330}$ $\frac{33}{133}$	1660 $\frac{660}{1660}$ $\frac{11}{150}$	1990 $\frac{990}{1990}$ $\frac{99}{199}$
1010 $\frac{100}{1010}$ $\frac{10}{101}$	1340 $\frac{340}{1340}$ $\frac{17}{77}$	1670 $\frac{670}{1670}$ $\frac{67}{167}$	2000 $\frac{1000}{2000}$ $\frac{1}{200}$
1020 $\frac{100}{1020}$ $\frac{10}{102}$	1350 $\frac{350}{1350}$ $\frac{7}{195}$	1680 $\frac{680}{1680}$ $\frac{22}{77}$	

Z z a

M. Nikolson a su réunir dans un seul instrument la double propriété de faire connoître la pesanteur spécifique des liquides & des solides ; ainsi avec lui on peut, à la rigueur, se passer de balance hydrostatique & de pèse-liqueur, puisqu'il remplit absolument les mêmes conditions. En voici la description, tirée d'une de ses lettres à M. Magellan, & que M. de Morveau nous a communiquée.

Description d'un nouvel instrument, propre à mesurer la pesanteur spécifique des solides & des fluides, tirée d'une lettre de M. William Nikolson à M. Jean-Henri Magellan, de la société royale de Londres.

Après avoir fait honneur au célèbre Boyle de l'invention de l'hydromètre & de l'aréomètre, destiné par ce grand physicien à des expériences hydrostatiques sur les métaux, & sur-tout à éprouver les guinées, M. Nikolson en donne une description abrégée ; il parle ensuite de celui de M. Clarke, publié en 1730, & qui, quoique bien inférieur à celui de Boyle, perfectionné par Farenheit, est cependant employé en Angleterre par les officiers de l'acisie. Le docteur Fordyce & M. Quin ont aussi tenté de perfectionner l'hydromètre, leurs instruments ont chacun leur avantage : celui de M. Quin est d'un usage plus facile, plus prompt & plus commode ; mais celui du docteur Fordyce est, de tous ceux de ce genre, le plus parfait.

M. Nikolson décrit ainsi celui qu'il a inventé, & en donne les dimensions suivantes. Voy. fig. 10, classe 2.

AA représente un petit bassin de balance. On peut le détacher à volonté ; son diamètre est de 1 pouce $\frac{1}{2}$, il pèse 44 grains.

B Une tige d'acier, diamètre $\frac{1}{16}$ de pouce.

E Un globe de cuivre creux, diamètre 2 pouces $\frac{1}{2}$; son poids avec la tige à laquelle il tient, est de 369 grains.

FF Chappe ou étrier d'acier, tenant par une vis au globe au point C.

G Est un petit bassin de balance servant de contre-poids, diamètre 1 pouce $\frac{1}{2}$; il pèse avec la chappe 1634 grains. On peut prendre les autres dimensions sur le dessin même, qui représente l'instrument au tiers de sa grandeur réelle.

Dans la construction, on suppose que le bassin supérieur porte constamment 1000 grains, quand le bassin inférieur est vide, & que l'instrument est plongé jusqu'au milieu de la tige dans de l'eau distillée, à la température de 60°, au thermomètre de Fahrenheit. La longueur de la tige, ainsi que la distance du bassin inférieur à la surface du globe, est arbitraire ; mais la longueur de la tige étant fixée, le bassin inférieur peut devenir d'autant plus léger, & conséquemment aussi le globe d'autant plus petit, que le bassin inférieur sera plus

éloigné de ce globe, & vice versa. Il faut noter que le diamètre de chaque bassin ne doit pas être moindre que le côté d'un cube d'eau, pesant 1,000 grains, c'est-à-dire, que 2 pouces, 4.

Les distances du bassin supérieur & de l'inférieur étant déterminées respectivement à la surface la plus proche du globe, ajoutez un demi-côté d'un cube d'eau pesant 1,000 grains, à la distance du bassin supérieur au globe ; vous pouvez considérer la distance augmentée d'un demi-côté de cube d'eau, pesant 1,000 grains, & celle du bassin inférieur, comme les deux bras d'un levier ; & d'après la propriété de cette force mécanique, vous établirez la proportion suivante.

Comme le nombre exprimant la distance inférieure est à tout le poids au-dessus, & nommément aux 1,000 grains ajoutés au poids du bassin supérieur, ainsi est le nombre exprimant la distance supérieure à tout le poids inférieur, quand l'instrument est en équilibre.

Ce dernier poids trouvé doit être considérablement augmenté, afin que l'instrument puisse prendre & garder une position verticale.

Additionnez ensemble le poids du bassin inférieur ainsi trouvé, celui du bassin supérieur & de sa charge, ajoutez-y le poids évalué du globe & des tiges. Le diamètre d'une sphère d'eau égale en poids à celui de ces trois poids réunis, fera égal à celui du globe qui sera flotter le tout.

L'auteur prétend que ce procédé pouvant se déduire aisément des loix connues de l'hydrostatique, il est inutile d'appuyer sur la démonstration ; en conséquence, il passe à l'usage de son instrument, qu'il se contente d'indiquer légèrement.

Manière de mesurer les pesanteurs spécifiques & les dilatations thermométriques des fluides.

L'instrument, médiocrement enfoncé dans l'eau, représente, lorsqu'il est chargé, un poids de 3,100 grains. Il est pourtant nécessaire dans la pratique de déterminer exactement par des expériences le poids réel, ce poids est égal à celui d'une quantité d'eau distillée & à la température de 60 degrés, (Fahrenheit) dont le volume est égal à la partie inférieure de l'instrument à prendre au milieu de latige ; en conséquence si l'instrument est plongé jusqu'au milieu de la tige dans quelque autre fluide également à la température de 60 degrés, ce qu'on peut effectuer en variant le poids, la différence entre ce dernier poids & les 3,100 grains, sera la différence qu'il y a entre des volumes d'eau ou d'autres fluides égaux au volume de la partie plongée, puisqu'on sait que le poids de la masse d'eau est de 3,100 grains, auxquels on doit ajouter cette différence si elle excède, comme on doit l'en soustraire si elle est au-dessous, le reste donnera un nombre dont le rapport à 3,100 grains exprimera le rapport de pesanteur spécifique du fluide ex

question à celle de l'eau, & ce rapport sera estimé avec beaucoup de justesse, puisque la verge de l'instrument n'ayant de diamètre qu'un quarantième de pouce, l'addition ou la soustraction d'un dixième de grain le fera enfoncer ou surmonter de près d'un pouce, en sorte que l'instrument sera sensible jusques à un vingtième de grain ou un soixante & deux millièmes du poids total, conséquemment on aura jusques à la cinquième décimale la pesanteur spécifique des corps les fluides dans lesquels on le plonge.

Il est évident que cet instrument est une sorte de thermomètre, qui servira mieux que tout autre à juger de la dilatation des fluides par la chaleur. Comme dans le thermomètre ordinaire les fluides montent par l'excès de la dilatation de la liqueur sur celle du verre qui la contient, l'instrument de M. Nikolson descendra par l'excès de la dilatation de la liqueur sur celle des parties dont il est composé.

Manière de mesurer la pesanteur spécifique des solides.

Il ne faut pas qu'ils pèsent plus de 1,000 grains.

On placera l'instrument dans l'eau distillée, & on le chagera par le bassin supérieur jusqu'à ce que la surface de l'eau coupe la tige en deux; si le poids nécessaire pour arriver à ce point est exactement de 1,000, c'est une preuve que l'eau est à 60 degrés au thermomètre de Fahrenheit; s'il faut plus ou moins, l'eau est plus chaude ou plus froide. Après avoir pris note du poids, déchargez le bassin & mettez-y le corps dont vous cherchez la pesanteur spécifique; ajoutez au poids ce qu'il faut pour que l'instrument enfoncé jusqu'à moitié de sa tige, la différence entre le poids ajouté & le premier poids sera le poids du corps dans l'air: placez ensuite le corps dans le bassin inférieur, c'est-à-dire, dans l'eau, & ajoutez des poids dans le bassin supérieur jusqu'à ce que l'eau coupe encore la tige en deux; ce poids ajouté donnera la différence entre les 1,000 grains, & le poids du corps dans l'eau.

Nous croyons à propos de joindre ici l'exemple que donne M. Nikolson, pour rendre sa théorie plus sensible, en avertissant cependant que la pesanteur spécifique de l'étain & du plomb, & probablement des autres métaux, variera à la troisième décimale si la même pièce de métal a subi une seconde fusion. Cette différence nait probablement de l'arrangement qu'affectent les parties en se refroidissant plus ou moins vite.

Exemple: Soit la note du poids 999,10 grains.
Le poids ajouté à un morceau de
plomb..... 210,85

La différence..... 788,25
est le poids du plomb dans l'air.

Le poids ajouté (le plomb étant
au bas)..... 280,09 grains.

La différence est..... 69,24
C'est-à-dire, la perte de poids
par l'immersion.

Or, $\frac{788,25}{69,24} = 11,384$ ou $11,384$, qui est la pesanteur spécifique.

Quand l'instrument a été une fois bien ajusté dans l'eau distillée, on peut se servir ensuite d'eau commune.

Comme on fait que le rapport de la pesanteur spécifique de l'eau qu'on emploie à celle de l'eau distillée est $\left[= \frac{1}{\gamma} \right]$; & le rapport de la pesanteur spécifique du solide à l'eau dont on fait usage, donnant l'expression connue $\left[= \frac{1}{\gamma} \right]$: le rapport de la pesanteur spécifique du corps à celle de l'eau distillée; sera en raison composée de deux, (c'est-à-dire, $\frac{1}{\gamma^2}$).

On est fondé à inférer des expériences de différents physiciens, poursuit M. Nikolson, qu'ils n'ont pas fait grande attention ni à la température ni à la pesanteur spécifique de l'eau qu'ils employoient. Ceux qui n'exigent pas une grande précision dans leurs expériences, pourront substituer une tige plus grosse à celle que M. Nikolson emploie, & qui doit pouvoir s'oter à volonté.

Les attractions & les répulsions qui ont lieu à la surface de l'eau, sont ce qui rend les expériences hydrostatiques si délicates.

Le meilleur moyen pour corriger ces irrégularités, est d'essuyer avec soin tout l'instrument, & particulièrement la tige avec un linge blanc. On ne peut compter sur la justesse des poids des bassins, tant qu'il se trouvera une élévation ou un enfoncement dans l'eau autour de la tige.

Théorie de l'aréomètre, ou pèse-liqueur de Nikolson, figure 2, classe 2.

Soit P le poids absolu de l'aréomètre.

V le volume constant de sa partie plongée.

La pesanteur spécifique de l'eau distillée à la température de 10 degrés, & à la pression de 28 pouces.

a Le poids additionnel pour que l'instrument s'y enfonce au point marqué.

On aura,

$$(1) P + a = V \pi, V = \frac{P + a}{\pi}$$

Soit de plus π la pesanteur spécifique de la liqueur dans laquelle on va opérer.

b Le poids additionnel pour enfoncer l'aréomètre comme précédemment.

On aura,

$$(2) P + b = V w', w' = \frac{P + b}{V} = \frac{(P + b) \pi}{(V + d)}$$

Ainsi la pesanteur spécifique de la liqueur dans laquelle on veut opérer, est égale au quotient de la somme du poids de l'instrument & du poids additionnel, dans le cas actuel, divisé par la somme du même poids de l'arôme, & du poids additionnel primitif; la pesanteur spécifique de l'eau distillée, aux conditions ci-dessus énoncées, étant prise pour l'unité.

Maintenant soit vx , le poids du corps dont on cherche la pesanteur spécifique x ; son volume étant par conséquent v , & nommons c le poids additionnel nécessaire.

On aura,

(3) $P + c + vx = V w'$, mais (2) $V w' = P + b$; donc $c + vx = b$, & par conséquent, $x = \frac{b-c}{v}$. Soit enfin d le poids additionnel, lorsque vx est plongé dans la liqueur,

On aura,

(4) $P + d + vx = V w' + v w'$; mais (3) $V w' = P + b$; donc, $d = c + v w'$; d'où l'on tire $w = \frac{d-c}{v}$.

Mettant pour v la valeur dans l'expression de x , on aura $x = \frac{(b-c) w'}{(d-c)}$, c'est-à-dire, que la pesanteur spécifique d'un corps est égale au quotient de son poids absolu, divisé par sa perte de poids dans la liqueur où on le plonge, & multiplié par la pesanteur spécifique de cette même liqueur, ce qui est d'ailleurs évident.

Voyez l'article ALCOOLS (Pharmacie.) où l'aréomètre de l'aréinheit, est employé pour déterminer la pesanteur spécifique de toutes les liqueurs, depuis l'acide sulfurique très-concentré jusqu'à l'éther, au moyen de changement de lest.

AREQUIER. *Areca catechu*. L. C'est un palmier indien, dont le fruit est appelé *arec*. La chair extérieure de ce fruit se mange avec le bétel, mais le noyau qu'elle enveloppe est d'un usage beaucoup plus général. Son goût est un peu astringent, & l'expérience que les Indiens ont qu'il est utile à l'estomac, & propre à adoucir la salive, le fait servir d'une espèce de régal parmi eux. L'*arec* est antidiarrhéique. Toutes les parties de ce palmier ont une saveur astringente & stiptique. Ses fleurs lorsqu'elles s'ouvrent répandent une odeur foible à la vérité, mais agréable & plus sensible le matin ou le soir, que dans la chaleur du jour.

Depuis un temps immémorial, les auteurs de matière médicale croyoient que le cachou se retiroit de l'*arec*, mais Kerr, chirurgien anglais, qui a vécu pendant long-temps au Bengale, a vu que

le cachou provient d'une espèce de mimosa. L'illustre M. Murray, ayant eu connoissance de cette découverte, s'empresse de publier une excellente monographie à ce sujet, dans laquelle il présente la description botanique de l'arbre qui donne le cachou; il le nomme *mimosa catechu*.

L'*arequier* le trouve encore en Chine & aux îles Moluques.

(M. WILLEMET).

ARGEMONE ou PAVOT ÉPINEUX. *Argemone Mexicana*. L. *Papaver spinosum* Bauh. pin. 171. Cette plante annuelle, indigène aux Indes, au Mexique, à l'Amérique septentrionale, à l'île-de-France, est de la famille des pavots. On la cultive dans les jardins pour la beauté de ses fleurs; c'est le charbon béni des Américains, & la fleur du diable des Espagnols. La fleur de l'*argemone* est anodine, pectorale, hypnotique contre la diarrhée & la dysenterie. Les feuilles sont vulnéraires, résolutives, ophtalmiques, détersives contre les inflammations. Sloane assure que deux gros de semence d'*argemone* en poudre suffisent pour purger. M. Andanson rapporte que les nègres du Sénégal boivent la décoction des racines de cette plante pour faire couler les chaudières.

Le suc de cette plante est jaune, pesant, épaissi; il ressemble à la gomme-gutte, il teint en jaune.

(M. WILLEMET.)

ARGENT. Il n'y a que peu de substances plus utiles que l'argent parmi les productions de la nature. La flexibilité & la ductilité ainsi que l'inaltérabilité de ce beau métal par un très-grand nombre de corps, le rendent précieux pour une foule d'usages économiques, & cela avec autant plus d'avantages, qu'il est moins rare que l'or. Les alchimistes & les chimistes se sont beaucoup occupés de l'argent, & on connoît aujourd'hui un grand nombre d'expériences sur ce métal. Les modernes ont aussi fait plusieurs découvertes importantes sur l'argent, & la doctrine pneumatique a sur-tout éclairci tous les points de son histoire. On pourra prendre une idée bien exacte de l'état actuel de la science à cet égard, si après avoir lu cet article, on consulte celui que Macquer a consacré dans la dernière édition de son dictionnaire de chimie en 1777. Cet auteur, complet pour son temps, fait vraiment l'époque frappante du passage de la chimie, entre ce qu'on peut déjà appeler l'époque moyenne, ou en quelque sorte l'âge moyen de son histoire, & les temps nouveaux.

L'argent nommé *Lune* ou *Diane* par les alchimistes, est d'abord rangé parmi les métaux *parfaits*, *nobles* ou *inaicérables*. Il est d'une couleur blanche & du brillant le plus vif. Il n'a ni saveur ni odeur, on l'a représenté par le caractère de la lune en croissant.

Sa pesanteur spécifique est telle, qu'il perd à la balance hydrostatique environ un onzième de son

poids. Il est placé après le platine, l'or, le mercure & le plomb. Suivant M. Brisson, sa pesanteur spécifique est de 104743. Un pied cube de ce métal pèse plus de 730 livres lorsqu'il est pur. La couleur de l'argent n'est pas si variable que celle de l'or. Tiller dit qu'on voit plus de pores dans ce métal que dans l'or avec le microscope.

L'argent est d'une si grande ductilité, qu'on le bat en lames aussi minces que le papier, & qu'on le réduit en fils aussi fins que des cheveux. Un grain d'argent se peut former par son extension un vaisseau capable de contenir une once d'eau & un fil de 400 picds de longueur, cependant il est moins malléable encore que l'or pur.

Sa tenacité est assez considérable pour qu'un fil d'argent d'un dixième de ponce de diamètre puisse soutenir un poids de 370 livres sans se rompre.

Sa dureté & son élasticité sont moindres que celles du cuivre, & plus fortes que celles de l'or, du plomb & de l'étain. Il est le plus sonore des métaux après le cuivre; le son qu'il rend est aigu & assez beau pour qu'on se serve souvent de l'expression, son argentin.

L'argent s'écrout sous le marteau, & il est très-susceptible de perdre l'écroutissement par le recuit.

MM. Tillet & Mongez on fait cristalliser de l'argent en le fondant, & en le laissant refroidir lentement. Ils ont obtenu des pyramides quadrilatères, quelquefois isolées, sur-tout vers les bords du creuset. Ces pyramides tétraèdres examinées à la loupe avec attention, paroissent raboteuses, inégales, hérissées de pointes; on reconnoît qu'elles sont formées par des octaèdres implantés les uns sur les autres. Et telle paroît être la forme primitive de ce métal, ainsi que celle de l'or & de la plupart des substances métalliques.

L'argent se trouve en plusieurs états dans la nature. Les principales mines de ce métal peuvent être réduites aux suivantes.

1°. L'argent natif ou pur on le reconnoît à son brillant & à sa ductilité. Il offre un grand nombre de variétés pour la forme. Il est souvent en masses irrégulières plus ou moins considérables. Quelquefois il est en fils capillaires contournés, & il paroît alors devoir sa formation à une mine d'argent rouge décomposée, comme l'ont observé Henckel & Romé de Lile. On le rencontre aussi en lames, en réseaux qui imitent les toiles d'araignées, & que les Espagnols appellent à cause de cela *arant*; en végétation on en rameaux formés par des octaèdres implantés les uns sur les autres. Quelques uns de ces échantillons offrent la forme d'une feuille de fougère; d'autres présentent des cubes & des octaèdres isolés, dont les angles sont tronqués; ces dernières sont les plus rares. L'argent natif est souvent dispersé dans une gangue quartzeuse; quelquefois on le rencontre dans des terres grasses.

L'argent natif se trouve au Pérou, au Mexique, à Kongsberg en Norwège, à Johan-Georgens-

taldt, à Chrenfriedersdorf, en Saxe; à Sté-Marie, à Allemont en Dauphiné, &c. On ne connoît point dans la nature ce métal en état d'oxide. M. Mongez distingue sept variétés de l'argent natif, qu'il décrit ainsi.

1°. L'argent natif solide ou en masses irrégulières. *Kongsberg* en Norwège, *Neumarten* en Wermland, où il a pour gangue une terre argilleuse; à *Sté-Marie aux Mines*, on en a trouvé des masses de 50 à 60 livres dans de la terre grasse (Monnet, ouvr. cité, p. 278. 2°. L'argent natif en grains. Il est en petits grains ronds ou plats, disséminés dans les mines & les pierres; le *Mexique* & le *Potosi*; 3°. L'argent natif en filaments contournés de différentes manières; c'est celui que les allemands nomment *Silberohne*; *Allemont* en Dauphiné; *Kongsberg*, le *Mexique*. 4°. L'argent natif en germination, on sous la forme de dendrites; il imite la ramification des arbres ou de la mouffe; *Kongsberg*, *Potosi*, *Schantz*. 5°. L'argent natif en lames minces, on le rencontre dans les fissures des pierres; *Kongsberg*, *Freyberg*, *Georgenstadt*. 6°. L'argent natif capillaire, presque dans toutes les mines d'argent, & c'est même un des états où on le rencontre plus souvent natif. Suivant Henckel & plusieurs auteurs minéralogistes, cette variété ainsi que la précédente sont dues à la décomposition de la mine d'argent rouge, § 166. 7°. L'argent natif cristallisé en octaèdres & en cubes isolés; *Kongsberg*, *Sté Marie aux Mines*.

2°. L'argent natif uni à l'or, au cuivre, au fer, à l'arsenic, à l'antimoine, ou à l'or & au cuivre ensemble, ou à l'arsenic & au fer en même-temps. C'est à Freyberg en Saxe & dans les mines du Guadal-Canal en Espagne qu'on trouve ces variétés d'argent natif allié. Mais il faut observer que ces substances métalliques étrangères n'y sont qu'en très-petite quantité, & que l'argent y jouit de la plupart de ses propriétés.

3°. La mine d'argent vitreuse est, suivant la plupart des minéralogistes, formée d'argent & de soufre. Elle est d'un gris noirâtre semblable au plomb; il y en a de brune, de verdâtre, de jaunâtre, &c. on la coupe au couteau comme ce dernier métal. Elle est souvent informe, quelquefois cristallisée en octaèdres ou en cubes, dont les angles paroissent tronqués, ces derniers sont le passage de l'octaèdre au cube. M. Monnet en distingue une variété qui se réduit en poudre, au lieu de se couper. Cette mine donne depuis 72 jusqu'à 84 livres d'argent par quintal, elle se fond très-facilement; si on l'expose à une chaleur douce sans la fondre, le soufre se dissipe & l'on obtient l'argent en végétation ou en fils. Suivant M. Mongez, on peut distinguer neuf variétés de la mine d'argent vitreuse; elles ne diffèrent entr'elles que par la forme ou par la couleur. 1°. La mine d'argent vitreuse, couleur de mine de plomb, c'est la plus commune; 2°. Brune; Bruckman en cite une de cette couleur qui étoit verte intérieure.

ment ; 3°. Jaunâtre : cette couleur est due à la portion d'arsenic qu'elle contient & qui mêlé avec le soufre, forme de l'orpiment ; 4°. Verdâtre ; 5°. Bleuâtre : elle est friable, semblable à des scories, ce qui lui a fait donner par les mineurs de Freyberg le nom de *Schlackeuerz*, mine de scorie ; 6°. en végétation ; 7°. en feuillets ; 8°. cristallisée en octaèdre, ou en prisme hexaèdre, ou en pyramides décroissantes ; 9°. enfin superficielle, lorsqu'elle recouvre des pierres.

La mine d'argent rouge, est souvent foncée en couleur, quelquefois transparente, cristallisée en cubes dont les bords sont tronqués, & en prismes hexaèdres, terminés par des pyramides trièdres ; on la nomme *Rosst-elerz* au Porosi. L'argent y est combiné avec le soufre & l'arsenic. Suivant Bergman, elle contient par quintal 60 d'argent, 27 d'arsenic & 13 de soufre. Lorsqu'on la casse, sa couleur est plus claire en dedans, & elle paroît formée de petites aiguilles ou de prismes convergens comme les stalactites. Si on l'expose à un feu bien ménagé & capable de la faire rougir, l'argent se réduit, & forme des végétations capillaires semblables à l'argent natif. Elle donne depuis 58 jusqu'à 62 livres d'argent par quintal. Les variétés de cette sorte sont relatives à la couleur plus ou moins foncée, à la forme, à la pesanteur ; on trouve en général l'argent rouge dans tous les lieux où existent les autres mines d'argent. M. Mongez décrit avec soin les propriétés & les variétés de la mine d'argent rouge. Elle est, dit-il, pesante, d'un rouge plus ou moins fort, quelquefois d'un rouge foncé, d'autres fois approchant du pourpre ; elle est brillante, & si on la brise, sa poussière est toujours rouge ; elle est presque toujours opaque quand elle est en masse régulière ; mais demi-transparente lorsqu'elle est cristallisée ; elle est très-friable & exposée au feu elle décrépité, laisse échapper des vapeurs arsenicales & une odeur d'ail, & fond avant que de rougir. La présence du soufre dans cette mine est prouvée par la couleur rouge qu'elle a, & qui est due à l'union du soufre, & de l'arsenic, & par sa détonnation avec le nitre ; en la chauffant par degré & avec précaution, l'arsenic & le soufre se dégagent, le volatilifient & laissent l'argent à nud sous la forme de végétation capillaire. Cette mine contient un peu de fer, sur-tout celle qui est foncée en couleur à Krémnitz en Hongrie, & à Joachimsthal, on en a trouvé qui tenoit un peu d'or. Les principales variétés de la mine d'argent rouge sont : 1°. la rouge opaque qui vient du Porosi, & que les Espagnols nomment *Rosst-elerz*, sa couleur approche de celle du cinabre ; elle est brillante, friable, & en masse ; c'est la plus riche de toutes. Outre le Porosi, Andreasberg en Harz, Salberg en Westmanie 1°. La rouge avec une nuance bleue, Freyberg, Annaberg. 2°. La rouge grise, réduite en poussière, la nuance blanche disparaît & la couleur rouge reste. 3°. La rouge noire ; c'est un rouge extrêmement foncé ;

4°. Transparente & cristallisée, Porosi, la Saxe ; la Bohême, Ste-Marie aux Mines, &c. 6°. Enfin la mine d'argent rouge en feuillets, en enduits superficiels appliqués sur une gangue quartzeuse : c'est la plus pauvre de toutes.

On trouvoit à Ste Marie aux Mines, une mine d'argent rouge recouverte de réalgar, qui nouvellement tirée de la mine avoit la couleur vive de cire d'Espagne, & on en a abusé pour vendre aux curieux des morceaux de réalgar pur pour de la mine d'argent rouge.

M. le baron de Dietrich, qui a voulu réduire de ces morceaux, n'en a point retiré d'argent, & toute la mine s'est volatilisée au grillage.

Au chalumeau sur le charbon, on dégage d'abord l'arsenic par une lente calcination, ensuite le soufre, & on purifie le bouton par le borax ; elle décrépité un peu.

5°. L'argent avec de l'arsenic, du calcaire & du fer minéralisé par le soufre. Bergman dit que l'argent passe quelquefois $\frac{1}{12}$ dans cette mine ; elle est quelquefois grise & brillante, souvent sombre & terne ; on y reconnoît les efflorescences de cobalt. La mine d'argent merde-d'oie appartient à cette espèce.

6°. La mine d'argent grise, qui ne diffère de la mine de cuivre appelée Fahlerz, que parce qu'elle contient plus de ce métal précieux. Elle est en masse ou en cristaux tétraèdres réguliers, dont les bords ou les angles solides sont souvent remplacés par des facettes. Les plus gros de ces cristaux sont d'une couleur peu éclatante ; les plus petits dispersés sur une gangue pierreuse, terne, forment un spectacle fort agréable à la lumière, à cause de leur brillant très-vif. L'argent gris, donne depuis deux jusqu'à cinq marcs d'argent par quintal. Quelquefois l'argent gris s'est introduit dans les manières organiques, dont il imite très-bien la forme. On le nomme alors *mine d'argent figurée* ; telle est celle qui ressemble à des épis de blé, & que Romé de Lille a reconnu pour des cônes & des écailles de pin ; on a trouvé aussi du bois minéralisé de cette espèce. Cette mine contient de l'argent, du cuivre, du fer, de l'arsenic & du soufre. Lorsque le fer n'est que très-peu abondant, on la nomme *mine d'argent blanche*. Il ne faut point confondre cette dernière avec la galène tenant argent, que les ouvriers appellent quelquefois mine d'argent. Voici ce que disent Bergman & Mongez de cette mine. La quantité d'argent que la mine d'argent blanche ou grise contient, varie beaucoup ; quelquefois elle va jusqu'à $\frac{1}{12}$, d'autres fois elle surpasse ; on la nomme ordinairement la pauvre *mine d'argent grise*. Bergman, dit M. Mongez, réunit ici, ainsi que les mineralogistes, la mine d'argent blanche *Weissguldner* des Allemands, avec la mine d'argent grise *Fahlerz* des mêmes. Je crois qu'on doit les séparer, puisque la première ne contient pas du fer, & que la seconde en contient, du moins en plus grande quantité, ainsi que le cuivre.

il ne faut pas confondre la mine d'argent blanche des mineurs, dont parle M. Sage (ouvr. cité tom. 11 p. 318) & qui appartient aux galènes très-riches en argent.

LA MINE D'ARGENT BLANCHE dont il est ici question, est pesante, d'une couleur blanchâtre, ou d'un gris de cendre, elle est brillante & écailleuse, mais compacte, grenue dans sa cassure, quoique naturellement striée. Elle se fonce, en quelque façon à la galène brillante à petits grains; mais elle est plus dure, elle ne se laisse pas couper au couteau & brayer: sa couleur est blanche. Elle ne contient point, ou infiniment peu de fer. Ses variétés sont, 1°. La mine d'argent blanche couleur de plomb; Ste. Marie-aux-mines, en Alsace, Guadalcanal en Espagne, Allemont en Dauphiné, &c. &c. 2°. La mine d'argent blanche couleur d'acier; sa couleur est plus foncée & tirant sur le bleu, mais sa poussière est blanche; Ste. Marie-aux-mines. 3°. La mine d'argent blanche cristallisée; Joachimsthal.

LA MINE D'ARGENT GRISSE, *Fah'ert*, contient de plus que la précédente, une assez grande quantité de fer & de cuivre qui lui donne des caractères particuliers. Elle diffère de la précédente, non-seulement par sa couleur qui est beaucoup plus obscure, mais encore, parce qu'elle a une couleur grise quand elle est réduite en poussière. Elle est pesante, très-dure, propriétés qu'elle doit, suivant M. Monnet, à la combinaison intime de l'arsenic & du cuivre; brillante dans sa fracture, plus elle est riche en argent & plus elle est brillante. Outre les substances métalliques que l'analyse y découvre, on en a trouvé une variété à Schemnitz, qui tenoit un peu d'or. On en connoît plusieurs variétés: 1°. La mine d'argent grise, d'un gris clair ou argentin, c'est l'espèce la plus riche; elle est plus brillante que les autres, & semble jouir au moins pour les petits morceaux, d'une espèce de flexibilité; Ste. Marie-aux-mines, le Hartz. 2°. La mine d'argent grise cristallisée; elle est belle & brillante à sa surface. 3°. La mine d'argent grise noire. C'est celle que les allemands nomment *Schwartzgritz*, & les Espagnols *Nigrillo*. Elle est tantôt solide, tantôt spongieuse, fragile, cellulaire, & comme vermiculée. Elle paroit être due à la décomposition de la précédente; l'otofo, Bleyberg, Freyberg, Hongrie, Giromanie, & Baïgorie, Ste. Marie-aux-mines, en France; quequois cette dernière variété est absolument terreuse, pulvérulente, d'une couleur noire fuligineuse. Dans cet état les Allemands la nomment *Schwartz-Galderitz*, quand elle conserve un peu de solidité: alors elle est ca-verneuse & annonce qu'elle est le résultat d'une décomposition; Sibérie, Freiberg, Allemont en Dauphiné, quelques auteurs y ont rapporté le *Rafschewach*. Voyez §. 163 B.

Au chalumeau, sur le charbon, on dégage les deux principes volatils, & on a un bouton qui contient une portion de cuivre.

Chimie. Tome II.

7°. La mine d'argent noire appelée *Nigrillo* par les Espagnols, n'est, suivant Lehman & Romé de Lillie, qu'une décomposition de la mine d'argent rouge ou de la grise, & une sorte d'état moyen entre celui de ces mines & l'argent natif; on y rencontre souvent de ce dernier. Romé de Lillie observe que celle qui est solide, spongieuse ou vermiculée, provient des mines rouges & vitreuses & est beaucoup plus riche que celle qui est friable & de couleur de poix, dont l'origine est due à l'altération des mines d'argent blanches ou grises. Aussi est-elle fort sujette à varier pour le produit: elle donne en général depuis 6 à 7 livres jusqu'à près de 60 livres d'argent par quintal.

8°. La mine d'argent corné ou la combinaison naturelle d'argent avec l'acide muriatique & souvent avec un peu d'acide sulfurique; le muriate d'argent natif. Cette mine est d'un gris jaunâtre sale; quelquefois elle tire sur le gris de lin; elle est, quoique rarement, une demi-transparente; elle est molle, s'écrase & se coupe facilement, elle se fond à la flamme d'une bougie. On la trouve cristallisée en cubes & le plus souvent en masses informes. Elle contient fréquemment des portions d'argent natif. On croyoit autrefois qu'elle contenoit du soufre & de l'arsenic; mais les minéralogistes sont aujourd'hui d'accord sur sa nature. MM. Cronstedt, Lehman & Sage, Woulf, Lommer, Bergman, y ont reconnu la présence de l'acide muriatique qui s'en dégage par la chaleur. M. Woulf y a reconnu de plus la présence de l'acide sulfurique. On ne la trouve encore qu'en Saxe, à Ste. Marie, à Guadalcanal en Espagne, & à Allemont en Dauphiné. Il faut faire l'essai de cette mine avec précaution, parce que l'acide muriatique en se volatilisant entraîne de l'argent avec lui. M. Mongez distingue trois variétés principales d'argent corné. 1°. La mine d'argent corné couleur de perle, demi-transparente, sa texture est très-fine; quelquefois elle est cristallisée; on la trouve à *Johann-Georgenstadt* en Saxe; 2°. La mine d'argent corné, grise & pulvérulente, comme elle est à Ste. Marie-aux-mines. 3°. La mine d'argent corné noirâtre ou d'un jaune brun comme la résine; c'est la plus impure de toutes, elle existe sur-tout en Saxe; 4°. La mine d'argent alcaline de M. Jullit, qui suivant M. Sage n'est que du muriate d'argent dans de la craie; celle-ci est quelquefois remplie d'argent natif, qui devient très-sensible quand on la polit, suivant l'observation de M. Bruning.

Il faut observer que toutes les variétés d'argent corné sont blanches ou grises dans leur cassure ou leur coupure, & qu'elles deviennent violettes lorsqu'on les expose à la lumière, comme cela arrive au muriate d'argent artificiel.

9°. La mine d'argent molle de Wallerius n'est que l'argent natif ou minéralisé, semé en plus ou moins grande quantité dans les terres colorées. On trouve beaucoup de variétés de couleur dans les

terres tenant argent, depuis gris sale jusqu'au brun foncé.

10°. Enfin l'argent se trouve souvent combiné avec d'autres matières métalliques, dans des mines dont il fera question à l'histoire de différens métaux. Tels sont le mispickel, la mine de cobalt grise, le kupfernikel ou mine de nikel, le sulfure d'arsimoine, qui offre souvent la variété appelée *mine d'argent en plumes*; la blende ou le sulfure de lin, la galène ou le sulfure de plomb, les pyrites martiales & les mines de cuivre blanches; ces dernières ne sont même que des mines d'argent grises. Toutes ces substances contiennent souvent assez d'argent, pour qu'on puisse en retirer avec profit ce métal précieux; mais il est facile de concevoir qu'on ne doit pas les décrire comme des mines d'argent particulières, & qu'il fust de dire qu'elles sont en partie composées de ce métal.

L'essai des mines d'argent, doit varier suivant leur nature. Celles qui contiennent de l'argent natif ne demandent à la rigueur que d'être bocardées & lavées; on peut pour séparer exactement ce métal des substances étrangères qui l'altèrent, les trituruer avec du mercure coulant. Ce dernier dissout l'argent, & on le volatilise ensuite à l'aide du feu, pour avoir le métal précieux. Les mines d'argent sulfureuses demandent à être grillées, ensuite fondues avec une plus ou moins grande quantité de flux. (Voyez ce mot.) On obtient dans cette fonte l'argent ordinairement allié avec du plomb, du cuivre, ou du fer, &c. on emploie pour le séparer, & pour savoir exactement la quantité de métal précieux que cet alliage contient, un procédé entièrement chimique, fondé sur les propriétés des métaux nommés autrefois imparfaits, ou très-facilement oxidables.

Le plomb étant susceptible de s'oxidier, de se vitrifier, & d'entraîner dans sa vitrification les métaux très-oxidables, tels que le fer & le cuivre, sans toucher à l'argent, on se sert de cette propriété pour séparer ce métal d'avec ceux qui l'altèrent. On fond l'argent avec d'autant plus de plomb qu'il contient plus de métaux étrangers, on met ensuite cet alliage dans des vaisseaux plats & poreux, faits avec des os calcinés qu'on appelle *couppelles*, parce qu'ils ont la forme de petites coupes, & propres à absorber le verre de plomb qui se forme dans l'opération de la coupellation. L'argent reste pur après cette opération. Pour savoir combien il contenoit de métaux imparfaits, ou à quel titre il étoit, on suppose une masse d'argent quelconque composée de douze parties qu'on appelle *deniers*, & chacun de ces deniers est formé de vingt-quatre grains; si la masse d'argent examinée a perdu $\frac{1}{4}$ de son poids, c'est de l'argent à onze deniers; si elle n'a perdu qu'un vingt-quatrième, l'argent est à onze deniers douze grains de fin, & ainsi de suite. La coupelle après cette opération a acquis beaucoup de poids; elle est chargée d'oxide

de plomb vitreux, & de celui des métaux imparfaits qui étoient alliés à l'argent, & que le plomb en a séparés. Comme le plomb contient presque toujours un peu d'argent, il est nécessaire de le coupler d'abord tout seul, afin de déterminer la quantité d'argent qu'il contient, on doit ensuite défilquer du bouton de retour que l'on obtient en couplant son argent, la petite portion que l'on sait être contenue dans le plomb qu'on a employé, & que l'on appelle *rémoine*. La coupellation présente un phénomène qui avertit l'artiste de l'état de son opération. A mesure que l'argent devient pur par la vitrification & la séparation du plomb, il paroît plus brillant que la portion qui ne l'est pas encore. La partie brillante augmente peu-à-peu, & lorsque toute la surface de ce métal devient pure & éclatante de lumière, l'instant où il passe à cet état, présente une sorte d'éclair ou de fulguration qui annonce que l'opération est finie. L'argent de coupelle est très-pur, relativement aux métaux imparfaits qu'il contenoit auparavant; mais il peut contenir de l'or, & comme il en contient toujours une certaine quantité, il faut employer un autre procédé pour séparer ces deux métaux parfaits. Comme l'or est beaucoup moins altérable que l'argent par la plupart des dissolvans, on dissout l'argent par les acides nitrique ou muriatique & par le soufre; l'or sur lequel ces dissolvans n'ont que très-peu d'action, reste pur. Cette manière de séparer l'argent de l'or est nommée *départ*. Voyez les mots COUPELLE, COUPELLATION, DÉPART & OR.

Les travaux en grand pour extraire l'argent de ses mines, & pour l'obtenir pur, sont à-peu-près semblables à ceux qui ont été décrits pour l'essai des mines de ce métal. Il y a, en général, trois manières de traiter l'argent en grand. La première consiste à triturer l'argent natif avec du mercure; on lave cette amalgame pour en séparer toute la terre, on l'exprime à travers des peaux de chamois, & on la distille dans des cornues de fer, on fond ensuite l'argent & on le coule en lingots ou en barres. On ne peut pas suivre ce procédé pour les mines d'argent qui contiennent du soufre, alors on les grille & on les mêle avec du plomb pour affiner le métal précieux par la coupellation. Tel est le procédé qu'on met en pratique pour les mines d'argent riches: quant à celles qui sont pauvres, on suit une méthode différente des deux premières. On les fond sans grillage préliminaire, avec une certaine quantité de pyrite ou de sulfure de fer ou de cuivre. Cette fusion appelée *fonte cœue*, donne une masse de cuivre tenant argent, que l'on traite par la lixivation avec le plomb; ce dernier qui a entraîné l'argent pendant la fonte est scoriifié ensuite par la coupelle, & le métal parfait reste pur. La coupellation en grand diffère de celle que l'on fait en petit, en ce que, dans la première, le plomb scoriifié est chassé de dessus la coupelle par l'action des soufflets,

tandis que dans les essais, l'oxide de plomb vitrifié est absorbé par la coupelle. On n'a fait qu'indiquer ici d'une manière générale le rapport des travaux en grand sur les mines d'argent, parce que ces travaux seront exposés avec les détails convenables dans l'article métallurgique qui suivra celui-ci.

L'argent obtenu par les procédés qui viennent d'être indiqués, est en général beaucoup moins altérable par les divers corps, que ne le sont la plupart des autres métaux; il n'y a que le platine & l'or qui le soient moins que lui.

Le contact de la lumière, quelque long-temps que ce métal y reste exposé, n'est change en aucune manière les propriétés. Lorsqu'il est poli, il la réfléchit avec tant d'éclat, que ses rayons blessent l'œil qui les reçoit. Comme il la réfléchit toute entière, & sans en séparer les élémens, on peut croire que ce corps n'a aucune action sur l'argent; aussi est-il de tous les métaux celui qui s'échauffe le moins par le contact de la lumière.

Le calorique introduit dans l'argent commence par le dilater. Les calculs de Bouguer donnent pour la dilatation d'une barre divisée en trente-trois parties, une augmentation égale à vingt-quatre de ces parties, tandis qu'une barre d'or de la même division, donne trente-un de dilatation. Suivant Muschenbroeck, la chaleur du soleil, au Pérou, allonge une barre d'argent de six pieds de soixante-deux centièmes de ligne, tandis qu'une barre de fer égale, n'éprouve que quarante centièmes de dilatation par la même chaleur. Lorsque l'argent est devenu rouge de feu, & qu'on continue de le chauffer, il se fond. Morimer estime la fusibilité de l'argent à mille degrés du thermomètre de Fahrenheit. Dans l'ordre de la fusibilité métallique, on le range après l'or & avant le cuivre. Cramer dit qu'il se fond à un degré de feu un peu moins fort que l'or.

Lorsque l'argent est tenu en fusion pendant quelque temps, il se boursouffle, il bout, il exhale des vapeurs qui ne sont que de l'argent volatilisé. Ce fait est prouvé par l'existence de ce métal dans le tuyau des cheminées où on en fond continuellement de grandes quantités; il est confirmé par les belles expériences des académiciens de Paris. En exposant de l'argent très-pur au foyer de la lentille de Trudaine, ces savans ont vu ce métal fondu répandre une fumée épaisse, qui a blanchi une lame d'or sur laquelle elle avait été reçue.

L'argent, en se refroidissant lentement, est susceptible de prendre une forme régulière ou de se cristalliser en pyramides quadrangulaires. M. Baumé avait déjà fait observer que ce métal prenoit en se refroidissant, une forme symétrique qui s'annonçoit à sa surface par des filets semblables aux barbes d'une plume. J'avois remarqué que le bouton de fin que l'on obtient par la coupellation,

offroit souvent à sa surface de petits polygones à cinq ou six côtés, arrangés entr'eux comme les carreaux d'une chambre; mais la cristallisation en pyramides tétraédres n'a été bien observée que par MM. Tillet & Monnez. Cette forme se retrouve dans plus plusieurs échantillons d'argent natif. Les variétés connues sous les noms d'argent en dendrites, d'argent en barbes de plume ou de feuilles de fougère, sont des amas d'octaédres implantés les uns sur les autres, dont l'extrémité est constamment une pyramide tétraédre.

On a cru pendant long-temps, & quelques chimistes pensent encore, que l'argent est indestructible par l'action combinée du calorique & de l'air. Il est certain que ce métal, tenu en fusion avec le contact de l'air, ne paroit pas s'altérer sensiblement. Cependant Juncker avoit avancé qu'en le traitant pendant long-temps par la réverbération, à la manière d'Isaac le hollandais, l'argent se changeoit en un oxide vitreux. Cette expérience a été confirmée par Macquer. Ce savant chimiste a exposé de l'argent jusqu'à vingt fois de suite dans une creusette de porcelaine au feu qui cuit celle de Sèvres, & il a obtenu à la vingtième fusion une matière vitreuse d'un verd d'olive, qui paroit être un véritable oxide d'argent vitreux. Ce métal chauffé au foyer du verre ardent a toujours présenté une matière blanche pulvérulente à sa surface, & un enduit vitreux verdâtre, sur le support sur lequel il étoit placé. Ces deux faits ne peuvent laisser aucun doute sur l'altération de l'argent par l'air; quoiqu'il soit plus difficile à oxider que les autres matières métalliques, il est cependant susceptible de se changer à la longue en un oxide blanc qui, traité à un feu violent, donne un verre couleur d'olive. Peut-être seroit-il possible d'obtenir un oxide d'argent en chauffant pendant long-temps ce métal réduit en lames très-fines ou en feuilles, dans des matras, comme on le fait pour le mercure. La commotion électrique paroit aussi l'oxider; quoi qu'il en soit, il est certain que ce métal ne se combine que difficilement avec la base de l'air vital atmosphérique, & que la chaleur qui ne favorise point cette combinaison, comme elle le fait pour presque tous les métaux, en dégage au contraire très-aisément ce principe; car les oxides d'argent sont tous très-faciles à réduire sans addition, comme il sera dit plus bas, ce qui dépend du peu d'affinité de l'oxygène, qui se dégage de ces oxides en air vital par l'union du calorique & de la lumière.

C'est à ce résultat général que peuvent être rapportés tous les faits connus sur l'oxidabilité de l'argent, par l'action simultanée du calorique & de l'air atmosphérique. Ce résultat suffit, sans doute, pour ceux qui commencent l'étude de la science, & c'est aussi la raison pour laquelle il m'a paru convenable de ne tracer cet objet

qu'avec cette généralité dans mes élémens de chimie ; mais dans un ouvrage où l'ensemble de la science doit être présenté avec toute sa richesse & toute son étendue, il ne conviendrait pas de s'en tenir à ce simple exposé. Il faut faire connoître, en détail, les faits sur lesquels est fondée l'opinion où je suis, que l'argent est oxidable par ces deux agens, pourvu qu'on les emploie l'un & l'autre en grande masse. Je dois donc entrer à cet égard dans tous les détails nécessaires, pour affecter l'opinion du lecteur qui cherche à approfondir les phénomènes de la chimie.

M. Darcey, dans ses belles expériences sur l'action d'un feu long & égal, dit avoir enfermé de l'argent très-pur dans des boules de porcelaine dure de Seve, & l'avoir tenu exposé au feu qui cuit cette porcelaine. Le plus grand nombre de ces boules a été rompu par la dilatation & la tendance à se vaporiser du métal ; il a été en partie changé en une masse spongieuse, d'un blanc jaunâtre, dans laquelle il parait qu'il y avait une portion d'oxide d'argent. Macquer, malgré sa répugnance à croire à l'oxidabilité de ce qu'on appelloit les métaux purs, rapporte des expériences faites au foyer du verre ardent, qui ne laissent aucun doute sur l'oxidation qu'y a éprouvée l'argent. Il n'est pas encore bien décidé, (dit-il), si l'or & l'argent peuvent fe brûler comme les autres métaux par l'action d'un feu ou très-violent, ou long temps soutenu, & aidé du concours de l'air ; mais ce qui est très-certain, c'est que si ces métaux sont susceptibles de cette espèce de calcination, il y a, à cet égard, une différence très-grande entre eux & tous les autres. On verra, à l'article de l'Or, le résultat des expériences qui ont été faites en divers temps par plusieurs physiciens & chimistes, sur la calcination & la vitrification de l'or & de l'argent. Je dirai seulement ici, au sujet de ce dernier métal, que M. M. Cadet, Lavoisier, Briffon & moi, ayant été chargés, par l'Académie des sciences, de faire la suite la plus complète qu'il seroit possible, d'expériences au foyer de la grande lentille de *Tschirnhausen*, de trente-trois pouces de diamètre, dont elle est propriétaire ; que M. de la Tour d'Auvergne, rempli de zèle pour l'avancement des sciences, nous ayant prêté la seconde lentille du même auteur, & de même diamètre, qui lui appartient, & qu'ayant obtenu toutes les facilités dont nous avions besoin pour faire la suite des expériences projetées, nous avons profité de tous les jours favorables depuis le mois d'août de l'année 1772, pour exposer aux foyers de ces verres ardens, les plus grands & les plus longs qui aient été connus jusqu'à celui de M. Trautner, une infinité de substances différentes ; que l'or & l'argent sur-tout ont été soumis nombre de fois à l'action de ces foyers dans leur plus grand état de pureté ; que nous avons obtenu dans

ces expériences des vitrifications à la surface de ces deux métaux, mais de manière cependant à n'être pas encore parfaitement assurés qu'elles proviennent du métal même ; qu'il s'élevait de leur surface une fumée très-fine, & quelquefois de cinq à six pouces de hauteur. Enfin que nous avons constaté de la manière la moins équivoque, que cette fumée n'étoit autre chose que l'or ou l'argent même réduits en vapeurs par la violence de la chaleur. Le moyen dont nous nous sommes servis pour mettre cette vérité importante hors de doute, a été aussi simple que décisif : il a consisté à exposer une lame d'argent à la fumée de l'or, & une lame d'or à celle de l'argent, la lame d'argent a été bien dorée par la fumée de l'or & celle d'or très-bien argentée par la fumée de l'argent, d'où il suit que la fumée de l'or & de l'argent n'est autre chose que ces métaux eux-mêmes réduits en vapeurs, de même que la fumée de l'eau est de l'eau, celle du mercure, du mercure ; & qu'enfin la fixité des métaux purs, ni probablement celle d'un autre corps n'est point absolue, mais seulement relative au degré de chaleur qu'ils éprouvent. Il est vraisemblable qu'il en fera de même au sujet de leur *incombustibilité ou incaléinabilité*.

Cette dernière assertion de Macquer est confirmée par des expériences faites depuis lui, & sur-tout par les effets du feu volatil produit par l'air vital versé sur les charbons. M. Ehrman décrit ainsi ce qui arrive à l'argent chauffé fortement dans un charbon avec l'air vital. L'argent très-fin soulevé subitement en un bouton brillant, se volatilisa bientôt, & précipita, comme l'or, des phénomènes particuliers. Il parut sur le bouton d'argent une tache noire, & sur celle-ci, quelques globules d'argent mat. Environ une minute après, le bouton prit un mouvement de rotation, exhala une forte vapeur violette, & tacha le tuyau qui versé l'air vital d'un jaune sale. Le microscope fit découvrir une poudre d'argent très-fine à l'embouchure de ce tuyau. Le poids du bouton d'argent étoit sensiblement diminué, la tache noire étoit plus élevée, & on y voyoit plusieurs globules d'argent. Ce bouton diminua de plus en plus, la tache noire au contraire s'augmenta, & se fit appercevoir distinctement sur le bouton d'argent qui continuoît sa rotation. La troisième minute écoulée, le bouton d'argent étoit volatilisé entièrement. Le creuset de charbon & son bord étoient incrustés d'une infinité de globules d'argent, dont une partie étoit visible à l'œil nu ; le microscope faisoit découvrir l'autre ; dans cet instrument, le charbon paroissoit couvert d'une croûte grise.

L'argent exposé au feu, dit M. Lavoisier, a fondu en dix secondes, il a répandu une fumée considérable, mais sans flamme. Une poutre de canne d'or, exposée à la vapeur blanche, n'a

point été sensiblement argentée, mais comme on opérait la nuit, on ne peut pas compter à un certain point sur cette observation. Quoique l'argent fût fort pur, il s'est formé à la partie supérieure du globe une petite croûte vitreuse, jaunâtre, provenant, sans doute, de l'oxidation & de la vitrification de quelques portions de métal allié à l'argent.

On a répété cette même expérience, en se servant d'un grand ajutoir, & en exposant ainsi l'argent à un courant d'air vital très-considérable, pour examiner si l'argent répandoit de la flamme, comme la plupart des autres métaux : il a fondu en peu de temps, & il s'est formé à sa surface supérieure une très-petite couche d'oxide jaunâtre, mais il n'y a point eu de flamme.

Dans ces diverses expériences on reconnoît, malgré le peu d'assurance des auteurs qui les ont faites, que l'argent a été en partie oxidé, qu'il s'est formé un oxide, & même un verre foncé ou d'un jaune vert. Les phénomènes produits par une violente commotion électrique sur l'argent placé dans l'air, rendent encore notre opinion de plus en plus vraisemblable. Meldinger dit avoir converti par le choc électrique, de l'argent en une poudre d'un brun noir. M. Vanmarum en employant pour ses belles expériences électriques, la machine fameuse qui est déposée dans le cabinet de Teyler en Hollande, a vu des fils d'argent brûler avec flamme, & se réduire en un oxide fumeux, en une vapeur légère que le vent emporte. M. Charles a répété avec succès cette combustion de l'argent. Plusieurs pieds d'un fil d'argent fin, d'un assez fort diamètre, frappés dans l'air d'un choc électrique, produit par une très-grande batterie, brûlent en un instant avec une flamme d'un blanc verdâtre ; l'oxide qui en résulte, est réduit en gaz dans l'atmosphère, & se condense en refroidissant en flocons légers qu'on voit nager dans l'air.

L'argent n'éprouve aucune altération de la part de l'air ; sa surface n'est que très-peu ternie, & même au bout d'un temps très-long, mais aucune espèce de rouille n'attaque ce métal ; dans un espace de temps très-considérable, il noircit par l'action d'un peu de gaz hydrogène sulfuré qui se mêle toujours à l'air.

L'eau n'a pas plus d'action sur ce métal, que l'air sur l'argent.

Les matières terreuses ne se combinent point avec lui ; son oxide paroît susceptible de colorer en olive les verres avec lesquels on le feroit entrer en fusion. Il semble même que le contact d'autres oxides favorise l'oxidation de l'argent, comme on le voit dans l'art de l'émailleur : car les émaux blancs ou peu colorés, qu'on applique sur l'argent par la fusion, prennent une teinte verte d'olive, pour peu qu'on les chauffe un peu trop.

Cette coloration en vert foncé étoit d'accord avec tout ce qu'on fait sur l'oxidation de l'argent,

dans les circonstances déjà rapportées ci-dessus, ne laisse aucun doute relativement à l'union de ce métal avec l'oxigène, & ce qui paroît accélérer son oxidation, c'est l'attraction disposante des oxides métalliques, & du verre pour celui de l'argent.

Les matières salino-terreuses & les alcalis n'agissent point d'une manière sensible sur l'argent. Il paroît cependant que la potasse & la soude caustiques agissent sur ce métal. J'avais fait fabriquer un creuset d'argent pur, très-épais & pesant près d'une livre, pour y faire des expériences exactes sur les pierres. En y traitant du feldspath avec le double de son poids de potasse bien pure, le creuset n'a pas été plutôt rouge & même légèrement, qu'il a paru se déformer ; en voulant l'enlever avec des pincettes, il s'est brisé sur ses bords ; il étoit devenu si cassant, qu'il a été très-difficile de le retirer du fourneau ; refroidi, il étoit gris sale, tout boursofflé, comme écaillé. On verra à l'article du PLATINE, qu'il en a éprouvé autant de la part de la potasse. Certainement il existe d'après cela une grande action entre l'alcali fixe pur & l'argent ; mais cette action mérite d'être plus suivie, & n'est pas assez connue, pour nous occuper plus long-temps.

L'acide sulfurique le dissout, lorsqu'il est très-concentré & bouillant ; & lorsqu'on lui présente ce métal dans un grand état de division, il se dégage beaucoup de gaz acide sulfurique de cette dissolution, l'argent est réduit en une matière blanche, sur laquelle il faut verser de nouvel acide sulfurique, si l'on veut l'avoir en dissolution. En faisant évaporer cette liqueur avec excès d'acide sulfurique, on obtient de très-belles aiguilles de sulfate d'argent. J'ai obtenu plusieurs fois ce sel en plaques formées par la réunion d'un grand nombre de prismes ou d'aiguilles sur leur longueur. Si le sulfate d'argent est sans excès d'acide, il prend la forme de petits grains qui sont dissolubles dans l'eau aiguillée d'acide sulfurique. Ce sel se fond au feu ; il est très-fixe ; traité par une assez grande chaleur, il se décompose. L'eau en grande quantité trouble l'acide sulfurique tenant de l'oxide d'argent. Le sulfate d'argent est décomposé par les alcalis, par le fer, le cuivre, le zinc, le mercure, &c. Exposé à la lumière, il noircit, se décompose lentement & se recouvre à la longue d'une lame d'argent. L'ammoniaque ne sépare point l'oxide d'argent de l'acide sulfurique, mais forme un sel triple avec ce sel. Tous les précipités qu'on obtient par les alcalis, peuvent se réduire sans addition & en argent fin dans les vaisseaux fermés par l'action du calorique ; ils fournissent tous de l'air vital. Ainsi l'argent décompose l'acide sulfurique à l'aide d'une température d'environ cent degrés ; ce qui prouve une certaine force d'attraction pour l'oxigène, plus considérable même que celle de l'oxigène pour le soufre. Il ne faut pas croire avec quelques auteurs que l'argent soit plutôt rongé que dissous par l'acide sulfurique ; il est au contraire

fortement oxidé & dissous en grande quantité, puis-
qu'une partie d'argent n'exige que deux parties
& demie ou trois parties de cet acide, pour
être entièrement dissous, & pour donner un sul-
fate d'argent cristallisable.

L'acide nitrique oxide & dissout l'argent avec
rapidité & même sans la secours de la chaleur.
Cette dissolution se fait même quelquefois, si vi-
vement, qu'on est obligé pour prévenir les incon-
veniens que cette rapidité fait naître, de n'em-
ployer que l'argent en masse. Il se dégage beaucoup
de gaz nitreux, & il se fait un précipité blanc
plus ou moins abondant, si l'acide du nitre con-
tient quelques portions d'acide sulfurique ou d'acide
muriatique. L'acide nitrique se colore ordinai-
rement en bleu ou en vert; il perd cette couleur &
devient transparent, lorsque la dissolution est fi-
nie, & si l'on a employé de l'argent pur; il reste
au contraire avec une nuance plus ou moins ver-
dâtre, lorsque l'argent contient du cuivre. La cou-
leur bleuâtre ou verdâtre que prend l'acide ni-
trique, pendant qu'il opère la dissolution de l'ar-
gent, n'a lieu que lorsque l'acide nitrique est bien
blanc, & lorsqu'on ne le chauffe point. Elle se
borne toujours à la partie inférieure de la liqueur,
& se manifeste d'autant mieux, que le vase est plus
régulièrement conique. Elle est due au gaz nitreux
qui se dégage, pendant que l'argent décompose
la partie inférieure de l'acide nitrique & lui enlève
de l'oxygène. Ce gaz nitreux se dissout dans la
portion d'acide nitrique qui surnage l'argent; on
le fait dégager, & la liqueur redevient prompte-
ment blanche, en l'agitant beaucoup ou en la
chauffant. Il ne faut donc pas prendre l'apparition
de cette couleur verte pour la preuve de la pré-
sence du cuivre & de l'impureté de l'argent, puis-
qu'elle a lieu avec l'argent le plus pur; car la
couleur verte due au cuivre est constante, & se
fonce d'autant plus qu'on chauffe ou qu'on évapore
davantage la dissolution.

Souvent, mais non pas toujours, comme le dis-
soit Boerhaave, l'argent le plus pur qu'on puisse
employer, contient de l'or. Alors comme l'acide
nitrique n'a que peu d'action sur ce métal, à me-
sure qu'il agit sur l'argent, il s'en sépare de petits
flocons noirs, qui se rassemblent au fond du
vase, & qui ne sont que de l'or. C'est d'après
cette action diverse de l'acide nitrique sur ces deux
métaux, qu'on l'emploie avec succès pour les sé-
parer l'un de l'autre dans l'opération du départ à
l'eau-forte.

L'acide nitrique peut dissoudre plus de moitié
de son poids d'argent. Cette dissolution est d'une
très-grande causticité; elle tache l'épiderme en
violet, lorsqu'elle est un peu étendue d'eau; en
noir, lorsqu'elle est moins, & elle le corrode en-
tièrement, lorsqu'elle est fortement concentrée.
En mettant cette dissolution sur des pierres dures,
des agates blanches, & l'exposant au soleil, Dufay
fait naître des espèces de dendrites qui imitent

parfaitement les herborisations naturelles. On a
employé cette dissolution pour teindre les cheuve-
roux en noir; on la vend même pour cet effet,
sous le nom d'eau grecque. Walernus observe qu'il
faut étendre cette dissolution avec seize parties
d'eau, ou qu'il faut mouiller les cheveux d'une
lessive faite avec une once & demie de potasse
dans une livre d'eau. Malgré cette précaution,
ce procédé est toujours dangereux pour les che-
veux, & il n'est cité ici que comme appartenant
à l'action du nitrate d'argent liquide sur les sub-
stances animales.

La dissolution nitrique d'argent convenablement
évaporée dépose des cristaux minces, brillans,
semblables à l'acide boracique; en l'évaporant à
moitié, elle donne par le refroidissement des
cristaux plats, qui sont ou hexagones, ou triang-
ulaires, ou carrés, & qui paroissent formés d'un
grand nombre de petites aiguilles posées les unes
à côté des autres. On voit aussi des octaèdres al-
longés au milieu de ces lames; quelquefois le ni-
trate d'argent offre des prismes à six pans, dont
deux sont beaucoup plus grands que les autres,
& qui sont terminés par des pyramides tétraèdres,
tronquées près de leur base. Ils sont transparents,
& très-caustiques. On les a nommés *cristaux de lune*,
comme leur saveur est très-amère, on les a nom-
més *sel des métaux*. C'est le nitrate d'argent. Ce
sel est promptement altéré par le contact de la lu-
mière; il est décomposé & se réduit en argent
pur; il est noirci par les vapeurs combustibles.
Si on le met sur un charbon ardent, il détone
bien, & il laisse une poudre blanche, qui est de
l'argent pur. Boerhaave qui connoissoit cette ex-
périence, donne le nom d'*argent ardent* à son
produit. Le nitrate d'argent est très-fusible. Si
on l'expose au feu dans un creuset, il se bour-
souffle d'abord en perdant l'eau de sa cristallisation;
ensuite il reste dans une fonte tranquille, comme
une graisse ou comme une huile: Si on le laisse ré-
froirir dans cet état, il se prend en une masse
grise, légèrement aiguillée, & forme une prépa-
ration connue en pharmacie & en chirurgie sous
le nom de *ierre infernale* en France, & qui est la
lune caustique de Boerhaave, le *caustique lunaire*
de la pharmacopée de Londres. On n'a pas besoin
pour l'obtenir, de se servir du nitrate d'argent
cristallisé, qui est très-long à faire & très-dispen-
dieux. Il suffit d'évaporer à siccité une dissolu-
tion d'argent par l'acide nitrique, de mettre le
résidu dans un creuset ou dans une timbale d'argen-
te, comme le conseille M. Baumé, & de le chauffer
lentement, jusqu'à ce qu'il soit dans une fonte
tranquille. Alors on le coule dans une espèce de
lingotière de cuivre, formée de deux plaques por-
tant chacune dix à douze demi-canaux & réunis
solidement par un lien de fer, de sorte à repré-
senter des canaux de deux ou trois lignes de dia-
mètre, communiquant les uns avec les autres,
afin qu'ils puissent être remplis par la liqueur que

l'on coule à l'une des extrémités de la plaque. Cette sorte de moule donne au nitrate d'argent fondu la forme de petits cylindres ou de crayons. Si l'on caüe des crayons de *ierre infernale*, on observe qu'ils sont formés d'aiguilles qui partent en rayonnant du centre de chaque cylindre, & qui vont se terminer à sa circonférence. Il ne faut pas chauffer trop long-temps le nitrate d'argent, pour en faire la *ierre infernale*. Sans cela, une partie de ce sel se décompose, & l'on trouve un culot d'argent dans le fond de ce creuset. Pour voir ce qui se passe dans cette opération, j'ai distillé ce sel dans un appareil pneumatique-chimique. J'en ai obtenu du gaz nitreux & de l'air vital mêlé de gaz azote; j'ai retrouvé dans mon matras l'argent entièrement réduit. Le verre de ce vaisseau avoit pris dans une portion de son épaisseur & du côté de sa paroi intérieure, l'opacité d'un véritable émail; & il étoit coloré en un beau brun couleur de marron. C'est sans doute à l'oxide de manganèse ou à quelque autre substance contenue dans ce verre, qu'est due la couleur brune qu'il a prise dans cette expérience; car celle du verre formé par l'oxide d'argent, tire sur le vert d'olive, comme je l'ai fait observer ci-dessus.

Le nitrate d'argent exposé à l'air, n'en attire pas l'humidité, lorsqu'il est bien cristallisé; quoique quelques auteurs disent qu'il est déliquescent, j'en conserve de beaux cristaux larges de près de deux pouces depuis plusieurs années, il ne s'est point humidifié du tout, il a perdu seulement un peu de sa transparence, & il a pris dans quelques points une teinte violette, mais il n'a rien perdu de sa forme. Ce sel se dissout très-bien dans l'eau, & on peut le faire cristalliser par l'évaporation lente de ce fluide. Il ne se décompose point à la chaleur de l'eau bouillante.

La dissolution nitrique d'argent est décomposée par les substances salino-terreuses & par les alcalis, mais avec des phénomènes très-différens, suivant l'état des matières. L'eau de chaux y forme un précipité couleur d'olive très-abondant. Les alcalis fixes chargés d'acide carbonique le précipitent en blanc; l'ammoniaque caustique, en un gris qui tire sur le verre d'olive. Cette dernière précipitation n'a lieu qu'à la longue; encore on ne l'obtient que sur une dissolution de nitrate d'argent bien neutre dans l'eau distillée; la dissolution d'argent elle-même, qui est toujours une liqueur avec excès d'acide, ne donne ordinairement aucun précipité avec l'ammoniaque bien pure & bien caustique. Voilà ce qui explique une contradiction singulière, que l'histoire de la chimie présente entre deux chimistes également distingués par leur exactitude. Brandt a nié que l'argent peut être précipité de l'acide nitrique par l'alcali volatil. Margraf a soutenu au contraire qu'on pouvoit en obtenir un précipité qui, à la vérité, se redissolvoit dans l'alcali volatil mis en excès. Le premier avoit pris une dissolution d'argent avec

excès d'acide nitrique, & le second avoit opéré sur du nitrate d'argent neutre; & du moins c'est ce que rendent vraisemblables les expériences des modernes dont il va être question.

Kien n'est mieux connu aujourd'hui que la cause de ces phénomènes, & tout ce qui regarde la réaction réciproque du nitrate d'argent & de l'ammoniaque. Depuis 1779, j'avois observé constamment chaque année dans les expériences que je faisois pour mes leçons de chimie, que la dissolution nitrique d'argent n'étoit point précipitée par l'ammoniaque, & je conservois dans mon laboratoire un flacon contenant plusieurs onces de mélange de dissolution d'argent uni avec de l'ammoniaque en excès, dont je me proposois de faire quelque jour l'examen, pour découvrir la cause de la non précipitation réciproque de ces matières. Un grand nombre d'autres travaux dont j'ai entretenu le public, m'avoit empêché de me livrer à cet examen, & peut-être fort heureusement pour moi, puisqu'il résulta de l'union & de la réaction de ces corps une matière fulminante ou détonante par la moindre friction, le moindre choc. En décembre 1788, M. Berthollet lut à l'académie un mémoire, dans lequel il annonça que l'ammoniaque faisoit un sel triple avec le nitrate acide d'argent, & que le précipité de ce sel par la chaux digérée avec l'ammoniaque, formoit un corps bien plus rapide dans sa détonation que l'or fulminant. J'extrais de ce mémoire ce qui a trait à ces deux combinaisons remarquables, & je laisserai parler M. Berthollet lui-même.

L'ammoniaque ne précipite pas le nitrate d'argent, lorsqu'il a un excès d'acide; mais s'il n'a point d'excès d'acide, il se forme un petit précipité noir, & la liqueur reste claire. Il ne faut pas conclure de là que l'oxide d'argent a autant d'affinité avec l'acide nitrique, que l'ammoniaque; c'est un sel triple qui se forme, & qui par l'évaporation donne des cristaux qui ont été observés par Margraf. C'est probablement ce même sel qu'a vu Bergman, & dont il parle dans son traité des affinés, § 57, comme d'une combinaison de l'argent & de l'ammoniaque.

Ce qui arrive dans cette occasion, est un phénomène qu'on pourroit observer dans la formation de la plupart des sels triples, qui prennent dans leur composition une plus petite quantité de chacun des composés, qu'il n'en falloit pour un sel formé de ces deux substances. C'est ainsi que M. Higgins a remarqué que l'ammoniaque ne précipite qu'une portion de la magnésie tenue en dissolution par un acide, parce que l'autre partie reste en dissolution & forme un sel triple; ce qui explique des anomalies observées par plusieurs chimistes dans les combinaisons de cette terre.

Le nitrate d'argent abandonne donc une portion de l'oxide d'argent, lorsqu'il est dans un état de saturation; mais lorsqu'il a un excès d'acide, ce superflu d'argent se combine avec l'excès d'a-

cide & avec l'ammoniaque, pour former également un sel triple. Le nitrate d'argent & d'ammoniaque se décompose par la chaleur sans fulminer. Lorsqu'il est en dissolution, la chaux en précipite l'oxide d'argent, mais l'alcali volatil qui en est dégagé, en retient une partie. Je n'ai pu constater si ce précipité, ainsi que celui qu'on obtient par la chaux d'une dissolution nitrique, étoit combiné avec une petite portion de chaux.

Lorsqu'on a décomposé le nitrate d'argent par la chaux ou par les alcalis fixes (caustiques), le précipité qui est d'une couleur brune, le dissout presque entièrement dans l'ammoniaque; mais si on le fait sécher auparavant sur du papier à filtrer, on le dépouille par-là du nitrate qui s'est formé pendant la précipitation, sur-tout lorsque c'est un nitrate de chaux, & alors il présente avec l'ammoniaque d'autres propriétés. J'avois attribué à l'action de la lumière ce changement qui dépend uniquement de l'absorption du papier à filtrer.

Dans cet état, l'oxide d'argent produit avec l'ammoniaque, avec laquelle on le mêle, une espèce de frémissement semblable à celui qui a lieu, lorsqu'on étend la chaux vive dans l'eau; une partie seulement se dissout. Qu'on laisse reposer ce mélange 10 à 12 heures, on voit se former à sa surface une pellicule brillante; qu'après ce temps on ajoute encore de l'ammoniaque, la pellicule se redissout. Si cependant on avoit mis d'abord une grande quantité d'ammoniaque, l'on n'auroit pas besoin d'en ajouter une seconde dose, & la pellicule ne se seroit pas formée. Qu'enfin on décante la liqueur, & que pour sécher le précipité qui est devenu noir, on le dépose sans secousse sur un papier à filtrer, on lui trouvera les propriétés suivantes.

Lorsque ce précipité est encore humide, si on le presse avec un corps dur, il fulmine avec violence, & l'argent se trouve réduit; mais s'il est sec, il suffit, pour le faire fulminer, de le toucher ou d'exciter un petit frottement en le transportant; l'ébranlement qui naît d'une fulmination, peut la communiquer à plus de deux pouces de distance.

Si l'on remplit une petite cornue de la liqueur qu'on a décantée, & si on la fait entrer en ébullition, il se dégage des bulles qui sont du gaz azote, & il se forme des petits cristaux qui sont opaques, & qui ont un éclat métallique; ces cristaux fulminent dès qu'on les touche, quoiqu'ils soient couverts de liqueur, & même ils la chassent avec violence, s'ils sont en certaine quantité, & brisent les vaisseaux de verre d'une manière dangereuse.

Les propriétés de l'argent fulminant ont une telle

analogie avec celles de l'or fulminant dont j'ai donné l'explication dans les *Mémoires de l'Académie de 1783*; elles répondent tellement à la nature connue de l'ammoniaque & de l'oxide d'argent, que j'ai cru inutile de m'exposer aux expériences dangereuses qu'auroient exigées les phénomènes de cette fulmination, pour en établir directement la théorie.

L'oxide d'argent est combiné avec l'ammoniaque, comme fait l'oxide d'or, pour former l'or fulminant. Son oxygène y tient très-peu. L'eau vient à sa grande causticité, ainsi que je l'ai fait voir ailleurs, & la facilité avec laquelle il se réduit par la simple chaleur. Cependant l'oxygène étant privé d'une grande partie de son élasticité, il est très-disposé à former des combinaisons. D'un autre côté, l'hydrogène de l'ammoniaque le trouve dans la même disposition: une petite circonstance peut donc déterminer cette combinaison qui forme de l'eau, en laissant l'argent dans l'état métallique; (1) mais l'oxygène & l'hydrogène qui dans ce cas se trouvent l'un & l'autre peu comprimés, pour ainsi dire, vu la faible amitié qui agit sur eux, contiennent beaucoup de calorique, & ils sont obligés d'en abandonner beaucoup, lorsqu'ils se réunissent pour former de l'eau; de-là vient que celle-ci reçoit une grande expansion dans l'instant même de la formation; mais l'eau en vapeur n'est pas la seule cause de la dilatation subite, le gaz azote qui se dégage de l'ammoniaque y contribue aussi. (*Voyez les mémoires de l'Académie, 1783.*)

Dans la dissolution d'argent qui donne naissance aux cristaux fulminants dont j'ai parlé, le métal paroît trop oxygéné, pour former l'argent fulminant; mais par l'ébullition, une partie de l'ammoniaque se décompose, d'où vient le gaz azote qui se dégage; son hydrogène se combine avec une partie de l'oxygène, & alors se forme l'argent fulminant, dont les molécules qui ne sont plus solubles dans l'eau, se réunissent en cristaux: c'est pour ainsi parler le commencement du phénomène de la fulmination qui s'exécute.

La pellicule qui se forme à la surface de la même liqueur est due à l'oxide d'argent, auquel l'air paroît enlever l'ammoniaque par une supériorité d'affinité. Je recommande de la dissoudre par une nouvelle addition d'ammoniaque, parce que son interposition diminueoit considérablement l'effet de l'argent fulminant.

Le nitrate & le muriate de baryte ont précipité la dissolution précédente; mais je n'ai pas examiné les précipités.

Le carbonate d'ammoniaque dissout l'oxide d'argent précipité par la chaux, & cela avec effervescence; c'est une partie de l'acide carbonique qui

(1) Dans la fulmination, tout l'argent n'est pas réduit, une partie reste en oxide noir, de même qu'une partie de l'or reste en oxide pourpre. Cette partie qui reste non réduite, & qui est variable selon les circonstances, doit être considérée comme étrangère aux phénomènes de la fulmination.

se dégage, l'autre partie forme avec l'oxide d'argent & l'ammoniaque un sel triple qui, étant desséché, laisse une poudre jaune qui noircit au feu sans fulminer.

L'oxide d'argent précipité par la chaux, reprend de l'acide carbonique, lorsqu'on le laisse longtemps exposé à l'air; & alors il n'est plus propre à former l'argent fulminant, ainsi que l'ont observé MM. Virli & Morveau; parce qu'il forme un sel triple, sensible à celui dont je viens de parler.

Le mélange d'un peu de cuivre empêche la formation de l'argent fulminant. Probablement il se fait aussi un sel triple, qui n'a plus les mêmes propriétés.

L'on peut donc ne pas réussir à la préparation de l'argent fulminant, ou parce qu'on a employé un argent allié d'une portion de cuivre, ou parce qu'on n'a pas séparé exactement les nitrates qui se sont formés dans la précipitation de l'argent, ou parce qu'on s'est servi d'une ammoniaque qui n'étoit pas assez privée d'acide carbonique, ou parce que l'oxide d'argent en avoit repris dans l'atmosphère. Je dois ajouter que lorsqu'on a fait la précipitation avec les alcalis fixes, l'argent n'est pas aussi fulminant que lorsqu'on s'est servi de la chaux.

L'on avoit déjà donné le nom d'*argent fulminant* au précipité du nitrate d'argent par l'acide oxalique, dans lequel M. Klaprot avoit découvert la propriété de suser avec vivacité, lorsqu'on l'expose à la chaleur. M. Amellion avoit aussi depuis long-temps fait connoître que l'acide oxalique communiquoit cette propriété au mercure, quoiqu'à un degré inférieur à celui qu'al'argent; mais cet effet est fort éloigné de celui qu'on désigne par la fulmination, & au contraire celui que produit l'oxide d'argent ammoniacal, répond tellement à cette dénomination, que j'ai cru devoir la lui rapporter.

On a pensé jusqu'à présent que l'inflammation des corps se produisoit toujours, parce qu'on élevoit leur température; mais il étoit difficile d'expliquer par-là comment l'on pouvoit décider la combinaison des principes, qui en se réunissant devoient abandonner la chaleur & la lumière. M. Monge a exposé avec exactitude cette espèce de contradiction, lorsqu'il a discuté les phénomènes de la formation de l'eau. Les deux fluides, dit-il, en abandonnant le feu qui les dissolvoit, se combinent pour produire de l'eau; il arrive donc qu'en élevant la température, c'est-à-dire, qu'en introduisant du feu dans le mélange des deux gaz, ou pour mieux dire encore, qu'en augmentant la dose du dissolvant, on diminue l'adhérence qu'il avoit pour ses bases; ce qui est absolument contraire à ce qu'on observe dans toutes les opérations analoges de la chimie.

Il nous manque donc encore, ajoute-t-il, beaucoup de lumières sur cet objet; mais nous avons

Chimie. Tome II.

droit de les attendre & du temps & du concours des travaux des physiciens. Ces lumières, nous les devons à M. Monge lui-même. En continuant de s'occuper de cet objet, il parvint à l'idée que la compression produite, soit par un moyen mécanique, soit par la chaleur, pourroit bien être la principale cause qui, en rapprochant les molécules du centre de l'action de leur affinité, les obligerait à se combiner & à relâcher la partie du leur calorique, qui ne pourroit pas entrer dans leur nouvelle combinaison.

Cette opinion me paroît prouvée non-seulement par les propriétés de l'argent fulminant, mais encore par plusieurs phénomènes, dont je rappellerai quelques-uns.

En effet, l'argent ne fulmine pas à la chaleur de l'eau bouillante, il lui fait une température plus élevée; or, l'on ne peut supposer que la légère compression d'un simple contact produise une chaleur sensible.

L'accident arrivé chez M. Baumé, lorsqu'on comprima quelques molécules d'or fulminant qui se trouvoient dans le goulot d'un flacon, prouve bien que la compression peut seule faire fulminer l'or, quoiqu'elle doive être plus forte que celle qu'exige l'argent. Nous avons observé que la poudre faire avec le muriate oxigéné de potasse, s'enflammoit lorsqu'on lui faisoit éprouver un choc assez médiocre entre deux corps durs, lequel seroit capable de produire une chaleur sensible; & un choc un peu plus fort produit le même effet sur la poudre ordinaire. Enfin M. Lavoisier a remarqué que, lorsqu'on comprimoit fortement sur une table de pierre le muriate oxigéné de potasse, il se faisoit une explosion avec lumière. Je laisse à les autres détails dans lesquels entre M. Berthollet sur l'effet de la compression, pour ajouter quelques observations à son énoncé sur l'argent fulminant.

Après avoir laissé sécher à l'air & au soleil pendant 12 ou 15 heures le précipité du nitrate d'argent par l'eau de chaux, en versant dessus la quantité d'ammoniaque nécessaire pour qu'il en soit recouvert de quelques lignes, il devient tout-à-coup noir; une partie se dissout dans l'ammoniaque, & il se forme à la surface une pellicule blanche jaunâtre, que M. Berthollet conseille de séparer d'avec le précipité lorsqu'on décante l'ammoniaque, parce que cette pellicule n'est pas détonante comme le précipité, & nuit à sa fulmination: on verra tout-à-l'heure que cette pellicule devient fulminante en la gardant quelque temps, & qu'il faut s'en méfier. La préparation de l'argent fulminant est une des opérations les plus délicates, & qui demande le plus de prudence & d'attention. On ne doit point mettre l'oxide d'argent avec l'ammoniaque dans des vaisseaux très-profonds, qui aient de petites ouvertures, car la chaleur augmentée, le frottement ou le choc le plus léger suffisent pour faire briser les vaisseaux

Bbb

avec les plus grands dangers. Les capsules plates de porcelaine ou les soucoupes, sont les vaisseaux qui méritent la préférence. Il ne faut pas deslécher l'oxide d'argent ammoniacal dans les soucoupes, car en voulant le détacher il pourroit blesser les yeux de l'opérateur en fulminant sur un corps qui lui opposeroit de la résistance. Quand après dix-huit ou vingt heures de séjour d'ammoniacque sur l'oxide d'argent, il faut la décanter en donnant de légers mouvemens de rotation à l'oxide ammoniacal qui est au fond de la liqueur, on doit emporter en entier cet oxide avec les dernières gouttes de liqueur, & distribuer l'espece de liquide épais qui forme ce mélange sur des morceaux de papier joseph; celui-ci absorbe la portion liquide & facilite le desséchement de l'oxide d'argent ammoniacal. Chaque morceau de papier ne doit contenir que trois ou quatre grains de matière, & il faut les couvrir d'une cloche de verre large, afin de s'en servir au besoin. Il suffit pour faire fulminer cette substance d'y toucher légèrement avec un corps quelconque; une goutte d'eau, un grain de sable, tombés d'une certaine hauteur dessus, la font détoner très-vivement. L'ammoniacque transparente décantée de dessus l'oxide d'argent, donne des cristaux lorsqu'on l'évapore; ces cristaux qui paroissent être une sorte d'argentate ammoniacal sont encore détonans lorsqu'ils éprouvent une pression, même au milieu de ce liquide qui les contient, comme l'a indiqué M. Berthollet. Il faut se délier de cette liqueur, ne la traiter qu'avec précaution. Voici ce que nous avons vu, M. Vauquelin & moi, sur ce sel. Nous faisons évaporer au lycée quelques onces de liqueur ammoniacale décantée de dessus l'argent fulminant, dans un vase de verre arrondi, placé sur un bain de sable; la chaleur ayant évaporé la liqueur jusqu'à la formation de quelques cristaux, on se proposeoit de retirer la liqueur du feu, lorsque pendant qu'une autre occupation nous appelloit ailleurs, il se fit entendre un bruit considérable; le vase se brisa en morceaux, qui furent lancés à plus de 15 pieds du fourneau; ces fragmens présentèrent à leur surface un enduit d'argent d'un poli aussi vif que si on l'avoit frotté avec un brunissoir. Les cristaux que l'on obtient par l'évaporation de l'argent ammoniacal, sont blancs & transparents, mais ils noircissent promptement lorsqu'on les expose à la lumière, & ils deviennent en même-temps beaucoup plus fulminans qu'ils n'étoient sous la forme cristalline & transparente.

La pellicule qui se forme à la surface de l'ammoniacque versée sur l'oxide d'argent, & que M. Berthollet conseille de séparer comme non fulminante, afin qu'elle ne nuise point à la fulmination de la poudre, acquiert la propriété détonante au bout de quelque temps. M. Vauquelin en a fait l'expérience d'une manière cruelle, & dont il a failli d'être la victime dans mon labo-

ratore. En préparant de l'oxide d'argent ammoniacal, il avoit mis à part dans un verre conique la pellicule qui pouvoit nuire à la pureté de cette préparation. Ce verre ayant resté environ deux mois sur une tablette dans le laboratoire, M. Vauquelin en ayant besoin pour une autre expérience, il voulut en enlever la poudre noire qu'il contenoit, ne se souvenant plus de ce qu'elle étoit. Ayant pris le pied de ce vase dans sa main gauche, il porta un doigt de la droite sur cette poudre noire, pour reconnoître si elle adhéroit au verre & si elle pouvoit être enlevée facilement. La pression qu'il exerça la fit à l'instant fulminer avec une violence extrême; le verre fut réduit en grains & lancé de tous côtés, un grand nombre de ces morceaux perçèrent les mains de M. Vauquelin, & lui sautèrent dans les yeux; il éprouva une douleur & une tension si fortes dans ces organes, qu'il crut les avoir crevés; il fut quelques minutes sans voir clair; heureusement qu'ils ne furent affectés que d'une inflammation qui dura quelques jours. Le bruit de cette détonation fut si considérable, que M. Vauquelin resta sourd pendant plus de trois heures; la main qui tenoit le pied du verre fut frappée d'une commotion telle, qu'elle fut presque impotente pendant plusieurs jours. Cette commotion s'étendit à de grandes distances dans le laboratoire, des vases de verre placés à plus de vingt pieds du lieu où la fulmination s'opéra, furent renversés. Il n'y avoit cependant que quatre ou cinq grains de matière dans le verre qui causa le fracas; qu'on juge d'après cela de l'horrible accident qui auroit pu arriver, si ce vase eut contenu quelques gros de matière, comme cela n'auroit pas manqué d'avoir lieu, si j'avois fait évaporer à la manière accoutumée la quantité assez considérable de dissolution argenteuse mêlée d'ammoniacque, que je conservois depuis quelques années, & dont j'ai fait mention plus haut; aussi je me suis hâté de décomposer cette dissolution par l'alcali fixe. On doit donc être prévenu de ces dangereuses expériences, pour se méfier toujours des mélanges d'ammoniacque & d'oxide d'argent; il faudra ne préparer l'argent fulminant qu'à petites doses & avec les plus grandes précautions; il est toujours indispensable de ne rien faire de ces préparations, de les employer à mesure qu'elles sont faites, de ne les faire qu'à des doses modérées, & de laver sur le champ à grande eau tous les vases qui y servent, enfin de ne pas conserver dans des vaisseaux de verre les différens produits qu'on en obtient, & sur-tout les pellicules, regardées jusqu'à présent comme non fulminantes, qui se forment à la surface de l'ammoniacque tenant de l'oxide d'argent en dissolution.

Le sel qui résulte de l'évaporation de l'ammoniacque décantée de dessus l'oxide d'argent ammoniacal, que Berthollet avoit indiqué, qui cristallise régulièrement, & qui lui-même est très-fulminant,

comme on l'a dit plus haut, paroît être un composé d'ammoniaque & d'oxide d'argent, dans lequel cet oxide fait fonction d'acide, comme M. Berthollet l'a pensé de plusieurs oxides métalliques, & en particulier de ceux d'antimoine & de plomb. (Voyez les articles de ces deux métaux.) Ainsi on pourroit nommer ce sel argentate ammoniacal, cependant l'oxide d'argent se rapprochant davantage des acides foibles, il vaudroit mieux peut-être le désigner par la dénomination d'argentite ammoniacal, d'après les principes de nomenclature établis dans nos ouvrages sur cet objet. On peut soupçonner ainsi que cet argentite d'ammoniaque contient une certaine quantité de nitrate d'ammoniaque, puisqu'il est bien prouvé qu'en agissant sur l'oxide d'argent & en se décomposant, l'ammoniaque laisse une portion d'azote libre qui peut se combiner avec l'oxygène; cependant il n'y a pas encore de preuves positives de la présence du nitrate d'ammoniaque dans l'argentite ammoniacal.

Quant à la singulière propriété de saturer les acides & les alcalis, que ces expériences indiquent dans l'oxide d'argent, il est vraisemblable qu'en examinant cet oxide avec plus d'exactitude qu'on ne l'a encore fait, on y trouvera des propriétés salines plus ou moins marquées. Ce que je vais exposer ici des principaux caractères que j'ai reconnus à l'oxide d'argent précipité du nitrate de ce métal par les alcalis fixes, pourra conduire à de nouvelles découvertes à cet égard. Cet oxide bien lavé avec de l'eau distillée légèrement alcaline pour enlever les dernières portions d'acide qu'il pourroit contenir, a une saveur alcaline, métallique & désagréable, que en annonce la nature saline; l'eau pure qu'on laisse séjourner longtemps sur cet oxide, quoique ne le dissolvant pas d'une manière sensible, y contracte cependant une saveur âpre & rebutante. Les acides le dissolvent tranquillement & sans effervescence, comme un sel se dissout dans l'eau; l'acide muriatique non-seulement n'en chasse point d'oxygène, mais lorsqu'il est dans l'état d'acide muriatique oxygéné, il ne rend pas cet oxide plus oxydé, il ne fait point avec lui un composé plus soluble que s'il étoit dans l'état d'acide muriatique ordinaire, ce qui prouve qu'il n'y a qu'un état du muriate d'argent, & que l'oxide d'argent une fois saturé d'oxygène, ne peut plus en absorber davantage. Cet oxide est réduit par le contact de la lumière, par le calorique, qui, agissant sur lui en même-temps que la lumière, le décompose bien plus rapidement; le carbone, l'hydrogène, le phosphore, lui enlèvent l'oxygène. Le dernier de ces corps combustibles opère même cette décomposition à froid; c'est pour cela qu'en mettant du phosphore dans une dissolution de nitrate d'argent, comme l'a fait M. Bullion, il se précipite de l'argent en grains & en petites lames, qui enveloppent le bâton du phosphore & le recouvrent

d'une espèce de fourreau métallique; on retrouve de l'acide phosphorique dans la lieueur. L'oxide d'argent se décompose les matières végétales & animales, à l'aide du carbone & de l'hydrogène qu'elles contiennent, aussi pourra-t-il servir quelque jour à l'analyse de ces matières. Voyez les mots OXIDES.

Quoique l'acide nitrique soit de tous les acides celui qui agit avec le plus d'énergie sur l'argent, ce n'est pas celui qui a le plus d'adhérence & le plus d'affinité avec l'oxide de ce métal; l'acide sulfurique & l'acide muriatique sont susceptibles de lui enlever cet oxide. C'est pour cela qu'on verse quelques gouttes de ces acides dans une dissolution nitrique d'argent, il se forme un précipité en une poudre blanche, lorsqu'on emploie l'acide sulfurique, & en flocons épais comme un *coagulum*, si l'on se sert d'acide muriatique. Dans le premier cas, il se forme du sulfate d'argent; dans le second du muriate d'argent; ces deux sels n'étant pas très-solubles se précipitent. Il n'est pas nécessaire de se servir des acides sulfurique & muriatique libres pour opérer ces décompositions; on peut aussi employer les sels neutres qui résultent de leur union avec les alcalis & les matières terreuses; alors il y a double décomposition & double combinaison, parce que l'acide nitrique, séparé de l'argent, s'unit avec la base des sels sulfuriques ou muriatiques.

C'est sur cette différence de rapport entre les acides & l'argent, qu'est fondé un procédé que l'on met en usage pour se procurer un acide nitrique bien pur & exempt du mélange des autres acides, tel en un mot, qu'il le faut pour plusieurs opérations de métallurgie, & pour la plupart des recherches chimiques. Comme en distillant l'esprit de nître à l'aide de la décomposition de ce sel par l'acide sulfurique, il est rare que ce fluide ne soit pas mêlé avec une certaine quantité d'acide sulfurique ou muriatique, les chimistes ont cherché les moyens de séparer ces fluides étrangers, & ils se servent avec succès de la dissolution nitrique d'argent, pour parvenir à cet but. On verse dans l'acide nitrique impur cette dissolution jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'elle n'y occasionne plus de précipité; on laisse rassembler le dépôt formé de sulfate ou de muriate d'argent; on décante l'acide & on le distille à une chaleur douce pour le séparer d'avec la petite portion de sels d'argent qu'il peut contenir; le produit que l'on obtient est de l'acide nitrique très-pur; on lui donne dans les arts métalliques, le nom d'*eau-forte précipitée*. C'est cet acide qu'on emploie pour faire des dissolutions pures d'argent; il sert surtout à l'opération du dépôt.

La plupart des matières métalliques, sont susceptibles de décomposer la dissolution nitrique d'argent, parce qu'elles ont plus d'affinité que ce métal avec l'oxygène. L'arséniate de potasse dissous dans l'eau, produit dans la dissolution nitrique un pré-

cipité rougeâtre formé par l'union de l'oxide d'argent avec l'oxide arsenique. Ce précipité imite la mine d'argent rouge. On peut obtenir l'argent précipité dans son état métallique, par le plus grand nombre des métaux ; mais c'est sur-tout la séparation de ce métal précieux opérée par le mercure & par le cuivre, qu'il nous importe de considérer ici, à cause des phénomènes intéressans que présente la première, & la grande utilité de la seconde.

L'argent séparé de l'acide nitrique par le mercure, est dans son état métallique, & la lenteur de sa précipitation donne naissance à un arrangement symétrique particulier, connu sous le nom d'*arbre de Diane*, ou *arbre philosophique*. Il y a plusieurs procédés pour obtenir cette cristallisation. Lemery prescrivait de prendre une once d'argent fin, de le dissoudre dans de l'acide nitrique médiocrement fort, d'étendre cette dissolution dans environ vingt onces d'eau distillée, & d'y ajouter deux onces de mercure. En quarante jours il s'y forme une végétation très-belle. Homberg a donné un autre procédé beaucoup plus court. On fait d'après ce chimiste une amalgame à froid de 4 gros d'argent en feuilles avec 2 gros de mercure ; on dissout cette amalgame dans suffisante quantité d'acide nitrique ; on ajoute à cette dissolution une livre & demie d'eau distillée. On met dans une once de cette liqueur une petite boule d'une amalgame d'argent molle, & la précipitation de l'argent se fait sur le champ. L'argent précipité & uni à une portion de mercure, se dépose en filets comme prismatiques à la surface de l'amalgame. D'autres filets viennent s'implanter sur les premiers, demanier à offrir une végétation en forme de buisson. Enfin M. Beaumé a décrit un moyen d'obtenir l'arbre de Diane, qui diffère un peu de celui de Homberg, & qui réussit plus sûrement. Il conseille de mêler 6 gros de dissolution d'argent, & 4 gros de dissolution de mercure par l'acide nitrique, & toutes deux bien saturées, d'ajouter à ces liqueurs 5 onces d'eau distillée, & de les verser dans un vase de terre, sur 6 gros d'une amalgame faire avec 7 parties de mercure & une d'argent. Ces deux méthodes réussissent avec beaucoup plus de promptitude qu'celle de Lemery.

Cette réussite est due à l'action réciproque & au rapport qui existe entre les matières métalliques. En effet le mercure contenu dans la dissolution, attire celui de l'amalgame, qui tend à s'unir d'ailleurs à l'oxygène de l'argent, & à prendre sa place dans l'acide, tandis que l'argent contenu dans la liqueur, s'en sépare à mesure qu'il est réduit, & tend à s'unir à celui de l'amalgame ; & il résulte de ces attractions multipliées, une précipitation plus prompte que celle qui est opérée par le mercure seul. Le mercure qui fait partie de l'amalgame, étant plus abondant qu'il ne seroit nécessaire pour précipiter l'argent de la dissolution, produit encore un troisième effet bien important à consi-

dérer, c'est qu'il attire l'argent par l'affinité & la tendance qu'il a à se combiner avec ce métal ; il s'y combine effectivement, puisque les végétations de l'arbre de Diane ne font qu'une véritable amalgame cassante & cristalline. Cette cristallisation téussit beaucoup mieux dans des vaisseaux coniques comme des verres, que dans des vaisseaux arrondis & évases, tels que la cucurbitte recommandée par M. Baumé. On conçoit aussi qu'il est nécessaire de mettre le vase où l'on fait l'expérience, à l'abri des secousses qui s'opposeroient à l'arrangement symétrique & régulier de l'amalgame, or qui le détruiroit à mesure qu'il auroit lieu.

Le cuivre plongé dans la dissolution nitrique d'argent comme dans celle par l'acide sulfurique, en précipite aussi ce métal sous la forme brillante & métallique.

On emploie ordinairement ce procédé pour séparer l'argent de son dissolvant après avoir fait le départ. On trempe des lames de cuivre dans la dissolution, ou bien on met cette dernière dans un vaisseau de cuivre ; l'argent se sépare sur le champ en flocons d'un gris blanchâtre. On décante la liqueur lorsqu'elle est bleue, & qu'il ne s'en précipite plus d'argent. On lave ce dernier à plusieurs eaux ; on le chauffe légèrement dans des creusets, ou on le dessèche à un bain de sable ; il est vendu dans cet état dans les monnoies, sous le nom impropre d'argent en chaux. La même précipitation du nitrate d'argent par le cuivre, est employée pour faire une espèce d'argenteur sur les vaisseaux & les ustensiles de ce dernier métal.

On voit, d'après ces deux précipitations de l'argent par le mercure & par le cuivre, que les métaux séparés de leurs dissolvans par des matières métalliques, se précipitent avec toutes leurs propriétés ; ce phénomène dépend de ce que les métaux plongés dans la dissolution d'argent, enlèvent à ce dernier l'oxygène avec lequel ils ont plus d'affinité.

L'acide muriatique ne dissout point immédiatement l'argent, mais il dissout bien son oxide. Lorsque cet acide est surchargé d'oxygène, il oxide facilement le métal. Telle est, sans doute, la raison de ce qui se passe dans le *départ concentré*. Cette opération consiste à exposer au feu des lames d'or allié d'argent cémentées avec un mélange de sulfate de fer & de muriate de soude, l'acide sulfureux dégage l'acide muriatique, qui enlève à ce qu'il paroit à l'oxide de fer une portion de son oxygène, & qui se porte sur l'argent qu'il oxide & qu'il dissout. On reconnoît bien dans ces expériences, avec l'acide muriatique & l'argent, la puissance de l'oxygène pour opérer les dissolutions métalliques. L'acide muriatique, qui, soit qu'il ne contienne point d'oxygène, soit, ce qui est plus vraisemblable, qu'il ne cède point celui qui le constitue aux matières métalliques, l'acide muriatique n'a nulle action sur l'argent, mais il enlève l'oxide de ce métal à l'acide nitrique. Si on présente l'argent en

feuilles à l'acide muriatique oxigéné, il est promptement oxidé & converti en muriate d'argent. Aussi faut-il éviter pour les vases d'argent poli & bruni le contact de l'acide muriatique oxigène, qui les attaque très-vivement dans les laboratoires.

On suit un procédé très-prompt & très-facile, pour combiner l'acide muriatique avec l'argent en oxide. On verse cet acide ou un des sels qui le contiennent, & sur-tout le sel marin, dans une dissolution nitrée de ce métal, le précipité très-abondant qui se forme sur le champ, est la combinaison de l'acide muriatique avec l'oxide d'argent, qui a plus d'affinité avec cet acide qu'avec celui du nitre, & qui conséquemment quitte ce dernier pour s'unir au premier. On obtient la même combinaison, en versant de l'acide muriatique dans une dissolution de sulfate d'argent; parce que cet acide a plus d'affinité avec ce métal que n'en a le sulfure. On peut encore combiner l'acide muriatique l'argent, en chauffant cet acide sur un oxide de ce métal précipité de l'acide nitrique par l'alcali fixe.

En préparant ce sel, ou la *lune corlée*, on trouve que deux onces d'argent dissoutes dans l'acide du nitre, & précipitées ensuite par l'acide ou un sel muriatique, donnent deux onces cinq gros & quelques grains de muriate d'argent bien lavé & bien desséché. Il est essentiel d'observer ici, que l'acide muriatique oxigéné précipite & enlève l'oxide d'argent à l'acide nitrique, comme l'acide muriatique ordinaire, & que l'oxide d'argent ne parait pas susceptible de former avec l'acide muriatique oxigéné un sel différent de celui qui forme avec l'acide muriatique ordinaire, ce qui tient à ce qu'il est saturé complètement d'oxigène dans sa combinaison avec l'acide nitrique.

Le muriate d'argent a plusieurs propriétés qu'il est important de bien connaître. Il est mou & un peu ductile, on le coupe facilement avec le couteau. Il est singulièrement fusible; lorsqu'on l'expose dans une fiole à médecine à un feu doux, comme sur les cendres chaudes, il se fond en une substance grise & demi-transparente assez semblable de la corne; c'est pour cela qu'on l'a appelée *lune corlée*. Si on le coule sur un porphyre, il se fige en une matière friable & comme cristallisée en petites aiguilles argentines; si on le chauffe long-temps avec le contact de l'air, il se décompose, il passe facilement à travers les creusets, une partie se volatilise & une autre se réduit en métal, & donne des globules d'argent semés dans la portion de muriate d'argent non décomposé. Ce sel exposé à la lumière perd sa couleur blanche, & brunit assez promptement. Il se dissout dans l'eau, mais en très-petite quantité, puisqu'un livre d'eau distillée bouillante ne s'en charge que de trois ou quatre grains, suivant l'expérience de M. Monnet. Les alcalis sont susceptibles de décomposer le muriate d'argent dissous dans l'eau ou traité au feu avec ces sels; c'est un moyen qu'on peut employer

pour obtenir l'argent le plus pur & le plus fin que l'on connoisse. On fait un mélange de 4 parties de potasse ordinaire ou carbonate de potasse avec une partie de muriate d'argent. On le met dans un creuset, & on le fait fondre rapidement; lorsque ce mélange est en belle fusion, on le retire du feu, on le laisse refroidir & on le casse, on en sépare l'argent qui se trouve au-dessous du muriate de potasse formé dans cette opération, & de la portion surabondante d'alcali employés. M. Baumé, à qui est dû ce procédé, assure que la quantité d'alcali qu'il prescrit empêche le muriate d'argent de passer à travers le creuset, en agissant sur toutes les parties qu'il décompose à la fois. Margraf donne un autre procédé pour réduire ce sel, & pour obtenir l'argent parfaitement pur. On tire dans un mortier 3 onces 16 grains de muriate d'argent avec une once & de carbonate ammoniacal, en ajoutant assez d'eau distillée pour faire une pâte; on agite ce mélange jusqu'à ce que le gonflement & l'effervescence qui s'y excitent soient apaisées; alors on y ajoute 3 onces de mercure bien purifié, & on triture jusqu'à ce qu'on aperçoive une belle amalgame d'argent; on la lave avec beaucoup d'eau, on continue la trituration, & on renouvelle le lavage jusqu'à ce que l'eau soit très-claire, & que l'amalgame soit très-brillante; à cette époque, on dessèche cette dernière, & on la distille dans une cornue, jusqu'à ce que ce vaisseau soit d'un rouge blanc; le mercure passe dans le récipient, & on trouve l'argent pur au fond de la cornue. De cette manière, on obtient ce métal de la plus grande pureté & sans dâcher sensible. C'est de cet argent qu'on doit se servir pour les expériences délicates de la chimie. On le nomme argent revivifié ou résuscité de la *lune corlée*. L'eau employée pour laver ce mélange, a emporté deux substances, une certaine quantité de muriate ammoniacal qui elle tient en dissolution, & une poudre blanche qui ne peut point s'y dissoudre. Lorsqu'on sublime cette dernière, on retrouve une petite quantité d'argent au fond du vaisseau sublimatoire. Cette expérience prouve qu'on ne décompose complètement le muriate d'argent que par le secours d'une double affinité. En effet dans le procédé de Margraf, l'ammoniacque ne s'unirait à l'acide muriatique que parce que l'argent se combine de son côté au mercure, qui attire & le sollicite de quitter l'acide, ce que l'alcali seul ne peut faire. Il faut de plus que l'argent soit privé de son oxigène & ramené à l'état métallique, pour s'unir au mercure & former l'amalgame que l'on obtient. Cet effet est produit par deux forces qui agissent en même temps; l'ammoniacque est en partie décomposée, & son hydrogène enlève une portion de l'oxigène de l'argent; le mercure parait enlever à l'argent l'autre portion d'oxigène, & passer à l'état de muriate mercuriel qu'on retrouve dans la poussière blanche non dissoute. Il parait aussi qu'une petite partie de l'oxide d'argent n'est pas complètement réduite par cette

première opération, puisqu'on retrouve un peu après la sublimation de la poussière blanche non soluble, ou du muriate de mercure doux. Mais l'on conçoit que cette opération longue & coûteuse, ne peut convenir que dans les travaux en petit de nos laboratoires. Si on avoit à réduire le muriate d'argent en grande quantité, on emploieroit ou les alcalis fixes, comme on le fait dans les ateliers des monnoies, ou quelques substances métalliques, qui, la plupart, ont plus d'affinité avec l'oxygène & avec l'acide muriatique, que n'en a l'argent. Tels sont entr'autres, l'antimoine, le plomb, l'étain, le fer, &c. Si l'on fond dans un creuset une partie de muriate d'argent avec trois parties de l'une de ces matières, on trouve l'argent réduit au fond du creuset, & le métal employé, oxidé & uni à l'acide muriatique. L'argent ainsi précipité est fort impur, il contient toujours une portion du métal dont on s'est servi pour le réduire; & comme on emploie le plus communément le plomb, conseillé par Kunkel, l'argent qu'il soutirait besoin d'être coupellé; il ne peut jamais être amené à l'état de pureté de celui qui est réduit par les alcalis, ou par le procédé de Margraf.

L'acide nitro-muriatique agit assez bien sur l'argent, & il le précipite à mesure qu'il le dissout. Cet effet est fort aisé à concevoir; l'acide nitrique oxide & dissout d'abord ce métal; l'acide muriatique enlève ensuite son oxide au premier, en formant du muriate d'argent qui se dépose à cause de son peu de solubilité: c'est un procédé qui peut servir à séparer l'argent contenu dans l'or. (Voyez DÉPART.)

On ne connoît pas bien l'action des acides fluorique & boracique sur l'argent; on fait seulement qu'une dissolution de borax ou borate avec excès de soude produit un précipité blanc très-abondant dans la dissolution nitrique de ce métal, & que ce précipité est en partie formé par l'acide boracique uni à une portion d'oxide d'argent.

L'argent n'éprouve, suivant Scheele, aucun changement de la part de l'acide fluorique; l'oxide de ce métal précipité par un alkali, s'y dissout en partie; le surplus forme avec cet acide une masse insoluble que l'acide sulfurique décompose, & dont il dégage une vapeur acide d'acide fluorique.

L'acide carbonique quoique n'agissant en aucune manière sur l'argent, est susceptible de s'unir à son oxide; c'est ce qui se passe lorsqu'on met dans de l'eau acidulée par le gaz acide, l'oxide d'argent précipité de ses dissolutions par un carbonate alcalin; ce carbonate d'argent n'est pas dissoluble dans l'eau; on en dégage facilement l'acide carbonique par le feu. Les oxides d'argent précipités de l'acide nitrique par les alcalis fixes caustiques, attirent l'acide carbonique de l'atmosphère, lorsqu'on les y expose encore mouillés.

Scheele a fait plusieurs expériences sur la combinaison de l'acide arsénique & de l'argent. Voici

les détails intéressans qu'il a donnés sur cette combinaison. L'acide arsénique digéré sur l'argent, ne l'attaque pas. Si l'on augmente le feu, quand tout le phlegme est passé jusqu'à faire couler ou fondre l'acide, il se sublime une quantité d'arsénic métallique, comme dans les expériences sur l'or & le platine. L'ayant tenu pendant un quart-d'heure au même feu, tout l'argent fut dissous. On cassa la cornue quand elle fut refroidie, elle contenoit une masse de verre presque transparente & sans couleur, elle étoit couverte d'un verre jaune foncé qui ne put être enlevé par aucun dissolvant.

La masse de verre fut pulvérisée & mise dans l'eau distillée au bain de sable; elle perdit sur le champ sa transparence, & devint d'un rouge brun. L'acide arsénique fut dissous, & il resta une poudre brune; l'acide tenoit un peu d'argent en dissolution, puisque l'acide muriatique en précipita du muriate d'argent.

A un degré de feu tel que la cornue commençoit à fondre, la poudre brune entra en fusion; mais il ne se sublima point d'arsénic; après le refroidissement, la masse se trouva brune & transparente vers les angles.

Comme l'oxide d'argent se réduit sans addition, ce que fait aussi l'acide arsénique lorsqu'il éprouve une grande chaleur, je mis la masse de verre dans un creuset renversé, & je l'exposai à un degré de feu capable de fondre l'argent; après le refroidissement je trouvai l'argent réduit & entouré d'un peu de verre blanc.

La dissolution d'argent est précipitée par l'acide arsénique, mais non complètement; le précipité est brun. L'arséniate de potasse en précipite davantage; mais si ce sel est avec excès d'acide, il reste une partie d'argent en dissolution. Les arséniates bien neutres décomposent complètement cette dissolution.

Si l'on fait digérer le précipité dans l'acide muriatique, l'acide arsénique se dégage, & l'argent s'unit à l'acide muriatique; il se dissout aussi dans l'ammoniaque pure.

Quoique l'argent ne soit attaqué ni par l'acide arsénique, ni par l'acide muriatique séparément, cependant le mélange des deux acides l'attaque sensiblement. J'ai précipité l'argent de sa dissolution, dans l'acide nitrique par le cuivre, j'ai bien lavé ce précipité dans l'eau chaude, & je l'ai fait digérer pendant 14 jours, dans un matras bouché avec deux parties d'acide arsénique & deux parties d'acide muriatique: l'argent ressembloit à une poudre blanche, & l'ayant édulcoré & séché, je trouvai que c'étoit du muriate d'argent. Si l'on distille l'acide restant sur la poudre, il passe de l'acide muriatique qui tient de l'arsénic; en y ajoutant de l'acide nitrique & rectifiant le mélange, il reste de l'acide arsénique. Il paroît que pendant cette distillation opérée par Scheele, l'acide muriatique attaque l'argent qui a enlevé de l'oxygène à l'acide arsénique, c'est pour cela que la portion d'acide muriatique

qui passa dans la distillation entraîne avec lui de l'arénic.

On ne peut méconnoître dans les expériences de Scheele une oxidation de l'argent par l'acide arénique, un enlèvement de l'oxygène de cet acide par l'argent; celui-ci prend tantôt la couleur jaune, tantôt la couleur rouge-brun; or on connoît des oxides d'argent de ces deux couleurs dans les combinaisons vitrines; c'est ainsi que M. M. Ehrman & Lavoisier ont eu un verre jaune en traitant de l'argent dans un charbon à l'aide de l'air vital, & que j'ai vu le verre d'un matras coloré en beau rouge marron, après y avoir traité du nitrate d'argent, jusqu'à son entière décomposition, & à la réduction complète de ce métal; il faut observer que ce matras, quoique soutenu par du sable dans un creuset, avoit été ramolli & déformé par la chaleur employée.

On ne connoît point du tout l'action des acides molybdique, tungstique & fucinique sur l'argent. On sait seulement d'après Scheele, que l'acide tungstique précipite le nitrate d'argent en une poudre blanche, & paroît avoir une affinité plus grande pour l'oxide d'argent que l'acide du nitre.

Il est aisé de concevoir que les acides végétaux ne doivent point avoir d'action sur l'argent; car ce métal n'ayant que peu d'attraction pour l'oxygène, comme on l'a vu dans tous les détails précédens, il ne peut décomposer ni l'eau, ni ces acides, dont la base ou le radical est un composé d'hydrogène & de carbone fort adhérent à l'oxygène. Il ne peut donc y avoir d'union, qu'entre l'oxide d'argent & ces acides: on connoît encore très-peu ces différentes combinaisons.

L'acide benzoïque dissout facilement, suivant M. Tromsdorf, l'oxide d'argent précipité de sa dissolution nitrique, par le carbonate de soude. Le benzoate d'argent est très-dissoluble dans l'eau, & très-peu dans l'alcool. Ce sel se colore en brun par le contact des rayons solaires; il ne s'altère point à l'air; enfin son acide se volatilise, & l'argent reste pur après avoir fourni du gaz oxygène.

L'acide malique précipite la dissolution nitrique d'argent, & l'on observe au bout de quelque temps une partie de ce précipité repassant à l'état métallique.

L'acide gallique n'agit point sur l'argent, mais il précipite & sépare l'oxide de ce métal de tous les autres acides qui le tiennent en dissolution. La teinture de noix de Galle à l'eau, ou leur infusion précipite la dissolution nitrique d'argent en brun; en même temps une portion de l'oxide d'argent est revivifié, & vient former à la surface de la liqueur une lamelle sensible & très-brillante d'argent. Le galène d'argent précipité n'est pas dissoluble, dans l'eau, exposé au soleil il brunit & présente des points brillans d'argent réduit; il est très-décomposable par le feu.

L'acide oxalique n'attache pas l'argent; il en dissout en petite quantité l'oxide séparé de l'acide

nitrique par la potasse ou la soude. Il se sépare aussi lui-même de la dissolution nitrique. Cet oxalate d'argent formé par la précipitation est peu dissoluble, suivant Bergman; il brunit au soleil, il paroît susceptible de cristalliser. L'acide oxalique décompose de même le sulfate d'argent, mais il ne paroît pas décomposer le muriate de ce métal. M. Morveau a fait remarquer, par rapport à cet acide, que combiné avec une portion de potasse & dans l'état d'acide oxalique, (sel essentiel d'oseille,) il est susceptible de former avec l'oxide d'argent un sel triple ou un triûle, ainsi qu'avec la plupart des métaux: Il rapporte encore (tom. 1. pag. 200. colon. 1.) qu'il a répété avec succès l'expérience de M. Voëken, sur un oxalate d'argent fulminant. En précipitant du nitrate d'argent par l'oxalate de potasse, on obtient un sel qui paroît être de l'oxalate de potasse & d'argent, lequel mis au feu, se décompose avec bruit.

On ne connoît presque pas l'union de l'acide tartareux avec l'oxide d'argent. Cet acide ne précipite pas la dissolution nitrique du métal précieux. Suivant M. Wenzel, l'acide tartareux se charge de l'oxide d'argent précipité de l'acide nitrique par l'alcali fixe; le mercure sépare ensuite l'argent métallique de ce tartre de potasse & d'argent.

L'acide acétique dissout un peu de l'oxide d'argent; cette dissolution fournit un acétate d'argent cristallisé, suivant Margraf, mais M. Monnet assure n'avoir pas pu en obtenir; il n'a eu qu'une masse épaisse & comme gommeuse. En évaporant à siccité la dissolution acétueuse d'argent, M. Monnet a obtenu un sel blanc farineux, qui avoit une saveur très-piquante, & qui étoit très-dissoluble dans l'eau. En chauffant un peu fortement ce sel, il est décomposé & fournit de l'argent pur. Il faut observer que la dissolution acétueuse d'argent est permanente à l'air & au feu, puisque M. Monnet l'a évaporé en consistance d'huile, sans qu'il se soit séparé d'oxide d'argent. On n'a point examiné l'union de l'acide acétique, ou vinaigre radical avec l'argent.

Les acides empyreumatiques végétaux, pyromuqueux, pyrolineux & pyrocatartaux, dissolvent l'oxide d'argent: on n'a point encore examiné ces combinaisons.

En général les sels formés par l'oxide d'argent uni aux acides végétaux, sont tous susceptibles d'être décomposés par le contact de la lumière, & il se forme à leur dépens de l'eau, de l'acide carbonique, tandis que l'oxide d'argent repasse à l'état métallique. Cette décomposition suivie avec soin, pourra servir à faire connoître les proportions des principes qui composent les acides végétaux, car l'argent ne fournissant dans ce cas qu'une quantité connue d'oxygène, celle d'eau & d'acide carbonique que l'on obtiendra pourra servir à déterminer les proportions de carbone, d'hydrogène, & même d'oxygène contenus dans ces acides.

On ne connoît pas à beaucoup près exactement

les sels formés par les acides animaux unis à l'oxide d'argent. L'acide sébacique paroît susceptible d'attaquer ce métal même sous sa forme métallique ; il se sépare son oxide de la plupart des acides , comme on le verra par l'ordre des affinités.

L'acide prussique uni à la chaux précipite la dissolution nitrrique d'argent , en une masse blanche de consistance caséeuse , non dissoluble dans les acides , mais qui l'est dans un excès de prussiate calcaire.

L'acide phosphorique n'altère point sensiblement l'argent ; cependant lorsqu'il est très-concentré & aidé d'une grande chaleur , l'argent paroît s'oxyder & se combiner avec cet acide , comme il semble résulter de l'expérience que je vais décrire. Ayant évaporé quelques livres d'acide phosphorique retiré des os par l'acide sulfurique dans une bassine d'argent , lorsque cet acide fut devenu épais & presque comme du miel , il réagit sur le fond de la bassine ; il se fit dans ce vaisseau une grande quantité de trous sans qu'on s'en aperçût d'abord. Bientôt la couleur verte de la flamme des charbons fut un indice certain qu'il tomboit de l'acide phosphorique dans le fourneau , & en examinant avec attention , je m'aperçus que la bassine étoit percée de plus de trente petits trous ronds par lesquels s'écouloit l'acide. En cherchant parmi les charbons , on trouva des gouttes & des masses d'une matière fondue vitriforme , d'une couleur d'olive claire , qui traitée avec du charbon en poudre , donna par la distillation du phosphore & de l'argent réduit. En dissolvant la portion d'acide évaporée dans la bassine , & en versant dans cette dissolution des alcalis fixes & de l'eau de chaux , j'obtins un précipité d'oxide d'argent qui se réduisit facilement en argent pur par la chaleur.

Bergman établit l'ordre suivant pour les affinités de l'argent avec les acides dans la quarante-septième colonne de sa table des attractions électives ; il place au premier rang l'acide muriatique , ensuite progressivement les acides sébacique , oxalique , sulfurique , sélachastique , phosphorique , tartreux , malique , nitrique , fluorique , arénique , tartareux , citrique , formique , lactique , acéteux , pyrolineux , pyromuqueux , succinique , prussique & carbonique. Quant à l'ammoniaque qu'il place au dernier rang , on ne peut plus laisser subsister ainsi cet ordre d'attraction , depuis que l'on sait que cet alcali forme une manière très-décomposable & très-fulminante avec l'acide de ce métal. Voici comment il s'exprime sur ces attractions. L'acide muriatique attire puissamment l'oxide d'argent , & l'enlève à tous les autres acides ; cependant l'acide sébacique paroît aller de pair avec lui. Il est probable que l'acide prussique ne l'emporte que sur l'acide carbonique ; lorsqu'il est saturé de chaux , il précipite l'argent de ses dissolutions sulfurique & nitrique , sous la forme d'une poudre blanche qu'il redissout s'il est en excès. La force de l'acide oxalique suit immédiatement celle de l'acide

sébacique , car il décompose le sulfate d'argent & s'empare de sa base. L'acide sulfurique & l'acide sélachastique précipitent le nitrate d'argent ; l'acide arénique produit à la vérité le même effet , mais d'une manière si imparfaite , qu'il semble devoit passer après l'acide nitrique. Les rangs des autres acides qui suivent ne sont pas si bien déterminés. L'argent précipité par le carbonate de potasse , s'unit à l'acide carbonique , qu'on peut chasser ensuite par le feu : cette combinaison est presque insoluble dans l'eau. Le même acide , à moins qu'il ne soit mêlé d'un peu d'acide muriatique , n'a point d'action sur le sulfate d'argent. D'après cette courte explication , on reconnoît que Bergman n'a déterminé réellement que les attractions de quelques acides pour l'oxide d'argent , car il n'a pas dit un mot de l'action prédominante de ces sels sur le métal , & des phénomènes des dissolutions. Il faudra donc de nouvelles expériences pour assurer positivement l'ordre des attractions de cet oxide pour les différens acides.

L'argent ne paroît pas être altérable par les sels neutres ; au moins on a constaté qu'il ne détonoit pas avec le nitre , & qu'il ne décompose pas le muriate ammoniacal. Cette inaltérabilité de l'argent par le nitre , fournit un bon moyen d'en séparer par la déronation avec ce sel , les métaux très-oxidables qui peuvent lui être unis , tels que le cuivre , le plomb , &c. on fait fondre ce métal allié au-dessous du titre qu'il doit avoir avec du nitre ; ce sel en se décomposant brûle & oxide la portion de métal étranger à l'argent , & ce dernier se trouve sous la scorie alcaline & métallique au fond du creuset ; il est beaucoup plus pur qu'il n'étoit auparavant. Les orfèvres employent souvent ce moyen pour purifier l'argent.

Presque toutes les matières combustibles , ont une action plus ou moins marquée sur l'argent. Aucun métal n'est plus vite terni & coloré par les différens gaz inflammables. Le gaz hydrogène sulfuré sur-tout , de quelque substance qu'il se dégage , lui donne , dès qu'il le touche , une couleur bleue violette tirant sur le noir , & diminue beaucoup sa ductilité. On fait que les vapeurs animales fétides , telles que celles des latrines , de l'urine putréfiée , des œufs chauds , produisent le même effet sur ce métal , & par la même cause : le gaz hydrogène sulfureux , déposé à la surface de l'argent une portion du foufre qu'il contient , & celui-ci en s'unissant au métal , le colore & le noircit. On ne peut pas conserver de l'argent brillant & poli dans le voisinage d'une source d'eau sulfureuse , d'une fosse latrinaire , &c.

Le soufre se combine très-bien avec l'argent ; on fait ordinairement cette combinaison en stratifiant dans un creuset des lames de ce métal avec du soufre en poudre ou de la fleur de soufre , & en poussant promptement ce mélange à la fonte ; il en résulte une masse d'un noir violet , beaucoup plus fusible que l'argent , cassante & disposée en aiguilles ;

en un mot, une véritable mine artificielle qui se rapproche beaucoup de l'argent vitreux. Cette combustion se décompose facilement par l'action du feu, à cause de la volatilité du soufre & de la fixité de l'argent; le soufre se consume & se dissipe, & l'argent reste pur. Les sulfures alcalins & terreux dissolvent ce métal par la voie sèche & même par la voie humide. En faisant fondre une partie d'argent avec trois parties de sulfure de potasse, ce métal disparaît, & peut se dissoudre dans l'eau, en même temps que le sulfure. Si l'on verse un acide dans cette dissolution, on obtient un précipité noir d'argent sulfuré. Des lames d'argent, mises dans une dissolution de sulfure de potasse, prennent bientôt une couleur noire, & il paroît que le soufre quitte l'alcali pour s'unir au métal & le minéraliser, ainsi que nous l'avons vu pour le mercure; les feuilles d'argent disparaissent & se dissolvent véritablement dans cette liqueur. Il paroît que l'oxide d'argent uni au soufre, forme une espèce d'argent rouge.

On ne connoît pas l'action du carbone sur l'argent; il paroît que ces deux corps ne sont pas susceptibles de s'unir. Le phosphore n'a pas à beaucoup près autant de tendance pour s'unir à l'argent qu'il en a pour beaucoup d'autres substances métalliques. M. Pelletier qui a essayé cette combinaison, y a observé les phénomènes suivans.

J'ai fait (dit-il) un mélange de demi-once d'argent extrêmement divisé, de deux gros de poudre de charbon, & d'une once de verre phosphorique, le tout fut mis dans un creuset de l'esse, que j'ai ensuite placé dans un fourneau de fusion, où je lui ai donné demi heure de feu; ayant alors ouvert le creuset, je vis que la fusion étoit parfaite, l'argent paroissoit au fond du creuset en bain, & il s'en dégagait de petits jets de phosphore; je retirai aussitôt le creuset du feu, & je le portai hors du laboratoire, afin que l'argent fût plutôt refroidi; en effet, le métal cessa bientôt d'être fluide, mais je fus très-surpris de voir dans le même moment, plusieurs jets de phosphore sortans du culot qui venoit de se figer. L'argent avoit néanmoins augmenté d'un gros, il avoit perdu de sa ductilité, il paroissoit grenu & comme cristallisé, & il se brisoit sous le marteau; il conservoit sa couleur blanche & étoit entamé par le tranchant d'un couteau; exposé sur une coupelle dans une moufle ardente, le phosphore se dissipe, & l'argent reste très-pur.

J'ai fait rougir dans un creuset deux cents grains d'argent à douze deniers; j'y ai alors projeté quelques petits morceaux de phosphore, l'argent est ensuite entré en fusion; j'ai continué à y jeter du phosphore, jusqu'à ce que l'argent m'en parût saturé; j'ai alors retiré le creuset du feu, l'argent y étoit en fonte, belle & tranquille; j'ai porté le creuset à quelque distance du fourneau, afin que le métal fût plutôt refroidi, mais quelle fut ma surprise de voir sortir de l'argent,

Chimie. Tom. II.

au moment où il cessa d'être fluide, une grande quantité de phosphore qui, en se volatilissant, brüloit avec une grande vivacité, & dans le même instant la surface du métal devint toute mamelonnée. J'ai observé ce dégagement de phosphore dans mon dernier mémoire sur les phosphures métalliques, en parlant de l'argent phosphoré, que j'obtenois en traitant l'argent en limaille avec de la poudre de charbon & du verre phosphorique, mais ce phénomène ne m'avoit point tant frappé que cette fois-ci; je l'ai cru assez singulier pour devoir répéter l'expérience plusieurs fois, & j'ai constamment observé qu'il se séparoit de l'argent, au moment où il cessoit d'être fluide, une assez grande quantité de phosphore. La conséquence que j'en tire, c'est que le phosphore reste combiné en plus grande dose à l'argent en fusion qu'à de l'argent non fondu. A quoi attribuer ce phénomène? le calorique y contribue certainement pour beaucoup; cette observation au reste, nous apprend que les proportions dans les combinaisons, peuvent varier en raison du plus ou du moins de calorique qui peut y être uni.

L'argent, après la phosphoration, pesoit, étant refroidi, deux cents vingt-quatre grains, ce qui donne douze grains d'augmentation par cent; j'ai eu aussi, dans d'autres expériences, une augmentation de trente grains, ou de quinze par cent. L'on peut évaluer le phosphore qui se sépare de l'argent au moment où il cesse d'être fluide, à environ vingt grains; ainsi cent grains d'argent en fusion, peuvent recouvrer environ vingt-cinq grains de phosphore, tandis que lorsqu'il cesse d'être fluide, il n'en retient qu'environ quinze grains.

L'argent s'unit avec l'arsenic qui le rend cassant; cet alliage est jaune en dehors, & d'un gris foncé dans son intérieur; en le chauffant fortement l'arsenic se volatilise, mais il entraîne un peu d'argent.

Il ne se combine que difficilement avec le cobalt, suivant la plupart des chimistes. Gellert dit: « Qu'un mélange de deux parties de cobalt & d'une partie d'argent, offre après la fusion ce dernier métal au fond du creuset, devenu plus fragile, d'une couleur grise, & que le cobalt, placé au-dessus de lui, a pris une couleur blanche. »

L'argent s'allie très-bien au bismuth, & forme avec lui un métal mitre fragile, dont la pesanteur spécifique est plus grande que celle des deux métaux pesés séparément. La couleur de cet alliage tient le milieu entre celles du bismuth & de l'antimoine; on ne sépare que difficilement ces deux métaux.

Suivant Cronstedt, l'argent ne s'unit point au nickel; ces deux métaux fondus ensemble, se placent à côté l'un de l'autre, comme si leur pesanteur étoit parfaitement identique.

Il se fond avec l'antimoine, & donne avec ce métal un alliage très-fragile, d'une pesanteur spécifique plus forte que celles des deux métaux fé-

Ccc

parés ne l'indiquent. L'argent est susceptible de décomposer le sulfure d'antimoine & de s'unir en partie au soufre de ce minéral, en partie au métal lui-même, en sorte qu'il y a deux combinaisons différentes dans cette opération.

L'argent se combine facilement au zinc par la fusion. Il résulte de cette combinaison un alliage grenu à sa surface & très-cassant; sa couleur approche de celle de l'antimoine & a quelque chose de rougeâtre, suivant Muschembroeck. Lorsqu'on expose dix parties de zinc alliées à une partie d'argent dans un creuset ouvert de manière à ce qu'elles s'enflamment & se réduisent en oxide sublimé, cet oxide entraîne avec lui ce dixième d'argent, quoique dans lui faire subir d'altération.

L'argent se dissout complètement & même à froid, dans le mercure; pour opérer cette dissolution, il suffit de malaxer ou de triturer avec ce fluide métallique des feuilles d'argent; il en résulte une amalgame d'une consistance variée, suivant la quantité respective des deux substances qui la forment. Cette amalgame est susceptible de prendre une figure régulière par la fusion & le refroidissement. (Voyez le mot AMALGAME.) Elle donne des cristaux prismatiques tétraèdres, terminés par des pyramides de la même forme. Le mercure prend une forte de fixité dans cette combinaison, car il faut pour le séparer de l'argent un degré de chaleur plus considérable que celui qui est nécessaire pour le volatiliser seul. Kunckel, Henckel & Margraf, ont observé qu'en dissolvant par la trituration l'argent dans le mercure, il se produit de la chaleur, les deux métaux se dilatent & semblent faire une forte d'effervescence. Cette amalgame est non-seulement plus pesante que le calcul des pesanteurs séparées de chacun d'eux ne l'indique, mais encore que le mercure qui surpasse cependant de beaucoup l'argent par sa pesanteur. Suivant Gellert l'amalgame d'argent tombe au fond du mercure. En l'exposant à une chaleur modérée & égale, elle présente une sorte de végétation analogue à l'arbre de Diane. On se sert de l'amalgame d'argent pour argenter le cuivre. L'argent est susceptible de décomposer le muriate mercuriel corrodé par la voie sèche. Il semble qu'il y ait ici une exception au système des attractions électives, car on sait que le mercure précipite le nitrate d'argent & enlève l'oxygène à ce dernier métal, tandis que c'est l'argent qui enlève à son tour l'oxygène au mercure dans la décomposition du mercure corrodé; mais en réfléchissant à ce qui se passe dans cette dernière expérience, on voit que la différence des acides & de la température produire ici la diversité des résultats, & qu'elle tient sur-tout à l'attraction de l'acide muriatique pour l'oxide d'argent.

L'argent s'unit parfaitement avec l'étain, mais il perd par la plus petite dose de ce métal en vapeur toute sa ductilité. Muschembroeck a donné des détails très-intéressants sur cet alliage; suivant

lui, un partie d'étain unie à quatre parties d'argent, forment un alliage aussi dur que celui du cuivre & de l'étain; une plus grande portion de ce dernier diminue sa ténacité, alors l'alliage devient si dur qu'il est très-difficile à limer; il est en même temps très-fragile. L'étain pénètre & rongé singulièrement l'argent; en chauffant cet argent flammique à l'air, il se forme un oxide blanc dans lequel on ne distingue plus l'argent. L'étain décompose le muriate d'argent.

L'argent s'allie promptement avec le plomb, qui le rend très-soluble & qui lui ôte son élasticité & sa qualité sonore; la couleur de l'argent est ternie dans cet alliage; sa ductilité n'est pas détruite comme par l'étain.

Il s'allie au fer, & cet alliage, peu examiné, pourroit devenir d'une très-grande utilité dans les arts. Une dose égale d'argent & de fer forme un métal blanc plus dur que l'argent & attirable à l'aimant; l'acier est facilement fondé à l'aspect. Suivant Gellert le fer a plus d'affinité pour l'argent que n'en a le cuivre; les propriétés de cet alliage mériteroient d'être examinées avec soin.

L'argent se fond & se combine en toutes proportions avec le cuivre. Ce dernier ne lui ôte point sa ductilité, il le rend plus dur & plus sonore. Cet alliage est très-dense, & plus pesant que le calcul des pesanteurs des deux métaux ne l'indique. Suivant Krafz & Gellert, sa couleur n'est que peu altérée, le cuivre étant même à parties égales. Les propriétés de cet alliage le rendent extrêmement utile dans les arts. On trouvera dans l'histoire de l'or & du platine leur combinaison avec l'argent.

Bergman dispose dans l'ordre suivant les attractions des différens métaux avec l'argent par la voie sèche, le plomb, le cuivre, le mercure, le bismuth, l'étain, l'or, l'antimoine, le fer, le manganèse, le zinc, l'arsenic, le nickel, le platine. En plaçant au dernier rang le sulfure alcalin & le soufre, il indique que le soufre tenant argent est séparé de ce métal par tous les autres métaux.

Quant aux substances végétales & animales; elles ont peu d'action sur l'argent, à moins qu'elles ne contiennent du soufre; dans ce cas elles le noircissent & finissent par le convertir en sulfure d'argent; des vases d'argent qui ont séjourné dans des larmes ont été minéralisés par le soufre; les feuilles d'argent qui enveloppent les pilules sont souvent colorées par les substances qui constituent ces préparations.

L'argent est un métal singulièrement avantageux & très-souvent employé à cause de sa ductilité, de son indestructibilité par le feu & l'air. On le brillant le fait servir d'ornement; on l'applique à la surface des différens corps & même du cuivre; on le fait entrer dans le tissu des étoffes dont il relève la beauté; mais son usage le plus important est celui de fournir une matière propre, par sa ductilité & par sa ductilité, à faire des vases de toutes

les formes. L'argent de vaisselle est ordinairement allié d'un vingt-quatrième de cuivre qui lui donne plus de dureté & de cohérence, & qui ne l'expose à aucun inconvénient pour la sûreté, parce que les vingt-trois parties d'argent masquent & détruisent entièrement les propriétés délétères du cuivre. Enfin, l'argent est employé pour exprimer la valeur de toutes les marchandises, & on le fabrique en monnaie; mais dans ce cas on l'allie à un douzième de cuivre, & son titre est conséquemment à onze deniers de fin.

ARGENT. (*Métallurgie.*) *Procédés métallurgiques par lesquels on retire ce métal précieux des substances avec lesquelles il se trouve mêlé au sortir de ses mines.*

L'argent est un métal qu'on appelle parfait, parce qu'il est fixe au feu, il est blanc & très-dur, lorsqu'il est pur; le pouce cube d'argent pèse six onces cinq gros & vingt-six grains.

Les minerais d'argent sont très-variés, ainsi que le lecteur le verra à la minéralogie, & comme toutes les autres substances métalliques, ils se trouvent par filons, par veines, &c. Voyez le mot **FILONS**. Voyez aussi au mot **MINES**, les différents traitemens des minerais d'argent aux bocards à eau, aux bocards à sec, aux laveries, aux cribles & aux tables, &c. Car les minerais d'argent, ainsi que tous les autres, se trouvent presque toujours si mélangés de roche & autres substances, qu'ils ne pourroient être fondus avec profit, si on ne les en dégageoit pas au moins d'une bonne partie. L'argent se trouve aussi plus minéralisé par le soufre & l'arsenic que natif ou vierge, & enfin il se rencontre très-communément combiné avec des minéraux de plomb, de cuivre & autres. Nous décrirons les méthodes les plus en usage pour retirer l'argent de ses minerais.

Les mines d'argent les plus riches & les plus abondantes sont en Amérique, sur-tout dans le Potosi, qui est une des provinces du Pérou. Elles ont fourni aux Espagnols une très-grande quantité de ce métal depuis qu'ils ont fait la conquête du Pérou; celles du Potosi ont été autrefois si abondantes, qu'elles occupoient jusqu'à 120 moulins pour broyer les minerais qui en sortoient; mais comme leur richesse a diminué à mesure de l'approfondissement des travaux souterrains, le nombre des moulins est réduit à 40, qui même ne sont pas tous occupés.

Nous allons rendre compte des procédés employés au Potosi pour retirer l'argent des substances minérales & pierceuses dans lesquelles il est contenu, ces procédés sont extraits des voyages de M. Frézier à la mer du Sud.

Après avoir concassé la pierre qu'on tire de la mine, on la moule ou dans des moulins (Voyez au mot **ON** la description de ces moulins), ou le plus ordinairement sous les pilons d'un bocard, qui

pèsent environ deux cents livres: on tamise ensuite cette poudre par des cribles de fer ou de cuivre, pour en tirer la plus fine, & remettre la plus grosse au moulin. Dans les petites mines on pile le minerai avec de l'eau pour en former une boue que l'on fait couler dans un réservoir; au lieu que quand on le pile à sec, il faut ensuite le détrempier & le paître avec les pieds pendant long-temps. Pour cet effet, dans un emplacement fait exprès, on range cette poudre par couches d'environ un pied d'épaisseur, qui contiennent chacune vingt-cinq quintaux de minerai, sur lequel on verse environ deux cents livres de sel marin plus ou moins, suivant sa qualité. On le paître & on le fait incorporer avec la terre pendant deux ou trois jours, ensuite on y jette une certaine quantité de mercure, en pressant avec la main une bourde de l'eau dans laquelle on le met pour le faire sortir par goutte; on en emploie pour chaque couche 10, 15 ou 20 livres, car plus le minerai est riche, plus il en faut pour rassembler l'argent qu'il contient; ainsi on n'en connoit la dose que par une longue expérience. On charge un Indien du soin de paître une de ces couches huit fois par jour, afin que le mercure puisse bien s'incorporer avec l'argent; pour cela on y mêle souvent du sel marin quand le minerai est gras, en quoi il faut user de précaution; car on dit que quelquefois il s'échauffe si fort, qu'on n'y trouve plus ni mercure ni argent, ce qui paroît incroyable; souvent aussi on y mêle du minerai de plomb ou d'étain pour faciliter l'opération du mercure, qui dans les grands froids se fait plus lentement que dans les chaleurs modérées; c'est par cette raison qu'au Potosi & à Lipas on est souvent obligé de paître le minerai pendant un mois ou six semaines; mais dans des pays plus tempérés il s'amalgame en huit à dix jours.

Pour faciliter le mercure à s'amalgame; on a dans quelques endroits, comme à *Buno*, des emplacements voûtés en briques, sur lesquels on fait du feu pour échauffer le minerai pendant vingt-quatre heures.

Quand on croit que le mercure a ramassé tout l'argent, l'essayeur en prend un peu de chaque, & le lave dans une assiette ou bassin en bois; il connoît par la couleur du mercure qui se précipite dans le fond, s'il a fait son effet; car lorsqu'il est noirâtre, c'est une preuve que le minerai a été trop de feu, on y remet du sel ou autre drogue, ils disent alors que l'argent s'enfuit. Si ce vif-argent est blanc, on en met un peu sous le pouce, & en l'appliquant vite dessus, l'argent reste attaché au doigt, & le mercure s'échappe en globules. Enfin quand on reconnoît que tout l'argent est amalgamé, on transporte la terre dans un bassin où tombe un ruisseau pour le laver en l'agitant avec les pieds, du premier bassin cette terre tombe dans un second, où on la remue encore pour la bien délayer, & de ce second elle passe à un troi-

fième, où l'on procède de même. Après que le tout a été lavé & que l'eau est claire, l'on trouve au fond des bafins garnis de cuir, le mercure incorporé avec l'argent, ce qu'on nomme *la pella*; on la met dans une chauffe de laine de vignogne, suspendue pour faire couler une partie du mercure; on la lie, on la bat & on la presse fortement, en appliquant par dessus des morceaux de bois plats, & quand on en a tiré ce qu'on a pu, on met certe pâte dans un moule construit en planches, dont la forme est celle d'une pyramide octogone tronquée, & dont le fond est une plaque de cuivre percée de petits trous. On la foule dans ce moule pour l'assettir. Cet amalgame ainsi moulé s'appelle *pignes*. Lorsqu'on veut faire plusieurs pigns de différens poids, on les divise par des petits lits de terre qui en empêchent la continuité. En déduisant de la *pella* les deux tiers pour ce qu'elle contient de mercure, l'on fait à très-peu de chose près ce qu'il y aura d'argent net.

On lève ensuite le moule, & on met la *pigne* avec sa base de cuivre sur un trépid posé sur un grand vase plein d'eau, on l'enferme sous un chapiteau de terre qu'on couvre de charbon, dont on entretient le feu pendant quelques heures, afin que la pigne s'échauffe vivement, & que le mercure qu'elle contient en sorte en fumée; mais comme cette vapeur mercurielle n'a point d'essor, elle circule dans le vuide qui est entre la pigne & le chapiteau, & venant à rencontrer l'eau qui est au-dessous, elle se condense & tombe au fond transformée de nouveau en mercure; ainsi on en perd peu, & le même sert à plusieurs fois, mais il faut en augmenter la dose, parce qu'elle s'affoiblit. On consommoit autrefois au *Potosi* fix à sept mille quintaux de mercure, selon *Acosta*, d'où l'on peut connoître la quantité d'argent qu'on en tiroit.

Comme dans la plus grande partie du Pérou il n'y a ni bois ni charbon, mais seulement de l'huile, qu'on appelle *icho*, on s'en sert pour chauffer les *pignes*, par le moyen d'un four construit auprès de la *Dejaga-guacora*, ou fourneau à dessécher l'argent & à le purger de mercure, & l'on en communique la chaleur par un canal où le mercure en vapeurs s'engouffre.

Quand le mercure est évaporé, il ne reste plus qu'une masse de grains d'argent confus, fort légère, & presque friable, qu'on appelle *pigu*, *pigu*, marchandise de court-éclat hors des mines, puisque par les loix, on est obligé de la porter aux caisses royales, où on la monnoie pour en payer le quint, & où elle est fondue en lingots, sur lesquels on applique les armes de la couronne.

La méthode que nous venons de décrire, d'extraire l'argent des minerais au *Potosi*, ne peut guères avoir lieu qu'au Pérou, où il y a des mines de mercure qui fournissent à l'amalgamation: on y en fait même passer beaucoup des mines d'Almadén, en Espagne, qui sont très-riches en mer-

cure. La raison pour laquelle on ne traite pas les minerais du *Potosi* par la fonte, vient sans doute de ce qu'il n'y a pas de bois, ainsi que M. l'abbé le fait observer; car nous sommes persuadés que l'on y perd beaucoup d'argent dont on profiteroit par la fonte, après l'avoir concentré dans un plus petit volume par le bocarde & le lavage. Voyez ces manipulations au mot MINES. La plus grande partie de l'argent qui n'est pas sous la forme métallique ou native, & qui est minéralisé par le soufre ou par l'arsenic, ne peut pas s'amalgamer, est entraîné par l'eau avec la terre & les pierres broyées, durant la lotion que l'on fait, pour séparer ces substances étrangères de l'amalgame. Ainsi nous ne regardons ce procédé que comme convenable au pays seulement, où sans doute la majeure partie de l'argent est sous la forme métallique, quoique M. l'abbé dise que le minéral n'est pas toujours de même qualité, qu'il y en a de blanc, de gris mêlé de taches rouilles, de noir comme du machefeur où l'argent ne parait pas; qu'il y en a de mêlé de plomb, &c. C'est ce qui nous fait préférer qu'on n'obtient pas tout l'argent des minerais du *Potosi*, & qu'il est vraisemblable qu'il en échappe une très-grande partie à l'action du mercure, en sorte que si l'on avoit en Europe ce qui s'y perd, on en tireroit un très-grand parti, en traitant ces matières par les procédés ordinaires de la fonte avec les additions convenables. L'our se convaincre de l'immensité de l'argent perdu au Pérou par l'amalgamation, il suffira de faire attention à ce qui reste après ce procédé dans les terres ou cendres des monnoies & d'orfèvres, qui après avoir été passées jusqu'à trois fois au mercure dans nos moulins bien faits, retiennent encore assez d'argent pour être fondus avec profit dans nos fonderies. Cependant il n'y a pas dans ces cendres, comme dans les minerais du *Potosi*, d'argent minéralisé par le soufre & l'arsenic, il est donc bien plus aisé à saisir par le mercure. Ce procédé, nous le répétons, ne doit être employé que dans les endroits où le bois manque, & où le mercure est abondant comme au Pérou. Les procédés de la fonte des minerais d'argent dont nous allons parler, sont plus avantageux, puisque, comme nous le ferons voir, on tire parti des minerais qui ne tiennent qu'une demi-once & même deux gros d'argent par quintal.

Avant que d'entrer dans le détail des opérations de la fonte des minerais d'argent, il convient de dire qu'ils sont si variés, tant par rapport à leurs différentes espèces, qu'aux substances métalliques, pierreuses & terreuses qui les accompagnent, qu'ils exigent des procédés différens, dont la théorie doit être fondée sur leurs degrés de fusibilité; car telle espèce de minéral fera très-fusible, tandis qu'une autre variéte sera réfractaire, au point de ne pas pouvoir vitrifier les parties pierreuses qui doivent former les scories; mais un habile métallurgiste charge de la direction d'une fonderie,

fait remédier à cet inconvénient, en ajoutant les fondans convenables aux minerais qu'il traite ; il lui suffit souvent de mêler dans certaines proportions des minerais de différentes qualités, pour rendre le tout fusible au point désiré ; car il n'en est pas de la fonte en grand, comme de la domesticité, on ne peut pas dans la première se servir de flux ou fondans, comme dans la dernière. Il faut, pour pouvoir tirer parti du travail métallurgique, que ces fondans ne coûtent rien ou peu de chose, & qu'ils flottent, autant qu'il est possible, partie des minerais que l'on veut traiter.

Si en Allemagne, & sur-tout en Saxe, les minerais d'argent se fondent avec beaucoup d'économie, c'est qu'il y a des fonderies royales où tous les minerais de chaque district sont traités & mêlés dans des proportions convenables à se servir réciproquement de fondans : ce qui ne peut avoir lieu, lorsqu'on n'a que le minerai d'un seul filon. C'est ce qui devrait engager le ministère d'établir en France des fonderies royales, où se livreroient tous les minerais d'un arrondissement donné.

Les différentes manières de traiter les minéraux d'argent, sont presque aussi variées que leurs espèces. Chaque pays a ses usages, soit pour la forme des fourneaux & leurs dimensions, soit pour la manière d'y opérer. Nous ne détaillerons que les plus importantes, & le plus clairement qu'il nous sera possible.

Les minerais d'argent doivent être triés, bordés & lavés, avant que d'être livrés aux fonderies. Voyez au mot MINES toutes ces manipulations.

Lorsque par le triage, on a mis à part de l'argent natif, du minerai rouge & vitreux d'argent qui sont les plus riches, on ne les traite pas aux fonderies avec les minerais ordinaires ou pauvres, on les met dans le bain d'un affinage de plomb ; lorsque ce metal commence à litharger, l'argent de ces minerais précieux reste au fond de la coupelle avec celui déjà contenu dans le plomb. Voyez au mot LIQUATION, la manière d'affiner le plomb, pour en retirer l'argent.

Au lieu d'imprimer ces minerais riches en argent dans le bassin de la grande coupelle, on peut, comme à Joachimsthal, le passer sur une petite coupelle, semblable à celle où l'on raffine l'argent affiné ou de première opération. Voyez aussi au mot LIQUATION ce raffinage, qu'on appelle aussi, mal-à-propos, brûler l'argent.

Après avoir réduit en petits morceaux les minerais d'argent, dont on vient de parler, préparé & bien fait chauffer la coupelle, pour la priver de son humidité, l'on y met une douzaine de livres de plomb ; lorsqu'il commence à travailler, c'est-à-dire que la litharge se forme à la surface, l'on y introduit fix ou sept livres de minerai ; on retire avec un petit crochet de fer les scories qui nagent sur le bain, & dès que le plomb travaille de nouveau, on remet du minerai à plusieurs reprises,

jusqu'à ce qu'il y en ait douze à quinze livres. On laisse ensuite affiner l'argent, jusqu'à ce qu'il soit au titre de 11 deniers 21 à 22 grains. Par ces deux méthodes d'imprimer les minerais riches en argent, dans les coupelles, l'on en perd moins que si on les fondait avec les minerais pauvres dans les fourneaux de fusion par les procédés que nous donnerons ci après.

L'argent que l'on obtient en plateau après l'affinage sur la grande coupelle, quoiqu'il ait fait son éclair, n'est pas pur ; il contient encore un dix huitième ou un vingtième de son poids de plomb, qu'on lui enlève en le passant à la seconde opération, qu'on appelle raffiner l'argent, que le lecteur trouvera décrite au mot LIQUATION. Il y verra aussi ce que c'est que l'éclair de l'argent dans le travail de la coupellation en grand, ainsi que la description du fourneau de coupelle.

De la fonte des minerais contenant de l'argent.

Nous avons déjà dit que l'argent se trouve plus souvent confondu avec d'autres substances métalliques, sulfureuses & arsenicales, que seul. Nous avons aussi fait voir que ces minerais tenant argent, sont le plus ordinairement disséminés dans une très-grande quantité de spar, quartz & autres substances pierreuses dont on les débarrasse en partie par les opérations du bocardage & du lavage, afin de pouvoir rapprocher dans un plus petit volume les particules métalliques, & traiter aux fonderies ces matières avec plus d'avantage. Mais les minerais d'argent sont souvent si pauvres en ce metal, que malgré toutes ces préparations préliminaires, ils n'en tiennent fort souvent que peu, ainsi que nous le ferons remarquer plus bas ; c'est dans cette circonstance où il faut qu'un métallurgiste soit habile pour tirer parti de ces matières pauvres en argent. De tous les procédés métallurgiques que nous avons eu occasion de suivre chez l'étranger, nous n'en avons pas trouvé de plus économiques ni mieux fondés sur les vrais principes, que ceux que l'on fait aux fonderies de Freyberg en Saxe : en conséquence nous allons en rapporter brièvement les opérations.

Nous commencerons par la fonte qui se fait des minerais les plus pauvres en argent, & qui ne contiennent point de plomb, que l'on fait être l'intermédiaire le plus ordinaire, pour retirer l'argent de ses minerais ; mais lorsque les minerais d'argent n'en contiennent point de ceux de plomb, il faut y ajouter des substances cuites, durant la fonte, se saisissent de l'argent. L'expérience a fait connoître que les pyrites sulfureuses remplissent parfaitement cet objet, & fournissent des mattes qui dans un volume beaucoup plus petit recèlent l'argent.

Nous allons rendre compte d'une pareille fonte faite en notre présence, que l'on appelle *fonte pauvre & fonte crue*. La première denomination lui est donnée, par rapport au peu d'argent con-

tenu dans les minerais ; & la seconde, parce que ces minerais font fondus, sans avoir été grillés.

De la fonte crue.

L'on prit de seize minières différentes, environ cent quarante quintaux & soixante-cinq livres de minerais contenant du spath, du quartz, de la blende & beaucoup de pyrites sulfureuses, qui ensemble ne contenoient que 132 marcs sept onces quatre gros d'argent ; ce qui avoit été reconnu par des essais docimastiques, faits avec exactitude. Tous ces différens minerais furent bien mêlés, afin qu'il pussent se servir réciproquement de fondans. Car l'on fait, ainsi que M. M. Darcet & Port l'ont fait connoître, que le quartz, ou toute autre pierre réfractaire, étant mêlée en certaines proportions avec du spath calcaire, l'un & l'autre entre en fusion en se vitrifiant. Il ne suffit pas ici de procurer de la fluidité à la matière fondue, il faut encore en rassembler toutes les parties métalliques, & sur-tout celles d'argent, dans un volume plus petit que celui où il étoit auparavant. C'est à quoi l'on parvient à l'aide des pyrites qui donnant dans la fonte une matte plus pesante que la partie vitrifiée, appelée scorie, réunissent les particules métalliques. Ces pyrites facilitent aussi beaucoup la fusion ; ce qui arrive par-tout où le fer & le soufre se trouvent mêlés, comme dans cette substance. L'addition des scories est également essentielle dans cette fonte ; on étend par leur moyen dans un grand volume fusible par lui-même, des matières qui sont encore réfractaires, telles que la blende qui s'attache aux parois & au fond des fourneaux. Les scories en facilitent la vitrification. Il fut donc ajouté aux 1440 quintaux & 65 livres du mélange des minerais ci-dessus, 600 brouettées de scories provenant d'une fonte de minerais de plomb, qui avoient déjà passé plusieurs fois à la fonte pour les appauvrir ; il y fut en outre mis cent brouettées de matières qui, ne se fondant pas bien, se rassemblent dans les fourneaux. On appelle ces matières *durillons* ; en Allemand, *guschur*. Enfin l'on ajouta au mélange 36 brouettées de matières pilées & lavées, extraites de la braque qui forme le sol des fourneaux ; l'essai annonce qu'elles contiennent sept marcs quatre gros d'argent, qui avec les 132 marcs sept onces quatre gros contenus dans les minerais, font 140 marcs.

Les 736 brouettées de scories de durillons & lavures de braque, sont évaluées peser deux quintaux chacune ; ce qui seroit 1472 quintaux, qui ajoutés aux 1440 quintaux 65 livres de minerais, font un total du poids de 2912 quintaux & 65 livres.

Le plomb, l'argent & le cuivre contenus dans ces matières d'addition, se réunissent durant la fonte crue, aux mattes avec lesquelles elles se précipitent. Il seroit impossible de tirer parti des

minéraux pauvres, si on ne suivoit pas cette méthode.

Tous les minerais du mélange ci-dessus avec ses additions, furent fondus en quinze jours dans deux hauts fourneaux, semblables à celui qui est représenté sur la planche trente-huit du traité des fonderies de Schlutter, traduit de l'allemand par M. Hellot ; mais avec quelques différences, dont voici les principales.

La hauteur totale de ce fourneau est de 16 pieds cinq pouces, y compris quatre pieds six pouces & demi pour les fondations ; de sorte qu'il reste douze pieds dix pouces & demi, depuis le sol de la fonderie jusqu'au haut du fourneau, qui a vingt pouces neuf lignes de large à sa partie supérieure, sur 28 pouces & demi de longueur. Il forme un renflement à la hauteur de la tuyère, qui va en diminuant jusques sur le devant ; à cette hauteur, il a 34 pouces 7 lignes de largeur, & sur le devant, où est la petite voûte pour la pierre de l'œil, 29 pouces 5 lignes, sur une largeur de 36 pouces 3 lignes.

Il diffère encore de celui de Schlutter, en ce que l'on a pratiqué à côté de l'avant-foyer, à l'endroit opposé du bassin de réception, un canal pour y faire couler les scories, lorsque le catin du premier est plein. Ce canal est fait avec de la terre grasse & en pente, sur laquelle on bat de la braque.

Avant de commencer la fonte, les fondeurs & leurs aides se rendent le lundi à quatre heures du matin à la fonderie pour préparer leurs fourneaux ; ils enlèvent les scories & autres matières qui y sont restées de la fonte précédente, de même que toute la braque qui a été brûlée, & celle qui n'est pas assez ferme pour en recevoir de nouvelle ; ils abattent, avec un marteau & autres outils, tout ce qui s'est attaché aux parois intérieurs, & s'ils trouvent que leurs fourneaux aient une plus grande capacité que celle qui est prescrite, ils y remédient en bouchant toutes les cavités qui peuvent s'y être formées, sur-tout au-dessus de la tuyère ; enfin, ils les rétablissent dans leur premier état. La vieille braque est criblée & mise à part pour être mêlée avec de la nouvelle ; toutes les matières qui restent sur le crible, sont lavées à un courant d'eau pour en retirer la matte & les scories, c'est ce qui fait partie des débris qui ont formé les trente six brouettées portées ci-dessus au mélange.

La braque dont on se sert est légère ; elle est composée de partie égale d'argile bien séchée & de poussière de charbon, le tout pilé sous les pilons d'un bocard, & tamisé ; l'on humecte cette poussière de manière qu'elle puisse se pelotter dans les mains ; on en met d'abord trois brouettées tant dans l'intérieur d'un fourneau que dans son encaissement extérieur ; on la bat avec un pilon de bois de quatre à cinq pouces de diamètre, on place alors le bois conique qui doit former

le passage de la percée; on remet un nouveau lit de braque, après avoir arrosé le premier, afin que l'un & l'autre puissent mieux se lier, & ainsi de suite, *stratum super stratum*, jusqu'à ce que le fourneau soit plein à hauteur de la lèvre inférieure de la tuyère, que le maître fondeur place, suivant la qualité des matières à fondre: si le mélange n'est ni réfractaire ni trop fusible, il place la tuyère dans une position horizontale de quinze pouces & demi, plus élevée que le dessus du bassin de l'avant-foyer, & dans cette circonstance, le vent des soufflets est dirigé aussi horizontalement; ils sont de cuir, de neuf pieds de longueur, & trois pieds dans leur plus grande largeur. Les buses ou canons de ces soufflets sont disposés de manière que leur vent se croise à-peu-près au milieu de la longueur du fourneau.

Si l'on avoit à fondre des minerais plus réfractaires que ceux du mélange ci-dessus, il seroit à propos d'élever la tuyère d'un pouce; alors ayant plus de distance pour arriver au bassin de l'avant-foyer, les matières acquieseroient une fusion plus parfaite, & les parties métalliques se précipiteroient avec plus de facilité à travers les scories. Si le minerai est très-fusible, on place la tuyère de six lignes, & même d'un pouce plus bas, & alors on l'incline un peu vers l'intérieur du fourneau, ainsi que les buses ou portent-vent des soufflets. Enfin, il y auroit de l'inconvénient à placer la tuyère trop bas, la fonte ne se feroit pas aussi promptement, les scories ne seroient pas aussi fluides; elles ne laisseroient pas bien précipiter la matte, dont une partie y resteroit mêlée.

La tuyère placée, on fait la trace en creusant la brasque dans le fourneau, depuis dix-sept jusqu'à dix-neuf pouces de profondeur, & le bassin de l'avant-foyer de onze à treize pouces, de façon que l'un & l'autre forment un seul bassin où se rassemblent les mattes & les scories, la brasque qui est en pente depuis la tuyère jusqu'au fond de la trace, s'appelle le siège du nez.

On ferme ensuite le devant du fourneau avec des briques, on garnit la trace & les bassins de charbons que l'on allume, on y entretient le feu pendant trois ou quatre heures, on remplit ensuite le fourneau de charbon, en y ajoutant une brouettée de scories qui servent à former le nez. Enfin, on porte sur la dernière charge de charbon deux baquets du minerai mélangé, alors l'on fait agir les soufflets, & le maître fondeur veille à ce que le nez se forme tel que le travail l'exige. (Les fondeurs appellent nez, des scories qui s'attachent au bout de la tuyère, & qui en forment la prolongation). Pour la fonte dont nous traitons ici, le nez ne doit avoir que six jusqu'à huit pouces de longueur, & le fondeur ne doit pas attendre que les matières soient trop baissées dans le fourneau pour le charger de nouveau, parce que le minerai n'auroit pas le temps de s'échauffer suffisamment avant d'être rendu vis-à-vis la

tuyère, alors il ne fondroit qu'imparfaitement, ce qui occasionneroit une perte de matière & de temps.

Jusqu'à ce que la trace & le bassin de l'avant-foyer soient pleins, le fondeur remet de temps en temps la matière en fusion, en passant en dessous de la pierre de l'œil, une barre de fer qu'on appelle ringard, afin de détacher de la brasque la matte & les scories qui s'y rendent ordinairement adhérentes dans le commencement de la fonte. Il enlève aussi de temps en temps les scories de la surface, de crainte qu'elles ne deviennent trop pâteuses.

A mesure que le fourneau s'échauffe, on augmente à chaque charge la quantité du minéral ou mélange, sans changer la proportion du charbon; le premier se porte sur la partie postérieure du fourneau, afin de ménager les charbons de bois; nous avons vu ajouter à chaque charge un peu de charbon de terre crue, que l'on charge sur la partie antérieure du fourneau, car les Saxons avoient alors soin qu'il ne touchât pas le minéral; leur but ne tendant qu'à augmenter l'intensité de la chaleur, s'ils eussent connu la manière d'épurer le charbon de terre, ils en auroient employé, sans inconvénient, une bien plus grande quantité; nous sommes même persuadés que dans la fonte crue dont nous traitons, ils auroient pu se passer de charbon de bois. Voyez l'article CHARBON DE TERRE, vous y verrez son utilité dans les fonderies lorsqu'il est réduit en coute.

Mais reprenons la suite de notre fonte. Lorsque la trace & le bassin de l'avant-foyer sont remplis de mattes, on fait la percée qui n'a lieu que de six en six heures; pour cet effet on bouche la tuyère avec une boule d'argile & on arrête les soufflets; ensuite l'on introduit un fer pointu dans le canal de la percée, on l'enfonce d'abord doucement, si on trouve de la résistance, on frappe avec un marteau sur le fer que l'on retire & qui laisse un petit trou par lequel la matte s'écoille dans le bassin de réception tenu chaud avec un feu de charbons. Lorsque les scories qui naissent à la surface de la matte, se présentent à l'entrée du canal, on bouche avec une petite pelotte de terre argileuse le trou de percée. On enlève du bassin de l'avant-foyer les scories qui s'y sont figées, & avec des ringards ou leviers de fer, on détache les matières pâteuses qui sont restées dans la trace & dans la partie inférieure du fourneau; ces matières qui sont composées de matte, de blende & de scories, sont ce que nous avons nommé durillons, & qui entrent dans la composition du mélange, ainsi que nous l'avons dit.

On répare le bassin de l'avant-foyer en y battant de la brasque, & on fait agir les soufflets; la matte est ensuite levée en gâteaux, de chacun desquels l'on prend un petit morceau, dont le maître de la fonderie fait l'essai, afin de s'assurer

de la teneur en argent de la matte de chaque perçee.

On continue la fonte jusqu'à ce que le mélange soit passé aux deux fourneaux qui travaillent en même temps. La dernière charge étant faite, on laisse descendre le minerai & les charbons jusqu'à la tuyère, & aussitôt que le nez est fondu on arrête les soufflets, on ouvre le devant des fourneaux, on fait les dernières percées & on nettoie les fourneaux.

Le mélange rapporté fut fondu en 330 heures, ce qui fait 6 heures moins des deux semaines entières, mais ces 6 heures sont employées à préparer & à chauffer les fourneaux avant d'y commencer la fonte; il fut consumé durant ce temps 2748 pieds cubes de charbon de bois, & seulement 87 pieds $\frac{1}{2}$ de charbon de terre.

Il résulta de cette fonte 560 quintaux de mattes, qui, suivant les essais, contenoient deux onces d'argent par quintal, ce qui fait que leur totalité renfermoit exactement les 140 marcs contenus tant dans les minerais du mélange que dans les durillons ajoutés, ce qui prouve le succès de la fonte.

L'avantage qui résulte de ce procédé est d'avoir rassemble tout l'argent contenu dans les quatorze cens quarante quintaux cinq huitièmes de minerai, en une masse de cinq cens soixante quintaux de matte, dont il est bien plus facile de le séparer par les procédés ci-après. Un maître fondeur & son aide à chaque fourneau conduisent la fonte dont nous venons de rendre compte.

Les mattes provenant de cette fonte sont cassées en morceaux, pesées & transportées dans un fourneau de grillage de vingt pieds neuf pouces de long sur dix pieds quatre pouces de large, entouré de murs; on étend sur le sol de ce fourneau cent huit pieds cubes de charbon de bois, sur lequel on met quatre cens cinquante quintaux de cette matte; l'on met le feu au charbon, qui, par la grande quantité de soufre que la matte contient, se grille facilement & comme d'elle-même. Lorsque le feu du charbon l'a pénétrée, il ne faut pas qu'elle entre en fusion, c'est pourquoi on met peu de charbon; la matte grillée doit être spongieuse & cellulaire, celle qui est ressemblée compacte n'est pas suffisamment grillée, c'est pourquoi on lui fait subir une seconde calcination ou torréfaction, & même un troisième feu aux parties de matte qui ont échappé à son action dans le second grillage.

Si dans la livraison des minerais aux fonderies il se trouve beaucoup plus de pyrites pauvres en argent & en cuivre qu'il n'en faut pour le procurer des mattes dans la fonte crue, on en fait griller une partie, afin que par la dissipation du soufre & de l'arsenic, la quantité de matte soit réduite à un plus petit volume. On a par-là l'avantage d'avoir des scories, qui ne sont ni trop fluides ni trop épaisses, & qui par cette raison se séparent très-bien des mattes sans en retenir; dans cette cir-

constance l'on ajoute moins de scories au mélange, puisque les scories grillées en fournissent elles-mêmes de très-bonnes.

On a deux manières de griller ces pyrites; la première qui ne concerne que les morceaux de la grosseur d'une noix, plus ou moins, se fait dans un fourneau de dix pieds quatre pouces en carré, dont les quatre murs qui en font le pourtour, ont neuf pieds quatre pouces de hauteur. Dans le mur postérieur sont six ouvertures de dix pouces de largeur sur un pied de haut, qui toutes répondent à une cheminée, à laquelle est adapté un conduit ou canal horizontal construit en briques, & recouvert avec des planches, dont les joints sont bouchés avec de la terre; ce canal, pour être plus au frais, est enterré; il a douze toises de longueur, mais avec plusieurs sinuosités, à son extrémité est une autre petite cheminée; ce canal est commun & sert à deux fourneaux semblables, qui sont l'un à côté de l'autre.

Sur un lit de bois de dix pieds cubes, rangé sur le sol de l'un de ces fourneaux, & 54 pieds cubes de charbon, on étend environ 800 quintaux de pyrites; la porte de devant se ferme avec des briques, de manière à laisser entr'elles des intervalles pour le passage de l'air; lorsque le gros minerai est rouge, on le couvre de pyrites en poudre, qu'on nomme *schlick*, de deux ou trois pouces d'épaisseur, & pour leur faire prendre corps on les humecte, ce qui empêche la fumée de passer au travers, & l'oblige à enfler le canal où le soufre se dépose en fleurs, ce qui fait une vraie sublimation; s'il se forme des fentes à la surface du grillage, on les bouche avec de nouvelles pyrites moillées.

Ces grillages restent en feu pendant six semaines ou deux mois; le soufre que l'on en retire paye les frais de cette opération, & lorsqu'on ne donne aux pyrites que ce seul feu de grillage, elles peuvent alors être ajoutées aux mélanges de la fonte crue, ainsi que nous l'avons déjà dit.

A la seconde méthode de griller les minerais d'argent pyriteux à lieu dans des fourneaux semblables à ceux décrits pour le grillage des mattes; comme cette manière est plus coûteuse que la précédente, l'on n'y fait passer que le minerai réduit en petits morceaux, & celui qui a été lavé aux tables, que l'on nomme *schlick*, & qui est en poussière.

Sur chaque sol de deux de ces fourneaux, on étend 40 quintaux de pyrites les plus grossières, sur lesquelles on arrange 80 pieds $\frac{1}{2}$ cubes de bois de corde, & par-dessus 108 pieds cubes de charbon; sur ce charbon on fait un nouveau lit de 40 quintaux de pyrites en poussière, sur laquelle l'on en étend 130 quintaux de celle qui est en petits morceaux lavée aux cribles, le tout recouvert encore de 30 quintaux de *schlick*. Ainsi les grillages sont composés de 480 quintaux de pyrites, de 161 pieds $\frac{1}{2}$ cubes de bois, & de 216 pieds cubes de charbon. On met des charbons allumés autour des

murs

murs pour communiquer le feu aux autres & au bois.

Ces grillages résistent au feu pendant quinze jours; ces pyrites sont très-pauvres, car les 480 quintaux ne contiennent communément que 26 à 27 marcs d'argent, ce qui fait par quintal, 3 gros 43 grains & un cinquième. L'on épargneroit du bois & du charbon, en y mettant une plus grande quantité de pyrites, qui, lorsqu'elle est mise en feu se grille elle-même, par l'abondance du soufre qu'elle contient.

De la fonte des minerais d'argent, appelée fonte riche.

La fonte riche diffère de la précédente; 1°. en ce que les minerais contiennent plus d'argent; 2°. en ce que l'on ajoute dans les mélanges des minerais contenant du plomb, afin que ce métal puisse se saisir de l'argent; 3°. cette fonte diffère de la fonte crue, en ce que les minerais sont tous grillés ou torréfiés avant que de les passer à la fonte.

Nous allons rendre compte des procédés en usage à Freyberg en Saxe, & que nous avons suivis. Il fut traité en notre présence 362 quintaux de minerais provenant de dix minières différentes, & divisés en vingt-deux espèces relativement à leur teneur & variétés, savoir: 1°. en minerais d'argent, 97 quintaux un quart, consistant en quartz, spath bleu & pyrite, contenant, d'après les essais, 119 marcs 2 gros d'argent.

2°. En 264 quintaux $\frac{1}{2}$ de minerais de plomb, également de différentes variétés, contenant ensemble 54 marcs 2 onces 1 gros d'argent, qui, joints aux 119 marcs 2 gros, font 173 marcs 2 onces 3 gros.

Tous ces minerais furent mêlés, & comme étant trop riches pour être fondus crus, sans s'exposer à perdre du fin, ils furent grillés pour en dégager une partie du soufre & de l'arsenic, afin que l'argent ne trouvât débarrassé de ces substances volatiles, fût en état d'être saisi par le plomb durant la fonte. L'on grille ces minerais de deux manières, savoir, la première en suivant à très-peu près la dernière méthode décrite ci-dessus, en leur faisant subir trois feux; & la seconde, en les passant au réverbère. Ce fourneau étant à-peu près semblable à celui que nous avons décrit au mot ETAIN, nous y renvoyons le lecteur, il a aussi un conduit pour recevoir les vapeurs sulfureuses & arsenicales. L'on étend 25 quintaux de minerai sur le sol de ce fourneau, on jette quelques bûches de bois par-dessus, & on fait du feu avec du charbon de terre dans la chaudière qui est à côté; on remue fréquemment le minerai avec des râteaux de fer; le feu doit être doux dans le commencement, de crainte que le minerai ne devienne pâteux; on l'augmente par degrés. Ce grillage exige vingt-quatre

heures de feu, après quoi on sort le minerai du fourneau, & l'on y en met 25 autres quintaux, ainsi de suite; l'on ne grille dans ce fourneau de réverbère que les minerais de moyenne grosseur; les gros morceaux n'y seroient pas suffisamment grillés, & le schlich en poussière seroit en partie emporté par le courant de la flamme; on grille ceux-ci à feu ouvert, ainsi que nous l'avons dit plus haut. Il y auroit aussi de l'inconvénient de rôtir au réverbère des minerais très-riches en argent, & qui contiennent beaucoup d'arsenic, parce que cette substance volatile en se dégageant, emporteroit avec elle une forte partie de ce métal: il convient mieux de les torréfier à feu ouvert, en les mêlant avec ceux de plomb.

Aux 362 quintaux des différents minerais dont nous avons parlé, après avoir été grillés ainsi que nous venons de le rapporter, il fut ajouté 270 quintaux de matte, provenant de la fonte crue détaillée plus haut & grillée trois fois, contenant 70 marcs d'argent, plus 128 quintaux de plomb pauvre d'une précédente fonte, contenant 92 marcs 3 onces 4 gros d'argent; ces deux quantités de fin font 162 marcs 3 onces 4 gros, qui, avec les 173 marcs deux onces 3 gros, contenus dans les 362 quintaux de minerais grillés, font 335 marcs 5 onces 7 gros d'argent.

A ce mélange il fut encore ajouté 50 quintaux de lincharge & 60 quintaux de reit ou cendres de coupelle imbibées de plomb; enfin il fut ajouté sur ce mélange, 68 broüettées de scories pauvres mais fondantes, qui à deux quintaux l'une, font 136 quintaux. Toutes ces substances réunies font au total 986 quintaux.

Il est bon d'observer ici, que malgré les 3 grillages que les 362 quintaux de minerais d'argent & de plomb ont reçu, ils ont encore conservé du soufre & de l'arsenic, qui, s'ils étoient fondus seuls, donneroient encore beaucoup de mattes; mais en y ajoutant les 370 quintaux de matte grillée provenant de la fonte crue, il arrive que ces substances volatiles s'unissent au fer de ces mattes, avec lequel elles ont une grande affinité, & se convertissent en scories; alors l'argent contenu dans ces mattes s'unit au plomb avec celui contenu dans les minerais & se précipite; mais comme ces mattes & les minerais quoique grillés ont encore tout de soufre & d'arsenic pour être entièrement absorbés par le fer, il provient de la fonte de ce composé de nouvelles mattes, que l'on appelle alors mattes de plomb, parce qu'elles en contiennent réellement & conséquemment de l'argent; elles contiennent, en outre le cuivre qui étoit contenu dans les pyrites, & du zinc, le ruait uni à du soufre & à de l'arsenic.

Le fourneau dont se sert pour cette fonte, est le même qui a servi à la fonte crue, & ce procédé est égal, c'est pourquoi nous ne le répéterons point.

Nous devons remarquer ici, que les 128 quintaux

de plomb d'œuvre qui ont passé à cette fonte, ont été divisés en autant de parties égales qu'il y a eu de percées, & chaque partie a été chargée au fourneau avant de faire les percées; de cette manière, le plomb en passant à travers le fourneau, se saisisse beaucoup mieux des particules d'argent contenu dans les minerais & dans les mattes, qu'en le mettant dans le bassin de l'avant-foyer, ainsi que cela se pratiquoit du temps de Schlutter. La litharge & le test sont également chargés sans addition, quelque temps avant la percée.

A mesure que la matte se refroidit dans le bassin de réception, on l'enlève en gâteaux avec des fourches de fer, c'est ce que nous avons appelé matte de plomb; lorsque toute cette matte a été enlevée, il se présente ordinairement une matière régulière plus pesante que la matte, que l'on appelle *speiss*. Enfin en-dessous de ce *speiss* se trouve le plomb enrichi de l'argent des minerais; lorsqu'il n'est plus rouge, on le puise avec une cuiller de fer enduite d'arrille, on le verse dans des moules de fer demi sphériques. Le bassin étant à peu-près à moitié, le fondeur met un peu de ce plomb dans un petit moule creusé d'une brique, pour être remis au maître des fonderies qui en doit faire l'essai, afin de connoître le produit en argent de chaque percée, qui se fait toutes les huit heures: les scories qui tiennent encore 12 à 13 livres de plomb par quintal, sont en parties jetées sur le mélange pour être refondues avec lui, le surplus est mis à part pour servir d'addition à la fonte crue; le plomb qui y est vitrifié se revivifie par l'action des charbons & s'unit à la matte qui l'empêche de se scotifier de nouveau, mais il y a toujours une diminution de plomb à chaque fonte. Quant aux durillons ou matières que l'on a détachées des fourneaux, on les rassemble; la fonte que nous venons de décrire en a rendu 33 brouettées, & 24 de matières trouvées dans la brasure.

Le mélange rapporté fondu en 117 heures dans trois fourneaux, a produit 279 quintaux sept huitièmes de plomb, appelé œuvre, contenant 314 marcs 2 onces d'argent, & 66 quintaux de matte de plomb qui, à 1 once & 6 gros d'argent, font 20 marcs 5 onces, qui joint aux 314 marcs 2 onces contenus dans l'œuvre, font 334 marcs 7 onces, ce qui fait à 6 onces 7 gros près, l'argent contenu dans les matières passées à cette fonte, pour laquelle on a consommé 4014 pieds cubes de charbon de bois, & 43 pieds huit pouces cubes de charbon de terre.

Lorsque la fonte est finie, on repasse aux mêmes fourneaux les mattes qui en sont provenues, avec les scories & durillons du même travail; c'est ce qu'on nomme *changer les mattes*: le plomb qui en provient est assez riche pour être affiné, & les mattes qui sortent de cette opération sont de suite refondues; mais comme le plomb se trouve alors trop embarrassé dans ces mattes par le soufre, l'arsenic, le fer, le cuivre & le zinc, on

ajoute à cette seconde fonte de la litharge & du test, afin que le plomb se saisisse de la majeure partie de l'argent y contenu; les mattes résultantes de cette refonte ne contiennent plus que 1 once à 2 onces & demie d'argent par quintal, & le plomb d'œuvre n'étant pas assez riche pour être affiné, sert d'addition aux mélanges d'une autre fonte de minerais d'argent.

Ces mattes changées & refondues deux fois, outre les 1 once à 2 onces $\frac{1}{2}$ d'argent par quintal, contiennent de 12 à 16 liv. de plomb, 7 à 8 liv. de cuivre, du fer, du zinc, du soufre & de l'arsenic; c'est pour en dégager ces deux dernières substances volatiles, & pour brûler le zinc au moins en partie, qu'on fait griller ces mattes cinq à six fois, en les faisant passer d'un fourneau à l'autre; ces grillages se font à feu ouvert dans les fourneaux que nous avons décrits; on étend sur le sol de l'un de ces fourneaux 81 pied cubes de charbon de bois, & par-dessus 300 quintaux de matte; on augmente un peu le charbon à chaque feu, c'est-à-dire d'environ 3 pieds $\frac{1}{2}$ cubes; l'on évite avec soin que cette matte n'entre en fusion, ce qui empêcherait le succès du grillage, c'est pourquoi l'on n'y met que peu de charbon & point de bois.

Les 300 quintaux de matte ci-dessus ayant été suffisamment grillés, furent fondus dans l'un des hauts fourneaux du travail du plomb préparé de même, la seule différence est dans la trace qui doit être creusée de 20 à 21 pouces, & le bassin de l'avant-foyer d'environ 15 pouces de profondeur.

Aux 300 quintaux de cette matte grillée six fois, & qui contenoit en total 80 marcs d'argent, il fut ajouté 12 brouettées de scories provenant de la fonte du cuivre; 129 dites résultant de la fonte de plomb, mais changées & fondues plusieurs fois; 45 dites du même travail à mesure de leur refroidissement, 64 quintaux de litharge ajoutée pendant la fonte à la quantité de 3 ou 4 quintaux pour chaque percée, qui se fait de huit heures en huit heures.

La durée de cette fonte a été de 130 heures; elle a produit 69 quintaux de plomb cuivreux, contenant six onces d'argent par quintal, ce qui fait pour le tout, 51 marcs 6 onces; plus 60 quintaux de matte, qu'on appelle alors matte de cuivre, car elle en contient beaucoup, qui, à 3 onces 6 gros d'argent par quintal, font 18 marcs 1 once, qui ajoutés aux 51 marcs six onces contenus dans le plomb, font 79 marcs 7 onces & par conséquent à une once près de l'argent contenu dans les mattes avant leur traitement.

Cn a consommé pour cette fonte 1277 pieds cubes de charbon de bois, & 21 pieds aussi cubes de charbon de terre.

Le plomb que l'on obtient de cette fonte des mattes est cuivreux, les nouvelles mattes qui en proviennent contiennent 25 à 30 pour 1000 de cuivre uni à du fer, du soufre, de l'arsenic, du zinc &

du plomb ; enfin cette matre ne diffère de celle de plomb que par les différentes proportions des subtilances qui la composent dans la matre de plomb c'est ce métal qui y domine , dans celle-ci c'est le cuivre.

La méthode qui nous paroîtroit la plus avantageuse pour traiter les mattes de plomb , seroit celle du haut-faït, décrite au chapitre 82 du traité des fonderies de Schlutter , elle est aussi en usage à Ste.-Marie-aux-mines. Plusieurs motifs devoient engager à l'adopter & à la perfectionner , on épargneroit du charbon , & on évitetoit une perte assez considérable de plomb qui se détruit , soit aux grillages répétés de ces mattes , soit aux différentes fontes qu'on leur fait subir. Par ce procédé , qu'on appelle affinage des mattes , on évite aussi la perte d'une partie du cuivre.

Affiner la matre de plomb , c'est en brûler le soufre & l'arsenic , afin que ce métal s'en sépare. On n'y peut réussir que sur le foyer d'un fourneau d'affinage où la chaleur est vive , le soufre s'allume & se dissipe avec l'arsenic , la plus grande partie de l'œuvre se sépare alors. La dissipation des parties volatiles est accélérée par le vent des soufflets , le zinc se brûle pour la majeure partie ; les mattes en sortant de l'affinage , sont fondues avec des matières tenant plomb , dont ce métal extrait une bonne partie de l'argent qui y est resté après l'affinage , sans qu'il y ait à craindre qu'il se mêle beaucoup de cuivre avec le plomb ; car il reste uni au fer par l'intermède d'une portion de soufre , ce qui forme de nouvelles mattes.

Le fourneau dont on se sert pour affiner les mattes est semblable à celui de la coupellation du plomb à l'effet d'en retirer l'argent. Voyez la description de ce fourneau au mot LIQUATION , mais le bassin du foyer au lieu d'être fait de cendres , l'est avec de la braise composée d'une partie d'argile & de trois parties de charbon , le tout pile , tamisé , mêlé & humecté. Avec ce mélange on forme le bassin , & on le bat aussi ferme que s'il étoit de cendres ; & devant la voie , qui , dans un affinage ordinaire , serviroit à l'écoulement de la litharge , on fait un bassin de percée , pour y faire couler la matre ; lorsqu'elle a tendu l'œuvre qu'elle contenoit , on fait chauffer avec du charbon ce bassin , avant que d'y faire la percée. Le sol de braise dont on vient de parler ne peut servir que pour deux affinages de matre de 25 à 30 quintaux chacun , que l'on arrange dans le fourneau du côté des soufflets sur deux pièces de bois , alors on fait le feu dans la chauffe avec des bûches & même des fagots , mais sans interruption.

Lorsque la matre est fondue , si elle patoit couverte d'une espèce de végis tenace qui lui ôte tout mouvement , il faut la découvrir en retirant cette matière , pour lui donner la liberté de céder à l'action des soufflets , & de circuler ; mais pendant cette manœuvre , il est nécessaire d'entretenir toujours un feu très-vif. Quand la matre

contient beaucoup de plomb , elle n'est pas longtemps à se mettre en fonte claire.

Si le degré de chaleur est toujours tel qu'il doit être , le soufre de la matre se brûle en grande partie , elle abandonne son œuvre : il se forme des scories qui la surnagent , & qu'on a soin de retirer successivement. Lorsque vers la fin elle devient plus pâteuse , il faut chauffer encore davantage , & enfin jusqu'à ce qu'on voye qu'on ne pourroit plus l'empêcher de s'épaissir. Alors on retire entièrement les scories qui surnagent , & l'on pèche , afin que l'œuvre & la matre coulent dans le bassin de réception ; on en retire la matre , & on verse l'œuvre dans des poêles de fer. Cet affinage dure huit à dix heures ; on en retire quatre à cinq quintaux d'œuvre , échargé d'une partie de l'argent contenu dans la matre , & 12 à 13 quintaux de nouvelle matre , qui contient plus de cuivre , & moins de plomb & d'argent que la première ; on fond ordinairement ces mattes dans un fourneau préparé à cet effet ; on y ajoute des scories de minéral de cuivre ; on obtient encore un peu d'œuvre de cette fonte , & des mattes , que l'on affine une seconde fois. La matre qui résulte de ce dernier affinage , contient jusqu'à 70 livres de cuivre par quintal d'œuvre , échargé de peu de plomb : on la fait entrer dans une fonte de cuivre.

Nous avons tenu compte de la fonte des minerais d'argent dans les fourneaux , & des différens traitemens des mattes qui en résultent , l'on a vu que tous les procédés ne tendent qu'à concentrer l'argent des minéraux dans une suffisante quantité de plomb , duquel on l'extrait ensuite par un autre procédé , qu'on appelle *affinage* ou *couppellation* , Voyez cette opération au mot LIQUATION. L'on y trouvera aussi la manière de raffiner l'argent , à l'effet de le mettre au titre , & la revivification ou reconversion des lichages en plomb marchand.

Il nous reste à traiter de la fonte des minéraux d'argent dans des petits fourneaux. La méthode en usage à Joachimthal en Bohême , & que nous avons suivie , mérite de trouver ici sa place , parce qu'elle tient le milieu entre la fonte crue & la fonte riche que nous venons de décrire.

Les fourneaux dont on se sert en Bohême pour la fonte des minéraux d'argent , sont de l'espèce de ceux qu'on nomme *courbes*. Leur hauteur n'est que de quatre pieds un pouce , leur longueur de deux pieds huit pouces , sur deux pieds trois pouces de largeur. La tuyère de fer coulé est placée à seize pouces au-dessus de la pierre d'encaissement , & inclinée d'un degré & demi en dedans du fourneau : deux soufflets de bois de neuf pieds deux pouces de longueur & trois pieds de largeur , donnent le vent.

Le fourneau se prépare avec une braise légère , composée de trois parties de poulxier de charbon sur une d'argile ; cette braise se bat à l'ordinaire dans le fond du fourneau , en observant

d'y former une trace ou rigole qui, depuis la tuyère, va en pente fe terminer au bassin de l'avant-foyer qui en fait la suite.

On ne connoit à Joachimsthal qu'une seule méthode de fondre les minerais; elle peut être appelée *fonte crue* & *fonte riche* en même-temps, puisque, sans griller les minerais d'argent, on les fond avec des matières tenant plomb, dont ce métal saisi du fin des la première opération. Les proportions des matières qui composent les mélanges sont relatives à la qualité des minerais d'argent; s'ils sont très-riches en ce métal, il faut que les substances tenant plomb soient ajoutées en plus grande quantité, que si les minerais sont pauvres. Nous allons donner l'exemple d'un mélange seulement.

On étend sur un plancher posé sur le sol de la fonderie six quintaux de minerais d'argent de diverses espèces, sur lesquels on met quatre quintaux de litharge & de test, deux quintaux de scories ou laitiers, provenant des forges à fer, quatre quintaux de matte grillée à cinq feux, 60 à 70 livres de grenailles de fer de fonte, & par-dessus une douzaine de quintaux de scories du même travail, dont partie a été bocardée & lavée. Comme en général les minerais d'argent sont plus riches ici qu'à Freyberg, on fait en sorte que le plomb ou œuvre qui provient de cette fonte tienne au moins deux ou trois marcs par quintal; si les minerais sont très-riches, il en tient jusqu'à 12 marcs.

Après avoir chargé le fourneau de charbon & d'un peu de scories pour l'échauffer & y former le nez, l'on fond les durillons d'une précédente fonte, qui s'étoient attachés à la brasque & aux parois du fourneau, auxquels l'on ajoute environ 130 livres de plomb le plus pauvre en argent; ensuite l'on charge du mélange; lorsque la fonte va bien, chaque charge a lieu toutes les demi-heures, chacune de ces charges est composée de cinq petits paniers de charbon de dix à onze livres, chacun faisant 30 à 35 livres, & sur chacun de ces paniers de charbon, on porte 20 à 25 livres du mélange, faisant pour les cinq, 100 à 125 livres, en observant de charger le mélange sur la partie postérieure du fourneau. On a la plus grande attention d'empêcher la flamme de se manifester; aussi-tôt qu'elle paroit, on l'éteint avec un ballet mouillé: l'on fait aller les soufflets doucement.

Le mélange dont nous avons rendu compte, est ordinairement fondu en dix ou douze heures. Alors on fait la percée, afin de faire couler les matières dans le bassin de réception. Aussi-tôt après on nettoie celui de l'avant-foyer & la trace. On charge ensuite du plomb; comme il a été dit, & l'on entame un second mélange. L'on continue la fonte de cette manière, depuis le lundi matin jusqu'au samedi suivant.

Peu de temps après qu'on a fait la percée, on enlève environ deux doigts d'épaisseur de mattes qui nagent à la surface du plomb. Ce sont ces

mattes qui servent d'addition aux mélanges, après avoir été grillées; on en retire aussi un peu de *scories*, qui se trouve entr'elles & le plomb; on puise ensuite ce dernier avec une cuiller, & on le verse dans des moules ronds: ce plomb est très-arsénical, & qui le rend difficile à affiner. L'orqu'on a puise la moitié du plomb du bassin, on en verse un peu dans un creut ou scorificatoire; & dont on fait l'essai, afin de s'assurer de sa teneur en argent.

Les minerais de ce district contiennent en général une grande quantité d'arsenic qui, en se volatilisant, emporte de l'argent dans les cheminées des fourneaux; la poussière qui s'y dépose, contient assez de ce métal pour être ramassée avec soin, & fondue ensuite avec le mélange. On a fait nombre d'épreuves, pour appliquer à ces minerais la méthode la plus avantageuse de les traiter; on a d'abord essayé de les rôtir avant que de les fondre; mais on s'est aperçu d'une diminution d'argent enlevant l'arsenic; on a tenté encore de les fondre crus dans de hauts fourneaux; mais y restant trop long-temps exposés à l'action du feu, l'arsenic s'en volatilisoit & enlevait du fin avec lui, ce qui faisoit le même effet que le grillage. Enfin la méthode de fondre ces minerais dans des petits fourneaux bas en arrolant les charbons, pour empêcher la flamme de s'élever, ainsi que nous l'avons dit, a été reconnue pour la plus avantageuse.

Par l'addition des scories de fer, on présente un fondant qui, en même-temps, absorbe un peu de soufre & d'arsenic, & par le fer en grenailles, un métal qui a une grande affinité avec ces substances volatiles, & qui ne peut s'unir au plomb, qui de son côté a une très-grande analogie avec l'argent, duquel il se fait. On a donc l'avantage en se servant des fourneaux bas, de faire une prompte décomposition du minerai, & d'exposer le moins de temps qu'il est possible à l'action du feu le mixte d'argent & d'arsenic; car aussi-tôt que le mélange arrive devant le vent des soufflets, une partie du fer des scories & de celui qui a été mis en nature, s'unit à l'acide virridique du soufre, & se scorifie avec un peu d'arsenic, une autre partie se mêle au soufre qui n'a pas été décomposé, & forme la matte avec du plomb, de l'argent, un peu de cuivre & du zinc; une autre parties'unit enfin à la plus grande quantité d'arsenic, & forme du *speiss*. Par-là la majeure partie de l'argent se trouvant débarrassée de l'arsenic, & sous sa forme métallique, rencontre le plomb auquel il s'unit, & se précipite avec lui: ce qui s'accorde parfaitement avec les principes.

La précaution que l'on prend de faire agir les soufflets lentement, & de ne point laisser élever la flamme dans la partie supérieure du fourneau, est aussi très-bonne, puisqu'il se volatilise moins d'arsenic, qui s'attache en grande partie aux charbons mouillés, & que celui qui se sublime dans la cheminée ne se trouvant point exposé à un

courant rapide, emporte moins d'argent avec lui.

Toutes les scories qui résultent de la fonte que nous venons de détailler, sont, comme il a été dit, ajoutées aux mélanges, & refondues deux ou trois fois, après quoi elles tiennent encore, depuis un & demi jusqu'à deux gros d'argent par quintal; mais comme l'on ne veut perdre que le moins possible de ce métal, on a imaginé de le concentrer dans un pins petit volume par le bocardage & le lavage.

Ces scories ayant été bocardées, sont lavées 3 ou 4 fois sur une table semblable à celle représentée par les figures H & I de la planche des laveries, elles tiennent alors trois, quatre & cinq onces d'argent par quintal; ces scories lavées sont, ainsi que nous l'avons déjà dit, ajoutées aux mélanges pour la fonte des minerais, elles procurent le double avantage de servir de fondant, & de donner une augmentation d'argent. Il en résulte d'ailleurs très-peu de frais; puisqu'en 24 heures, trois ouvriers peuvent bocarder & laver 24 quintaux de ces scories, qui, réduits à 3, 4 ou 5 quintaux après le lavage, contiennent par quintal, depuis 24 jusqu'à 40 gros d'argent. Il est assez particulier que cet argent, qui est divisé à l'infini, puisse par la lotion se séparer d'une matière vitrifiée. Il y a lieu de croire, qu'il y est enveloppé dans le plomb qui s'y trouve en petites grenailles.

Le plomb d'œuvre résultant de la fonte des minerais d'argent & chargé de ce métal, est affiné à l'ordinaire. Voyez ce procédé au mot LIQUATION; mais comme à Joachimthal ce plomb est arsénical, on jette sur son bain, pendant l'affinage, environ 20 livres de grenailles de fer, qui fixent l'arsenic, & qui dans le moment est converti en scories ou quiURNent le plomb, & que l'on en retire en l'écumant.

1^a la méthode en Saxe d'essayer les minerais pour savoir ce qu'ils contiennent d'argent, est celle de la scorification avec la quantité requise de plomb granulé; & ensuite on passe à la coupelle le bouton de plomb, afin d'en obtenir l'argent.

Les minerais de plomb & de cuivre sont essayés suivant l'ancien usage, c'est-à-dire, en après avoir été suffisamment grillés, ils sont fondus avec du flux noir. Il ne seroit pas permis à un essayeur de pratiquer une autre méthode, qui est employée depuis l'établissement des fonderies royales, parce qu'en suivant les procédés de M. Cellert, on trouveroit plus de métaux dans les minerais, & l'électeur qui les paye suivant le tarif ou taxe qui a été faite d'après l'ancienne manière d'essayer, au lieu d'avoir du bénéfice de l'achat qu'il fait des minerais pour ses fonderies, éprouveroit des pertes.

Vocabulaire des principaux termes employés dans les procédés en grand de la fonte des minerais d'argent.

Affinage des matras dans un fourneau de réverbère.

Amalgame, argent retiré de ses minerais par l'amalgamation avec le mercure.

Argent retiré de ses minerais par la fonte.

Arsenic, comme minéralisateur de l'argent.

Brafque, mélange de charbon & d'argile pilés, mêlés & humectés, dont on prépare les fourneaux.

Fonte erat & fonte des minerais d'argent, sont celles qui ont lieu sans calcination préalable.

Fonte riche, est celle qui se fait des minerais après avoir été grillés, avec addition de matières tenant plomb dont ce métal saisit l'argent.

Grillage, manière de griller les minerais d'argent & les matras.

L'argent, amalgame de l'argent avec le mercure.

Matte, matière réguline, composée de différents métaux, de soufre & quelquefois d'un peu d'arsenic.

Nez, on appelle ainsi des scories qui s'attachent au bout de la tuyère.

Pécée, est l'écoulement des matières fondues du bassin de l'avant-foyer dans celui de réception.

Pignes, on nomme ainsi au Pérou l'argent amalgamé avec le mercure, & dont la surabondance de ce demi-métal a été exprimée.

Pyrites contenant de l'argent, leur traitement aux fonderies, pour en obtenir ce métal.

Scories, parties vitrifiées durant la fonte, & ajoutées comme fondant.

Spécis, substance réguline composée de métaux, demi-métaux, & sur-tout de beaucoup d'arsenic.

Trace, est une rigole faite dans la brafque du fourneau, dans laquelle se rassemble la matière en fusion.

ARGENT. (Pharmacie.) Il en est de ce mot comme de celui *antimoine* pour la pharmacie; l'article chimique contenant tous les faits qui peuvent éclaircir sur la préparation & l'emploi de tous les médicaments qu'on tire de l'argent, l'article pharmaceutique ne doit plus exposer qu'un résumé, une énumération des principales applications des détails chimiques déjà connus à cet art.

1^a. L'argent étant un métal sans saveur & sans odeur, & n'ayant aucune action sur l'économie animale, il seroit à désirer que tous les vases de pharmacie fussent faits avec ce métal, & qu'on ne préparât des médicaments que dans des vaisseaux d'argent. Aussi les laboratoires bien montés sont-ils fournis d'ustensiles faits avec ce métal. Les bassines, les mouilloirs, les bouillottes, les poêlons, les balances, les morriers, les spatules d'argent, sont très-utiles pour la préparation & le mélange des médicaments; il est même nécessaire que la plupart de ces ustensiles soient faits avec de l'argent très-pur, de l'argent de coupelle.

2^a. La même inaltérabilité de l'argent fait qu'on l'emploie en feuilles pour recouvrir les pilules, sur-tout celles qui contiennent des matières très-odorantes & très-séjides. L'enveloppe que ces

feuilles forment autour de ces matières, fait une espèce de rempart qui s'oppose à la volatilisation de la matière odorante, & qui diminue le déagrement que les malades éprouvent en prenant ces espèces de médicamens.

3°. On ne croit plus aujourd'hui que l'argent ait les propriétés cordiale, alexitére, alexipharmique, roborante, &c., qu'on lui attribuoit autrefois ; & si on le met encore dans quelques électuaires, c'est par l'empire de l'habitude & pour conserver à ces médicamens le coup-d'œil agréable & le brillant que ces feuilles leur procurent.

4°. La dissolution nitrique d'argent est la seule combinaison de ce métal qui fournisse une matière utile à la pharmacie ; elle sert à analyser les eaux, à y reconnoître la présence des sels muriatiques ; quelques auteurs ont conseillé l'usage intérieur de cette dissolution, contre des maladies rebelles de la peau & du système lymphatique ; il est cependant difficile de concevoir comment on a osé proposer un pareil médicament à l'intérieur, en raison de son excessive causticité ; en effet cette substance est un poison terrible ; le docteur Suédaur m'a assuré qu'il avoit vu un homme dont la peau étoit devenue noire, & l'épiderme s'étoit enlevé par écailles après avoir fait usage de ce sel à l'intérieur ; on sait que la dissolution nitrique d'argent produit cet effet lorsqu'il en tombe quelques gouttes sur la peau. L'oxide d'argent combiné avec l'acide nitrique est d'une grande causticité ; son union avec l'oxigène le rend extrêmement âcre. Le grand usage de ce sel est donc de servir à brûler les excroissances, les chairs fongueuses, les porreaux, d'exciter l'inflammation & la suppuration. Lorsqu'on veut agir très-promptement avec ce caustique, on l'emploie dans l'état liquide ; cependant il est rare qu'on s'en serve de cette façon ; le plus souvent c'est dans l'état concret & après la fusion qui change le nitrate d'argent en *Pierre infernale*. On met cell.-ci dans des crayons d'or ou d'argent, & le chirurgien touche avec l'extrémité de ces crayons les points qu'il veut cautériser. Cette cautérisation est une véritable combustion ; elle est due à la décomposition de l'oxide d'argent & au transport de son oxigène sur la matière animale ; aussi après l'action de ce médicament voit-on l'argent en lame brillante & métallique. Beaucoup de caustiques minéraux agissent par le même principe.

5°. Pourroit-on croire que Boyle a proposé l'usage intérieur du nitrate d'argent sous forme sèche ? A la vérité il faisoit évaporer la dissolution nitrique d'argent avec une dissolution de nitrate de potasse, en sorte que le produit sec de cette évaporation étoit un mélange de nitrate d'argent avec du nitrate de potasse. En quelque dose que soit ce dernier, il ne détruit ni même ne modère l'action délétère du nitrate d'argent, & l'on ne doit pas se permettre d'employer ce remède à l'intérieur.

ARGENT VIF. C'est un des noms du mercure. *Voyez* ce mot.

ARGENT CORNÉ. Dénomination donnée au muriate d'argent, parce que par la fusion il prend, a-t-on dit, l'apparence, la couleur & la demi-transparence de la corne. Ces noms, donnés par analogie, sont la plupart très-mauvais, parce que les ressemblances sont fort éloignées. *Voyez* le mot ARGENT.

ARGENT DE COUPELLE. On nomme ainsi de l'argent très-pur, parce qu'on croit qu'après l'opération de la coupellation, ce métal a perdu tous les métaux étrangers qu'il pouvoit contenir. Mais cela n'est pas toujours parfaitement exact, il reste souvent un peu de cuivre ou de plomb, & même un peu d'or dans de l'argent coupelle. Les alchimistes pensent que le seul argent bien pur qu'ils aient, est celui qu'on obtient du muriate d'argent décomposé par les alcalis. Ils le nommoient, il y a quelques années, argent revivifié de la lune cornée. C'est celui qu'il faut employer dans les expériences exactes de chimie. *Voyez* ARGENT.

ARGENT GRIS. Nom d'une mine d'argent formée de ce métal depuis 16 jusqu'à $\frac{1}{100}$, uni au soufre, à l'arsénic, au fer & au cuivre. *Voyez* l'article ARGENT.

ARGENT FULMINANT. C'est sous ce nom que M. Berthollet a fait connoître d'abord l'oxide d'argent ammoniacal, qui a la propriété très-remarquable de fulminer par le moindre frottement, par le plus léger contact. *Voyez* les mots ARGENTATE ET ARGENTITE.

ARGENT NATIF. On appelle, en minéralogie, argent natif, ce métal existant dans la terre sous la forme métallique. *Voyez* le mot ARGENT.

ARGENT PHILOSOPHIQUE. C'étoit ainsi que les alchimistes désignoient l'argent qu'ils croyoient produire, faire entièrement dans leurs expériences, soit que ce fût du plomb, soit que ce fût du mercure qu'ils eussent prétendu convertir en argent. Ils avoient, en même-temps, la prétention que cet argent étoit parfaitement pur, & même d'un titre plus haut que celui de la nature, qui étoit purifié. Outre qu'on ne s'avoit pas ce que vouloit dire cette dernière prétention, il n'a jamais été prouvé qu'on ait fait de l'argent, & conséquemment, qu'il ait existé de l'argent philosophique.

ARGENT ROUGE. L'argent rouge, ainsi nommé cause de sa couleur, est une espèce de mine de ce métal, dans laquelle il est combiné à ce qu'il paroît, en état d'oxide avec le soufre & l'arsénic. Quelques minéralogistes croient que

l'arsenic y est à l'état d'acide. *Voyez* le mot ARGENT.

ARGENT SULFURÉ. L'argent combiné au soufre doit porter le nom d'argent sulfuré; c'est aussi sous ce nom que cette combinaison a été indiquée à l'article de l'ARGENT. *Voyez* ce mot.

ARGENT VIERGE. C'est le nom très-impropre que les minéralogistes ont donné à l'argent natif, parce qu'ils le croyoient très-pur; mais on sait que cet argent est mêlé de différentes substances métalliques de cuivre & d'or; dans ce sens, il n'est donc pas vierge. *Voyez* le mot ARGENT.

ARGENT VITREUX. On connoît, en minéralogie, sous le nom d'argent vitreux, une mine d'argent sulfuré, très-riche en métal, qui se coupe facilement, &c. *Voyez* l'article de l'ARGENT.

ARGENTATE. J'ai donné dans les détails de l'article *argent*, les principales raisons qui pourroient déterminer l'usage du mot *argentate*; elles sont fondées sur l'état de l'oxide d'argent dans sa combinaison avec l'ammoniaque, sur le rôle d'acide qu'il paroît y jouer, mais en supposant même qu'il réunisse comme d'autres oxides métalliques, la double fonction d'acide & d'alcali, il seroit plus d'accord avec les principes de la nomenclature moderne de nommer ces combinaisons *argentites*. *Voyez* le mot ARGENTATE AMMONIACAL.

ARGENTATE AMMONIACAL. Il est facile de voir, d'après l'article précédent, que le nom d'*argentate ammoniacal* devoit être donné à la combinaison fulminante de l'oxide d'argent avec l'ammoniaque, si l'on prouvoit que cet oxide fait fonction d'acide dans cette singulière combinaison. Peut-être aussi le nom d'*argentite ammoniacal* lui conviendrait-il davantage dans cette manière de la considérer, puisqu'en supposant l'oxide d'argent comme y faisant fonction d'acide, cet acide seroit toujours très-foible, & beaucoup plus analogue à ceux dont la dénomination est terminée en *aux*, dans la nomenclature actuelle, qu'à ceux dont les noms ont la terminaison en *ique*. *Voyez* ci-après le mot ARGENTITE.

ARGENTITE. L'oxide d'argent uni aux alcalis, & sur-tout à l'ammoniaque, à la manière d'un acide, ne peut ressembler dans ces compositions qu'aux acides foibles, puisqu'il n'a point de saveur aigre ni d'action sur les couleurs bleues, puisque d'ailleurs il paroît être séparé des bases terreuses & alcalines par tous les acides connus. Telle est la raison pour laquelle je pense, qu'en adoptant les règles de la nomenclature méthodique, on devroit désigner par le nom d'*argen-*

te la combinaison saline de l'oxide d'argent avec les alcalis, & sur-tout son union avec l'ammoniaque, qui forme l'argent fulminant, & qui seroit très-convenablement nommé *argentite ammoniacal*. *Voyez* le mot ARGENT.

ARGENTINE. (*Pharmacie.*) *Potentilla anserina*. L. *anserina*. Tab 343. L'argentine est une plante vivace, rampante, indigène & commune dans toute l'Europe. On la trouve sur le bord des chemins & des fossés. Les feuilles doivent être séchées avec précaution. Les pharmacologites assurent que, prises en décoction, elles sont astringentes, vulnéraires, détersives, rafraichissantes, apéritives, diurétiques, fébrifuges, ophtalmiques, odontalgiques; cosmétiques propres, contre la diarrée, la dysenterie, les obstructions, la jaunisse, l'hémoptisie, les hémorragies, les fleurs-blanches, les mois abondans, les hémorroïdes, le scorbut, les hernies, les fluxions, la lucte relâchée, l'empyème, les calculs, les ulcères, le sang coagulé. Les feuilles récentes d'argentine sont à préférer aux seches. Rosenstein rapporte avoir guéri des phisiques, en leur faisant prendre pendant plusieurs semaines, deux livres de décoction d'argentine par jour. Le suc a les mêmes vertus. Nous reconnoissons une propriété spécifique aux feuilles d'argentine récentes; piles & appliquées sur les cuisses écorchées du cavalier inexpérimenté, ce topique guérit sous peu de jours ces excorations. Il en est de même des ampons qui se forment à la plante des pieds du fantassin. L'eau distillée est bonne pour la chasie, le hâle & les rougeurs du visage. L'argentine entre dans la décoction astringente de la pharmacopée de Paris; elle est rangée, par les Ecois, avec les plantes potagères. Le betail, les oies, les canards, la mangent; elle sert au tan. La racine pourroit être mangée en temps de disette; elle est douce comme celle du panais; elle est recherchée des porcs; elle offre, ainsi que les semences, plusieurs propriétés des feuilles.

Les botanistes ont remarqué que les feuilles de cette plante devenoient soyeuses dans les terrains argileux, & vertes dans un sol sablonneux.

(M. WILLEMET).

ARGILE. Le mot argile étoit employé avant la nomenclature chimique moderne, pour désigner non-seulement la matière terreuse naturelle qui happe à la langue, qui fait pâte avec l'eau, qui se cuit & se durcit au feu, mais encore pour nommer la terre base de l'alun, qu'on appelloit alors argile pure; cette expression parut très-juste alors, parce qu'on venoit de connoître que l'argile naturelle-formoit toujours de l'alun avec l'acide sulfurique, & que la terre précipitée de ce sel par un alcali fixe, présentoit toutes les propriétés de l'argile naturelle dans un très-haut degré. Mais depuis que la terre base de l'alun, a été nommée alumine, & qu'on a bien reconnu que cette terre

n'est jamais pure dans la terre, & qu'elle est au contraire toujours mêlée de silice, de carbonate de chaux, & d'oxide métallique, il est convenu de réserver le nom d'argile à ces terres qui de leur essence sont mélangées. C'n voit donc que le mot argile ne doit presque plus être employé qu'au pluriel, pour désigner une collection de terres qui diffèrent les unes des autres par leur nature intime, quoiqu'elles se rapprochent par leurs principales propriétés.

Le caractère générique des terres argileuses ou des argiles, doit être tiré de quelques-unes des propriétés qui distinguent l'alumine & qu'elle communique aux argiles, doit elle fait la base. Ainsi toutes les argiles sont douces au toucher & comme grasses quand elles sont sèches; leur tissu est très-fin; elles s'attachent à la peau; elles happent à la langue; elles absorbent fortement l'eau & font une pâte avec ce liquide.

Lorsqu'on les chauffe, elles se durcissent & se cuisent. C'n les trouve disposées par couches ou par lits dans l'intérieur de la terre; elles y conservent presque toujours l'humidité & le liant, de sorte qu'on les taille & qu'on les coupe très-facilement. Enlevées de leur carrière, de leur gîte, & exposées à l'air, elles se dessèchent & perdent peu-à-peu l'eau qu'elles contenoient. Si ce dessèchement a lieu dans de grandes hausses d'argiles ou de glaises, dont les bancs sont quelquefois découverts, soit par les éboulemens naturels & successifs des montagnes, soit par les ravaux, les percemens, les creusemens que les hommes y pratiquent, elles se fendent, elles se cassent suivant leur longueur en espèces de risées à trois, quatre ou cinq faces, qui imitent les basaltes; on y trouve même quelquefois des espèces d'articulations. Souvent les argiles détrempees par les eaux se moulent en se déposant dans des cavités, abandonnées par des cristaux pierreux ou salins, dans des coquilles, dans des matières organiques, dont elles représentent & conservent les formes; de-là l'origine des argiles heureuses qu'on trouve si fréquemment dans les collections. Quand elles sont déposées en couches peu épaisses, elles forment des espèces de feuillettes qui se séparent facilement les uns des autres, & elles ont en général une grande disposition à se feuilléter. Tels sont en général les caractères extérieurs des argiles.

Mais les chimistes ne doivent pas se contenter de ces simples observations; l'analyse des argiles, l'examen des différentes matières qui les constituent, doivent les intéresser. Il ne suffit même pas de savoir que l'alumine qui fait la base des argiles, y est combinée avec l'acide carbonique, mêlée de silice en faible plus ou moins fin ou grossier, de mica en fragmens plus ou moins gros, de carbonate de chaux & de magnésie, d'oxide de fer en différens états d'oxidation, de bitumes plus ou moins bruns ou noirs, de sulfures métalliques, & sur-tout de sulfure de fer. Ce n'est pas assez

d'exposer ainsi les résultats des analyses qu'on a faites jusqu'ici sur ces terres mélangées ou composées, il faut encore faire connoître la route qu'on a suivie pour faire ces analyses; il faut décrire & les agens qu'on a employés pour y recourir, & la manière dont on les a employés. En général on a traité par deux moyens les argiles dont on a fait l'analyse; savoir le lavage par l'eau & l'action des acides. Le premier de ces moyens sert à séparer les substances qui ne sont que mêlées à l'alumine, & qui, par leur volume & leur poids, ainsi que par leur peu d'adhérence pour ce fluide, tendent à se déposer promptement au fond des vases où l'on fait cette espèce de lavage. Te's sont les grains de sable, les fragmens de carbonate de chaux, les lames de mica, les cristaux pyriteux, & toutes les matières étrangères en quelque sorte à l'alumine & qui ne sont que mêlées, qu'interposées entre les molécules de cette terre. A mesure que ces corps étrangers se précipitent suivant le rapport de leur pesanteur, de leur volume, & sur tout de leur adhérence pour l'eau, on les sépare les uns des autres, & lorsque cette séparation est assez exacte, ce qu'on n'obtient que par plusieurs opérations successives faites avec tous les soins convenables, on les pèse & on en détermine la nature. L'alumine, qui reste la dernière suspendue dans l'eau, est ensuite recueillie à part; on la laisse se déposer lentement. Elle ne contenoit que les corps étrangers disséminés ou mélangés entre ses molécules. L'analyse est faite après cette opération, & l'alumine fort blanche, fine & pure de ces lavages. Mais le plus souvent il n'en est point ainsi; l'alumine bien lavée retient encore les parties les plus atténuées de silice, d'oxides métalliques & de bitume; ces deux dernières substances paroissent même être intimement combinées avec la terre alumineuse, & on ne peut les en séparer que par l'action des acides. Ainsi après avoir bien lavé une argile & en avoir obtenu à part les plus gros fragmens de sable, de mica, de pyrite, &c., qui lui étoient mêlés, il faut la traiter par la calcination; si elle est colorée en brun ou en noir, & en brûler le bitume; si elle n'est pas bitumineuse, il faut la traiter par les acides. Les trois acides minéraux, les plus communément employés dans les laboratoires de chimie, l'acide sulfurique, l'acide nitrique & l'acide muriatique, ont chacun leurs avantages & leur usage différent dans cette espèce d'analyse. L'acide nitrique foible employé le premier, dissout le carbonate de chaux & de magnésie; il ne touche que difficilement à l'alumine; il l'oxide le fer plus qu'il ne l'est ordinairement dans les terres, & il le rend insoluble par d'autres acides que le muriatique. Après l'action de l'acide nitrique, on lave l'argile, on la pèse, & on la soumet à l'action de l'acide sulfurique; celui-ci dissout peu-à-peu l'alumine, & ne laisse que l'oxide de fer & les portions de silice & de mica que le lavage n'a pas pu enlever;

emporter ; il faut employer une grande quantité d'acide sulfurique à un grand nombre de reprises différentes, pour enlever ainsi toute l'alumine. On doit même remarquer, à cette occasion ; que si l'on faisoit tremper l'argile entière telle qu'elle est dans l'état naturel dans l'acide sulfurique, il faudroit une action de plusieurs mois pour que l'analyse en fût faite, tandis qu'après avoir été divisée par la trituration & le lavage, & séparée par le dernier de la silice qui en recouvre les molécules, elle devient infiniment plus attaquable par les acides, que dans son premier état. C'est en raison de cette différence de dissolubilité qu'on voit dans quelques laboratoires où l'on se livre à ces analyses lentes des argiles & des pierres, qui sont presque spontanées, ces substances séjourner pendant des années entières dans l'acide sulfurique, sans perdre sensiblement de leur forme & de leurs propriétés, & ne donner leur alumine toute entière qu'après un temps considérable. Lorsque les argiles ont perdu toute leur alumine, on emploie avec succès l'acide muriatique pour dissoudre l'oxide de fer qu'elles contenoient ; il enlève aussi les dernières portions de carbonate de chaux & de magnésie qui ont échappé à l'action des premiers acides, & il ne reste plus que la silice & le mica.

En rappelant ici que les terres infusibles par elles-mêmes, & lorsqu'elles sont isolées, deviennent d'autant plus fusibles qu'elles sont plus mélangées, on concevra facilement comment la plupart des argiles qui contiennent de la silice, du carbonate de chaux & de l'oxide de fer unis à l'alumine, sont susceptibles de se fondre & de se vitrifier. On reconnoît la vérité de cette assertion dans les tuiles, les briques, & toutes les poteries communes qui, faites avec des argiles mélangées & non purifiées, éprouvent dans les feux de nos fourneaux des vitrifications plus ou moins avancées, & présentent même à leur surface des larmes de verre formées dans la partie la plus chauffée des fours où on les a cuites. Il faut donc nettoyer avec d'autant plus de soin les argiles même les plus pures que présente la nature, qu'on en les destine à la fabrication de vaisseaux plus précieux & plus réfractaires. Un simple mélange d'alumine & de sable est propre à fabriquer les creusets, les pots de verrerie, &c. mais si le carbonate de chaux est ajouté au premier mélange, il n'est plus susceptible de servir aux mêmes usages, & il devient trop fusible, alors il ne peut être employé que pour faire des poteries communes, qui ne doivent être exposées qu'à un feu modéré. Les fragmens de sulfure de fer ou pyrite, que les potiers de terre nomment *fermine*, sont plus nuisibles encore à la fabrication des poteries, que le mélange des matières calcaires, en déterminant plus promptement la fusion des argiles ; aussi les potiers ont-ils grand soin de retirer ces substances de la terre

Chimie. Tome II.

qu'ils emploient, mais aucune poterie n'exige autant de choix & autant de préparation que les porcelaines. (*Voyez ce mot*).

Les argiles servent souvent dans les laboratoires de chimie ; celle qu'on nomme terre à four, & qui contient de la silice très-fine & de l'oxide de fer jaune, est employée pour réunir les couvercles des creusets, pour boucher les joints des fourneaux, des mouffes, &c. pour lutter les cornues de verre ; on la bat, après l'avoir passée au tamis fin, avec de l'huile de lin qu'on pour préparer le lut gras. (*Voyez les mots LUTS & LUTTER.*)

Les argiles impures & marbrées des environs de Paris, celles sur-tout que l'on retire de la gâisière de Gentilly, sont employées pour la décomposition du nitre par les distillateurs d'aux-tores. Les portions de sulfure de fer & d'oxide de ce métal qu'elles contiennent, réagissent sur l'acide nitrique, & en convertissent une partie en acide nitreux ; ce qu'ils recherchent, en raison des vapeurs jaunes que répand alors l'eau-forte, & qui la font regarder comme plus concentrée. Après que ces argiles ont servi à cette opération, elles sont en fragmens rouges, durs, presque siliceux, & deviennent susceptibles de se durcir singulièrement avec de la chaux ; on les emploie pour la construction des bassins, des terrasses, pour réunir les joints des pierres ; sous le nom de ciment des ajillateurs d'aux-tores.

À ces généralités sur les argiles, j'ajouterais un extrait des principaux détails sur ces terres, insérés dans le dictionnaire de chimie, par Macquer, qui a fait un travail suivi sur ces terres, en y joignant quelques additions relatives à l'état actuel de la science, & en substituant la nomenclature moderne à celle que cet illustre chimiste employoit lorsqu'il a rédigé son ouvrage.

Les argiles naturelles, suivant Macquer, possèdent plus ou moins des propriétés de l'alumine, à proportion qu'elles ont plus ou moins été altérées par des mélanges de matières hétérogènes.

Comme les argiles sont d'une grande utilité dans la chimie, dans les arts, & pour les usages de la vie, il est très-important de savoir distinguer les plus pures & les meilleures, de connoître les endroits où l'on en peut trouver, & d'avoir les moyens de purifier celles qui ont besoin de l'être, c'est pourquoi on va faire mention ici de ce qu'il y a de plus essentiel à connoître sur ces différents objets.

On reconnoît facilement les argiles les plus pures, au moyen des propriétés générales décrites à l'article ALUMINE, & retracées au commencement de cet article. Plus l'argile naturelle possédera ces propriétés, & plus on peut être assuré qu'elle est pure.

Les substances qui altèrent la pureté des argiles naturelles sont le sable & le quartz, le mica, E &c

les matières bitumineuses, l'acide sulfurique, les oxides métalliques, les matières pyriteuses ou les sulfures métalliques, les matières calcaires ou le carbonate de chaux, & le gypse ou sulfate de chaux; on juge d'après cela, combien peuvent être nombreuses les variétés des argiles dont la distinction doit, en général, être fondée sur ces différentes substances additionnelles à l'alumine qui en fait la base, aussi rien n'est-il plus multiplié dans les descriptions minéralogiques que les espèces d'argiles, qu'on ne doit cependant regarder que comme des variétés.

Les matières bitumineuses altèrent, en général, la couleur de l'argile, qui, quand elle est pure, doit être blanche; il en est de même des oxides métalliques colorés, tels que sont singulièrement ceux du cuivre & du fer, & de tous les sulfures métalliques. L'argile qui n'est colorée que par une matière inflammable non métallique, perd cette couleur, & devient plus ou moins grise ou blanche lorsqu'on l'expose au feu, & qu'on la calcine avec le concours de l'air libre. Telles sont la plupart des argiles grises & brunes, d'une couleur uniforme, & qui ne sont point veinées ou tachées.

Il n'en est pas de même de celles qui sont colorées par des matières pyriteuses, & par les oxides de cuivre & de fer. Ces sortes d'argiles ne deviennent jamais blanches au feu, tant qu'elles ne sont pas exactement dépouillées de ces oxides métalliques.

Si ces substances hétérogènes sont en une certaine quantité dans l'argile, elles la rendent fusible. On reconnoît ces argiles fusibles à leurs couleurs, qui sont jaunes, rouges, vertes ou veinées & marbrées de toutes ces nuances: ces argiles sont les plus mauvaises de toutes, pour tous les usensibles qui doivent soutenir l'action d'un feu fort, tels que sont les vaisseaux chimiques & les briques, les creusets & les pots de verrerie.

Il est à remarquer à ce sujet, que les argiles naturelles, même les plus pures, ne sont jamais absolument exemptes du mélange de quelques parties d'oxides métalliques, sur-tout de celui du fer. Macquer, qui nous fournit ces détails, en avoit examiné plus de huit cent espèces différentes, & il n'en avoit point trouvé une seule dans cette grande quantité, même parmi les plus blanches & les plus nettes, qui fût absolument pure à cet égard; mais lorsque l'oxide ferrugineux n'est dans les argiles qu'en petite quantité, qu'il n'est point intimement mêlé dans toute la masse de l'argile, ce que l'on reconnoît à la beauté & à la pureté de son blanc, & que cet oxide ferrugineux ne se trouve, comme cela est ordinaire dans ces belles argiles, que dans des petites places dispersées de côtés & d'autres, sous la forme de taches jaunes, ces sortes d'argiles doivent être

regardées comme très-bonnes. Le seul moyen de pratique qu'il y ait de séparer ces parties ferrugineuses, c'est de casser l'argile en petits morceaux, & d'enlever exactement toutes ces taches jaunes avec un couteau. Il est très-essentiel d'épucher ainsi ces argiles avant de les délayer dans l'eau, parce que l'oxide de fer ne peut point se séparer par le lavage, & qu'il ne fait que se mêler plus exactement & plus intimement avec l'argile.

Les parties pyriteuses, le mica & le fable grossier qui se trouvent mêlés en plus ou moins grande quantité dans beaucoup d'argiles, le rendent maigres, & diminuent leur ductilité. On purge facilement les argiles de la plus grande partie de ces substances hétérogènes par le moyen du lavage; il consiste à bien délayer l'argile dans une grande quantité d'eau pure, à laisser ensuite déposer cette eau jusqu'à ce qu'elle ne reste plus troublée que par les parties les plus fines & les plus légères. On la décante après cela de dessus le sédiment, en la passant dans un tamis de soie très-fin; le second dépôt qui se forme au fond de cette eau ainsi tamisée, est la portion la plus argileuse & la plus pure; on doit la recueillir & la sécher avec soin & propreté. Cette purification des argiles par le lavage est très-essentielle quand on veut en faire de bonnes poteries, & sur-tout de la *porcelaine*.

Les matières sulfureuses métalliques ou pyriteuses qui se trouvent dans les argiles, les font fondre avec la plus grande facilité. Une parcelle de pyrite ne manque jamais de former dans l'argile qu'on expose à un feu capable de la bien cuire, une cavité ou un trou proportionné à sa grosseur, & enduit d'une couleur noire plombée.

Le lavage à l'eau fait exactement, est un moyen suffisant pour séparer d'avec une argile les plus petites parties de pyrite, parce que ces parties ont essentiellement une pesanteur spécifique beaucoup plus grande que celle de l'argile; mais il n'en est pas de même du fable & du mica. Macquer a fait voir dans son mémoire sur les argiles, que le lavage le plus exact est insuffisant pour séparer en entier les parties sableuses que contiennent ces terres, parce qu'il n'y a aucune argile naturelle qui ne contienne une quantité, quelquefois même très-considérable, de fable aussi atténué, aussi fin, & aussi léger que l'argile même.

Il en est de même du mica pour les argiles micacées, mais ces parties de fable & de mica, que le lavage ne peut séparer, ne font aucun tort aux ouvrages qu'on fait avec les argiles; au contraire, elles les empêchent de contracter des fentes soit en séchant, soit à la cuite.

Les molécules de terre calcaire ou carbonate de chaux qui altèrent aussi la pureté de beaucoup

d'argiles naturelles, se reconnoissent très-facilement par l'effervescence qu'elles font avec les acides, & sur-tout avec l'acide nitrique. Cette espèce de sel terreux ne peut point se séparer des argiles par le lavage, à cause de la finesse & de la légèreté des parties : lorsqu'il est en certaine quantité, il rend toujours l'argile fusible, à cause des parties de sables inséparables de celles de l'alumine qui s'y rencontrent; de-là il suit que toutes les argiles calcaires doivent être réputées mauvaises pour tous les usensibles qui doivent fournir l'action d'un feu violent.

Enfin l'acide sulfurique qui paroît avoir été distribué & combiné d'une manière singulière par la nature dans toutes les argiles, peut en être séparé par le moyen de la digestion de l'argile dans une liqueur alcaline, & ensuite en édulcorant cette même argile avec une suffisante quantité d'eau; mais cette purification des argiles n'est point nécessaire pour la plupart des usages auxquels on peut employer ces terres, parce que cet acide n'y fait aucun tort.

En désignant ainsi la présence de l'acide sulfurique dans les argiles, j'ajouterai à cet énoncé de Macquer, 1°. que l'origine de cet acide est manifestement due au soufre & aux pyrites que les argiles pures contiennent presque toutes, & qui y éprouvent tôt ou tard une combustion; 2°. que les argiles en contiennent une si petite quantité, qu'il ne peut pas nuire aux ouvrages auxquels on les destine; 3°. qu'il suffit de les laisser remper quelque temps dans l'eau pour les débarrasser de l'acide sulfurique; 4°. qu'enfin, comme cet acide, lorsqu'il y existe depuis quelque temps, forme du sulfate d'alumine bien neutre, ou de l'*alun saturé de sa terre*, ce sel étant peu soluble & peu dissoluble, ne porte point d'altération sensible dans les arts où on les emploie.

Il est aisé de sentir que toutes les matières étrangères dont on vient de parler, se trouvant naturellement mélangées avec l'argile, ou seules ou plusieurs ensemble, ou toutes à-la-fois, & dans toutes sortes de proportions, doivent occasionner la plus grande variété dans les argiles naturelles: c'est aussi ce qu'on observe. Il n'est point de terre aussi diversifiée dans toutes ses espèces, c'est sans doute cette grande variété qui a fait multiplier les dénominations des différentes espèces d'argiles.

Quelques naturalistes & physiciens semblent même tirer une différence entre ce qui s'appelle argile, & ce qui porte le nom de *glaise* ou *terre glaise*; mais il n'y a aucune unanimité sur le sens précis de ces dénominations, ainsi il paroît qu'on peut les regarder comme synonymes, & s'en servir indifféremment.

Les terres qu'on nomme *bols*, *terres bolaires* & *terres sigillées*, sont de véritables argiles; mais il paroît qu'on a affecté singulièrement ces noms à celles qui s'attachent le plus fortement à la

langue, de même qu'à certaines argiles complées d'une grande quantité d'oxide ferrugineux, qui les colore d'une manière uniforme en jaune ou en rouge.

Un grand nombre d'argiles portent des noms relatifs aux usages auxquels on les emploie; telles sont celles qu'on nomme *terres à digraffer*, *terres à fouler*, *terres à ruiles*, *terres à four*, *terres à briques*, *terres à potier*, *terres à pipe*, *terres à fayence*, *terres à porcelaine*.

Les terres qu'on appelle *marnes*, ayant pour caractère de se bien délayer dans l'eau, d'avoir un certain degré de liant, de faire effervescence avec l'acide nitrique, & de se fondre lorsqu'on les pousse au grand feu, semblent n'être autre chose que des argiles plus ou moins sableuses & mêlées de beaucoup de terre calcaire.

Enfin on a donné aussi à beaucoup d'argiles des épithètes qui indiquent leur couleur, comme *argiles blanches*, *argiles grises*, *argiles bleues*, &c.

Mais toutes ces dénominations ne donnent que fort peu, ou même point du tout, de connoissance sur la vraie nature des différentes argiles naturelles. Ne seroit-il pas plus avantageux d'examiner d'une manière plus particulière, & sur-tout par des épreuves chimiques, quelles sont les matières hétérogènes, dont le mélange altère, dans les différentes argiles naturelles, la pureté de l'alumine à laquelle elles doivent tout ce qu'elles ont de propriétés argileuses, & de leur donner des noms qui indiquassent ces matières hétérogènes, ou du moins celles d'entr'elles qui dominent, en y joignant, si l'on vouloit, la couleur de l'argile. Dans ce plan de nomenclature, on auroit les *argiles blanches*, *sableuses*, *micacées* ou *calcaires*, *rouges*, *ferrugineuses*, *les argiles noires*, *bitumineuses*, &c.

L'objet de cet ouvrage n'étant point d'entrer dans les détails de l'histoire naturelle, on ne dira rien de plus sur ce sujet. Ce qui a été exposé à l'article *alumine* sur les propriétés de cette terre pure, & sur les différentes substances dont le mélange altère sa pureté, & déguise plus ou moins ses propriétés dans les argiles naturelles, suffit pour donner une idée des lumières que la chimie peut répandre dans l'histoire naturelle des minéraux, & spécialement dans celle des terres & des pierres.

Comme les argiles naturelles les plus pures, les plus réfractaires & les plus propres par conséquent à un grand nombre d'usages très-essentiels dans la chimie & dans les arts, ne sont connues, pour ainsi dire, que de ceux qui les emploient, on croit que les amateurs de la chimie, & ceux qui s'intéressent aux progrès des arts, verront ici avec plaisir une courte énumération des meilleures argiles de France, avec l'indication des endroits où elles se trouvent, tirées du mémoire de Macquer sur les argiles, (acad. 1758), & de l'article de son dictionnaire de chimie.

1°. On tire des environs de Gournai & de Gisors en Normandie, une argile d'un gris brun,

E e e

d'un très-grand liant, parce qu'elle ne contient presque pas de sable grossier. Elle résiste au feu le plus violent, sans donner le moindre signe de fusion. Cette argile, lorsqu'elle est exposée seule à l'action d'un feu médiocre, perd sa couleur, & y devient assez blanche; mais lorsqu'elle est poussée à un feu capable de la cuire complètement; c'est-à-dire, de la rendre dure comme un caillou, elle prend une forte teinte de roux.

Il paroît qu'en général toutes les argiles blanches ou colorées conservent leur blanc, ou en acquièrent, lorsqu'elles ne sont calcinées qu'à un feu médiocre avec le concours de l'air libre; mais qu'il n'y en a point qui ne perdent ensuite d'autant plus de leur blanc, qu'on les calcine & qu'on les chauffe plus fortement.

Cette argile de Comnay, en vertu de sa qualité réfractaire, peut très-bien servir pour les fours & pots de verrerie, & est effectivement employée à cet usage dans une grande verrerie. Celle avec laquelle on fait les pots, doit être épluchée, pour en séparer quelques parties de terre ferrugineuse, jaune, dispersées çà & là dans la substance.

20. Le territoire de Montreau-sur-Yonne & des environs, est rempli d'une grande quantité de bancs d'argiles de différentes nuances de gris, dont la plupart sont très-bonnes, peu sableuses, très-liantes & très-réfractaires. Ces argiles se comportent au feu, à-peu-près comme celle de Gournai dont il vient d'être question. La meilleure & la plus pure de toutes celles de ce canton se tire d'une grande fouille sur le chemin & à la montagne de Morêt. Cette argile, dans la fouille même, & lorsqu'elle est humide, est d'une couleur si rembrunie, qu'elle paroît toute noire. Elle perd à un feu médiocre toute cette couleur, & y devient d'un fort beau blanc. On en fabrique de jolies poteries de terre blanche & fine, façon d'Angleterre, à Montreau même, & encore plus à Paris, à la manufacture du Pont-aux-choux. On épluche & on lave cette argile dans ces manufactures, avant de l'employer.

30. Il y a au village de Savigny en Picardie, à quatre lieues de Beauvais, des bancs considérables d'une argile grise, liante, peu sableuse, avec laquelle les habitants de ce village, qui sont presque tous potiers, fabriquent les poteries de terre commune, cuite en grès & sans couverte, dont on se sert à Paris & autres lieux. Cette terre blanchit peu au grand feu; elle y résiste assez bien. Cependant lorsqu'elle est trop chauffée, il se forme de grandes amoncelles à sa surface, & elle se sépare en feuillets, sans néanmoins que cela ait l'apparence d'un commencement de fusion. Quand cet accident arrive, les ouvriers qui la travaillent, disent qu'elle est brûlée.

Cn ne se donne pas la peine de l'éplucher exactement ni de la laver pour ces poteries communes & à bas prix; aussi y a-t-il beaucoup de pièces tachées & trouées.

40. On trouve aux environs de Maubeuge, une argile gris-blanc, bonne, liante & bien réfractaire, qui ne change point de couleur au grand feu, cui s'y cuit très-dure & très-serrée; c'est celle avec laquelle on fait les poteries de toli grès fin de Landres, qui ont une couverte saline, & qui sont ordinairement ornées de peintures en bleu de safre.

50. On peut mettre aussi au nombre des bonnes argiles, une argile grise de Vilenraut, près de Montmirail, qui sert aux creusiers de cuculons verreries; une grise aussi, de la Bellière en Normandie, employée autrefois aux pots & fours de la glacerie de Saint-Gubin; une argile blanche de Sully en Picardie, dans le voisinage de Saint-Cnbin, que l'on a substituée depuis quelque temps à la terre de la Bellière, dans la même manufacture. M. Dantic, docteur en médecine, correspondant de l'académie des sciences, qui a remporté le prix de cette académie sur la verrerie, fait mention de ces deux dernières argiles dans ses mémoires. Cn peut regarder en général comme très-bonnes toutes les argiles employées pour les pots de verreries, parce qu'il faut que ces vases résistent à l'action d'un feu très-violent, sans aucune interruption pendant plusieurs mois, en contenant de plus une matière très-fonlante telle que le verre.

60. A l'égard des argiles bien blanches, nettes & pures, elles sont encore beaucoup plus communes que les grises. J'ai cité pour exemple de ces sortes de terre une argile blanche des environs de Chateaudun, qui entre dans la composition d'une porcelaine qu'on fait à Orléans.

70. Une autre argile blanche, qui n'est point encore connue ni employée, est celle que j'ai fait venir des environs du Port-Louis en Bretagne, où il y en a de très-grands bancs. Cette argile est d'une blancheur admirable; elle est mêlée naturellement de beaucoup de gros & de menu sable quartz, & d'une grande quantité d'un beau mica blanc, & parsemée de quelques raies jaunes, ferrugineuses, qu'il faut absolument enlever avant de la laver: elle est assez liante, quand elle est séparée de la plus grande partie de ces matières étrangères par un lavage exact; elle est bien réfractaire & demande une chaleur très-forte, pour se cuire au point de faire beaucoup de feu avec l'acier; elle perd, quand elle est cuite à ce point, beaucoup de son blanc; comme toutes les autres, & devient un peu transparente. J'ai fait faire avec cette argile toute seule des poteries de terre fine, d'un blanc passable, qui ressemblent beaucoup à la vraie terre blanche d'Angleterre; mais cette terre a l'inconvénient de se rider d'une manière désagréable à sa surface en se cuisant.

Tels sont les détails que donne Marquet sur les principales espèces d'argiles pures de France qui à eu occasion d'examiner, & que j'ai cru devoir consigner dans cet ouvrage. Cn en trouvera plusieurs autres également intéressans aux artistes

CREUSET, FUSION, PORCELAINE, POTERIES, TERRES, VITRIFICATION, &c.

Macquer donne dans son article ARGILE, à la suite des résultats généraux que j'ai empruntés de cet ouvrage, un exposé des théories qui régnoient il y a trente ans sur la nature des argiles, & sur-tout de celle de M. Baumé qui regardoit ces terres comme de la terre vitrifiable ou de la silice altérée par l'acide sulfurique. Comme cette théorie, que Macquer combat même dans l'article citée ici, n'est admise aujourd'hui par aucun chimiste, il est inutile de faire connoître ici tous les détails dans lesquels Macquer est entré à cet égard. D'ailleurs les principaux points de cette théorie ont été traités dans l'article de l'ALUMINE, & il seroit superflu d'en représenter une partie dans cet article qui n'est destiné qu'à faire connoître les propriétés de cette terre, alliée comme elle l'est dans la nature avec la silice & toutes les autres matières qui en altèrent les caractères, & qui la convertissent par cette altération en argile.

ARGILE ACÉTUEUSE. Bergman avoit adopté une nomenclature des sels neutres inverse de celle qu'on avoit employée jusqu'à lui. Les mots de *vitriol*, *nitre*, *sel marin* ou *sel* simplement, ceux de *sels tartareux*, *acéteux*, *phosphoriques*, de telle ou telle base, avoient d'abord été substitués aux noms insignifiants, presque mythiques, ou aux noms d'hommes, qu'on avoit peu-à-peu introduits dans la science; mais Bergman qui vouloit faire régner dans les noms une uniformité, dont il favoit bien que devoit dépendre la clarté de la science, avoit préféré de nommer les sels neutres d'abord du nom de la base terreuse, alcaline ou métallique, & d'y ajouter celui de l'acide. Ainsi le mot *argile acéteuse* signifioit la combinaison de l'argile pure ou de l'alumine avec le vinaigre ou acide acéteux. Nous aurions adopté cette marche, si elle avoit permis de désigner l'état des acides, que Bergman ne connoissoit point encore exactement. Dans notre nomenclature méthodique, l'argile acéteuse de Bergman est notre acétite d'alumine. Voyez ces mots.

ARGILE AÉRÉE. C'est dans la nomenclature de Bergman, la combinaison de l'argile pure avec l'acide aérien de cet auteur. Cette combinaison est le carbonate d'alumine de la nouvelle nomenclature. Voyez ces mots.

ARGILE ARSÉNIQUÉE. Sel neutre ainsi nommé par Bergman, & composé d'acide arsénical de cet auteur avec l'argile pure. C'est notre arseniate d'alumine. Voyez ces mots.

ARGILE CRAYEUSE. On a nommé pendant quelque temps *argile crayeuse* la combinaison de l'alumine avec l'acide carbonique. Celui-ci portoit alors le nom d'*acide crayeux*. Voyez l'article du CARBONATE D'ALUMINE.

ARGILE FLUORÉE. C'étoit d'après Bergman le sel neutre formé par l'acide fluorique uni à l'argile. Nous le désignons aujourd'hui par le nom de FLUATE D'ALUMINE. Voyez ces mots.

ARGILE MURIATIQUE. Quand l'argile étoit unie à l'acide marin ou muriatique, c'étoit ainsi que Bergman exprimoit cette combinaison. Nous la nommons MURIATE D'ALUMINE. Voyez ces mots.

ARGILE NITRÉE. Bergman nommoit ainsi la combinaison de l'argile pure avec l'acide de nitre. On fait aujourd'hui que cette combinaison peut être double, soit avec l'acide nitreux, soit avec le nitrique. Dans le premier cas, nous le nommons NITRITE D'ALUMINE, & dans le second NITRATE D'ALUMINE. Voyez ces mots.

ARGILE PHOSPHORÉE. Bergman désignoit par ce nom la combinaison de l'acide phosphorique avec l'argile pure. C'est dans la nouvelle nomenclature ou le phosphate d'alumine, ou le phosphate d'alumine, suivant que l'acide du phosphore y est chargé de plus ou de moins d'oxygène, ou phosphorique ou phosphoreux. Voyez ces mots.

ARGILE SPATHIQUE. Dans le temps où l'acide fluorique étoit nommé *acide spathique*, quelques chimistes nommoient le fluaté d'alumine *argile spathique*. Bergman nommoit aussi ce sel *argile fluatée*. Voyez le mot FLUATE D'ALUMINE.

ARGILE VITRIOLÉE. On conçoit que c'étoit là, dans le système des dénominations de Bergman, celle qu'il donnoit à la combinaison de l'acide vitriolique & de l'argile pure. Dans la nomenclature moderne, les noms de l'acide du soufre & de l'acide étoient changés, ce sel est le sulfate d'alumine ou le sulfate d'alumine, suivant que l'acide est à l'état sulfurique ou à l'état sulfureux.

Réflexions sur la nomenclature de Bergman.

On voit qu'en suivant l'esprit des dénominations indiquées par Bergman, & qui ont été suivies par plusieurs chimistes, & sur-tout par les Allemands, le rapport qui existe entre elles, suppose que les sels neutres y sont considérés par leur base, & que celle-ci semble en déterminer les genres, du sorte qu'il y auroit dans une disposition méthodique fondée sur ce principe, autant de genres de sels neutres qu'il y a de bases. Il s'ensuit encore que les espèces de ces genres seroient distinguées par les acides, & que leur nombre égaleroit celui de ces derniers sels. Mais quand on compare les propriétés des sels neutres les uns aux autres, on reconnoît que celles qui dépendent des acides, sont plus constantes & plus générales que celles qui tiennent aux bases terreuses ou alcalines. Celles-ci en effet

n'offrent aucune régularité, aucune analogie qui puisse devenir un caractère générique dans leur saveur, leur forme, leur altération par le feu, par l'air, ni même dans les phénomènes de leurs décompositions, qui paroissent cependant devoir être généralement identiques, & fournir seuls les caractères des genres considérés par leur base. Quoique les attractions des bases soient en général analogues les unes aux autres pour le plus grand nombre des acides, elles ne sont pas cependant parfaitement identiques dans chaque acide; par exemple, quoiqu'en général la chaux vienne après les deux alcalis fixes pour le rang de son attraction ou de son affinité pour les acides, l'expérience prouve qu'elle définit ces alcalis d'avec l'acide fluorique, l'acide phosphorique, l'acide oxalique, &c. On ne pourroit donc pas donner la décomposition des sels calcaires par les alcalis fixes, comme un caractère générique de ces sels; les anomalies sont très-fréquentes dans les considérations des attractions des bases. Il existe une autre source de parcelles anomalies, plus abondante encore, & qui fait naître un plus grand nombre de variétés dans les phénomènes des décompositions chimiques, c'est la production des sels triples. La magnésie, l'alumine, offrent sans cesse aux chimistes la propriété de s'unir aux acides en même-temps que l'ammoniaque, & de former des triflues dont les caractères ne sont point encore connus. Les décompositions que ces bases exercent par rapport aux acides, & réciproquement les unes par les autres, ne sont que partielles. Les acides au contraire forment des caractères plus constants dans les sels; ces caractères sont plus faciles à désigner. Ces raisons m'ont déterminé à ranger les sels neutres par les acides, à tirer de ces derniers la formation des genres, comme on en a tiré la formation des noms des sels neutres. Voyez les mots SELS NEUTRES, GENRES CHIMIQUES, CARACTÈRES CHIMIQUES, &c.

ARGYROPEE. Le mot *argyropée*, qui signifie fabrication de l'argent, travail sur & avec l'argent, & qui n'exprime aujourd'hui qu'une très-petite partie des archimiques, a été autrefois une des dénominations de la chimie, soit parce qu'elle s'exerçoit particulièrement sur les minéraux tenant de l'argent, soit parce qu'elle s'occupoit alors du prétendu art de faire de l'argent par le moyen du grand œuvre ou de la pierre philosophale. On conçoit qu'une pareille dénomination doit être abandonnée, depuis que la chimie est devenue une science exacte.

ARIA. (*Pharmac.*) Ce mot employé dans plusieurs formulaires de médecine & de pharmacie, est un des synonymes du sorbier, *forbus aemegica* des botanistes. L'incens nomme cyvogetal *crataegus aria*, *foliis ovatis incisiss serratis subius tomentosis*. Voyez **SORBIER**.

ARIBARZANION. (*Pharmac.*) Surnom donné à une espèce d'emplâtre décrit par Héras, & dont il vante l'efficacité contre les ulcères malins & difficiles à guérir. Galien, livre 4 de la composition des médicaments selon les genres, chapitre 12, fait mention de cet emplâtre. On en trouve aussi la description dans l'aul, livre 7.

ARISARON. (*Pharmac.*) *Arum arisarum*. L. *Arisarum latifolium*. Clus. Hb. 273. Cette plante croît spontanément en Portugal, en Italie, en Provence, en Espagne, &c. Quelques-uns l'ont appelée *capuchon de moine*, par rapport à la forme de sa fleur qui ressemble en effet à cette partie de l'habillement d'un moine. Elle possède la même acrimonie que l'*Arum* ou pied-de-veau.

La décoction des feuilles & des fleurs de l'*Arisarum* est vulnératoire, detergative, utile dans la fistule lacrymale, les brûlures & les ulcères anciens. La racine doit être séchée avec les mêmes précautions que celles de l'*Arum*; réduite en poudre à la dose d'un scrupule & même d'un gros, elle est estimée contre les maladies pefilentes. Plenk dans sa *bractologie*, dit que le peuple indien mange cette racine avec la tige, après les avoir fait bouillir dans plusieurs eaux, afin d'en détruire l'âcreté. Il cite ce passage d'après Rumphius, nous avons confronté cet article. L'*Arisarum* dont il est ici question, ne se trouve point dans l'*herbar d'Amboine*, mais bien l'*Arum pergrinum* de Linnéus, qui est l'*Arisarum esculentum* de Rumphius; erreur commise par Plenk, qu'il faut rectifier. Zucker n'apas commis la même faute dans sa matière alimentaire.

(M. WILLEMET.)

ARISARON BATARD. (*Pharmac.*) *Arum tenuifolium*. L. *Arisarum angustifolium*. Bauh. Pin. 196. Cette espèce se trouve en Dalmatie, au Levant, aux environs de Rome & de Montpellier.

La racine récente de cette plante a la même acrimonie que celle du pied-de-veau; elle est communément de la grosseur d'une olive. Les anciens préparoient avec cette racine un collyre qu'ils estimoient efficace contre les fistules lacrymales. Si l'on frotte les parties génitales des animaux avec cette racine récente, elle excite de violents & douloureux irritations. Nous croyons que cette sensation peut également être produite avec les racines récentes de toutes les espèces d'*Arum*.

(M. WILLEMET.)

ARISTOLOCHE ANGUICIDE. (*Pharmac.*) *Aristolochia Anguica*, L. L'odeur de cette plante, selon M. Jacquin, est désagréable & nauséabonde; le suc de sa racine mêlé avec la salive par la mastication, répandu à la quantité d'une ou deux gouttes dans la gueule d'un serpent médiocre, l'enivre & l'hébète, ou l'étourdit tellement, qu'on peut alors le manier impunément, & même le

mettre dans son sein sans en avoir rien à craindre, au moins pendant quelques heures. Si on lui en fait avaler une dose plus considérable, sur le champ son corps est saisi d'un tremblement convulsif, & il meurt en peu de temps. Les Américains, qui ont connoissance de ce secret, saisissent avec adresse par le col quelques serpens des plus dangereux, mais d'une grosseur médiocre, répandent dans sa gueule une dose de salive imprégnée de ce suc, suffisante seulement pour hébété l'animal, & le présentent dans cet état d'ivresse au public qui paye avec plaisir ce petit spectacle, à cause de la satisfaction qu'il a d'apprendre un secret pour se garantir de la morsure des serpens. M. Jacquin convient que l'on fait suir au loin ces animaux, lorsqu'on approche d'eux avec cette *aristolochie*, ce qu'il attribue à l'odeur de sa racine. On peut avaler, selon cet auteur, quelques gouttes du suc de cette racine sans en être incommodé, mais il présume qu'une certaine quantité de ce suc occasionneroit le vomissement, ou causeroit quelque autre mal. On lui a rapporté que ce même suc appliqué sur la morsure récente d'un serpent venimeux, nu pris à l'intérieur dans cette circonstance, guérirait inmanquablement.

Extrait du *Manoir* de M. Lamarec.

(M. WILLEMET.)

ARISTOLOCHIE CLEMATITE. (*Pharmac.*) *Aristolochia clematitis* L. *Aristolochia Bruns.* Plante indigène à toute l'Europe; elle se multiplie si facilement dans les jardins botaniques, qu'il est difficile de la détruire & de l'empêcher de se multiplier, ce qui a déterminé Césalpin à l'appeller venin de la terre.

(M. WILLEMET.)

ARISTOLOCHIE D'AMÉRIQUE. (*Pharmac.*) *Aristolochia trilobata* L. C'est un petit arbre de l'Amérique méridionale & de St.-Domingue, dont les tiges sont alexitères & sudorifiques contre les morsures des serpens. Bergius a célébré cette plante par un article particulier.

(M. WILLEMET.)

ARISTOLOCHIE DES INDES. (*Pharmac.*) *Aristolochia indica* L. C'est le *contrayerva* de la Jamaïque; les Anglois attribuent à la racine de cette aristolochie, les mêmes propriétés qu'au *contrayerva* des officines qui est la racine du *dorsieniu contrayerva*.

(M. WILLEMET.)

ARISTOLOCHIE DES MAURES. (*Pharmac.*) *Aristolochia Mazarum* L. Sa racine possède les mêmes vertus que celles des autres aristoloches.

(M. WILLEMET.)

ARISTOLOCHIE LONGUE. (*Pharmac.*) *Aristolochia longa* L. Cette aristolochie croît en Lan-

doc, en Provence, en Italie, en Espagne. M. Thunberg l'a rencontrée au Japon.

(M. WILLEMET.)

ARISTOLOCHIE ODORANTE. (*Pharmac.*) *Aristolochia odorata* L. Toutes les parties de cette plante, dit M. la Marck, ont une odeur forte que l'on prétend n'annoins être agréable. On assure que cette aristolochie appliquée en topique, est propre pour calmer les douleurs & fondre les tumeurs contre nature; son suc exprimé ou fa décoction, détruit ou diminue les frissons des fièvres intermittentes, fortifie l'estomac & le cerveau, guérit les diarrhées. Le suc de la racine s'emploie aussi avec succès contre la morsure des serpens: on trouve cette plante à la Jamaïque, au Mexique, dans l'Amérique.

(M. WILLEMET.)

ARISTOLOCHIE PETITE. (*Pharmac.*) *Aristolochia pifolochia* L. *Pifolochia*, *dos. Pemp.* La petite aristolochie est commune dans le Languedoc, & dans plusieurs départemens de l'empire de France; elle se trouve aussi en Espagne.

Une once de racine de cette aristolochie pulvérisée grossièrement, mise en infusion dans une livre de bonne eau-de-vie pendant plusieurs jours, ensuite filtrée, forme un élixir bon à prendre tous les matins à jeun à la dose d'une cuillerée, pour la goutte. Nous avons vu des effets admirables de cet élixir sur des gouteux invétérés.

(M. WILLEMET.)

ARISTOLOCHIE RONDE. (*Pharmac.*) *Aristolochia rotunda* L. *Aristolochia*, *Cam. epit.* 419. Cette plante est commune dans le Languedoc, la Provence, l'Italie, l'Espagne, la Suisse; en général toutes les aristoloches sont vulnérables, détersives, antiseptiques, alexitères, apéritives, emménagogues, résolutes, antiartriques, anthelmintiques, déobstruatives, sudorifiques, céphaliques, absorbantes, antiscorbutiques, carminatives, vomitives, diurétiques; & propres contre la goutte, la cachexie, la chlorose, l'hydropisie, l'asthme, l'oedème, la jaunisse, les polyypes, les hémorrhoides, la fistule, les ulcères, l'épilepsie, les cathares, la carie, le sarcome, la galle, les maladies de poitrine, les affections soporeuses, pour consumer les chairs baveuses, expulser l'arrière-faix, exciter les mois.

L'art vétérinaire en retire aussi de grands secours. Les feuilles, & sur-tout les racines, sont en usage. On ne peut pas donner impunément, à grande dose & sans précaution, les aristoloches aux femmes grosses, elles causeroient l'avortement. Boerhaave avertit que leur usage continu, affoiblit l'estomac & même tout le corps. La dose en poudre ne doit pas passer un gros, une plus forte exciteroit le vomissement. La racine doit être compacte, point cariée; il faut la faire sécher dans un

endroit chaud : l'on en retire un extrait. Elle entre dans l'huile antiepileptique d'Hoffman, la poudre arthritique amère, les trochisques hystrériques, l'eau générale, dans divers onguents & autres compositions pharmaceutiques. La semence des aristoloques a aussi quelques propriétés ; Jean-Jacques Baier a composé un traite particulier sur l'aristoloche.

(M. WILLEMET.)

ARISTOLOCHQUES. (Pharmacie.) On désigne sous le nom d'aristoloques, les remèdes capables de soutenir & de provoquer même l'écoulement des lochies. Ce mot a été employé pour désigner quelques préparations pharmaceutiques ; mais on ne s'en sert plus aujourd'hui. Voyez le dictionnaire de médecine.

ARMARINTE. (Pharmacie.) *Cachrys Libanotis.* C'est une plante de la grande famille des ombellifères, qui se trouve en Sicile, en Italie, sur la côte de Barbarie, en Afrique & aux environs de Montpellier. Elle est vivace, la semence est très-acre ; toute la plante a une odeur aromatique & d'encens ; elle est, on-échouffante, astringente & anti-hystérique. Cette plante étoit fort en usage chez les anciens. Plin l'a célébrée dans son histoire naturelle.

(M. WILLEMET.)

ARMARINTE ODONTALGIQUE. (Pharmacie.) *Cachrys odontalgica.* L. fil. Sa racine est fort longue, a un goût aromatique & très-acre, elle fait couler la salive lorsqu'on en met dans la bouche, ce qui fait qu'on l'emploie comme salivair, pour soulager dans les maux de dents occasionnés par des fluxions. On trouve cette plante dans la Sibirie. M. l'allas en parle dans ses voyages.

(M. WILLEMET.)

ARMOISE. (Pharmacie.) *Artemisia vulgaris.* *Artemisia, Biach. W. Her. 1. 431.* Cette plante porte le nom d'Artemisie, reine de Carie ; elle est perenne, vivace, indigène, non-seulement à toute l'Europe, mais elle se trouve encore au Japon & à la Chine. Malgré l'usage multiple de l'armoise chez les anciens, & l'application qu'en faisoit Hippocrate contre une foule de maux, quelques modernes dépréciateurs veulent absolument anéantir ses propriétés. Ayons toujours une certaine vénération pour nos anciens ; d'après cela je vais rappeler par une énumération succincte de ses principales vertus & qualités.

Toutes les parties de l'armoise sont d'usage, mais c'est spécialement les feuilles & les sommets qui s'emploient de préférence ; leur dessication n'est pas difficile, attendu qu'elles contiennent peu d'humidité. Elles sont vulnéraires, apéritives, antihystériques, antispasmodiques, analeptiques, toniques, emménagogues, febrifuges, antipodagriques, diurétiques, ophtalmiques ; propres contre les pâles couleurs, la jaunisse, l'hydropisie,

l'hydropisie, les lassitudes, les obstructions, la stérilité, les maladies des femmes, pour remettre l'estomac dérangé, rétablir les digestions. A l'extérieur l'armoise est un très-grand résolutif. Elle est bonne en cataplasme sur des tumeurs, à la fin des inflammations, pour résoudre les squirrhés, contre les brûlures. Selon Parkinson, cette plante en poudre, à la dose de trois gros dans du vin, est un excellent remède dans la sciaticque. Il assure aussi que la même plante fraîche, ou son suc mêlé avec une liqueur convenable, détruit l'effet soporifique & délétère de l'opium.

C'est de l'armoise vulgaire que l'on retire à la Chine & au Japon le *moxa*. Ce fait est confirmé par le rapport fidele du savant M. Thunberg, qui a voyagé dans ces contrées éloignées. On prépare le *moxa* en recueillant & en faisant dessécher au mois de juin les feuilles d'armoise ; on les pile jusqu'à ce qu'elles soient extrêmement molles ; on en sépare alors exactement les fibres d'avec les parties lamineuses, qui servent de cautére actuel ; les Chinois & les Japonais en font un grand usage pour guérir les maladies arthritiques & autres.

La feuille récente d'armoise machée, donne à la salive une belle couleur verte.

Les cuisiniers facilitent les uns des mêmes feuilles, pour en rendre la chair tendre & lui donner un bon goût.

La racine morte de l'armoise ressemble parfaitement à du charbon.

Muller dit que les Persans font bouillir la graine d'armoise, & en préparent une gelée utile dans les fièvres malignes & pétéchiales.

L'armoise, appelée aussi *herbe de Saint-Jean*, peut servir de fourrage aux bœufs, aux chèvres, aux chevaux.

Les principales préparations faites avec l'armoise, que l'on garde dans les pharmacies pour l'usage de la médecine, sont l'eau distillée de la plante lorsqu'elle est en fleur, le sirop, l'extrait. Cette plante entre dans l'eau vulnéraire, la poudre de Palmarius contre la rage, l'eau hystérique de Charas.

Jean-Jacques Baier de Jena, professeur de médecine en l'université d'Altorf, membre de l'académie impériale des curieux de la nature sous le nom d'Eugène, a fait une dissertation uniquement consacrée à l'armoise.

Jean-Paul Stechman, docteur en médecine de l'université de Göttingue, en a composé une autre, qui comprend toutes les espèces du genre *artemisia*.

(M. WILLEMET.)

ARMONICAC ou AMMONIAC. (Pharm.) Par une corruption dont on trouve beaucoup d'exemples dans la nomenclature des sciences, on a changé le mot ammoniac en celui de sel armoniacque. Les vieux dispensaires emploient fréquemment ce mot pour désigner le muriate d'ammoniacque. Voyez l'article de ce sel.

ARNIQUE.

ARNIQUE. (Pharmacie.) *Arnica montana*, L. *Calcha alpina*, Dod. purg., p. 61. *Diuretica rinalm*, spec. 118. On trouve assez communément cette plante dans les prairies humides des Alpes, des Vosges, de la Bohême, de la Sibirie, de la Lapponie, de la Suède, de la Heréynie, &c. de plusieurs vallées de la Suisse : elle est vivace.

L'arnique est âcre, un peu amère, fait éternuer, c'est pour cela qu'en Lorraine on lui donne le nom de tabac des Vosges. Elle excite aussi des nausées & le vomissement. C'est un des plus puissans végétaux en usage dans la médecine. On l'estime singulièrement en Allemagne, où elle est appelée *panacée contre les chûtes*, car elle a la propriété de rétablir le sang épanché dans les échinofes, les contusions, les coups, elle peut rendre l'usage de la parole, remède à la constipation, à la léthargie, à la perte des sens. Elle a guéri plusieurs fois la goutte seréine, toujours après avoir excité des douleurs dans la partie malade, en rendant à la prunelle sa mobilité, la réduisant à son diamètre ordinaire. Elle a encore réussi pour les spasmes, les convulsions, les tremblements des membres, les fausses pleurésies, la péripneumonie, l'épilepsie, les maladies de poitrine, la suppression des menstrues & celle des lochies, les hémorrhagies de la matrice, le crachement & le vomissement de sang, l'hémiphégie, la paraplégie, la cachexie, les triffons de tout le corps, & donne de la gaieté. Pour finir notre récapitulation sur toutes les propriétés de l'arnique, nous dirons avec les auteurs qui en ont traité, qu'elle agace, irrite & aiguillonne fortement les parties solides, accélère la circulation des humeurs, produit un orgasme général, met en contraction toutes les fibres motrices, excite une effervescence prodigieuse dans les humeurs, & un trouble universel auquel succède une espèce de douleur sourde, qui ramène le calme & l'équilibre dans toute la machine. Elle convient encore dans l'asthme humide, les obstructions desespérées des viscères, l'œdème, l'hydropisie commençante, les fièvres quartes, &c. M. Collin, médecin de Vienne, assure avoir guéri des milliers de fièvres malignes putrides, dans l'armée impériale, avec son usage. L'arnique est aussi regardée comme spécifique pour guérir & prévenir le vertige, de manière que plusieurs danseurs de corde en font usage pour se fortifier le cerveau & se garantir des chûtes. Elle est diurétiq.ue, sudorifique, tonique, vulnéraire, résolutive.

Les fleurs, les feuilles & les racines sont employées. Les feuilles demandent des soins pour leur dessication, elles doivent être retournées souvent, soit qu'on les fasse sécher au soleil ou sur le four, car les herboristes des montagnes nous apportent communément les feuilles d'arnique mal desséchées, & mêlées avec des feuilles

Chimie. Tome II.

de graminées. On emploie cette plante en forme de thé, ou en décoction, ou en poudre à petite dose &c. en somentation. Elle est encore préconisée pour la peste du bétail. On fait bouillir les fleurs d'arnique dans de la lessive pour les maux de tête &c. pour rendre les cheveux blonds.

Cette plante, a, dit-on, la propriété de tuer les chiens qui en mangent, &c. d'autres animaux ; cette assertion paroît être démentie par l'avidité que les bœufs & les vaches ont à la manger au printemps. Les paysans de quelques provinces de Suède fument les feuilles d'arnique à défaut de tabac du Virginie.

L'on prépare un extrait & un sirop avec cette plante.

Buchner, Alberti, Meisner, Schilt, Doellinger, Witke, Fehr, Aaskow, sont les principaux historiens monographiques de l'arnique.

(M. WILLET.)

AROMATE D'ALLEMAGNE. (Pharmacie.) *Aroma Germanicum*. Surnom donné par quelques pharmacographes à la plante que nous nommons *anula compans* ou *helonium*.

AROMATITE. (Ph.) *Aromatites des Grecs*. Cette dénomination que l'on trouve dans quelques anciens pharmacographes, répond à notre adjectif *aromatique*, & il est toujours employé pour désigner une substance dans laquelle se trouve le principe odorant ; ainsi Dioscoride donne la formule d'un vin qu'il nomme *aromatites*. Plinie, &c. d'après lui, beaucoup d'écrivains, font mention d'une pierre que l'on trouve, dit-il, en Arabie, en Egypte, qui a une odeur de myrrhe, & que l'on nomme également *aromatite* : quelques écrivains ont ainsi désigné la noir mulcade sous le nom de *nux aromatites*.

AROME. L'arome est, dans la nouvelle nomenclature méthodique, le principe ou la matière odorante des végétaux & des animaux. Cette dénomination est tirée de celle d'aromate déjà employée depuis long-temps, mais restreinte à la classe des odeurs agréables.

Boerhaave avoit donné le nom d'*esprit reïeur* des plantes au principe qui constitue leur odeur ; on ne connoît encore que très-peu les propriétés de cet être singulier, si intéressant par ses effets sur l'économie animale. Depuis les considérations que Boerhaave a présentées sur le principe de l'odeur des végétaux, on l'a généralement regardé comme un corps existant par lui-même, indépendamment de toutes les autres matières qui constituent les végétaux, &c. seulement inhérent plus particulièrement à quelques-unes de ces matières, comme aux huiles volatiles, aux sucs balsamiques ou résineux, &c. qu'à d'autres. C'est sous ce point

Fff

de vue que nous examinerons d'abord l'arôme, ensuite nous ajouterons quelques observations sur sa nature & les analogies avec les autres matériaux des végétaux.

L'arôme paroît être très-volatil, très-fugace, très-atténué; il se dégage sans celle des plantes, & forme autour d'elles une atmosphère odorante, qui se propage à une plus ou moins grande étendue, & qui est transportée par le vent souvent à de grandes distances. Toutes les plantes diffèrent les unes des autres par la quantité, la force & la nature de ce principe. Les unes en sont abondamment pourvues, & ne le perdent même qu'en partie par leur dessiccation, de sorte qu'il paroît jouir alors d'un certain degré de fixité; tels sont en général les bois odorans & toutes les parties végétales odorantes, sèches & ligneuses. D'autres en ont un si fugace & si volatil, que quoiqu'elles aient beaucoup d'odeur, on ne peut en fixer le principe qu'avec peine; il se perd complètement par leur exposition à l'air & leur desséchement. Enfin il est des plantes dont l'odeur est fade & peu sensible, on les a appelées inodores: ces dernières n'ayant, pour ainsi dire, qu'une odeur d'herbe, leur arôme a été nommé *herbacé*. Cependant on verra plus bas qu'il est rare que les plantes les plus inodores ne puissent pas fournir un arôme qui leur est propre & qui les fait reconnoître.

La plus légère chaleur suffit pour dégager l'arôme des plantes, on regarde comme tel le produit aqueux que fournissent les plantes vertes par l'action d'un feu doux. Pour l'obtenir, il faut distiller la plante au bain-marie & en recevoir les vapeurs dans un chapeau froid qui les condense, & les fait couler en liquide dans un récipient. Ce produit est une eau limpide, chargée d'odeur, & qu'on a nommée *eau essentielle* ou *eau distillée* des plantes. Cette liqueur doit être regardée comme une dissolution du principe odorant dans l'eau. Ce principe paroît être plus volatil que le liquide qui le tient en dissolution; si l'on chauffe très-doucement cette eau aromatique, elle perd peu-à-peu son odeur & devient fade; si on l'expose à l'air, elle éprouve la même altération, elle dépose en même-temps des flocons légers blancs, comme mucilagineux, & prend même une odeur de moisissure ou de chançé.

Le principe de l'odeur est presque toujours uni aux sucs huileux, & il paroît même faire un des élémens des huiles volatiles; puisque, 1°. ces dernières en sont toujours chargées; 2°. les plantes qui ont une odeur forte & tenace donnent constamment beaucoup plus d'huile volatile que celles dont l'odeur est très-fugace, quoiqu'assez vive & qui souvent n'en fournissent point du tout; telles que les lilacées & plusieurs autres. On est obligé, pour retenir l'arôme de ces dernières, comme les lys odorans, la tubéreuse, &c., de le combiner avec des huiles fixes. Le jasmin, l'héliotrope sont aussi dans ce cas. On met ces fleurs dans une cu-

curbide d'éraïn avec du coton imbibé d'huile de ben; on dispose les fleurs & le coton couches par couches, on ferme la cucurbitre, & on l'expose à une chaleur douce. L'arôme dégage lentement, se combine à l'huile, & s'y fixe d'une manière durable; 3°. les plantes qui n'ont point d'odeur sensible ou qui n'ont qu'une odeur herbacée, ne donnent pas un arôme d'huile volatile; 4°. les végétaux dont on a extrait l'eau aromatique par la distillation au bain-marie, ne fournissent plus cette espèce d'huile volatile, à moins qu'ils ne retiennent encore un peu de leur odeur; dans ce cas ils n'en donnent même qu'une très-petite quantité; 5°. une huile volatile qui a perdu son odeur la reprend très-facilement avec toutes ses propriétés lorsqu'on la distille sur la plante fraîche dont on l'a d'abord extraite. Tels sont les trois principaux qui établissent une analogie, un rapport de nature & de propriétés entre l'arôme & les huiles volatiles; ils sont tels, qu'on pourroit croire même que ces deux matières sont une seule & même substance, & en effet une huile volatile réduite en vapeur ou en gaz présente toutes les propriétés de l'arôme, & semble souvent se confondre avec lui. Il est vrai qu'on n'a point encore pu examiner l'arôme seul & pur; on a pris long-temps pour lui l'eau chargée de ce principe ou l'eau aromatique; c'est même sous cette forme qu'il est nécessaire d'en parler ici, parce qu'on n'a point encore trouvé le moyen d'examiner l'arôme pur & isolé.

On n'a point encore examiné l'action des matières terreuses salines sur l'eau aromatique; ainsi on ignore l'action de la silice, de l'alumine, de la baryte, de la magnésie & de la chaux sur l'arôme uni à l'eau. Il en est à-peu-près de même des effets des alcalis sur le principe odorant; quoiqu'on sache déjà que les alcalis fixes bien caustiques ou bien concentrés, modifient & même paroissent détruire plusieurs des odeurs. Les acides puissans, tels que l'acide sulfurique & l'acide nitrique concentrés ont certainement aussi une action sur l'arôme ou au moins sur l'eau aromatique des végétaux; il n'est pas de plantes qui ne perdent leur odeur par leur immersion dans ces acides; mais on n'a pas assez suivi cette action pour la bien connoître. M. Berthollet a trouvé que l'acide muriatique oxygéné détruit l'odeur d'un grand nombre de végétaux, & altère par conséquent leur arôme. Cette destruction est manifestement due à l'oxygène qui se porte sur le principe odorant, puisque l'acide muriatique oxygéné perd son odeur & ses propriétés à mesure que l'odeur disparaît: on se sert aujourd'hui de ce moyen pour déterminer l'énergie de l'arôme, & on en juge par la quantité d'acide muriatique oxygéné nécessaire pour la détruire.

Le qu'on a fait jusqu'à présent sur l'arôme semble indiquer qu'il n'est pas de la même nature, & qu'au contraire il diffère suivant les genres & les

espèces de plantes auxquelles il appartient. Macquer pense avec Boerhaave qu'il est en général composé d'une substance inflammable & d'une matière saline ; mais il observe que dans quelques végétaux il participe davantage de la nature saline, tandis que dans d'autres plantes il se rapproche plus des matières huileuses. L'arome des crucifères lui paroît être salin ; & il lui donne pour caractère d'être piquant & pénétrant sans affecter les nerfs. Celui qui, au contraire, est fade ou fort, mais sans être piquant, & qui affecte les nerfs de manière à produire ou à calmer les accès spasmodiques qui dépendent de leur agacement, comme le sont ceux des plantes aromatiques & des narcotiques, lui paroît participer beaucoup de la nature huileuse. Quoique cette assertion ne soit pas fondée sur une suite d'expériences concluantes, il faut convenir que quelques faits viennent à l'appui de l'opinion de Macquer. La fraxinelle répand une odeur qui forme autour de la plante une atmosphère inflammable, & vers la fin d'un beau jour d'été il suffit d'approcher un corps combustible en ignition pour allumer ce gaz odorant. Cette vapeur brûle alors depuis le bas jusqu'au haut de la tige qui supporte les fleurs. On peut recommencer plusieurs fois dans un été cette expérience avec succès sur un pied de fraxinelle qui est en très-forte végétation. L'arome de la fraxinelle semble donc être de nature huileuse ; on peut attribuer à un principe odorant analogue les éricelles, les fleurs phosphoriques qu'on a vues à la surface de quelques autres plantes, avec plus de vraisemblance peut-être qu'au feu électrique, qu'on a regardé comme la cause de ces phénomènes.

Venel, chimiste de Montpellier, & élève de Rouelle, avoit retiré du marum à une chaleur douce, un esprit recteur acide ; & Roux, professeur de chimie aux écoles de médecine, qui a examiné ce produit, a découvert que sans être assez acide pour rougir les couleurs bleues végétales, il étoit cependant susceptible de saturer les alcalis & de former avec eux des sels neutres. Quant à l'arome des crucifères que Macquer regardoit comme salin, on a long-temps disputé sur cette question, & l'on n'a point été jusqu'à présent d'accord sur sa nature, les uns l'ont cru acide & les autres alcalin.

Il paroît, d'après les travaux de MM. Deyeux & Baumé, que le soufre se trouve combiné avec le principe odorant des plantes anti-scorbutiques, & que c'est ce corps combustible réduit dans l'état de fluide élastique par sa combinaison avec l'hydrogène qui constitue l'arome des crucifères. Il ne faut point cependant regarder ce corps odorant comme un véritable gaz hydrogène sulfuré, inflammable, fécide, ainsi que celui que l'on retire des sulfures alcalins ; c'est certainement une autre combinaison, peut-être est-elle due à du carbone dissous en même-temps qu'un peu de soufre dans

un gaz ; peut-être aussi n'est-ce pas le gaz hydrogène qui vient se combiner & le soufre en vapeur. Ces problèmes peuvent être résolus aujourd'hui avec plus de facilité & d'exactitude, qu'ils n'ont pu l'être il y a quelques années.

On est bien loin, d'après ce qui a été exposé jusqu'ici, de connoître assez la nature & les propriétés de l'arome dans différentes plantes, pour pouvoir hazarder une classification de cette matière & en distinguer les diverses espèces ; aussi les divisions des odeurs faites par Linnéus, Lorry & quelques autres physiciens, sont-elles plutôt tirées de leur impression sur l'organe de l'odorat & de leur action sur l'économie animale, que de leurs propriétés intimes, de leur nature ; & nulle analogie chimique, nulle expérience exacte n'a encore pu servir à déterminer leurs véritables différences. C'est à cause de cet état de la science sur l'arome des plantes, & de l'incertitude qui existe encore sur ce principe, qu'on terminera cet article par trois considérations générales également importantes.

La première est que, comme l'a très-bien soupçonné Macquer, ce principe est peut-être un gaz d'une nature particulière ; son invisibilité, sa volatilité, la manière dont il se répand dans l'atmosphère, son expansibilité, & quelques expériences du docteur Ingen-Houzs sur le gaz nuisible fourni par les fleurs, rendent cette opinion très-vraisemblable. Il ne reste plus qu'à faire sur cet objet des recherches, qui, à la vérité, demandent beaucoup de soin & d'exactitude, mais qui promettent aussi des découvertes brillantes & utiles. Déjà Boyle a ouvert une vaste carrière sur les odeurs, sur leur altérabilité, sur leur combinaison réciproque, & ce travail a été repris il y a quelques années, & continué avec le plus grand succès par Lorry. Ce savant a suivi les altérations qui résultent du mélange des odeurs, celles qu'elles éprouvent par la fermentation, par l'action du feu, de l'air & de différens dissolvans ou réactifs. Ces recherches sont cependant si différentes de la marche sévère & exacte des chimistes modernes, que ce seroit nous écarter de notre objet que d'entrer dans les détails de travaux de Lorry. Mais il ne sera peut-être pas inutile de faire connoître ici la division primitive des odeurs qu'il a présentée, dans les mémoires sur cet objet. Lorry divise ces corps en cinq classes, les odeurs camphrées, les éthérées, les vireuses ou narcotiques, les acides & les alcalines ; toutes les odeurs peuvent être, suivant ce physicien, rapportées à ces cinq classes primitives. En s'expliquant sur la base de sa division, prise de l'affection que les odeurs font éprouver aux sens de l'odorat & aux nerfs en général, Lorry annonce qu'il ne s'est point proposé d'en rechercher la nature chimique ; mais il est très-vraisemblable, comme il le pense lui-même, que celles de chaque classe se rapprochent les unes des autres par leurs propriétés chimiques, comme elles le sont déjà.

par leur action sur l'économie animale. On voit bien que c'est à l'expérience à prononcer sur ce point, & qu'on est loin de posséder encore assez de faits chimiques pour pouvoir prononcer sur cette classification qui n'est que médicale.

La seconde considération par laquelle nous terminerons l'histoire chimique du principe de l'odeur, de l'arôme, c'est que, quoique les plantes qui ont été appelées inodores soient regardées comme ne contenant point ce principe, il est cependant très-démonstré aujourd'hui qu'on peut en extraire, à l'aide de la chaleur la plus douce du bain-marie, une eau, dont l'odeur, quoique très-légère, suffit pour faire connoître aux personnes exercées la plante d'où elle a été tirée. Je puis assurer, pour l'avoir éprouvé un grand nombre de fois, que les plantes réputées les plus inodores, telles que la chicorée, le plantain, la bourrache, la laitue, &c., donnent au bain-marie une eau qui répand tellement leur odeur, qu'on peut les distinguer les unes des autres. Il est vrai que ces eaux aromatiques fides se décomposent très-vite & perdent bien-tôt la légère odeur qui les caractérise. Elles s'altèrent, fermentent & passent même à l'acidité ou à l'alcali, suivant leur qualité. On doit observer que cette eau odorante n'est caractérisée comme on l'indique ici que lorsqu'elle provient des plantes mêmes qui la fournissent, & que si on les distille avec de l'eau étrangère à leur nature, avec de l'eau ajoutée à ces plantes, le caractère annoncé ici ne s'y retrouve plus. Il faut que ce soit l'eau de végétation des plantes elles-mêmes qui soit réduite en vapeurs par une chaleur douce, & pour obtenir cette eau odorante, je mets les plantes prétendues inodores, fraîches & hachées menu dans une corne de verre, dont les deux tiers sont plongés & suspendus dans l'eau bouillante; j'adapte à la corne un récipient lutté au papier collé, & dont je refroidis la surface par des linges mouillés ou par la glace. Je distille ainsi au bain-marie, jusqu'à ce que les plantes contenues dans la corne soient privées de toute leur verdure & deviennent sèches & cassantes.

La troisième considération relative à la nature de l'arôme, c'est qu'il n'est pas complètement prouvé qu'il soit un principe particulier des végétaux, quoique depuis Boerhaave les chimistes l'aient toujours regardé comme tel. En effet il n'est pas démontré que l'on puisse le séparer entièrement des plantes ou des parties des plantes dans lesquelles on croit qu'il est contenu, de manière à ce qu'elles en soient totalement privées, & ne fournissent plus un arôme. Au contraire, la plupart des plantes ou des parties des plantes d'où on a retiré par la distillation l'eau aromatique, conservent après cette opération une très-grande partie de leur odeur; souvent même elles en réprennent bientôt une plus considérable que celle qu'elles avoient d'abord. On voit beaucoup de

matières végétales telles que des huiles volatiles; des baumes, des résines, qui fournissent du principe aromatique jusqu'à ce qu'elles soient entièrement volatilisées ou détruites. Enfin il est des plantes, & telles sont spécialement les fleurs des lilacées les plus odorantes, ainsi que le jasmin, le réséda, l'héliotrope, &c. qui, en perdant leur arôme, semblent perdre en même-temps toute leur substance. Il est aussi des matières animales odorantes, comme le musc, la civette, l'ambre gris, qui restent constamment & uniformément aromatiques jusqu'à leur dernier atôme. Ces faits pourroient porter à croire qu'il n'existe pas un principe particulier de l'odeur; que de qu'on a nommé esprit recteur & arôme est tellement inhérent aux végétaux qui le récedent, qu'il constitue véritablement leur essence; en un mot que l'arôme est la propre substance de ces végétaux réduite toute entière en vapeur. Cette considération mérite au moins d'être suivie, & elle pourra conduire sûrement à la découverte de l'arôme.

Il existe un art fondé sur les moyens d'extraire les parties odorantes des végétaux, de les conserver, de les fixer dans différentes substances; c'est celui du parfumeur. La plupart de ses procédés sont entièrement chimiques. C'est avec de l'eau, de l'alcool, des huiles & des graisses qu'on fixe l'arôme. On se sert aussi des huiles volatiles & des baumes ou des résines qu'il contiennent plus ou moins fixés.

La médecine fait un assez grand usage des eaux distillées, ou aromatiques. Elles ont différentes vertus suivant leur nature; on est dans l'usage de n'employer que celles que l'on distille à feu nu, avec de l'eau, comme on le fait pour obtenir les huiles volatiles. Nous observerons que cette manipulation est bonne pour l'arôme des plantes vraiment aromatiques ou fortement odorantes; mais qu'elle est defective pour celui des plantes nommées communément inodores. Nous croyons qu'il est indispensable de les distiller au bain-marie: comme on ne prend point ordinairement cette précaution, elles ont une odeur de feu ou d'empyreume, sans être chargées de celles de la plante. Si la vertu de ces eaux ne réside que dans leur arôme, quelque foible qu'il soit, il est certain que de la manière dont on les prépare il leur ôte toutes les propriétés qu'elles peuvent avoir. On voit, d'après ces observations, que les eaux distillées des plantes que l'on prépare en pharmacie, ne sont point l'arôme pur ou esprit recteur de Boerhaave, mais que l'arôme y est noyé dans une plus ou moins grande quantité d'eau que l'on distille avec les plantes.

ARQUEBUSADE; (eau d') (Pharmacie) On donne le nom d'eau d'arquebuse à un alcool aromatique composé, qu'on connoît plus souvent sous le nom d'eau vulnéraire. Voyez les mots ARCOLES, EAUX SPIRITUEUSES, EAU VULNERAIRE.

ARRETE-BŒUF, ou BUGBANE. (*Pharmacie.*) *Anonis fraxinosa*. L. *Anonis Fuchs.* *hist. 60.* Cette plante aime à croître dans les lieux stériles, arides, secs, friches, au bord des chemins; elle couvre les débris arides & sablonneux de l'Égypte & de la partie Asiatique qui l'avoiine; elle est perennelle.

La racine, qui est assez ligneuse, dure, est une des cinq racines apéritives mineures; elle est diurétique, incitive, laxative, désoppressive, détersive, hepaticque, splénique, dissolvative, abortif, emolliente, urinaire, antiscorbutique, antinephrétique, pectorale, odontalgique.

Elle est propre contre la jaunisse, l'ischurie, la dysurie, la suppression des mois, les pâles couleurs, la pituite, l'anorexie, la fièvre de Hongrie, les maux de gorge, l'hydrocèle, la sarcocèle, les enflures des gencives, les carnosités, les hernies, les mariques, les hémorroïdes: on la prend en décoction, ou pulvérisée à la dose d'un gros.

Les feuilles & les fleurs d'arrête-bœuf possèdent quelques-unes des propriétés sulfureuses.

Les jeunes pousses vernoales, confites dans le vinaigre & au sel, sont bonnes à manger: elles corrigent l'haleine puante.

Agricola recommande l'usage d'une forte décoction de racines d'arrête-bœuf pour faire uriner les chevaux.

Les bœufs, les chèvres & les moutons pâturent cette plante.

(M. WILLEMET.)

ARRETE-BŒUF JAUNE. (*Pharmacie.*) *Anonis natris*. L. *Natrix* Riv. *terr.* 68. Cette espèce se trouve dans la France méridionale, l'Espagne, & nous l'avons rencontrée en Lorraine. Des paysans appliquent cette plante récente & broyée sur les blessures, ce qui les guérit fort vite. Les pharmacographes vantent sa racine pour combattre toutes sortes de venins.

ARRHENICON. (*Pharmacie.*) dénomination des grecs, & employée par quelques anciens pharmacographes pour désigner l'oxide d'arsenic jusjuré jaune, ou orpiment.

ARROCHE. (*Pharmacie.*) *Atriplex hortensis*. *Atriplex*. *Math.* 459. C'est une potagère annuelle, originaire de Tartarie, qui croît facilement dans nos jardins. On la trouve aussi en Sibérie. Elle est émolliente, humectante, anodine, relachante, antinephrétique, antiphlogistique. Elle est encore, suivant plusieurs auteurs utile contre les hémorroïdes, l'hyppocondrie, les inflammations & les douleurs de la goutte.

La semence d'arroche est vomitive & purgative contre le rachis, la jaunisse, l'épilepsie, & les vers. Elle entre dans la poudre de gnette.

L'arroche plaît aux bœufs, aux chèvres, aux moutons, & aux porcs.

(M. WILLEMET.)

ARROCHE HASTÉE. (*Pharmacie.*) *Atriplex aspera*. Cette arroche est Européenne, ses propriétés sont analogues à celles des espèces précédentes.

(M. WILLEMET.)

ARROCHE MARITIME. (*Pharmacie.*) *Atriplex laciniata*, *Atriplex maritima*. *Dod. Pempt.* 161. Cette plante se trouve en Europe & dans la Virginie septentrionale, près du rivage de la mer. On lui attribue les mêmes vertus qu'à l'arroche des jardins: Camerarius assure qu'elle est digestive, atténuante, apéritive, incitive.

(M. WILLEMET.)

ARSENIATES. On nomme arseniates dans la nomenclature moderne de la chimie, les combinaisons salines de l'acide arsénique avec les bases terreuses, alcalines & métalliques. Pour connaître la nature de ces sels, & pour fixer ici leurs propriétés générales, leurs caractères génériques, il est bon de rappeler les principaux faits relatifs à l'acide arsénique, & d'insister sur tout sur plusieurs de ceux où qui n'ont point été exposés à l'article ACIDE ARSENICAL du premier volume de ce dictionnaire, ou qui n'ont été présentés qu'en partie & trop vaguement, en raison ou de l'état d'incertitude où étoit encore la science chimique à l'époque déjà un peu reculée où la première partie de cet ouvrage a été rédigée par M. Morveau; les nouveaux détails en faisant connoître l'état actuel de la chimie, compléteront l'histoire de l'acide arsénique.

J'observerai avant tout, que le mot acide arsénical employé dans cette première partie du dictionnaire a été depuis changé en celui d'acide arsénique, suivant les règles de la nomenclature moderne, parce que cet acide est aussi acidifié, aussi oxygéné qu'il peut l'être; & d'après les mêmes principes ses combinaisons avec les bases doivent être nommées arseniates.

L'arsenic, comme toutes les substances combustibles, & sur-tout comme toutes les matières métalliques, peut se combiner avec des doses différentes d'oxygène, s'arrête en quelque sorte à différents degrés d'oxidation, & présente à chacune de ces oxidations des phénomènes nouveaux & des propriétés particulières. Quand on le chauffe avec le contact de l'air, il brûle avec flamme & il forme bientôt l'oxide blanc connu dans les arts sous le nom d'arsenic. Celui-ci sans être acide, offre cependant quelques propriétés des acides; il est acre, dissoluble dans l'eau; il rougit la teinture de tournesol, quoiqu'il v. diss. la couleur des violettes; il s'unit aux terres, aux alcalis, mix. qu'aux acides; il attrape plusieurs métaux & sur-tout le cuivre; le fer & le zinc; il forme même avec eux comme avec les terres & les alcalis des espèces de sels, des arseniates, dont quelques-uns

sont cristallifables suivant Bergman. Il décompose les sulfures terreux & alcalins. Mais ces caractères salins, ne sont que très-foibles encoire en comparaison de ceux qu'il peut acquérir par une nouvelle proportion d'oxygène. Il est vrai que l'arsénic reste avec une sorte de constance & de fixité dans cet état simple d'oxide, tant qu'on ne trouve pas le moyen d'y précipiter, d'y unir une grande quantité du principe acidifiant, en le lui présentant plus dense & plus près de se combiner qu'il ne l'est dans l'atmosphère. Car malgré l'observation de M. Landriani sur la conversion d'une partie d'oxide d'arsénic en acide arsénique, par le seul contact de l'air vital contenu dans l'air atmosphérique, en le tenant long-temps chaud dans un appareil distillatoire rempli d'air, cette conversion est très-peu de chose, par rapport aux vrais procédés qu'on possède aujourd'hui pour former l'acide arsénique, & il n'y en a jamais qu'une très-petite portion convertie ainsi en acide dans un appareil contenant beaucoup d'air. Ces procédés acidifians l'oxide d'arsénic, sont beaucoup plus multipliés que Schéele ne l'avoit cru, ou plutôt qu'ils ne l'étoient quand Schéele découvrit en 1775 la propriété de devenir acide dans l'arsénic. Le chimiste Suédois préparoit l'acide arsénique de deux manières différentes, qui ont été décrites dans le premier volume de ce dictionnaire; l'une consistoit à dissoudre l'oxide d'arsénic dans près de quatre fois son poids d'acide muriatique, pesant un quart environ plus que l'eau pure, à y ajouter en deux reprises, presque autant d'acide nitrique, & à distiller jusqu'à siccité. Dans l'autre on faisoit passer à travers de l'eau tenant deux fois son poids d'oxide d'arsénic diffus & mêlé, du gaz acide muriatique oxygéné produit par la distillation de l'acide muriatique sur l'oxide de manganèse, jusqu'à ce que tout l'oxide d'arsénic parût dissous; alors on trouvoit deux liqueurs dans le récipient; l'une contenoit de l'acide muriatique chargé d'un peu d'oxide d'arsénic, l'autre située au-dessous tenant en dissolution l'acide arsénique; on distilloit ces liqueurs à siccité, & l'acide arsénique ressoit pur & sous sa forme sèche au fond de la cornue. On reconnoit dans ces deux opérations de Schéele, la précipitation de l'oxygène dans l'oxide d'arsénic. L'acide nitrique seul produit cet effet. En distillant six parties d'acide nitrique pesant moitié plus que l'eau distillée sur une partie d'oxide d'arsénic, on voit l'acide nitrique devenir acide nitreux & même gaz nitreux; on sait que ce changement ne peut pas lui arriver sans qu'il s'en sépare de l'oxygène; ce principe en effet s'unit à l'oxide d'arsénic & l'acidifie; on chauffe assez ce dernier pour lui faire prendre la forme de verre, & on le dissout ensuite dans deux fois son poids d'eau distillée qu'on fait chauffer dessus. Il s'en sépare ordinairement un peu d'une terre très-légère, blanche & floconneuse, que Schéele a connue, & qu'il dit être un peu de silice enlevée à la cornue par l'acide en fusion. Or-

dinairement on prépare plus simplement l'acide arsénique, en chauffant dans une capsule ouverte huit parties d'acide nitrique foible à 28 ou 30 degrés de l'aréomètre de Baumé avec une partie d'oxide d'arsénic; on fait fondre ensuite cet acide dans un creuset.

En jetant de l'arsénic en poudre fine dans du gaz acide muriatique oxygéné, à mesure que le métal brûle, il absorbe assez d'oxygène pour être à l'état d'acide arsénique, mais cette manière de le préparer n'est pas économique, parce qu'il faut une très-grande quantité de gaz pour produire cet effet. On peut le former sur le champ, en dissolvant de l'oxide d'arsénic dans suffisante quantité d'acide muriatique oxygéné liquide, & dans un vaisseau fermé; quand la dissolution est faite, on évapore la liqueur à siccité & on obtient l'acide arsénique sec. On peut encore préparer l'acide arsénique en chauffant l'oxide d'arsénic avec de l'oxide de manganèse noir ou avec de l'oxide de mercure rouge; dans l'une & l'autre de ces opérations l'acide arsénique est formé; à la vérité avec le premier on a de l'arséniate de manganèse, tandis qu'avec le second le mercure, tout-à-fait réduit passe à l'état métallique dans le récipient. Quelques chimistes ont assuré qu'en distillant de l'oxide d'arsénic avec l'acide sulfurique à siccité, on avoit de l'acide arsénique; M. Landriani a sur-tout insisté sur cette préparation, & elle ne répugne point aux principes reçus puisqu'on fait que l'oxide d'arsénic donne de l'acide sulfureux, quand on le traite par l'acide sulfurique. Enfin M. Pelletier en décomposant à la manière de Macquer du nitrate d'ammoniaque par l'oxide d'arsénic & en séparant d'abord l'acide nitreux formé en raison de la fixation de l'oxygène dans l'oxide, a obtenu de l'acide arsénique pur en continuant de chauffer l'arséniate d'ammoniaque & en en dégagant l'ammoniaque.

On voit par ce court exposé qu'il y a un grand nombre de procédés propres à faire obtenir l'acide arsénique, & que tous ces procédés se rapportent à la fixation de l'oxygène dans l'acide d'arsenic. On n'a point encore déterminé la proportion de ce principe qui existe dans l'acide arsénique, & on ne connoit même pas celle qui, avec l'arsenic, constitue l'oxide blanc, & dont la proportion détermine la limite de l'état d'oxide le plus avancé à celui qui commence l'état d'acide; il faut même convenir que cette limite peut être très-difficile à fixer; puisque l'oxide d'arsenic a déjà quelques caractères d'acide. Il a même cela de particulier, & ce qui le fait différer des autres oxides métalliques, c'est qu'il fait d'une manière moins marquée qu'eux la double fonction de base & d'acide, & qu'il a bien plus de tendance à jouer le second rôle que le premier: en effet il s'unit bien mieux aux alcalis qu'aux acides, & il y a tel uni bien plus soliblement.

La fixité de l'acide arsénique, si éloignée de la volatilité de l'oxide qui sert à le former, est un

des caractères les plus singuliers de cette substance saline ; on peut le tenir tordu dans des creusets comme un verre, il ne se sublime plus. Cependant en le faisant rougir quelque temps il s'en dégage de l'air vital, & il repasse à l'état d'oxide en se volatilisant. L'acide arsénique est un violent poison ; il a plus de causticité & d'énergie sur les matières animales que n'en a l'oxide d'arsenic, & on reconnoit ici la force de l'oxigène & la puissance de son action sur l'économie animale.

L'acide arsénique attire l'humidité de l'air & se dissout facilement dans l'eau. Il se combine avec la silice & l'alumine par la fusion, de-là vient qu'il ronge le verre des cornues dans lesquelles on le fait fondre, & prend alors une couleur laiteuse ; quand on le dissout ensuite dans l'eau, il s'en précipite de la silice. En le chauffant assez dans un creuset pour le faire bouillir & le réduire par un grand feu presque tout à l'état d'oxide d'arsenic, à mesure qu'il s'en dégage de l'air vital, une portion reste attachée aux parois du creuset, & se fond que difficilement, & présente une couverture très-adhérente au creuset. Schéele a trouvé que cet enduit étoit un composé d'alumine & d'acide arsénique, & de l'arsenic d'alumine.

Le charbon n'a point d'action sur l'acide arsénique par la voie humide & par la simple digestion ; mais il en a une très-forte par la voie sèche, & en élevant à un certain point la température. Une partie d'acide arsénique sec, & une demi-partie de charbon en poudre bien mélangées & mises dans une cornue de verre, chauffée jusqu'à ce que le fond de ce vaisseau devienne rouge, prennent tout-à-coup feu & produisent une gerbe d'artifice très-belle ; on trouve sublimé dans le col de la cornue de l'arsenic métallique très-brillant & très-pur, mêlé d'un peu d'oxide d'arsenic blanc & de poudre de charbon : il y a toujours un peu d'eau dans le récipient, & il se dégage beaucoup de gaz acide carbonique. Il est facile de concevoir la théorie de cette expérience, quand on entend bien celle de la formation de l'acide arsénique. Le carbone à une haute température, a plus d'attraction pour l'oxigène que n'en a l'arsenic ; il s'en empare donc avec vivacité, & c'est à cette combinaison qu'est due la décomposition de l'acide arsénique & la formation de l'acide carbonique. Mais il se passe dans cette décomposition un phénomène qui pourroit présenter une difficulté pour ceux qui n'alloient bien l'ensemble de la doctrine moderne, & dont l'explication mérite quelques détails ; c'est l'inflammation du charbon qui a lieu & qui se fait même avec violence (suivant l'expression de Schéele). Les chimistes français qui ont créé la nouvelle doctrine qu'on appelle pneumatique, parce qu'elle est en effet fondée sur une connoissance approfondie de l'air & des gaz, pensent assez généralement, 1°. que la flamme provient de la lumière qui se dégage de l'air vital à mesure que la base pesante & solidifiable de cet air ou l'oxigène, se fixe dans

les corps combustibles ; 2°. que cette lumière, comme le calorique qui l'accompagne & qui tient avec elle l'oxigène fondu en fluide élastique, se dégage en quantité d'autant plus grande que l'oxigène se fixe plus solide & sous un plus petit volume dans les corps combustibles ; 3°. qu'anti lorsqu'une matière inflammable enlève à un corps brûlé l'oxigène qu'il contient en raison d'une plus grande affinité pour ce principe, elle est par rapport à la lumière dans l'un ou l'autre des trois cas suivans, 1°. ou bien elle absorbe l'oxigène à-peu-près dans un même état de solidité que celui où il est dans le corps brûlé, alors le transport de ce même principe se fait facilement, sans flamme, & même à froid ; telles sont les réductions des oxides métalliques dissous dans les acides par d'autres matières métalliques ; l'oxide d'argent par le mercure, l'oxide de mercure par le cuivre, l'oxide de cuivre par le fer ; 2°. ou bien la matière inflammable absorbe l'oxigène plus solide qu'il ne l'est dans la première combinaison, & alors pendant cette absorption, il se dégage de la lumière, & du calorique, il y a inflammation, &c. Elle est l'inflammation du phosphore par l'acide nitrique, par l'acide muriatique oxigéné, &c. 3°. ou bien enfin la matière combustible a besoin de prendre l'oxigène plus divisé, plus rare qu'il ne l'est dans le corps brûlé auquel elle s'enlève, & alors pendant que cet enlèvement a lieu, & même pourqu'il puisse avoir lieu, non-seulement il ne doit pas se décharger de lumière de l'oxigène, il faut au contraire ajouter de la lumière & du calorique, il faut chauffer & faire rougir plus ou moins fortement les deux substances ; c'est ce qui se passe pendant la décomposition de l'acide phosphorique vitreux, par le charbon, & ce dernier exemple même peut être appliqué directement ici. Il est très-vraisemblable que la combinaison du carbone avec l'oxigène ou l'acide carbonique, qui prend si facilement la forme de gaz, contient l'oxigène moins solide que l'acide phosphorique vitreux, & l'on conçoit bien d'après cela pourquoi lorsqu'on veut faire passer l'oxigène de l'acide phosphorique dans le carbone, il faut ajouter beaucoup de calorique & de lumière ; mais il semble y avoir ici un effet inverse quoique dans des circonstances analogues. En effet l'acide arsénique paroit contenir l'oxigène beaucoup plus solide que l'acide carbonique ; on en a la preuve par l'inflammation de l'arsenic qui a lieu dans le gaz acide muriatique oxigéné, tandis que le charbon ne s'y enflamme pas, & comme on pourroit concevoir d'après cela que le carbone en absorbant l'oxigène de l'acide arsénique sépare encore de la lumière, quoiqu'il ne semble pouvoir s'y combiner qu'en y ajoutant ce dernier principe : pour faire voir exactement qu'elle est la valeur de cette difficulté, il me suffira de faire observer que cette opinion sur la quantité de lumière diverse contenue dans l'oxigène uni à différents corps n'est fondée que sur la masse de lumière qu'on voit se dégager très-diversément en effet de l'air vital dans les

diverses combustions, & que nos yeux nous trompent vraisemblablement; nous ne jugeons que d'après ce que nous voyons, & il se peut que de deux corps qui se combinent en même temps avec l'oxygène, celui qui dégage à nos yeux le plus de lumière, en retient cependant plus que celui qui en dégage le moins; c'est plutôt la rapidité du dégagement que notre vue juge, que la quantité réelle; sans vouloir assurer qu'il n'y a aucune difficulté dans la nouvelle doctrine, il est nécessaire au moins de faire voir que celle-ci n'est qu'apparente, qu'elle ne tient qu'à une erreur, à une illusion optique, & qu'on ne doit pas se hâter de juger cette grande question sur le premier rapport de nos yeux. On reviendra en détail sur ce fait aux articles LUMIÈRE & PHOTOMÈTRE.

L'acide arsénique chauffé avec un sixième de son poids de soufre s'y combine avec vivacité, présente un bouillonnement, une effervescence produite par le dégagement du gaz sulfureux, & se sublime en sulfure d'arsenic rouge. Ainsi le soufre à une haute température, enlève une portion d'oxygène à l'acide arsénique, & après l'avoir en partie réduit, se combine avec son radical métallique.

Le gaz hydrogène décompose l'acide arsénique, en faisant passer ce gaz lentement, & à l'aide de tubes très-fins, dans des vaisseaux longs & étroits remplis de dissolution d'acide arsénique; on voit se déposer, au bout de plusieurs heures, une poudre noire qui est de l'arsenic métallique.

Les matières métalliques éprouvent toutes plus ou moins d'altération par l'acide arsénique; elles tendent toutes à lui enlever de l'oxygène, & à se brûler en le décomposant, de sorte qu'il ne peut pas se former d'arsénates métalliques, mais seulement des arsénites par l'action immédiate des métaux, & sur-tout, les plus avides d'oxygène, sur l'acide arsénique.

Quant aux oxides métalliques, il paroît que le plus grand nombre est susceptible de s'unir immédiatement à l'acide arsénique. Ceux d'entre eux qui sont très-avides d'oxygène, ou qui tendent à devenir acides, doivent ou se combiner peu à l'acide arsénique, lorsqu'ils sont saturés d'oxygène, ou décomposer plus ou moins d'acide, en lui enlevant une portion de son principe acidifiant. Il est des oxides métalliques qui paroissent susceptibles de s'unir à l'acide arsénique dans leur premier degré d'oxidation, & qui refusent de s'y combiner, lorsqu'ils ont atteint le maximum de cette oxidation; il en est aussi qui, après y être restés unis pendant quelque temps, s'en séparent ensuite à mesure qu'ils enlèvent de l'oxygène soit à l'air, soit à l'acide arsénique même; dans ce dernier cas, on voit cet acide devenu simple oxide se précipiter de la dissolution sous la forme d'une espèce de gelée: le fer a sur-tout cette propriété.

Enfin, il paroît qu'il existe des métaux qui, dans l'état d'oxides, ont tant d'affinité pour l'acide arsénique, que cette force devient une affinité disposante qui les rend susceptibles de décomposer l'eau, & que mis en contact avec une dissolution d'acide arsénique, ils donnent du gaz hydrogène, & forment ainsi des arsénates. Au reste, cette partie des propriétés de l'acide arsénique n'est point encore suffisamment connue, & elle offre encore une carrière nouvelle pour les travaux des chimistes.

Schæele a traité les principaux sels neutres ou moyens par l'acide arsénique, à la chaleur de la distillation dans des cornues de verre. Cet acide décompose les sulfates de potasse & de soude; on diroit qu'il passe alors à l'état d'acide arsénique oxigéné, puisqu'il dégage l'acide sulfurique, en partie sous la forme d'acide sulfureux. Mais cela peut venir de ce que l'acide arsénique contenoit encore une portion d'oxide d'arsenic: à l'aide d'une grande chaleur, l'acide arsénique décompose les nitrates & en dégage l'acide nitrique; il reste des arsénates dans le fond de l'appareil distillatoire. Il en est de même du muriate de soude qui est décomposé, & donne de l'acide muriatique lorsqu'on le traite à une haute température avec l'acide arsénique. En décomposant, par le même procédé, le muriate d'ammoniaque par l'acide arsénique, Schæele a obtenu de l'acide muriatique, & ensuite de l'ammoniaque; l'acide arsénique a resté pur dans la cornue. Cependant, une partie a été décomposée & réduite en oxide volatil, comme cela arrive à l'arséniate d'ammoniaque. L'acide sulfurique est aussi chassé du sulfate de chaux, & même du sulfate de baryte par l'acide arsénique; mais cela n'a lieu, sur-tout pour le dernier sel, qu'à une chaleur extrême. L'acide fluorique est dégagé du fluaté de chaux natif par l'acide arsénique.

Les huiles volatiles, les huiles grasses, le sucre, le miel, &c. digérés avec l'acide arsénique, lui enlèvent aussi une grande partie de son oxygène, & le rapprochent plus ou moins de l'état métallique.

Tels sont les principaux caractères que présente l'acide arsénique pur, qui n'ont point été exposés à l'article ACIDE ARSENICAL du premier volume de cet ouvrage, & que j'ai cru devoir tracer ici, pour mieux faire concevoir les propriétés des arsénates.

Il n'est plus besoin de présenter d'autres détails pour expliquer la différence qui existe entre les combinaisons de l'oxide d'arsenic, & celles de l'acide arsénique. La proportion plus grande de l'oxygène dans ce dernier que dans le premier, explique assez la cause & la nature de cette différence; mais il est nécessaire de consigner à la suite des propriétés de l'acide arsénique, celles

des arsénates, en les considérant comme formant un genre de substances salines très-importantes, & qui peuvent fournir des instrumens utiles pour les arts, & des moyens avantageux d'analyse pour les expériences chimiques; il faut, en un mot, tirer les caractères génériques des arsénates pour les faire facilement reconnoître.

Les arsénates ne sont assez connus que depuis Schéele; Macquer a découvert le premier, & le mieux connu ces sels. Voyez ARSÉNATE DE POTASSE. On doit les distinguer en trois sections; 1°. Les arsénates terreux au nombre de quatre, ou les combinaisons de l'acide arsénique avec l'alumine, la baryte, la magnésie & la chaux; on peut même compter un arsénate de silice; voyez ce mot; 2°. les arsénates alcalins, ou les combinaisons de l'acide arsénique avec les trois alcalis, la potasse, la soude, & l'ammoniaque; 3°. les arsénates métalliques, ou les composés de l'acide arsénique avec les dix-sept oxides métalliques, d'arsenic, de tungstène, de molybdène, de cobalt, de bismuth, de nickel, de manganèse, d'antimoine, de zinc, de mercure, d'étain, de plomb, de fer, de cuivre, d'argent, d'or & de platine.

Tous les arsénates, quoique présentant chacun des propriétés spécifiques & distinctives, se ressemblent & se rapprochent par quelques propriétés générales; tous sont, par exemple, décomposés par l'acide sulfurique; tous exposés sur des charbons ardens ou chauffés avec du charbon en poudre dans des vaisseaux fermés, se décomposent. Dans le premier cas, on observe une vapeur arsénicale qui infecte l'air de son odeur d'ail, & la base de l'arsénate reste plus ou moins fixe sur le charbon: dans le second cas, il se sublime de l'arsenic métallique à la partie supérieure du vaisseau distillatoire, & la base se retrouve au fond de l'appareil, quand elle n'est pas volatile, ce qui n'a lieu que pour l'ammoniaque, comme on le verra dans l'article de chaque sel. Ces deux phénomènes ne diffèrent qu'en ce que, dans le premier, l'arsenic réduit brûle par le contact de l'air, tandis que, dans le second, il ne peut pas brûler dans le vide, & doit se sublimer sans altération.

Les arsénates paroissent aussi susceptibles de se trouver dans plusieurs états, & sur-tout bien neutres, ou avec un excès d'acide arsénique. Enfin, il est vraisemblable qu'ils forment aussi facilement des sels triples, dont on connoît, à la vérité, encore très-peu l'existence & les propriétés caractéristiques. Si les arsénates sont très-décomposables par le charbon & par le soufre qui, en réduisant l'acide arsénique, forme en effet de l'orpiment ou du réalgar avec son oxide ces sels, ne sont nullement par le calorique seul. On peut même les faire brûler dans des cornues sans qu'ils éprouvent d'altération sensible.

C'est à ces propriétés seulement, qu'on doit

Chimie. Tome II.

borner leurs caractères génériques; & toutes les autres varient dans chaque espèce, & on trouve des loix particulières à chacun d'eux, par rapport à leur forme, leur dissolubilité, leur cristallibilité, & les attractions différentes des bases pour l'acide arsénique. Il ne reste donc plus qu'à traiter actuellement chaque arsénate en particulier.

ARSÉNATE ACIDULE DE POTASSE. Schéele a remarqué que le sel neutre découvert par Macquer, & qu'on a nommé jusqu'à l'établissement de la nouvelle nomenclature, *sel neutre arsénical de Macquer*, n'est pas véritablement un sel neutre, mais qu'il contient un excès d'acide, au point qu'il rougit la teinture de tournesol; mais comme cet excès d'acide est peu sensible, & que ce sel est beaucoup plus connu & beaucoup plus employé comme arsénate simple, on remet à parler de cette circonstance particulière à l'article ARSÉNATE DE POTASSE.

ARSÉNATE D'ALUMINE. Ce sels est peu connu. Schéele dit que l'alumine précipitée du sulfate acide d'alumine ou de l'alun par les alcalis fixes & bien lavée, se dissout encore humide dans l'acide arsénique liquide. Cette dissolution est épaisse comme un mucilage; elle ne fournit point de cristaux, au moins d'après ce qu'on en fait jusqu'à présent. Sans doute cet arsénate d'alumine est décomposé par les alcalis fixes, la chaux, la magnésie & la baryte, comme tous les sels qui ont la même base; aussi Bergman met-il l'alumine après les autres terres & les alcalis dans la neuvième colonne de sa table des attractions électives. L'arsénate d'alumine chauffé fortement, entre en fusion sans perdre son acide ni se décomposer. Le charbon & plusieurs métaux le décomposent en enlevant l'oxygène à l'acide arsénique. On ne connoît pas l'action de l'air, de l'eau & de beaucoup d'autres substances sur ce sel. On doit se rappeler que l'acide arsénique dissout l'alumine par la voie sèche ou la fusion, & qu'il agit violemment sur les creusets. Schéele observe que cet acide ne décompose pas le sulfate, le nitrate & le muriate d'alumine, mais bien l'acetate d'alumine. Cependant lorsque l'acide arsénique est uni à d'autres bases & dans l'état de sel neutre, il enlève l'alumine aux trois premiers acides indiqués, à l'aide d'une double attraction. L'arsénate d'alumine n'est encore d'aucune utilité connue.

ARSÉNATE D'AMMONIAQUE. Schéele qui a combiné l'acide arsénique avec toutes les bases connues, a trouvé les propriétés suivantes dans l'arsénate ammoniacal. Par l'évaporation à l'air libre, ce sel donne des cristaux semblables à l'arséniate de potasse. S'il contient un excès d'acide, on en obtient des cristaux acidules en longues aiguilles & déliquescentes. L'arsénate d'ammoniaque

Ggg

ne change point la teinture de tournesol, & verdit celle de violettes ; il perd fa transparence à une légère chaleur. Si on le met en distillation dans une cornue, on en obtient de l'ammoniaque pure. La matière se fond, il se sublime de l'arsenic, & il reste de l'acide arsénique fondu au fond du vaisseau. Schéele attribue la réduction de l'acide arsénique à la décomposition de l'ammoniaque. Le passage remarquable de sa dissertation sur ce point, doit être inséré ici ; il sera voir combien de vues contiennent les ouvrages de cet homme célèbre. La réduction de l'acide arsénique en arsenic ne peut être ici attribuée, dit-il, à la chaleur de la distillation, puisque cet arsenic se sublime, avant que le résidu ou l'acide arsénique soit fondu. Il en résulte que pendant la distillation, l'acide arsénique a décomposé une partie de l'ammoniaque. Dans mes expériences sur l'oxide de manganèse, j'ai remarqué que, lors de la décomposition de l'ammoniaque, il se dégageoit une espèce de gaz. J'ai observé ici la même chose ; j'ai distillé une once d'arséniate d'ammoniaque dans une petite cornue ; j'ai employé au lieu de récipient une vessie sèche. Aussitôt que l'arsenic s'est sublimé au col de la cornue, la vessie s'est enflée, & ce gaz ressembloit exactement à celui qu'on retire de l'oxide de manganèse & du muriate ammoniacal. On voit bien que le gaz dont il est ici question, est du gaz azote, & qu'il se sépare à mesure que l'hydrogène de l'ammoniaque se porte sur l'oxigène de l'acide arsénique.

Depuis les découvertes de Schéele, M. Pelletier a examiné quelques propriétés de l'arséniate d'ammoniaque, & il en a consigné l'histoire dans le journal de physique, (année 1782, tome 19, page 127.) Ce chimiste, après avoir constaté que l'oxide d'arsenic décompose le nitrate d'ammoniaque, comme le nitrate de potasse & le nitrate de soude, qu'il n'y a pas de détonation dans cette opération, parce que l'acide nitreux est dégagé avant que la réaction sur l'ammoniaque ait lieu ; que l'arséniate d'ammoniaque est décomposable par un grand feu, & qu'il reste après cela de l'acide arsénique pur, a combiné ce dernier tombé en déliquescence à l'air avec ce nouvel ammoniaque, & en a étudié les caractères. Ayant pris du carbonate d'ammoniaque pour faire cette saturation, il a remarqué qu'il y avoit une très-vive effervescence, & qu'il falloit une grande quantité de ce sel pour saturer l'acide arsénique. Il a évaporé la liqueur, jusqu'à ce qu'elle pût cristalliser : il a obtenu un sel d'une forme très-différente de celle des arsénites de potasse & de soude, quoique Schéele dise qu'elle est semblable. Les cristaux d'arséniate ammoniacal très-prononcés étoient rhomboïdaux, & ressembloient assez au nitrate de soude. Il y a certainement loin de cette forme à celle de prismes quarrés que présente l'arséniate de potasse. L'arséniate d'ammoniaque mis sur les charbons ardens, non-seulement se décompose comme tous les arse-

niates, en donnant des vapeurs d'oxide d'arsenic, mais ne laisse aucun résidu : ce qui tient à la volatilité de sa base. On voit que M. Pelletier n'a point observé la décomposition & la réduction d'une partie de l'acide arsénique par l'ammoniaque, sur laquelle Schéele a insisté d'une manière particulière, comme on l'a fait remonter plus haut. Cela dépend de la température qu'on emploie. A une chaleur douce, employée par M. Pelletier, l'ammoniaque se dégage ; elle se décompose au contraire, ainsi que l'acide arsénique, à une chaleur forte & brusquement appliquée. Je me suis assuré que l'arséniate d'ammoniaque est décomposé par la chaux, la baryte, la potasse & la soude. Ce sel n'est d'aucun usage.

ARSENATE D'ANTIMOINE. Suivant Schéele, l'acide arsénique liquide agit par la digestion sur l'antimoine ; il se sépare une grande quantité de poudre blanche ou d'oxide blanc d'antimoine. La dissolution claire versée dans l'eau, déposée aussi beaucoup d'oxide ; mais cet oxide contient de l'acide arsénique. Il n'en est pas moins dissoluble dans l'acide muriatique, & susceptible d'en être ensuite précipité par l'eau. En distillant une partie de sulfure d'antimoine avec trois parties d'acide arsénique, le mélange s'enflamme ; dès qu'il entre en fusion, il se sublime de l'arsenic & une matière roussâtre ; on obtient un peu d'acide sulfureux. L'eau bouillante appliquée au résidu, dissout l'acide arsénique, & laisse une poudre blanche, brillante, qui, traitée à la distillation avec du charbon par un feu violent, donne de l'arsenic sublimé & de l'antimoine au fond du vaisseau.

On reconnoit bien dans les expériences de Schéele le jeu de l'oxigène sur deux substances métalliques qui en sont avides ; mais on ne trouve rien de positif sur l'arséniate d'antimoine.

Schéele ajoute à ces premiers détails que l'acide arsénique ne précipite point le muriate d'antimoine, quoique les arsénites alcalins opèrent cette précipitation par une double affinité. L'acétate & le tartrate d'antimoine font précipités par l'acide arsénique. Ces phénomènes indiquent que l'arséniate d'antimoine est peu dissoluble. Ce sel, comme on voit, peu connu, n'est point employé, même pour les opérations de chimie.

ARSENATE D'ARGENT. Schéele décrit dans le § XXVI de sa dissertation sur l'arsenic & son acide, de très-belles expériences sur la combinaison de cet acide avec l'argent, l'air la digestion, l'acide arsénique n'attaque pas ce métal ; mais si l'on chauffe assez pour enlever toute l'eau, & opérer la fusion de l'acide arsénique solide, on obtient un sublimé d'arsenic qui annonce que l'acide a perdu une partie de son oxigène qui se porte sur l'argent. En effet, après un quart-d'heure de fusion dans l'expérience de Schéele, tout l'argent fut dissous. La cornue refroidie & cassée contenoit un

verte; blanc, presque transparent; celui de ce vaisseau étoit couvert d'un enduit vitreux, d'un jaune foncé. J'ai décrit à l'article de l'ARGENT, des expériences dans lesquelles le nitrate de ce métal réduit dans des cornues de verre, faisoit dans celles-ci un émail brun ou marron, manifestement coloré par de l'oxide d'argent; on reconnoit ici un effet analogue, une combinaison de l'oxide d'argent avec le verre de la cornue. La couleur variée de cet émail dépend certainement de la nature du verre, & de la proportion ainsi que de l'état des oxides de manganèse & de plomb qu'il contient.

L'arséniate d'argent vitreux & presque transparent, qui résulte de l'opération décrite ci-dessus, étant pulvérisé & mis avec de l'eau distillée chaude, perd sur le champ sa transparence, & devient d'un rouge brun. L'acide arsénique est dissous, & il entraîne un peu d'oxide d'argent que l'acide muriatique enlève & précipite en flocons blancs pesans; il reste après cette dissolution une poudre brune qui se fond au feu, sans dégager d'arsenic, & qui après son refroidissement, présente une masse brune, transparente vers les bords; il paroît que cette masse est une espèce d'arséniate d'argent ou une combinaison d'oxide d'arsenic & d'oxide d'argent; chauffée fortement dans un creuset couvert, elle se réduit en argent, que Schéele a trouvé entouré d'un verre blanc. On ne doute point d'après cet exposé de l'expérience de Schéele, qu'à une haute température l'argent ne décompose en partie l'acide arsénique, & ne forme ainsi une espèce fort singulière d'arséniate d'argent qui prend par la fusion la forme d'un émail blanc, & qui se partage ensuite par l'eau en deux combinaisons différentes l'une de l'autre par la proportion des deux métaux & de l'oxigène.

L'acide arsénique pur précipite en partie la dissolution nitrique d'argent; les sels neutres arséniques ou les arsénates alcalins la décomposent complètement. Il se forme un précipité brun, qui paroît être la couleur propre de l'arséniate d'argent. Ce précipité est décomposable par l'acide muriatique & dissoluble dans l'ammoniaque.

Un mélange de parties égales d'acide arsénique & d'acide muriatique liquide, digéré pendant une quinzaine de jours sur l'argent divisé comme il l'est lorsqu'on l'a précipité de sa dissolution nitrique par le cuivre, agit sensiblement sur ce métal. Il prend la forme d'une poudre blanche. Schéele a reconnu cette poudre pour du muriate d'argent. En dissolvant la liqueur lumineuse sur cette poudre, il a obtenu de l'acide muriatique qui tenoit de l'oxide d'arsenic en dissolution. Ainsi l'acide arsénique qui dans son état liquide, n'est point décomposé par l'argent seul, en devient susceptible par l'addition de l'acide muriatique; on reconnoit ici l'influence d'une attraction dispoñante.

ARSÉNIATE D'ARSENIC. Schéele n'a rien dit

de l'arséniate d'arsenic. Il s'est contenté d'observer 1°. que l'arsenic métal digéré dans l'acide arsénique liquide, se couvre d'une poudre blanche d'oxide d'arsenic; 2°. qu'en traitant à la distillation une partie d'arsenic avec deux parties d'acide arsénique sec, le premier se sublime, & l'acide se fond; que si l'on jette de l'arsenic en poudre sur l'acide arsénique en fusion, il se produit une inflammation, & si se sublime de l'oxide d'arsenic blanc. Ces expériences de Schéele apprennent seulement qu'en traitant l'arsenic pur, ou dans l'état métallique par l'acide arsénique, l'oxigène se partage également entre ces deux matières, & il en résulte que l'une revient & l'autre arrive à l'état d'oxide; mais il n'est pas question dans ces détails de l'union de l'acide arsénique avec l'oxide d'arsenic, union qui doit former l'arséniate d'arsenic. Aucun chimiste n'a encore parlé de cette combinaison, & on doit la compter parmi les inconnus de cette science.

ARSÉNIATE DE BARYTE. Il n'y a que très-peu de faits dans la dissertation de Schéele sur la combinaison de la baryte avec l'acide arsénique. Suivant lui, la baryte se dissout facilement dans l'acide arsénique liquide; la dissolution approchant de la saturation, l'arséniate de baryte se sépare de l'eau. L'acide arsénique n'enlève point la baryte aux acides sulfurique, nitrique, muriatique & acéteux; mais les trois derniers sont décomposés par les arsénates alcalins, & de cette décomposition résulte de l'arséniate de baryte.

L'arséniate de baryte se fond par la chaleur, sans éprouver d'altération; chauffé avec du charbon, il s'en sépare de l'arsenic par la décomposition de l'acide arsénique. L'acide sulfurique enlève la baryte à ce sel.

A ces faits indiqués par Schéele, j'en ajouterai plusieurs autres que j'ai eu occasion d'observer dans les expériences destinées aux démonstrations de mes cours.

L'arséniate de baryte cristallise en petits solides minces & plats, qui présentent quatre pans inégaux. La meilleure méthode de le préparer, consiste à mêler de l'acétite de baryte avec de l'arséniate de potasse, tous les deux en dissolution un peu rapprochés. On voit bientôt se former des aiguilles brillantes qui se déposent. Si les dissolutions sont trop étendues, il faut les évaporer sur leur mélange. En conduisant lentement cette évaporation, on obtient des cristaux purs & assez réguliers d'arséniate de baryte. Ce sel ne paroît se décomposer qu'à la dernière violence du feu. Il paroît que parmi les différentes bases alcalines & terreuses qui peuvent être unies à l'acide arsénique, il n'y a que la chaux qui soit susceptible de décomposer l'arséniate de baryte. Il paroît encore qu'il est insatiable par tous les sels neutres, si l'on en excepte les sulfates par rapport à l'acide sulfurique qui enlève par-tout la baryte, les sels cal-

taires par rapport à la chaux qui absorbe pas-tout l'acide arsénique, & les carbonates alcalins qui agissent alors par une double attraction.

L'arséniate de baryte n'a point encore été employé à rien. Il pourroit servir pour reconnoître la présence de l'acide sulfurique dans des composés arsénicaux.

ARSÉNIATE DE BISMUTH. Le bismuth, d'après les expériences de Schéele, est attaqué par l'acide arsénique liquide. Mis en digestion avec cet acide, il se couvre d'un oxide blanc en poussière, & il est précipité abondamment par l'eau. Ce précipité est de l'arséniate de bismuth. Trois parties d'acide arsénique & une partie de bismuth traitées par la distillation, entrent en fusion; le bismuth sur oxide; une partie de l'acide arsénique sublimé en métal; le lavage emporte l'acide, & laisse un oxide de bismuth indissoluble. L'acide arsénique précipite le nitrate de bismuth; ce précipité est difficile à fondre, il paroît indissoluble; lorsqu'on le traite avec du charbon, les deux métaux se réduisent. L'arséniate de bismuth n'est point employé; on voit qu'il n'a point été assez examiné, pour qu'on en connoisse les propriétés. Il paroît que l'oxide de bismuth n'adhère point à l'acide arsénique, & qu'il tend lui-même à prendre le caractère salin, peut-être même à devenir acide. Voyez l'article BISMUTH.

ARSÉNIATE DE CHAUX. Les propriétés de l'arséniate de chaux sont encore peu connues; elles mériteroient cependant d'être étudiées avec soin. Voici ce qu'on a déjà découvert sur ce point, c'est presque à Schéele seul que l'on doit ces découvertes; j'ai répété avec soin toutes ses expériences sur ce sel, & je puis en assurer l'exactitude. En jetant de l'eau de chaux dans une dissolution d'acide arsénique, il se forme un précipité blanc en flocons assez pesans. Ce précipité disparoit tant qu'il y a un excès d'acide, & l'arséniate de chaux paroît être extrêmement dissoluble dans l'acide arsénique: si on évapore cette dissolution acide, on obtient de petits cristaux polyèdres, assez brillans, dont on n'a point déterminé la forme. L'eau de chaux décompose tous les arséniates connus, & donne dans toutes leurs dissolutions un précipité semblable à celui que je viens d'indiquer. On n'a point appréciée la dissolubilité de l'arséniate calcaire; elle paroît n'être pas très-forte. Lorsqu'on fait ce sel en jetant du carbonate de chaux en poudre, ou de la craie dans l'acide arsénique liquide, les premières portions de craie se dissolvent & disparaissent, en oisrant une légère effervescence; mais bientôt à mesure qu'on ajoute du carbonate de chaux, la dissolution d'arséniate calcaire devient épaisse par la quantité considérable de petits cristaux qui s'en séparent. Schéele qui a décrit ce phénomène, n'en a point indiqué la cause. Je pense que cela est dû à ce que l'acide carbonique

en se dissolvant dans l'eau, retient d'abord l'arséniate de chaux en dissolution; mais quand la quantité de celui-ci augmente, comme celle de l'acide carbonique ne suffit plus à le dissoudre, comme d'ailleurs cet acide est infiniment plus dissoluble que l'arséniate de chaux, ce dernier doit bientôt se précipiter.

L'arséniate de chaux n'est pas décomposable par le feu; il entre en une espèce de fusion, mais il retient fortement son acide. En le traitant à un grand feu avec du charbon, on obtient de l'arséniate en métal sublimé; le résidu formé de charbon & de chaux contient toujours un peu d'acide arsénique; c'est une espèce d'arséniate avec excès de chaux, ce qui prouve que l'acide arsénique tient avec force à la chaux. L'arséniate de chaux est décomposable par les acides sulfurique, nitrique, & muriatique. Ce premier versé dans une dissolution d'arséniate calcaire, précipite du sulfate de chaux.

Les arséniates alcalins décomposent le nitrate & le muriate de chaux, & forment dans leur dissolution de l'arséniate calcaire qui se précipite.

Quand on distille du nitrate de chaux avec de l'oxide d'arsenic blanc, il se dégage de l'acide nitreux & du gaz nitreux, il reste dans la cornue de l'arséniate de chaux; ici, comme dans la décomposition des autres nitrates par l'oxide d'arsenic, l'acide nitrique est décomposé, son oxygène se porte sur l'oxide d'arsenic, le convertit en acide, & alors l'acide nitreux, devenu très-foible, se dégage & cède la chaux à l'acide arsénique. On n'a point encore fait usage de l'arséniate de chaux. Il pourra peut-être devenir très-utile dans les arts, comme plusieurs autres espèces d'arsénates.

ARSÉNIATE DE COBALT. On connoît peu l'arséniate de cobalt. Schéele a consigné dans sa dissertation quelques faits sur les phénomènes que présente l'action réciproque de l'acide arsénique & du cobalt. Cet acide liquide chauffé sur du cobalt en poudre, prend une couleur rose-rouge, quoiqu'il reste beaucoup de cobalt non dissous. On fait en effet qu'il ne faut que très-peu d'oxide de cobalt, pour donner à une grande quantité d'acide la couleur rose: Schéele n'a point indiqué les quantités réciproques d'acide arsénique & de cobalt qu'il a prises pour faire ses expériences. Ayant distillé un mélange d'acide arsénique & de cobalt en poudre, jusqu'à ce que l'acide ait été desséché, toute la masse entra en fusion, lorsque le feu devint un peu fort; bientôt il se sublima de l'arsenic en métal. L'appareil étant refroidi presenta une substance vitreuse, violette & demi-transparente; mise dans l'eau & sur du sable chaud, l'acide arsénique sur dissous, & présentoit une couleur rouge obscure; la nuance violette de la masse fut dans l'instant détruite; le fond de la cornue eut devenant bleu, & il est aisé de concevoir pourquoi aucun dissolvant ne put enlever cette couleur au verre,

puisque celui-ci étoit intimement combiné avec une portion d'oxide de cobalt. Tels sont les phénomènes que Schéele a décrits ; mais il n'a rien ajouté sur les propriétés de l'arséniate de cobalt.

Suivant lui, l'acide arsénique ne précipite aucune des dissolutions de cobalt ; mais tous les arséniates alcalins & solubles décomposent les sels cobaltiques ; il se forme alors un précipité rose , plus ou moins rouge , qui , chauffé dans un creuset , ne se fond que difficilement , & prend l'apparence d'une scorie bleue foncée. L'arséniate de cobalt n'est encore d'aucun usage.

ARSENATE DE CUIVRE. Schéele a fait le même genre de travail sur la combinaison de l'acide arsénique avec le cuivre ; il n'a examiné que l'action réciproque de ces deux substances , & il n'a presque rien dit de l'arséniate de cuivre lui-même. L'acide arsénique liquide attaque le cuivre à l'aide de la chaleur ; on obtient une dissolution verte , qui laisse précipiter beaucoup d'une poudre blanche bleuâtre. Cette poudre est , suivant Schéele , un composé d'acide arsénique & d'oxide de cuivre. Cependant , si le cuivre est , comme il le paroît , oxidé par l'acide arsénique , la poudre blanche paroît être de l'oxide d'arsenic mêlé ou combiné avec de l'oxide de cuivre , c'est-à-dire , une espèce d'arsénite de cuivre plutôt qu'un arséniate.

Une partie de limaille de cuivre mêlée à deux parties d'acide arsénique en poudre poussées au feu dans une cornue , entretient en fusion. Il se sublime de l'arsenic au col du vaisseau ; la masse fondue étoit bleue ; bouillie dans l'eau , elle forma une dissolution de la même couleur ; il s'en sépara une poudre bleuâtre , semblable à celle qui se sépare de l'acide arsénique liquide chauffé sur le cuivre ; il resta dans la cornue une portion de poudre non dissoute. Le fond de ce vaisseau avoit des taches jaunes & d'un brun rouge qu'aucun dissolvant ne put enlever , & qui provenoient d'une combinaison de l'oxide de cuivre avec le verre.

Les dissolutions de cuivre dans les acides minéraux ne sont pas précipitées par l'acide arsénique , mais donnent un précipité bleu d'arséniate de cuivre , quand on y ajoute les arséniates alcalins ; l'acétate de cuivre fournit le même précipité par l'acide arsénique pur. Ce précipité d'arséniate de cuivre bien lavé & séché , ayant été exposé dans un creuset à l'action d'un feu très-vif , soutenu pendant une heure , se fondit en une espèce de scorie vitreuse brune , dont l'enduit forma sur les parois de ce vaisseau un vernis d'un jaune brun. Cette scorie fut réduite en arsenic métallique sublimé & en cuivre , en la chauffant dans une cornue avec du noir de fumée.

Il paroît , d'après ces expériences de Schéele , que l'arséniate de cuivre est un sel bleuâtre , pulvérulent , fusible en un émail brun , très-peu dissoluble. Ce sel n'est point employé ; il pourroit être utile aux émailleurs.

ARSENATE D'ÉTAIN. L'étain sur lequel on fait chauffer l'acide arsénique liquide , prend d'abord une couleur noire ; se couvre ensuite d'un oxide blanc , mêlé d'oxide d'arsenic & d'étain , & forme à la fin une masse gélatineuse , que Schéele semble regarder comme un arséniate d'étain , mais qui paroît plutôt être un arsénite d'étain.

Une partie d'étain en limaille traitée avec deux parties d'acide arsénique en poudre , chauffée dans une cornue de verre jusqu'au rouge , produisit une vive inflammation. Il y eut une sublimation d'arsenic métallique & d'oxide blanc d'arsenic. Bientôt la masse coula en un verre laiteux ou émail blanc. Ce verre dissous dans l'eau chaude , fut partagé en deux substances ; l'une dissoute tenant beaucoup d'acide arsénique & peu d'oxide d'étain , l'autre non dissoute tenant beaucoup d'oxide d'étain & peu d'acide arsénique.

L'acide arsénique ne précipite point les dissolutions d'étain par les acides minéraux ; mais les arséniates alcalins opèrent cette précipitation. L'acétate d'étain est aussi précipité par l'acide arsénique. Cet arséniate d'étain fait par précipitation est très-difficile à fondre ; traité avec la poudrière de charbon , il se décompose , & l'on en obtient en le chauffant avec ce corps dans des vaisseaux fermés de l'arsenic sublimé.

ARSENATE DE FER. Les expériences que Schéele a faites sur la combinaison de l'acide arsénique avec le fer , présentent des résultats très-importans pour la théorie des arséniates métalliques en général. Ce célèbre chimiste n'en a cependant tiré aucune induction , & il s'est contenté de les décrire avec la précision & son exactitude ordinaires.

Le fer , dit-il , est attaqué par l'acide arsénique à l'aide d'une douce chaleur ; toute la dissolution devient à la fin gélatineuse. Quand on fait l'opération sans le contact de l'air , la dissolution ne prend point la forme gélatineuse. Une partie laissée quelques heures à l'air libre est devenue tellement solide à sa surface par l'absorption de l'oxygène , que l'on a pu retourner le matras sans qu'il ait rien tombé. La partie de la dissolution non exposée à l'air , mêlée avec une dissolution de potasse , donna un précipité blanc verdâtre très-abondant , qui , bien lavé & chauffé dans une cornue de verre , a fourni de l'arsenic sublimé & un résidu d'oxide de fer rouge.

Une partie de limaille de fer distillée avec quatre parties d'acide arsénique liquide , se gonfla beaucoup ; lorsque le mélange fut desséché , le feu ayant été augmenté , il s'enflamma ; Schéele obtint de l'arsenic & de l'oxide d'arsenic sublimés ; le résidu étoit de l'oxide de fer , dont une partie avoit pénétré le verre de la cornue & lui avoit communiqué une teinte brune jaune.

L'acide arsénique ne précipite point les sels minéraux de fer , mais il précipite l'acétate de ce

métal. Tous les arséniate alcalins décomposent le sulfate, le nitrate & le muriate de fer. L'arséniate de fer précipité dans ces opérations se fond en une scorie noire à un grand feu; cette scorie, poussée à ce feu avec du charbon, laisse évaporer beaucoup d'arsenic, & passe à l'état d'oxide noir.

Voilà ce que Schéele a fait sur les combinaisons de l'acide arsénique avec le fer. Ce métal est un de ceux sur lesquels l'acide arsénique agit avec le plus de force, ou plutôt qui agit lui-même avec le plus d'énergie sur l'acide arsénique. On voit qu'il enlève l'oxygène à cet acide, qu'il le fait passer à l'état d'oxide & même d'arsenic, suivant la proportion d'oxygène qu'il lui enlève; on voit encore que par le dernier procédé, Schéele n'a obtenu qu'un arséniate de fer difficile à dissoudre, & dont il n'a point à beaucoup près déterminé les propriétés. On ne fait point comment l'acide arsénique agiroit sur les oxides de fer, & c'est en général ce qui manque aux expériences du célèbre chimiste suédois, qui a moins examiné les arsénates métalliques que l'action des différens métaux sur l'acide arsénique, & celle de cet acide sur les principales dissolutions des métaux connus. L'arséniate de fer n'est d'aucun usage; il n'est point encore assez connu pour être employé.

ARSÉNATE DE MAGNÉSIE. Schéele n'a que peu examiné les propriétés de l'arsénate de magnésie; il se contente de dire que l'acide arsénique liquide dissout bien la magnésie, que cette combinaison s'épaissit lorsqu'elle est au point de saturation; que l'espèce de coagulum qu'elle forme se redissout lorsqu'on y ajoute de l'acide arsénique & que la liqueur évaporée devient gommeuse; étendue d'eau & évaporée, il reste, ajoute-t-il, une substance visqueuse incristallisable.

Suivant lui, le sulfate, le nitrate, le muriate & l'acétate de magnésie ne sont point décomposés par l'acide arsénique, mais précipités par les arsénates alcalins; ce précipité, qui est de l'arséniate de magnésie, est indissoluble dans l'eau, mais dissoluble dans les acides; il faut ajouter qu'à mesure que les acides sulfurique, nitrique, muriatique & même acétueux dissolvent l'arséniate de magnésie, ils le décomposent & forment des sulfate, nitrate, muriate & acétate de magnésie, en mettant l'acide arsénique en liberté. Schéele annonce aussi que l'arséniate de magnésie se décompose par le charbon; mais cette propriété appartient à toutes les espèces de ce genre. L'arséniate de magnésie n'est d'aucun usage.

ARSÉNATE DE MANGANÈSE. L'acide arsénique liquide dissout un peu d'oxide noir de manganèse à l'aide de la chaleur; les alcalis fixes précipitent l'oxide de manganèse en blanc. En distillant l'acide arsenique avec cet oxide, le mélange devient liquide à un grand feu; il se sublime un

peu d'arsenic; mais l'acide ne retient pas plus de manganèse qu'auparavant. L'oxide de manganèse blanc & en partie desoxygéné se dissout aisément dans l'acide arsénique liquide; lorsque cette combinaison approche de la saturation, la liqueur s'épaissit par la quantité de petites cristaux qui s'y forment & qui s'en séparent. L'acide arsénique ne précipite pas l'oxide de manganèse dissous dans les acides minéraux, mais il le sépare de l'acide acétueux; les arsénates alcalins décomposent le sulfate, le nitrate & le muriate de manganèse; l'arséniate de manganèse précipité ainsi est blanc; il conserve sa couleur & sa nature au feu, qui même ne le fait pas entrer en fusion; en le chauffant avec la poussière de charbon dans une cornue de grès, on obtient de l'arsenic sublimé, & il reste de l'oxide de manganèse au fond de ce vaisseau.

Voilà ce que Schéele a reconnu sur la combinaison de l'acide arsénique avec l'oxide de manganèse; ce sel mérite d'être examiné avec soin; il présentera quelque jour des phénomènes intéressans aux chimistes. On conçoit que trop peu connu encore, il n'est d'aucun usage.

ARSÉNATE DE MERCURE. Schéele a décrit des expériences très-singulières sur la combinaison du mercure avec l'acide arsénique, & cependant il n'a presque rien dit des propriétés de l'arséniate de mercure; il a donc plus examiné ce qui se passe pendant l'action réciproque de ces deux corps à différentes températures, que les caractères de leur combinaison toute formée. L'acide arsénique liquide n'attaque point le mercure coulant par une chaleur douce, mais l'eau étant une fois volatilisée & le feu augmenté, le mélange devient jaune, il s'élève de l'arsenic, du mercure coulant & un peu de sublimé blanc; la cornue se fond sans que la masse entre elle-même en fusion. De six onces de mercure que Schéele a employées pour cette expérience, il en a retrouvé trois onces & demie dans le recipient; l'acide arsénique dont il n'annonce point la proportion avoit retenu deux onces & demie de mercure. Le résidu jaune de cette opération, semblable à du tartre dans ses propriétés extérieures, n'a point été dissous par l'eau bouillante; les acides sulfurique & nitrique ne l'ont point décomposé; mais l'acide muriatique l'a dissous très-aisément. Cette dissolution muriatique ayant été évaporée à siccité & distillée, elle donna du muriate de mercure corrosif, il resta de l'acide arsénique; une autre partie de ce résidu traité avec du muriate de soude donna aussi du muriate de mercure corrosif. Cette belle expérience de Schéele prouve qu'à une température assez élevée au-dessus de celle de l'eau bouillante le mercure a décomposé une partie de l'acide arsénique, & devenu oxide s'est combiné avec une autre partie du même acide; elle prouve encore que l'oxide de mercure fait

par ce procédé est assez chargé d'oxygène pour se convertir en muriate de mercure corrosif par l'action de l'acide muriatique simple. Quant à l'arséniate de mercure que l'on obtient dans cette opération, on voit qu'il est indissoluble dans l'eau & indécomposable par les acides sulfurique & nitrique. L'arséniate de mercure est également décomposable par un grand feu; ce qui paroît dépendre du peu d'adhérence de l'oxygène au mercure, car celui-ci passe en métal coulant, & la portion d'acide arsénique qui lui avoit fourni cet oxygène se sublime elle-même à l'état métallique; il ne reste d'acide arsénique au fond du vaisseau que la partie qui neutralisoit ou plutôt saturait l'oxide de mercure.

C'est à la décomposition de l'arséniate de mercure par l'acide muriatique & à l'état d'oxidation très-forte du mercure dans cette combinaison, qu'est due une autre expérience que décrit Schéele. On fait, dit-il, que l'acide muriatique n'attaque pas le mercure à l'aide de la chaleur; mais si on fait digérer dans un matras fermé pendant une quinzaine de jours deux parties d'acide muriatique, deux parties d'acide arsénique & une partie de mercure coulant, l'acide prend une saveur mercurielle & le mercure est changé en une poudre jaune; en dissilant ensuite le mélange, il passe d'abord du muriate d'arsenic, & à un feu plus fort du muriate de mercure corrosif: il reste de l'acide arsénique dans la cornue. Cette expérience mérite une explication que Schéele n'a pas donnée. Il semble au premier aperçu qu'elle est contradictoire avec la formation de l'acide arsénique par l'oxide d'arsenic & l'acide muriatique oxigéné; car tandis que dans cette formation l'oxide d'arsenic enlève l'oxygène à l'acide muriatique oxigéné, ici c'est au contraire l'acide muriatique qui paroît enlever l'oxygène à l'acide arsénique; mais cette contradiction dans les attractions électives n'est qu'apparente, puisqu'on trouve ici la présence du mercure qui fait varier ces attractions. En effet l'affinité de l'acide muriatique oxigéné pour l'oxide de mercure est plus forte que celle de l'acide arsénique, & même que celle de l'oxygène pour l'arsenic; aussi l'acide muriatique décompose-t-il l'arséniate de mercure, & l'acide arsénique convertit-il le muriate de mercure doux en muriate de mercure corrosif, tandis que ce même acide ne change point le muriate de mercure corrosif. Voilà comment un corps de plus fait varier tout-à-coup les attractions dans les opérations de chimie.

L'acide arsénique décompose le sulfate & le nitrate de mercure, & ne fait rien au muriate de mercure corrosif; l'arséniate de mercure se précipite dans les deux premiers cas en une poudre d'un blanc jaunâtre; l'arséniate ammoniacal est le seul de ces sels alcalins qui décompose le muriate de mercure corrosif, & cette décomposition n'a lieu que par la tendance qu'a le muriate de mer-

cure pour faire un sel triple avec l'ammoniaque. Voyez le mot MERCURE.

L'arséniate de mercure n'est d'aucun usage; il doit avoir une grande énergie sur l'économie animale, mais il ne peut être prescrite que comme un poison terrible.

ARSENATE DE MOLYBDÈNE. On n'a point essayé de combiner l'acide arsénique avec le molybdène ni avec l'oxide de ce métal, trop peu connu encore & trop peu abondant parmi les chimistes, pour qu'on ait pu examiner son action sur différens acides.

ARSENATE DE NICKEL. L'acide arsénique liquide, digéré sur le nickel, se colore en vert; il s'en sépare beaucoup de poudre de la même couleur; lorsqu'on chauffe cette poudre on en retire de l'oxide d'arsenic même à un feu doux. On ne peut méconnoître dans cette expérience de Schéele la décomposition d'une portion de l'acide arsénique par le nickel, & la précipitation de l'oxide d'arsenic moins soluble que l'acide, de sorte que la poussière verte est une espèce d'arsénite de nickel. Une partie de nickel en poudre avec deux parties d'acide arsénique sec ayant été chauffées dans une cornue de verre & poussées jusqu'à la fusion, ont paru s'enflammer, & il s'est sublimé de l'oxide d'arsenic. Après le refroidissement de l'appareil, Schéele trouva dans la cornue une masse jaune couverte de filets feux semblables à une végétation. En lavant cette masse dans l'eau distillée, il resta un oxide jaunâtre qui ne fut point complètement réduit par le charbon. Schéele ne dit rien de la dissolution qui devoit contenir de l'arséniate de nickel; il ajoute que les dissolutions acides de nickel, même celle par le vinaigre, ne sont point précipitées par l'acide arsénique, mais que les arsénates alcalins les décomposent par une double affinité. Le précipité est d'un blanc verdâtre.

ARSENATE D'OR. L'acide arsénique n'attaque point l'or dans son état liquide & par la digestion à une chaleur douce; en augmentant le feu lorsque l'acide a perdu son eau & qu'il commence à entrer en véritable fusion, on voit s'en élever un peu d'oxide d'arsenic. Quoique ce passage de l'acide arsénique à l'état d'oxide semble annoncer le passage d'un peu d'oxygène dans l'or, celui-ci a été retrouvé après le lavage, sans altération & sans perte de poids par Schéele; on voit bien que la décomposition de l'acide arsénique dépend ici uniquement de l'action du calorique & de la lumière, & si le chimiste Suédois avoit employé l'appareil pneumatique-chimique, il est très-probable qu'il auroit obtenu un peu d'air vital dans cette expérience. Cependant, il semble que quelques atomes d'or ont été oxides & se sont combinés au verre, puisque le fond de la cornue avoit

quelques taches rouges & jaunes, qui n'ont pu être enlevées par aucun dissolvant.

L'acide arsénique liquide ne trouble point la dissolution nitro-muriatique d'or; en évaporant ce mélange, l'or fut réduit lorsque la matière parvint à la fécité; il passa en même-temps dans la corne de l'acide muriatique oxigéné. La corne étoit tachée de rouge & de jaune, comme dans l'expérience précédente.

L'acide muriatique & l'acide nitrique mêlés d'acide arsénique, n'ont point attaqué l'or.

Il résulte de ces expériences de Schéele, qu'il n'a point formé d'arséniate d'or; mais il n'a point essayé de combiner l'acide arsénique avec l'oxide d'or précipité par les alcalis de sa dissolution.

ARSÉNIATE DE PLATINE. Le platine n'est, en aucune manière, attaqué dans son état métallique par l'acide arsénique, soit liquide & à l'aide d'une chaleur douce long-temps continuée, soit solide & par un feu violent. Cet acide ne sépare pas non plus l'oxide de platine de l'acide nitro-muriatique qui le tient en dissolution; mais les arsénates alcalins décomposent cette dissolution, & y forment un précipité qui paroît contenir de l'arséniate de platine. Cependant ce précipité qui est jaune & qui est dissoluble dans une grande quantité d'eau, ne donne, suivant Schéele, aucun indice d'acide arsénique. Je conclus de ces faits, qu'on ne connoît point du tout la combinaison de platine & d'acide arsénique.

ARSÉNIATE DE PLOMB. Si l'on fait chauffer de l'acide arsénique liquide sur du plomb, ce métal commence par se colorer en noir; il se forme, au bout de quelques jours, à sa surface une poudre grise mêlée d'oxide d'arsenic qu'on peut en séparer par un feu doux; l'acide surnaissant ne tient point d'oxide de plomb en dissolution.

Une partie de limaille ou de raclure de plomb avec deux parties d'acide arsénique concret en poudre, ont été chauffées dans une corne; le mélange s'est fondu en une masse transparente, si s'est sublimé un peu d'oxide d'arsenic au col de la corne. Le verre blanc laiteux resté dans le vaisseau après l'opération, bouillit dans l'eau, donna de l'acide arsénique en dissolution, & il se sépara une grande quantité de poudre blanche. Celle-ci étoit de l'arséniate de plomb, & non un mélange de deux oxides, comme on auroit pu le penser, puisqu'en la chauffant & la tenant en fusion pendant une demi-heure, Schéele n'en pût point volatiliser d'oxide d'arsenic, tandis qu'en jetant dans la corne des petits morceaux de charbon, la masse solide bouillonna, il se sublima de l'arsenic métallique, & le plomb fut réduit. On voit donc que l'arséniate de plomb est blanc, indissoluble, fusible en verre sans décomposition, & que le charbon le décompose en lui enlevant l'oxigène uni, soit à l'arsenic,

soit au plomb, & en formant de l'acide carbonique qui s'échappe par le bouillonnement de l'effervescence. L'acide arsénique décompose le nitrate, le muriate & l'acétate de plomb; l'arséniate de plomb qu'il en sépare en poudre blanche, se comporte comme celui qui a été décrit ci-dessus, & est absolument de la même nature.

L'arséniate de plomb n'a été employé jusqu'ici à aucun usage.

ARSÉNIATE DE POTASSE. L'arséniate de potasse est le premier des sels formés par l'acide arsénique qui ait été connu. Il avoit été préparé par Kunckel, par Stahl, & par beaucoup d'autres chimistes anciens, sans qu'ils se soient doutés de son existence & de ses singulières propriétés. En décomposant le nitrate de potasse par l'oxide d'arsenic, on le produit toujours, parce que cet oxide enlevant l'oxigène à l'acide nitrique à mesure que celui-ci se dégage, passe à l'état d'acide arsénique, & se combine avec la potasse. Or comme la distillation & la décomposition du nitre par l'oxide d'arsenic est une des plus anciennes opérations de chimie, on voit qu'un grand nombre de chimistes ont dû préparer cette espèce de sel. Kunckel avoit même remarqué que par cette distillation on obtenoit l'esprit de nitre concentré & avec une couleur verte très-remarquable, lorsqu'on le recevoit dans un ballon avec une certaine quantité d'eau. Mais ni lui, ni aucun chimiste ne s'étoit avisé d'examiner le résidu de cette opération; & c'est en examinant ce résidu que Macquer, dans la suite des recherches qu'il avoit entreprises en 1744 & 1745 sur l'arsenic, découvrit que l'esprit dans l'eau, il étoit bien dissoluble & donnoit par une évaporation lente des cristaux en prismes quarrés terminés par des pyramides à quatre faces. La belle forme de ce sel, sa fixité au feu, l'engagèrent à l'examiner en détail, & sans quelques erreurs capitales, mais qui étoient inévitables, à l'époque déjà éloignée pour la marche actuelle de la chimie, Macquer fit plusieurs découvertes importantes sur cette matière saline. Schéele a repris depuis les principales expériences de Macquer sur l'oxide d'arsenic, & ayant ajouté un grand nombre d'autres faites sur-tout avec des agens mieux connus & plus énergiques que ceux que la chimie possédoit il y a quarante ans, il a découvert l'acide arsénique. Voyez les mots ARSENIC & ACIDE. On juge bien que ce premier pas l'a conduit beaucoup plus loin que Macquer, sur-tout dans la connoissance des différents sels moyens que cet acide forme avec les différentes bases. Le chimiste Suédois a fait voir qu'on peut préparer l'arséniate de potasse, que Macquer nommoit *sel neutre arsenical*, en combinant directement l'acide arsénique avec la potasse. Examinons les propriétés que présente la combinaison de ces deux substances.

Si l'on sature l'acide arsénique liquide de potasse, on obtient un sel qui ne cristallise pas, qui change

en vett la teinture de violette, qui n'altère point celle de tournesol, qui attire l'humidité de l'air lorsqu'il a été évaporé à siccité. Voilà la combinaison qu'on doit appeller arséniate de potasse, & qui paroît avoir un excès d'alcali. Ce n'est point là le sel neutre arsénical de Macquer, qui cristallise en prismes tétraèdres, &c. Schéele observe qu'en ajoutant au sel saturé de potasse de l'acide arsénique jusqu'à ce que le composé ne verdisse plus le frop de violette, alors on obtient le sel de Macquer, mais qui paroît contenir un excès d'acide arsénique, puisqu'il tougit la teinture de tournesol. Cependant j'observerai par rapport à cet énoncé de Schéele qui fait croire à quelques chimistes modernes qu'il faut nommer le *sel neutre arsénical* de Macquer, arséniate acide de potasse, que cet arséniate prétendu acide est peut-être plus voisin de l'état d'un véritable sel neutre que le premier, puisqu'au rapport de Schéele même, celui qu'on sature de potasse suivant son expression s'éloigne beaucoup des sels neutres par sa non-cristallisation, sa propriété de verdir le frop de violettes, & celle de perdre facilement son excès d'alcali à un feu de fusion. Je crois donc qu'on doit plutôt regarder le sel arsénical de Macquer comme le véritable arséniate de potasse. Voici quelles sont les propriétés caractéristiques de ce sel.

Il se fond au feu & reste en fonte tranquille dans des vaisseaux fermés sans se décomposer. Chauffé fortement à l'air il tend plus à la décomposition, il bouillonne, donne un peu d'air vital & devient bientôt avec excès d'alcali comme le *nitre fixé* par l'arsenic des anciens chimistes.

Il est insatiable à l'air, il se dissout très-bien dans huit parties d'eau à dix degrés; il cristallise par refroidissement, car il est un peu plus dissoluble à chaud qu'à froid. On l'obtient en très-beaux prismes à quatre pans, en laissant sa dissolution s'évaporer spontanément à l'air.

La chaux & la baryte le décomposent, soit en versant les dissolutions de ces terres dans la sienne soit en chauffant ces terres seches avec ce sel en poudre dans des creusets.

Les acides sulfurique, nitrique & muriatique concentrés décomposent l'arséniate de potasse; si on évapore des dissolutions de ce sel traitées avec ces acides, on obtient du sulfate, du nitrate ou du muriate de potasse, & l'acide arsénique reste libre dans la liqueur.

L'arséniate de potasse décompole & précipite la plupart des dissolutions métalliques, & sur-tout celles que l'acide arsénic seul ne décompose pas; il le fait dans ces opérations des arséniates métalliques presque tous indissolubles.

Ce sel est décomposé par le charbon qui réduit son acide en très-bel arsenic métallique, & qui laisse la potasse en état de carbonate de potasse.

Chimie, Tome II.

Le soufre & les métaux très-avides d'oxygène, le fer & le zinc décomposent aussi l'arséniate de potasse.

A cet exposé qui comprend tout ce qu'on a découvert jusqu'à présent sur les propriétés de l'arséniate de potasse, il me paroît utile pour faire établir une comparaison frappante entre l'état de la science il y a quarante ans & celui où elle est aujourd'hui, de donner ici un extrait du mémoire de Macquer imprimé dans le volume de l'Académie des sciences pour l'année 1736, où est consignée sa découverte. J'y laisserai les expressions même & la nomenclature employées par ce savant; on trouvera seulement en lettres italiques, les mots qui présentent aujourd'hui ou des erreurs ou des dénominations insignifiantes. Après avoir décrit la décomposition du nitre par l'oxide d'arsenic, Macquer ajoute les détails suivans.

Kunkel n'avoit en vue dans cette expérience que d'obtenir une eau-forte, & c. à l'égard de ce qui lui restoit dans la cornue; pour moi ne doutant pas qu'il ne se fût fait dans cette opération une combinaison de l'arsenic avec la base du nitre, qui pourroit avoir quelque chose de singulier, principalement à cause que l'opération avoit été faite dans les vaisseaux fermés, j'ai cru que ce *caput mortuum* méritoit un examen particulier. J'ai donc dissous dans l'eau ce qui restoit dans la cornue. La dissolution s'est faite assez facilement, & j'ai mis cette eau ainsi chargée de sel s'évaporer d'elle-même à l'air libre; à mesure qu'elle s'est évaporée, il s'est formé le long des bords une végétation saline qui a grimpé autour des parois & même les a surmontées, & dans le milieu de la liqueur il s'est amoncelé une assez grande quantité de très-beaux cristaux d'une figure extrêmement régulière & très-différente de celle du nitre, chacun de ces cristaux est un prisme quadrangulaire rectangle; terminé à chaque bout par une pyramide aussi quadrangulaire rectangle dont les angles répondent à ceux du prisme.

Ce sel est une combinaison singulière de l'arsenic avec la base du nitre, qui n'a point encore été examinée par aucun chimiste, & qui diffère beaucoup de celle qui est connue en chimie sous les noms de nitre fixé par l'arsenic ou d'arsenic fixé, qui est cependant aussi une combinaison d'arsenic & de la base du nitre, mais qui a toujours été faite dans un creuset, en projetant l'arsenic sur le nitre en fusion.

La principale différence qui se trouve entre l'arsenic fixé à ma manière, c'est à-dire combiné avec la base du nitre dans les vaisseaux fermés, & l'arsenic fixé par la méthode ordinaire, c'est que ce dernier ne contient pas une quantité d'arsenic suffisante pour saturer entièrement l'alcali, en sorte qu'il attire l'humidité de l'air, se résout en liqueur, ne peut se cristalliser, verdit le frop de violettes, en un mot a toutes les propriétés des alcalis; au lieu que le mien est une espèce de sel qu'on peut

H h h

regarder comme parfaitement neutre, l'arsénic étant combiné avec l'alcali précisément au point de saturation, tellement qu'il lui enlève les propriétés qui le font reconnoître pour alcali.

La raison de cette différence est que lorsque l'arsenic est joint à un alcali il ne peut jamais en être séparé quelle que soit l'action du feu, tant qu'il est dans des vaisseaux fermés. J'ai mis de mon nouveau sel neutre arsénical dans une cornue & l'ai exposé à un degré de feu assez grand pour faire fondre la cornue, sans qu'il se soit sublimé la moindre partie d'arsenic, & la combinaison est restée dans son entier. Et ce qui est encore plus singulier, c'est qu'en employant même les intermédiaires les plus efficaces pour cela, tels que sont les trois acides minéraux, on ne peut parvenir à décomposer ce sel; mais en le mettant dans un creuset, & l'exposant à l'action du feu il se décompose facilement; une grande partie de l'arsenic qu'il contient se dissipe en vapeur, & ne laisse dans le creuset qu'une matière qui attire promptement l'humidité de l'air, manifeste toutes les propriétés d'un alcali, en un mot est entièrement semblable à l'arsenic fixé ordinaire.

Les vapeurs arsénicales ne commencent à s'élever que lorsque ce sel est rouge & en fusion, il se fond un peu plus difficilement que le nitre; si on le met immédiatement sur les charbons ardents, il ne donne aucune marque de détonation ou de fulmination, il se fond simplement en noirissant le charbon qui l'environne & jette une grande quantité de vapeurs d'arsenic, en quoi il diffère de la croute saline formée le long des parois du vase où s'est faite la cristallisation qui contient encore un peu de nitre qui n'a point été décomposé dans la distillation, ce que j'ai reconnu à quelques légères marques de détonation qu'elle a données lorsque je l'ai mise sur les charbons ardents.

Quoique l'arsenic fixé par cette méthode, soit comme je l'ai dit, un sel parfaitement neutre, il ne laisse pas de précipiter la plupart des substances métalliques dissoutes dans les acides, & cela avec des phénomènes très-curieux & très-singuliers. Je vais en rendre compte aussi-bien que des effets que produit l'arsenic fixé ordinaire sur les mêmes dissolutions métalliques, pour les comparer ensemble, & j'essaierai ensuite de rendre raison de ces mêmes effets, tant de ceux par lesquels ces deux sels arsénicaux se ressemblent, que de ceux par lesquels ils diffèrent: voici quels sont ces phénomènes.

Les substances métalliques dissoutes dans l'acide nitreux sont ainsi précipitées par le nouveau sel neutre arsénical, le mercure en jaune, le fer en blanc un peu jaune, le plomb en beau blanc, l'argent en couleur de pourpre; le cuivre ne se précipite point d'abord, mais après un certain temps le mélange des deux liqueurs qui étoit de-

meuré transparent devient louche & acquiert une couleur blanchâtre, tirant un peu sur le bleu; le zinc forme un précipité ou plutôt un *coagulum* blanc & transparent; le bismuth, un précipité blanc; surquoi il faut remarquer que quoique la dissolution de bismuth ait couru de se précipiter par l'addition de l'eau seule, cependant dans la précipitation qui s'en fait par le nouveau sel neutre arsénical, l'arsenic contribue à la procurer, puisqu'il se trouve joint avec le bismuth précipité; je m'en suis assuré en le mettant sur des charbons ardents. La dissolution de vitriol bleu est sur le champ précipité en couleur de verd céladon clair; celle de vitriol verd ne se trouble point d'abord, mais après quelques minutes elle devient louche, & il se forme un espèce de *coagulum* d'un verd sale & foncé; l'étain & le *régule* d'antimoine dissous dans l'eau *régale* donnent avec cet arsenic fixé, un précipité blanc; celui de l'étain tire pour-tant un peu sur le roux. L'or dissous dans l'eau *régale*, & la dissolution de mercure sublimé corrosif ne se troublent point & ne sont aucunement précipités.

A l'égard du deliquium de l'arsenic fixé ordinaire, voici les effets qu'il produit avec les mêmes dissolutions métalliques.

Celles qui sont faites par l'acide nitreux, sont ainsi précipitées, le mercure en jaune, le fer en couleur rouille, le plomb en beau blanc, l'argent en couleur de pourpre, le cuivre en blanc bleuâtre; le zinc ne forme point de *coagulum*, mais un précipité d'un beau blanc; le bismuth fait la même chose; la dissolution de vitriol bleu est précipitée en verd céladon clair, celle du vitriol verd en verd sale & foncé.

L'or, l'étain, & le *régule* d'antimoine dissous dans l'eau *régale*, se précipitent comme par les alcalis fixes ordinaires, & le mercure sublimé corrosif en couleur de citron.

Il y a plusieurs réflexions importantes à faire sur les expériences dont je viens de rendre compte; elles prouvent d'abord, comme je l'ai avancé, que le nouveau sel arsénical est une espèce de sel neutre, dans lequel la partie alcaline du nitre est entièrement engagée par l'arsenic; puisqu'autrement, pour peu qu'il y eût d'alcali libre, il ne manqueroit pas de précipiter l'or & le mercure sublimé; ce qu'il ne fait point, & qu'au contraire. L'arsenic fixé ordinaire est un composé où l'alcali domine, puisqu'il précipite ces deux métaux. C'est à cette qualité alcaline qu'on doit aussi attribuer les autres différences qu'on remarque entre les précipitations que font ces deux substances. C'est par cette raison par exemple que le fer qui est précipité en blanc par la première, donne un précipité roux avec la dernière.

Pour bien entendre la raison de ce phénomène, il faut observer que toutes les précipitations qu'o-

pète le nouveau sel neutre arfénical, ne se font que par le moyen d'une double affinité, savoir, celle de l'acide qui tient le métal en dissolution avec la base alcaline du nouveau sel, & celle de l'arsénic contenu dans ce sel avec le métal qui étoit dissous par l'acide.

Il est d'ailleurs important de remarquer, comme je l'ai déjà dit, qu'aucun acide, lorsqu'il est pur, ne peut précipiter l'arsénic contenu dans le nouveau sel neutre arfénical, en s'emparant de sa base à son préjudice. Cela posé dans l'exemple ci-dessus, le fer uni à l'acide nitreux ne peut se précipiter, qu'il ne se précipite en même-temps une quantité proportionnée d'arsénic, qui apparemment est assez grande, pour masquer la couleur rousse qu'il a naturellement lorsqu'il est précipité par un pur alcali, & le faire paroître blanc; mais si on suppose que le précipitant contienne une portion d'un pur alcali, la partie du fer qui sera précipitée par ce pur alcali, aura la couleur rousse, qui étant combinée au blanc, fera le jaune roussâtre qui paroît lorsqu'on précipite cette dissolution de fer par l'arsénic fixé ordinaire.

La seconde réflexion qu'il faut faire sur nos précipitations métalliques, c'est qu'il est très-singulier que le mercure dissous dans l'acide nitreux, soit précipité par le nouveau sel arfénical; car, ainsi que je l'ai dit plus haut, cette précipitation ne se peut faire que par le moyen d'une double affinité, celle de l'acide avec l'alcali, & celle du métal avec l'arsénic. Or jusqu'à présent les chimistes n'ont remarqué aucun rapport entre le mercure & l'arsénic, & n'ont pu les joindre ensemble. Ce précipité de mercure avec l'arsénic mérite un examen particulier: c'est peut-être un moyen d'unit ensemble ces deux substances. J'ai sur ce sujet des expériences commencées; mais j'ai réservé ce détail pour un autre mémoire, parce que j'ai dessein de les pousser plus loin.

Quant à ce que ce nouveau sel qui précipite le mercure dissous dans l'acide nitreux, n'a aucune action sur le sublimé corrosif, je crois qu'on en doit déduire la cause des différentes affinités de l'acide du sel commun, savoir, de celle qu'il a avec cette substance métallique, & de celle qu'il a avec l'alcali fixe. Au reste ces phénomènes que présente le nouveau sel avec le mercure dissous dans l'acide nitrique & le sublimé corrosif, semblent indiquer une analogie entre l'arsénic & l'acide vitriolique, puisque le tartre vitriolé qui n'est que l'acide vitriolique uni à un alcali fixe, de même que ce nouveau sel neutre, n'est que l'arsénic aussi uni à un alcali fixe, produisent les mêmes effets avec ces deux composés.

Il est bon de faire aussi attention à la manière dont l'arsénic fixé ordinaire précipite le sublimé corrosif; car comme l'arsénic fixé par ma méthode, n'a aucune action sur cette dissolution de mercure, il semble que l'arsénic fixé ordinaire ne devroit le

précipiter que comme simple alcali fixe. Cependant il agit sur elle d'une manière différente, puisque les alcalis fixes ordinaires la précipitent en couleur de brique, & que le nitre fixé par l'arsénic la précipite en couleur de citron; ce qui ne vient que de ce qu'il se précipite avec une portion d'arsénic avec le mercure, comme je m'en suis assuré en mettant sur des charbons ardens ce précipité qui m'a donné des vapeurs arsénicales. La raison de ce phénomène est, à ce que je crois, qu'il y a dans l'arsénic fixé ordinaire une certaine quantité d'arsénic qui est moins engagé dans l'alcali, qu'il ne l'est dans celui du nouveau sel neutre arfénical, & par conséquent qui peut se précipiter, tandis que l'autre ne se précipitera pas. Nous venons de voir que l'arsénic fixé ordinaire ne diffère du nouveau sel que parce que le feu a chassé de son alcali une portion de l'arsénic qui y étoit engagé. Il est vraisemblable que dans celle qui y est restée, il y a eu un certain nombre de parties qui sont demeurées à demi dégagées, & qui n'y tiennent que foiblement. Ce sont celles-là qui sans doute se précipitent dans l'occasion présente; les expériences confirment de jour en jour que les mêmes substances peuvent se joindre & se combiner ensemble de plusieurs façons différentes, d'où dépendent aussi des effets bien différents les uns des autres. J'en ai déjà donné des exemples dans un autre mémoire, en parlant de l'union de l'acide avec les huiles, & j'en vais rapporter un dans la suite de celui-ci, encore plus décisif, où on verra l'arsénic joint avec le même alcali que dans les expériences dont il est question actuellement, je veux dire, la base du nitre, qui forme un composé dont les propriétés sont entièrement différentes de celles du nouveau sel dont je viens de rapporter les principales propriétés, & de l'arsénic fixé ordinaire; ce qui ne peut venir que de la différente manière dont ils sont unis.

Nous considérerons en troisième lieu, que le nouveau sel ne précipite qu'à la longue & en petite quantité, le cuivre dissous dans l'esprit de nitre, & qu'il précipite sur le champ & en abondance la dissolution de vitriol bleu. Au contraire il précipite facilement & en quantité la dissolution de fer dans l'acide nitreux, & ne précipite qu'avec peine & après un certain temps celle de vitriol verd. On peut facilement rendre raison de ces phénomènes, par le moyen des affinités que les différentes substances qui entrent dans ces combinaisons, ont les unes avec les autres. L'acide vitriolique qui est uni au fer & au cuivre dans les vitriols verd & bleu, a un plus grand rapport avec les alcalis, que n'en a l'acide nitreux; & le fer a un plus grand rapport avec l'acide vitriolique, l'acide nitreux & l'arsénic, que n'en a le cuivre avec ces mêmes substances. Cela posé, si le nouveau sel neutre arfénical précipite facilement la dissolution de vitriol bleu, & ne précipite qu'avec peine la dissolution de cuivre dans l'esprit de nitre, on en voit la raison dans l'af-

finité de l'acide sulfurique avec l'alcali de cet arsenic, plus grande que celle de l'acide nitreux de la dissolution de cuivre avec ce même alcali. Si au contraire ce sel précipite facilement le fer dissous dans l'acide nitrique, & difficilement la dissolution de vitriol verd, c'est que le fer a une union moins forte avec l'acide nitreux, qu'il n'en a avec l'acide vitriolique. De même en envisageant la chose d'un autre côté, pourquoi ce sel précipite-t-il avec facilité la dissolution de vitriol bleu, tandis qu'il précipite avec peine celle du vitriol verd? C'est que le fer tient plus fortement à l'acide vitriolique, que n'y tient le cuivre. Et pourquoi ce même sel précipite-t-il plus aisément la dissolution de fer dans l'acide nitreux, & avec difficulté celle de cuivre dans le même acide? C'est que le fer a plus d'affinité avec l'arsenic de ce sel que n'en a le cuivre. Il n'y a rien, comme on voit, dans ces différents effets, qui ne soit parfaitement d'accord avec les règles des affinités déjà indiquées pour la plupart par feu M. Geoffroy, & même qui ne tende à les confirmer.

La dernière réflexion que j'ai à faire sur nos précipitations métalliques, aura pour objet la couleur en laquelle l'argent dissous dans l'acide nitreux est précipité, tant par le nouveau sel neutre arsenical, que par l'arsenic fixé par la méthode ordinaire. Il est très-ingulier que cet argent soit de couleur de pourpre. On pourroit croire avec assez de fondement que ce précipité a de la ressemblance avec une mine d'argent, nommée par les minéralogistes, *minera argenti rubra*. Car il est certain que cette mine, & le précipité dont il s'agit actuellement, sont l'un & l'autre une combinaison d'argent avec l'arsenic. Cependant comme cette mine d'argent contient aussi une certaine quantité de soufre, & qu'on fait d'ailleurs que le soufre joint à l'arsenic peut lui donner une couleur rouge, cela pourroit faire soupçonner que la couleur de ces deux combinaisons, je veux dire de la mine & du précipité, vient de deux causes différentes, car ce dernier ne contient point du tout de soufre; au reste ce précipité d'argent mérite bien un examen particulier, dont je me propose de rendre compte dans un autre mémoire. Je me contenterai de dire ici que l'ayant mis sur des charbons ardens, il s'en est élevé une grande quantité de vapeurs d'arsenic, & qu'à mesure que l'arsenic s'est ainsi dissipé, la couleur rouge de l'argent s'est évanouie, en sorte que lorsqu'il ne s'est plus élevé aucune vapeur, l'argent m'a paru avoir repris sa blancheur ordinaire.

Cette couleur ne m'a pas été inutile. Car, comme j'ai avancé que l'arsenic peut se joindre avec les alcalis d'une manière encore différente de celle dont il est combiné avec eux, tant dans le nouveau sel neutre arsenical que dans l'arsenic fixé ordinaire, & que j'ai remarqué que c'est toujours en couleur rouge que l'argent est précipité

par un alcali quelconque, quand l'arsenic est joint avec ce même alcali, comme il l'est dans ces deux combinaisons, cela m'a servi à distinguer dans toutes celles que j'ai faites, quelles sont celles qui leur ressemblent à cet égard.

Je viens de dire, & je l'avois dit plus haut, que l'arsenic peut se combiner avec les alcalis de différentes manières, & qu'il avoit des propriétés différentes, suivant la manière dont il y est joint. Voici l'exemple que j'ai promis d'en donner. J'ai fait dissoudre de l'arsenic dans une lessive bien chargée de nitre fixé par les charbons, il s'y en est dissous à la saveur du feu, une quantité assez considérable; la liqueur, à mesure qu'elle s'est chargée d'arsenic, est devenue d'une couleur brune, & a acquis une consistance & un degré d'épaississement comme de la colle-forte. Tant qu'elle a eu un peu de fluidité, elle s'est chargée toujours de nouvel arsenic, & n'a cessé d'en prendre que lorsqu'elle est devenue presque solide. Cette combinaison a une odeur désagréable, mais dont il est assez difficile de donner une juste idée; je l'ai nommée *foie d'arsenic*. Ce composé, en refroidissant, devient dur & cassant, sur-tout lorsqu'il est bien chargé d'arsenic; car il a quelque propriété différente que je serai remarquer par la suite, à proportion de la quantité d'arsenic qu'il contient. Je parle ici de celui qui en contient le plus; il attire en quelques jours l'humidité de l'air, & redevient visqueux de dur qu'il étoit d'abord en se refroidissant. Il se dissout facilement dans l'eau, &c.

J'ai aussi exposé au feu dans un creuset le foie d'arsenic en entier; il s'y est fondu très-promptement & à une légère chaleur, jettant beaucoup de vapeurs arsenicales, mais qui ne m'ont pas paru avoir une odeur d'ail aussi forte que celle de l'arsenic pur. Quand la matière a été en parfaite fusion, j'en ai retiré une portion qui s'est trouvée être un verre fort transparent; j'ai continué à pousser le feu, & l'ai même augmenté considérablement. Les vapeurs arsenicales ont encore continué à paroître pendant quelque temps, après qu'elles ont beaucoup diminué, & j'ai remarqué pendant ce temps qu'à mesure qu'il se dissipoit des vapeurs, la matière contenue dans le creuset devenoit moins fusible, en sorte que sur le feu, quoique le feu fût beaucoup plus fort, elle avoit perdu beaucoup de sa fluidité; l'ayant retirée du feu, il s'est trouvé que c'étoit une substance vitreuse, mais différente de la première, en ce que ce n'étoit plus un verre transparent, mais opaque & laiteux. Ce changement vient vraisemblablement de ce que la matière la plus vitrifiable & la plus fusible s'est dissipée en fumée pendant l'opération, d'où il est arrivé que la matière la plus fixe & la moins fusible est demeurée en plus grande proportion, & a été au verre sa fusibilité & sa transparence: la dissolution de *foie d'arsenic* faite par l'eau, est précipitée sur le champ en blanc par tous les acides; & ce qui n'ar-

rive point au nouveau sel neutre arsenical, comme je l'ai fait voir. Ce précipité blanc n'est autre chose que l'arsénic même qui étoit joint avec l'alcali, & qui en est chassé par les acides. Il faut cependant remarquer que quand l'alcali n'a dissout qu'une petite quantité d'arsénic, il ne se forme point de précipité sensible, quoiqu'on ajoute une quantité d'acide suffisante pour saturer l'alcali.

Comme il paroît par ces expériences que l'arsénic est un moins intimement avec l'alcali dans le *foie d'arsenic* que dans le *sel neutre arsenical*, il est naturel de présumer que ce *foie d'arsenic* précipite toutes les dissolutions métalliques; aussi n'y en a-t-il aucune sur laquelle il n'ait action. La dissolution du fer dans l'acide nitreux & celle de *vitriol verd*, sont précipitées en verd obscur & sale; celle de cuivre dans le même acide, & celle de *vitriol bleu* en beau verd de pré; le plomb, l'argent, le mercure, le zinc, le bismuth dissous dans l'acide nitreux, sont précipités en beau blanc, aussi bien que le mercure sublimé corrodé; & la dissolution d'or est précipitée en jaune orange.

On peut remarquer dans ces précipitations deux différences essentielles d'avec celles qui sont faites par le nouveau sel neutre arsenical: la première est que le *foie d'arsenic* précipite la dissolution d'or & le sublimé corrodé, quoique son alcali soit parfaitement saturé d'arsénic, (car il ne verdit point le sirop de violettes), précipitation que n'opère point le nouveau sel neutre; & la seconde qui est encore plus remarquable, c'est que l'argent, au lieu d'être précipité en couleur de pourpre, comme il l'est par les *arsénics fixés*, est précipité en blanc par le *foie d'arsenic*, & que cela arrive toujours & constamment de même, quelle que soit la proportion d'arsénic qu'on ait fait entrer dans cette combinaison.

Ces deux différences qui se trouvent entre les effets produits par les mêmes substances par les *arsénics fixés* & le *foie d'arsenic*, sont la preuve de ce que j'ai avancé dans mon mémoire, savoir, que l'arsénic peut être combiné avec les alcalis de plusieurs manières, en sorte qu'il présente des phénomènes absolument dissimilables. On voit ici qu'il n'est pas indifférent d'unir ensemble ces deux substances par la voie sèche ou par la voie humide, quoique cela le soit à l'égard des acides, qui produisent toujours les mêmes effets, quand on les a unis avec les alcalis, soit de l'une, soit de l'autre manière.

Si on calcine le *foie d'arsenic* dans un creuset, il devient semblable à l'arsénic fixé ordinaire, & précipite l'argent en couleur de pourpre.

J'en ai dissous dans l'eau, & j'ai laissé la dissolution filtrée en évaporation à l'air libre; elle ne m'a point donné de cristaux; il s'est seulement formé à la surface de la liqueur une croûte mince & blanche qui s'est ensuite cassée & précipitée au

fond, & qui n'est que de l'arsénic pur qui se sépare de lui-même. La liqueur, à mesure qu'elle s'est évaporée, a acquis de l'épaississement, & enfin a celle de former cette croûte arsenicale: je ne desespère pourtant point d'en obtenir des cristaux, en variant ce procédé.

* On reconnoît à la lecture de cet extrait du mémoire de Macquer, que, tout en faisant une découverte importante, il n'en a pas tiré tout le parti possible, & qu'il y a même laissé beaucoup d'obscurité. L'état de la chimie en 1746 ne permettoit pas à Macquer non-seulement de trouver la différence que pouvoit faire naître l'acide nitrique, mais même de la deviner. Il devoit croire que l'oxide d'arsenic combiné immédiatement à la potasse, étoit à-peu-près dans le même cas que cet oxide uni au même alcali, après avoir décomposé le nitre. Aussi a-t-il commis sur les différences de l'arsénic fixé, du *foie d'arsenic* ou arsenite de potasse & de son sel neutre arsenical ou arseniate de potasse, des fautes essentielles; mais elles n'ont pu être senties & détruites que d'après les découvertes de l'acide arsenique & de la formation par le moyen de l'acide nitrique. Il est difficile de concevoir comment Macquer a pu assurer que les acides minéraux ne décomposent point son sel neutre arsenical, parce qu'ils ne forment point de précipité dans la dissolution. S'il avoit évaporé ces mélanges, il auroit reconnu cette décomposition, en obtenant les sels que forment les acides avec la potasse, & il eut alors découvert l'acide arsenique. Mais préoccupé de la précipitation de l'oxide d'arsenic uni aux alcalis par les acides, & ne voyant pas de précipité qu'il se figuroit devoir arriver s'il y avoit décomposition; il en a conclu qu'il falloit une affinité double pour le décomposer. On ne peut cependant méconnoître le germe des découvertes faites par Schéele & d'autres modernes sur l'arsenic dans le mémoire de Macquer, & c'est pour cela que j'ai cru devoir en consigner ici un extrait.

L'arséniate de potasse est employé, à ce qu'il paroît, comme mordant dans les teintures; car M. Baumé en a préparé en grand d'après les demandes des manufactures; mais on ne fait point encore à quels usages on le destine.

ARSENATE DE SILICE. Il n'y a pas, à proprement parler, d'arséniate de silice ou de sel moyen, de sel neutre formé par l'acide arsenique & par la silice. Schéele a prouvé que l'acide arsenique liquide n'agit pas sur le quartz en poussière fine, tel qu'il est, lorsqu'on l'a précipité de l'alcali par un acide. Après avoir fondu dans une cornue l'acide arsenique sur de la silice, & l'avoir lavée pour redissoudre l'acide, la terre s'est trouvée pure & n'ayant rien perdu. Cependant en faisant fondre l'acide arsenique dans un creuset de terre, le verre qui en résulte est opaque, & contient un peu de

silice qui s'en précipite, quand on lessive la masse avec l'eau chaude : il y a donc dans cette combinaison vitreuse une espèce d'arséniate de silice ; mais à la vérité cette combinaison n'est nullement comparable à toutes celles dans lesquelles l'acide forme un sel neutre.

ARSENATE DE SOUDE. Scheele & M. Pelletier ont examiné la combinaison de l'acide arsénique avec la soude. Le chimiste Suédois a remarqué que la soude saturée d'acide arsénique donne des cristaux qui, dit-il, ressemblent à ceux que fournit l'arséniate de potasse, & qui verdissent le sirop de violettes, sans changer la teinte de tournesol. Si l'on y ajoute de l'acide arsénique, ce sel ne cristallise plus, & lorsqu'on l'a desséché, il attire l'humidité de l'air. On voit par ces détails que ce sel est absolument l'inverse de l'arséniate de potasse, qui cristallise lorsqu'il contient un excès d'acide. M. Pelletier après avoir décomposé le nitrate de soude par l'oxide d'arsenic, a dissolvé le résidu & obtenu de l'arséniate de soude sous la forme de prismes hexagones, terminés par des plans perpendiculaires à leur axe. Cette configuration diffère essentiellement de celle de l'arséniate de potasse, avec laquelle Macquer & Scheele l'avoient confondu. Quoiqu'on n'ait pas autant examiné les propriétés de l'arséniate de soude que celles de l'arséniate de potasse, on peut assurer qu'il se comporte à-peu-près comme lui dans sa fusibilité, sa dissolubilité, sa cristallisabilité, sa décomposition par le charbon, &c. ; il n'en diffère que par les loix de ses attractions, car la soude n'a pas la même attraction pour l'acide arsénique que la potasse, &c. L'arséniate de soude n'est d'aucun usage.

ARSENATE DE TUNGSTÈNE. On ne connoît point du tout la combinaison de l'acide arsénique avec l'oxide de tungstène, ni l'action du tungstène sur cet acide. Scheele n'a point essayé cette combinaison, & le tungstène lui-même n'est pas connu. On pourra vraisemblablement déterminer bientôt les caractères de l'arséniate de tungstène, d'après la propriété que M. Pelletier vient de découvrir dans le muriate d'arsic, de réduire l'acide tungstique en métal. *Voyez l'article TUNGSTÈNE.*

ARSENATE DE ZINC. Le zinc, dit Scheele, est le seul métal qui, traité par l'acide arsénique liquide, à l'aide d'une douce chaleur, présente une effervescence ; il prend une couleur noire, & bientôt l'acide arsénique est troublé par la quantité de poussière noire qui y est répandue. Cette poussière recueillie, séchée & jetée sur un fer rouge dans un lieu obscur, brûle avec une flamme bleue & une odeur d'ail qui annonce sans équivoque la présence de l'arsenic. On voit que dans cette expérience l'acide arsénique est entièrement décomposé, qu'il perd tout son oxygène qui lui est enlevé par le zinc, & qu'il passe à

l'état métallique. Après quelque temps le zinc est tellement enveloppé d'arsenic, que l'effervescence s'arrête, & que le zinc cesse d'être attaqué. Scheele a fait une belle observation sur le gaz hydrogène qu'il se dégage pendant cette opération, & qui prouve que l'eau est décomposée, c'est qu'il tient en dissolution de l'arsenic, & qu'en brûlant, il exhale une odeur d'ail très-fétide, il laisse déposer une poussière noire sur les parois du vase où on l'allume, comme le gaz hydrogène sulfuré dépose du soufre en brûlant.

En chauffant dans une cornue une partie de limaille de zinc avec deux parties d'acide arsénique sec, jusqu'à ce que le fond de ce vase commence à rougir, il se fait une vive inflammation qui brise ordinairement l'appareil distillaire avec grand bruit. On trouve dans le col de la cornue de l'arsenic très-brillant, de l'oxide d'arsenic & de l'oxide de zinc élevé par la déflagration.

Les dissolutions sulfurique, nitrique & muriatique de zinc ne sont pas précipitées par l'acide arsénique ; mais celle d'acétate de zinc l'est par cet acide. Les arsénates alcalins décomposent le sulfate, le nitrate & le muriate de zinc par une double attraction. Le précipité d'arséniate d'ammoniacque est en poudre blanche, si on le pousse au feu, il se fond ; il donne de l'arsenic métallique, quand on le traite par le charbon. Il paroît que ce sel est très-peu dissoluble. Il n'est d'aucun usage.

ARSENIC. Le mot arsenic a été employé d'abord par les Grecs, pour désigner l'orpiment. Ce n'est que long-temps après qu'il a été adopté pour la substance métallique qu'il désigne aujourd'hui. On a, depuis plus de deux siècles, connu sous ce nom l'oxide blanc qu'on prépare en grand dans les travaux métalliques. Aujourd'hui il doit signifier exclusivement le métal qu'on retire de cet oxide. Avicenne paroît être le premier auteur qui ait fait mention de l'oxide d'arsenic sous le nom d'arsenic blanc, & qui ait su que cette matière étoit sublimée. I. Héophraste, long-temps auparavant, avoit placé l'orpiment & le réalgar parmi les pierres métalliques. Paracelse est le premier chimiste qui ait fait mention du métal qu'on retire de l'oxide d'arsenic blanc traité avec la chaux d'œuf par la sublimation. En 1649 Schrederet annonça dans sa pharmacopée qu'on obtenoit un régule de l'oxide d'arsenic & de l'orpiment, en les traitant avec le charbon & le fer. Lemery publia en 1677 un procédé pour réduire cet oxide à l'aide du savon & de l'alcali fixe.

La qualité saline de l'oxide d'arsenic a été aussi remarquée il y a long-temps par les chimistes. Kunkel le regardoit comme une *eau forte volatile*. Becccher & Stahl l'ont confidéré comme une ma-

tière saline. Schéele a prouvé qu'il est susceptible de former un acide particulier. D'un autre côté l'André & Macquer ont démontré que cette substance est un vrai métal. L'arsenic, pourvu de toutes les propriétés, a en effet les caractères des matières métalliques. Il est parfaitement opaque, il a la pesanteur & le brillant propres à ces substances. Sa couleur est grise bleuâtre ; il paroît formé dans la cassure de petites lames appliquées les unes sur les autres. Il n'a aucune espèce de ductilité ; il se brise par le choc, & on le réduit facilement en poussière fine. La pesanteur de l'arsenic est, suivant Bergman, à celle de l'eau distillée :: 310 : 1,000. Le pied cube doit peser, d'après ce rapport, 581 livres 11 onces 1 gros 43 $\frac{1}{2}$ grains ; & le pouce cube 5 onces 3 gros 5,43 grains.

L'arsenic se trouve souvent natif ; il est en masses noires peu brillantes, très-pesantes ; quelquefois il a l'éclat métallique, & réfléchit les couleurs de l'iris. Dans la cassure il paroît plus brillant, & semble composé d'un grand nombre de petites écailles ; lorsque ces écailles sont sensibles à l'extérieur des échantillons, on le nomme alors *arsenic refacé*, ou improprement *cobalt refacé*, parce qu'autrefois, comme on ne connoissoit pas le caractère métallique de l'arsenic, & qu'on retiroit des mines de cobalt une grande quantité d'oxide d'arsenic, on avoit regardé l'arsenic refacé comme une mine de cobalt. L'arsenic natif est très-aisé à reconnoître lorsqu'il a l'éclat métallique & qu'il est en petites écailles ; mais lorsqu'il est noir & que dans sa fracture il paroît composé de grains fins & très-serrés, on ne peut le distinguer que par sa pesanteur très-considérable, & parce que si on l'expose sur des charbons ardents, il se dissipe en entier sous la forme de fumées blanches, qui ont une forte odeur d'ail fétide. Ce dernier métal se trouve abondamment à Sainte-Marie-aux-mines. Il est mêlé avec la mine d'argent grise ; on en rencontre aussi parmi les mines de cobalt en Saxé, & à Andrarum en Scanie.

La nature offre quelquefois l'arsenic en oxide blanc, ayant même l'aspect vitreux, mais le plus souvent sous la forme de poussière superficielle, ou mêlée à quelques terres. Cet oxide existe aussi à Sainte-Marie-aux-mines ; on le reconnoît par les fumées blanches & l'odeur d'ail qu'il exhale lorsqu'on en jette sur des charbons ardents. Il a quelquefois la forme de petits cristaux, d'autres fois il est en couches mamelonnées comme les stalactites. Il est presque toujours voisin de l'oxide d'arsenic sulfuré.

L'oxide d'arsenic est souvent uni avec le soufre, il forme alors l'*orpiment* & le *réalgar*, ou les oxides d'arsenic sulfuré jaune & rouge. L'*orpiment* natif est en masses plus ou moins grossières, jaunes, brillantes, & comme calcaires ; il y'en a de plus ou

moins brillant, souvent il est mêlé de *réalgar*, quelquefois il tire sur le verd. Le *réalgar* est d'un rouge plus ou moins vif & transparent, & souvent cristallisé en aiguilles brillantes. On en trouve beaucoup à Quito & sur le Vésuve ; ces deux matières ne paroissent différer que par la proportion des composans & par l'intimité de la combinaison.

Le mispickel ou pyrite arsenicale, est la dernière mine d'arsenic. Ce métal s'y trouve combiné au fer, quelquefois le mispickel est cristallisé en prismes droits quadrangulaires ; souvent il n'a point de forme régulière. Cette mine est de couleur blanche & charoyante ; Walénius la nomme *miné d'arsenic blanche cubique*.

On trouve encore l'arsenic dans les mines de cobalt, d'antimoine, d'étain, de fer, de cuivre & d'argent.

On ne travaille ou l'on n'exploite point les mines d'arsenic pour en retirer le métal fragile, mais en traitant les mines de cobalt & plusieurs autres métaux qui contiennent de l'arsenic ; ce dernier métal se brûle, se volatilise & se condense dans des canaux obliques ou horizontaux qui terminent les fourneaux. Cette onique opération qu'on fait en métallurgie sur l'arsenic, vient de ce que l'on n'emploie dans les arts que l'oxide d'arsenic. Voyez l'article de MÉTALLURGIE après celui-ci.

Exposé au feu dans des vaisseaux fermés, l'arsenic se sublime sans éprouver d'altération, à moins que l'appareil ne soit très-grand & ne contienne beaucoup d'air qui brûle une partie du métal. L'arsenic est une des matières métalliques les plus volatiles. Il est susceptible de cristalliser en tétraèdres réguliers, lorsqu'on le sublime lentement.

L'arsenic chauffé avec le contact de l'air s'oxide très-promptement & se dissipe sous la forme de fumées blanches, qui répandent une odeur d'ail très-forte. Lorsque l'arsenic est rouge, ou lorsqu'il est jeté en poussière très-fine sur des charbons très-embrasés, il brûle avec une flamme bleuâtre très-sensible. Dans cette combustion il se combine avec l'oxigène de l'air vital, & forme un composé connu autrefois sous les noms d'*arsenic blanc*, de *chaux d'arsenic*, & qui est désigné aujourd'hui sous celui d'oxide d'arsenic. C'est en raison de ce phénomène que les mines de cobalt arsenicales tournissent dans les fourneaux où on les traite une grande quantité de fumées qui se condensent dans les cheminées sous la forme d'une matière blanche, pesante, vitrifiée, déposée en couches, que l'on débite dans le commerce sous le nom très-imprescriptible d'arsenic. C'est un véritable oxide d'arsenic vitreux. On retire l'arsenic de cet oxide dans les laboratoires de chimie en le chauffant dans des vaisseaux fermés avec du charbon ou des matières qui le contiennent ; l'arsenic se sublime au haut de

ces vaisseaux sous la forme d'une croûte ou d'un pain noirâtre au-dehors, & gris brillant dans son intérieur.

Pour réussir à réduire l'oxide d'arsénic en métal, on fait une pâte avec cet oxide en poudre & du savon noir; on met cette pâte dans un matras sur un bain de sable; on chauffe d'abord faiblement pour dessécher & décomposer l'huile; lorsqu'il ne s'exhale plus de vapeurs humides, on augmente le feu pour faire sublimer l'arsenic. On casse le matras après l'avoir laissé refroidir, & on trouve à sa partie supérieure un pain, ayant l'aspect & le brillant métallique de l'arsenic; la plus grande partie du charbon de l'huile reste au fond du matras.

L'oxide d'arsenic diffère essentiellement de tous les autres oxides métalliques; il a une saveur très-forte, & même caustique; c'est un poison violent. Si on l'expose au feu dans des vaisseaux fermés, il se volatilise à une chaleur médiocre, en une poudre blanche cristalline, nommée *fleurs d'arsenic*; si la chaleur est un peu plus forte, il se vitrifie en se sublimer, il en résulte un verre transparent, susceptible de se cristalliser en tétraèdres, dont les angles sont souvent tronqués. Cet oxide vitreux se ternit facilement à l'air, & devient d'un blanc opaque. Aucun oxide métallique n'est vraiment volatil par lui-même, & celui d'arsenic présente seul cette propriété. Il est en même temps très-fusible & très-vitrifiable. Beccher attribuoit la pesanteur & la volatilité de l'arsenic à un principe particulier, qu'il nommoit *terre mercurielle ou arsenicale*, & dont Stahl n'a pu démontrer l'existence. On ne peut pas douter que la saveur forte de l'oxide d'arsenic, & sa propriété vénéneuse dépende de la combinaison de l'oxygène, & du transport de ce principe de l'arsenic sur les organes des animaux. On doit même remarquer ici que parmi les oxides métalliques, ceux qui retiennent avec le moins de force l'oxygène, ceux à qui un grand nombre de métaux peuvent l'enlever, sont les plus acres & les plus vifs de la propriété vénéneuse; tandis que ceux qui retiennent l'oxygène avec beaucoup d'énergie & qui ne le cèdent qu'à très-peu d'autres, comme le fer, le zinc, &c., n'ont qu'une action faible sur l'économie animale. Cet objet sera traité avec toute l'étendue qu'il exige, à l'article CAUSTICITÉ & à celui des OXIDES.

Comme c'est l'oxide d'arsenic qu'on a longtemps traité seul dans les expériences de chimie; nous comparerons toujours, dans tout cet article, les propriétés qu'il présente avec celles de l'oxide d'arsenic.

L'arsenic exposé à l'air, perd son brillant métallique, il devient noir, friable & pulvérulent; c'est un commencement d'oxidation qu'il éprouve; quant à l'oxide d'arsenic, quelque temps qu'on l'expose à l'air froid, il ne paroît pas susceptible de changer de nature; il devient cependant blanc & opaque, au lieu de transparent qu'il

étoit d'abord. M. Landriani a trouvé, qu'en le sublimant plusieurs fois de suite dans un appareil qui contient beaucoup d'air, il passe en partie à l'état d'acide arsenique. Ce phénomène qui a déjà été indiqué sous un autre point de vue à l'article de l'ACIDE ARSENICAL, (c'étoit ainsi qu'on nommoit cet acide à l'époque où M. Morveau rédigeoit les premiers articles de ce dictionnaire,) prouve que l'oxide d'arsenic est capable d'enlever à une température au-dessus de cent degrés de l'échelle de Réaumur, une portion d'oxygène atmosphérique. On reconnoît ici comme dans toutes les oxidations, l'influence du calorique, pour favoriser la combinaison de l'oxygène avec le métal déjà en partie oxidé, puisqu'à froid, l'arsenic ne se convertit qu'en oxide & l'oxide blanc n'éprouve aucune altération connue.

L'arsenic n'agit point sur l'eau à froid. Ce métal reste en masse ou en poudre au fond de ce liquide, sans changer de nature, mais il n'en ferait peut-être pas de même à une température élevée; peut-être alors l'arsenic seroit-il susceptible d'enlever l'oxygène à l'eau, & d'en dégager de l'hydrogène en gaz; l'expérience n'a point encore prononcé à cet égard, & on seroit tenté de nier la possibilité de cette décomposition, en observant que les acides non décomposables par les métaux, n'agissent point sur l'arsenic, & ne contribuent point à le faire oxidier par l'eau. Mais si le métal arsenical n'est point susceptible d'éprouver de changement par l'eau, & de s'unir à ce liquide, en revanche son oxide s'y unit avec une grande énergie. Il faut quatre-vingt parties d'eau à douze degrés, suivant Bergman, pour dissoudre une partie d'oxide d'arsenic, mais j'ai eu occasion d'observer que l'eau peut en dissoudre bien davantage; au reste, mon observation tient sans doute à ce que l'oxide d'arsenic varie & est plus ou moins avancé vers l'acidification, car on connoît l'exacritude de Bergman. L'eau chaude dissout beaucoup plus d'oxide d'arsenic, & l'eau bouillante en dissout près du double de son poids. Une portion de cet oxide se précipite en petits grains cristallins de cette dissolution, à mesure qu'elle se refroidit. Lorsque le refroidissement est très-lent, les cristaux sont des tétraèdres réguliers. M. Morveau a vu cet oxide sous la forme d'octaèdres allongés, jaunâtres comme des topazes; on ne connoît pas d'oxide métallique qui se dissolve dans l'eau en aussi grande quantité que celui d'arsenic. Cette propriété, jointe à la saveur extrême de l'oxide d'arsenic le rapproche des matières salines, & on avoit déjà reconnu depuis long-temps cette analogie, comme on l'a vu dans le commencement de cet article.

L'arsenic ne se combine point du tout avec les terres, mais l'oxide de ce métal s'y combine facilement par la fusion ou la vitrification. Cette combinaison, par le feu, paroît même détruire

la volatilité de l'oxide d'arsénic, & le fixer dans les verres dont il fait partie. Il est aussi susceptible d'accélérer la vitrification, c'est pour cela qu'on le fait entrer dans quelques verres; mais ceux-ci ont l'inconvénient très-grave de se ternir à l'air même en peu de temps, & de s'éclater en lames.

Les terres alcalines, la baryte, la magnésie & la chaux, n'ont aucune action sur l'arsénic. L'oxide de ce métal paroît être susceptible de s'unir à ces terres alcalines. On dissout l'oxide d'arsénic blanc dans l'eau de chaux, & il en résulte une combinaison peu connue, que je nommerai arsénite de chaux.

C'est, sur-tout, avec les alcalis, que cette union a lieu d'une manière remarquable.

Les alcalis fixes caustiques qui n'ont point une action sensible sur l'arsénic, dissolvent très-bien l'oxide de ce métal. Macquer, dans son beau travail sur l'arsenic (acad 1746), a observé, qu'en faisant bouillir de l'oxide d'arsénic en poudre dans la liqueur de nitre fixé, ou dissolution de potasse caustique, cette substance s'y dissout complètement, & forme un fluide brun, gélatineux, dont la consistance augmente peu à peu par le refroidissement. Ce composé, auquel Macquer donnoit le nom de *foie d'arsenic*, & que je nommerai arsénite de potasse, n'a pas la propriété de se cristalliser, il se dessèche comme une gomme par l'évaporation; il devient même dur & cassant; il est déliquescant & dissoluble dans l'eau qui en précipite cependant quelques flocons bruns. L'ouïsse au grand feu, l'arsénite de potasse laisse échapper l'oxide d'arsénic qui se réduit en vapeur; il est décomposé par les acides.

La soude présente les mêmes phénomènes avec l'oxide d'arsénic, cependant la dissolution de cet arsénite de soude a donné à Macquer des cristaux irréguliers, dont il lui a été impossible de décrire la forme. L'ammoniaque dissout aussi l'oxide d'arsénic; mais si on chauffe quelque temps cette dissolution, il s'en précipite une poussière noire qui paroît être de l'arsenic réduit; on retrouve ici un nouvel exemple de la décomposition réciproque de l'ammoniaque & d'un oxide métallique.

L'acide sulfurique, même concentré, n'attaque pas l'arsenic à froid; mais si on le fait bouillir avec ce métal dans une cornue, il se dégage d'abord beaucoup de gaz acide sulfureux, ensuite il se sublime un peu de soufre, & l'arsenic se trouve réduit en oxide, mais sans être dissout: l'acide sulfurique concentré & bouillant, dissout aussi l'oxide d'arsénic; mais lorsque la dissolution est refroidie, cet oxide se précipite presque en entier, & l'acide ne paroît en retenir qu'une très-faible portion. Il acquiert, dans cette combinaison une fixité assez considérable. Bucquet assure qu'en lessivant cet oxide d'arsenic traité par l'acide sulfurique pour emporter la portion d'acide qu'il peut retenir, il reprend toutes ses qualités.

Macquer a dit, qu'en distillant à siccité de l'acide sulfurique sur de l'oxide d'arsenic, celui-ci étoit fixé, & se fondoit en un verre transparent. Brandt avoit déjà remarqué que l'arsenic prenoit de la fixité dans cette opération. M. Monnet ajoute que l'acide sulfurique devient acide sulfureux pendant cette distillation. On voit, par cette espèce de fixité de l'oxide d'arsenic, par sa fusion en un verre transparent, & par le passage de l'acide sulfurique à l'état sulfureux, que cet oxide se rapproche de l'état d'acide arsénique.

L'acide nitrique, appliqué à l'arsenic, l'attaque avec vivacité, & le brûle très-promptement; cet acide dissout aussi l'oxide d'arsenic en assez grande quantité, lorsqu'il est aidé d'une douce chaleur. Brandt dit qu'il faut cinquante parties d'eau-forte pour en dissoudre une d'oxide d'arsenic. M. Monnet assure que l'acide nitrique est celui des acides qui se charge de la plus grande quantité de ce métal, & qu'il ne faut pas plus de dix-huit parties d'eau-forte pour en dissoudre une d'oxide d'arsenic. Saturé d'oxide d'arsenic, l'acide nitrique conserve l'odeur qui lui est propre; évaporé fortement, il forme un sel qui n'a point de figure régulière, suivant Bucquet, & que M. Baumé dit être en partie cubique, & en partie taillé en pointes de diamans. Wallérius dit que ces cristaux sont semblables à ceux du nitrate d'argent. Le nitrate d'arsenic attire puissamment l'humidité de l'air; il ne détone pas sur les charbons, il n'est décomposé ni par l'eau, ni par les acides; les alcalis n'y occasionnent aucun précipité, cependant ils le décomposent, suivant Bucquet, puisqu'en faisant évaporer une dissolution nitrique d'arsenic à laquelle on a ajouté une lessive alcaline, on obtient du nitrate ordinaire & de l'arsénite de potasse. Tous les chimistes, très-embarrassés sur la nature singulière des dissolutions de l'arsenic & de son oxide dans les acides, n'avoient point découvert ce qui se passe dans plusieurs des combinaisons de l'oxide d'arsenic avec les acides. M. Monnet avoit d'abord cependant fait des observations très-curieuses sur cette combinaison. Il avoit remarqué que cette dissolution ne peut pas être saturée, que l'arsenic s'en sépare par l'eau, & que cet oxide paroît s'unir aux acides, comme seroit un acide avec un autre acide: ce sont ces propres expressions, & l'on voit qu'il étoit bien près de découvrir l'acide arsénique. Il est nécessaire de faire remarquer que l'oxide d'arsenic décompose l'acide nitrique; qu'il lui enlève une grande partie de son oxygène; que cet acide en agissant sur l'oxide d'arsenic, passe à l'état de gaz nitreux. Schéele a découvert que, dans cette opération, l'arsenic devient un acide très-fort. On a décrit ses propriétés au mot ACIDE ARSENICAL; on en reparle encore ci-dessus au mot ARSENIATE. Il suffit de bien connoître cette tendance de l'oxide d'arsenic à décomposer l'acide nitrique, à lui enlever son

oxygène, & à former lui-même un acide, pour concevoir qu'il doit abandonner facilement l'acide nitrique, & se précipiter de sa dissolution.

L'acide muriatique, aidé de l'action du feu, dissout l'arsénic & son oxide, suivant Bucquet; cette combinaison peut être précipitée par les alcalis fixes & volatil. M. Baumé dit que ce métal se dissout dans l'acide muriatique bouillant, & qu'il s'en précipite ensuite une poudre jaune comme du soufre. MM. Bayen & Charlard ont constaté que l'acide muriatique n'a aucune action à froid sur l'arsénic; aussi les métaux blancs, & sur-tout l'étain, contenant de l'arsénic, sont bientôt reconnus en raison de cette propriété; en les dissolvant par l'acide muriatique, l'arsénic reste en poudre noire au fond de la dissolution. L'arsénic en poudre jeté dans le gaz acide muriatique oxygéné, y brûle avec une flamme blanche très-vive, & se réduit en oxide qui reste uni à l'acide muriatique.

Si l'on dissout de l'oxide d'arsénic dans l'acide muriatique oxygéné, celui-ci est décomposé, son oxygène se porte sur l'oxide & le fait passer à l'état d'acide arsénique. C'estoit par ce procédé que Scheele préparoit l'acide arsénique. Voyez le 1^{er} vol., histoire des acides, & le mot ARSÉNATE. La dissolution d'oxide d'arsénic dans l'acide muriatique, soumise à la distillation, se sépare en deux états différens, l'un liquide volatil fumant, qu'on a nommé beurre d'arsénic, & l'autre plus fixe & solide, qui attire l'humidité de l'air. Le premier est avec un grand excès d'acide, l'autre sul est avec excès d'oxide. La dissolution muriatique d'arsénic distillée est décomposable par l'eau, qui en précipite l'oxide métallique. M. Monnet observe à cette occasion, que cette dissolution n'est pas saturée & ressemble à l'union de deux acides. Aussi Bergman en traitant de cette dissolution muriatique d'arsénic remarque-t-il qu'en y ajoutant de l'acide nitrique, & en évaporant le mélange à siccité, on obtient de l'acide arsénique. C'est à une formation semblable d'acide arsénique qu'est due la grande dissolubilité apparente de l'oxide d'arsénic dans l'eau régale ou acide nitro-muriatique.

On ne connoît que très-peu l'action des autres acides sur l'oxide d'arsénic, car on sait qu'elle est nulle sur l'arsénic. Voici ce que Bergman dit de l'union des acides fluorique, boracique, oxalique, tartareux avec l'oxide d'arsénic. L'acide arsénique & l'acide fluorique le dissolvent, & il se forme dans la dissolution des cristaux cristallins. Je ne doute pas que la même chose n'arrive avec l'acide boracique; quoiqu'il soit certain que le borax saturé de son acide ne trouble pas la dissolution aqueuse d'arsénic. L'acide oxalique attaque facilement l'oxide d'arsénic blanc, & la dissolution donne des cristaux prismatiques: il en est de même de l'acide tartareux.

Suivant M. Tromsdorf l'oxide d'arsénic est dis-

soluble dans l'acide benzoïque. Le benzoate d'arsénic se cristallise en plumes très-fines; il est plus dissoluble à chaud qu'à froid; les alcalis ne le décomposent point; il est susceptible de se sublimer à un feu doux; il se décompose à une grande chaleur. On ignore entièrement les propriétés du malate, du citrate, du gallate, du pyromucate, du pyrolignite & du pyroarsénite d'arsénic.

Ces énoncés sont vagues, & prouvent qu'on ne possède point encore de connoissances exactes sur un grand nombre de sels arsénicaux. Il est vrai que la plupart des combinaisons salines de l'acide d'arsénic avec les acides, présentent peu de propriétés distinctives, parce qu'elles sont presque toutes également peu constantes, peu solides, peu susceptibles de permanence, & que l'oxide d'arsénic tend sans cesse à s'en séparer. On doit ajouter à cela que lorsqu'on traite tous les sels formés par les acides végétaux avec l'oxide d'arsénic par le feu, à mesure que les principes qui constituent les radicaux des acides végétaux se séparent, le carbone & l'hydrogène se portent chacun de son côté sur l'oxygène de l'arsénic, & rapprochent cet oxide de l'état métallique.

On a quelques détails de plus sur l'acétite d'arsénic; les premières pages du premier volume de ce dictionnaire ont présenté l'article ACÉTÉ AMMONIACAL, l'histoire assez détaillée des propriétés remarquables de ce sel. On se contentera ici de rappeler les principaux traits de cette histoire, pour rendre plus complète celle de l'arsénic.

L'acide acétique ne paroît pas dissoudre immédiatement l'oxide d'arsénic, mais cette dernière substance, dissillée avec partie égale d'acétite de potasse, a donné à M. Cadet & à MM. les chimistes de l'académie de Dijon, une liqueur rouge, fumante, d'une odeur infecte, très-ténace & d'une nature très-singulière. M. Cadet avoit déjà observé que cette liqueur étoit capable d'enflammer le lut gras. MM. les académiciens de Dijon voulant examiner la matière jaunâtre d'une consistance huileuse rassemblée au fond du flacon qui contenoit la liqueur fumante arsénico-acétée, décantèrent une portion de cette liqueur fumante, & versèrent le reste sur un filtre de papier. A peine eut-il passé quelques gouttes, qu'il s'éleva tout-à-coup une fumée infecte très-épaisse, qui formoit une colonne depuis le vase jusqu'au plafond; il s'exalta sur les bords de la matière une espèce de bouillonnement, & il en partit une belle flamme rose qui dura quelques instans. On peut voir dans le troisième volume des *éléments de chimie de Dijon*, le détail des belles expériences que ces savans académiciens ont faites sur cet objet. Ils comparent la liqueur dont nous venons de parler à un phosphore liquide; nous croyons que c'est une espèce de pyrophore. Le résidu de la distillation de l'acétite de potasse avec l'oxide d'arsénic est formé en grande partie par la potasse. (Voyez le mot ACÉTÉ ARSENICAL dans le premier volume)

On n'a point examiné les combinaisons de l'oxide d'arsenic avec les acides animaux; car il est presqu'inutile d'observer encore ici que ces acides n'ont pas d'action sur l'arsenic en métal.

Bergman indique les attractions de quelques-uns des acides pour l'oxide d'arsenic; mais on voit qu'il n'a que peu de faits particuliers sur ces affinités. Les dissolutions d'arsenic font en quelque sorte imparfaites suivant lui, parce que son oxide est promptement acidifiable. Il est évident que l'acide sulfurique cède cet oxide au muriatique, car si on verse ce dernier sur une dissolution de sulfate d'arsenic, on obtient par l'évaporation du muriate d'arsenic. L'acide oxalique chasse également l'acide sulfurique, & l'acide nitrique sépare l'acide tétracique. Quoiqu'il annonce le reste comme douteux dans la courte explication qu'il donne de la cinquième-cinquième colonne de sa table, il place au-dessous des cinq acides déjà indiqués, le phosphorique, le fluorique, le saccharique, le succinique, le citrique, le formique, le lactique, l'arsénique, l'acétueux, le pyrolique, le malique, le pyromaqueux, le tunisien, & le prussique.

L'arsenic paraît susceptible de se décomposer les sulfates à une température élevée, mais sa volatilité s'oppose à ce que cette décomposition soit complète; son oxide ne fait rien sur ce genre de sels, puisqu'il est déjà combiné avec assez d'oxygène pour ne pas enlever celui de l'acide sulfurique qui lui sur-tout a des bases terreuses ou alcalines très-fixes.

L'arsenic mêlé en poudre fine avec le nitre, & projeté dans un creuset rouge au feu ou chauffé jusqu'au rouge dans une cornue, produit une détonation vive; l'oxygène dégagé de l'acide nitrique brûle avec une flamme blanche le métal. Suivant la dose de nitre employé, on trouve dans le creuset ou dans la cornue après l'opération, l'alcali fixe qui seroit de base au nitre uni à l'oxide d'arsenic, à l'état d'arséniate de potasse, ou à l'acide arsénique formant de l'arséniate de potasse; le premier a lieu quand on a pris parties égales, le second se retrouve lorsqu'on a pris trois parties de nitre sur une de métal.

L'oxide d'arsenic, mêlé à deux parties de nitre & jeté dans un creuset rouge, détone faiblement mais encore sensiblement; si l'acidité en partie par l'addition de l'oxygène, & on obtient alors de l'arséniate de potasse.

Le même oxide distillé dans une cornue de verre avec partie égale de nitre, se décompose ce sel & donne un acide nitreux en vapeur très-rouge. Cet acide ne peut se condenser qu'autant qu'on met un peu d'eau dans le ballon, ce qui lui donne une couleur bleue. Beccher, Stahl & Kunckel ont décrit cette opération. Macquer qui l'a répétée avec soin, ayant examiné le résidu dont ces chimistes n'avoient pas parlé, a découvert qu'il formoit un sel neutre particulier auquel il a donné le nom de *sel neutre arsenical*; c'est l'arséniate de potasse de la nouvelle nomenclature. On a décrit avec

soin cette opération & les propriétés du sel qu'elle fournit, à l'article ARSÉNATE DE POTASSE.

L'oxide d'arsenic se décompose aussi le nitrate de soude à l'aide de la distillation, & se forme avec la base de l'arséniate de soude. Voyez ce mot. Cet oxide agit de même sur le nitrate ammoniacal. On avoit cru que cette opération demandoit beaucoup de précautions à cause de la propriété qu'a le nitrate ammoniacal de détoner sans addition dans les vaisseaux clos; mais M. l'ellénier a prouvé qu'on pouvoit la faire sans aucun danger, même à la dose de plusieurs livres. Voyez le mot ARSÉNATE D'AMMONIAQUE. La découverte du sel neutre arsenical de Macquer a conduit manifestement Scheele à celle de l'acide arsénique, puisque Macquer avoit annoncé que l'oxide d'arsenic faisoit fondre d'acide d'un ce sel. Mais Scheele a poussé beaucoup plus loin la connoissance exacte de ces nouvelles combinaisons. Voyez le mot ARSÉNATE.

L'arsenic & l'oxide d'arsenic ne décomposent pas les muriates alcalins. Ils ne séparent que difficilement l'ammoniacque du muriate ammoniacal.

Le muriate oxygéné de potasse fait brûler l'arsenic avec une célérité singulière, lorsqu'on mêle ce métal en poudre fine avec deux parties de sel. Ce mélange touché par une manière en combustion, prend feu à l'instant, & brûle en un moment très-court avec une flamme blanche très-brillante. Si on se sert d'oxide d'arsenic au lieu du métal, on convertit cet oxide en acide arsénique. Tous les autres sels minéraux, les fluates, les borates, les carbonates, les tunitaires, les molybdates & les succinates, n'ont pas été traités par l'arsenic ni par son oxide, & on ignore entièrement si ces matières ont une action réciproque les unes sur les autres, & quelle est cette action.

On n'a point encore examiné avec soin les combinaisons de l'arsenic & de son oxide, avec les différens corps combustibles, c'est-à-dire l'hydrogène, le diamant, le soufre, le phosphore, & le carbone. Voici à quoi se réduit ce qu'on fait sur ces combinaisons.

L'hydrogène dans l'état de gaz, n'a aucune action sur l'arsenic, mais il paroît rapprocher son oxide de l'état métallique, en lui enlevant l'oxygène; ce dont on s'assure, en faisant passer du gaz hydrogène dans une dissolution aqueuse d'oxide d'arsenic; on voit bientôt se former un précipité noirâtre.

Personne n'a encore tenté de combiner le diamant avec aucun autre corps; on ne fait donc pas s'il peut s'unir avec l'arsenic.

Quant au soufre, quoiqu'on ignore encore plusieurs faits importants sur les combinaisons avec l'arsenic, c'est au moins celui de tous les corps combustibles dont on connoît le mieux l'action sur l'arsenic.

Ce métal s'unit très-bien au soufre par la fusion

& par la sublimation ; il forme un composé jaune ou rouge suivant les proportions ; cependant Bergman qui indique cette différence, n'énonce pas les proportions, & laisse les lecteurs dans l'incertitude sur cet objet. Il paroît résulter de toutes les expériences que l'on a faites sur cette combinaison, que le sulfure d'arsénic jaune ou l'*orpiment*, diffère par plus d'oxygène, du sulfure d'arsénic rouge ou du *réalgar*. Le principal fait qui autorise cette conclusion, c'est que lorsqu'on chauffe de l'oxide d'arsénic blanc avec le soufre, une partie de ce dernier passe à l'état d'acide sulfureux, en enlevant de l'oxygène à l'arsénic ; & si on en dégage beaucoup de gaz acide sulfureux, on obtient du sulfure d'arsénic rouge ou réalgar, au lieu du jaune ou de l'orpiment. D'après cette généralité, on concevra mieux & les détails que j'ai donnés sur ces combinaisons dans mes élémens de chimie, & ceux que j'y ajouterai ici sur les propriétés de ces sulfures.

L'oxide d'arsénic se combine très-bien avec le soufre ; lorsqu'on fait sublimer ces deux substances ensemble, il en résulte un corps jaune ou rouge, volatil, qui a une saveur moins forte que l'oxide d'arsénic pur, & qui n'est plus soluble dans l'eau. Cet oxide d'arsénic sulfuré jaune a été nommé *orpim* ou *orpiment fatide* ; il est susceptible de cristalliser en tétraèdres comme l'oxide d'arsénic vitreux ; lorsqu'on le tient plus long-temps fondu, il devient d'un beau rouge & transparent, dans cet état on l'appelle *réalgar*, *réalgar*, *rizigal fatide*, ou *arsenic rouge*. Nous nommons ce composé oxide d'arsenic sulfuré rouge. Quelques chimistes ont cru que le sulfure d'arsenic rouge ne différoit du jaune & de l'orpiment, qu'en ce qu'il contenoit plus de soufre ; mais Bucquet avoit observé que le composé de soufre & d'arsenic est rouge, lorsqu'il a été fondu quelque temps, puisqu'il suffit d'exposer de l'*orpiment* à une chaleur vive pour le faire passer à l'état de *réalgar*. Cette observation est d'accord avec ce qui a été exposé plus haut, puisqu'une température plus élevée favorise la décomposition de l'oxide par le soufre, & rapproche cet oxide de l'état métallique.

Le sulfure d'arsenic jaune ou rouge présente des propriétés qui est important de faire connoître ici. Le premier prend souvent la forme de lames ; le second affecte presque toujours celle de prismes.

L'orpim a une pesanteur spécifique — à 5,315 ; & le réalgar à 3,235, suivant Bergman.

L'acide nitrique & l'acide nitromuriatique attaquent l'un & l'autre de ces sulfures ; le réalgar passe du rouge au jaune par le contact de ces acides, qui ne changent point la couleur de l'orpim ; ce qui annonce encore que ce dernier contient l'arsenic plus oxidé que le rouge. Ces sels dissolvent l'arsenic, & laissent le soufre ; il faut les prendre assez concentrés pour dissoudre ce métal, & ne les pas trop chauffer, car ils brûle-

roient du soufre & l'on ne pourroit pas en connoître les proportions.

Les alcalis caustiques dissolvent par la voie humide les sulfures d'arsenic ; ils forment une espèce d'encree de sympathie, dont la vapeur colore les sels de plomb à travers beaucoup de feuilles de papier. En faisant bouillir de l'eau avec l'orpim & le double de chaux vive, on prépare un sulfure calcaire arsénical, qu'on a beaucoup employé autrefois comme *liqueur d'épreuve du vin*, pour y reconnoître la présence du plomb. Les alcalis fixes très-chauffés avec deux fois ou même trois fois leur poids d'*orpiment* ou de *réalgar* dans un creuset, fixent en quelque sorte le soufre, & laissent dégager l'arsenic ; il ne reste que très-peu d'oxide arsénical dans les sulfures solides qui se forment par cette opération.

Le nitre & le muriate suroxygéné de potasse détonent fortement avec les sulfures d'arsenic, ils en brûlent le soufre & en oxident le métal. La plupart des matières métalliques qui ont de l'affinité pour le soufre & l'arsenic s'unissent à l'orpim & au réalgar, tels sont sur-tout le fer & l'argent ; le premier forme une espèce de mispickel, & le second une mine d'argent rouge artificielle.

Voici ce que M. Pelletier a consigné dans ses mémoires sur les phosphores métalliques, relativement à la combinaison du phosphore avec l'arsenic. Margraf (dit-il) a examiné l'action du phosphore sur l'oxide d'arsenic. Voici ce qu'il a dit à ce sujet. « J'ai mêlé demi-drachme de *chaux d'arsenic* avec une seule drachme de phosphore, & en ayant fait la distillation, j'ai observé les circonstances suivantes. 1°. L'arsenic se sublima avec le phosphore, d'un rouge éclatant, mais il y en avoit fort peu qui fût sous la forme accoutumée du phosphore, cela avoit plutôt l'air d'un sublimé mixte ; au lieu de résidu, je trouvois une substance noire, fragile, du poids d'environ huit grains, qui attira assez vite l'humidité de l'air, & se fondit. »

J'ai répété l'expérience de Margraf, & j'ai obtenu les mêmes résultats ; mais je ne regarde point ce sublimé rouge comme de l'arsenic phosphoré ; ce sublimé rouge est du phosphore en partie décomposé, c'est à dire, uni à une portion d'oxygène qui lui a été fourni par la *chaux d'arsenic*, parce que l'oxygène a une affinité plus grande avec le phosphore qu'avec l'arsenic ; ce que je regarde comme de l'arsenic phosphoré, est une substance brillante, noirâtre qui se sublime avec cette matière rouge, & qui étant mise sur un charbon brûlé, répand l'odeur de l'arsenic & celle du phosphore ; la petite portion de résidu que l'on trouve dans la cornue est de l'acide phosphorique produit par l'union d'une petite portion de phosphore à une portion de l'oxygène de l'oxide d'arsenic, mais, comme je viens de l'observer, la plus grande portion de l'oxygène que fournit la *chaux d'arsenic*, forme en s'unissant au phosphore une combinaison

toute particulière, de couleur rouge, & pouvant se sublimer; le phosphore dans cet état, est, relativement au phosphore, ce que l'arsenic blanc est relativement au régule d'arsenic; ce sera donc (si l'on peut donner le nom d'oxide à des substances qui ne sont point métalliques) de l'oxide de phosphore.

L'on peut obtenir de l'arsenic phosphoré, en distillant un mélange de parties égales de régule d'arsenic & de phosphore, mais il faut dans cette distillation bien ménager le feu, l'on obtiendra par ce moyen un résidu noir & brillant, dans lequel le phosphore se trouve en quantité. Il faut conserver le produit dans l'eau.

L'on unit aussi le phosphore à l'arsenic, par la voie humide. J'ai mis dans un matras avec S. Q. d'eau un gros de régule d'arsenic & un gros de phosphore. J'ai tenu le matras sur un bain de sable pendant quelque temps, le phosphore s'est fondu, & s'est uni à l'arsenic, j'ai aussi obtenu l'union du phosphore & de l'arsenic, en mettant dans un matras un gros de chaux d'arsenic, & un gros de phosphore. Procédant d'ailleurs, comme je viens de l'indiquer dans cette dernière expérience, l'oxygène de la chaux d'arsenic se porte sur le phosphore, d'où il résulte de l'acide phosphorique qui se dissout dans l'eau; l'oxide d'arsenic se trouve ensuite à l'état de régule, se combine avec la portion de phosphore non décomposé.

Quant au carbone, on n'a point encore d'expériences qui prouvent qu'il forme une combinaison particulière avec l'arsenic, quoiqu'il soit vraisemblable que cette combinaison existe. On fait que ce corps combustible enlève l'oxygène à l'oxide d'arsenic, & qu'il rappelle cet oxide à l'état métallique.

Presque toutes les substances métalliques sont susceptibles de s'unir à l'arsenic; quoique ces combinaisons appartiennent particulièrement à chaque métal, & doivent être présentées en détail dans l'histoire de chacun d'eux, il est convenable d'en exposer ici les principaux phénomènes.

Le cobalt est toujours uni à l'arsenic dans la nature. Il paroît y être même fort adhérent, puisqu'on ne peut tenir du cobalt en fusion sans qu'il s'en dégage une vapeur arsenicale.

Le nickel paroît aussi fort adhérent à l'arsenic; on ne peut l'en séparer que par des grillages répétés avec le charbon, comme Bergman l'a fait voir.

L'arsenic enlève facilement de l'oxygène à l'oxide de manganèse, & même l'oxide d'arsenic blanc paroît passer en partie à l'état d'acide, lorsqu'on le chauffe avec l'oxide de manganèse.

L'arsenic s'unit à l'antimoine, on a peu examiné cette combinaison.

Allié au zinc, il en altère le grain, la couleur & la demi-ductilité. En chauffant du zinc en poudre avec l'oxide d'arsenic, celui-ci cède son oxygène au zinc qui brûle rapidement; l'oxide d'arsenic passe à l'état métallique.

On ne connoît pas la combinaison de l'arsenic avec le mercure; on fait seulement que l'arsenic enlève l'oxygène à l'oxide de mercure, à l'aide d'une température douce; en faisant cette expérience dans une cornue de verre avec une partie d'arsenic en poudre, & deux parties d'oxide rouge de mercure, l'arsenic brûle en donnant des étincelles blanches brillantes, & se trouve converti en oxide blanc. C'est cette attraction de l'arsenic plus forte pour l'oxygène que celle du mercure, qui est la cause de la décomposition du muriate de mercure corrosif ou *sublimé corrosif* par l'arsenic, puisque cette décomposition n'a pas lieu avec l'oxide d'arsenic.

On unit l'arsenic à l'étain, soit immédiatement, en faisant fondre de l'étain avec un douzième ou un seizième de son poids d'arsenic en poudre fine, ou en chauffant de l'étain avec l'oxide d'arsenic, celui-ci cède son oxygène à une partie de l'étain, & en repassant à l'état métallique se combine avec ce métal. Un pareil alliage contenant un seizième d'arsenic est difficile à fondre, lamelleux, cassant & ne peut pas être employé. Voyez ETAIN.

L'alliage du plomb avec l'arsenic est inconnu; il paroît que l'acide arsenique est un des minéralisateurs du plomb dans la nature; quelques mines rouges de plomb semblent avoir le caractère d'arséniate de plomb. Voyez le mot PLOMB.

Le fer uni à l'arsenic paroît cassant à chaud; on trouve cet alliage dans le mispickel, la structure fibreuse du fer est très-altérée par cette combinaison. Voyez l'article FER.

Le cuivre se combine bien avec l'arsenic; il devient blanc & cassant par cette union; il forme une espèce de cuivre blanc connu sous le nom de tombac blanc. Voyez les mots CUIVRE & TOMBAC.

L'argent allié d'arsenic devient très-aigre & très-cassant. Les mines d'argent rouge contiennent de l'arsenic, mais celui-ci y est à ce qu'il paroît à l'état d'oxide ou même d'acide.

L'or est pâli par l'arsenic, qui lui enlève en même temps sa ductilité.

Le platine devient très-susceptible par l'addition de l'oxide d'arsenic; en chauffant long-temps cette espèce d'alliage, l'arsenic se dissipe & le platine reste ductile. C'est pour cela qu'on emploie cette addition d'arsenic pour travailler le platine. Voyez le mot PLATINE.

Bergman indique dans l'ordre suivant les attractions de l'arsenic par la voie sèche pour les métaux, le nickel, le cobalt, le cuivre, le fer, l'argent, l'étain, le plomb, l'or, le platine, le zinc & l'antimoine.

L'oxide d'arsenic est employé dans plusieurs arts, & spécialement dans les teintures. On le fait entrer aussi dans la vitrification. Nery donne pour teindre le cristal de roche par le feu, une recette qui a été répétée avec succès par Bergman. Elle consiste à faire chauffer ce cristal dans un

crusset, avec un mélange d'orpin, d'oxide d'arsenic, de sulfure d'antimoine & de muriate d'ammoniaque. Les cristaux ainsi traités par Bergman, étoient tachés de rouge, de jaune & d'opale, mais ils étoient remplis de petites fentes.

L'orpin & le réalgar sont fort employés par les peintres; quelques-uns même ont la dangereuse habitude de porter leurs pinceaux à la bouche. On fait un beau vert avec le cuivre & l'arsenic. Voyez le mot *CUIVRE*.

Dans les cours de physique on se sert (comme entre de symphathio) de la dissolution d'orpiment dans l'alcali.

On a employé le sulfure de chaux arsenical comme liqueur d'épreuve pour connoître les vins lithargyrés, mais cette méthode est vicieuse, parce que les vins chargés de tartre donnent un précipité, & parce que s'ils contiennent de la craie, on ne peut plus y reconnoître l'oxide de plomb par cette addition.

Les alliages d'arsenic avec le cuivre, avec l'étain, sont quelquefois utiles; mais il faut bannir ces alliages des usages économiques.

On a propulé & conseillé même avec assez de force, plusieurs préparations d'arsenic, comme de précieux médicaments dans plusieurs maladies, &c., comme on s'y attend bien, sur-tout dans les maladies désespérées, qui résistent à tous les remèdes connus, telles que le cancer, les fièvres rebelles, &c. On a cherché à l'adonner par la combinaison avec les alcalis, mais on ne doit jamais oublier que c'est le plus violent & le plus dangereux de tous les poisons: la couleur blanche & la dissolubilité de l'oxide d'arsenic dans l'eau rendent malheureusement trop fréquens les empoisonnements par cette matière. On connoît qu'un homme a été empoisonné par l'arsenic, aux symptômes suivans: la bouche est sèche, les dents agacées, le gosier serré; on éprouve un crachottement involontaire, une douleur vive à l'estomac, une grande soif, des nausées, des vomissemens de matières glaireuses, sanguinolentes; des coliques très-vives, accompagnées de sueurs froides, des convulsions. Ces symptômes sont bientôt suivis de la mort: on s'assure que l'oxide d'arsenic en est la cause en examinant les alimens suspects. La présence de ce poison s'y manifeste, lorsqu'en jettant sur des charbons une portion de ses alimens desséchés, il s'en élève une fumée blanche d'une sorte d'odeur d'ail. La disposition putride des cadavres peut volatiliser, suivant Bergman, l'odeur alliée de l'arsenic. Il rapporte l'exemple d'un sujet empoisonné par l'arsenic, dont le corps répandoit une odeur très forte d'arsenic dans l'amphithéâtre de dissection d'Upsal.

On avoit coutume de donner aux personnes empoisonnées par l'oxide d'arsenic, des boissons mucilagineuses ou du lait, ou des huiles douces en grandes doses, dans le dessein de relâcher les viscères agacés, de dissoudre & d'emporter la plus

grande partie du poison arsenical. Navier, médecin de Châlons, qui s'est occupé de la recherche des contre-poisons de l'oxide d'arsenic, a trouvé une matière que se combine avec cette substance par la voie humide, la sature, & détruit la plus grande partie de sa causticité. Cette substance est le sulfure calcaire ou alcalin, & mieux encore le même sulfure qui tient en dissolution un peu de fer. La dissolution d'oxide d'arsenic décompose les sulfures sans exhiler aucune odeur. Cet oxide se combine au soufre, avec lequel il fait de l'orpiment, & il s'unit en même-temps au fer, si le sulfure en contient. Navier prescrit un gros de *soufre de fer* dans une pinte d'eau qu'il fait prendre par verrees. On peut également donner cinq à six grains de sulfure de potasse sec en pilules, & par-dessus chaque pilule un verre d'eau chaude. Lorsque les premiers symptômes ont disparus, il conseille l'usage des eaux minérales sulfureuses. L'expérience lui a fait connoître qu'elles sont très-propres à détruire les tremblemens & les paralysies qui suivent ordinairement l'effet de l'oxide d'arsenic, & qui mènent à la phrésie & à la mort. Navier approuve aussi l'usage du lait, parce que cette substance dissout aussi bien l'oxide d'arsenic que le fait l'eau; mais il condamne les huiles qui ne peuvent le dissoudre.

ARSENIC. (Métallurgie.) L'arsenic se trouve très-souvent accompagner les minéraux dont on tire les métaux & demi-métaux. Voyez le dictionnaire de minéralogie.

L'arsenic est sur-tout abondamment combiné dans les minéraux de cobalt & d'argent. Il se trouve aussi très-souvent accompagner le minéral d'étain sous forme d'une pyrite blanche, qui est elle-même un minéral d'arsenic, auquel les Allemands ont donné le nom de *mispickel*. Mais il est rare dans les travaux en grand de la métallurgie, de procéder sur des mines purement arsenicales, & l'état d'en retirer l'arsenic. Ce demi-métal se tire ordinairement des minerais, pendant les grillages que l'on est forcé de leur faire subir, avant que de les fondre.

L'arsenic traité avec le charbon ou d'autres corps combustibles d'une manière convenable, prend les propriétés d'un demi-métal très-volatil, d'une couleur plus ou moins sombre, blanche ou brillante. On nomme cette substance *régule d'arsenic*.

L'arsenic qui entre dans le commerce, se tire dans les travaux en grand, des fonderies d'Allemagne, principalement de Saxe, où l'on traite des minerais d'argent & d'étain &c., sur-tout du cobalt, que l'on est obligé de torréfier pour en dégager l'arsenic, avant que d'en faire de l'aur. Voyez AZUR, article métallurgique. L'arsenic se perdroit & se dissiperoit en fumée pendant le grillage de ces minerais qui le contiennent, sans un moyen qu'on a imaginé, & qu'on pratique pour le recueillir & le rassembler.

Pour cela on grille les minerais dans un four-

neau de reverbère voûté, auquel est ajussée une longue cheminée ou galerie tortueuse. L'arsenic réduit en vapeurs, enfle cette cheminée, s'y condense; les portions d'arsenic, qui se déposent & s'arrachent à la partie de la cheminée la plus froide & la plus éloignée du fourneau, y forment sous la forme d'une poudre blanche ou grise, qu'on nomme *seur* ou *farine d'arsenic*. Celles au contraire qui s'attachent à la partie de la cheminée la plus chaude & la plus voisine du fourneau, y éprouvent une sorte de fusion, qui les réduit en masses compactes, pesantes, d'un blanc mat, & ressemblant à de l'émail blanc. Ces masses d'arsenic blanc sont presque toujours entrecoupées de veines jaunâtres & grisâtres. Ces couleurs sont dues à un peu de soufre qui, pendant le grillage, se sublime avec l'arsenic.

Il est rare que l'arsenic qu'on obtient dans les travaux en grand, soit pur ou exempt de parties sulfureuses; car les minerais sont presque toujours accompagnés de cette substance qui se sublime avec l'arsenic; mais en le sublimant de nouveau, on le purifie; & ce qui cependant ne peut avoir lieu qu'en y mêlant un intermédiaire capable d'absorber le soufre. Les terres absorbantes & les alcalis peuvent faire cette fonction.

La facilité avec laquelle l'arsenic se volatilise, lui fait souvent emporter de l'agent avec lui dans les grillages que l'on fait éprouver aux minerais de ce métal, pour en dégager cette substance volatile. Voyez l'article ARGENT, *métallurgie*.

ARSENIC. (Pharmacie.) On ne croiroit pas que le plus terrible poison que renferment les minéraux, a pu être proposé & même employé sous différentes formes, pour le traitement de quelques maladies, si l'on ne s'avoit pas jusqu'à quels excès l'espoir de guérir & l'amour de la singularité ont pu porter les hommes. C'est sur-tout contre les fièvres quartes rebelles, le cancer, les vieux ulcères, les maladies de la peau opiniâtres, l'éléphantiasis, qu'on a proposé ce remède, même à l'intérieur. Tantôt on a conseillé l'usage de l'oxide d'arsenic blanc dissous dans des boissons adoucissantes, mucilagineuses, &c. Quelques médecins ont cru l'adoucir en l'unissant aux alcalis fixes, & ils ont prescrit l'arsénite de potasse ou le foie d'arsenic de Macquer. Il en est qui ont préféré le sel neutre arsénical ou l'arséniate de potasse. Mais tous ces remèdes sont également terribles, & il nous est impossible d'en recommander l'usage intérieur. A l'extérieur il n'est même pas prudent de se servir de ce caustique. Morgagni & plusieurs autres médecins célèbres en ont vu de mauvais effets; il excite l'inflammation, la rougeur, la chaleur; il détruit l'épiderme; alors il passe dans le système absorbant, il peut produire des douleurs affreuses dans l'économie animale. On faisoit cependant autrefois entrer l'arsenic blanc ou oxide d'arsenic dans les emplâtres & les onguents,

entr'autres dans l'emplâtre magnétique. Spielman a bien raison de conseiller de rejeter absolument l'usage de pareils médicaments, & d'avertir même les pharmaciens de ne les donner qu'avec la plus grande circonspection.

Il est bien plus prudent de parler des moyens qu'on peut employer pour s'opposer à ses terribles effets. L'huile & tous les huileux nuisent dans cette espèce d'empoisonnement, en attachant les molécules arsénicales aux parois de l'estomac & des intestins. Le lait ne détruit point l'acreté de l'oxide d'arsenic; le sulfure de potasse & surtout celui qui tient du fer en dissolution, est un moyen recommandé par Navier, & qui a eu de grands succès entre les mains. Les eaux sulfureuses ou chargées de gaz hydrogène sulfuré, sont aussi très-utiles pour détruire les effets secondaires de ce poison. Cet objet a été traité avec toute l'étendue qu'il mérite dans le dictionnaire de médecine. (Voyez-y l'article ARSENIC.)

ARSENIC BLANC. Lorsque le nom d'*arsenic* commença à faire naître quelques équivoques dans la nomenclature de la chimie, après la découverte du métal, on adopta les mots **ARSENIC BLANC**; soit pour distinguer l'oxide de l'arsenic métallique, soit pour l'opposer aux noms d'*arsenic jaune* & d'*arsenic rouge*, qu'on donnoit aux sulfures de ce métal. (Voyez le mot ARSENIC.)

ARSENIC JAUNE. C'est un des noms qu'on a donné au sulfure d'arsenic jaune ou orpiment. Voyez ARSENIC.

ARSENIC ROUGE. Une des dénominations du sulfure d'arsenic rouge ou réalgar. (Voyez ARSENIC.)

ARSÉNIÉ. Voici encore une nouvelle dénomination que je propose, pour exprimer la combinaison de l'arsenic métallique, du répule d'arsenic en nature avec différentes substances. Il vaudra mieux que celui d'*arsénique* qu'on a déjà employée, & qui depuis la nouvelle nomenclature appartient aux combinaisons de l'acide arsénique. On nommera par exemple *gaz hydrogène arsénié*, la dissolution de l'arsenic dans le gaz hydrogène, découverte par Scheele, en dissolvant du zinc dans l'acide arsénique liquide; & cette désignation sera analogue à celle de sulfuré, phosphore, &c.

ARSÉNITES. Je propose cette nouvelle dénomination pour désigner les combinaisons de l'oxide d'arsenic blanc avec les terres, les alcalis & les oxides métalliques, parce que je crois que ces combinaisons sont à celles de l'acide arsénique ou aux arsénates ce que sont les sulfures aux sulfates, &c. En effet, l'oxide d'arsenic présente beaucoup de caractères acides; il rougit la teinture de tournesol; il est acre & dissoluble dans l'eau; il pré-

cipite les sulfures, & sur-tout il s'unit aux terres, aux alcalis & aux métaux oxydés. Il y a plus, la volatilité beaucoup plus grande que celle de l'acide arsénique, ressemblant à l'excès de celle des acides sulfureux, nitreux, phosphoreux, sur celle des acides sulfurique, nitrique, phosphorique. On pourroit donc l'appeler *acide arsénieux*, & cette seule innovation dans la terminaison d'un mot ferait naître beaucoup d'idées aux chimistes qui s'intéressent au progrès de leur science. Ils pensent qu'il seroit très-intéressant de bien connoître toutes les combinaisons que forme cet acide sur tout avec les terres & les oxydes métalliques; ces espèces de sels pourroient être quelque jour fort utiles aux arts. On ne connoît assez bien que l'arsénite de potasse. Voyez les mots ARSÉNIC & ARSÉNIATE DE POTASSE.

ARTHRITQUES. (*Pharmacie.*) Médicaments propres aux maladies des articulations. Voyez le dictionnaire de médecine.

ARUM. (*Pharmacie.*) Le mot latin arum, pied de veau, est le nom d'une plante presque francisée, dont on se sert en pharmacie. La racine d'arum fournit une féculle purgative quand elle n'a point été lavée, & seulement nourissante quand elle l'a été. Voyez FEULE.

ART SACERDOTAL. Dans quelques livres de chimie du siècle dernier, qui ne sont point encore entièrement purgés des idées & des prétentions alchimiques, on trouve quelquefois la chimie nommée art sacerdotal. Il paroît que cela vient de ce que chez les anciens Egyptiens la chimie étoit exercée par des prêtres, qui en faisoient mystère, & qui s'en servoient pour en imposer aux peuples crédules & ignorants.

ARTICHAUD. (*Pharmacie.*) *Cynara scolymus*. *Cynara*. Dod. *Pempt.* 754. Cette belle plante potagère n'est pas beaucoup du domaine de la médecine. En recueillant ce qu'il y a dans les auteurs sur la propriété de l'artichaud, il résulte que le réceptacle de cet espèce de fruit est un aliment doux, facile à digérer, qu'il fait quelquefois le délice de nos tables, qu'il est aphrodisiaque, cordial, alexipharmaque, sudorifique, apéritif, stimulant & restituant.

Le suc des feuilles de cette plante a été donné avec succès par verrees contre l'hydropisie, contre l'œdémate & les vers.

La racine est diurétique, apéritive, contre les gonorrhées. Sa décoction est vantée pour chasser les punaises.

Sa fleur fait cailler le lait. Les Arabes & les Maures s'en servent pour préparer le fromage. On la cite pour guérir de la stérilité & pour empêcher l'avortement.

L'Aigue a publié un traité contenant la pro-

priété des artichaux. A Paris, chez Dupré 1530, in-4°.

(M. WILLEMET.)

AS. (*Pharmacie.*) Ce mot est synonyme de libra ou livre, poids antérieur de 12 onces, actuellement de 16 onces en médecine & en pharmacie.

ASARINE. (*Pharmacie.*) *Amirrhinum asarina*. *Asarina*. Lob. Cette plante, peu en usage, croît spontanément sur les rochers, dans les lieux épineux & montagneux du Dauphiné, du Languedoc, près de Genève. Elle est apéritive, vulnérinaire, propre contre l'asthme, la gravelle & les ulcères du poulmon.

(M. WILLEMET.)

ASPHALTE. (*Pharmacie.*) On tire pour l'usage médical quelques produits de l'asphalte en pharmacie. Son huile & son phlegme sont employés comme fortifiants à l'extérieur; ce bitume entre aussi dans quelques médicaments composés & spécialement dans la thériaque, le baume hyssopique & l'emplâtre diabolotum. On range aussi l'asphalte parmi les vulnéraires, les discutifs, & comme tel, il entroit antrefois dans un grand nombre de médicaments composés.

Il seroit beaucoup chez les anciens Egyptiens pour l'embaument des corps. On trempoit dans l'asphalte fondu les bandes de toiles qui étoient ensuite roulées autour des membres & du corps. on le mettoit en poudre avec les plantes aromatiques, également pulvérisées pour enduire & remplir les cavités du corps. On le retrouve presque sans altération dans les momies. Voyez EMBAU-
MENT.

ASBESTE. L'asbeste est une pierre magnésifiliée, qui ne diffère de l'amiante que par la dureté, la rigidité de ses filers, & parce qu'on ne peut pas les détacher comme ceux de l'amiante. Voyez le dictionnaire de minéralogie pour la connoissance de toutes ses propriétés; il ne doit être question ici que des résultats des expériences chimiques auxquelles on a soumis cette pierre, & de l'analyse qu'on en a faite.

L'asbeste se fond à un feu violent en un verre d'un blanc verdâtre. Il absorbe un peu d'eau entre ses molécules. Les acides ne l'attaquent qu'à l'aide de beaucoup de temps; mais on parvient cependant à en extraire & à en séparer les différentes terres par le moyen de ces sels. Bergman a trouvé dans un quintal d'une variété de cette pierre, 67 de silice, près de 17 de magnésie, 6 d'alumine, 6 de chaux & 4 d'oxyde de fer.

Au chalumeau l'asbeste se fond en un globe qui devient brun lorsqu'on le chauffe long-temps; le borax, le phosphate de soude le dissolvent en le fondant; le carbonate de soude le dissout aussi

avec

avec effervescence. Quelques minéralogistes pensent que l'asbeste est un produit de la décomposition de la sésérite. (Voyez ce mot.)

Bergman ayant fait l'analyse de neuf différentes espèces d'asbeste, en a tiré les inductions suivantes. La silice est la terre la plus abondante; dans aucune espèce elle n'est moindre que la moitié, & elle n'excède les trois quarts. La magnésie tient le second rang; elle est entre 12, 7 & 28, 8. Le carbonate de chaux y est contenu entre 6 & 14 centièmes. L'alumine en fait le principe le moins abondant; elle n'y est qu'entre 1 à 6 centièmes; quant au fer il y est toujours à l'état d'oxide; il ne passe pas 10 centièmes. L'amiante diffère de l'asbeste en ce qu'il contient du sulfate de baryte.

Bergman propose de ranger l'asbeste parmi les pierres du genre magnésien, parce que la magnésie, quoique n'y tenant que le second rang par la quantité, lui donne ses principaux caractères; & a effet cette pierre est en filets plus ou moins séparables, non scintillans, qui n'indiquent point la présence de la silice par ses propriétés. (Voyez AMIANTE.)

ASBESTINE. (terre.) Croustet parmi les neuf terres simples qu'il distinguoit dans la minéralogie, comptoit la terre asbestine, parce qu'on n'avoit point encore pu la décomposer, & parce qu'elle paroît former des pierres très caractérisées par leur tissu, leur structure & leurs propriétés. Il donnoit pour caractères de la terre asbestine, 1°. une fusibilité très-difficile; 2°. la flexibilité des fils qu'elle formoit par son aggrégation; 3°. une surface opaque & inégale; 4°. une fragilité produite par le feu; 5°. une dureté non suffisante pour tirer des étincelles de l'acier; 6°. aucune dissolubilité dans les acides; 7°. enfin une fusion facile avec le borax.

Mais il en est aujourd'hui de la terre asbestine comme de la granitique, de la micacée, de la zéolithe, de la fluorée, aussi indiquées pour des terres simples par Croustet. Les progrès de l'analyse chimique ont fait voir que toutes ces terres sont composées; & en particulier que la terre asbestine de Croustet est formée par l'union de la silice & de la magnésie, &c. (Voyez le mot ASBESTE. Voyez aussi le mot TERRES.)

ASCLÉPIADE TUBÉREUSE. (Pharmacie.) *Asclepias tuberosa*. Cette espèce se trouve dans l'Amérique froide; sa racine est conservée dans les pharmacies de cette île; elle est légèrement astringente, diaphorétique, bonne contre la colique. On la donne en poudre à la dose d'un gros. Sa décoction aqueuse est recommandée contre les vapeurs & les hémorrhagies. Sa décoction faite au vin est salutaire dans la dysenterie. (M. WILLEMET.)

ASCLÉPIADE EXPECTORANTE. (Pharmacie.) *Asclepias syriaca*. Parmi les plantes exotiques qui offrent des secours efficaces à la médecine, il faut distinguer celle qui fait l'objet de cet article. Cette asclépiade croît dans les bois de l'île de Ceylan, elle est velue, suivant M. la Mark; sa racine passe pour très-bonne dans l'asthme humide; on en fait des décoctions & des sirops qui facilitent l'expectoration aux phthiques, & les soulage. (M. WILLEMET.)

ASCLÉPIADE TORTILLÉE. (Pharmacie.) *Asclepias spiralis*. Le même genre végétal nous donne un arbrisseau que Forster a rencontré dans l'Arabie. Ses semences sont douces & sont estimées pour calmer les douleurs de ventre. (M. WILLEMET.)

ASPALAT. (Pharmacie.) *Aspalathum*. Linn. *mat. medic.* 834. *Agallochum praeantissimum*. Bauh. *pin.* 393. L'arbre qui fait l'objet de cet article, se trouve, dit-on, aux Indes orientales. Il n'est que communément connu, car aucun botaniste n'en a donné la description.

Son bois étoit anciennement d'usage en médecine. Réduit en poudre fine, on l'estimoit contre la colique. Il est dessicatif, un peu astringent, résiste à la malignité des humeurs, excite la transpiration. On peut placer l'aspalat dans la série des bois d'aloës de Rhodes & des Sautaux. M. Murray, célèbre professeur de médecine en l'université de Gottingue, qui s'occupe dans ce moment à faire connoître les végétaux utiles à la médecine, dont l'origine & l'existence sont incertaines, ne manquera pas sans doute à dévoiler celles de l'aspalat. Ces articles infiniment intéressans & désirés, feront partie du sixième volume de son *apparatus medicamentorum* (1).

Lemery en a bien donné une petite figure dans son dictionnaire des drogues, & c'est suivant lui, un arbre épineux. (M. WILLEMET.)

ASPERGE. (Pharmacie.) *Asparagus officinalis*. *Asparagus* Math. Diosc. 349. Théophraste, Dioscoride, Mathioli, Pline, & les autres naturalistes anciens, ont mentionné l'asperge. Ils recommandent cette plante potagère & s'en servoient contre la phrénésie, la nephrectique, le pissement de sang, l'hydropisie, l'épilepsie, l'odontalgie, les douleurs de la poitrine, de l'estomac, & des intestins, la mélancolie, l'ophtalmie, les palpitations de cœur, la sciatique, l'ictère, la dysenterie, la strangurie, la dysurie, pour exciter les règles, dans toutes les maladies qui viennent à *senectute*. C'étoit ordinairement l'asperge sauvage que les anciens médecins employoient. Ils la regardoient comme beaucoup plus active que la cultivée. Ils la prescrivoient encore comme aphrodisiaque. Ils croyoient qu'elle concouroit à donner,

(1) Depuis la rédaction de cet article, les sciences ont perdu le savant & laborieux Murray, il est à désirer que l'on fasse paraître public des manuscrits qu'il a laissés pour la continuation de cet utile ouvrage.

de la beauté. Ils s'en servoient dans les luxations. Aétrus la vante comme un excellent discutif. Siméon Sethi assure qu'elle est infiniment utile aux personnes sujettes à des coliques, & qui ont des dispositions aux maux de reins.

La racine est une des cinq apéritives majeures, elle entre dans le sirop des cinq racines. Cette racine doit être desséchée avec soin, après avoir été soigneusement lavée, pour en séparer exactement la terre.

La semence possède quelques-unes des propriétés susdites. Elle entre dans l'électuaire de Renou & dans le *philonium romanum*, électuaire qu'il faut reléguer avec le régime galénique.

Ce sont les jeunes pousses vernalles de l'asperge qui nous offrent un mets délicieux dans le temps des primeurs, au moment que toute la nature entre en fermentation. Cet aliment rend les urines fétides. M. Baumé a découvert que quelques gouttes d'acide muriatique jetées dans le vase urinoire, empêchoient cette puanteur des urines.

L'asperge croît spontanément dans l'Europe australe; cette plante aime un sol sablonneux; c'est par le moyen de l'art du jardinier que nous obtenons ce légume précieux. L'asperge est vivace.

Gaspard Fallope écrit en 1558 une dissertation épistolaire sur l'asperge.

Antoine de Cléricis, de Corse en Rhétie, a soutenu en 1755 une thèse dans l'université d'Altorf, sur la même plante.

Etienne Wespremi a donné d'excellentes observations sur l'efficacité & les vertus de l'asperge en médecine.

Mais de tous les monographes de ce végétal utile, aucun n'en a mieux traité que le professeur Franzius de Leipsick. Il a rassemblé dans une dissertation tout ce que les botanistes & les médecins de la plus haute antiquité ont dit sur l'asperge, éclaircit les passages difficiles à entendre, en un mot, il ne laisse rien ignorer sur les propriétés de cette plante.

(M. WILLEMET.)

ASPERGE SAUVAGE. (*Pharmacie.*) *Asparagus acutifolius*. *Asparagus silvestris*. *Cam. epit.* 260. Les anciens, comme nous l'avons fait observer précédemment, se servoient par prédilection de l'asperge sauvage, pour combattre les diverses maladies dont nous venons de faire l'énumération. Tous les pharmacographes en effet se réunissent, pour assurer que ses propriétés sont plus énergiques & plus éminentes que celles de l'espèce précédente.

L'asperge sauvage conserve ses feuilles pendant l'hiver, & semble alors à un petit genévrier, ne craint point le froid, & peut trouver place dans les bosquets de cette saison des frimats. Cette

espèce croît naturellement dans les lieux stériles & pierreux, en Europe.

(M. WILLEMET.)

ASPERULE CINANCHINE ou **GARAN-CE DE CHIEN.** *Affera cynanchica*. *Rubiacynanchica*. *B. 6.* 333. L'on dit cette plante résolutive, astringente, bonne contre l'eliquanance, soit à l'extérieur ou en gargarisme, soit en topique. La racine de cette asperule teint en rouge, comme la garance, sur-tout si on la fait bouillir dans du bon vinaigre; elle a encore la propriété de colorer en rouge les os des animaux, si on la mêle avec leurs aliments.

On trouve cette plante dans les friches, près des chemins, dans les prairies graminées, montagneuses, sèches, à sol crayeux, pierreux. Elle est perennelle.

(M. WILLEMET.)

ASPERULE ODORANTE, HEPATIQUE ET OILÉE ou **MUGUET DES BOIS.** *Asperula odorata*. *Hepatica stellata*. *Tabern.* 816. Cette plante croît dans les forêts, sur-tout dans les bois taillis montueux, en Europe. Sa saveur est un peu salée & austère, aussi abonde-t-elle particulièrement en acide fixe; son odeur est agréable & restaurante; elle a la propriété de chasser les teignes & les blattes. On la trouve dans les pharmacies, parce qu'elle offre une foule de vertus médicinales, comme étant cordiale, hépatique, tonique, emménagogue, apéritive, viscérale, incisive, vulnéraire, débilitatrice. Feu sa majesté Stanislas, roi de Pologne, duc de Lorraine & de Bar, faisoit usage de cette plante en guise de thé. On l'emploie en Allemagne dans les maladies du foie. Quelques-uns la font infuser dans du vin; ce qui le rend agréable & excite à la joie. Les nouvelles périodiques ont célébré depuis peu l'hépatique étoilée comme un spécifique contre la rage. Elle avoit déjà cette réputation du temps de Gesner, qu'il a nommée *asylus*. Elle fait la base des vulnéraires suisses ou talranck. Elle offre une excellente nourriture aux troupeaux. Sa fleur est aimée des abeilles.

Cette asperule est vivace.

(M. WILLEMET.)

ASPHODÈLE BLANC. (*Pharmacie.*) *Asphodelus ramosus*. *Asphodelus albus ramosus* *mat. C.* 18. Les asphodèles appartiennent à la grande & superbe famille des liliacées. Elles font l'ornement des parterres; leur port & leur aspect ont fait qu'elles sont appelées sceptres des rois. C'est spécialement l'asphodèle blanc qui peut servir en médecine; cette plante est détersive, incisive, apéritive, diurétique, résolutive, digestive, discutive, vulnéraire, alexitère, aphrodisiaque, mondificative, emménagogue, maturative, émolliente, cosmétique; propre contre la toux, la phthisie, la cachexie, l'asthme humide, les engorgements catarrheux, les fièvres malignes, les douleurs de tête, les convul-

sions, les scrophules, les hernies, le calcul, la galle, les panaris, la furdité, les brûlures ; propre à provoquer les menstrues, faire croître les cheveux, nettoyer les oreilles, consumer les chairs. La dose est depuis un gros jusqu'à deux onces & demie à l'intérieur, en décoction ou en infusion. Les pharmaciens Allemands substituent au bulbe de l'asphodèle celui du lis martagon, malgré la différence qu'il y a entr'eux.

Dans les temps de disette, on fait du pain avec la racine de l'asphodèle, après l'avoir fait bouillir & macérer dans de l'eau, afin d'en enlever l'acreté ; il faut en ôter l'écorce, la couper par rouelle, la laver dans l'eau tiède, la sécher doucement au feu, puis la mouler ; on mêle moitié de froment, on passe la farine par le tamis, & on en fait d'affez bon pain, en la pétrissant avec un peu plus de levain qu'à l'ordinaire.

Les anciens plantoient l'asphodèle auprès des tombeaux, afin, disoient-ils, que les manes des morts pussent trouver de quoi se nourrir.

Les tiges & les semences de cette plante peuvent être aussi comestibles. On peut extraire de l'amidon de cette racine bulbeuse.

Cette légende de propriétés données à l'asphodèle, nous a été transmise par les anciens. Il paraît que les modernes ne l'ont guères employée.

Elle croît spontanément à Narbonne & dans d'autres départemens de la France ; en Autriche, en Suisse, en Portugal, en Espagne & en Italie. Elle est vivace.

(M. WILLEMET.)

ASPHODELE JAUNE. (Pharmacie.) *Asphodelus luteus*. *Asphodelus femina*. Cam. epig. 370. Cette asphodèle possède les mêmes propriétés que la précédente. On la trouve en Sicile, en Italie. Quoique Linnéus la désigne seulement bisannuelle, nous pouvons assurer qu'elle est vivace, nous la cultivons depuis plus de 30 ans dans un jardin de botanique, où elle est perpétuellement pérennelle.

(M. WILLEMET.)

ASPIC. (Pharmacie.) Voyez LAVANDE.

ASSA FOETIDA. *Ferula assa foetida*. C'est une plante ombellifère, dont M. Jean Hope, docteur en médecine, membre de la société royale de Londres, a donné une nouvelle description dans les transactions philosophiques. Elle paraît différer beaucoup de celle décrite par Koempfer. Toutes les parties de cette plante, dit M. Hope, lorsqu'on les incise, versent abondamment un suc laiteux qui est l'*assa foetida*. Sa tige périclit en automne, & sa racine est perpétuelle. Comme cette plante vient en plaine, & que la culture en est facile, qu'elle produit même dans une saison favorable des graines mûres, on peut espérer que sa culture deviendra un objet de spéculation.

L'*assa foetida* est une gomme-résine qui nous

arrive en morceaux de diverses figures & grosseurs de couleur brune jaunâtre, rougeâtre ou bleuâtre ; quelquefois noirâtre avec des taches blanches. Il faut le choisir en masses d'une médiocre ténacité, avec des larmes sèches, nettes, & prendre garde à son adulteration par les Indiens qui y mêlent souvent de la farine, du son & autres substances. Il faut aussi rejeter l'*assa foetida* qui est gras, salé, rempli d'écorce, de même que le noir. Son odeur est forte, alliée, très-désagréable ; ce qui a fait sans doute qu'on l'a appelée *merde du diable*. Sa saveur est acre, un peu amère, nauséuse.

L'*assa foetida* est une production qui nous vient de la Perse ; il abonde plus en partie gommeuse que résineuse. Il est de nature anrispétique. On le donne contre la colique, l'hydropisie, la tympanite, les vers, les maux de nerfs ; pour fortifier l'estomac, exciter l'appétit, dissiper les vents, les vapeurs, l'hypocondrie, l'asthme, les obstructions, l'épilepsie, la suppression des menstrues, des lochies, des pertes blanches, de l'arrière-faix ; faire pousser la petite vérole, la rougeole & les autres éruptions, contre les convulsions, la stérilité, pourvu qu'on s'en serve avec précaution & à petite dose. Il est aphrodisiaque, alexitére & sudorifique, contre les maux d'oreilles & de dents. Il est regardé comme excellent contre l'effet de l'opium & des autres narcotiques. On le prescrit depuis deux ou trois grains jusqu'à un scrupule. La dose pour les chevaux est depuis demi-once jusqu'à deux onces. L'*assa foetida* récent est un excellent vulnéraire, appliqué sur les plaies. C'est un puissant émollient résolutif contre les scrophules, les tumeurs dures, les bubons, les panaris.

Garzias assure qu'il n'y a point de simple plus employé dans toutes les Indes, soit comme médicament, soit comme assaisonnement. On a observé que l'*assa foetida* communique son odeur aux excréments de ceux qui en font usage, même pris en très-petite dose & mêlé avec d'autres substances. C'est la panacée des chevaux, pour lesquels mêlé avec du vin & de l'ail, c'est un puissant sudorifique.

L'*assa foetida* entre dans la teinture & les pilules fétiées, l'élisir utérin, l'essence & l'emplâtre antihystériques, les pilules gommeuses, la teinture de suie, les trochisques hystériques & ceux de myrrhe composés, le baume, les pilules & l'eau hystériques & l'orviétan.

On retire aussi de l'*assa foetida* une teinture qui entre dans le baume acoulique.

Les auteurs qui ont le mieux écrit sur l'*assa foetida*, sont Koempfer, Gmelin, Pander & Metzger.

(M. WILLEMET.)

ASSA ou ASA. (Pharmacie.) Ce mot est employé pour désigner deux substances très-différentes l'une de l'autre, savoir, le benjoin, nommé *asa ou assa dulcis*, baume résineux très-suave qu'on

Kkk 2

brûle comme encens, & l'*assafoetida*, espèce de gomme résine fondante, d'une odeur alliée si terrible, qu'on la nomme aussi *stercus diaboli*. L'*assafoetida* qu'on compte parmi les fondans & les antihystériques les plus actifs, entre en pharmacie dans l'eau hystérique, les trochisques hystériques, les trochisques de myrrhe, le baume hystérique, les pilules hystériques, l'essence antihystérique, l'orvietan, &c. On le fait prendre quelquefois en émulsion, le plus souvent en pilules recouvertes d'une feuille d'argent. On en prépare une teinture alcoolique & une teinture éthérée.

ASSAIERET. (*Pilules.*) (*Pharm.*) Avicenne a donné ce nom à des pilules faites avec l'aloes, les myrobolans citrins & le mastic. Fernel en a légèrement changé la dose des ingrédients. Lemery l'a corrigée encore; mais ces pilules ne sont plus employées depuis long-temps, & il en est un grand nombre d'analogues dont l'aloes fait la base. Voyez le mot *PILULES*.

ASSARIUS. (*Pharmacie.*) L'*assarius* étoit chez les médecins romains un poids qu'on croit être analogue à deux de nos dragmes ou gros. On trouve quelquefois cette expression dans les anciens auteurs de médecine.

ASSATION. (*Pharmacie.*) L'*assation*, qui devoit signifier simplement cuisson ou cuisson suivant son étymologie, est souvent employée en pharmacie pour désigner la torréfaction, telle que celle de la rhubarbe, &c.

ASSIMINIER. (*Pharmacie.*) *Annona glabra*. C'est un arbre médiocre, originaire de la Caroline & de la Pensylvanie. On peut l'obtenir de marcottes, mais la voie des graines est plus usitée. On les sème au printemps dans des pots ou terrines, que l'on a soin de placer sur une couche tiède, en leur procurant quelque abri. Lorsque les plantes sont un peu fortes, c'est à-dire, vers la seconde année, on les repique dans des pots ou même en pleine terre, dans un sol léger, frais & ombragé. Le terrain de bruyère leur convient lorsqu'elles sont jeunes; mais dans un âge plus avancé une terre substantielle est plus analogue à leur nature. C'est ainsi qu'il sera facile de naturaliser en France ce petit arbre américain.

En Amérique l'on se sert en médecine du fruit & de l'écorce de l'*assiminier*. Lorsque son fruit n'est pas encore mûr, on le fait infuser dans du vin pour en toucher les aphtes des enfans. C'est un excellent remède pour ce mal. Ce fruit est d'un goût acide doux, l'écorce est stérile, sans odeur, & ressemble assez à celle de la pomme épineuse. (*Datura stramonium.*)

Fusée Aublet rapporte dans son histoire des plantes de la Guinée française, qu'il a observé un autre *assiminier*, nommé *umbotay*, par les galibis,

dont l'écorce a un goût piquant & aromatique. Elle est employée en décoction pour guérir les malin-gres qui sont des ulcères malins. Il ajoute qu'ayant été attaqué lui-même de ce mal, il avoit fait usage de ce médicament avec succès.

(M. WILLEMET.)

ASTÈRE MARINÉE. (*Pharmacie.*) *Aster tripolium*. *Tripolium*. Dod. pempt. 379. Quelques auteurs recommandant la racine de cette astère comme étant un purgatif doux; elle est apéritive contre le venin. Elle est vivace, croît spontanément dans les lieux marécageux salés, aquatiques, près des rivages de la mer.

(M. WILLEMET.)

ASTÈRE ŒIL DE CHRIST. (*Pharmacie.*) *Aster Amellus*. 132. *Amellus Virgilitii*. Calc. Veron. 3. Cette belle astère que Virgile a célébrée dans sa quatrième Georgique, est pérennelle, croît communément sur nos collines. Nous l'avons observée aux environs de Nancy. Elle se trouve aussi en Italie, en Bohême, en Sicile. On la dit apéritive, diurétique, détergative, résolutive, digestive, alexipharmaque, utile contre l'épilepsie des enfans, la morsure des chiens enragés; sa fleur est vanée contre les inflammations des yeux, du gosier. M. Valmont Bomare dit dans son dictionnaire d'histoire naturelle, que cette astère a été transportée par Linnéus dans le genre de l'année. Voilà une grande erreur, puisque c'est son *aster amellus*.

Cette plante mérite une place dans nos parterres.

(M. WILLEMET.)

ASTRAGALE DE MONTPELLIER. (*Ph.*) *Astragalus Montpellieranus*. Cette astragale offre une fleur purpurine & se trouve aux environs de Montpellier, elle est vivace; sa racine & sa semence arrêtent la diarrhée, & font uriner étant prises en décoction; elles étoient autrefois employées à l'extérieur pour déterger les plaies & les ulcères, & pour les dessécher.

(M. WILLEMET.)

ASTRAGALE REGLISSE OU REGLISSE SAUVAGE. (*Pharmacie.*) *Astragalus glycyphyllos*. *Glycyrrhiza Silvestris*. Cam. Epit. Les feuilles & les fleurs de cette plante sont apéritives contre l'ischurie & les tumeurs de la vessie, la racine est douce comme celle de la réglisse. Elle est dessiccative, diurétique, propre contre le flux du ventre, le saignement de nez, les ulcères invertérés, & fortifie les genives. La semence est éliminée contre la diarrhée.

Cette astragale assez connue dans le département de la Meurthe, y est connue sous le nom de Malmation; elle est employée avec succès contre les pleurésies, les intranpirations, les maux d'estomac & autres, en infusion. On la prend en guise de thé.

Elle offre un excellent fourrage aux bestiaux. Elle est vivace, & croît dans les bois & lieux pierreux & montagneux de presque toute l'Europe.

On la substitue souvent à la rue de chèvre.
(M. WILLEMET.)

ASTRAGALE SANS HAMPE. (Pharmacie.) *Astragalus exscapus. Cicer montanum acaulon.* B. Aux confins de la Hongrie les femmes se servent pour guérir de la vérole, de la racine de cette plante; le mal & l'antidote dans ce pays se trouvent à côté l'un de l'autre. M. le professeur Wintert ayant été témoin de plusieurs cures opérées par ces femmes, fut curieux de connoître le remède dont elles faisoient usage, il apprit qu'elles n'employoient que des racines de la plante, appelée par Linnéus dans sa *Manitissa*, *Astragalus exscapus*, & c. il l'écrivit aussi tôt au baron de Storck, qui pria M. Quarin, médecin à l'hôpital général de Vienne, de faire l'essai de ce nouveau remède. Cet habile praticien a été si satisfait des effets heureux qu'il en a obtenus, qu'il a cru devoir les publier. Voici la formule qu'il a adoptée: prenez une demi-once de racines d'*astragalus exscapus*, faites-les cuire dans quinze onces d'eau jusqu'à la réduction d'une livre d'Allemagne, c'est-à-dire, à douze onces, que le malade boira tiède le matin & le soir. Cette décoction a un saveur agréable, qui se rapproche de celle de l'infusion de réglisse. M. Quarin fut obligé de s'en tenir à quatre expériences, qui constatèrent complètement l'efficacité de cette nouvelle découverte, parce que les racines lui manquèrent. Il en fit depuis une provision, & c. il annonce que les guérisons qu'il opère chaque jour lui confirment de plus en plus la bonne opinion qu'il a conçue de ce remède, aussi simple que salutaire. Une partie des observations faites par ce célèbre médecin sont consignées dans son ouvrage qui a pour titre : *Anmodum versioes practica in diversis morbis. Viennæ. 1786. cap. XVI, pag. 320 & seq.*

(M. WILLEMET.)

ASTRAGALE SESAMIER. (Pharmacie.) *Astragalus sesamier.* M. Hollandre prétend que les racines de cette espèce sont regardées comme astringentes, & ordonnées quelquefois dans les diarrhées siéueuses & dans les pertes de sang; on les applique aussi, continue-t-il, réduites en poudre, sur les ulcères, pour en détruire les chairs fongueuses. Cet écrivain ne se seroit-il pas trompé en attribuant à cette espèce les propriétés de l'*astragale* de Montpellier, d'autant plus que l'*astragale* sesamier n'est qu'annuelle? (Voyez qu'il en soit, cette plante se trouve en Italie & dans la France méridionale.

(M. WILLEMET.)

ASTRINGENT. Le mot astringent employé en chimie, ne sert qu'à désigner la saveur resser-

rante & presque styptique que font éprouver plusieurs substances, lorsqu'on les met ou qu'on les tient quelque temps dans la bouche, soit aussi lorsqu'on en reçoit les vapeurs dans cet organe. Le sulfate acide d'alumine est astringent; la vapeur d'acide muriatique oxygéné est fortement astringente. On ne connoît point la cause & le mode de cette action, qui cependant paroît être en grande partie une action chimique.

On a même eu cette opinion il y a déjà longtemps, puisqu'on nommoit dans cette science un des premiers principes des végétaux, principe astringent. Il est vrai que la classe des végétaux qu'on nomme astringens, paroît devoir cette propriété à l'acide gallique qu'ils contiennent tous en plus ou moins grande quantité. (Voyez le mot ACIDE GALLIQUE.)

ASTRINGENT. (Pharmacie.) Un remède astringent est celui qui resserre & condense les fibres, les vaisseaux, qui arrête les flux immodérés, &c. Beaucoup de médicaments composés portent le nom d'astringens; il y a dans les dispensaires des décoctions, des tisanes astringentes, des bols, des pilules, des tablettes astringentes, &c. Le bol d'ariénie, les vitriols ou sulfates métalliques, l'alun, l'écorce de grenade, le sumach, la noix de Galle, le sang-dragon, le mastic, sont les plus forts & les principaux astringens qui entrent dans ces compositions. Voyez le dictionnaire de médecine au mot ASTRINGENT.

ASYNCRITON ou ASYNCRITUM. (Pharmacie.) Surnom donné à un antidote, ou espèce d'électuaire décrit par Actuarius, qui pendant très-long-temps a été transcrit dans les dispensaires & préparé dans les pharmacies. Cet électuaire étoit composé d'opium, & de différentes substances acres, aromatiques, incorporées avec suffisante quantité de miel écumé; chaque gros de cet électuaire contenoit environ six grains & demi d'opium; aussi sa dose étoit depuis un scrupule jusqu'à deux, on l'employoit principalement pour calmer les douleurs, la toux, procurer le sommeil; on en recommandoit même l'usage contre l'épilepsie, les vertiges, la phrénésie, &c., & comme on attribuoit à cette préparation un grand nombre de propriétés, Actuarius lui avoit donné le nom pompeux d'*asyncriton*, dénomination grecque, qui signifie sans pareil ou incomparable.

ATHANASIA. (Pharmacie.) Expression empruntée du grec, & qui signifie immortelle. Cette dénomination pompeuse étoit donnée à une espèce d'antidote ou d'électuaire qui a long-temps été décrit dans les dispensaires, & vanté dans nos pharmacies pour guérir une infinité de maux, & surtout contre les morsures des animaux venimeux & les poisons, ce qui avoit engagé à lui donner ce nom. On trouve une grande variété dans la

formule de cet électuaire, parce que chaque électuaire changeoit sa préparation. Cependant on en distingue deux espèces principales, l'une étoit composée de foie de loup, de safran, de castoreum, de pavot noir, de jujubame, &c. de plusieurs espèces de substances aromatiques, que l'on incorporoit avec du miel, on la nommoit *athanasia magna*; l'autre qui étoit composée d'un moins grand nombre d'ingrédients, étoit nommée *athanasia parva*. Ce nom a aussi été donné à la plante que l'on appelle ordinairement *sanisfe*.

ATHANOR. Ce fourneau, figure 39 des planches des instrumens & fourneaux, nommé aussi fourneau des paresseux (*piger henricus*) est construit de manière qu'on puisse y entretenir une chaleur toujours égale & pendant long-temps, sans être obligé de renouveler souvent l'aliment du feu. Le corps de l'athanor (A) n'a rien de particulier; il est construit comme les fourneaux les plus ordinaires, mais il a à un de ses côtés ou dans son milieu une tour creuse (B) qui s'élève perpendiculairement & qui communique dans le foyer (C) par une ou plusieurs ouvertures en talus (D). Cette tour doit avoir un couvercle (E) qui ferme exactement son ouverture supérieure.

Quand on veut se servir de l'athanor, on met dans son foyer la quantité de charbon allumé que l'on juge nécessaire, & on emplit la tour jusqu'en haut de charbon noir; on la ferme ensuite exactement avec son couvercle. A mesure que le charbon du foyer se consume, il est remplacé par celui de la tour qui y tombe par son poids. Comme le charbon contenu dans la tour n'a point de communication avec l'air extérieur, il ne peut brûler qu'à mesure qu'il arrive dans le foyer, où il entretient le feu jusqu'à ce qu'il soit entièrement descendu.

L'athanor étoit très-renommé & très-usé dans l'ancienne chimie; beaucoup d'auteurs en ont donné des descriptions particulières, & il y en avoit dans presque tous les laboratoires. Mais aujourd'hui il est entièrement abandonné; la raison en est simple, c'est que les idées absurdes, le fol espoir de faire de l'or à qui ce fourneau doit la naissance & son perfectionnement, ont été peu-à-peu détruites par les mauvais succès des opérations alchimiques. Ceux qui cultivent maintenant la chimie n'ont d'autre but que d'étendre & de perfectionner cette belle branche de la physique. Ce motif, quoique certainement plus noble que l'ancien, a apparemment moins de puissance sur l'esprit des hommes, car toutes les opérations de la chimie, longues & laborieuses, dont on pourroit tirer de grands avantages, ne sont point assez suivies; on s'ennuie bientôt de ce qui ne nous promet pas de grandes récompenses, ou plutôt de ce dont on ne sent pas les avantages. Quelle différence en effet, dit Macquer, d'espérer pour résultat d'un grand & pénible travail l'explication d'un

simple fait de chimie, ou bien un lingot d'or qui doit ensuite en engendrer autant qu'on voudroit!

Quoique l'athanor puisse servir avantageusement dans plusieurs opérations qui ne demandent pas un grand degré de chaleur, il est néanmoins sujet à quelques inconvénients: souvent le charbon s'arrête dans la tour & le feu s'éteint, quelquefois au contraire il tombe tout d'un coup & étouffe celui qui est allumé.

ATMOSPHERE. L'atmosphère ou la masse d'air qui enveloppe le globe jusqu'à un grand nombre de milliers de toises de hauteur, est formée, comme tout le monde le sait, par l'air dont la nature, la composition & les propriétés ont été exposées avec un grand détail à l'article AIR, du premier volume. On a même dit dans cet article les divers phénomènes que l'air atmosphérique fait naître dans les expériences de chimie, soit par sa forme, soit par sa pression, soit par sa composition intime, soit enfin par les différentes substances & sur-tout par l'eau qu'il tient en dissolution. Toutes ces considérations ont été présentées dans le premier volume avec tant de détails, d'exactitude & de clarté, qu'il n'y a rien à y ajouter. Seulement il ne sera peut-être pas inutile de présenter ici quelques vues sur la masse de l'air tout ensemble, sur la formation, sur l'atmosphère considérée comme un grand laboratoire où la nature exerce en quelque sorte une chimie, dont la connoissance est immédiatement utile à l'avancement des sciences. Ainsi malgré l'étendue que M. Morveau a donnée à son article AIR du premier volume, malgré le recueil considérable de faits importants qu'il y a rassemblés, & l'histoire complète qu'il a présentée de ce corps, si j'ai cru pouvoir me permettre quelques additions, ce n'a été que que dans l'intention d'ajouter une simple pierre à ce grand édifice, & sans vouloir en changer ni les proportions, ni le dessin, ni le fini même, qui font de cette dissertation un ouvrage terminé à tous les égards.

I. L'atmosphère de la terre doit être considérée, suivant M. Lavoisier, comme le mélange de toutes les substances susceptibles de conserver l'état aërien à la température la plus basse connue sur notre globe, & à la pression d'une colonne de 28 pouces de mercure, ainsi que de tous les corps capables d'être dissous dans ce premier assemblage de différens gaz. Pour mieux fixer les idées, M. Lavoisier suppose la terre transportée à la place de Mercure, & beaucoup plus près du soleil. Alors l'eau, l'alcool, l'éther, les acides, les huiles, le mercure, &c. seroient réduits en vapeur, & seroient partie de l'atmosphère. Ces nouveaux gaz se mêleraient à ceux qui composent notre air, & il en résulteroit des décompositions & des combinaisons, jusqu'à ce que l'équilibre amenât le repos dans la force d'attraction moléculaire. Mais cette vaporisation même auroit un terme. La po-

l'atmosphère augmentant à mesure, formeroit une pression qui s'opposeroit à la nouvelle vaporisation, & bientôt l'eau cesseroit de bouillir, le mercure de se volatiliser, &c. Si dans une supposition contraire, poursuit M. Lavoisier, la terre étoit transportée à un grand éloignement du soleil, par exemple à la place de Saturne, l'eau & les autres liquides que nous possédons, deviendroient des espèces de roches, les matières qui forment l'air cesseroient d'être fondues en gaz, & il en résulteroit des liquides. Les substances les plus volatilisables & les plus fusibles que nous connoissons, conserveroient une forme si éloignée de l'état d'air, qu'on ne peut plus se figurer quelle seroit l'atmosphère de notre terre ainsi éloignée du soleil. M. Lavoisier conclut de cette manière nouvelle de considérer l'atmosphère, que la solidité, la fluidité & la gazéité étant trois états différents dont tous les corps paroissent pouvoir être susceptibles & dépendent du degré de température auquel ils sont exposés, & de la quantité de calorique qui les pénètre, l'air est un composé de tous les fluides susceptibles d'exister dans un état constant de vapeur & d'élasticité au degré habituel de température & de pression que nous éprouvons, & qu'il ne seroit pas impossible qu'il contint des matières compactes, & même un métal, pourvu qu'il fût plus fusible & plus volatil que le mercure.

II. Tous les liquides n'étant pas sensiblement miscibles ou dissolubles les uns par les autres, & restant alors à différentes hauteurs suivant leur pesanteur spécifique, comme le sont le mercure, l'eau & l'huile, il n'est pas invraisemblable que l'atmosphère contient à différentes hauteurs, & comme autant de zones différentes, des fluides élastiques de densité & de pesanteur différentes qui ne sont point miscibles les uns avec les autres. M. Lavoisier est porté à croire, d'après les phénomènes des météores ignés, qu'il existe dans le haut de l'atmosphère une couche de gaz inflammable distincte de l'air atmosphérique, & que c'est dans le point de contact de ce gaz avec la dernière couche atmosphérique, que le passent tous les météores ignés, & spécialement l'aurore boréale. De même on peut penser que dans certains lieux, & particulièrement dans les vallées profondes & dans les bois épais & tousus qui les garnissent, la couche inférieure de l'atmosphère est formée par des gaz pesans, & spécialement par du gaz acide carbonique qui en occupe une étendue plus ou moins considérable.

III. Quoiqu'on ait donc pensé jusqu'ici que l'atmosphère seroit dans toute sa hauteur une masse de nature à-peu près homogène, il est permis de croire que les diverses couches de l'air atmosphérique, outre la diversité de leur densité qui décroît en raison inverse de la pression qu'elles éprouvent, ne sont pas d'une nature exactement semblable. Ainsi dans son voyage du Mont-Blanc,

M. de Saussure a observé que les procédés eudiométriques indiquoient des qualités & des proportions un peu différentes sur les hautes montagnes que dans les vallées, & ce n'a pas été à l'avantage de celui des montagnes que ces essais ont été faits.

IV. On conçoit, d'après les réflexions précédentes, que les expériences de chimie doivent être soumises à des variations, à des modifications multipliées, lorsqu'elles sont faites à l'air, que la pression de l'atmosphère doit même influencer sur les liquides & les gaz contenus dans les appareils qui ont toujours quelque communication avec l'air; que l'élevation du mercure dans les baromètres doit toujours être consultée & indiquée dans la description des phénomènes que l'on observe; qu'il doit être très-difficile de faire des évaporations, des cristallisations, &c., à telle ou telle position dans l'atmosphère; enfin que dans un laboratoire sur-tout, où l'on fait un grand nombre d'opérations successives, l'air doit être rempli & plus ou moins saturé de vapeurs, ou mêlé de diverses substances qui doivent avoir une influence plus ou moins marquée sur les résultats des expériences faites dans des vaisseaux ouverts, & qu'il faut en tenir note. On a beaucoup insisté, & avec raison, dans une des sections de l'article AIR du premier volume, sur l'état hygrométrique de l'air, & l'hygromètre dans les laboratoires ou dans les ateliers chimiques, est un des instrumens dont il est le plus essentiel de suivre & d'indiquer la marche. Car la proportion d'eau dans l'air fait singulièrement varier le temps & les phénomènes de l'évaporation, de la cristallisation, de la dessiccation, &c.

V. Mais une considération encore trop nouvelle pour être, je ne dirai pas approfondie, mais même suivie dans ses principaux détails, est celle qui appartient aux phénomènes météoriques de l'atmosphère. La pluie, la neige, la grêle, les éclairs, le tonnerre, les aurores boréales, les globes de feu, les inflammations atmosphériques, les étoiles filantes, &c., sont, à n'en pas douter, de grandes, d'immenses combinaisons ou de décompositions chimiques. Les changements subits de température, l'humidité ou la sécheresse, l'état électrique, sont également des phénomènes dont l'explication doit intéresser immédiatement les chimistes. On y reconnoît des combustions, des détonations, des précipitations, des dissolutions, des dégagemens & des fixations de calorique, de lumière, qui appartiennent assurément aux attractions chimiques. Déjà de grands physiciens se sont occupés de cet objet. MM. de Luc, Saussure, Monge, ont donné ou des observations importantes, ou des expériences exactes, ou des théories ingénieuses. Mais qu'on est encore loin de connoître avec quelque exactitude la suite de ces grands phénomènes, leurs liaisons, leurs rapports & sur-tout leurs causes! Quelque jour la chimie s'en occupera avec succès.

Quelque jour on transportera dans les hauteurs où se passent ces grands phénomènes, des laboratoires de chimie, portés dans ces régions par les machines aérostatiques. On y fera des observations précieuses, des expériences nouvelles, on y obtiendra des résultats inconnus, & l'on pourra commencer alors l'histoire de l'atmosphère qui nous intéresse à tant de titres par son influence sur la vie animale & végétale. C'est à ces importantes recherches que pourront être utilement appliquées quelque jour les machines aérostatiques, qui jusqu'ici n'ont presque servi qu'à piquer la curiosité, & exciter le goût de la physique. On tirera aussi grand parti des expériences chimiques faites comparativement sur les plus hautes montagnes & dans les vallées profondes, ou dans les excavations des mines; on se souviendra que Pascal a mis la théorie du baromètre hors de doute, en comparant la marche de cet instrument sur la hauteur du Puy-de-Dôme à celle qu'il présente dans les élévations ordinaires. Voyez les mots AIR, EAU, MÉTÈRES, PLUIE, VÉGÉTATION, RESPIRATION, &c.

ATTENUANS. (*Pharmacie.*) Ce sont des remèdes pénétrants, rarefiants, fondans, par leurs parties actives, volatiles, acres, salines, &c. Voyez le dictionnaire de médecine.

ATTRACTIFS. (*Pharmacie.*) Les médicaments attractifs sont ceux qui, par l'inflammation qu'ils excitent dans la partie où on les applique, attirent les humeurs dans ce lieu. Toutes les matières acres, caustiques, piquantes, la moutarde, l'ail, les cantharides, &c. font de cette classe. On donne ce nom aux médicaments composés qui ont la même propriété. Voyez le dictionnaire de médecine.

ATTRACTION. On entend en physique par attraction, la force par laquelle toute matière tend à s'approcher. La pesanteur des corps n'est que l'effet de leur attraction au centre de la terre.

On sent que je ne dois m'occuper ici de l'attraction que par les rapports qu'elle peut avoir avec les phénomènes chimiques. C'est donc dans les dictionnaires de mathématique & de physique qu'il faut chercher tout ce qui concerne la gravitation universelle, les loix qu'elle suit & leur accord constant avec les mouvements des planètes.

Mais en remontant aux causes des affinités chimiques, on a reconnu que les combinaisons qu'elle produit, ne pouvoient être que l'effet d'une attraction prochaine ou à de petites distances, ainsi que Newton l'avoit soupçonné. Il importe donc d'exposer ici en peu de mots le fondement de cette doctrine. On la trouvera développée au mot *affinité* avec les détails qui conviennent à l'importance

de la matière. Je me bornerai à annoncer ici en peu de mots les principes généraux, les questions que présente la théorie de l'attraction chimique qui est proprement celle de l'affinité.

Toute matière s'attire.
L'attraction est en raison directe des masses ou de la quantité de matière.

Elle est en raison inverse du carré de la distance, c'est à-dire, qu'à mesure que la distance augmente, la force décroît suivant le rapport du carré de cette distance, de sorte que si la distance est double, l'attraction se trouve réduite au quart, si elle est triple, au neuvième, si elle est quadruple, au seizième, &c. &c.

Il n'y a une propriété essentielle, inhérente à la matière ? C'est une conséquence assez probable de l'universalité, (1) & sur-tout de la réciprocité bien démontrée de l'action de tous les corps les uns sur les autres. Cependant l'habitude de ne voir du mouvement qu'en suite d'une impulsion, & la difficulté de concevoir que la matière puisse agir où elle n'est pas, suspendent encore l'opinion de quelques-uns des plus grands physiciens, & même les portent à imaginer un fluide dont l'action impulsive est la cause première de l'attraction, quoiqu'il soit tout aussi difficile de concevoir la communication du mouvement qui pourtant frappe tous les jours nos yeux, & quoique l'hypothèse d'un fluide moteur ne se trouve pas moins inconciliable avec un grand nombre de phénomènes bien constatés. Au reste il suffit de dire avec les physiciens les plus réservés, que l'attraction est du moins un effet général, constant, une propriété primordiale de la matière, & sans vouloir remonter au-delà, de s'appliquer à recueillir les observations, à en déduire les loix, qui est ce qui importe le plus à notre théorie. (2)

La question qui touche le plus près aux phénomènes chimiques, est celle de savoir si la loi que suit l'attraction à de très-petites distances, est la même que celle que l'on observe à des distances plus considérables.

Cette attraction prochaine est très-sensible dans l'ascension des fluides dans les tubes capillaires, la reunion subite de deux gouttes d'eau, de deux globules de mercure, au moment où ils se touchent, l'adhésion des surfaces, la cohésion des parties solides & même fluides des corps, la combinaison de deux matières par dissolution, & une infinité d'autres exemples que nous aurons occasion de rassembler ailleurs. Voyez ADHESION, COHESION, DISSOLUTION, CRISTALLISATION.

L'ascension des liqueurs dans les tubes capillaires, le plus frappant de tous ces faits, n'est pas une attraction égale pour toute matière en pro-

(1) En d'autre lieu, M. Coulomb a fait voir que l'électricité & le magnétisme suivent, comme l'attraction, la raison inverse du carré des distances. Voyez Exposition de la Théorie, &c. par M. Haüy.

(2) C'est sans doute dans ces vues, que M. Keir, dans la dissertation, de attraction chimica, définit l'attraction en ces termes : *Force quæ corpora inter se propriis admodum consensibus coherere, sine vi extrinseca manifestæ ad se invicem*, portio.

portion des quantités, elle participe visiblement de cette attraction modifiée, de cette attraction de choix, que nous verrons produire réellement affinée. En effet si cette attraction ne dépendoit que d'une propriété commune à toute matière dans la même condition de distance, il s'ensuivroit que les colonnes élevées dans les tubes au-dessus du niveau des liqueurs, devroient suivre la gradation de leur densité ou de la pesanteur qui fait obstacle à la force qui les attire ; c'est ce qui n'arrive pas. Dans un tube où l'eau s'élève à 13 lignes au-dessus de son niveau, l'alcool rectifié ne va qu'à 5, & l'éther encore plus léger ne se tient qu'à 4 lignes ; ce qui donne précisément un ordre inverse de la pesanteur de ces fluides. (*Dissertation de M. de la Lande sur les tubes capillaires, &c. n°. 55.*) Il en est de même des adhésions qui ne suivent ni les rapports des surfaces ni ceux des densités. Ces faits méritent la plus grande attention ; ce sont les vrais bases sur lesquelles on peut éléver la théorie des attractions chimiques.

La loi de ces attractions est-elle aussi celle du carré ? Voilà le problème dont la solution doit guider nos recherches théoriques, & c'est sur quoi les physiciens ne sont pas d'accord.

Newton enseigna dans ses principes mathématiques que la loi qu'on observoit dans les attractions des petites parties de la matière étoit souvent très-différente de celle que suivoient les sphères composées de ces parties, que si elle ne diminuoit que dans la même proportion que le carré de la distance de ces parties augmentoit, l'attraction de ces parties au contact ne seroit pas beaucoup plus grande que lorsqu'elles seroient éloignées à fort peu de distance, au lieu que cette force devient infinie au contact, en supposant la diminution de l'attraction, en raison inverse du cube de la distance. (*Méthode, liv. 3, chap. 4, n°. 6.*) D'autre part ayant observé que les corps sulfureux étoient ceux qui avoient le plus d'attraction sous même densité intégrale, Newton a douté si l'on ne pourroit pas attribuer l'attraction de tous les corps dans les petites distances aux particules sulfureuses qu'ils contiennent en abondance, quoiqu'en différentes proportions. D'où quelques physiciens ont pensé, (dit M. Sigorgne dans ses *institutions Newtoniennes*, n°. 159,) qu'on pourroit expliquer cette attraction de tous les corps dans les petits intervalles sans recourir à d'autre loi que celle du carré, en supposant simplement que les molécules du soufre sont très-irrégulières & d'une densité cent septillions de fois plus grande que la densité moyenne de la terre ; car pourquoi ne supposeroit-on pas la densité du soufre à volonté, par rapport à la densité moyenne & peu considérable de la terre ?

M. Sigorgne juge cette hypothèse inadmissible, & si elle répugne aux géomètres à cause de cette excessive densité, elle sera rejetée avec plus de fondement encore par les chimistes modernes qui ont absolument abandonné ce soufre élémentaire

Chimie, Tome II.

de l'ancienne école, qu'elle croyoit sans preuve distribué dans tous les corps en plus ou moins grande quantité ; mais il ne faut pas perdre de vue que cette densité propre des molécules primitives des corps est un élément qui nous manque pour soumettre au calcul leurs attractions, & que si elle n'est pas dans une aussi prodigieuse proportion avec celle de la terre, il est permis du moins de croire qu'elle la surpasse de beaucoup dans les substances que nous nommons actives, & que cet excès est nécessairement une des causes qui modifie l'attraction universelle.

C'est par une suite de la complication de ces phénomènes que les physiciens & même les géomètres ont tant varié sur la loi des attractions prochaines. Que l'on applique par exemple la loi du carré à un cône attirant une particule de matière placée à son sommet ; en supposant le côté de ce cône partagé d'abord en ses deux moitiés, ensuite dans la moitié de la moitié en allant vers le sommet, puis coupé en tranches infiniment minces parallèles à sa base. On voit que l'attraction de chaque tranche étant comme sa masse divisée par le carré de sa distance au sommet du cône, & la masse étant aussi comme le carré de cette distance, son attraction sera $a = \frac{dd}{dd} = 1$, & puisqu'il en sera de même de chaque tranche, l'attraction d'un cône tronqué sera comme la somme de ses tranches, c'est-à-dire, que la moitié qui touche, n'attirera pas plus que la moitié qui est distante de la particule de toute la moitié de la longueur du cône.

C'est ainsi que M. Sigorgne prouve (*instit. Newton. n°. 154*) que dans cette loi d'attraction l'effet ne peut augmenter au contact beaucoup plus qu'à de petites distances du contact. Il en sera autrement, dit ce savant, si l'attraction suit une loi plus élevée, par exemple, celle du cube ; car reprenant le cône dont le côté a été supposé divisé en une infinité de cônes de proportions, différentes dont le premier est de toute la longueur de ce cône le second de sa moitié, le troisième de la moitié de cette moitié, &c. ; divisant chacun de ces cônes tronqués en un même nombre de tranches infiniment petites ou d'éléments, ces éléments auront des épaisseurs proportionnelles à la longueur des tous qu'ils composent, & par conséquent à leurs distances du sommet du cône, tandis que leurs bases qui sont des portions de surfaces courbes qui ont leur centre à ce sommet, seront comme les carrés de ces mêmes distances. La masse de chaque élément sera donc alors comme le cube de sa distance au sommet du cône, puisqu'elle sera le produit de son épaisseur d par la surface de sa base qui est $d d$, & son attraction sera $a = \frac{ddd}{ddd} = 1$; elle sera par conséquent égale dans tous les éléments, qui étant en même nombre dans chaque cône tronqué, donneront une même attraction totale dans

l. II

chacun de ces solides. Or puisque la progression est décroissante, & qu'elle peut se continuer à l'infini, le plus petit solide de cette progression depuis tel terme qu'on voudra assigner jusqu'au sommet qu'on suppose en contact avec la particule attirée, contient une infinité de ces solides ou cônes tronqués qui ont chacun une attraction égale à celle du plus grand cône tronqué plus éloigné, & par conséquent il a infiniment plus de force attractive que lui; c'est-à-dire, que la plus petite partie de matière en contact avec une autre particule attire, dans cette loi d'attraction, infiniment plus que le plus grand corps qui n'est pas en contact, & qui en est à la plus petite distance finie. »

M. Sigorgne conclut de-là que si l'attraction est encore sensible à quelque distance du contact, elle est absolument infinie au point de contact, & que si au contraire elle n'est que très-grande au point de contact, par rapport à la gravité, elle est infiniment petite ou nulle à la moindre distance finie. Mais puisqu'il est certain d'une part que l'attraction au contact n'est pas infiniment supérieure à la force qui produit la pesanteur, étant toujours possible de rompre la cohésion (1), que d'autre côté il y a des phénomènes qui prouvent une attraction encore sensible à de très-petites distances du contact, la loi du cube n'est pas celle qui convient, mais plutôt un rapport moyen entre l'inverse du cube & l'inverse du carré. Il propose enfin, pour tout réduire à une loi, de regarder l'attraction primitive & universelle de toutes les parties de la matière, comme n'étant exactement en raison inverse ni du carré ni du cube, mais dans un rapport mixte ou certaine fonction de la distance qui se modifie selon les circonstances, de manière que dans les grandes distances elle ne montre que la raison réciproque du carré, & que près du contact ou en contact, la raison du carré étant absorbée par l'attraction de la terre, la raison plus grande subsiste, surpassée la pesanteur de toute la quantité nécessaire, & soit le ressort de toutes les opérations chimiques. (n°. 157 & 193.)

J'aurais beaucoup à ajouter, si je voulois rapporter toutes les hypothèses qui ont été imaginées pour ramener tous les phénomènes de l'attraction à une seule loi, & les motifs que quelques-uns ont jugé assez puissants pour en admettre plusieurs, mais mon intention n'est pas de faire ici un article de physique-mathématique, que l'on trouvera bien mieux traité dans les parties de l'encyclopédie auxquelles il appartient; il me suffit d'avoir fait sentir toute l'importance & la difficulté de la matière, d'avoir renfermé dans ce court exposé ce que ne peut ignorer un chimiste qui veut s'éle-

ver au-dessus de la routine des manipulations, enfin d'avoir préparé l'intelligence de ce qu'il me reste à dire, en traitant de l'affinité où je proposerai aussi quelques idées pour la résolution de cette grande question. Voyez ADHESION, COHESION & AFFINITE.

Plusieurs physiciens croyent qu'il n'est pas possible de rendre raison de tous les phénomènes, sans admettre avec l'attraction une force contraire ou de répulsion, & le célèbre Apinus a cherché à établir cette hypothèse de la répulsion des molécules des corps dans sa belle théorie de l'électricité, mais il s'en faut bien que ce système soit généralement reçu. M. l'abbé Haüy observe très-bien que quand la nature des fluides électrique & magnétique sera encore mieux connue, on trouvera probablement que ce sont ces fluides eux-mêmes qui déterminent les répulsions, & sont la fonction que M. Apinus attribue aux molécules propres des corps, (exposition de la théorie de l'électricité, &c. disc. prélim.) je crois pouvoir dire du moins qu'il n'y a en chimie de répulsion apparente que dans les effets qui procèdent immédiatement de l'attraction ou de l'affinité. C'est ce que M. Keit a très-bien développé dans sa dissertation sur l'attraction chimique (chap. 2, §. 4). Les corps qui refusent de s'unir, ne se repoussent pas; ils manquent seulement de l'attraction qui constitue l'affinité, ou, ce qui est la même chose, l'attraction d'affinité est inférieure à celle de cohésion; s'il n'y a pas assez d'attraction entre l'eau & l'huile pour produire dissolution, il y en a assez pour produire adhésion. Une goutte d'eau placée sur une lame de suif posée verticalement, y reste enchaînée par une force qui fait équilibre à son poids. La substance qu'on sépare d'un dissolvant en lui présentant une autre base, n'est pas repoussée; elle devient libre, parce qu'elle est moins attirée; elle tombe au fond des vaisseaux, si elle est plus pesante que la liqueur dans laquelle elle se trouve abandonnée à son poids; elle s'élève, si elle a moins de pesanteur spécifique; la matière de la chaleur n'écarte les molécules des corps qu'en vertu de l'attraction qui s'y fixe précisément, comme l'eau écarte les molécules des sels qu'elle dissout, & l'effervescence n'est que le mouvement sensible d'un gaz nouvellement formé ou tendu libre & déplacé subitement par les corps beaucoup plus pesans avec lesquels il cesse d'être uni.

Ainsi c'est toujours l'attraction qui est la cause première & unique de tous ces phénomènes, & il est probable que toutes les fois que nous en avons une suffisante connoissance, nous les verrons

(1) M. Keit paroit vouloir distinguer l'attraction de cohésion de l'attraction de l'affinité, en ce que la première existe toujours aux instrumens mécaniques, qui n'ont aucune prise sur les combinaisons chimiques (de astrali. chimica, cap. 2, §. 4.) On se tromperoit beaucoup, si on vouloit en tirer une preuve de la nécessité de deux loix différentes; il est tout aussi impossible à l'instrument de séparer les deux dernières molécules unies par cohésion, que deux molécules simples d'un composé; l'obstacle commun est qu'elles échappent par leur union au tranchant, & c. même à la vue; il n'est pas moins vrai que le ciseau qui tranchait un lingot allié d'or & d'argent, sépare également, & probablement avec autant de facilité, l'or de l'argent que l'or de l'or.

se classer naturellement dans les effets de cette grande force de la nature.

M. le Sage de Genève, &c d'après lui M. Prévôt, dans son traité de l'origine des forces magnétiques, ont proposé une explication de l'attraction, & pour cela en supposant que l'espace soit vuide, & qu'on y distribue à-peu-près uniformément une infinité de corps durs, très-petits, à-peu-près égaux; que chacun d'eux se meuve selon une direction rectiligne, continue, mais que les directions des différents corpuscules soient très-variées & leurs mouvemens à-peu-près également rapides, en sorte que prenant un point quelconque de l'espace, il puisse être considéré un moment comme un centre où & d'où rayonnent en tout sens des corpuscules égaux avec des vitesses égales. Les choses étant ainsi conçues, qu'on place à un point quelconque de cet espace un corps sphérique beaucoup plus grand que les corpuscules, les corpuscules seront interceptés en tout ou en partie; chaque corpuscule intercepté frappe le grand corps, mais comme ils ont tous des antagonistes égaux en forces, le corps restera en équilibre, ou ne fera que de très-petits mouvemens ou des oscillations, s'il y a de temps-en-temps des inégalités dans les courans.

Si l'on place un autre grand corps, les corpuscules interceptés ne frappent point l'autre, les courans opposés conservent leur force; ils pousseront les corps l'un contre l'autre. Telle est l'hypothèse fondamentale de M. le Sage; elle se trouve à la suite d'un mémoire, & parmi ceux de Berlin, ann. 1782, sous le titre de *Lutèce Newtonien*.

(M. GUYTON MORVEAU.)

ATTRACCTIONS DIVELLENTES. M. Kirwan, en voulant rendre raison de l'effet des attractions doubles avec plus d'exactitude & de clarté qu'on ne l'avait fait avant lui, a désigné sous le nom d'affinités divellentes ou d'attractions divellentes, la somme des deux forces réunies, qui dans cette espèce d'attraction double opère la décomposition. On voit que c'est en raison de cette décomposition ou de cette séparation de principes, que M. Kirwan a adopté cette expression *avellentes* du mot latin *divellere*, séparer, arracher. Voyez le mot AFFINITÉ dans le premier volume.

ATTRACCTIONS QUIESCENTES. C'est dans le même esprit & pour désigner un effet contraire à celui qui a lieu par les attractions divellentes, que M. Kirwan a nommé *attractions quiescentes* celles qui sont opposées aux premières, & qui tendent à laisser dans le repos, *quies*, les corps que l'on fait agir les uns sur les autres. Il n'y a de doubles décompositions que dans le cas où la somme des affinités divellentes l'emporte sur celle des affinités quiescentes. Voyez aussi le mot AFFINITÉ.)

ATTRACCTIONS ÉLECTIVES. Bergman en considérant avec tous les physiciens modernes les

affinités chimiques comme les effets de l'attraction, a cru devoir nommer attractions électives, les affinités particulières que les diverses substances naturelles exercent les unes sur les autres, & en vertu desquelles s'opèrent les différentes décompositions & combinaisons connues. Il semble en effet qu'il y ait dans l'action de ces affinités, une sorte de choix ou d'élection entre les matières qui réagissent les unes sur les autres, & l'expression de Bergman désigne avec autant de finesse que d'exactitude, ce qui se passe dans les opérations fondées sur cette force. Tous les détails relatifs aux attractions électives ont été exposés avec une grande étendue au mot AFFINITÉ. Voyez ce mot.

AUBEPINE ou **EPINE BLANCHE.** (*Pharmacie*.) *Crataegus oxyacantha*, *Mespilus sylvestris*, *Cust.* C'est un grand arbrisseau qui croît par-tout, tant dans les pays froids que dans les pays chauds. Tout terrain & tout climat lui conviennent.

Sa fleur est anripleurétique, anticolique; l'on en retire une eau distillée qui est diurétique. J'ai vu substituer la fleur d'aubépine à celle de l'*acacia nostris* ou prunier épineux. L'infusion des feuilles a été ordonnée dans les diarrhées bilieuses, dans la diarrhée avec relâchement d'estomac. Le fruit est astringent, excite l'urine. Les hommes en mangent dans le Nord; il sert de nourriture aux oiseaux. On peut en retirer un esprit ardent.

Le bois excelle pour la dureté & l'égalité, il va immédiatement après le buis, & l'on en fait grand cas pour les ouvrages du tour.

L'aubépine est très-essentielle pour la construction des haies vives.

(M. WILLEMET.)

AUBERGINE ou **MAYENNE.** (*Pharmacie*.) *Solanum Melongena*, *Malva insana*, *Dod.* *emp.* 458. Cette belle plante croît spontanément en Asie, Afrique & Amérique. Les curieux la cultivent. Elle est annuelle, & offre plusieurs variétés. La première, qui est la plus remarquable, donne des fruits blancs semblables à l'œuf de poule. La seconde variété a des fruits jaunes, & la troisième les a d'un rouge pâle. Ces fruits sont comestibles dans les pays chauds.

Les feuilles de l'aubergine sont anodines, résolutives, émollientes. On peut les employer en forme de cataplasme sur les cancers, les hémorroides, les brûlures, & dans les cas d'inflammation.

(M. WILLEMET.)

AUREA ALEXANDRINA. (*Pharm.*) C'est un opiate ou un antidote inventé par un médecin nommé Alexandre, qui y faisoit entrer de l'or, de l'argent, des perles, auxquels on attribuoit alors des propriétés merveilleuses. Il y avoit plus de 60 espèces de médicaments aromatiques, acres, précieux dans cet antidote. Quoique Lémery en ait décrit la préparation, il nous permet de nous en

LII 2

passer, en blâmant le grand nombre de remèdes entassés dans cette formule, & en assurant que la thériaque doit en tenir lieu.

AURICULAIRES. (*Pharmacie.*) Remèdes convenables aux maladies des oreilles, ou disposés par le pharmacien, de manière à être commodément appliqués ou dans les oreilles, ou autour & au-dehors des oreilles. Voyez **ACOUSTIQUES** dans le dictionnaire de médecine.

AUBOURS ou ÉBÉNIER DES ALPES. (*Pharmacie.*) *Cyrtus liburnum. Loburnum. Dod. pempt.* C'est un arbre de moyenne grandeur, qui offre au printemps des fleurs jaunes charmantes, en grappes; il croît dans les contrées chaudes montagneuses.

Les feuilles, les fleurs & les semences sont estimées apéritives, digestives, résolutives & laxatives, propres pour exciter les mois aux femmes, contre l'asthme.

Les jeunes boutons confits au vinaigre, se mangent comme les cornichons.

Le bois sert avantageusement dans les arts mécaniques.

(M. WILLEMET.)

AUNE. (*Pharmacie.*) *Betula alula. Alnus. Com. eric. 68.* C'est un arbre de gros fruit médiocre, indigène à toute l'Europe; on le trouve aussi au Japon, dans la nouvelle-Angleterre & en Virginie. L'aune mérite l'attention de l'économiste; car son bois sert aux charpentiers, aux ébénistes, aux menuisiers, aux tonneurs, aux charçons, aux fabricateurs de poudre à canon & à d'autres artifices. L'écorce est employée par les teinturiers, les tanneurs; l'on en fait des torches, on prépare une teinture noire avec la racine, qui imite parfaitement l'ébène. On peut faire de l'encre avec les fruits. Les Japonais préparent avec ce fruit une teinture noire fort en usage chez eux.

En médecine les feuilles sont résolutives, vulnéraires, tempérantes, antiphlogistiques & sudorifiques, propres contre la pierre, les rhumatismes, la sciatique, la paralysie, les inflammations, les démangeaisons, les tumeurs, les ulcères des jambes, les lassitudes. Schultz dit que les feuilles d'aune sont anodines, qu'on les applique avec beaucoup de succès sur les maux de jambes, sur les cautères quand il y a prurit & inflammation. On lit dans les éphémérides des curieux de la nature, que ces mêmes feuilles appliquées seules à la plante des pieds, avoient fait cesser une affection spasmodique causée par le poison. Elles sont encore merveilleuses pour faire diffuser le lait aux femmes en couche. Il faut alors les décomposer, les chauffer sur le feu & les appliquer chaudes sur les mamelles. Kramer rapporte dans sa *médecine militaire*, que c'est un souverain remède pour guérir les ulcères corroifs. L'on prépare encore avec les feuilles des bains qui

excitent abondamment la sueur & font merveille dans la goutte, le rhumatisme & la sciatique.

Les moutons & d'autres bestiaux mangent la feuille fraîche de ce petit arbre. Elle a la propriété de chasser les puces; & M. Malzel dans son *traité sur la culture des asperges*, conseille de faire infuser dans l'eau les feuilles d'aune, & de les y laisser macérer assez long temps, de se servir ensuite de cette eau pour arroser les asperges afin de chasser les insectes qui les dévorent.

L'écorce & le fruit sont astringens, rafraîchissans, fébrifuges, utiles contre l'hydropisie & les inflammations du goître.

Relevons ici une erreur commise dans le *dictionnaire du jardinier* de Miller, édition & traduction française; à l'occasion de l'aune au mot **ALNUS**, l'on renvoie à l'article **EUTULA ALNUS**, & il n'en est nullement fait mention.

(M. WILLEMET)

AUNÉE ou ENULE CAMPANE. (*Pharmacie.*) *Anula helenium. Enula campana. Brunf. Herb. 1. 100.* C'est une grande & belle plante vivace, à fleurs jaunes radieuses, commune dans plusieurs contrées de l'Europe, ainsi qu'au Japon, en Virginie. Elle joue un grand rôle en médecine, & se trouve dans toutes les officines. C'est la racine qui est en vénération; il faut la choisir charnue, dépourvue de fibres, la faire sécher avec précaution. Elle est incisive, atténuante, expectorante, apéritive, fondante, vulnéraire, alexipharmique, vésiculaire, laxative, exhalante, antipileurétique, diaphorétique, antispasmodique, antiseptique, emménagogue, tonique, stomacique, fébrifuge, diurétiq.ue, exanthématique; propre contre la toue, la coqueluche, la pulmonie, le scorbut, l'hypocondrie, la paralysie, la cachexie, la chlorose, la jaunisse, l'hydropisie, les fleurs blanches, la mélancolie, la sciatique, les tremblements, la colique, les convulsions, la gravelle, les douleurs d'oreille, la difficulté de respirer, parce qu'elle dissipe & atténue les humeurs épaisses & visqueuses, qui sont fortement attachées dans la poitrine & les p.oumons; corrige les mauvais effets du mercure, dirige les ulcères des p.oumons, dans les phtisiques. Elle est très-salutaire pour l'estomac, & c'est de-là que vient ce proverbe tiré de l'école de Salerne, *Enula campana reddit prae cordia Juna*; c'est-à-dire, l'aunée rend les entrailles saines. En effet elle aide la digestion, rétablit & affermit le ton des viscères, dissipe & chasse par les selles la sa.ure tenace de l'estomac & des intestins, c'est pourquoi on dit qu'elle rend le ventre libre : c'est par cette même raison qu'elle calme les coliques venteuses, purge les reins, chasse le sable, lève les obstructions de la matrice, excite les règles en divisant les humeurs épaisses & gluantes, qui sont amassées dans ces parties. La racine d'aunée est encore bonne contre les poisons, non-seulement contre ceux qui attaquent les hommes, mais

encore contre ceux qui infectent les animaux, surtout les quadrupèdes; car elle conserve les moutons, selon Renaudot, & les guérit de la clavelée.

On la prescrit pour les hommes depuis demie-once jusqu'à deux onces, dans les bouillies, apozèmes & décoctions; ou en substance depuis un gros jusqu'à deux.

A l'extérieur, la racine d'aunée est résolutive & rubéfiante. On peut l'appliquer sur toutes sortes de tumeurs & l'œdème; la fumigation chasse les puces, les mouches & les mouchetons. L'on retire de cette racine une couleur bleue.

En Allemagne on la confit, & Platerus l'appelle l'aromate germanique, dont on assaisonne utilement les aliments: on l'estime dans cette contrée plus que les épices des Indes. L'on fait avec la racine d'aunée des conerves, extraits, vin, essence, sirop, onguent, huile & une eau distillée odoriférante. On en obtient aussi une huile essentielle concrète, qui ressemble au camphre. Elle entre dans le sirop de velar composé & d'armoise, le sirop hydragogue, le sirop anasthmatique de Charas, l'eau theriacale, l'eau générale, le looch de santé, le looch pectoral, l'opiat de Salomon, l'orviétan, le suc de réglisse brun, l'électuaire catholique de Fernel, l'onguent martiatum, l'emplâtre de Virg, l'emplâtre diabatantum. Son extrait entre dans la thériaque écossée.

La racine d'aunée se trouve également dans les pharmacies américaines.

L'aunée est encore propre à cacher les endroits désagréables des jardins.

Jean Rodolphe Wedel, professeur de médecine en l'université de Jena en Saxe, a composé une dissertation sur cette plante.

(M. WILLEMET.)

AURONE MÂLE, ou GARDEROBE. (*Pharmaceut.*) *Artemisia abrotanum*. *Abrotanum mas.* *Dod. pempt.* 21. Cette aurone naît communément sur les montagnes d'Italie, de Syrie, en Sibérie, en Galicie, en Cappadoce; elle est commune au Japon selon Thunberg, & se trouve dans les provinces méridionales de la France. On la cultive dans les jardins, on peut l'employer utilement à garnir les bosquets d'hiver, parce qu'elle ne quitte point ses feuilles; on peut aussi en former des bordures agréables que l'on taille comme le buis. On se sert en médecine des feuilles & des sommités fleuries.

L'odeur forte de cette plante, son goût aromatique, acre & amer, marquent qu'elle contient des parties volatiles, subtils, salées, huileuses, qui servent à augmenter le mouvement de fermentation du sang, à diviser les humeurs épaisses, à rétablir le ton des parties solides, & à l'augmenter lorsqu'il est affaibli, suivant Geoffroi. Par ces mêmes parties actives elle résiste à la pourriture, & que les vers, non-seulement par son huile

essentielle, amère, ennemie des vers, mais encore par les parties fines & actives qui divisent & résolvent la mucoité trop gluante de l'estomac & des intestins, dans laquelle se nichent les vers. C'est par la même raison qu'elle dissipe les vents, excite les urines & les règles, en levant les obstructions des reins. C'est pourquoi les médecins lui ont attribué la vertu apéitive, incisive, échauffante, digestive, alexitère, vulnéraire, emménagogue, carminative, anticiade, tonique, balsamique, hépatique, fébrifuge, stomachique, aphrodisiaque, antiscorbutique; on la dit propre contre la péripneumonie, la toux, les fleurs blanches, la léthargie, la cachexie, la mélancolie, les vieilles gonorrhées, les dévoiemens, les excréations immodérées, la sciaticque, la gangrène, les convulsions, l'asthme, & pour exciter l'appétit. A l'extérieur elle est utile dans les écorchures, l'alopecie, la teigne, les taches, les éphélides, les achoras.

L'aurone mâle étoit la plante de prédilection d'Emulier contre les maladies. Simon Pauli, dans sa botanique en quatre parties, propose & recommande ses sommités à la dose d'un gros, comme un spécifique, à ceux dont les urines font supprimées, à cause de quelques calculs; il y faisoit ajouter une très-petite dose de sel de nitre; son eau distillée est diurétique.

Vogel lui attribue les mêmes vertus qu'à l'absinthe. On en retire une huile par infusion & par décoction, une autre essentielle par la distillation; on en fait aussi des vins médicinaux & une conserve. Elle fait la base de l'onguent de Buxet de Brellan, qui est un secret & un remède éprouvé contre le défaut des cheveux. On emploie cette aurone dans l'eau générale, l'onguent martial, l'onguent carminatif & les poudres stomatiques.

Cette plante peut servir dans la cuisine pour les farces; elle chasse les insectes, conserve les cadavres. Il faut la ranger dans la classe des sous-arbristeux.

(M. WILLEMET.)

AURONE FEMELLE ou SANTOLINE. (*Pharm.*) *Chamaecyparissus*. *Santolina chamaecyparissus*. J. B. 3. 133. Cette aurone vient communément dans les lieux champêtres d'Italie & de toute l'Europe australe. Caridol l'a rencontrée dans la Provence, on la cultive dans les jardins & elle doit être rangée parmi la classe des arbrutes. On emploie en médecine les feuilles, les fleurs & les semences. On lui donne à-peu-près les mêmes vertus qu'à l'aurone mâle. On en recommande la graine seule ou couverte du sucre, pour faire mourir les lombrics; c'est un bon substitut du *simencontra*. Voyez notre matière médicale indigène. Matthioli assure que l'on donne fort utilement les feuilles de cette plante réduites en poudre à la dose de demi-gros, pour arrêter les fleurs blanches des femmes. On leur en fait d'abord prendre pendant six jours consécutifs, & ensuite de jour à autre. M. Colle,

médecin d'Aix en Provence, avoit coutume d'en donner un gros également en poudre, dans la pleurésie & la fluxion de poitrine, & cela avec un heureux succès.

L'aurone femelle mise parmi les étoffes de laine & les habits, chasse les teignes, les mites & autres insectes. Le célèbre Réaumur nie cette propriété; d'autres la croient capable d'expulser les punaises des appartemens. On l'emploie dans l'espèce hystérique, dans l'onguent martial & dans la fermentation ordinaire de la pharmacopée de Londres.

On attribue à sa racine une vertu fébrifuge.
(M. WILLEMET.)

AURONE SAUVAGE. (*Pharmacie.* *Artemisa campestris.* *Abrotanum campestre.* C. B. t. 36. Cette aurone est indigène à la France, où elle se trouve dans les terrains sablonneux. On la rencontre aussi en Virginie. Elle est carminative, résolutive, stomachique. L'on recommande sa semence dans l'Amérique septentrionale contre les vers. Cette plante participe des propriétés & vertus de l'armonie. La pharmacopée de Paris dir qu'on peut la substituer à l'aurone mâle. Elle est aussi annuelle.

(M. WILLEMET.)

AURUM MUSIVUM. *Aurum musicum.* *Aurum mosaicum*, en français *or musif*, est une préparation d'étain & de soufre assez oxydée pour différer sensiblement de l'airain fuluré. C'est un oxide d'étain fuluré, d'une couleur jaune brillante & dorée imitant celle de l'or pâle, & servant à quelques espèces de mauvaises dorures. Il sert surtout aussi à froter les coussins des machines électriques; on lui attribue la propriété d'augmenter beaucoup la force de ces machines, & on le préfère à cause de cela aux amalgames. L'histoire de sa préparation & son analyse seront exposées à l'article **ÉTAIN** (Voyez cet article.)

AVICULÆ CYPREÆ. (*Pharmacie.*) C'est le nom qu'on donnoit autrefois à des paillasses odorantes qu'on employoit pour parfumer les chambres des malades. Ce nom métaphorique avoit été adopté, parce que c'étoit en se volatilisant dans l'air, qu'elles s'envelopaient en quelque sorte, que ces matières agissoient. On les nomme aujourd'hui cloux odorants, paillasses odorantes. Voyez parfums.

AUXILIAIRES. (*Pharmacie.*) Les remèdes auxiliaires sont ceux qui, dans une formule, sont manifestement placés après les principaux ou la base, & destinés à en aider seulement l'action. C'est ainsi que la manne, la rhubarbe, la casse, les tamarins, les fels neutres, placés dans des formules de potions purgatives après le séné, ne sont que des purgatifs auxiliaires de celui-ci; tout ce qui est relatif à la nature, à la force, à la disposition, à la dose des remèdes auxiliaires dans les formules est entièrement du ressort de la thérapeutique, & doit être traité dans le dictionnaire

de médecine, plutôt que dans un article de pharmacie. Voyez le mot **FORMULE**, dans le dictionnaire de médecine.

AVOINE. (*Pharmacie.* *Avena sativa.* *Avena vulgaris.* T. 514. C'est une plante annuelle, digne d'exciter la sollicitude de l'agronome, puisqu'elle offre une excellente nourriture à la plupart des quadrupèdes, à la volaille, & à quelques autres oiseaux. Anson assure qu'elle est originaire de l'île Fernandez, près du Chili.

Sa semence est regardée en médecine comme adoucissante, pectorale, rafraîchissante, apéritive, diurétique; les femmes provençales font prendre la décoction d'avoine, pour faire passer le lait aux accouchées. Les Anglois riches ou pauvres, dit Geoffroi, ne sont point d'autres bouillons qu'avec de l'avoine, lesquels sont très-salutaires tant aux malades qu'à ceux qui se portent bien; ils digèrent facilement & fournissent une excellente nourriture. Boerhaave ordonne l'avoine dans toutes les maladies aiguës. Elle est recommandée à l'extérieur, contre les points de côté, la colique, les affections hystériques, les raches de la peau. Arbuthnot se servoit avec succès de la farine d'avoine mêlée avec du beurre pour guérir la galle de la tête.

Cette graine céréale a été d'un grand secours aux gens de la campagne, pendant ces dernières années de disettes. Elle sert aux bœufiers. On fait dans la basse-Normandie & dans la Bretagne, avec de l'avoine que l'on pile légèrement & dont on ôte la peau, une sorte de gruau. Les Moscovites en retirent par la distillation une liqueur dont ils usent en guise de vin, & qui n'enivre guère moins. La farine d'avoine est émolliente & résolutive, l'on en retire de l'amidon. L'avoine torréfiée & pulvérisée, prise en guise de café le matin à jeun, est un excellent laxatif & une boisson saine, j'en ai observé d'heureux effets. La base de la tisane d'un médecin Anglois qui s'appelloit Jean de Sainte-Catherine, est l'avoine; son usage a la réputation de faire vivre long-temps. Elle entre également dans les espèces pour la décoction d'avoine composée de Lower, qui se trouvent insérées dans la pharmacopée de Virembourg & dans celle de Triller; Ettmüller employoit un sirop composé d'une forte décoction d'avoine & de sucre, qui est merveilleux contre la colique, on le nomme ordinairement le sirop de Luther, parce qu'il s'en servoit souvent contre ce mal, auquel il étoit fort sujet.

L'avoine en herbe macérée dans une quantité suffisante d'eau pour des bains, est, dit-on, d'un grand avantage contre les maladies néphrétiques. La paille de cette plante sert aux emballages, ainsi qu'aux couchages.

L'arête située à la base de la balle extérieure de la corolle, se courbe, & tourne de différens côtés, suivant l'humidité de l'air, de sorte qu'elle offre un hygromètre vivant.

Frédéric Hoffman, premier médecin du roi de

Prusse, a rédigé une dissertation sur les guérisons qu'il a opérées avec l'avoine.

(M. WILLETET.)

AXIOMES CHIMIQUES. A mesure qu'une science fait des progrès, à mesure qu'elle acquiert des méthodes pour perfectionner sa marche, les vérités générales se multiplient, & elle possède des axiomes. Telle est aujourd'hui la chimie. Les principes de cette science ne sont créés que depuis quelques années, & déjà elle est riche en corollaires ou en résultats généraux, qui en renferment tout l'ensemble. Une suite de ces résultats pourroit être d'une grande utilité. Depuis 12 ans j'ai constamment cherché cette série; j'en ai déjà tracé l'esquisse un grand nombre de fois dans mes cours, & surtout dans ceux que je fais tous les ans à la suite du cours général & détaillé de chimie, n'offrant les phénomènes que présentent les fluides élastiques connus, soit dans leur formation, soit dans leur fixation, & dans leur influence sur toutes les opérations de la nature & de l'art, je passe en revue toutes les vérités fondamentales de la science, & il résulte de leur exposé un tableau qui rappelle à la mémoire tous les changements dont les corps naturels sont susceptibles dans leurs attractions réciproques. Mais pour réunir ici ces vérités capitales sous la dénomination d'axiomes, il est évident qu'il faut choisir avec un grand discernement celles qui sont les plus générales, qui embrassent tous les faits de la science, qui les renferment, & d'où ils puissent être tirés comme des corollaires, comme des conséquences immédiates. Il faut aussi qu'elles soient clairement énoncées; sans aucune ambiguïté, sans aucun doute, sans aucune équivoque; il faut encore qu'on n'en multiplie pas trop le nombre, quoiqu'il soit nécessaire de les multiplier assez pour ne rien oublier d'essentiel; il faut enfin les disposer entre elles dans un tel ordre & dans une série tellement naturelle, qu'elles présentent les éléments de la science, & qu'elles en fassent concevoir le rapport & la liaison. Voilà les idées que je me suis formées & qui m'ont guidé dans la recherche de ces vérités, j'ai pensé qu'elles devoient servir à l'établissement d'une doctrine complète de chimie, qui, féconde en applications, en principes, puisse également rappeler à l'homme instruit tous les faits qui composent l'immense domaine de la science chimique, & donner à celui qui cherche l'instruction une notion suffisante de la carrière qu'il doit parcourir.

Pour remplir convenablement cet objet, il m'a paru que je ne devois pas présenter une suite de propositions non interrompues, sans liaison & sans adhérence entre elles, comme il eut été possible de le faire, dans l'idée de donner des axiomes & seulement des axiomes. J'ai mieux aimé les lier par des rapports généraux, leur donner un arrangement qui en fit connoître & apprécier la connexion, & si je puis le dire, la réaction réciproque.

Je commence donc par exposer comme un axiome, & même comme le premier des axiomes chimiques, qu'il est possible de rapporter à un petit nombre de chefs principaux, les faits, les expériences, les données de toute la chimie, en sorte que tous ces chefs on puisse facilement & promptement disposer, rapporter tous les détails de la pratique, ainsi que toutes les explications de la théorie. Je n'élève ce nombre de phénomènes généraux qu'à douze, dont voici l'énumération.

- 1°. L'action de la lumière.
- 2°. Celle du calorique.
- 3°. L'action de l'air.
- 4°. La nature & l'action de l'eau.
- 5°. Celles des terres, la formation des alcalis & leur rôle dans les combinaisons.
- 6°. La nature & les propriétés des corps combustibles.
- 7°. La formation & la décomposition des acides.
- 8°. L'union des acides avec les terres & les alcalis.
- 9°. L'oxidation & la dissolution des métaux.
- 10°. La nature & la formation des matières végétales.
- 11°. Le passage des végétaux à l'état de matières animales, & la nature de celles-ci.
- 12°. Enfin la décomposition spontanée des substances végétales & animales.

Si je me suis bien fait entendre, on doit considérer ces douze titres comme autant de chapitres à chacun desquels appartiennent les différents articles de détails, suivant leur rapport direct avec le titre, & dont l'ensemble renferme toute la doctrine de la chimie. Je vais actuellement reprendre chacun de ces titres dans l'ordre où ils ont été indiqués & insérer dans chacun d'eux une suite de propositions ou d'axiomes, sous lesquels on pourra ensuite ranger tous les faits de la science à mesure qu'ils seront étudiés ou connus. Je présenterai pour plus d'utilité une esquisse de cette disposition à la fin de chaque titre.

TITRE PREMIER.

ACTION DE LA LUMIÈRE.

I. La lumière, soit qu'elle vienne du soleil & des étoiles fixes, soit qu'elle soit répandue dans l'espace, se comporte de quatre manières par rapport aux corps qu'elle touche; ou bien elle est réfléchie toute entière de leur surface vers nos yeux, & elle fait naître la sensation du blanc; ou bien elle est décomposée & réfléchie seulement dans quelques-unes de ses parties, de-là la coloration diverse; ou elle est plus ou moins complètement absorbée & donne naissance au noir; ou enfin elle passe à travers les corps en éprouvant une déviation plus ou moins forte, en se rapprochant de la perpendiculaire; c'est ce qui constitue la transparence.

II. En passant à travers les corps transparents, elle éprouve une réfraction qui est en raison directe de la densité de ces corps s'ils sont incombustibles, & qui est d'autant plus forte qu'ils sont plus combustibles. Newton a deviné ainsi la combustibilité du diamant & l'existence d'un principe combustible dans l'eau.

III. En se refrangeant, la lumière se décompose en sept rayons, le rouge, l'orangé, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo & le violet. Trois de ces couleurs paroissent simples, le rouge, le jaune, & le bleu; quatre se décomposent dans les deux qui les forment, l'orangé en rouge & jaune, le vert en jaune & bleu, l'indigo en bleu & violet, le violet en rouge & bleu. Cette décomposition par le prisme est une espèce d'analyse de la lumière.

IV. La lumière agit encore chimiquement sur les corps, c'est-à-dire, qu'elle opère des combinaisons & des décompositions; on en juge par la différence qu'offrent les mêmes corps plongés dans la lumière ou privés de cet élément. Les premiers deviennent en général colorés, volatils, inflammables; les seconds ont les propriétés contraires.

V. Ainsi par le contact de la lumière quelques acides sont décomposés, plusieurs sels changent de nature; les oxides métalliques se rapprochent en général de l'état métallique; les végétaux se colorent & deviennent sapides, inflammables; privés de la lumière ils restent blancs & fides; ils sont *tiédés*.

VI. Ces effets généraux sont presque toujours dus à ce que la lumière enlève aux corps brûlés le principe qu'ils ont absorbé en brûlant, de sorte que d'incombustibles qu'ils étoient devenus, ils repassent à l'état de combustibles. On peut dire qu'en général la lumière *détruit* les corps brûlés.

Application de ces propositions.

Les couleurs des corps.

La transparence.

L'opacité.

Le brillant.

La réfraction simple ou double.

L'éclair métallique.

La décomposition des acides, celle des oxides métalliques.

La décombustion.

L'altération des couleurs minérales.

La végétation.

La décomposition de l'eau par les feuilles.

Le renouvellement de l'air vital atmosphérique.

La formation des huiles.

La différence des végétaux des climats chauds d'avec ceux des pays tempérés, &c.

TITRE SECOND.

ACTION DU CALORIQUE.

I. Ce que les hommes nomment *chaleur* est une sensation produite par un corps que les chimistes modernes nomment *calorique*; quand le calorique est appliqué à notre corps plus abondamment qu'il n'en contient, notre système s'échauffe & il existe pour nous de la chaleur; quand au contraire des matières moins élevées en température que notre corps lui sont appliquées, nous sentons du froid, parce que nous perdons du calorique.

II. Le calorique pénètre tous les corps; il en écarte les molécules en se logeant entre elles; il diminue leur attraction; il dilate les corps; il fond les solides, & rarefie assez les fluides pour les rendre invisibles, pour leur donner la forme d'air, pour les convertir en fluides élastiques, compressibles, aëriiformes. D'après cela les liquides sont des combinaisons de solides avec le calorique, & les gaz sont des dissolutions de différens corps dans le calorique, qui, par lui-même est la plus divisée, la plus rare, la plus légère, la plus élastique des substances naturelles; aussi ne peut-on pas apprécier sa pesanteur.

III. En écartant les molécules des corps les uns des autres, en diminuant leur attraction pour elles-mêmes, le calorique augmente en même proportion leur attraction pour celles des corps voisins. C'est pour cela qu'on l'emploie avec succès pour produire des combinaisons, pour faciliter les unions réciproques; de-là l'axiome *corpora non agunt nisi soluta*, les corps n'agissent que dissous.

IV. Chaque corps ayant une forme différente dans ses molécules & un écartement différent entre elles, admet une quantité différente de calorique, pour arriver à la même température; c'est-là ce qu'on appelle *capacité* des corps pour le calorique. Il résulte de-là que les différens corps élevés à la même température & manquant le même degré au thermomètre, contiennent réellement des quantités différentes de calorique.

V. Cette quantité diverse de calorique contenu dans des corps élevés à la même température, & qu'on nomme avec raison *calorique spécifique*, ne pouvant pas être mesurée par le thermomètre, on a imaginé de la déterminer par la quantité de glace que chaque corps élevé à une température uniforme est capable de fondre, pour descendre au même degré. La différence dans cette quantité donne le rapport du calorique contenu dans les corps, & l'instrument qui sert à l'obtenir est nommé *calorimètre*.

VL

VI. Toutes les expériences faites par les physiciens modernes qui se sont occupés de la théorie du calorique, prouvent que les corps en changeant d'état, changent aussi de capacité. On nomme changement dans les corps, leur solidité, leur liquidité, leur fluidité élastique. Il suit de-là qu'en mêlant deux corps solides qui ne se combinent point, élevés à des températures inégales, si leur capacité est la même, on obtiendra la moyenne qui résulte des deux températures; mais si leur capacité est inégale, la température du mélange s'éloignera plus ou moins de la moyenne, & la différence indiquera la capacité réciproque de ces deux corps.

VII. Les phénomènes précédens annoncent que le calorique a des attractions différentes ou divers degrés d'affinité pour les différens corps. Dans toutes les combinaisons il faut donc calculer avec soin cette attraction variée du calorique.

VIII. Quand les corps s'unissent, ou ils perdent du calorique, ce qui annonce que la nouvelle combinaison en contient moins que ses composants, alors l'opération offre de la chaleur sensible à nos organes, & la température des mélanges s'élève, c'est ce qui a lieu le plus souvent dans les expériences; ou bien les corps qui se combinent absorbent du calorique, & la nouvelle combinaison contient plus de calorique que ses principes isolés; alors pendant que ces combinaisons ont lieu, les mélanges se refroidissent, le calorique qui étoit libre entre leurs molécules s'y combine plus étroitement, & il est même enlevé aux corps voisins.

IX. Quelquefois le calorique est si adhérent aux corps qu'il les empêche de se combiner à d'autres; c'est ainsi que plusieurs fondus en gaz ou fluides élastiques ne s'unissent point à d'autres corps ou entre eux, tant qu'ils conservent cet état de dissolution invisible dans le calorique; il faut avoir recours à des attractions doubles pour opérer alors des combinaisons.

X. L'attraction du calorique pour quelques corps est telle, que très-souvent on l'emploie avec avantage pour séparer ces corps des composés qu'ils forment, & pour analyser ou décomposer les substances composées. On ne fait pas autre chose dans les distillations, & dans toutes les décompositions opérées à l'aide du feu seul ou du calorique appliqué à des matières très-composées. On dissout peu-à-peu, & suivant leur ordre de solubilité par le calorique, les différens éléments de ces composés, & on les sépare en vapeurs ou en gaz.

XI. Souvent la lumière appliquée en même-

Chimie. Tome II,

temps que le calorique, aide son action ou réciproquement; aussi les vaisseaux transparents mis dans les fourneaux en laissant passer la lumière & le calorique à la fois, sont-ils extrêmement utiles aux chimistes. On produit le même effet en pénétrant d'assez de calorique les vaisseaux opaques pour les faire rougir ou les rendre perméables à la lumière.

XII. Il y a des corps qui absorbent beaucoup plus vite le calorique que d'autres, on appelle cette propriété *conductrice du calorique*; en général les corps les plus colorés sont les meilleurs conducteurs; la cause de ce phénomène est inconnue.

XIII. Tous ces faits prouvent que le calorique est un corps particulier & non une modification de tous les corps, comme l'ont cru quelques physiciens; il n'est pas démontré qu'il soit le même que la lumière; plus on avance & plus on trouve de différences dans l'action de ces deux corps.

Applications de ces axiomes.

La dilatation des solides, la rarefaction des fluides.

Les thermomètres.

La fusion.

La sublimation, la volatilisation.

Le calorimètre; table du calorique spécifique des corps.

Les changemens de température de différens mélanges.

Les refroidissemens artificiels.

La production des gaz & leur fixation.

La distillation à différentes températures.

L'incandescence.

Les différens conducteurs du calorique.

Les attractions du calorique.

TITRE TROISIEME.

ACTION DE L'AIR.

I. L'air agit en masse par son poids, par son état hygrométrique, par sa température, &c. sur tous les corps naturels. Ainsi des expériences de combinaisons ou de décompositions faites avec le contact de l'air différencient beaucoup de celles que l'on fait dans le vide, & il faut toujours apprécier l'état du baromètre, du thermomètre, & de l'hygromètre, dans les expériences de chimie.

II. L'atmosphère est un vaste laboratoire où la nature exerce d'immenses analyses, des dissolutions, des précipitations, des combinaisons; c'est un grand récipient, où tous les produits atténués & volatilisés des corps terrestres sont reçus, mêlés, agités, combinés, séparés. Sous ce point de vue, l'air atmosphérique est un chaos, un

M m m

mélange indéterminé de vapeurs minérales, de molécules végétales & animales, de graines, d'œufs, que parcourent & traversent sans cesse le fluide lumineux, le fluide calorique, le fluide électrique. Les grands changemens qu'il éprouve & qui sont sensibles dans de grands espaces, par l'eau, la lumière, le calorique libre, le bruit, sont nommés météores.

III. Malgré ce mélange dont il semble impossible de déterminer la nature, l'air atmosphérique est sensiblement le même par sa nature intime dans quelque lieu qu'on le prenne; & il est bien caractérisé par ses deux propriétés d'entretenir la combustion & de servir à la respiration. Ces deux grands phénomènes ayant entr'eux la plus intime analogie, on peut bien connoître l'air en étudiant avec soin ce qui se passe dans la combustion.

IV. Un corps combustible ne peut pas brûler sans le contact de l'air atmosphérique ou d'une matière qui en a été extraite, ainsi la combustion ne sauroit avoir lieu dans le vide.

V. Un corps combustible ne peut brûler dans une quantité donnée d'air atmosphérique, que jusqu'à une certaine époque. Cent parties de cerai n'en contiennent que vingt-sept qui puissent servir à la combustion; quand ces vingt-sept parties ont été absorbées par le corps combustible, la combustion s'arrête, les soixante-treize autres parties ne peuvent point y servir. Ainsi l'air atmosphérique est un composé de deux substances différentes, abstraction faite de quelques corps étrangers qui y sont mêlés, & qui ne vont pas à plus d'un centième; de ces deux substances, l'une sert à la combustion & à la respiration, on la nomme *air vital*; l'autre opposée à la première par ces deux propriétés est appelée *gaz azote*.

VI. Un corps qui brûle dans l'air fait donc une véritable analyse de ce fluide; il en sépare, il en absorbe l'air vital qui augmente le poids de ce corps & change sa nature; le gaz azote qui reste est plus léger que l'air atmosphérique, il éteint les corps en combustion, il tue les animaux, il est, comme nous le verrons plus bas, un des principes de plusieurs composés, & sur-tout de l'ammoniac ou alcali volatil, de l'acide du nitre, & des substances azotées.

VII. Le corps combustible qui a brûlé dans l'air atmosphérique, & qui en a absorbé tout l'air vital auquel il peut s'unir, ne peut plus brûler davantage dans de nouvel air; il est devenu incombustible & souvent salin.

VIII. Un corps qui brûle dans l'air atmosphérique n'absorbe jamais complètement les $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{20}$ d'air vital qu'il contient. L'our enlève entièrement

ce fluide à l'air atmosphérique, & pour en faire une analyse complète, il faut y plonger à plusieurs reprises des corps combustibles, & y recommencer de nouveau la combustion.

IX. La portion d'air ainsi absorbée par les corps combustibles, & qui a déjà été nommée *air vital*, est aussi appelée *gaz oxygène* son premier nom vient de ce qu'il est le seul fluide élastique qui entretienne la vie; le deuxième lui est donné, parce que beaucoup de corps en l'absorbant deviennent acides.

X. La combustion consiste donc dans la fixation & l'absorption de l'air vital par les corps combustibles, dans la décomposition de l'air atmosphérique par ces corps. Comme il n'y a que l'air vital qui y serve, on conçoit qu'un corps très-combustible, susceptible d'absorber en entier l'air vital, pourra être employé pour déterminer la proportion des deux fluides atmosphériques, c'est ainsi que le phosphore est adopté aujourd'hui pour l'eudiométrie, ou pour connoître la pureté de l'air; c'est-à-dire la proportion d'air vital qu'il contient.

XI. Comme l'air vital est un gaz, & que beaucoup de corps combustibles, en l'absorbant, le fixent, lui font prendre la forme solide, il faut que l'air vital, en se précipitant ainsi, perde le calorique qui le tenoit sondu, qui lui donnoit la forme de fluide élastique, de-là l'origine du calorique dégagé, ou de la chaleur produite pendant la combustion.

XII. Tous les corps combustibles diffèrent entr'eux, 1°. par la rapidité avec laquelle ils absorbent l'oxygène; 2°. par la quantité qu'ils en absorbent; 3°. par la proportion de calorique qu'ils dégagent de l'oxygène absorbé; 4°. & conséquemment par l'état plus ou moins solide de l'oxygène qu'ils contiennent après avoir brûlé.

XIII. On peut donc définir les corps brûlés des corps combinés avec l'oxygène, on les nomme aussi substances oxygénées, oxydées, & comme le plus grand nombre des corps connus sont ou des corps combustibles ou des corps brûlés, il est permis de soupçonner que plusieurs corps incombustibles naturels dont on ne connoît point la composition, ne sont incombustibles que parce qu'ils sont saturés d'oxygène. Ce soupçon a déjà été vérifié pour un certain nombre.

XIV. Il résulte de plusieurs des axiomes précédents, que quand on brûle un corps combustible pour se procurer de la chaleur, comme on le fait pour adoucir la rigueur de l'hiver, c'est pour tirer de l'air lui-même, en plus grande partie au moins, le calorique qui y est combiné. On peut

même dire que plus l'air est froid, & plus on en tire de chaleur, parce qu'il passe plus d'air sous un même volume dans un foyer quand l'atmosphère est très-froide. On fait assez que le feu de nos foyers est bien plus ardent & bien plus vif lorsque l'air se refroidit tout-à-coup, & l'art d'augmenter la combustion par de l'air condensé qu'on verse sur le bois déjà chaud, est fondé sur ce principe.

XV. La combustion ne se borne donc pas à décomposer l'air de l'atmosphère, en absorbant un de ses principes, mais elle décompose encore l'air vital, en absorbant, en fixant, en solidifiant plus ou moins dans le corps combustible l'oxygène ou la base de l'air vital, & en dégageant le dissolvant de cette base, le calorique, en plus ou moins grande quantité.

XVI. Il y a dans la combustion un autre phénomène intéressant que la chimie moderne est parvenue à expliquer. C'est celui du dégagement de la lumière ou de la production de la flamme. Il est prouvé, que la plus grande partie de la lumière qui constitue la flamme est contenue dans l'air vital, dont elle forme un des principes; 1°. parce que les corps combustibles donnent beaucoup plus de flamme quand ils brûlent dans l'air vital seul, que dans l'air atmosphérique; 2°. parce qu'il y a des corps combustibles qui ne brûlent avec flamme que dans l'air vital; 3°. parce que pour dégager l'oxygène des corps qui le contiennent, en air vital, il ne faut pas seulement le fondre par une quantité plus ou moins grande de calorique, mais parce qu'il est nécessaire d'y ajouter en même-temps de la lumière; 4°. enfin parce qu'il y a des corps brûlés qui par le seul contact de la lumière se laissent enlever l'oxygène: c'est dans ce sens qu'il faut entendre la propriété de *débrûler* & la *décomposition*, qui a été annoncée comme un caractère de la lumière dans le titre premier.

XVII. Ainsi on doit regarder l'air vital comme un composé d'une base solidifiable, pesante, acidifiante, l'oxygène, fondue dans les deux dissolvants, le calorique & la lumière, qui sont par eux-mêmes des corps très-divisés, très-élastiques & sans pesanteur appréciable; la combustion consiste dans une précipitation plus ou moins complète de l'oxygène de ses deux dissolvants.

XVIII. Un corps combustible en brûlant dégage donc non-seulement du calorique de l'air vital, mais encore de la lumière, & chaque corps combustible sépare une quantité différente de lumière de l'air vital, comme il en dégage une quantité différente de calorique. Il est vraisemblable qu'il y a des corps combustibles qui dégagent plus de calorique que de lumière de l'air vital, & d'autres qui en séparent plus de lumière que de calorique,

XIX. L'oxygène fixé dans les corps combustibles brûlés y est donc plus ou moins privé de calorique & de lumière; la densité, la solidité qu'il acquiert alors est une des causes auxquelles est due la plus ou moins grande facilité qu'on éprouve pour séparer des corps combustibles brûlés, l'oxygène en air vital. Il en est qui demandent pour cela plus de calorique que de lumière, & d'autres plus de lumière que de calorique.

XX. Il est aisé de sentir, d'après tout ce qui a été dit jusqu'ici, qu'enlever l'oxygène à un corps brûlé, c'est faire une opération inverse de la combustion. Il n'y a pas de mot dans la langue pour rendre cette opération. On peut dire que l'on *débrûle*, que l'on *défixe* les corps; de-là l'expression de *décombustion*, *défixation*.

XXI. Outre que l'oxygène tient plus ou moins fortement aux corps combustibles, suivant qu'il y est uni plus ou moins solide, & qu'il a perdu plus ou moins de ses dissolvants, calorique & lumière, il adhère encore à ces corps par son attraction, par son affinité propre pour chacun d'eux. On connoît déjà un assez grand nombre de ces affinités de l'oxygène pour les différens corps, & on en a déjà déterminé quelques-unes dans leur rapports.

XXII. C'est en raison de ses affinités qu'on fait passer souvent l'oxygène d'un corps brûlé dans un corps combustible. Il se fait alors une combustion d'autant plus cachée, d'autant plus tacite en quelque sorte, que l'oxygène est plus solide dans le corps brûlé, & plus voisin de la densité du corps qui l'absorbe ou dans lequel il passe. Mais cette espèce de combustion se fait quelquefois avec flamme & chaleur vive; ces phénomènes ont lieu lorsque le corps qui enlève l'oxygène doit le contenir plus solide que celui qui le lui cède. C'est ainsi que le fer, le zinc, l'antimoine, l'arsenic, &c. brûlent avec flamme, lorsqu'on les chauffe avec l'oxide de mercure, auquel ils enlèvent l'oxygène, & qu'ils doivent contenir plus solide que ne le contenoit le mercure.

Applications de ces propositions.

L'obstacle qu'oppose l'air à l'évaporation, à l'ébullition des liquides, à la sublimation, &c.

La dissolution de l'eau dans l'air, & l'état hygrométrique de l'atmosphère.

L'efflorescence & la déliquescence des corps salins, &c.

Les météores aqueux.

Les expériences faites à diverses hauteurs de l'atmosphère.

Les expériences faites dans le vide.

La nature comparée des corps combustibles.

L'augmentation de poids & le changement de nature de ces corps après la combustion.

M m m 2

- L'histoire des corps naturels brûlés.
 La flamme & la chaleur artificielles.
 La théorie des fourneaux.
 Les différents procédés eudiométriques.
 La respiration des différens animaux.
 Le méphitisme par la combustion & la respiration.
 La chaleur animale entretenue, diminuée, augmentée.

La transpiration cutanée & pulmonaire, &c.

TITRE QUATRIÈME.

NATURE ET ACTION DE L'EAU.

I. L'eau existe dans trois états ; solide c'est la glace ; liquide, c'est sa forme la plus connue ; en vapeur ou en gaz.

II. La glace est une cristallisation plus ou moins régulière, transparente, très-faspe, élastique, subile au-dessus de 0 de température, qui laisse encore sortir beaucoup de calorique de son intérieur dans plusieurs combinaisons.

III. La glace à 0 absorbe pour se fondre 60 degrés de température, ou la quantité de calorique nécessaire pour élever une quantité d'eau égale à la sienne, de 60 degrés au-dessus de 0. Sa capacité n'est donc pas la même que celle de l'eau liquide, ce qui tient à la différence de son état, comme il a été dit au titre II. n°. VI.

IV. Toutes les fois que l'eau liquide perd beaucoup de calorique en se combinant, on doit la considérer comme solide dans ces combinaisons ; souvent même elle y est beaucoup plus solide que de la glace à 0 ; c'est de-là que dépend la solidité des mortiers, des cimens où entre la chaux éteinte.

V. L'eau reste éternellement solide sur les montagnes refroidies depuis des siècles par la présence de la glace, & sous les pôles ; elle y forme des espèces de rochers ou des concrétions blanches presque semblables à des pierres.

VI. L'eau liquide & pure est sans saveur, sans odeur, d'une pesanteur 850 fois plus considérable que l'air ; elle forme les fleuves, les rivières, les étangs, les sources, les ruisseaux, &c. Elle occupe les cavités, les sillons, & en général les parties les plus basses du globe.

VII. Elle est très-rarement pure, parce qu'elle dissout dans la terre & la surface l'air, les gaz salins, les sels terreux ; elle agit même sur les pierres les plus solides ; elle les dissout, les charrie, les dépose, les fait cristalliser. C'est pour cela qu'on l'a nommée le grand dissolvant de la nature ; elle donne naissance à beaucoup de phénomènes, &

elle est un des plus grands agens qui modifie sans cesse la surface du globe. Ses mouvements, ses courans, son action, ont changé peu-à-peu la nature des minéraux, & ont créé une espèce de monde nouveau sur l'ancien.

VIII. Toutes les eaux terrestres contiennent d'après cela quelque substance étrangère à la nature de l'eau ; on en reconnoît la présence par sa pesanteur spécifique augmentée, sa faveur plus ou moins fade, terreuse, crue, la difficulté de bouillir, de cuire les légumes, de dissoudre le savon. L'eau qui s'éloigne le plus de ces propriétés étrangères à son caractère essentiel, est la plus pure.

IX. L'eau terrestre, assez pure pour servir aux besoins de la vie & à la plupart des arts, est celle qui coule sur un terrain sablonneux, quarzeux & qui est en contact avec l'air. Celle au contraire qui traverse la craie, les plâtres, les marbres & qui séjourne sur des tourbes, des bitumes, des mines, & dans des cavités souterraines loin de l'atmosphère, est plus ou moins impure.

X. L'art chimique de corriger les eaux impures crues, dures, consiste à les exposer à l'air, les agiter à son contact, les faire bouillir, les distiller, & les combiner ensuite à l'air. Souvent l'addition des cendres, des alcalis, des acides légers, sert à diminuer les mauvaises qualités des eaux, quelquefois même cette addition les fait totalement disparaître. La plupart des corps étrangers qui altèrent la pureté des eaux étant en général ou beaucoup plus volatils ou beaucoup plus fixes que l'eau, la distillation est le moyen le plus sur d'avoir de l'eau pure. Voilà pourquoi les chimistes emploient toujours de l'eau distillée dans leurs expériences.

XI. L'eau liquide étant une combinaison de glace à 0 & de la quantité de calorique suffisante pour élever de 0 à 60 degrés du thermomètre de Réaumur une quantité d'eau égale à la sienne, quand on y ajoute du calorique, elle se raréfie ; lorsqu'elle a acquis 80 degrés au-dessus de 0, elle prend la forme de gaz, elle est en vapeurs ; alors elle est bien plus légère que l'eau liquide, elle occupe un volume beaucoup plus considérable, elle pénètre facilement tous les corps, elle se dissout bien dans l'air ; son effort expansif par une élévation de température, la rend susceptible de mouvoir des masses énormes.

XII. Comme l'eau liquide absorbe de l'air qui la rend légère, l'air absorbe aussi de l'eau & la dissout ; telle est la cause de l'évaporation de l'eau. Cette dissolution de l'eau dans l'air, est sèche & invisible comme lui ; elle fait la raison de la température de l'atmosphère ; l'hygromètre n'indique point exactement cette eau, il n'est point altéré par une dissolution complète, mais il marche en

raison de l'eau qui va se dissoudre, & sur-tout de celle qui se précipite.

XIII. L'eau n'est point un corps simple comme on l'a cru si long-temps. En faisant brûler avec activité un grand nombre de corps combustibles plus ou moins échauffés, comme le charbon & le charbon de terre déjà allumés, le fer rouge, le zinc fondu & rouge, l'huile, &c. l'eau se décompose; elle dépose dans les corps combustibles l'oxygène qu'elle contient.

XIV. A mesure que l'oxygène de l'eau se fixe dans les corps combustibles qu'elle allume, son autre principe susceptible de se dissoudre dans le calorique, forme le gaz inflammable qui se dégage. Comme le second principe est un des élémens de l'eau, on l'a nommé *hydrogène*; & gaz hydrogène, sa dissolution fluide élastique dans le calorique & la lumière. Le dégagement de ce principe en gaz qui a lieu toutes les fois que l'eau est décomposée par un corps combustible, est la cause d'un grand nombre de détonations & de fulminations.

XV. Le gaz hydrogène qu'on obtient dans un grand nombre d'expériences vient toujours de l'eau, soit originairement & par l'effet d'une décomposition ancienne qui l'a fixé en hydrogène dans différens corps, soit par une décomposition instantanée de l'eau elle-même. Ainsi tout gaz inflammable vient de l'eau.

XVI. Des expériences multipliées ont prouvé que l'eau contient à-peu-près 0,85 d'oxygène, & 0,15 d'hydrogène; la synthèse de l'eau, une des plus magnifiques découvertes de la chimie moderne, confirme l'analyse de ce corps; car en unissant par la combustion 0,85 parties d'oxygène & 0,15 d'hydrogène, on obtient 100 parties d'eau pure.

XVII. Quand l'eau est décomposée par un corps combustible, cela ne se fait que par une double affinité, celle de l'oxygène de l'eau pour le corps combustible, & celle du calorique pour l'hydrogène de l'eau. C'est pour cela que la décomposition de l'eau par le feu, le charbon, &c. se fait d'autant plus vite qu'il y a plus de matière calorique employée dans l'expérience. On conçoit par cette nécessité d'une abondance extrême de calorique dans cette opération, comment l'hydrogène, un des élémens de l'eau, peut acquérir une légèreté si grande au-dessus de celle de ce fluide; en effet un pied cube d'eau pesant 70 livres, un pied cube de gaz hydrogène pèse que 61 grains.

XVIII. Le gaz hydrogène, toujours produit par la décomposition de l'eau, entraîne avec lui beaucoup de corps en suspension ou en dissolution, suivant la nature plus ou moins mêlée des corps d'où il se dégage; ainsi il est mêlé de gaz azote,

de gaz acide carbonique, d'air vital; ou bien il tient en dissolution, de l'eau, du carbone, du soufre, du phosphore, de l'arsenic, de l'huile, de l'alcool, de l'éther, &c. Suivant ces différentes substances additionnelles à sa composition intime, il varie dans son odeur, sa pesanteur, son inflammabilité, la couleur de sa flamme, son action sur différentes substances, ainsi que par les produits étrangers à l'eau pure qu'il donne en brûlant. De-là sont venues toutes les espèces & les dénominations différentes de gaz inflammables que l'on a admises, & dont la base générale est toujours le gaz hydrogène.

XIX. Le gaz hydrogène étant une des substances naturelles qui contient le plus de calorique, c'est un des corps combustibles qui en laisse le plus dégager, & qui conséquemment donne le plus de chaleur en brûlant. De-là tous les corps combustibles composés, tels que les huiles, les graisses, & tous ceux qui proviennent des corps organisés en général, dont la base de la composition est due à l'hydrogène, donnent beaucoup de chaleur dans leur combustion. Tels sont les bois, les huiles, les charbons de terre, les bitumes, l'alcool, l'éther, &c.

XX. Il suit aussi de ce qui précède que, les corps combustibles composés qui contiennent beaucoup d'hydrogène dans leur composition, doivent en brûlant exiger une quantité d'oxygène très-considérable, & fournir de l'eau pour produit de leur combustion, entraînant la quantité d'hydrogène qu'ils contiennent. Ainsi une livre d'alcool donne en brûlant plus d'une livre d'eau, &c.

XXI. Les corps combustibles qui décomposent l'eau, sont en général ceux qui ont plus d'affinité, ou une attraction plus forte pour l'oxygène que n'en a l'hydrogène; mais cette attraction est très-favorisée par le calorique, qui tend de son côté à s'unir à l'hydrogène. La grande quantité de calorique peut même rendre l'eau décomposable par des corps qui, à froid, ne seroient pas susceptibles de la décomposer: la lumière y contribue également.

XXII. Les corps combustibles qui ne décomposent point l'eau à quelque température que ce soit, en raison de leur peu d'attraction pour l'oxygène, toujours plus faible dans ce cas que celle qui existe entre l'oxygène & l'hydrogène, doivent au contraire quand elles ont été brûlées par d'autres moyens, être décomposées ou se laisser enlever l'oxygène par l'hydrogène. Voilà ce qui arrive aux oxydes de plomb, de bismuth, &c.

XXIII. On ne connoît encore dans l'art chimique que des moyens de décomposer l'eau par des corps combustibles qui lui enlèvent son oxygène: on n'en a point qui lui enlèvent l'hydrogène &

qui mettent à nud son oxygène ; il paroît que la nature a des instrumens pour opérer cette manière inverse de décomposition de l'eau ; les feuilles des végétaux frappées par les rayons du soleil paroissent décomposer l'eau, absorber son hydrogène, & dégager son oxygène en air vital. Tel paroît être en partie le mécanisme de la végétation, de la formation des huiles, & du renouvellement de l'atmosphère. Voyez le titre IX.

XXIV. Tant que l'hydrogène & l'oxygène tous les deux fondus en gaz par le calorique & la lumière, sont en contact à froid l'un avec l'autre, ils ne se combinent point ; il n'y a point d'inflammation, il ne se forme point d'eau. Mais quand on approche du mélange un corps en ignition, ou quand on le comprime fortement, ou par une secousse violente & brusque quelconque, ces deux gaz commencent à se combiner, la combustion s'opère & l'eau se forme.

XXV. Il paroît qu'il se passe un phénomène analogue dans l'atmosphère ; les détonations atmosphériques, les coups de tonnerre, semblent n'être qu'une combustion de gaz hydrogène & d'air vital, aussi sont-ils souvent suivis d'une pluie rapide ; ce qu'on appelle les grains sur mer, paroissent être dus ainsi à une formation instantanée d'eau dans l'atmosphère, par la combustion rapide du gaz hydrogène & de l'air vital, occasionnée à l'aide de l'électricité & par la nécessité du rétablissement de l'équilibre électrique entre différens nuages, ou entre les nuages & la terre.

XXVI. Une foule de phénomènes chimiques de la nature & de l'art, qui étoient autrefois inexplicables & qu'on comptoit parmi les miracles, sont aujourd'hui des suites nécessaires de la décomposition de l'eau bien appréciée ; l'influence des vérités exposées dans ce titre sur la théorie générale de la chimie, est immense ; on la retrouvera dans tous les titres suivans.

Application des propositions de ce titre.

Les refroidissemens artificiels.

La théorie des glaciers, des glaces polaires.

Les variétés des eaux atmosphériques & terrestres.

L'art de corriger les mauvaises qualités des eaux.

La théorie de l'ébullition de l'eau.

La différence de l'eau bouillie & de l'eau aérée.

La distillation de l'eau en grand ; celle de l'eau salée.

La théorie des brouillards, des rosées.

La théorie de l'hygromètre & des effets hygrométriques.

L'inflammation des corps combustibles par l'eau.

Les gaz dégagés des eaux de marres.

La variété des gaz inflammables.

Les colorations par les gaz.

Les oxidations des métaux, ou la rouille formée par l'air humide.

La théorie des détonations.

Quelques phénomènes des dissolutions métalliques.

Quelques bases de la théorie de la végétation, de la formation des huiles, &c.

TITRE CINQUIÈME.

NATURE ET ACTION DES TERRES
ET DES ALCALIS.

I. Ce que l'on nommoit autrefois la terre exclusivement, ce qu'on regardoit comme un élément & comme la cause de la solidité, de la sécheresse, de l'insipidité, de l'indissolubilité, &c. n'appartient plus qu'à une de ces idées vagues & indéterminées, que l'imagination peut satisfaire encore des succès de l'expérience, avoir créées pour tenir lieu de faits. Aujourd'hui on ne connoit point une terre élémentaire, & au lieu d'une, on a trouvé au moins cinq substances terreuses qui auroient toutes autant de droit pour être nommées des éléments, puisque chacune entre dans la composition de beaucoup de corps.

II. Des cinq substances terreuses que l'on a découvertes, deux sont en quelque sorte plus terreuses, plus sèches, plus susceptibles de dureté, plus insipides, &c., & les trois autres ont des propriétés salines qui les rapprochent des matières alcalines ; on a nommé ces trois dernières substances *salino terreuses*, *terres salines*, *terres alcalines*, *alcalis terreux*. Les deux premières sont la silice & l'alumine ; les trois autres sont la baryte, la magnésie, la chaux.

III. Chacune des cinq terres a des caractères spécifiques qui la distinguent, outre ceux qui lui appartiennent en commun & qu'on pourroit nommer *génériques*. Ces derniers sont la sécheresse, l'inaltérabilité au feu, l'insolubilité, la propriété de ne se pas décomposer & de se comporter dans les combinaisons comme des matières simples & indestructibles.

IV. La silice qu'on a nommée *terre siliceuse*, *terre flicieuse*, *terre quartzueuse*, *terre vitrifiable*, est rude au toucher ; elle use & rase les métaux ; elle est insulfible & apyre, indissoluble dans l'eau & dans la plupart des acides, soluble par les alcalis à un grand feu, & formant le verre avec ces sels ; on la trouve abondamment dans le sable, le quartz, le flint, l'agate, le jaspé, le grès & toutes les pierres scintillantes dont elle fait la base. On ne l'a point décomposée ni imitée par la synthèse. On l'a regardée comme la terre la plus simple, l'élément

terreux, l'origine de toutes les autres terres, mais on n'a point prouvé ces assertions par l'expérience. Elle sert à une foule d'usages, & sur-tout au moulage, à la verrerie, aux cimens, aux poteries, &c.

V. L'alumine, ainsi nommée parce qu'elle fait la base de l'un, appelée *argile* par quelques auteurs, douce sous le doigt, happant à la langue, durcissant au feu, faisant pâte avec l'eau, s'unissant à la plupart des acides, se séchant en feuillets, prenant une grande dureté par son mélange avec l'eau & la silice, convenue en grande quantité dans les argiles, les glaises, les schistes, les stéarites &c. employée dans une foule d'arts, comme prenant & retenant les formes, se cuisant au feu, arrêtant l'eau, inconnue dans la nature intime ou dans ses principes, regardée fausement comme de la silice altérée, divisée, pourrie par l'air & l'eau.

VI. La baryte ou la terre pesante, remarquable par son extrême pesanteur, jamais seule dans la nature & toujours unie aux acides sulfurique & carbonique, prenant une couleur bleue ou verte par le feu & avec le contact de la silice ou de l'alumine des creusets, se dissolvant dans 900 parties d'eau, verdissant la couleur des violettes, ayant une affinité plus grande que les alcalis mêmes avec la plupart des acides, inconnue dans ses principes, soupçonnée d'être un oxide métallique, servant à faire reconnoître par-tout la présence & la quantité de l'acide sulfurique.

VII. La magnésie, très-fine, très-blanche, inaltérable au feu, douce & légère, ressemblant à une scoule, exigeant près de deux mille parties d'eau pour se dissoudre, ne verdissant que légèrement la teinture des violettes & des mauves, formant des sels très-solubles avec les acides, y tenant moins que la chaux qui l'en sépare, & à-peu-près autant que l'ammoniaque qui consilue avec elle & les acides des sels à deux bases, ou une classe de sels triples, existant en quantité notable dans les serpentes, le mica, les ardoises, les amiantes, indécomposable comme les précédentes, & inconnue comme elles dans sa composition.

VIII. La chaux, la plus alcaline des terres, la seule qui ait une saveur âcre, chaude, piquante caustique, désagréable & urineuse, verdissant fortement le sirop de violettes, attirant l'eau atmosphérique dans son exsiccation à l'air, s'échauffant beaucoup avec l'eau & la solidifiant avec elle, en dégageant une très-grande quantité de calorique dans son exsiccation à l'air, se dissolvant dans moins de 700 parties d'eau, attirant l'acide carbonique de l'atmosphère, & formant à la surface de sa dissolution une croûte de craie in proprement nommée *crème de chaux*, inaltérable enfin quand elle est seule, mais se fondant avec la silice & l'alu-

mine, formée de principes ignorés encore, quoique manifestement composée.

IX. La conversion prétendue des terres les unes dans les autres admise par les naturalistes, est une véritable chimère. Il n'est point prouvé que la silice devienne de l'alumine à l'air, que les sels se changent en craie, que la craie se convertisse en magnésie, comme on l'a pensé d'après des indices beaucoup trop légers.

X. Les trois terres alcalines semblent être plus manifestement composées que les deux premières. On est porté à penser que l'azote est un de leurs principes, & que c'est lui qui leur donne ces propriétés alcalines; mais l'expérience n'a point encore fourni la preuve de cette idée; leur formation attribuée avec vraisemblance aux animaux marins qui contiennent beaucoup d'azote dans leur composition, lui donne quelque fondement.

XI. Quant à leur nature métallique qu'on a cru démontrer par de prétendues réductions en métaux des cinq terres, en les chauffant fortement avec du charbon, les globules métalliques très-peux & très-peu abondans qu'on a obtenus, venant manifestement des charbons & de la terre de couelle qu'on avoit mêlés à toutes les terres, & ayant été reconnus pour du phosphore de fer dans le traitement des cinq terres différentes, il est bien prouvé que les terres ne donnent point de substances métalliques.

XII. Si quelques physiciens conçoivent de penser que les terres sont des espèces de corps brûlés, auxquels l'oxygène est extrêmement adhérent, & qui ne peuvent pas être décomposés à cause de leur forte attraction pour ce principe, cette opinion n'est point appuyée sur l'expérience. Les terres s'unissent entre elles 2 à 2, 3 à 3 & même en plus grand nombre par des procédés qui nous sont inconnus, mais que la nature pratique très-en grand, pour donner naissance aux pierres différentes par leur dureté, leur tissu, leur transparence, leur opacité, leur couleur, leur forme, &c. Si l'air n'a point imité ces composés, c'est que le temps, les masses & l'espace lui manquent.

XIII. Les trois terres alcalines forment une espèce de passage entre les terres & les alcalis; ceux-ci sont reconnoissables par leur saveur âcre, brûlante & urineuse, leur causticité, leur action singulière sur la peau & sur toutes les matières animales, l'altération de la couleur bleue des violettes en vert & même en jaune verdâtre, leur déliquescence. On en connoît trois espèces, la potasse, la soude & l'ammoniaque: les deux premières ont été appelées *alcalis fixes*, parce qu'elles se fondent & rougissent au feu avant de se volatiliser; la troi-

fième, on raison d'une propriété appoëe, a été nommée *alkali volatil*.

XIV. La potasse reconnoît aux caractères suivans : elle est sèche, solide, blanche, cristallisée en plaques rhomboïdales, fusible à une température de 90 degrés, très-déliquescence, se dissolvant dans l'eau avec chaleur & odeur fade particulière, se combinant très-bien & formant un composé transparent par la fusion avec la silice. Elle se trouve souvent avec la chaux & combinée avec différens acides dans la nature. On la retire sur-tout des végétaux ; elle reste dans leur cendre après la combustion. On croit qu'elle a de l'analogie avec la chaux, & qu'elle pourroit être formée de cette matière unie à l'azote ; mais cette opinion n'est point prouvée par l'expérience.

XV. La soude retirée des plantes marines par leur incinération, faisant la base du sel marin, ressemble singulièrement à la potasse par sa forme, sa causticité, sa fusibilité, sa déliquescence, sa fusion avec la silice, son action sur les matières animales, &c. On la confondroit avec elle, comme on l'a fait pendant long-temps, si elle ne formoit point avec les acides des sels tous différens de ceux que forme la potasse, & si elle ne cédât pas les acides à cette dernière. On a pensé que la soude étoit un composé de magnésie & d'azote, parce que l'on trouve aussi souvent les sels à base de magnésie avec ceux à base de soude, que l'on rencontre les sels calcaires avec ceux à base de potasse ; mais l'une de ces pensées n'est pas plus vérifiée encore que l'autre.

XVI. L'ammoniaque ou alkali volatil, diffère beaucoup des deux précédentes espèces par sa forme de gaz, lorsqu'elle est dissoute dans le calorique, par celle de liquide lorsqu'elle est dissoute dans l'eau, par son odeur vive & suffoquante, par sa dissolubilité dans l'air, par sa décomposition connue & facile à l'aide de l'électricité électrique, des oxides métalliques, des acides nitrique & muriatique oxygénés. Cette décomposition prouve que l'ammoniaque est composée d'hydrogène & d'azote, & c'est pour cela qu'elle présente souvent des phénomènes d'une matière combustible. On conçoit aussi par-là comment les matières animales fournissent de l'ammoniaque dans la putréfaction.

XVII. Si l'azote est reconnu quelque jour comme le principe qui forme les alcalis, l'atmosphère se trouvera être un composé d'oxygène & d'alcigène, fondus, chacun séparément dans le calorique ; elle offrira un vaste réservoir, où le physicien verra la nature puisant les matériaux des deux classes d'agens composés, les plus actifs & les plus utiles pour un grand nombre de ses opérations.

Applications des propositions de ce titre

L'extraction, la préparation & purification des terres.

La théorie des arts du potier, du briquetier, du tuilier, du faïencier, de la porcelaine.

La théorie des cimens & des mortiers.

Les combinaisons réciproques des terres par la feu.

La lithogénésie.

La nature composée des terres & des pierres.

Les altérations naturelles des pierres.

Les changemens des couleurs par les alcalis.

La vitrification, les procédés des verriers.

L'extraction & la purification de la potasse & de la soude.

La théorie des caustiques alcalins.

Quelques points de la putréfaction.

TITRE SIXIÈME.

NATURE DES CORPS COMBUSTIBLES :

I. Les corps combustibles sont trop variés, trop nombreux & trop importants dans les phénomènes qu'ils présentent, & dans les combinaisons qu'ils éprouvent sans cesse entre eux & avec l'air, pour ne pas les examiner avec soin, & pour ne pas chercher à en bien déterminer les propriétés, les caractères spécifiques.

II. En comprenant sous ce nom toutes les substances susceptibles de se combiner plus ou moins rapidement avec l'oxygène, & d'en dégager le calorique & la lumière, on doit les distinguer en deux classes ; savoir les combustibles simples ou indécomposés & les combustibles plus ou moins composés.

III. Les combustibles simples n'ont pu être jusqu'ici ni décomposés, ni faits de toutes pièces. On ne connoît pas leur nature intime. Ils se rencontrent quelquefois isolés dans le règne minéral ou dans les deux autres règnes, & presque toujours combinés deux à deux. Tels sont le diamant, l'hydrogène, le soufre, le phosphore, le carbone & les métaux. Il faut connoître chacun de ces 6 genres en particulier.

IV. Le diamant, le corps le plus dur que l'on connoisse, très-remarquable par la force avec laquelle il réfrange & décompose la lumière, & par laquelle Newton avoit découvert qu'il étoit très-combustible, se trouve cristallisé en octaèdres, dodécèdres, &c. dans la nature ; il présente quelques espèces différentes par leur tissu, leur densité, leurs couleurs ; il brûle avec une flamme sensible ; il se réduit en vapeurs en brûlant ; on ne connoît pas sa combinaison avec l'oxygène ; peu de matière

matières agissent sur lui, & si ce n'étoit sa combustibilité, on pourroit le regarder comme inaltérable. On ne connoît point encore de composés où il entre comme principe, & il semble qu'il n'obéisse point à l'attraction chimique.

V. L'hydrogène; un des principes de l'eau, formant avec le calorique & la lumière le gaz hydrogène, 16 fois plus léger que l'air, insoluble dans la plupart des corps, dissolvant au contraire le soufre, le phosphore, le carbone, l'arsénic, les huiles, &c., & formant par ces dissolutions les diverses espèces de gaz inflammables, qu'on nomme aujourd'hui *gaz hydrogène sulfuré, phosphoré, carboné, arsenié, huileux*, &c., décomposant plusieurs oxides métalliques, les acides à radicaux simples & connus, donnant à tous les composés combustibles ou non, un pouvoir réfringent considérable, propriété qui avoit fait deviner à Newton que l'eau contenoit un corps combustible, se fixant dans les corps organiques, & y formant un des principes des mixtes combustibles qu'ils contiennent. (Voyez le titre X.)

VI. Le soufre; corps jaunâtre, odorant, électrique, transparent & octaèdre, opaque & prismatique, fusible, éprouvant deux combustions, l'une lente avec une flamme bleue & la formation d'acide sulfureux, l'autre rapide avec une flamme blanche & production d'acide sulfurique, se combinant avec les terres & les alcalis, & devenant dissoluble par ces combinaisons, s'unissant aux métaux & formant les minéraux sulfureux, existant en très-grande quantité, soit seul, soit combiné avec les métaux dans la terre.

VII. Le phosphore; corps blanc, transparent, cristallisé, lamelleux, très-fusible, brûlant de deux manières, lentement à toute température connue avec une flamme blanchâtre, une odeur âcre & formation d'acide phosphoreux; à soixante degrés rapidement, avec une flamme vive & très-brillante, sans odeur sensible & formation d'acide phosphorique, ne se trouvant jamais pur dans la nature, à cause de sa grande combustibilité, s'unissant bien au soufre, aux métaux, se dissolvant dans le gaz hydrogène, enlevant l'oxygène à plusieurs métaux, & les séparant des acides sous leur forme & avec leur éclat métallique, existant dans les minéraux plus même que dans les animaux, auxquels on l'attribuoit autrefois exclusivement.

VIII. Le carbone; matière combustible des charbons, supposée pure & isolée d'avec les terres, les alcalis, les sels, &c. combustible à un grand degré de chaleur, formant avec l'oxygène, l'acide carbonique, ayant la plus forte attraction connue pour l'oxygène, & enlevant ce principe à tous les autres corps brûlés, existant en grande quantité dans les végétaux & les animaux, formant presque

Chimie, Tome 14

seul la base solide des premiers, restant à cause de cela avec leur forme après leur décomposition spontanée ou opérée par le calorique, se dissolvant dans les alcalis, dans le gaz hydrogène, s'unissant aux métaux, formant sur-tout avec le fer & l'acier, le carbure de fer improprement nommé *p. ombagine*, mine de plomb ou crayon noir, trouvé dans tous les régnes.

IX. Les métaux bien connus par leur grande pesanteur & leur brillant; fusibles, cristallisables, combustibles, décomposant l'eau, plusieurs acides s'unissant au soufre, au phosphore, au carbone, entre eux à différentes températures, faisant dans leur état d'oxides, fonction double d'acides avec les terres & les alcalis, & de bases salifiables avec les acides. Ce genre diffère sur-tout des précédents, parce qu'il est nombreux en espèces. Pour prendre une idée de celles-ci, qui sont au nombre de dix-sept bien connues, & qui se multiplieront peut-être encore par de nouvelles recherches, je partage ce genre en cinq sections; dans la première, je comprends les métaux cassans & acidifiables: il y en a trois espèces, l'arsénic, le tungstène & le molybdène. Dans la seconde, je place les métaux cassans & simplement oxidables, j'en compte cinq espèces, le cobalt, le bismuth, le nickel, le manganèse & l'antimoine. La troisième section de ce genre, renferme les métaux demi-ductiles & oxidables au nombre de deux sortes, le zinc & le mercure. La quatrième section appartient aux métaux bien ductiles & facilement oxidables, tels que l'airain, le plomb, le fer & le cuivre. Enfin, la cinquième est consacrée aux métaux bien ductiles & difficilement oxidables, qui sont au nombre de trois espèces, l'argent, l'or & le platine. Comme le titre neuvième est entièrement destiné à offrir les propriétés chimiques les plus importantes des métaux, il suffira d'exposer ici succinctement quelques différences spécifiques de chacun de ces corps, en observant que les noms de *demi-métaux*, de *métaux imparfaits*, de *métaux parfaits*, manifestement dus aux idées erronées de l'alchimie, doivent être bannis du langage d'une science exacte.

A. L'arsénic, en lames d'un gris bleuâtre, brillant, fragile, brûlant avec une flamme bleue, & une odeur d'ail.

B. Le tungstène, d'un gris blanc, grenu, friable, presque infusible, presque insoluble dans les acides, quoique très-oxidable & acidifiable par l'air & le calorique.

C. Le molybdène, en poudre ou grains noirs, brillants, agglutinés, cassans, très-peu fusibles, se brûlant en oxide blanc, volatil, prismatique & acidifiable.

Nnn

D. Le cobalt; grenu, fin, blanc-rosé, fragile & pulvérisable, de difficile fusion, devenant bleu en le fondant avec du verre.

E. Le bismuth; en grandes lames d'un blanc jaunâtre, cassant, très-fusible, très-cristallisable, très-oxidable.

F. Le nickel; gris, grenu, dur & peu fragile, de très-difficile fusion, donnant un oxide verd par le calorique & l'air.

G. Le manganèse; gris-blanc, à grain fin, fragile, très-difficile à fondre, le seul métal qui soit combustible à l'air, qu'il change sur-le-champ de couleur, & se réduit en poussière noire en quelques jours; on doit le conserver sous l'alcool ou l'huile, pour l'empêcher de brûler.

H. L'antimoine; blanc, pur, à grandes lames, fragiles, dur à fondre, à oxide blanc, sublimé & cristallisé, qui joue presque le rôle d'acide en s'unissant aux alcalis.

I. Le zinc; d'un blanc bleu, à grandes lames demi-cassant, pouvant être laminé, facile à fondre, le plus inflammable des métaux, brûlant quand il est rouge avec une belle flamme blanche jaunâtre, décomposant fortement l'eau.

K. Le mercure; fusible à 30 — 0 degrés du thermomètre de Réaumur, congelable à 33 — 0 degrés du même thermomètre, s'oxidant en noir (*ethiops persi*) par la simple division, ou s'éteignant par ce simple procédé dans toutes les matières visqueuses ou épaisses avec lesquelles on le trituré.

L. L'étain; blanc éclatant, mou, léger, peu sonore, rayable par l'ongle, très-fusible, très-combustible, donnant un oxide blanc qui trouble la transparence du verre, & le convertit en email.

M. Le plomb; bleuâtre, terne, lourd, mou, très-fusible, donnant un oxide le plus vitrifiable de tous, d'une couleur jaune de topaze.

N. Le fer; blanc, fibreux, le plus tenace des métaux, très-dur à fondre, très-combustible; le seul attirable à l'aimant, décomposant très-bien l'eau, se réduisant en poussière à l'air, s'unissant au charbon qui le convertit en acier, le seul métal abondant dans les deux règnes organiques.

O. Le cuivre; d'un beau rouge éclatant, très-doux, très-ductile, odorant, venéux, combustible avec une flamme verte, formant un oxide vert à l'air.

P. L'argent; blanc, pur & brillant, sans odeur, sans saveur, très-ductile, non oxidable par le calorique & l'air, brûlant avec une flamme verdâtre par la commotion électrique, noircissant par le soufre en vapeur, inaltérable par l'air seul.

Q. L'or; d'un beau jaune brillant, très-ductile, moins combustible & oxidable que l'argent, donnant, par la commotion électrique, un oxide d'un beau pourpre.

R. Le platine; le plus lourd des métaux, blanc, gris, peu brillant, le plus infusible, le moins combustible, le moins alterable des métaux; il deviendra quelque jour un des plus précieux instruments des arts.

X. Les corps combustibles composés sont tous ceux qui résultent de la combinaison de plusieurs des combustibles précédents entr'eux; ainsi les dissolutions de soufre, de carbone, de phosphore, d'arsenic dans le gaz hydrogène, sont des gaz inflammables composés. La combinaison du soufre & du phosphore, celle du carbone avec le fer, toutes celles des métaux avec le soufre, le phosphore, entr'eux, sont des corps combustibles composés. Ils sont presque toujours les combustibles qu'offre la nature; l'art s'occupe de les séparer les uns des autres, & de les obtenir purs & isolés.

XI. En comparant les propriétés des corps combustibles composés à celles des combustibles simples, on reconnoît que les premiers sont quelquefois plus avides d'absorber l'oxigène que les autres étoient seuls, comme beaucoup d'alliages & de sulfures métalliques: quelques-uns sont, au contraire moins portés à se brûler, en raison de la forte attraction qu'ils exercent les uns sur les autres, comme le sont en général les métaux phosphorés. Il en est même quelques-uns qui sont long-temps inaltérables à l'air, & qui paroissent avoir perdu par leur combinaison intime, la propriété combustible, ne l'exercent que lorsqu'ils sont très-fortement échauffés; tel est le carbure de fer, qui est employé même avec quelques succès pour garantir le fer de la rouille.

XII. L'hydrogène & le carbone, unis ensemble d'une manière très-intime dans les filières trédiliées des végétaux, & contenant souvent de petites portions de terre, d'alcalis, d'acides, & sur tout d'oxigène, forment les bitumes, les huiles, les résines, qui, quoique tendant à se brûler & à se séparer, restent cependant quelque temps dans leur équilibre de combinaison, jusqu'à ce qu'une élévation rapide dans leur température, en même-temps que le contact de l'air ou de l'eau vienne faire cesser cet équilibre en isolant les éléments & les combinaisons, & en

les unissant séparément à l'oxygène; aussi les produits de ces combustibles composés sont-ils toujours de l'eau & de l'acide carbonique. Il en est de même de l'alcool & de l'éther formés par des modifications des principes des végétaux, & qui, en dernière analyse, ne sont que des combinaisons d'hydrogène & de carbone avec plus ou moins d'eau & d'oxygène. Voyez les titres X. XI & XII.

XIII. Cette exposition des différentes espèces de corps combustibles, & de leurs principales propriétés caractéristiques, fait voir quel rôle jouent ces corps dans les phénomènes du globe; elle autorise à partager presque tous les produits naturels en deux grandes classes, les corps combustibles & les corps brûlés; on voit dans les masses & les actions des premiers, la cause des météores inflammables, des chaleurs partielles, des volcans, des changemens perpétuels de la surface de la terre, &c.; & dans l'existence des seconds, la diversité & le nombre des acides, des sels composés, des oxides & des sels métalliques qui varient de mille manières l'aspect des mines, leur décomposition réciproque, leurs altérations par l'eau l'air & la lumière; enfin, on trouve dans les végétaux des machines que la nature a organisées, pour combiner intimement plusieurs de ces corps combustibles les uns avec les autres, & pour en former des composés d'autant plus utiles à ses grands desseins, qu'ils sont moins durables & moins permanens.

• *Applications principales de ces axiomes.*

L'histoire détaillée de la combustion de chaque corps combustible en particulier.

L'histoire des terrains sulfurés, de l'acide sulfurique natif.

Les phénomènes des gaz inflammables naturels dans les carrières, les mines, l'atmosphère, &c.

Les propriétés des sulfures terreux, alcalins & métalliques.

Les conversions des sulfures en sulfites & en sulfates par l'action de l'air & de l'eau.

Les propriétés, l'extraction, les combinaisons du phosphore, les phosphures métalliques.

L'existence des carbures métalliques dans la nature.

Les phénomènes tenant à la densité, à la pesanteur, à la ductilité, à la fusibilité des métaux.

Les propriétés des alliages & leurs utilités.

La formation des mines secondaires, de transport, des sels métalliques naturels.

Les volcans, les eaux sulfureuses & thermales.

Les bitumes, la comparaison du soufre, du charbon, des corps combustibles simples avec les huiles, &c. &c.

TITRE SEPTIÈME.

FORMATION ET DECOMPOSITION DES ACIDES.

I. Tous les acides se ressemblant par leur faveur, leur manière de colorer en rouge les substances végétales, leur tendance pour s'unir aux terres, aux alcalis & aux oxides métalliques, ainsi que par leur propriété d'attirer & d'être attirés fortement, comme le disoit Newton, il étoit naturel de penser qu'ils se ressembloient aussi dans leur nature intime, & qu'ils avoient quelque principe homogène. C'est aussi ce que l'analyse chimique, aidée par les nouveaux moyens qui sont en sa puissance, a mis hors de doute.

II. Tout acide contenant de l'oxygène & perdant de son acidité à mesure & à proportion qu'on lui enlève ce principe, on doit concevoir les acides comme des corps brûlés ou oxygénés, qui se rapprochent tous les uns des autres par la présence du principe acidifiant.

III. Il y a deux manières de connoître la nature des acides; l'une de les former, de les composer de toute pièce en brûlant, en unissant à l'oxygène les corps qui sont susceptibles de le devenir par cette union; l'autre de les décomposer, de les débrûler, en leur enlevant l'oxygène par des corps qui ont beaucoup d'affinité avec ce principe.

IV. Considérés sous ce dernier point de vue; tous les acides connus peuvent être partagés en trois classes, savoir, 1°. ceux qui peuvent être composés & décomposés, & qu'on connoît le plus complètement; 2°. ceux qu'on peut seulement composer, mais qu'on ne peut décomposer; ceux-ci sont encore bien connus; 3°. ceux qu'on n'a ni composés ni décomposés, & dont on ne connoît pas du tout la nature.

V. Sur près de 30 espèces d'acides connus; comme il n'y en a que trois espèces, à la rigueur, qui sont dans le dernier cas, qu'on n'a pu ni composer ni décomposer, & dont on ignore conséquemment la nature, cela n'empêche pas qu'on regarde cette classe de corps comme bien déterminée, & qu'on puisse les considérer dans leurs propriétés générales & par rapport à leur composition.

VI. Tous les acides étant des composés d'oxygène avec différens corps, le premier principe est la cause de leur ressemblance, de leurs propriétés communes, & le second, différenciant dans chacun d'eux, peut servir à les caractériser en particulier. C'est pour cela qu'on nomme les matières qui varient dans les acides, les radicaux, les acidifiables.

Nnn

VII. Ainsi tous les acides sont des combinaisons de radicaux ou de matières acidifiables, différentes dans chaque espèce, avec l'oxygène qui est le même principe dans tous ; d'où il suit que leurs propriétés communes, leurs caractères d'acides dépendent de l'oxygène, leurs propriétés particulières, leurs caractères spécifiques sont dus à leurs radicaux.

VIII. Le mot *acide* indiquant la nature générale & identique de ces corps, forme le nom générique, & le nom particulier du radical qui y est contenu, peut & doit servir à désigner chaque acide en particulier. Ainsi le soufre est le radical de l'acide nommé *sulfurique*, le phosphore celui du *phosphorique*, le carbone celui du *carbonique*, &c.

IX. Quoique cette nomenclature ait l'avantage d'exprimer la nature de chaque acide, elle n'a pas pu être employée pour tous, soit parce que le radical de quelques-uns est inconnu, soit parce qu'il est lui-même un composé de plusieurs principes qui exigeroient des mots trop multipliés pour être désignés.

X. Les radicaux acidifiables peuvent contenir des quantités différentes d'oxygène, & ils ont sous ce point de vue deux états d'acidité ; le premier est celui où ils contiennent le moins d'oxygène possible pour être acides. Alors leur acidité est ordinairement très-foible, & ils contiennent que légèrement aux bases susceptibles de former avec eux des sels. Dans la nomenclature méthodique moderne, on rend compte de cet état de combinaison & d'acidité, en terminant les noms de ces acides foibles, en *eux*. C'est ainsi qu'on dit les acides sulfureux, nitreux, phosphoreux, acéteux, tartareux, &c. Le second état des acides est celui où ils contiennent plus d'oxygène, où ils en sont ordinairement complètement saturés ; alors ils ont toute la force, toute l'attraction qu'ils peuvent avoir ; & cet état est exprimé dans la nomenclature par la terminaison en *ique* ; ainsi on dit les acides sulfurique, nitrique, phosphorique, acétique.

XI. Par rapport à la proportion de l'oxygène uni aux radicaux acidifiables, on peut encore donner une plus grande latitude aux considérations présentées dans le précédent article. Chaque radical peut être considéré dans quatre états ; 1°. contenant très-peu d'oxygène, pas assez pour lui donner encore la nature acide, alors il n'est qu'un oxide ; tel est le soufre coloré en rouge ou en brun par l'oxydation à l'air & par la chaleur insuffisante pour l'enflammer ; c'est de l'oxide de soufre ; 2°. contenant plus d'oxygène que dans le premier cas, assez pour être déjà un acide foible ; tel est l'acide sulfureux, &c. ; 3°. contenant encore plus d'oxygène que dans le second cas, & devenu un acide puis-

sant : tel est l'acide sulfurique ; 4°. enfin contenant une dose d'oxygène au delà de celle qui le constitue acide puissant, acide en *ique* ; alors on le nomme *acide oxygéné*, ou même *sur-oxygéné*.

XII. D'après les considérations précédentes, on a deux manières de passer à volonté les acides avec ces proportions diverses d'oxygène, l'une est de combiner leurs radicaux avec les quantités déterminées d'oxygène nécessaires pour les mettre dans l'état que l'on desire, comme on le fait pour le soufre, le phosphore, l'arsenic ; l'autre est d'enlever aux acides qui contiennent le plus possible d'oxygène, des proportions diverses de ce principe, par des corps combustibles qui en sont très-avides.

XIII. Ce dernier moyen qui est fondé sur les attractions de l'oxygène pour les différents corps combustibles, est souvent employé avec succès pour décomposer entièrement les acides, en leur enlevant tout l'oxygène qu'ils contiennent ; c'est par lui que les acides enflamment les corps combustibles. Il suffit pour cela que les acides dont on se sert ne contiennent pas l'oxygène solide, & que les matières inflammables qu'on met en contact avec eux, puissent l'absorber plus solide qu'il n'est dans les acides. Aussi tous les acides décomposables par plusieurs corps combustibles, ne les enflamment-ils pas.

XIV. Le charbon est employé avec succès pour décomposer tous les acides qui en sont susceptibles ; mais il n'est pas le seul corps combustible qui puisse y servir ; la plupart des métaux, le phosphore, le soufre, l'hydrogène sec & solide, comme il est dans les composés végétaux, ont aussi cette propriété.

XV. Tous les acides dont la différence spécifique est due, comme il a été dit, à leurs radicaux particuliers, peuvent être partagés en quatre classes par rapport à la nature connue ou inconnue, simple ou composée de ces radicaux.

A. La première classe renferme les acides à radicaux connus & simples, c'est-à-dire, formés par des substances combustibles, indécomposées, unies à l'oxygène ; elle comprend les espèces suivantes : l'acide sulfurique, l'acide nitrique, l'acide carbonique, l'acide phosphoreux, l'acide arsenique, l'acide tartarique & l'acide molybdique.

B. La seconde classe contient les acides à radicaux inconnus, mais fortement soupçonnés d'être simples ; on peut compter dans cette classe l'acide muriatique, l'acide fluorique & l'acide boracique.

C. Dans la troisième classe, je range les acides à radicaux composés binaires ; tels sont tous les acides végétaux, dont le radical commun est un

composé d'hydrogène & de carbone ; l'acide succinique doit être aussi placé dans cette classe.

D. Enfin la quatrième classe appartient aux acides dont les radicaux sont des composés de trois corps au moins ; elle renferme les acides animaux , qui ont pour radicaux des combinaisons de carbone , d'hydrogène & d'azote.

XVI. Non-seulement chacune des classes d'acides présentées dans le numéro précédent , peuvent être distinguées par des caractères généraux appartenant à chacune d'elles , mais encore chaque acide en particulier a des propriétés qui le caractérisent , & qui empêchent qu'on ne puisse le confondre avec un autre. On peut même exposer ces propriétés par des expressions simples , faciles , par des phrases semblables à celles que les naturalistes emploient d'après Linnéus. L'équité de cette méthode va être tracée dans les numéros suivans.

XVII. Les acides à radicaux simples & connus sont tous décomposables par les corps combustibles qu'ils brûlent avec plus ou moins d'activité , & se réduisent ainsi à leurs radicaux ; c'est même par cette décomposition , qu'on a trouvé la nature de leurs radicaux. (On peut aussi les faire de toutes pièces , en unissant leurs radicaux à l'oxygène.

Les acides à radicaux inconnus , & soupçonnés des corps simples par de fortes analogies , n'ont d'autre caractère classique que de ne pas pouvoir être décomposés par les corps combustibles , & de ne pas être formés par l'art.

Les acides à radicaux binaires , ou les acides végétaux , sont reconnaissables & caractérisés , 1°. parce qu'ils sont tous décomposables par un grand feu & par une addition suffisante d'oxygène ; 2°. parce que dans cette décomposition ils donnent de l'eau & de l'acide carbonique , formés par l'isolement de leur hydrogène & de leur carbone , unis chacun a part à l'oxygène ; 3°. parce qu'ils se décomposent spontanément , lorsqu'on les expose dilués dans l'eau à une température au-dessus de 10 degrés ; 4°. par ce qu'ils ne peuvent pas être décomposés par les corps combustibles connus , parce que leur radical est composé des deux substances qui ont jusqu'ici la plus forte attraction possible pour l'oxygène ; 5°. enfin parce qu'ils peuvent être convertis les uns dans les autres ; ce qui tient à ce qu'ils ne diffèrent entr'eux que par les proportions de leurs trois principes.

Les acides à radicaux ternaires & plus composés encore , ou les acides animaux , quoique les moins connus de tous , ont aussi quelques propriétés qu'on peut regarder comme des caractères classiques. Telle est la propriété de donner de l'ammoniaque lorsqu'on les décompose par le feu , celle de fournir de l'acide prussique par un changement de proportion dans leurs principes.

XVIII. A ces caractères classiques il faut ajouter les caractères spécifiques , en essayant un langage analogue à celui des botanistes & des zoologistes.

Acides de la 1^{re} classe à radicaux simples & connus :

A. L'acide sulfurique , formé de soufre & d'oxygène , par la combustion du premier , inodore , deux fois plus pesant que l'eau , très-caustique , moins volatil que l'eau , donnant du gaz acide sulfureux & du soufre par sa décomposition due au charbon rouge , aux métaux , &c. , formant des sulfates avec les terres , les alcalis & les oxides métalliques.

B. L'acide sulfureux , très-odorant , très-volatil , gazeux , détruisant les couleurs bleues végétales , enlevant les taches produites sur le blanc par ces couleurs , enlevant peu-à-peu l'oxygène à l'air & a beaucoup d'acides ou d'oxides , formant des sulfites avec les bases terreuses & alcalines.

C. L'acide nitrique , liquide , blanc , caustique , d'une odeur forte & nauséuse , forme d'azote & d'oxygène , enflammant le soufre , le charbon , le zinc , l'étain , les huiles , perdant par les corps combustibles des proportions variées d'oxygène , & donnant naissance ainsi à l'acide nitreux , au gaz nitreux , détruisant les couleurs , brillant & jaunissant les matières végétales & animales , les convertissant en acides , décomposant l'ammoniaque , produit par les matières animales en putréfaction , formant les nitrates avec les terres , & les alcalis , restant peu uni aux oxides métalliques & tendant à les acidifier.

D. L'acide nitreux , acide nitrique moins un peu d'oxygène , en gaz rouge ou orangé , très-volatil , décolorant les végétaux , devenant bleu & vert avec l'eau , jaunissant l'acide nitrique auquel il est uni en diverses proportions , donnant du gaz nitreux par le contact des combustibles , formant les nitrites avec les terres & les alcalis.

E. L'acide carbonique , formé de carbone & d'oxygène , gaz plus lourd que l'air & le déplaçant , remplissant des cavités souterraines , se dégageant des liqueurs en fermentation vin-use , éteignant les bougies allumées , tuant les animaux , rougissant seulement les bleus végétaux légers , précipitant l'eau de chaux en craie , redissolvant la craie dans l'eau , minéralisant les eaux acidules , la baryte , la chaux , le cuivre , le fer , le plomb dans les carrières & les mines , formant les carbonates avec les terres , les alcalis & les oxides métalliques.

F. L'acide phosphorique , composé de phosphore & d'oxygène unis par combustion rapide & complète , liquide , épais ou solide , vitrifiable par le feu , dissolvant la silice dans la vitrification ,

décomposable par le carbone qui le rappelle à l'état de phosphore, & formant des phosphates avec les terres, les alcalis & les oxides métalliques.

G. L'acide phosphoreux ne diffère du phosphorique que par moins d'oxygène, volatil, odorant, enlevant l'oxygène à beaucoup de corps, formant des phosphites avec les bases terreuses, alcalines & métalliques.

H. L'acide arsénique formé du métal arsénic & d'oxygène (la combustion ne réduit l'arsenic qu'en oxide ; l'acide nitrique ou l'acide muriatique oxygéné ajoute à cet oxide la quantité d'oxygène nécessaire pour qu'il devienne acide arsénique ;) fixe, fusible en verre, décomposable par une grande quantité de lumière & de calorique, ainsi que par beaucoup de corps combustibles, formant des arsénates avec les terres, les alcalis, & les oxides métalliques. L'oxide d'arsenic s'unissant aussi avec les bases, peut être regardé comme une espèce d'acide arsénieux.

I. L'acide tungstique, composé du métal tungstène & d'oxygène, en poudre blanche ou jaunâtre, fixe, infusible, peu dissoluble, réductible en tungstène par l'hydrogène, le carbone &c. formant le tungstate de chaux natif nommé *Pierre pesante*, & le tungstate de fer natif ou le *volfram* des minéralogistes.

K. L'acide molybdique, composé du métal molybdène, d'une saveur âpre & métallique comme les deux précédens, en poudre blanche, devenant bleu par le contact des corps qui le réduisent, & repassant par la perte de l'oxygène à l'état de molybdène.

Acides de la II^e classe à radicaux inconnus.

XIX. Les acides à radicaux inconnus, & soupçonnés simples sont au nombre de trois ; savoir, l'acide muriatique, l'acide fluorique, & l'acide boracique.

A. L'acide muriatique, gazeux ou fluide, d'une odeur piquante, insalubre par tous les corps combustibles connus, enlevant au contraire l'oxygène à beaucoup de corps brûlés, & sur-tout aux oxides métalliques, devenant alors *acide muriatique oxygéné* ; celui-ci est remarquable par sa couleur jaune verdâtre, son action épaississante & resserante sur les organes des animaux, sa propriété de décolorer les substances végétales, de brûler & d'enflammer la plupart des corps combustibles, & celle de former avec la potasse un sel qui met rapidement le feu aux matières inflammables chauffées & qui donne l'air vitol le plus pur connu.

B. L'acide fluorique, gazeux, formant dans l'air une vapeur blanche très-épaisse, rongant le verre, dissolvant la terre silicee, formant avec cette

terre un gaz permanent, dont l'eau sépare une partie de la silice.

C. L'acide boracique, sec, cristallisé en lames hexaèdres, fusible en verre, peu sapide, peu dissoluble, fondant avec la silice, ayant des affinités très-foibles, & cédant les bases terreuses & alcalines à presque tous les autres acides.

Acides de la III^e classe à radicaux binaires.

XX. Les acides à radicaux mixtes ou composés binaires, appartiennent spécialement aux végétaux, & sont formés par l'union de l'hydrogène carboné ou du carbone hydrogéné avec l'oxygène en différentes proportions, ce qui explique comme il a été dit plus haut, leur conversion réciproque les uns dans les autres. Ces acides étant assez nombreux, & pouvant encore le devenir davantage par les découvertes de tous les jours, je les ai divisés en cinq genres, par rapport à leur nature & à leur formation. Le premier genre renferme les acides purs formés dans les végétaux, en y comprenant l'acide succinique qui a une origine manifestement végétale : il y a cinq espèces dans ce genre, savoir l'acide succinique, l'acide citrique, l'acide gallique, l'acide malique & l'acide benzoïque. Le second genre comprend les acides végétaux tout formés, mais en partie saturés de potasse ; on les nomme acides sels, il y en a deux espèces, l'acide lactique, l'acide oxalique. Dans le troisième genre, je range les acides particuliers formés par l'action de l'acide nitrique ; & par la précipitation de son oxygène sur les substances végétales ; il n'y a encore que l'acide camphorique de distinct dans ce genre. Dans le quatrième je place les acides que l'on forme dans les végétaux traités par le feu ; tels sont les acides pyromuriques, pyroligneux & pyrotartareux. Le cinquième genre renferme les acides végétaux qui sont produits par la fermentation ; on ne connoit encore que l'acide acétique dans ce genre. Voici les caractères spécifiques de ces 12 acides.

A. L'acide succinique, dégage & sublimé du succin chauffé, d'une odeur bitumineuse forte, huileuse & inflammable, volatil, cristallisable en aiguilles, formant des sels cristallisables permanens, surtout avec les oxides métalliques, & adhérent plus aux trois terres alcalines qu'aux alcalis.

B. L'acide citrique, cristallisable en lames rhomboïdales, non convertible en acide oxalique par l'acide nitrique, ayant plus d'affinité avec les terres qu'avec les alcalis, décomposable spontanément dans l'eau & par le feu.

C. L'acide gallique, abondant dans la noix de Galle, cristallisé en petites aiguilles grises ou jaunâtres, styptiques, précipitant en noir les dissolutions de fer, & réduisant les oxides métalliques

unis aux autres acides, convertible en acide oxalique par l'acide nitrique.

D. L'acide malique, abondant dans les pommes, non cristallisable, convertible en acide oxalique par l'acide nitrique, se formant en même-temps que l'acide oxalique & même avant lui, dans les végétaux traités par l'acide nitrique.

E. L'acide benzoïque, retiré du benjoin, des storax, du baume du Pérou, de la vanille, par la chaleur, cristallisable en prismes comprimés, d'une odeur aromatique lorsqu'on le chauffe, fusible à un feu doux, volatil, inflammable, peu soluble dans l'eau, dissoluble & non décomposable par l'acide nitrique.

F. L'acide tartareux, formé d'acide tartareux, en partie saturé de potasse, existant dans les vins, cristallisable, décomposable par le feu, donnant beaucoup d'acide carbonique & d'huile, & laissant beaucoup de carbonate de potasse; fournissant aussi à la distillation de l'acide pyrotartareux, peu dissoluble, décomposable dans l'eau, formant des sels triples avec les alcalis & les oxides métalliques, devenant très-dissoluble par l'addition du borax & de l'acide boracique; l'acide tartareux retiré de l'acide cristallisable en aiguilles entrelacées, inaltérable à l'air, très-dissoluble, reformant de l'acide par l'addition d'un peu de potasse, décomposant les sulfates, nitrates & muriates de potasse & de soude jusqu'à la formation en acide, convertible en acide oxalique par l'acide nitrique.

G. L'acide oxalique, formé d'acide oxalique en partie saturé de potasse, extrait du suc d'oseille, cristallisé en parallélipèdes, peu décomposable par le feu, ne donnant pas d'huile, peu soluble, formant des trifides avec les terres & les alcalis; l'acide oxalique qu'on en extrait, très-dissoluble, très-cristallisable, enlevant la chaux à tous les autres acides, parfaitement semblable à celui qui est formé par l'acide nitrique mis en contact avec toutes les matières végétales; inaltérable par l'acide nitrique, le moins décomposable & le plus oxygéné des acides végétaux.

H. L'acide camphorique, formé par l'action de l'acide nitrique distillé sur le camphre, cristallisable en parallélipèdes, formant des sels bien cristallisables avec les terres & les alcalis, n'enlevant pas la chaux à tous les autres acides, comme le fait l'acide oxalique; très-peu connu.

I. L'acide pyrotartareux, modification de l'acide tartareux faite par le feu, d'une odeur & d'une couleur de brûlé, très-rarefiable & se boutoufflant beaucoup par le calorique, non cristallisable, formant avec les bases terreuses & alcalines des

sels différens de ceux que donne l'acide tartareux; peu connu.

K. L'acide pyromuqueux, formé par la distillation des gommés, du suc, des féculés, d'une odeur vive, agréable, de caramel, volatil, tachant la peau en rouge, décomposable par un grand feu; peu connu.

L. L'acide pyrofluigneux, tiré des bois par distillation, d'une odeur piquante, fétide, non cristallisable, décomposable par un grand feu, volatil, formant des sels particuliers avec les terres, les alcalis & les oxides métalliques, ayant des attractions particulières pour ces bases, du reste aussi peu connu que les deux précédens.

M. L'acide acéteux, formé par la fermentation du vin, nommé à cause de cela vinaigre, d'une saveur & d'une odeur agréables, volatil & liquide, décomposable par un grand feu, susceptible de se surcharger d'oxygène quand on le distille avec des oxides métalliques, & devenant par-là de l'acide acétique ou vinaigre radical, beaucoup plus acide, plus âcre, plus odorant que l'acide acéteux, inflammable & mêlé d'alcool.

Acides de la IV^e classe à radicaux ternaires.

XXI. Les acides à radicaux composés ternaires, & qui ont été indiqués comme formés en général de carbone, d'hydrogène & d'azote unis à l'oxygène, appartiennent plus en particulier aux substances animales; on les connoît moins encore que les précédens: mais en rappelant ici qu'ils fournissent tous de l'ammoniaque par leur décomposition au feu & de l'acide prussique par un changement de proportion dans leurs principes, je ferai observer que l'acide prussique semble être à ce genre d'acides en général ce qu'est l'acide oxalique aux acides végétaux, & j'ajouterai qu'en convertissant les substances animales en acide oxalique par l'action de l'acide nitrique, il se forme constamment par la même action de l'acide prussique qui se dégage en vapeurs.

Il y a 7 acides animaux connus, qui paroissent appartenir tous à ce genre de composés; savoir l'acide lactique, l'acide saccholactique, l'acide féculique, l'acide lithique, l'acide formique, l'acide bombique & l'acide prussique. Cherchons dans chacun quelques propriétés qui les caractérisent.

A. L'acide lactique, formé avec un peu d'acide acéteux dans le lait agité spontanément, non cristallisable, soluble dans l'alcool, donnant à la distillation un acide analogue à l'acide pyrotartareux, formant des sels déliquescents avec les bases terreuses & alcalines, décomposant les acétites alcalins.

B. L'acide saccholactique, se précipitant en poudre blanche de l'acide oxalique formé par le

sacré de lait & l'acide nitrique, peu sapide, presque point foluble, décomposable par le feu, & donnant alors un sel sublimé de l'odeur du benjoin, formant des sels cristallifables avec les alcalis, très peu connu.

C. L'acide sébacique, retiré de la graisse par l'action du feu, séparé aussi de la graisse par les alcalis & la chaux à l'aide d'une chaleur forte, liquide, blanc, fumant, très-âcre dans son odeur & sa saveur, formant des sels cristallifables & fixes avec la terre & les alcalis, décomposant le muriate de mercure, décomposable par une forte chaleur.

D. L'acide lithique, existant dans l'urine humaine, formant la pierre de la vessie, sec, cristallisé en aiguilles plates, presque insipide & indissoluble, en partie volatil, décomposable à une forte chaleur, donnant du carbonate ammoniacal & de l'acide prussique par le feu, formant une dissolution d'un beau rouge avec l'acide nitrique, dissoluble dans les alcalis caustiques, se précipitant de l'urine des fiévreux avec une couleur gris de lin ou rougeâtre.

E. L'acide formique, tiré des fourmis par la distillation ou l'expression avec de l'eau, rougissant les fleurs bleues dans les insectes vivants, s'en dégageant en une vapeur odorante très-forte, analogue à celle du mûle, tuant les animaux sous cette forme de gaz, pouvant servir aux usages économiques comme le vinaigre, décomposable par un grand feu, enlevant l'oxygène à l'acide muriatique oxigéné, souvent plus fort que l'acide sulfurique, formant avec les alcalis & les terres des sels cristallifables & non déliquescents.

F. L'acide bombique, contenu dans un réservoir placé près de l'anus de la chrysalide du ver à soie, extrait de ce réservoir, soit par l'expression, soit par l'alcool, mêlé d'une huile brune & d'une gomme dans le ver, liquide, d'une couleur jaune ambrée, décomposable spontanément, donnant de l'acide prussique par la distillation & l'acide nitrique; inconnu dans ses combinaisons.

G. L'acide prussique, saturant le fer & le colorant dans le bleu de Prusse, obtenu aujourd'hui par la distillation du sang, par l'action de l'acide nitrique sur l'albumine, le gluten, les fibres animales, &c. & se dégageant à mesure qu'il se forme de l'acide oxalique, remarquable par une odeur fétide & vireuse analogue à celle des amandes amères, très-décomposable par un grand feu & donnant alors de l'ammoniaque, susceptible de prendre la forme de gaz, enlevant les oxides métalliques à un grand nombre d'autres acides, pouvant être formé de toutes pièces par l'union de l'hydrogène, du carbone, de l'azote & de l'oxygène,

peu acide dans sa saveur, contenant à ce qu'il paroît très-peu d'oxygène.

XXII. Il résulte de tout ce qui a été établi dans les numéros précédents, que tous les acides divisés en deux classes, par l'état simple ou composé de leurs radicaux, diffèrent sur-tout entre eux parce que les premiers ne peuvent pas être convertis les uns dans les autres, attendu qu'il y a fort loin des propriétés d'un radical simple, du soufre par exemple, à celles d'un autre, tel que le phosphore, & qu'il faudroit commencer par convertir réciproquement leurs radicaux, ce qui est bien loin d'être au pouvoir de l'art; les seconds acides au contraire formés en général d'une base composée d'hydrogène, de carbone & d'azote, unie à l'oxygène, paroissent ne différer les uns des autres que par les proportions diverses des deux ou trois principes qui entrent dans la composition de leur radical, & par celle de l'oxygène qui lui est uni, tendent à éprouver sans cesse des variations dans leur composition, les éprouvent sur tout par des changements de température, d'humidité, &c., & passent spontanément à différens états; c'est ainsi que par les seuls efforts de la végétation, les plantes contiennent des acides divers à différentes époques. C'est ainsi que les dissolutions des acides végétaux dans l'eau s'altèrent, changent de nature, & finissent par donner toutes une quantité quelconque d'acide carbonique & d'eau, en se réduisant à leur dernier terme de décomposition.

XXIII. En saisissant bien ces vérités, il est facile de sentir qu'il reste encore non-seulement à découvrir la nature de plusieurs acides dont on ignore la composition, mais encore un nombre peut-être assez considérable de nouveaux acides dans les plantes & dans les animaux. Car parmi les produits de ces êtres organisés dont on a commencé à rechercher les principes, on est bien loin d'avoir épuisé toutes les combinaisons possibles, que le plus léger calcul fait appercevoir, entre le carbone, l'hydrogène, l'azote & l'oxygène. C'est à cet ordre de recherches & de découvertes qu'on doit rapporter l'examen des acides indiqués dans le liège, dans les pois-chiches, & dans beaucoup d'autres matières végétales, ainsi que celui de l'acide du caillot de sang, *acide craurique*, de l'acide du suc gastrique, &c. On reconnoitra aussi par les articles du titre suivant, que la plupart des méaux brûlés paroissent rentrer dans la classe des acides, & se comporter comme ces sels dans un grand nombre de combinaisons, de sorte que les corps acides semblent être les plus nombreux & jouer le plus grand rôle dans les altérations chimiques qu'éprouvent sans cesse les corps simples & composés.

Application des axiomes sur les acides.

I. La formation artificielle de l'acide sulfurique, par la combustion du soufre en grand.

La décoloration des linges & étoffes blanches, par l'acide sulfureux.

Les arts nouveaux de blanchiment, par l'acide muriatique oxygéné.

La théorie de l'eau régale.

L'art de graver sur le verre avec l'acide fluorique.

Une portion de la théorie de la formation des nitrières artificielles.

L'existence & la formation des acides naturels connus.

L'influence des acides dans la minéralisation.

L'extraction & la purification des acides & acides végétaux.

La formation & la destruction spontanée des acides végétaux.

Leur conversion réciproque les uns dans les autres.

TITRE HUITIÈME.

DE L'UNION DES ACIDES AVEC LES TERRES, ET LES ALCALIS.

I. Tous les acides s'unissent sans décomposition avec les terres alcalines & les alcalis ; ces combinaisons ont été nommées *sels neutres*, *sels moyens*, *sels composés*, *sels secondaires* ; elles ne méritent les deux premiers noms que lorsqu'elles ne sont ni acides ni alcalines ; les seconds sont plus exacts & plus utiles. L'art fait facilement tous ces sels ; la nature en présente un assez grand nombre, sur-tout ceux qui sont formés par les acides à radicaux simples. La minéralogie gagne tous les jours dans ce genre de connaissances par l'analyse des minéraux qui seule peut en faire connoître la nature intime.

II. Tous les sels composés doivent porter deux noms ; le premier indique l'acide, le second la base terreuse ou alcaline. La terminaison des premiers noms des sels est double & annonce l'état de l'acide ; les mots terminés en *ate* appartiennent aux acides saturés d'oxygène qu'on désigne par une terminaison en *ique* ; ainsi les *nitrate*s sont formés par l'acide *nitrique*. Les mots terminés en *ite* désignent les acides foibles & non saturés d'oxygène dénommés comme on fait en eux ; ainsi les *nitrite*s sont composés d'acide *nitreux*.

III. Comme il y a 34 espèces d'acides connus, & 7 bases terreuses & alcalines qui peuvent être unies pour former des sels composés, on pourroit élever le nombre de ces sels à 238 espèces ; mais ce calcul ne seroit rien moins qu'exact. 1°. Parce qu'il n'y a que quelques acides qui peuvent s'unir à la silice ; 2°. parce qu'il y en a d'autres qui ne peuvent pas s'unir à quelques bases terreuses en raison de leur foiblesse, ou à l'ammoniaque sans la décomposer ; 3°. parce qu'il y a plusieurs acides qui peuvent être unis aux mêmes bases de trois manières,

Chimie. Tome II.

ou s'arrêter à trois états de saturation avec ces bases, savoir avec excès d'acide dans l'état neutre, & avec excès de bases. On ne peut pas non plus fixer exactement le nombre des sels neutres terreux & alcalins, parce qu'on est fort éloigné d'avoir assez examiné toutes ces combinaisons pour les bien connoître, & pour déterminer si elles ne sont pas susceptibles de plusieurs saturations, &c.

IV. Tous les acides ayant pour chaque base terreuse ou alcaline des attractions électives ou des affinités différentes, il faudroit bien connoître toutes ces affinités respectives pour avoir une histoire complète des sels composés ; comme on n'a encore déterminé d'une manière exacte qu'une très-petite partie de ces affinités, on est bien éloigné de posséder l'ensemble des faits qui doivent appartenir à cet ordre de corps : on n'a point encore convenablement examiné le dixième de ces combinaisons.

V. Pour commencer avec méthode l'histoire des sels composés, il faut les diviser en genres & en sortes, & établir leurs caractères génériques & spécifiques ; on ne peut offrir qu'une légère ébauche de ce travail qui n'a point encore occupé les chimistes, quoiqu'il soit essentiel d'appliquer aujourd'hui la méthode des botanistes à l'énoncé des propriétés chimiques.

On trouve deux méthodes de divisions pour les sels composés ; l'une est fondée sur les acides & l'autre sur les bases ; on ne peut encore établir de genres qui comprennent l'ensemble de tous ces sels que d'après les acides, parce qu'il n'y a qu'eux qui puissent fournir des caractères génériques ; l'influence des bases sur les propriétés de ces composés n'est point assez connue, pour qu'il soit possible de considérer ces bases alcalines & terreuses comme chefs des divisions génériques.

VI. On peut donc compter 34 genres de sels composés d'après le nombre des acides ; leurs noms génériques étant tirés de leurs acides, on a pour ces 34 genres les dénominations suivantes.

I. genre, les SULFATES.

II. genre, les SULFITES.

III. genre, les NITRATES.

IV. genre, les NITRITES.

V. genre, les CARBONATES.

VI. genre, les PHOSPHATES.

VII. genre, les PHOSPHITES.

VIII. genre, les ARSÉNIATES.

IX. genre, les TUNGSTATES.

X. genre, les MOLYBDATES.

000

- XI. genre, les MURIATES.
- XII. genre, les MURIATES OXIGENÉS.
- XIII. genre, les FLUATES.
- XIV. genre, les BORATES.
- XV. genre, les SUCCINATES.
- XVI. genre, les CITRATES.
- XVII. genre, les GALLATES.
- XVIII. genre, les MALATES.
- XIX. genre, les BENZOATES.
- XX. genre, les TARTRITES.
- XXI. genre, les OXALATES.
- XXII. genre, les CAMPHORATES.
- XXIII. genre, les PYROMUCITES.
- XXIV. genre, les PYROLIGNITES.
- XXV. genre, les PYROTARTRITES.
- XXVI. genre, les ACETATES.
- XXVII. genre, les ACETITES.
- XXVIII. genre, les LACTATES.
- XXIX. genre, les SACCHOLATES.
- XXX. genre, les SEBATES.
- XXXI. genre, les LITHIATES.
- XXXII. genre, les FORMIATES.
- XXXIII. genre, les ROMBIATES.
- XXXIV. genre, les PRUSSIATES.

VII. Chaque un des 34 genres de sels composés dont on vient de présenter le dénombrement doit être considéré par rapport à ses caractères distinctifs, ou aux propriétés qui peuvent le faire distinguer de tous les autres & donner une idée nette des différences de tous ces genres. Il faut pour cela choisir parmi les propriétés qu'ils présentent une seule s'il est possible, ou au plus deux ou trois propriétés qui soient bien branchées & qui constituent un caractère essentiel à chaque genre. On va essayer d'esquisser ici ce travail.

I. genre, SULFATES; décomposables par le charbon, &c. en sulfures.

II. genre, SULFITES; donnent par le contact de presque tous les acides, l'odeur du soufre qui brûle avec une effervescence.

III. genre, NITRATES; allument les corps combustibles à diverses températures, & se réduisant presque tous à leur base par l'action du feu.

IV. genre, NITRITES; décomposables par les acides foibles qui en séparent la vapeur rouge nitreuse.

V. genre, CARBONATES; laissant plus ou moins saillants les caractères de leurs bases; faisant avec tous les acides une effervescence vive & sensible, jusqu'au dégagement total de leur acide carbonique.

VI. genre, PHOSPHATES; décomposables médiatement ou immédiatement par le charbon qui en sépare le phosphore.

VII. genre, PHOSPHITES; décomposables tous immédiatement par le charbon qui en sépare le phosphore, & donnant des vapeurs par le contact de l'acide sulfurique, &c.

VIII. genre, ARSÉNIATES; donnant par un grand feu l'odeur & la vapeur blanche d'arsenic.

IX. genre, TUNSTATES; devenant jaunes par les acides nitrique ou muriatique.

X. genre, MOLYBDATES; orne les reconnoît encore lorsqu'on en a séparé l'acide molybdique par d'autres acides.

XI. genre, MURIATES; donnant de l'acide muriatique par l'acide sulfurique concentré, & de l'acide muriatique oxigéné par l'acide nitrique.

XII. genre, MURIATES OXIGENÉS; allument tous les corps combustibles à une température plus basse que ne le font les nitrates, avec une flamme plus vive; & restent dans l'état de muriates après cette combustion.

XIII. genre, FLUATES; donnant une vapeur qui ronge le verre, par le contact de l'acide sulfurique concentré.

XIV. genre, BORATES; fusibles avec ou sans séparation de leurs bases, donnant de leur dissolution unie à un autre acide, l'acide boracique en cristaux feuilletés.

XV. genre, SUCCINATES; on ne peut les reconnoître & les caractérier qu'en les décomposant & en observant leur acide; la plupart conservent l'odeur du succin brûlé.

XVI. genre, CITRATES; pas assez connus pour qu'on y trouve des caractères génériques; il faut pour les distinguer en séparer l'acide citrique par les acides minéraux les plus forts.

XVII. genre, GALLATES; ils sont tous très-caractérisés par leur propriété de précipiter les

dissolutions de fer en noir, &c de réduire en partie les oxides d'argent, d'or & de mercure en les séparant de leurs dissolutions.

XXVIII. genre, MALATES; presque tous déliquescens; on ne peut les reconnoître qu'en obtenant leur acide à l'aide des acides minéraux.

XIX. genre, BENZOATES; on en détermine le genre en reconnoissant à son odeur l'acide benzoïque qu'on en sépare par des acides plus puissans.

XX. genre, TARTRITES; on trouve des caractères assez tranchés, pour distinguer ces sels, dans leur tendance à former des sels triples, & des acicules moins solubles que ne le sont & l'acide pur & les sels neutres que cet acide tartareux forme avec les bases.

XXI. genre, OXALATES; leur tendance à former des acicules peu dissolubles & la propriété qu'ils ont de décomposer tous les sels calcaires, peuvent les caractériser.

XXII. genre, CAMPHORATES; on les connoît trop peu pour pouvoir leur assigner des caractères généraux; c'est à la présence & aux propriétés de l'acide camphorique obtenu à part qu'on pourra les distinguer.

XXIII. genre, PYROMUCITES; dans le même cas que les camphorates.

XXIV. genre, PYROLIGNITES; comme les pyromucites.

XXV. genre, PYROTARTRITES; comme les trois genres précédens.

XXVI. genre, ACÉTATES; encore trop peu distingués des acétites, donnant dans leur décomposition par les acides minéraux, une vapeur blanche très-forte & très-piquante.

XXVII. genre, ACÉTITES; tous reconnoissables par leur acide dégagé à l'aide d'acides plus puissans.

XXVIII. genre, LACTATES; très-peu connus; leur acide séparé par d'autres peut seul les caractériser.

XXIX. genre, SACCHOLATES; comme les lactates; inconnus.

XXX. genre, SEBATES; donnant la vapeur blanche & l'odeur acre de l'acide sebacique, par le contact des acides minéraux les plus forts.

XXXI. genre, LITHIATES; les plus faibles de

tous les sels dans leurs attractions; décomposables même par l'acide carbonique.

XXXII. genre, FORMIATES; très-peu connus, & seulement reconnoissables par leur acide.

XXXIII. genre, BOMBIATES; comme les formiates.

XXXIV. genre, PRUSIATES; très-bien caractérisés par leur propriété de former avec les dissolutions de fer du bleu de Prusse.

VIII. Pour déterminer les caractères spécifiques des 240 espèces à-peu-près que contiennent ces 34 genres, il faudroit en faire une étude approfondie, & la science en est encore fort peu avancée à cet égard. Au défaut de ces connoissances, il est essentiel de déterminer au moins la marche qu'on doit suivre pour compléter l'histoire de ces composés, & de fixer exactement la méthode d'en étudier les propriétés.

Chaque sel composé terreux ou alcalin présente à l'observateur,

1°. La forme, & les variétés de cette forme, elle doit être décrite géométriquement; on doit indiquer l'inclinaison & les degrés des angles, la formation primitive des cristaux, la forme intérieure, leur dissection & les loix de décroissement qui en déterminent les variétés.

2°. Son existence dans la nature ou dans l'art, la comparaison du sel naturel & du sel artificiel.

3°. La saveur.

4°. L'action sur l'eau, ou nulle, ou fondant, vitriant, sublimant, décomposant, &c.

5°. Celle de la lumière.

6°. L'influence de l'air, nulle, donnant ou enlevant l'eau des cristaux.

7°. L'union avec l'eau, la quantité nécessaire à la dissolution, à diverses températures, le froid ou la chaleur produite, la cristallisation opérée par le refroidissement ou l'évaporation.

8°. L'attraction des terres qui modifie ou décompose, ou ne change point ce sel, ou s'y unit en trisle.

9°. L'effet des alcalis sur lui nul, décomposant, quelq'fois s'unissant en sel triple.

10°. L'action comparée des acides différens de celui qu'il contient, décomposant, dénaturant le sel, ou n'y produisant aucun changement.

11°. L'influence des autres sels neutres sur lui, se réduisant ou à une action nulle, ou à une union entière qui tend à former un sel triple, ou à une double décomposition qui échange les bases & les acides, ou à une précipitation en raison de leur attraction pour l'eau.

12°. La dissolubilité ou la non dissolubilité du sel dans l'alcool.

13°. Son altération ou son inaltérabilité par le charbon qui en décompose l'acide, ou le laisse intact.

14°. L'influence de la végétation, & de la fermentation fur ce fel.

15°. Enfin son action fur l'économie animale.

IX. Si toutes ces questions avoient une réponse exacte dans l'état actuel de la chimie, l'histoire des fels composés terreux & alcalins, non seulement seroit complète, mais jetteroit une vive lumière sur beaucoup de phénomènes de la nature & de l'art qui sont encore plongés dans une grande obscurité.

X. On connoît déjà quelques combinaisons salines d'un acide avec deux bases, sur-tout la magnésie & l'ammoniaque; ces composés portent le nom de *trisples* ou de fels triples; mais il en existe un bien plus grand nombre qu'on ne soupçonne même pas assez, & qui appellent toute l'attention des chimistes. La terre recèle également à sa surface & dans les cavités superficielles, des composés salins qui diffèrent de ceux que produit l'art par l'existence simulannée de deux bases ou même de deux acides. On a trouvé déjà le borate de chaux & le borate de magnésie cristallisés ensemble dans le *quartz cubique*, le phosphate de chaux & le fluete de chaux dans la terre de Marmasoch, la pierre de l'Estramadure, &c.

Applications des propositions de ce titre.

La connoissance des fels naturels.

La cristallisation, la purification des fels utiles.

Les phénomènes des dissolutions.

Les précipitations & la préparation de l'alumine, de la magnésie, &c.

L'attraction de la chaux, de la potasse, de la soude, de l'ammoniaque, pour les acides.

La formation des fels neutres dans la nature.

Tous les détails de la halotechnie.

La préparation des acides nitrique, muriatique, boracique, &c.

TITRE NEUVIEME.

OXIDATION ET DISSOLUTIONS
DES MÉTAUX.

I. Les métaux ont été déjà considérés comme des corps combustibles indécomposés ou simples, & caractérisés par leurs propriétés saillantes, dans le titre sixième. Mais ces généralités ne suffisent point; le rôle important que ces matières jouent dans les phénomènes de la nature, & dans les procédés des arts, exige qu'on les examine en particulier & avec un détail suffisant pour en bien apprécier toute l'influence.

II. Quoique les métaux soient susceptibles de s'unir dans leur état métallique, soit entre eux, soit au soufre, au phosphore, au carbone, & en

général à toutes les matières combustibles, il est bien plus ordinaire de les voir combinés à l'oxygène avant de s'unir à d'autres substances; ou en d'autres termes, pour entrer dans le plus grand nombre des composés dont ils font partie, il faut qu'ils s'unissent auparavant à l'oxygène, ou qu'ils passent à l'état de corps brûlés. Aussi tous les phénomènes singuliers que présentent les métaux dans leurs combinaisons, tous les changemens de forme qu'ils éprouvent lorsqu'ils sont à leur attraction pour l'oxygène & à la proportion diverse dans laquelle ils contiennent ce principe.

III. Quoiqu'il y ait beaucoup de circonstances dans lesquelles les métaux peuvent être unis à l'oxygène, on peut les réduire en général à trois. La première est le contact de l'air aidé du calorique; la seconde est due à la décomposition de l'eau, & la troisième à celle des acides. C'est sous ce triple point de vue qu'il faut considérer ici l'oxidation & les dissolutions des métaux.

IV. Tous les métaux chauffés dans l'air & élevés à une température plus ou moins haute, soit avant, soit après leur fusion, sont susceptibles de brûler avec une flamme vive, une grande chaleur & une véritable déflagration; ils absorbent donc l'oxygène plus ou moins solide; ceux qui s'oxident lentement & sans inflammation sensible, dégagent cependant aussi de la lumière & du calorique de l'air vital, mais en si petite quantité à la fois, que ces matières ne sont pas sensibles à nos organes.

V. L'élévation de température favorise l'absorption de l'oxygène atmosphérique par les métaux, & rend plus solide la combinaison de ce principe avec ces corps combustibles.

VI. Tandis qu'il y a des métaux qui ne brûlent jamais dans l'air qu'à une très-haute-élévation de température, comme l'or, l'argent & le platine, il en est d'autres qui brûlent à toutes les températures, & même à la plus basse & avec une grande promptitude, comme le manganèse, qui s'oxide & tombe en poussière en quelques heures par le contact de l'air, même à plusieurs degrés au-dessous de 0. Quelques-uns, comme le fer, le cuivre, le plomb, &c., brûlent lentement & en quelques mois à l'air même froid.

VII. Tous les métaux augmentent de poids dans cette opération, qui n'a pas lieu sans le contact de l'air, & absorbent ainsi un principe, l'oxygène atmosphérique, sans en perdre aucun. Le nom de *calcu-tion* qu'on avoit donné à ce phénomène ne peut pas être conservé non plus que celui de *chaux métalliques*; on y a substitué les mots *combustion* & *oxidation* pour l'opération, & celui d'*oxides métalliques* pour les métaux ainsi brûlés.

VIII. Les couleurs que les métaux présentent en brûlant ou dont leur flamme est nuancée, paroissent tenir à la dissolution des molécules métalliques dans la lumière qui se dégage; ainsi le cuivre fait une flamme verte, &c.

IX. Non-seulement tous les métaux comparés les uns aux autres dans leur combustion par le contact de l'air, absorbent des quantités différentes d'oxygène pour se saturer, mais encore chaque métal considéré en particulier en absorbe des proportions diverses, s'arrête à différents points d'oxidation, suivant les divers degrés de température auxquels on l'expose. Ainsi l'étain, le plomb, le cuivre, le fer, changent d'abord de couleur, & se nuancent des teintes de l'iris aux premiers degrés de feu qu'on leur fait subir avec le contact de l'air; le plomb est d'abord en oxide gris, puis en oxide jaune, enfin en oxide rouge; le mercure passe du noir au blanc, du blanc au jaune, & du jaune au rouge; le fer d'abord en oxide noir devient ensuite oxide vert, puis oxide blanc, & à la fin oxide brun; le cuivre est d'abord en oxide brun, de-là il passe au bleu, & son dernier degré d'oxidation le colore en vert.

X. Les métaux diffèrent tous entre eux par leur attraction pour l'oxygène; il en est auxquels la lumière presque seule ou aidée d'une faible portion de calorique enlève l'oxygène, comme l'or, l'argent, &c.; d'autres exigent pour s'en séparer un grand degré de feu & beaucoup de lumière, comme le mercure; enfin la plupart ne se laissent point enlever ce principe par le calorique & la lumière. Pour décomposer ces derniers oxides, on les chauffe avec du charbon qui leur enlève l'oxygène.

XI. C'est aussi en raison de cette diversité d'attraction pour l'oxygène que quelques métaux l'enlèvent à d'autres, comme presque tous le font à l'or & à l'argent; le cuivre au mercure, le fer au cuivre, &c. Toutes ces attractions ne sont point encore bien connues; ce qu'on fait jusqu'ici annoncer l'ordre suivant entre eux, en commençant par la plus forte attraction pour l'oxygène, le manganèse, le zinc, le fer, l'étain, le cuivre, le mercure, l'argent, l'or.

XII. Plusieurs métaux décomposent l'eau & d'autant plus sensiblement ou rapidement que leur température est plus élevée, parce qu'alors la grande quantité de calorique employé, attire & dissout plus fortement l'hydrogène. Ainsi le fer décompose l'eau avec une grande activité lorsqu'il est rouge blanc, tandis qu'il ne produit cette décomposition qu'en beaucoup de temps à la température la plus élevée de l'atmosphère.

XIII. Le fer, le zinc, l'étain, l'antimoine,

paroissent susceptibles de décomposer l'eau; il est vraisemblable que le manganèse, & même quelques autres substances métalliques en sont également susceptibles. On attribue cette décomposition à une attraction plus forte pour l'oxygène que celui-ci n'en a pour l'hydrogène, il s'ensuit que les oxides de ceux qui ne décomposent point l'eau sont entièrement décomposés par l'hydrogène. Mais il faut distinguer ici les différents degrés d'oxidation; car l'oxide de fer très-oxidé ou oxide brun, est en partie décomposé par l'hydrogène & ramené à l'état d'oxide noir, parce que le fer n'enlève l'oxygène à l'eau que jusqu'au degré où il est oxide en noir; au-delà de cette oxidation il ne la décompose plus.

XIV. Tous les métaux susceptibles de décomposer l'eau, opèrent cette décomposition bien plus facilement & rapidement, lorsqu'ils sont aidés par le contact d'un corps qui a une grande tendance pour s'unir à leurs oxides. Souvent même les métaux, comme d'autres combustibles, qui seuls ne décomposeroient point l'eau, en deviennent susceptibles par la présence de quelques autres substances qui agissent alors par une affinité dispoñante; c'est ainsi que la présence des acides rend presque tous les métaux capables d'opérer la décomposition de l'eau.

XV. Les oxides métalliques ont cela de particulier dans leurs combinaisons, qu'ils semblent faire fonction d'alcalis ou de bases terreuses & alcalines à l'égard des acides, quoiqu'ils soient susceptibles de s'unir d'un autre côté aux terres & aux alcalis, comme des espèces d'acides. A la vérité, il y a moins de ces derniers que des autres, & on remarque en général que ce sont ceux auxquels l'hydrogène adhère le plus fortement, comme l'antimoine, le plomb, le fer, le manganèse, qui saturent les alcalis à la manière des acides. On a déjà dit, au titre VI, qu'il y a trois métaux véritablement acidifiables.

XVI. Des métaux ne peuvent pas être dissous par les oxides, sans être préliminairement oxides; c'est pour cela que les oxides métalliques dissolubles dans les acides s'y dissolvent lentement & sans effervescence; tandis que les métaux ne peuvent pas s'y dissoudre sans mouvement & sans effervescence.

XVII. L'effervescence produite par la dissolution des métaux est due à ce qu'en absorbant l'oxygène ils l'enlèvent à un principe qui prend la forme d'un gaz, ou fluide élastique. Ce principe provient ou de l'eau ou des acides, suivant que l'une ou les autres sont décomposés; quelquefois il appartient en même temps à ces deux corps qui sont alors décomposés tous deux à la fois par les métaux.

XVIII. L'acide sulfurique décomposé ainsi par les métaux lorsqu'il est concentré donne du gaz sulfureux, & l'acide nitrique du gaz nitreux.

XIX. L'acide sulfurique étendu d'eau facilitant beaucoup la décomposition de cette dernière par les métaux, donne dans ce cas du gaz hydrogène; c'est ainsi que se comportent principalement les dissolutions de zinc & de fer par l'acide sulfurique aqueux. L'acide phosphorique se comporte à peu-près avec les métaux, comme le fait l'acide sulfurique.

XX. L'acide nitrique est non-seulement décomposé par plusieurs métaux, mais il laisse encore décomposer l'eau en même-temps que lui. Il suffit pour cela que le métal qu'on y dissout soit extrêmement avide d'oxygène; tel est sur-tout l'étain. Dans ce cas l'hydrogène de l'eau en s'unissant à l'azote de l'acide nitrique forme de l'ammoniacque; voilà pourquoi ces dissolutions ne fournissent point de gaz & contiennent du nitrate ammoniacal. On conçoit d'après cela comment la plupart des dissolutions des métaux blancs dans l'acide nitrique, donnent des vapeurs d'ammoniacque quand on y jette de la chaux vive.

XXI. L'acide muriatique n'étant pas susceptible d'être décomposé par les corps combustibles, ne dissout par lui-même que peu de substances métalliques. Il n'attaque que les métaux qui sont assez avides d'oxygène pour décomposer l'eau; aussi pendant les dissolutions métalliques par l'acide nitrique, se dégage-t-il toujours du gaz hydrogène.

XXII. Non-seulement l'acide muriatique ne n'est pas susceptible d'être décomposé par les métaux, il a encore la propriété d'enlever l'oxygène à la plupart des oxides métalliques; il passe alors à l'état d'acide muriatique oxygéné; c'est à cette attraction pour l'oxygène qu'est due la propriété de dissoudre facilement les oxides métalliques dont jout cet acide, & c'est pour cela qu'on l'emploie avec succès pour dissoudre l'oxide de fer que les autres acides ne peuvent pas attaquer. Si les oxides métalliques sont surchargés d'oxygène lorsqu'on les dissout dans l'acide muriatique, cet acide fait effervescence, parce qu'une partie s'en va en gaz acide muriatique oxygéné. Si ces oxides ne sont qu'à un point convenable d'oxidation pour s'unir à cet acide, ils se dissolvent sans mouvement, sans effervescence, comme du sel ou du sucre dans l'eau.

XXIII. Les acides boracique & fluorique ne s'unissent que faiblement aux oxides métalliques; ils ne dissolvent point les métaux purs, parce qu'ils ne sont pas décomposables par ces corps; mais ils

sont oxidés par l'eau ceux d'entre eux qui ont le plus d'affinité pour l'oxygène. Il en est de même de l'acide carbonique qui se combine bien avec la plupart des oxides métalliques, & qu'on trouve souvent uni avec eux dans la nature.

XXIV. Les acides métalliques sont facilement décomposés par les métaux très-combustibles; ils s'unissent bien avec leurs oxides, & on les trouve souvent combinés ensemble dans la nature.

XXV. Les acides végétaux & animaux, ou à radicaux formés d'hydrogène & de carbone, ne sont pas décomposés par les métaux; mais ils rendent l'eau très-décomposable par ces corps, & ils s'unissent assez solidement avec les oxides métalliques; plusieurs sont repasser ces oxides à l'état de métaux.

XXVI. Les oxides métalliques ne peuvent s'unir aux acides & sur-tout y rester unis, qu'autant qu'ils contiennent des proportions déterminées d'oxygène; en-deçà de ces proportions ils ne s'y unissent point, au-delà ils les abandonnent.

XXVII. Outre cette vérité générale, il en est encore une du même ordre & particulière à chaque acide & à chaque métal; c'est que chacun d'eux ne peut rester réciproquement uni, que dans des limites souvent très-étroites d'oxidation. Il y a une proportion d'oxygène déterminée dans la combinaison d'un acide avec un oxide métallique.

XXVIII. C'est en vertu de cette loi que les dissolutions métalliques exposées à l'air se précipitent & se troublent, à mesure que l'oxide métallique absorbant l'oxygène atmosphérique devient peu-à-peu insoluble dans l'acide. Telle est la raison des décompositions opérées par l'atmosphère dans la plupart des sulfates & des nitrates métalliques.

XXIX. Souvent même les oxides métalliques dissous dans les acides, réagissent peu-à-peu sur ces sels, & leur enlèvent même dans les vaisseaux fermés & sans le contact de l'air, une portion de leur oxygène, en sorte qu'ils s'en séparent bien-tôt & se précipitent au fond des dissolutions.

XXX. La chaleur favorise singulièrement cette décomposition successive des acides par les oxides métalliques. C'est ainsi que les dissolutions nitriques se troublent ou deviennent de plus en plus décomposables par l'air & par l'eau lorsqu'on les chauffe; cela est sur-tout remarquable pour la dissolution nitrique de mercure.

XXXI. Il est des métaux qui ont tant de tendance pour s'oxider par les acides, qu'ils ne peuvent pas y rester unis ni former de dissolutions permanentes. Ce sont sur-tout ceux qui ont la propriété de devenir acides ou de former des oxides susceptibles de s'unir aux alcalis, comme l'arsenic, le tungstène, le molybdène, l'antimoine, l'étain, le fer, &c. Aussi voit-on les dissolutions de ces métaux dans l'acide nitrique sur-tout, être toujours chargées de précipités, & ne contenir que peu ou point d'oxides métalliques.

XXXII. On voit d'après les énoncés précédens que pour former des sels métalliques, il faut que leurs oxides restent unis aux acides & ne tendent point à s'en separer. Il faut aussi qu'on n'augmente point leur affinité pour l'oxigène, ou qu'on ne leur présente point ce principe en contact avec eux.

XXXIII. Les sels composés métalliques sont toujours ou presque toujours avec excès d'acides; ils sont d'ailleurs tous plus ou moins acres & corrosifs, ce qui annonce que presque tous les oxides métalliques ont de la tendance pour devenir acides.

XXXIV. Les propriétés des sels métalliques qu'il est important de connoître, sont renfermées dans les titres suivans :

1°. Forme & ses variétés; 2°. saveur & causticité plus ou moins grande; 3°. altération par la lumière; 4°. fusion, dessèchement, décomposition plus ou moins prononcée par le calorique; 5°. deliquescence, efflorescence ou décomposition plus ou moins complète par l'air; 6°. dissolubilité dans l'eau à chaud, à froid, décomposition plus ou moins avancée par l'eau pure, &c.; 7°. décomposition par les alcalis & les terres, nature des oxides métalliques précipités, précipitation complète ou formation de sels triples ou de trifides, en partie alcalins ou terreux, & en partie métalliques; 8°. altération des oxides métalliques précipités dans le moment de leur précipitation, soit par l'air, soit par la nature de l'alcali employé pour la précipitation, comme cela a lieu pour l'ammoniaque; 9°. altération réciproque par les divers acides, décomposition ou non, attraction des acides pour les oxides métalliques, changemens des oxides reconnaissables à leur couleur; 10°. altération par les sels neutres, terreux ou alcalins, qui présentent soit une union sans décomposition, soit une double décomposition; 11°. action réciproque des sels métalliques les uns sur les autres, qui annonce ou une union simple, ou un changement simple de bases par les acides, ou un déplacement d'oxigène qui précipite les deux oxides, l'un parce qu'il est en partie dissout, l'autre parce qu'il est sorcisé, telle est, par exemple, l'utile précipitation de la dissolution muriatique d'or par

la dissolution muriatique d'étain qui fournit le précipité pourpre de Cassius; 12°. union avec les sulfures terreux ou alcalins, formation d'espèces de mines sulfureuses.

XXXV. Les oxides métalliques ont différens degrés d'affinité avec les acides, & on peut employer les uns pour décomposer les combinaisons des autres.

Mais ce sont sur-tout les affinités diverses, des métaux pour l'oxigène qui sont la cause la plus importante du phénomène de la précipitation des dissolutions métalliques. Ainsi plusieurs métaux en enlevant l'oxigène à ceux qui sont dissous dans les acides, sont reparotés ceux-ci sous la forme métallique, comme le mercure fait pour l'argent, le cuivre pour le mercure, le fer pour le cuivre, le zinc pour le fer, &c. Quelquefois les métaux n'enlèvent point tout l'oxigène aux oxides métalliques dissous dans les acides. Cela arrive lorsque les métaux précipitans n'ont pas besoin de tout l'oxigène uni aux métaux dissous, pour prendre leur place dans les acides; ainsi l'étain en précipitant l'oxide d'or ne lui enlève point tout l'oxigène qu'il contenoit, & laisse précipiter ce dernier métal dans un état particulier d'oxidation. Les oxides métalliques en se partageant l'oxigène dans une nouvelle proportion, se précipitent avec des propriétés qui méritent d'être mieux observées qu'on ne l'a encore fait jusqu'ici.

Application des énoncés de ce titre.

Préparation de tous les oxides métalliques utiles aux arts.

Verres colorés, émaux.

Sels métalliques utiles aux arts.

Effets de ces sels dans les arts où on les emploie.

Dissolutions & départ des métaux.

Précipitation des oxides métalliques par les alcalis & les terres.

Ces applications sont en général si multipliées & si utiles, qu'elles ne peuvent être bien présentées qu'à l'histoire particulière de chaque métal.

TITRE DIXIÈME.

FORMATION ET NATURE DES MATIÈRES VÉGÉTALES.

I. Les matières qui constituent le tissu des végétaux diffèrent des substances minérales, en ce qu'elles sont d'un ordre de composition plus compliqué, & que toutes étant très susceptibles de décomposition ou d'analyse, aucune ne l'est de synthèse.

II. Il n'y a que le tissu des végétaux vivans, & n'y a que leurs organes végétaux, qui puissent former les matières qu'on en extrait, & aucun instru-

ment de l'art ne peut imiter les compositions qui se font dans les machines organisées des plantes.

III. Quoique ce soit avec quatre ou cinq substances naturelles, le calorique, la lumière, l'eau, l'air, & quelques débris de plantes conformées en terreau, que les végétaux forment tous les matériaux qui en composent le tissu, on trouve une variété extrême dans les propriétés de ces matériaux. On peut cependant les réduire à un certain nombre de chefs principaux, sous le nom de *matériaux immédiats des plantes*, parce qu'on les retire par des procédés simples presque entièrement mécaniques, par une espèce d'analyse immédiate qui n'en altère pas la nature.

IV. Ces matières plus ou moins composées sont placées dans des organes particuliers ou dans des vaisseaux, des cellules distinctes, &c. Quelquefois leur siège est dans la racine ou dans la tige, l'écorce & les feuilles à la fois; d'autres fois au contraire il n'y a que les fleurs, les fruits ou les semences & même quelques régions de ces organes qui les recèlent. Cette situation particulière des matériaux immédiats désigne la différence d'organisation du tissu, comme la cause de la variété de nature que chacune de ces matières présente.

V. La place différente qu'occupe chacun des matériaux des végétaux, permet souvent qu'on les obtienne facilement séparés & purs; il suffit lorsque ce cantonnement a lieu, de briser, d'ouvrir les vaisseaux ou les cellules qui les contiennent, & d'en exprimer les sucs liquides. La nature, par la force même de la végétation, offre souvent elle-même cette séparation à l'extérieur des plantes; c'est ainsi que découlent spontanément la sève, la manne, la gomme, la résine, &c. Souvent l'art est obligé de séparer les uns des autres plusieurs de ces matériaux réunis & confondus. Les moyens qu'il emploie pour cela sont ordinairement simples & faciles à pratiquer; tels que le repos, la filtration, la presse, le lavage, la distillation à une chaleur douce, qui n'altèrent point les substances qu'on y soumet.

VI. Parmi les matériaux qui composent les corps des végétaux, qu'on en retire par des moyens simples qui n'en altèrent point la nature, & qui sont ou fluides ou solides, on compte les substances suivantes:

- 1°. L'extractif ou l'extract.
- 2°. Le muqueux ou le mucilage.
- 3°. Le sucre.
- 4°. Les sels essentiels.
- 5°. L'huile fixe.
- 6°. L'huile volatile.
- 7°. L'arome.

- 8°. Le camphre.
- 9°. La résine.
- 10°. Le baume.
- 11°. La gomme résine.
- 12°. La tectule.
- 13°. Le gluten.
- 14°. La matière colorante.
- 15°. La gomme élastique.
- 16°. La partie ligneuse.

Outre ces 16 principes, on a encore trouvé dans les végétaux une substance analogue à l'albumine animale, Voyez le titre XI (1).

VII. Il est nécessaire de bien concevoir ici, qu'en réduisant à des termes généraux ou à des résultats principaux, tous les faits de l'analyse végétale, on n'a rien trouvé de plus dans toutes les plantes qu'on a examinées jusqu'à présent que les 16 substances précédentes; de sorte qu'on peut assurer qu'elles composent véritablement le tissu de tous les végétaux connus, & qu'en les séparant d'un végétal, on en fait ainsi une analyse très-exacte. Il ne faut cependant pas entendre que ces 16 matériaux immédiats se trouvent tous dans les diverses parties des végétaux, ou même dans chaque végétal tout entier. Il est des plantes qui dans tout l'ensemble de leurs parties ne fournissent pas 5 à 6 de ces matériaux; il en est d'autres qui en contiennent 8 ou 10; quelques-unes les offrent tous. Mais en supposant qu'on pût mêler ensemble & confondre même chimiquement toutes les plantes dont la chimie s'est occupée, ce mélange, cette combinaison, confuse en apparence, n'offrirait que les 16 ou 17 substances indiquées ci-dessus, par les analyses les plus exactes & les plus recherchées; on doit donc dire que les végétaux sont formés de ces matériaux immédiats.

VIII. Chacun des matériaux énoncés ci-dessus a des propriétés particulières distinctives, parmi lesquelles il faut choisir celles qui peuvent en tracer les caractères & les faire reconnoître facilement les uns des autres. Il n'est pas impossible de traiter cet objet à la manière des botanistes & de n'avoir qu'une phrase caractéristique ou spécifique pour chacun de ces matériaux. Quoique cette méthode n'ait encore été ni proposée ni exécutée en chimie, on essayera d'en présenter une esquisse dans les numéros suivans.

Caractères des matériaux immédiats des végétaux.

IX. L'extractif ou l'extract; matière sèche, brune, un peu deliquescente, dissoluble dans l'eau, obtenue des sucs des végétaux épais, des infusions, des décoctions; donnant à la distillation un acide, un peu d'anomachie & de l'huile; absorbant l'oxygène atmosphérique, & devenant peu-à-

(1) Voyez l'analyse du quinquina, annales de chimie, tome 8 & 9.

peu indissoluble par cette absorption; regardée fausement comme un savon naturel; composée de carbone, d'hydrogène, d'azote & d'oxygène, & tendant toujours à absorber plus de ce dernier principe qu'elle n'en contient dans son premier état.

X. Le MUQUEUX ou le MUCILAGE; substance gluante, visqueuse, fide, donnant beaucoup d'acide pyro-muqueux à la distillation; dissoluble dans l'eau froide & chaude; n'absorbant point l'oxygène atmosphérique, se séchant & devenant cassante sous la forme de gomme; existant dans les racines, les jeunes tiges, les feuilles; sortant par expression des écorces des arbres; collant leurs fibres les unes aux autres.

XI. Le SUCRE; d'une saveur piquante & agréable, cristallisable, dissoluble, fermentescible, presque tout semblable au mucilage, en différenciant par la propriété de fermenter & de former de l'alcool. Le mucilage & le sucre sont des composés de carbone, d'hydrogène & d'oxygène, qui diffèrent de l'extrait, 1°. Par la proportion d'hydrogène plus petite; (c'est pour cela qu'ils n'absorbent pas l'oxygène atmosphérique comme l'extrait;) 2°. Par l'absence de l'azote; aussi ne donnent-ils point d'ammoniaque.

XII. Le SEL ESSENTIEL; comprenant les acides végétaux, formés en général d'hydrogène & de carbone plus oxygénés que les trois principes précédents; en ajoutant l'oxygène à ces derniers, on les convertit en acides. Les acides végétaux en quelque nombre qu'ils puissent être ne paroissent différer que par la proportion de leurs trois principes; ils sont tous décomposables par le feu, susceptibles de se convertir les uns dans les autres; & se réduisent en dernière analyse par l'addition de l'oxygène en eau & en acide carbonique; (Voyez le titre VII.)

XIII. L'HUILE FIXE; nommée autrefois *huile grasse*; épaisse, douce, inodore, brûlant quand elle est volatilisée, formant des savons avec les alcalis caustiques; mêlée d'un mucilage nommé *principe doux* des huiles par Schéele; s'épaississant & devenant concrète par le contact de l'air & l'absorption de l'oxygène; éprouvant les mêmes effets par les acides & les oxides métalliques; composée de carbone, d'hydrogène & d'un peu d'oxygène. Elle diffère des composés précédents par la proportion d'hydrogène plus grande; de-là sa combustibilité & la propriété de se changer en eau & en acide carbonique, quand elle brûle avec suffisante quantité d'air, comme cela arrive dans les mèches cieuses & environnées de toutes parts d'air, qui consistent les lampes d'Argan.

XVI. HUILE VOLATILE, nommée autrefois *huile chimie*. Tome II.

essentielle, essence; acre, très-odorante, se réduisant en entier en vapeur à 80 degrés, nage combinant que difficilement aux alcalis; inflammable par les acides; s'épaississant en résine par l'oxygène; brûlant plus vite que l'huile fixe, donnant plus d'eau qu'elle; laissant précipiter plus vite son charbon, qui constitue le noir de fumée.

XV. L'AROME, nommé autrefois *esprit recteur*; principe très-volatil, réduit en vapeur par la chaleur atmosphérique; formant une atmosphère autour des plantes; passant avec l'eau à la distillation au bain-marie; quelquefois de nature inflammable, dans d'autres cas présentant les propriétés salines; s'unissant avec l'alcool, les huiles fixes, le vinaigre, &c. formant dans ces combinaisons ce qu'on appelle les eaux distillées en pharmacie; contribuant par sa présence à la quantité d'huiles volatiles qu'on retire des plantes; ayant avec elles tant d'analogie, qu'on les a prises l'une pour l'autre. On ne connoît pas exactement la nature de l'arome; on commence à croire que ce n'est point un corps particulier, un seul principe dégagé des matières végétales, mais ces matières elles-mêmes entièrement adoucies en vapeurs.

XVI. Le CAMPHRE; matière reconnue aujourd'hui dans une foule de végétaux & devant être comptée parmi leurs principes immédiats, sous forme concrète & cristallisée, très-volatile, combustible avec fumée, dissoluble dans une grande quantité d'eau, dans l'alcool & l'éther, existant dans beaucoup d'huiles volatiles, contenu tout pur dans le tronc & les feuilles de l'espèce de laurier qui le fournit, trop peu connu encore dans sa nature intime, faisant un acide particulier par l'acide nitrique.

XVII. La RESINE; matière molle ou sèche, peu odorante, combustible, dissoluble dans l'alcool, point dans l'eau, s'unissant difficilement aux alcalis, peu altérable par les acides, provenant d'une huile volatile épaissie, & ne paroissant en différer que par une plus grande proportion d'oxygène.

XVIII. Le BAUME; résine unie avec l'acide benzoïque, plus odorante que la résine pure, donnant son acide concret par l'action du feu & par l'eau; le laissant enlever par les alcalis & les terres; se rapprochant de la résine après avoir perdu son acide.

XIX. La GOMME RESINE; suc concret, en partie dissoluble dans l'eau, formant avec elle une sorte d'émulsion, ainsi qu'avec le vinaigre, qu'on a cru être son dissolvant universel; plus dissoluble dans l'alcool; ne sortant pas naturellement des végétaux comme la résine, mais retiré de leurs vaisseaux brisés sous la forme d'un suc blanc ou divers.

fement coloré, d'une odeur fétide & plus ou moins alliée.

XX. La FÉCULE; matière pulvérulente, sèche, blanche, insipide, combustible, donnant beaucoup d'acide pyro-muqueux à la distillation, dissoluble dans l'eau bouillante, formant une gelée avec ce liquide, se convertissant en acide oxalique & milique par l'action de l'acide nitrique; existant dans toutes les matières blanches & cassantes des végétaux, particulièrement dans les racines tubéreuses & les graines des graminées, formant la base de la nourriture des animaux, & disposée promptement à devenir le principe de leurs corps.

XXI. Le GLUTEN; corps élastique, ductile, comme fibreux ou membraneux, indissoluble dans l'eau, légèrement soluble dans l'alcool, donnant beaucoup d'ammoniaque à la distillation, putrescible comme une matière animale, se colorant en jaune comme elle par le contact de l'acide nitrique; se convertissant en acide oxalique par cet acide, faisant la différence de la farine de froment d'avec les autres farines, lui donnant la propriété de faire une pâte.

XXII. La MATIÈRE COLORANTE; toujours attachée à l'un ou à l'autre des matériaux précédents, paroissant varier par sa nature, tantôt dissoluble dans l'eau, tantôt attaquable seulement par les alcalis, les huiles ou l'alcool; devant ses diverses propriétés aux différentes quantités d'oxygène qui s'y sont fixées, ayant de l'affinité pour s'unir à l'alumine, à l'oxide d'étain, &c.; susceptible de se combiner plus ou moins étroitement aux tissus végétaux & animaux.

XXIII. La GOMME ELASTIQUE; analogue à la gomme-résine, paroissant exister dans beaucoup de végétaux, & remarquable par la ductilité & l'élasticité qu'elle conserve après sa dissolution, donnant de l'ammoniaque à la distillation, répandant une odeur fétide quand on la brûle; ayant d'abord été sous forme d'un fluide blanc & laiteux, & passant de-là à celui de solide élastique par l'absorption de l'oxygène atmosphérique.

XXIV. La PARTIE LIGNEUSE, LE BOIS; matière trop négligée jusqu'ici par les chimistes, faisant la base solide de tous les végétaux, bien plus abondante dans ceux qui sont durs, faiblement regardée comme une terre, indissoluble dans l'eau, donnant à la distillation l'acide particulier nommé pyro-ligneux; contenant une grande quantité de carbone; passant à l'état de 3 ou 4 acides par l'action de celui du nitre; paroissant le dernier produire de la végétation.

XXV. Il résulte de tout ce qui a été exposé ci-dessus sur les 16 matériaux immédiats des vé-

gétaux, qu'ils se réduisent tous en dernière analyse à trois ou quatre principes qui en sont les composans primitifs; savoir, l'hydrogène, le carbone, l'oxygène, & pour plusieurs l'azote; que ces matériaux ne diffèrent entre eux que par les diverses proportions de ces espèces d'éléments qui les constituent. Or si l'on recherche par un simple calcul le nombre des composés différents qui peuvent résulter de ces unions suivant les proportions possibles entre trois ou quatre principes primitifs, on trouvera qu'il peut en exister un bien plus grand nombre. Mais comme chacune des compositions ternaires ou quaternaires qui forment les matériaux immédiats des végétaux, admet, à ce qu'il paroît, une certaine latitude de proportions pour rester avec sa nature générale d'extrait, de muqueux, d'huile, d'acide, de résine, &c. &c. on conçoit que les diverses proportions de leurs principes qui sont renfermées dans ces latitudes, déterminent l'immense, l'incommensurable variété de couleur, d'odeur, de faveur, de consistance que l'on connoît dans tous les matériaux des végétaux, & que tous les hommes distinguent dans celles de ces matières employées à leur nourriture, leurs vêtements, la construction de leurs demeures, &c.

XXVI. Il ne sera pas plus difficile de concevoir par la même considération, que les végétaux doivent différer dans la nature & dans les propriétés spécifiques de leurs matériaux, suivant les différentes époques de leur végétation; qu'ils ne doivent jamais rester dans le même état, & que les scènes diverses que présentent les époques de la germination, de la frondaison, de la floraison, de la fructification & de la maturation, qui constitue la vie végétale, doivent être accompagnées & marquées même par des changemens intérieurs, comme elles le sont par les apparences extérieures. La faveur si diversément modifiée, la couleur variant sans cesse, l'odeur qui n'est pas plus stable, la différence des ritus qui caractérisent ces diverses époques de la végétation, en sont des preuves incontestables.

XXVII. C'est un nouveau résultat de la philosophie chimique actuelle, que d'avoir su distinguer ainsi la nature des matériaux, des plantes, plus compliquée que celle des substances minérales. Cette connoissance acquise conduit à l'appréciation des changemens qu'éprouvent les matières végétales par les différens-agens chimiques. Ainsi l'on ne peut plus dire qu'on ignore l'action de l'agent destructeur du feu sur les substances végétales. On conçoit, d'après les considérations précédentes, que lorsqu'on soumet un végétal entier ou ses différens produits à l'action du feu, le calorique tend à réduire à des compositions plus simples, ces espèces de composés compliqués, en opérant l'union de leurs principes, deux à deux, dans des proportions très-différentes de celles qu'ils contenoient d'abord.

En les chauffant doucement, on dégage l'hydrogène qui brûle seul, & il reste beaucoup de carbone; si on les chauffe fortement, on dégage le carbone en même-temps que l'hydrogène; l'un & l'autre brûlent dans l'air, & il ne reste pour résidu que la petite quantité de terre & de sels qui forment les cendres végétales.

XXVIII. Tous les principes immédiats des végétaux se réduisant en dernière analyse, à 3 ou 4 principes primitifs, savoir, l'hydrogène, le carbone, l'oxygène & un peu d'azote pour quelques-uns d'entre eux, cette analyse répondant d'ailleurs avec une véritable précision à la manière dont les végétaux se nourrissent, croissent, s'étendent & se perpétuent, puisqu'on sait que la végétation n'exige que ces matières simples pour avoir lieu, il ne reste plus qu'à trouver comment les plantes s'approprient ces espèces d'éléments, & comment elles les combinent dans leurs filières organiques, pour composer les diverses substances qui viennent d'être énoncées.

XXIX. Il ne paroît pas douteux que la source de l'hydrogène pour les végétaux, est l'eau; qu'ils décomposent ce fluide dans leurs feuilles, à l'aide du contact de la lumière solaire, qu'ils en absorbent l'hydrogène qui s'y fixe dans l'état d'huile, ou d'extrait, ou de mucilage, &c., & qu'ils en séparent l'oxygène, dont une grande partie fondue par la lumière & le calorique, se dégage en état d'air vital. Mais une portion de l'oxygène de l'eau se fixe en même-temps dans le tissu végétal, & il y est sur-tout retenu par le carbone.

XXX. Il n'est pas si facile de rendre compte de l'origine du carbone qui existe dans les végétaux. Quelques physiciens croyent que les végétaux décomposent l'acide carbonique en même-temps que l'eau, & qu'ils en absorbent le carbone; mais cette assertion n'est pas prouvée. D'autres chimistes pensent que les terres végétales, l'*humus*, les fumiers, & sur-tout l'eau de fumier, fournissent le carbone divisé & même dissous dans l'eau, que c'est par leurs racines que les plantes absorbent ce principe, & qu'elles ne l'enlèvent point à l'acide carbonique. Ainsi les engrais ne donneroient dans cette opinion que le carbone. C'est à ces données que doit être restreinte jusqu'à ce moment la théorie chimique de la végétation.

Applications des résultats du titre dixième.

Les applications des résultats consignés dans ce titre sont extrêmement multipliées; elles tiennent à l'agriculture, à l'économie rurale, à la pharmacie, à la matière médicale & à tous les arts qui s'exercent sur les substances végétales. Voici une légère esquisse des principaux traits de ces applications importantes.

La germination.
Le développement des feuilles.
La floraison.
La fructification.
La maturation des fruits & des graines.
La formation successive de la gomme, de l'extrait, de l'huile, de la résine, des sels, du sucre, de la partie colorante, dans les différentes époques de la vie végétale.
L'accroissement du corps ligneux, de l'écorce, &c.

Les préparations pharmaceutiques des sucres, des extraits, des sels essentiels, des mucilages, des huiles, des résines, des gommes-résines, des eaux aromatiques, &c.

Les arts du sucrier, du confiseur, du meunier, du boulanger, de l'amidonier, du vigneron, du brasseur, des brûleurs de vin & d'eau-de-vie, du vernisseur, du teinturier, du papetier, de l'indigoier, des lacs, du linier, du parfumeur, du limonadier, de l'huilier, du favonier, du charbonnier, &c.

TITRE ONZIÈME.

DE LA FORMATION ET DE LA NATURE DES SUBSTANCES ANIMALES; THÉORIE DE L'ANIMALISATION.

I. C'est une vérité constante que les animaux ne peuvent point entretenir leur existence sans le secours des végétaux; aussi a-t-on dit depuis longtemps dans l'histoire naturelle, que les végétaux se forment des minéraux, & les animaux des végétaux. Mais si cette vérité est connue depuis longtemps, le mode du changement de ces corps les uns dans les autres, ou de leur conversion réciproque, n'a pas encore été déterminé. Cependant c'est sur ce point que doivent principalement s'exercer les travaux des chimistes; ce problème une fois résolu, donnera la connaissance exacte de tous ceux qui concernent l'économie animale. Déjà les découvertes modernes offrent quelques résultats utiles à cette grande recherche.

II. Le moyen le plus sûr de résoudre cet important problème, c'est sans doute de reconnoître d'abord avec exactitude les substances animales, de les comparer à celles du règne végétal, d'en rechercher avec soin la différence ou l'analogie. Il n'est pas douteux que ces différences une fois bien connues, puissent faire concevoir la cause à laquelle elles sont dues.

III. En prenant les résultats de toutes les analyses moderates faites sur le sang & les humeurs, ainsi que sur les parties solides qui proviennent manifestement de la concrétion des premières, on trouve pour principales différences des substances animales d'avec les substances végétales.

A. La propriété de donner beaucoup d'ammoniaque & des produits très-fétides par l'action du feu.

B. Celle de se pourrir plus facilement, plus promptement, & en répandant une odeur beaucoup plus infecte.

C. De donner beaucoup plus de gaz azote par l'acide nitrique.

D. De contribuer singulièrement à la formation de l'acide nitrique.

IV. Toutes ces différences semblent ne tenir qu'à la présence d'un principe beaucoup plus abondant dans les animaux que dans les végétaux, c'est celle de l'azote. On dirait donc qu'il suffiroit d'ajouter de l'azote aux matières végétales, pour les convertir en substances animales.

V. On doit cependant observer encore qu'à ces premières différences indiquées, & que l'on pourroit appeler *différences capitales*, peuvent être ajoutées quelques autres phénomènes particuliers, dont l'influence, quoique moins grande sans doute sur la composition animale, ne doit cependant point être négligée. Telle est entre autres la présence de l'acide phosphorique & des différents phosphates, sur-tout de ceux de soude, de chaux & d'ammoniaque, dans les humeurs animales. C'est à ces sels qu'est due la qualité particulière, & sur-tout la presque-incombustibilité des charbons de matières animales.

VI. Le principe particulier qui est si abondant dans ces matières, & qui les fait spécialement différer des substances végétales, l'azote, paroît donc être la cause efficiente des propriétés qui les distinguent, & sur-tout de l'espèce de concretsibilité ou de plasticité dont il sera bientôt question plus en détail. On peut donc assurer que si on enlevoit l'azote aux matières animales, on les feroit redevenir en quelque sorte végétales, comme pour convertir ces dernières en matières animales, il suffit d'y combiner ou d'y introduire de l'azote.

VII. On peut considérer toutes les matières qui forment les corps des animaux comme autant de principes immédiats, ainsi qu'on l'a fait pour les végétaux. On doit de même caractériser chacun de ces principes par l'énoncé de ses propriétés les plus frappantes. Ainsi en examinant & désignant de cette manière, le sang, le lait, la bile, la graisse, l'urine, &c., & les solides des animaux, en les décrivant par la méthode abrégée qui a été tracée dans le titre précédent, il en résultera une marche comparable qui fera connoître les rapports & les différences que nous cherchons.

VIII. Le SANG; fluide rouge, chaud, à 32 degrés dans l'homme, les quadrupèdes, les oiseaux, à la température du milieu qu'ils habitent dans les quadrupèdes ovipares, les serpents, les poissons; douceâtre, concrescible par le froid, miscible à l'eau, se séparant presque spontanément en trois substances différentes, le *serum blanc*, le *serum rouge* ou la partie colorante, & la *matière fibreuse*; offrant dans chacune de ces matières des caractères distinctifs, savoir, l'alcalinité du *serum*, sa coagulabilité par le feu, par les oxides métalliques, &c., sa coagulabilité due à la combinaison plus intime de l'oxigène; la même nature générale dans le *serum rouge*, qui ne diffère du blanc que par la présence de l'oxide de fer; la concrescibilité spontanée de la matière fibreuse, sa dissolubilité dans les alcalis. Ces principaux caractères doivent être considérés dans le sang entier, qui paroît être le principe primitif de toutes les substances animales, & l'origine commune de toutes les humeurs & de tous les solides. On l'a nommé de la chair couleure, en vertu de la fibre qui s'y concrète par le refroidissement. On a déterminé la cause de la chaleur dans l'alération & l'absorption de l'air vital par la respiration. On a également déterminé le renouvellement du sang par le chile & le changement de celui-ci en matière animale, par le dépaquement d'une grande quantité de carbone & d'hydrogène qui paroît avoir lieu dans le poulmon.

IX. Le LAIT; fluide blanc, doux & sucré, formé de *serum*, de fromage & de beurre intimement mêlés & représentant une véritable émulsion animale. Dans le *serum* du lait, on doit observer en particulier la matière appelée *sucre de lait*, & qui n'a pour ainsi dire que le caractère d'un sucre ébauché; la quantité de phosphate de chaux plus abondante que dans d'autres humeurs, & qui semble annoncer que la nature a voulu placer dans la première nourriture des animaux une quantité de base osseuse, relative à la rapidité nécessaire de la formation & de l'accroissement des os dans le premier temps de leur vie. Le fromage est une vraie matière albumineuse. Le beurre est une huile concrète, dont la solidité & la facile séparation du lait par le simple mouvement, paroissent tenir à l'absorption de l'oxigène atmosphérique pendant la formation de la crème.

X. La BILE; suc huileux & savonneux, composé d'une huile presque voisine de l'état de blanc de baleine & de soude, mêlé de liquide albumineux, formé dans le foie, viscère qui contient lui-même une grande quantité d'huile; tout annonce dans le système de cette glande volumineuse, une disposition, une organisation destinée à séparer du sang la grande quantité de graisse qui résulte du ralentissement de ce liquide dans le système veineux du bas-ventre. Cette considération destinée à faire quelque jour une des bases principales

de la physiologie annoncées ci-dessus, explique le volume du foie dans le fœtus qui n'a point respiré, comme dans les animaux qui n'ont point d'organe respiratoire semblable à ceux de l'homme, des oiseaux & des quadrupèdes; elle explique encore la naissance des maladies du foie, & sur-tout celle des concrétions ou pierres biliaires.

XI. La GRAISSE; espèce de matière huileuse formée aux extrémités des artères & le plus loin possible du centre du mouvement & de la chaleur animale, offrant une sorte de réservoir où se fixe la grande quantité d'hydrogène qui n'a pas pu s'évacuer par le poumon; huile unie à une proportion assez considérable d'oxygène, contenant en outre de l'acide sébacique. Cette manière de considérer la graisse est encore un des points les plus frappans de la physique animale moderne.

XII. L'URINE; fluide excrémental, plus ou moins coloré, acré & salin, remarquable par la grande quantité d'acide phosphorique libre, de phosphate de soude, d'ammoniaque & de chaux qu'il charie, plus remarquable encore par la présence d'un acide particulier qu'on n'a point encore trouvé dans d'autres humeurs animales; nommé aujourd'hui acide *lithique*, parce qu'il fait la base des calculs des reins & de la vessie, maladie connue sous le nom de *lithiasis*.

L'urine a été une source des découvertes les plus précieuses pour les chimistes, elle doit l'être encore davantage pour les médecins. Sans la considérer seulement comme une lessive destinée à entraîner hors du corps une grande quantité de matières salines qui nuirait à l'intégrité de ses fonctions, il faut y voir de plus une évacuation dont la proportion des principes en variant comme l'état du corps devient une sorte de mesure propre à en faire connoître les modifications en santé & en maladie, par une suite d'observations que les médecins ont déjà commencées sous d'honnêtes auspices; il faut la voir comme contenant toujours la matière des concrétions rénales & vésicales, qui se voient ne demander pour se former, qu'un séjour un peu plus long que celui que la nature a voulu qu'elle fit dans ses organes, ou un premier noyau, qui appelle en quelque sorte, les couches lithiques successives. Il faut encore observer dans l'urine les proportions de divers principes, & sur-tout des acides à nu qu'elle contient, du phosphate de chaux qu'elle entraîne, & qui, variant singulièrement dans les maladies des articulations, dans celles des aponévroses & des os, doivent devenir quelque jour entre les mains des observateurs habiles, des nouveaux moyens de connoître la nature de ces affections, d'en déterminer les progrès, & peut-être même d'en assurer la curation.

XIII. On ne peut dire ici que peu de choses des

autres fluides animaux, tels que l'humeur de la transpiration, de la sueur, le suc gastrique, la salive, l'humeur des larmes, le mucus nasal, le cerumen des oreilles, la liqueur féminale, &c. parce que tous ces fluides ont été peu examinés jusqu'ici. Tous ont sans doute leur composition particulière & diffèrent par quelques points, sur-tout par la proportion de leurs principes; quelques-uns de ces humeurs un peu plus connues par des expériences modernes, ont présenté l'union d'un mucilage particulier avec l'eau, la soude pure, le phosphate de chaux & le phosphate de soude. Tels sont les larmes, le mucus nasal & le sperme: les deux premiers ont offert de plus la propriété de s'épaissir par le contact de l'air & par l'absorption de l'oxygène; ce qui constitue vraisemblablement la maturité ainsi nommée de l'humeur dans le rhume de cerveau, même dans celui des poumons. La liqueur féminale a présenté le singulier phénomène de la cristallisation jusqu'ici inconnue du phosphate de chaux.

XIV. En considérant l'ensemble des matières solides qui composent les tissus si variés des divers organes des animaux, on peut diviser en trois genres principaux les substances qui les forment; le premier comprend l'albumine, le second est la gélatine, ou la matière gélatineuse, le troisième la matière fibreuse, ou la fibre: deux de ces corps ont été déjà distingués à l'article du SANG, N°. VIII. On ne fera que présenter rapidement ici les phénomènes constants qu'on peut regarder comme les caractères de chacun de ces genres.

I. GENRE.

L'*Albumine*; concrescible par la chaleur, par les acides, par les oxides, & en général par l'oxygène concret ou presque concret. Insoluble par les alcalis, se trouve plus ou moins condensée ou oxigénée & tissée dans les membranes, les tendons, les cartilages, & en général dans toutes les parties animales blanches.

II. GENRE.

La *Gélatine* partageant la solidité de la première dans la plupart des organes blancs, susceptible d'en être séparée & dissoute facilement par l'eau bouillante, à laquelle elle donne la forme de gelée en refroidissant; comme elle fait la base ou la plus grande partie de tous les organes blancs en général, ceux-ci sont susceptibles de se dissoudre plus ou moins complètement dans l'eau bouillante, & de former des gélées transparentes par le refroidissement de ces dissolutions.

III. GENRE.

La *Matière fibreuse*; insoluble dans l'eau &

toutes les températures, dissoluble dans les acides, condensée, concrétée & organisée dans la chair musculaire, qu'on doit regarder comme le vrai réservoir de toute la fibre contenue dans le sang; aussi en considérant les muscles comme les organes sécrétoires de cette matière fibreuse du sang, on doit en suivre toutes les modifications relatives à la quantité ou à la proportion qui s'en fixe dans les organes, & sur-tout par rapport à l'exclusion qu'ils paroissent lui donner dans plusieurs circonstances morbifiques, dans la vieillesse. &c.

XV. Ces trois matières, l'albumine, la gélatine & la fibre, dans un état de concrétion, de combinaison deux à deux, trois à trois, & sur-tout dans des proportions différentes, forment tous les solides des animaux; on les sépare les uns des autres par une analyse simple & facile; elles forment aussi beaucoup de liquides animaux, sur-tout l'albumine; seulement elles y contiennent moins d'oxygène plus d'eau, & y sont réunies avec des acides, des sels neutres, &c. Il faut observer que la gélatine est aussi peu abondante dans les fluides, qu'elle l'est beaucoup dans les solides; il paroît qu'elle prend sa nature de gélatine en passant des liquides dans les solides. L'albumine dissoute artificiellement par les acides, prend des propriétés analogues à celles de la gélatine.

XVI. La matière solide animale ou la substance osseuse, est encore un autre ordre de composition. Une grande quantité d'un sel terreux presque entièrement indissoluble, (phosphate de chaux) est amassé dans le tissu ou le parenchyme primitif de l'os. Tel est tout le mystère de la structure & de la composition de cet organe; c'est pour cela que l'os donne de la gelée par la décoction dans l'eau, beaucoup d'huile & d'ammoniaque par la distillation; une fois bien calciné ou brûlé, l'os n'est plus que du phosphate calcaire mêlé de quelques parcelles de carbonate, de muriate & de phosphate de soude.

XVII. Quand on traite toutes les matières animales précédentes, & sur-tout les liquides blancs épais ou les organes blancs par l'acide nitrique, on en dégage une quantité plus ou moins grande de gaz azote & de gaz acide prussique, qui ne paroît être qu'un combinaison d'azote, d'hydrogène & de carbone avec un peu d'oxygène. A mesure que ce changement de combinaisons dans les principes des matières animales a lieu par le moyen de l'acide nitrique, il semble qu'elles repassent à leur ancien état de matières végétales, dont elles ne diffèrent essentiellement, comme on l'a dit, que par la présence de l'azote, & par une complication plus grande dans le nombre des principes combinés qui les forment. Ainsi au lieu de composés ternaires comme sont les substances végétales, les

matières animales sont des composés quaternaires & même plus compliqués encore. L'azote est le quatrième principe primitif, qui est ajouté à l'hydrogène, au carbone & à l'oxygène.

XVIII. Ainsi la conversion des matières végétales en matières animales, qui ne consiste que dans la fixation ou l'addition de l'azote, doit être considérée comme le principal phénomène de l'animalisation, lui seul en explique les principaux mystères; & quand cette addition d'azote sera bien connue dans son mécanisme, la plupart des fonctions de l'économie animale qui l'exécutent ou qui en dépendent, seront également connues.

XIX. Ce qu'on sait déjà sur ce dernier objet, se borne aux considérations suivantes: ce n'est pas tant par une fixation d'une nouvelle quantité d'azote, que par la soustraction d'autres principes, qui augmente alors la proportion du premier, que ce phénomène a lieu. Dans la respiration, le sang laite exhale une grande quantité d'hydrogène & de carbone, soit simplement dissous dans le gaz hydrogène, soit porté à l'état d'acide carbonique par l'acte même de la circulation, & dans le système vasculaire, suivant quelques physiiciens modernes. L'hydrogène forme, dans les cavités des bronches, de l'eau qui s'exhale par l'expiration. Une portion d'oxygène paroît se fixer en même temps dans le sang pulmonaire, & roulant avec ce fluide dans les vaisseaux, il se combine peu à peu avec le carbone, de manière à former cet acide carbonique qui se dégage du sang veineux dans la poitrine. On conçoit qu'en dégageant ainsi une grande quantité d'hydrogène & de carbone, la respiration doit augmenter nécessairement la proportion de l'azote. L'étude qui reste à faire du mécanisme des autres fonctions, conduira sans doute à de nouvelles découvertes plus importantes encore que les précédentes; ce qu'on a fait dans ce dernier temps conduit naturellement à penser qu'on fera bien plus encore. L'analogie d'action qu'on a trouvée depuis quelques mois entre la digestion, la respiration, la circulation & la transpiration, a commencé à établir, sur de nouvelles vues beaucoup plus solides que celles que l'on possédoit jusques-là, une physique animale, qui promet une ample moisson de découvertes & d'avantages. Ce sera sans doute en suivant ces phénomènes de la digestion & de l'accroissement dans les jeunes animaux, qu'on élèvera sur ces bases un édifice solide. Déjà tout est prêt pour ce grand travail, plusieurs physiiciens suivent ce nouveau plan d'expérience; une ardeur nouvelle née de ces nouvelles conceptions, anime les savans qui s'occupent de cette partie de la physique. La route qu'ils viennent de s'ouvrir paroît devoir les conduire à des résultats plus précis & plus exacts, que tout ce qu'on a jusqu'à présent avancé sur les fonctions qui constituent la vie des animaux,

Application des articles de ce titre.

Les fonctions de l'économie animale, & sur-tout,
 La respiration.
 La digestion.
 L'hématose.
 La transpiration.
 La sécrétion de la bile.
 L'ossification & l'ostéogénie.
 La nutrition.
 Les maladies dépendantes de la dégénérescence
 des humeurs ;
 Les concrétions animales.
 L'action de beaucoup de médicaments sur les
 humeurs &c. ,
 Les arts qui s'occupent du traitement des ma-
 tières animales, & en particulier ceux du tanneur,
 du corroyeur, de préparer les différentes espèces
 de colles ; du faiseur de cordes à boyaux ; ceux
 d'extraire les huiles, de travailler les cornes, les
 os, les écailles, &c.

TITRE DOUZIÈME.

**DE LA DESTRUCTION SPONTANÉE DES
 MATIÈRES VÉGÉTALES ET ANIMALES.**

I. Lorsque les végétaux & les animaux sont pri-
 vés de la vie, ou lorsque leurs produits sont enlevés
 aux individus dont ils faisoient partie, il s'ex-
 cite entr'eux des mouvements qui en détruisent le
 tissu & en altèrent la composition. Ces mouve-
 ments constituent les diverses espèces de fermenta-
 tion. Le but de la nature en les excitant, est ma-
 nifestement de rendre plus simples les composés
 formés par la végétation & l'animalisation, & de
 les faire entrer dans de nouvelles combinaisons de
 différents genres. C'est une portion de matière
 qui, employée pendant quelque temps à la fabri-
 cation du corps des végétaux & des animaux, doit
 être rendue après la fin de leurs fonctions à de
 nouvelles compositions.

II. D'après cette définition de la fermentation
 en général, il semble qu'il devroit y en avoir au-
 tant de particulières & différentes qu'il y a de
 matières végétales ou animales à changer & à
 décomposer ; mais plusieurs d'entr'elles suivant
 une marche analogue pour être amenées à un état
 de composition plus simple, le nombre des fer-
 mentations a été porté à trois espèces savoir, la
 fermentation vineuse, la fermentation acétueuse,
 & la fermentation putride.

III. La fermentation vineuse, est, comme son
 nom l'indique, celle qui produit le vin ou l'alcool.
 La matière sucrée est la seule qui l'éprouve lorf-
 qu'elle est étendue d'une certaine quantité d'eau,
 & mêlée à une troisième matière végétale ou ani-

male quelconque, soit extrait, sel, féculé, &c. car
 il est bien prouvé aujourd'hui que le sucre & l'eau
 seule ne passent point à la fermentation vineuse.
 La substance sucrée est si abondante & si généra-
 lement répandue dans les matières végétales, &
 même dans les matières animales, qu'il y a un grand
 nombre de corps susceptibles de donner du vin
 ou de former de l'alcool. Tous les fruits doux &
 sucrés réduits en pulpe, & sur-tout leurs suc-
 cés exprimés, éprouvent un mouvement lorsqu'ils sont
 à 15 degrés au moins de température, lorsqu'ils
 sont en grande masse & sur-tout ni trop épais ni
 trop liquides. De-là la grande quantité de vins
 différents, en y comprenant sur-tout les décoctions
 des graines céréales germées & converties en
 partie sucrée par la germination, & même les
 liqueurs vineuses faites avec le lait, le miel, le
 sang, &c.

IV. La fermentation vineuse s'annonce dans les
 sucres sucrés par une augmentation de volume, la
 formation d'une écume abondante qui en couvre
 la surface, l'élévation de la température, le dé-
 gagement de beaucoup de gaz acide carbonique,
 la conversion d'une liqueur douce en un liquide
 acre, chaud & piquant.

V. La cause de cette fermentation paroît être
 due à une décomposition de l'eau, dont une grande
 partie de l'oxygène se portant sur le carbone du
 sucre, le brûle & le convertit en acide carbonique.
 En même temps l'hydrogène de l'eau se porte sur
 la matière du sucre, & en s'y combinant donne
 naissance à l'alcool ; ainsi l'on peut définir l'alcool
 du sucre moins une certaine quantité de carbone,
 ou plus une certaine proportion d'hydrogène.
 Cette théorie explique & la formation de l'aci-
 de carbonique dégagé pendant la fermentation
 vineuse, & celle de l'alcool, ainsi que toutes
 les propriétés de ce nouveau produit.

VI. L'alcool pur est un liquide blanc, d'une
 odeur forte, d'une saveur chaude & acre, vapo-
 risable à 64 degrés de chaleur, inflammable à
 toutes les températures, donnant beaucoup d'eau
 & d'acide carbonique en brûlant, ne répandant
 point de fumée par sa combustion, miscible à l'eau
 en toute proportion, en chassant l'air & une por-
 tion du calorique pendant qu'il s'y combine, dissol-
 vant les alcalis purs ou caustiques, décomposant
 les acides, & se convertissant en éther par cette
 décomposition, dissolvant les sels neutres déli-
 quesceus & beaucoup de sels métalliques, enle-
 vant aux végétaux l'huile volatile, l'arôme, la ré-
 sine, le baume, une partie de la gomme-résine &
 plusieurs matières colorantes, enfin utile à une
 foule d'opérations des arts par toutes ses pro-
 priétés.

VII. Déjà l'on peut remarquer que la formation

de l'alcool s'opère au dépens de la destruction d'un principe végétal, que la matière sucrée éprouve une décomposition qui la réduit à un terme plus simple; ainsi la fermentation vineuse ou alcoolique est un commencement de destruction des principes formés par la végétation; ainsi on peut la considérer comme un des mouvements établis par la nature pour simplifier l'ordre de composition que présentent les substances végétales.

VIII. La fermentation acide ou acétueuse est le second mouvement naturel qui contribue à réduire les composés végétaux à des états de composition plus simple. Cette fermentation qui donne naissance au vinaigre, n'a lieu que dans les liqueurs qui ont d'abord éprouvé la fermentation vineuse. On a remarqué que le contact de l'air étoit nécessaire pour la production du vinaigre. On a vu même l'air être absorbé par le vin qui tourne à l'aigre, & il paroit qu'une certaine proportion d'oxygène atmosphérique est nécessaire à la formation de l'acide acétueux.

IX. Il y a sans doute plusieurs autres fermentations analogues à celle qui forme le vinaigre, & dont on ne connoît pas encore bien le produit. Telle est, par exemple, celle qu'éprouve l'eau mêlée d'amidon, sous le nom d'eau sûre des amidoniers; telle est celle qui forme le pain aigri, le chou & les liqueurs aigres. Tous ces changements doivent être considérés comme des moyens de décomposition qui simplifient toujours les combinaisons compliquées des végétaux.

X. Enfin, après que les liqueurs végétales ou leurs parties solides humectées ont passé à l'état d'acide, leur décomposition en se continuant par les circonstances favorables, c'est-à-dire, par une température douce ou chaude, par l'exposition à l'air & par le contact de l'eau, les conduit à une putréfaction qui finit par en volatiliser, sous forme de gaz, la plupart des principes. Il se dégage de l'eau, de l'acide carbonique, du gaz hydrogène carboné & même sulfuré, de l'huile volatile en vapeur, quelquefois même du gaz azote & de l'ammoniaque; il ne reste plus après cela qu'un résidu brun ou noir, connu sous le nom de terreau, formé de carbone un peu huileux & gras, dont l'eau extrait encore quelques substances salines & un peu de matière extractive.

XI. La nature en organisant les animaux, en formant leurs humeurs & leurs solides par des compositions compliquées, a mis en eux un germe de destruction qui se développe après la mort des individus.

Cette destruction s'opère par le mouvement qu'on a nommé putréfaction, & qui consiste dans une espèce de fermentation, une décomposition entre de ces substances liquides ou solides: leur

ordre de composition plus compliqué que celui des matières végétales, les rend encore plus susceptibles de la décomposition putride.

XII. Les matières animales composées d'hydrogène, de carbone, d'oxygène & d'azote, souvent plus compliquées encore par l'union du soufre, du phosphore, &c. privées de ce mouvement & surtout de ce renouvellement qui constituent la vie animale, s'altèrent bientôt par des attractions plus simples entre chacun de leurs principes, qui tendent à s'unir deux à deux. Cette réaction donne naissance à des composés binaires, tels que l'acide carbonique, l'acide nitrique, l'ammoniaque, le gaz hydrogène carboné, qui se dégagent peu à peu dans l'atmosphère en diminuant proportionnellement la masse des matières animales. C'est ainsi, & par une suite de la décomposition naturelle, qu'on voit ces matières se ramollir, changer de couleur, d'odeur, perdre leur tissu, leur forme, répandre dans l'atmosphère des vapeurs & des gaz qui s'y dissolvent, & qui vont porter dans d'autres corps, & sur-tout dans les végétaux, les matériaux nécessaires à leur formation.

XIII. Tous les phénomènes de la putréfaction des matières animales tiennent au mécanisme qui vient d'être exposé. On voit dans l'union de l'hydrogène & de l'azote la formation de l'ammoniaque, qu'on a regardé comme le principal produit de la putréfaction. La combinaison du carbone avec l'oxygène explique la formation & le dégagement de l'acide carbonique, dans lequel on faisoit consister vers les premiers temps de la découverte des gaz, tous les mystères de la putréfaction. L'acide nitrique, à la formation duquel on s'oit que les matières animales contribuent tant dans les nitrières artificielles, tient à l'union de l'azote & de l'oxygène; une certaine quantité de gaz hydrogène se dégage en emportant du carbone, du soufre & même du phosphore; de là l'odeur infecte si variée & la phosphorescence de toutes les matières animales qui se pourrissent.

XIV. Lorsque tous ces principes volatils se sont unis deux à deux & répandus dans l'atmosphère, il ne reste plus que quelque portion de carbone unie ou mêlée aux substances salines fixes, telles que les phosphates de soude & de chaux. Ces résidus forment une espèce de terreau, qu'on nomme terre animale, qui retient souvent un peu de gaz hydrogène sulfuré & carboné, un peu de graisse & d'extract, & dans lequel les végétaux trouvent abondamment les principes propres à la formation de leurs matériaux; voilà pourquoi ce résidu animal est si propre à servir d'engrais quand il est suffisamment consommé.

XV. Une certaine quantité d'eau est nécessaire à cette décomposition putride des matières animales;

males; elle leur fournit la quantité d'oxygène nécessaire à la composition de l'acide carbonique & de l'acide nitrique; elle contribue singulièrement à la naissance de ce mouvement par les attractions de l'oxygène qu'elle y porte. Sans doute aussi l'hydrogène provenant de cette décomposition de l'eau contribue beaucoup à la formation de l'ammoniaque; car c'est un fait bien connu, que lorsque les matières animales sont délayées dans une grande quantité d'eau, elles fournissent abondamment de l'ammoniaque dans leur décomposition.

XVI. La putréfaction consistant dans une suite d'attractions particulières, est modifiée de bien des manières différentes par toutes les circonstances extérieures, telles que la température, le milieu qu'occupent les matières animales, l'état plus ou moins pesant, sec ou humide de l'atmosphère, &c. C'est ainsi que les cadavres enfouis dans la terre, ou plongés dans l'eau, ou suspendus dans l'air, éprouvent des effets variés, auxquels leurs masses, leurs quantités, leur voisinage avec d'autres corps, ainsi que toutes les propriétés variables des trois milieux indiqués ici, donnent encore des formes nouvelles & diverses.

XVII. On a des preuves de cette assertion dans ce qui arrive aux cadavres enterrés seuls à seuls, ou enfouis en masse & entassés les uns sur les autres. Les premiers, entourés d'une grande quantité de terre, sont bientôt détruits par la putréfaction, dont les produits aériennes ou liquides sont absorbés par cette masse terreuse ou par l'atmosphère; les seconds n'ayant point autour d'eux cette espèce de récipient terreux ou atmosphérique, séjourment long-temps sans se détruire; la matière animale s'y convertit toute entière en ammoniaque & en huile concrète: celle-ci forme avec l'alcali volatil un savon semblable à celui qu'on a trouvé dans le sol des cimetières surchargés de cadavres.

XVIII. Dans l'eau les phénomènes de la destruction des matières animales sont encore différents; à mesure que de nouveaux produits se forment, l'eau les dissout & les entraîne dans l'air. Une humidité soutenue avec une température constante de quelques degrés au-dessus de 0, favorise la putréfaction & la dissolution de ces matières en gaz. Un air sec & chaud au contraire en volatilise l'eau, dessèche, racornit les corps animaux, & les conserve, presque comme un fable sec & brûlant le fait dans l'Egypte, si fertile en momies naturelles.

XIX. Quoique toutes les circonstances de la putréfaction, toutes les variétés presque innombrables des phénomènes qu'elles présentent n'aient point encore été connues ni décrites, on reconnoît cependant que tous ces phénomènes se bornent à changer des composés compliqués en composés plus simples, que la nature rend ainsi à de nouvelles combinaisons les matériaux qu'elle n'a point en quelque sorte que prêtés aux végétaux &

Chimie. Tome II.

aux animaux, & qu'elle exécute ainsi ce cercle perpétuel de compositions & de décompositions qui en attellent la puissance, en montrent la fécondité, en même-temps qu'elles annoncent une marche aussi grande que simple dans ses opérations.

Application des propositions de ce dernier titre.

Outre tous les objets indiqués à la fin des deux titres précédens, auxquels les articles de celui-ci peuvent fournir des applications presque immédiates, on trouve dans les divers exposés de ce douzième titre les applications suivantes:

La conservation de toutes les substances extraites des végétaux.

Les diverses altérations spontanées qu'elles éprouvent; le fermentations acétuse vineuse, &c.

Les produits de ces altérations souvent employés aux besoins des arts.

La production de l'ammoniaque & de l'acide nitrique.

L'influence de la putréfaction dans les régions diverses des corps vivans.

La contagion & les maux produits par les vapeurs des matières putréfiées.

La théorie de l'emplacement & du service des hôpitaux, des égouts, des latrines, des voiries, des cimetières, &c.

AXONGE. *Axungia* des latins! *Pharmacie.* Ce mot, d'après son étymologie, paroît désigner strictement une substance propre à oindre les effluës des roues; *axium unguen.* Aussi est-il employé dans Galien & les anciens écrivains, pour désigner une graisse de cochon vieille & rancie, que les Grecs nommoient *axungion* ou *axyngion*. Cependant par la suite ce mot a été adopté généralement pour désigner indistinctement toutes les espèces de graisses fournies par les animaux; & c'est en ce sens qu'on le trouve souvent employé dans les pharmacographes; mais nous n'adoptons pas cette dénomination, & nous renvoyons au mot GRAISSES l'exposition des préparations & des propriétés de ces substances.

Des pharmacographes amateurs du merveilleux, ont donné le nom d'*axonge* à des substances très-différentes de la graisse. Schroder dans sa pharmacopée, fait mention de deux espèces d'argile qu'il nomme *terres sigillées d'Allemagne*; l'une, dit-il, que l'on nomme *frigienne*, à cause de la ville de Striga en Silésie, est jaune, & on la nomme souvent *moëlle* ou *axonge du soleil*, parce qu'on ajoute-t-il, on croit qu'elle est empreinte du soufre du soleil, & propre aux maladies du cœur. L'autre espèce surnommée *liguene*, est encore appelée *axonge de la lune*, parce qu'on l'a cru pénétrée du soufre de la lune, & que d'après cela on la regardoit comme efficace dans les maladies de la tête, &c.

On a encore donné le nom d'*axonge* de verre ou *fleur de cristal*, à la substance salinac qui surnage les

matières vitrifiables qui sont en fusion dans les creusets des verreries, & que l'on en tire comme une écume inutile. Cette substance saline que l'on nommoit *axonge de verre*, a été recommandée comme un fondant, un résolvant très-efficace, sur-tout contre les maladies de la peau.

AZEDARAC ou LILAS DES INDES. *Melia azedarach*, *Azedarach*, *Dod. pempt.* 848. (Pharmacie.) Bel arbrisseau qui a ses feuilles plus découpées que celles du frêne, d'un verd gai, fort agréable. Il croît spontanément en Syrie, au Japon, dans le Ceylan, aux Indes, & se trouve naturalisé en Languedoc & en Provence. Il mérite une place dans les bosquets d'été ; mais il faut lui donner une bonne exposition.

La décoction de ses feuilles & de ses fleurs est apéritive, dissolvante, propre contre les obstructions. Les habitants du Malabar en font usage dans les maladies pestilentielles & malignes. Les feuilles en cataplasme sont employées avec succès contre la morsure des animaux venimeux ; le fruit de cet azedarach est très-dangereux ; il a la propriété de faire mourir les poux ; son noyau sert à faire des chapelets. Thunberg rapporte que ce fruit est mûr au Japon au mois de Décembre, que les Japonais le concassent & le font bouillir, pour le mettre à la presse, afin d'en extraire l'huile qui a la consistance du suif, avec laquelle ils fabriquent des chandelles à leur usage.

(M. WILLEMET.)

AZÉDARAC CILIÉ. (Pharmacie.) *Melia azadirachta*, ou **MARGOUSIER DE L'EUROPE.** *Olea Malabarica*, *fraxini folio*. *Pluk. Alm.* 269, & 247. Arbre élevé, toujours verd, dont les fruits ont la forme de petites olives. On en tire une huile par expression, dont les habitants du Malabar font usage pour les plaies, les piquures, les contractions de nerfs, & qui sert aussi à la teinture. Cet arbre croît dans les Indes orientales, au Malabar, à Ceylan.

Les Indiens font bouillir les feuilles de cet azedarach dans de l'eau, pour des bains qu'ils administrent dans la petite vérole & pour adoucir les douleurs des articulations. Les feuilles séchées, pulvérisées & mêlées avec l'huile du fruit, forment un excellent remède contre les spasmes, les convulsions & les douleurs des membres.

(M. WILLEMET.)

AZÉROLIER DE VIRGINIE. (Pharmacie.) *Crataegus coccinea*, *Mespilus Virginiana*, *colore rutido*, *C. B.* 453. Cet azérolier se trouve en Virginie & au Canada. Son fruit a les mêmes propriétés que celles des précédents.

(M. WILLEMET.)

AZÉROLIER. (Pharmacie.) *Crataegus azarolus*, *Mespilus epifolius laciniatus*, *C. B.* 453. Arbre mé-

diocre qui se trouve aux environs de Florence, de Montpellier, en Italie. Il mérite une place dans les bosquets du printemps pour la beauté de ses fleurs ; il pourroit aussi occuper une place dans les bosquets d'automne, à cause de son fruit qu'on nomme *azérole*. Cet arbre convient encore dans les remises ; parce que son fruit attire les oiseaux & le gibier ; on orne de ses baies les desserts, quoiqu'elles soient fades. En Provence, on est dans l'usage de les confire ; elles font astringentes, fortifient l'estomac, arrêtent le vomissement & la diarrhée.

(M. WILLEMET.)

AZÉROLIER ERGOT DE COQ. (Pharmacie.) *Crataegus erus galii*. Cet azérolier est indigène à la Virginie, à la Caroline, à la Géorgie & à la nouvelle Angleterre. Les baies de cet arbre & de l'espèce précédente, sont d'un beau rouge. Elles sont officinales dans l'Amérique septentrionale. On leur donne les mêmes vertus qu'à l'azérolier ordinaire.

(M. WILLEMET.)

AZOTE. Nom substantif masculin, qui signifie la base d'un gaz nommé *gaz azote*, lequel est un des matériaux fluides élastiques qui composent l'atmosphère. Ce mot est tiré de deux mots grecs, *a*, privatif & *zoo* vie ; il exprime que ce gaz ne peut pas servir à entretenir la respiration, à conserver la vie ; il est opposé au mot *air vital*, qui désigne l'autre fluide élastique, formant avec le précédent l'air atmosphérique. Quoique l'on se réserve d'examiner à l'article **GAZ AZOTE** toutes les propriétés de ce fluide, il est indispensable de donner ici quelques notions générales sur sa base. Tout fluide aërien étant un composé d'une matière quelconque & de calorique, une dissolution invisible & fluide élastique d'un corps quelconque simple ou composé dans le calorique, tous ces fluides doivent porter un nom qui exprime leur manière d'être générale, leur forme d'air ; & telle est exactement la valeur du mot *gaz*. Puis chacun d'eux doit être particulièrement caractérisé par un second mot qui désigne la matière particulière, l'espèce de base qui est dissoute dans le calorique. Le mot *azote* indique donc la base du gaz azote, la substance qui y est fondue par le calorique en fluide élastique ; & il est employé seul pour désigner la présence de cette base séparée du calorique, & n'ayant plus la forme de gaz que ce principe lui donne, lorsqu'il est combiné avec lui. Comme la base du gaz azote entre dans un grand nombre de combinaisons, où elle est privée de son dissolvant gazeux, on dit alors que l'azote est combiné avec tel ou tel corps, &c.

Voici ce qui caractérise l'azote, en le considérant sous ce point de vue. Comme toutes les bases des différents gaz, l'azote peut prendre la forme liquide ou solide, & avoir même toutes fortes de densités possibles dans ces deux états ; c'est l'azote seul qui fait la matière pesante du gaz azote.

Il existe dans l'acide nitrique dont il fait le radical acidifiable, & il y est combiné avec l'oxygène. C'est pour cela que quand on enlève tout l'oxygène à l'acide nitrique, on le réduit à l'état d'azote qui ordinairement dans la décomposition de cet acide trouve assez de calorique libre, pour se dégager sous la forme de gaz. Lorsqu'on traite l'acide du nitre par un corps très-avide d'oxygène, comme le fer, & lorsqu'on aide leur action réciproque par la chaleur, au lieu d'obtenir du gaz nitreux, on n'obtient que du gaz azote; ce qui prouve qu'on a entièrement décomposé l'acide nitrique. Cette décomposition qui met à nud l'azote, s'opère en vertu d'une double aïnéité, celle de la matière combustible pour l'oxygène de l'acide nitrique, & celle du calorique pour l'azote. En général le calorique aide de la lumière, tend à séparer l'oxygène de l'azote; & voilà pourquoi ce dernier ne s'unit point à l'oxygène, tant qu'ils sont tous les deux sous forme de gaz. Aussi la formation de l'acide nitrique dans les nitreries artificielles, & par la décomposition des matières animales, n'a-t-elle lieu qu'autant que l'azote se dégaugeant dans l'état liquide, s'unit à l'oxygène atmosphérique.

L'azote est un des principes de l'ammoniaque; il est sous trois formes dans cet alcali, suivant que ce sel est lui-même ou gazeux, ou liquide, ou solide; il y est uni avec l'hydrogène; il en est séparé par l'éclatelle & la commotion électrique, par l'action d'une vive & longue lumière, par l'acide nitrique, par l'acide muriatique oxygéné, par les oxides métalliques. L'azote ne s'unit à l'hydrogène pour former l'ammoniaque, que dans l'état liquide, & non dans celui de gaz, qui s'oppose en général à la combinaison de ces deux corps. Cette observation est immédiatement applicable aux circonstances dans lesquelles se forme l'ammoniaque au sein des matières animales décomposées par le feu ou par la putréfaction, ainsi qu'à la même formation qui a souvent lieu dans les dissolutions métalliques faites par l'acide nitrique. (Voyez l'article AMMONIAQUE.)

L'azote ayant été démontré dans l'ammoniaque, j'ai pensé qu'il existoit aussi dans les deux alcalis fixes & dans les terres alcalines. Je me suis fondé sur ce que plusieurs de ces substances accompagnent toujours les matières animales chargées d'azote, comme on le fait; sur ce qu'ayant toutes le caractère alcalin commun, il paroîtroit naturel de leur attribuer à un principe commun; sur ce que plusieurs de ces substances alcalines paroissent susceptibles de se convertir les unes dans les autres, & sur-tout capables de fournir toutes de l'ammoniaque par l'addition de l'hydrogène; enfin sur ce que l'azote libre ou seulement fondu dans le calorique en état de gaz azote, sembloit réunir la plupart des propriétés alcalines; mais toutes ces idées ne sont point appuyées sur un assez grand nombre d'expériences; pour autoriser la dénomination d'*alcaligène*, que j'avois proposée pour désigner l'azote, & il ne faut

les ranger encore que dans la classe des hypothèses. Voyez le mot ALCAÏS.

On ne connoit point d'union entre l'azote & l'eau: on fait qu'il est indissoluble, ainsi que dans les corps combustibles, solides ou liquides; on a seulement remarqué que le charbon chaud absorbe le gaz azote, & semble en fixer pour quelque temps au moins la base. Voyez GAZ AZOTE.

Il est également inconnu que l'azote puisse s'unir aux acides & aux alcalis; peut-être ces combinaisons existent-elles & ont-elles seulement échappé jusqu'ici aux recherches des chimistes.

On commence à entrevoir la combinaison de l'azote avec quelques oxides métalliques; mais les loix & les propriétés de ces combinaisons sont bien peu connues encore, & ce qu'on en fait, suffit seulement pour engager à les étudier.

C'est dans les matières végétales & animales que l'azote semble jouer un de ses plus grands rôles: les premières n'en contiennent pas à beaucoup près aussi abondamment que les secondes. Il est même plusieurs matériaux immédiats des végétaux, tels que le mucilage, le sucre, qui ne paroissent pas contenir un atome d'azote, au lieu que toutes les matières animales connues en contiennent une quantité plus ou moins considérable. Il est clair que l'azote qui fait partie des matières animales, leur donne en grande partie les caractères qui les distinguent des substances végétales, & particulièrement la propriété de fournir de l'ammoniaque à la distillation & de l'acide nitrique par la putréfaction; aussi celles des substances végétales dont l'azote est un des principes se rapprochent-elles des substances animales par les mêmes caractères; elles brûlent avec une odeur fétide; elles donnent une huile épaisse & de l'ammoniaque à la distillation; elles se pourrissent promptement; c'est à cause de ces caractères que les chimistes long-temps avant de connoître la nature intime de ces substances, & d'y soupçonner la présence de l'azote dont ils ignoroient alors l'existence, avoient nommé ces matières végéto-animales.

L'azote contenu dans les substances animales & végéto-animales, en est facilement dégagé par les corps qui, en s'unissant à la base de ces substances, & en altérant leur nature par l'oxygène qu'ils y portent, fournissent en même-temps du calorique qui dissout le premier principe en fluide élastique. Telle est la manière d'agir de l'acide nitrique sur les matières animales, d'où il dégage une grande quantité de gaz azote, ainsi que de toutes les substances végétales qui fournissent de l'ammoniaque à la distillation. (Voyez les mots ANIMALES, ANALYSE, ANIMALISATION, &c.)

La nature intime de l'azote n'est pas connue; on la regarde jusqu'à présent comme un corps simple, ou plutôt indécomposé, parce qu'on n'en a point fait l'analyse. Il mérite toute l'attention des chimistes, soit à cause de la grande quantité qu'en contient l'atmosphère, & qui annonce une vaste destination par la nature, soit à cause de ses

attractions & des composés déjà connus, dans lesquels il entre. Il y a quelques mois, (& j'écris ceci en avril 1792,) que l'on annonça parmi les étudiants à Paris, que M. Séguin avoit trouvé la nature de l'azote; mais cette assertion n'a point été confirmée; j'ai moi-même pris sur ce fait important les renseignements nécessaires auprès de M. Séguin, & il a bien voulu me tendre compte de l'expérience qui lui a fait concevoir cette espérance, & qui avoit donné lieu à l'assertion citée parmi les amateurs de la physique. Je crois devoir consigner ici un court exposé de cette expérience, & j'entrerai dans de plus grands détails à cet égard au mot GAZ AZOTE. M. Séguin ayant distillé du muriate furoxigéné de potasse bien pur avec du charbon, obtint une quantité notable de gaz azote mêlé avec l'acide carbonique; il présuma que l'azote pourroit bien être de l'acide carbonique furchargé de carbone; mais ce ne fut qu'une idée générale à laquelle il ne fit pas lui-même plus d'attention, & il n'y attacha pas plus de confiance que ne doit le faire un physicien éclairé. Sans doute cette expérience offre un résultat singulier; elle mérite d'être suivie avec beaucoup de soin, répétée avec une grande attention, & variée de plusieurs manières. Elle contient peut-être le germe de plusieurs grandes découvertes, mais il faut qu'elle soit confirmée & accompagnée de toutes les recherches exactes qu'un pareil énoncé exige. J'ai lieu de croire que d'ici à ce qu'on imprime les mots GAZ dans ce dictionnaire, il me sera permis de recueillir plusieurs faits nouveaux sur ce point très-intéressant de l'histoire de l'azote; mais dans l'état actuel de nos connoissances, on ne peut ranger l'azote que parmi les substances indécomposées, & le caractériser par son influence remarquable dans la composition de l'atmosphère, sa propriété d'exister en grande quantité dans les matières animales, celle de former l'ammoniaque & l'acide nitrique; il présente beaucoup d'autres propriétés importantes dans l'état de gaz; elles seront exposées avec tous les détails convenables à l'article GAZ AZOTE. (Voyez ces mots.)

AZOTH. Il est important de ne pas confondre ce mot avec celui qui est employé dans la nouvelle nomenclature méthodique pour exprimer la base du gaz atmosphérique délétère-oppoité par ses propriétés à celles de l'air vital. Outre la manière d'écrire le mot nouveau *azote*, si différente de l'orthographe de celui dont il est question dans cet article, l'*azote* des alchimistes s'assignoit toute autre chose. Tantôt c'étoit le mercure des philosophes, le principe ou la terre mercurielle de Becher; tantôt on appelloit ainsi le secret de la pierre, ou la pierre philosophale elle-même; pour d'autres chimistes l'azoth étoit une espèce de dissolvant universel ou d'alkali; enfin il en étoit, qui d'après l'idée sublime qu'ils s'étoient formée de l'azoth, décomposoient de ce nom les préparations souvent abusives

des qu'ils propoioient comme remèdes. Aujourd'hui l'azoth n'est plus rien.

AZYME. (*Pharmacie*) Le pain azyme, le *pain à chanter*, est de la farine detrempee seulement avec de l'eau, & qu'on a point subi de fermentation. On s'en sert en pharmacie pour envelopper les opiates, les bols, les pilules, &c., d'une saveur & d'une odeur désagréable, dans le moment où les malades vont les prendre, afin de leur ôter le désagrément qui accompagne ces espèces de médicaments. On trempe ou on humecte d'eau un morceau de ce pain, on le plie en double ou en triple couche sur le médicament qu'on veut envelopper, & le malade avale commodément cette préparation faite dans une cuiller & accompagnée d'un peu d'eau; elle glisse & passe facilement dans le gosier. Il y a des personnes dont l'arrière-bouche est si irritée qu'elle se refuse à l'approche de ce bol, & qu'elles ne peuvent pas l'avaler.

AZUR. (*Métallurgie*.) Verre bleu réduit en poudre, résultant de la fonte du minerai de cobalt avec les mélanges nécessaires. Il n'y a pas longtemps que l'on a mis le cobalt au rang des métaux; M. Brandt l'a reconnu en 1735, & d'autres chimistes après lui, dont M. Sage est du nombre. Nous ne traiterons point ici de l'analyse de ce minerai, elle appartient à la chimie; nous ne parlerons pas non plus de ses différentes couleurs, de la variété de ses formes &c., ce qui est du ressort de la minéralogie, notre objet, n'est ici que de décrire les procédés en usage pour obtenir de ce minerai le verre d'azur par la fonte en grand.

M. Sage fait connoître que le minerai de cobalt se trouve rarement pur, qu'il est souvent mêlé avec le fer, l'argent, le cuivre, le zinc & le bismuth; nous décrivons la méthode d'en retirer ce dernier demi-métal avant que d'en faire l'azur. Nous avons remarqué qu'il n'est pas des mines de la baxe & de la Bohême, que le minerai de cobalt s'y trouve plus communément dans les filons de minéraux d'argent de toutes les variétés, que seul dans des filons particuliers.

Les mines d'argent de *Marientberg*, d'*Annaberg*, de *Schneeberg*, *Johan-Georgen-Stadt*, de *Joachimthal*, &c. contiennent toutes des minerais de cobalt, ainsi qu'on peut le voir dans nos voyages métallurgiques, page 491 & suivantes du tome second; mais on les sépare de ceux d'argent & autres, aussi exactement qu'il est possible, par le triage, le lavage & même le bocadage. Voyez ces manipulations dans ce dictionnaire au mot MINES, à la suite de leur exploitation.

Comme le bismuth se mêle plus intimement avec le minerai de cobalt que tout autre métal ou demi-métal, on ne peut souvent en faire la séparation ni par le triage ni par le lavage; dans cette circonstance on a recours à l'action du feu qui, en faisant fondre le bismuth, laisse le cobalt seul.

Voici la méthode & l'appareil que l'on employe à Schneeberg pour faire cette séparation.

On place parallèlement cinq tuyaux de fer coulé sur les murs d'un fourneau, & surmontés d'une voûte qui recouvre le tout; ces tuyaux ont 4 pieds de long & 9 pouces de diamètre; leurs extrémités sortent un peu des parois extérieures du fourneau, & afin de faciliter l'écoulement du bismuth à mesure qu'il fond, ces tuyaux sont inclinés d'environ 30 degrés vers la partie antérieure du fourneau, où ils sont bouchés avec une brique lutée d'argile; à la partie inférieure de cette brique, est une petite entaille, par laquelle le bismuth s'écoule à mesure qu'il fond; il est reçu dans une capsule de fer placée en-dessous, mais un peu élevée afin que l'on puisse la chauffer avec un petit feu de charbon, & y entretenir ce demi-métal en fusion.

C'est dans les cinq tuyaux ou cylindres de fer dont nous avons parlé, que se met le minéral de cobalt mêlé avec le bismuth, qui s'y trouve disséminé, & le tout concassé en petits morceaux; on en fait entrer depuis cinquante jusqu'à soixante-cinq livres dans chaque cylindre, on l'y introduit par leur partie postérieure qui est la plus élevée, & que l'on bouche avec une porte de fer adaptée à chaque tuyau. L'on fait un feu de bois dans la chauffe qui est en dessous desdits tuyaux; la flamme qui passe entre eux & réverbère par la voûte supérieure, les a bientôt suffisamment chauffés pour faire fondre le bismuth, qui, comme nous l'avons dit, coule dans les capsules de fer d'où on le puise avec une cuiller, pour le verser dans des lingotières. Pendant le cours de la fonte, on a soin de remuer de temps en temps le minéral avec une verge de fer, afin que le bismuth ne soit point arrêté dans les tuyaux.

Lorsque le fourneau est échauffé, la fonte dont nous venons de rendre compte ne dure qu'environ trente à quarante minutes, après quoi on retire le cobalt des tuyaux de fer, & on y met d'autre minéral dont on veut retirer le bismuth, & on procède de même tant que l'on en a en provision.

Le bismuth obtenu de cette fonte, est vendu dans le pays environ vingt sols la livre.

Le cobalt retient toujours un peu de bismuth après cette opération; mais il est employé à faire l'azur à Schneeberg, où il se vend depuis 34 jusqu'à 37 liv. 10 sols le quintal.

Il est des espèces de cobalt qui n'exigent point d'être grillées avant que d'en faire l'azur; mais la majeure partie de ces minerais ne donnent que peu de couleur au verre sans un grillage préalable, & la couleur qui en résulteroit n'auroit pas l'éclat qu'elle doit avoir. L'on est donc forcé de griller ou calciner ceux qui contiennent une grande quantité d'arsenic, afin d'en dégager cette substance volatile; pour cet effet, on met le minéral de cobalt sur l'aire ou sol bien pavé

d'un fourneau de réverbère qui, d'un bout, a sa chauffe où l'on entretient un feu de bois, & de l'autre une cheminée pour recevoir les vapeurs volatiles.

Si on veut profiter de l'arsenic qui s'en dégage, l'on fait partir du haut de la cheminée une espèce de galerie construite soit en pierre soit en bois, soutenue horizontalement par des piliers, & qui a vingt, trente, quarante & cinquante toises de longueur, & assez grande pour qu'un homme puisse y passer; les fumées qui s'émanent du minéral suivent ce canal. Partie de l'arsenic qui se sublime du minéral, s'y condense sous la forme d'une farine blanche qui s'attache aux parois de la galerie, le surplus passe en fumée par une petite cheminée, qui est perpendiculairement élevée à l'extrémité du canal; lorsqu'il y a beaucoup d'arsenic de rassemblée, on le retire avec précaution, de crainte de s'empoisonner. Si le cobalt est pyriteux, l'arsenic a une couleur jaunâtre, ce qui fait un vrai réalgar.

L'on ne met que trois à quatre quintaux de cobalt à la fois dans le fourneau; on a soin de le remuer souvent, afin d'en faciliter l'évaporation des parties volatiles; trois ou quatre heures d'un feu modéré suffisent ordinairement pour opérer la calcination du cobalt, ce qui d'ailleurs dépend de sa qualité; car s'il en est des espèces qui exigent une calcination forte, il y en a d'autres qui ne peuvent la soutenir sans occasionner une perte considérable, en ce qu'ayant perdu de leur substance colorante, ils ne peuvent pas supporter une aussi grande quantité de cailloux ou quartz; si au contraire, ils ne sont pas assez grillés, ils ne donnent qu'une couleur foible ou mauveuse; l'expérience seule peut apprendre à déterminer les degrés de feu & le temps qu'il faut employer au grillage de chaque espèce de minéral de cobalt.

Nous ayons déjà vu qu'il y a des minéraux de cobalt qui peuvent être employés à faire l'azur sans grillage, d'autres qui exigent cette opération avec des degrés différents de feu; mais les uns & les autres doivent tous être bien pulvérisés & tamisés séparément, on en fait ensuite les mélanges dans les proportions convenables, suivant le degré de la couleur que l'on veut en obtenir; mais avant que de faire ces mélanges pour la fonte en grand, on commence toujours à faire les essais en petit des différentes espèces, le résultat desquels sert à régler les proportions convenables pour obtenir l'intensité de la couleur conforme aux échantillons qui leur servent de modèles; les Saxons l'attrapent parfaitement: c'est d'après ces essais en petit, que le prix du minéral de cobalt est déterminé par le conseil des mines, en comparant le résultat de ces essais avec les échantillons d'azur, qui, pour cet effet, sont conservés.

On ajoute ordinairement dans les essais trois

parties de quartz ou caillou pulvérisé, sur une de cobalt, avec les sels ou sels ordinaires en cette circonstance ; mais si le verre de ces essais est d'une couleur bleue plus foncée que celle d'aucun des échantillons servant de modèle, on procède à un nouvel essai avec addition d'une plus grande quantité de caillou, comme de six ou même neuf parties sur une de minéral, alors ce minéral est payé aux compagnies qui en font la livraison à la fonderie, beaucoup plus cher que lorsqu'il ne peut colorer d'une nuance donnée, que trois parties de quartz ; lorsqu'un minéral fondu avec trois parties de quartz, donne une couleur bleue semblable à celle du modèle qui porte trente livres pour taxe, le quintal de ce cobalt est payé ce prix ; mais si avec six parties de quartz ce minéral a donné une couleur semblable, il est payé le double, c'est-à-dire, 60 liv. & 90 liv. Si avec neuf parties de quartz il a produit un verre de la même intensité de couleur, il est rare que le cobalt soit payé aussi cher, parce qu'il en est peu qui puisse supporter autant de quartz, & fournir une belle couleur : les prix ordinaires sont depuis 20 liv. jusqu'à 48 liv. 15 s. le quintal à Joachimsthal en Bohême, où la taxe du minéral de cobalt se fait ainsi que nous venons de la rapporter.

La taxe des minerais de cobalt est un peu différente en Saxe ; elle a été réglée depuis 22 liv. 10 s. jusqu'à 45 liv. le quintal ; on n'y ajoute, dans les essais que l'on en fait, qu'une partie de caillou sur une de minéral, & on y compare les produits aux échantillons, ce qui en détermine le prix ; mais il est permis aux compagnies de faire répéter les essais en y ajoutant beaucoup plus de caillou ou quartz, ainsi que cela se pratique en Bohême, d'où il arrive que lorsque le cobalt est d'une excellente qualité, il se paye beaucoup plus cher que ne le porte la taxe ; enfin son prix va jusqu'à 90 liv., & même quelquefois à 135 liv. le quintal, faisant le double ou le triple de 45 liv., qui est la plus forte taxe portée par le tarif.

De la fonte en grand des minerais de cobalt pour en faire l'azur.

Tous les fourneaux dont on se sert pour cet objet font à réverbère, c'est-à-dire, qu'il n'y a que la flamme du combustible qui opère la fonte du cobalt & des substances qui lui sont ajoutées. Mais ces fourneaux diffèrent dans leur construction : les uns, comme en Bohême, sont carrés tant intérieurement qu'à leur extérieur ; les autres sont ronds & conséquemment moins de bois : ce sont les Saxons qui, les premiers, leur ont donné cette forme. Nous allons détailler les parties de ce fourneau exécuté à la fabrique d'azur de Schöneberg en Saxe. Voyez la planche, qui représente le fourneau, & son explication.

La figure première est le plan du fourneau à la hauteur de son sol.

La deuxième figure est le plan supérieur du fourneau, où l'on voit six grueurs E, & un trou au milieu pour le passage de la flamme.

La troisième figure est la coupe du fourneau qui fait voir ; creusets, la chauffe H & le cendrier L : l'on voit aussi en N l'intérieur du fourneau servant à sécher le quartz pulvérisé, qui, pour cet effet, reçoit la chaleur par le petit conduit M.

La figure quatrième est l'élevation du fourneau de fonte & de celui servant à sécher le quartz qui en fait la continuation.

Procédé de la fonte.

Nous avons déjà dit que l'on grille, pulvérisé & tamise le cobalt avant que de le fourmettre à la fonte ; nous avons aussi dit qu'il faut, au préalable, s'être assuré par des essais en petit de la qualité plus ou moins colorante, afin de pouvoir déterminer les justes proportions de quartz, ou caillou qu'il peut supporter pour faire une couleur donnée ; mais comme il arrive fréquemment que l'on a de plusieurs espèces de cobalt dont les qualités sont différentes & dont on veut composer des mélanges avant que de les fourmettre à la fonte, il faut en ce cas bien savoir déterminer les proportions de chaque variété de minéral & des additions du caillou ; par exemple, l'on aura un minéral qui peut faire une couleur suivant un échantillon donné, pourra supporter 6 parties de caillou, tandis que pour faire la même nuance l'on voudra faire entrer dans la fonte un minéral qui ne peut porter que deux parties de quartz : il s'en suivra qu'en mêlant ces deux minerais à parties égales, il ne pourra être ajouté que quatre parties de caillou sur une partie des deux minerais réunis ; il en est de même de toutes les autres variétés qui exigent plus ou moins de quartz. Mais en général, il n'y en entre que deux à trois parties sur un mélange de minerais différents.

Nous allons en rapporter un qui a été fait en notre présence à Platten en Bohême.

Sur deux quintaux & demi de minerais différents, on ajouta six quintaux de quartz réduit en sable fin au bocard, lavé, tamisé & séché dans le fourneau, & 281 livres de potasse calcinée avec un quintal de verre d'azur impur qui se précipite dans le grand réservoir lors des lotions que l'on en fait, ainsi que nous le dirons plus loin. L'on ajouta à ce mélange 40 livres de farine d'arsenic, ce qui fait en tout 1271 livres de matières que l'on fit entrer dans les six creusets E de la figure deux ; ces creusets ont 19 pouces de diamètre dans le haut, 16 pouces dans le bas, & un pied de hauteur, le tout dans œuvre.

Nous observerons ici qu'il est très-important d'employer dans les mélanges le quartz le plus

pur, & comme ordinairement il est très-dur & difficile à bocarder, on lui fait subir un grillage, ce qui l'attendrit, & lorsqu'il a été bien pulvérisé par les pilons du bocard, il est bien jayé & ensuite séché, ainsi que nous l'avons déjà dit.

Au lieu de quartz en masses que l'on prend des filons des mines, ou que l'on ramasse dans les rivières, on y peut employer des sables quartzeux lorsqu'ils ne sont pas mêlés avec d'autres substances.

Le mélange dont nous avons rendu compte se porte avec des cuillers par les petites portes G du fourneau. Voyez la figure 4. Il y a autant de petites portes, qui servent d'ouvertures pour le passage de la flamme, qu'il y a de creusets; on les bouche en partie avec des briques faites exprès.

On fait un grand feu dans la chauffe, & lorsque la matière commence à devenir pâteuse, on l'agite de temps en temps avec des crochets de fer; il faut ordinairement huit jusqu'à dix heures d'un feu continu, pour que le tout soit parfaitement vitrifié, ce dont on s'assure en en prenant un peu dans une cuiller, que l'on jette dans l'eau froide & que l'on examine, pour voir si le verre est net & bien homogène, sans bulles ni grains; alors les deux ouvriers qui conduisent cette fonte, avec chacun leur cuiller de fer, puisent l'azur dans les creusets & le portent dans une grande caisse pleine d'une eau qui s'y renouvelle incessamment, afin qu'elle conserve la fraîcheur autant qu'il est possible, car plus cette eau est froide & plus le verre d'émail s'étonne, s'attendrit & s'éclaire en plus petites parties, ce qui le rend plus aisé à broyer, ainsi que nous le dirons ci-après.

Aussi-tôt que les creusets sont vides, on les remplit d'un nouveau mélange; l'on continue ainsi sans interruption, aussi long-temps que le fourneau n'a pas besoin de réparation, ce qui va depuis quatre jusqu'à six mois. Lorsqu'il se casse un creuset, on le remplace par un autre, mais comme la grande chaleur du fourneau le ferait éclater s'il y étoit mis froid, on a soin de ne l'y introduire que lorsqu'il a été rougi par degrés dans un autre fourneau.

Il est bon d'observer ici qu'il se trouve presque toujours au fond des creusets une matière en fusion, pesante & régulière, que les Allemands appellent *speiss*, composée de plusieurs substances métalliques & demi-métalliques, & sur-tout de beaucoup d'arsenic: en Bohême cette matière régulière s'écoule des creusets tous les deux ou trois jours, par un petit trou pratiqué à cet effet à la partie inférieure de chaque creuset. En Saxe, au contraire, elle s'enlève avec les dernières cuillères d'azur, & on la fait couler dans un moule de fer rond avant que de porter le verre d'émail dans l'eau, & comme il s'émane de ce *speiss* une fumée purement arsenicale, on a soin de placer le moule de manière qu'elle puisse enfler une petite

cheminée méragée dans l'un des piliers du fourneau; & afin de se garantir de cette fumée, les ouvriers prennent la précaution d'avoir un mouchoir devant la bouche.

Il paroît à peine être singulier que l'on fasse subir une torréfaction au minéral de cobalt pour en dissiper les parties arsenicales, & que dans les mélanges on fasse entrer de la farine d'arsenic; les Allemands disent que cette addition est nécessaire pour aider la vitrification des matières, qui s'opère d'autant mieux, que l'arsenic en s'évaporant les soulève en se faisant jour au travers de la croûte déjà vitrifiée de la surface, & que la chaleur se communique par ces voies dans toutes les parties du creuset.

Lorsqu'on a une certaine quantité de *speiss*, on fait une fonte de tous les culots dans de grands creusets, & on le moule de nouveau en gâteaux, dont on extrait, par la lixivation, le bismuth qui y est contenu, & qui s'en dégage comme le plomb fait du cuivre à un degré de chaleur capable de le faire couler sans faire fondre les autres matières qui contiennent souvent beaucoup d'argent. Les Saxons ont un procédé particulier pour concentrer ce métal précieux dans un petit volume de *speiss*, qu'ils traitent ensuite aux fonderies pour l'obtenir: ils font mystère de ce procédé.

La consommation du bois de corde pour la fonte du cobalt dans le fourneau que nous avons décrit, est, par semaine, de huit mesures & demie tout au plus, chaque mesure cubant cent dix pieds, ce qui fait neuf cents quinze pieds cubiques. Le bois que l'on emploie à Schneeberg est du sapin.

Chaque fourneau produit par 24 heures au moins quinze quintaux de verre d'azur, qui, au sortir de la caisse remplie d'eau, est pilé à sec sous les pilons d'un bocard, & criblé.

Après que l'azur a été bocardé, il est livré aux moulins, où il est broyé le plus fin possible, ainsi que nous le dirons après avoir donné une description abrégée de ces moulins.

Une roue mue par l'eau, met deux moulins en mouvement; à l'arbre ou axe de la roue, sont fixés deux rouets de 4 pieds 8 pouces de diamètre, armés chacun de 40 dents qui engrenent dans deux lanternes verticales placées au-dessus des moulins, dont les axes de fer auxquels elles sont fixées, traversent les meules supérieures qui ont trente-deux pouces de diamètre & onze pouces & demi d'épaisseur; celles du dessous qui sont fixes, sont de même épaisseur, mais de trente-huit pouces six lignes de diamètre. Les meules du dessus & du dessous de chaque moulin, sont renfermées dans une cuve du diamètre de la meule inférieure, mais assez profondes pour qu'elles excèdent les meules supérieures de huit à neuf pouces, afin que l'eau chargée d'azur y soit retenue, toutes ces meules sont d'un grès micacé très-dur: l'axe des lanternes est terminé en pivot,

qui repose dans une crapaudine d'acier enchaînée dans la meule inférieure.

Au bas de chaque cuve ou tonneau qui renferme les meules, est une ouverture pour faire écouler la matière lorsqu'elle est suffisamment broyée, ce qui a lieu après six heures de travail, d'où elle est reçue dans un baquet pour être portée dans une cuve d'environ douze pieds cubes, que l'on remplit en même temps d'une eau bien claire, que l'on y fait venir en ouvrant un robinet, & à mesure qu'elle y arrive, un ouvrier, avec une grande spatule de bois, agite rapidement la matière durant quelques minutes; il la laisse ensuite reposer un moment, puis, avec un petit baquet, il puise cette lessive chargée d'azur, & la verse dans un canal de bois qui la porte dans une grande cuve qui peut contenir environ dix barriques. Quand il ne reste plus que quelques pouces d'eau sur le précipité qui s'est fait du plus grossier dans la petite cuve, on cesse de puiser, & l'on y fait venir de nouvelle eau fraîche; on agite de nouveau la matière, on la laisse un peu reposer & on la fait couler dans une autre cuve; cet azur n'étant pas aussi fin que le premier, paroît d'un bleu plus foncé, parce que les molécules plus grosses réfléchissent mieux la lumière que celles du premier; mais l'un & l'autre sont du même prix. A l'égard de celui qui s'est déposé au fond de la petite cuve après les deux lotions précédentes, il est de nouveau repassé au moulin.

Lorsque les grandes cuves sont pleines de pareilles lessives, & que l'azur est suffisamment déposé, on débouche une ouverture qui est à quelques pouces au-dessus du fond de chacune de ces cuves, l'eau s'en écoule & va se rendre dans un grand réservoir, où elle achève de déposer tout ce qu'elle tenoit encore de suspendu entre ses molécules, & qui n'est qu'un azur d'une couleur terne & chargé d'impuretés: c'est cette mauvaise couleur que l'on fait entrer dans la composition des mélanges, ainsi qu'on peut le voir dans celui que nous avons donné ci-dessus pour exemple.

Les précipités d'azur provenant des grandes cuves, sont portés au séchoir & étendus sur des planches rangées par étages dans ce séchoir, qui est une étuve dans laquelle est un poêle où l'on fait un feu continu pour accélérer la dessiccation de l'azur: lorsqu'il est parfaitement sec, il est en masses dures, on le pile à sec sous les pilons d'un bocard, après quoi on le tamise dans des tamis de soie très-fins. Mais afin de ne pas perdre de cette couleur, les tamis sont placés dans de grandes caisses couvertes, & chacun d'eux est fixé au bout d'un bâton ou manche assez long qui passe par un trou pratiqué dans les planches de la partie antérieure de la caisse; c'est par ce manche que l'ouvrier, en agitant le tamis par secousses, tamise l'azur qui tombe dans la caisse ou coffre; ce qui ne peut pas passer au travers est mis à part pour être refondu, & servir aussi d'addition aux

mélanges avec la couleur mauvaïse qui se précipite dans le grand réservoir, ainsi que nous l'avons dit plus haut.

Il n'y a qu'en Bohême où l'on soit obligé de piler l'azur après sa dessiccation; les Saxons le font sécher dans la chambre à ce destinée, pareillement chauffée par le feu d'un poêle, mais cet azur est mis sur de grandes tables, un ouvrier est chargé de passer fréquemment un petit cylindre de bois sur cet émail, ce qui empêche qu'il ne s'aglutine & ne forme masse; moyennant cette manipulation, aussi-tôt qu'il est sec il se trouve en état d'être tamisé, ainsi que nous l'avons rapporté.

Après avoir reçu toutes ces opérations, l'azur est mis dans des barils, livré dans le commerce & vendu à différents prix, suivant sa finesse & sa beauté. Il se vendoit en gros à la fabrique en l'année 1757, que nous citons sur les lieux, depuis 37 liv. 10 s. jusqu'à 160 liv. le quintal, mais récemment de ce dernier, qui est le superfin; & si on en livre, c'est à condition que l'on prend un assortiment d'azur inférieur en qualité.

Afin de désigner les différentes qualités de l'azur, les Saxons impriment sur les tonneaux, avec un fer chaud, des lettres, par exemple, FFC, désigne une couleur très-fine; lorsqu'il y a trois F suivies d'un C, la couleur est superfine, ou tout ce qu'il y a de plus beau, &c.

Les barils ainsi préparés, se vendent, comme nous l'avons déjà dit, en raison de la beauté & de l'éclat de l'azur, & se transportent dans toutes les parties de l'Europe; les Hollandais en font une très-grande consommation, on assure même que les Chinois en ont tiré une grande quantité.

Telle est la manière dont on fait l'azur: il y en a cinq manufactures en Saxe qui sont une source de richesses pour le pays; les Saxons ont fait long-temps un très-grand mystère de ce travail, ils cachent même encore leurs procédés. à cet égard, & jamais ils n'ont communiqué au public les ordonnances & les réglemens de leurs manufactures d'azur, dont l'origine est de l'année 1617.

On fait de l'azur en Bohême, ainsi que nous l'avons déjà dit, & dans le duché de Wirtemberg, &c. Mais l'on a jusqu'ici donné la préférence à celui des Saxons; il y a lieu de croire que cela vient plus de leur grande expérience que de la qualité des minerais de cobalt, car cette expérience leur a appris à faire les mélanges des matières de la manière la plus convenable, pour avoir du verre d'un plus beau bleu; il se trouve du cobalt en France dans les Pyrénées, dans les Vosges & en Dauphiné: il y a lieu de croire qu'en apportant à ce travail la même attention que les Saxons, on réussira aussi-bien qu'eux à faire de l'azur en France.

Il faut bien choisir les cailloux dont on fera la fritte du verre; souvent des cailloux qui paroissent

font parfaitement blancs & purs, contiennent des parties ferrugineuses que l'action du feu développe, alors ces cailloux rougiront ou jauniront par la calcination, & ils pourront nuire à la beauté de la couleur de l'azur; d'un autre côté, il y en a qui, quoique naturellement colorés, perdent cette couleur dans le feu, ceux-là pourront être employés avec succès; on voit par-là qu'il faut s'assurer par des expériences de la qualité des cailloux ou du sable vitrifiable que l'on emploiera.

Il faut que la porcelaine, la fonde ou le sel alcali fixe que l'on mêlera dans la frite du verre, soit aussi parfaitement pure.

Il ne faut pas négliger l'eau dans laquelle on éteint le verre d'azur au sortir des creusets; si cette eau impure est mêlée de particules étrangères, elle pourroit nuire à la beauté de la couleur. En général, ce travail exige beaucoup de netteté & de précaution.

On vend sous les noms de *smalt*, d'*azur à poudrer*, &c. de *bleu d'émail*, le verre d'azur préparé, ainsi que nous l'avons détaillé; tous ces noms différens ne signifiant que la même chose, on croit inutile de les répéter ailleurs dans ce dictionnaire. C'est aussi mal-à-propos qu'on lui a donné les noms du premier, du second, du troisième feu, &c. puisqu'il n'en reçoit qu'un, ainsi qu'on peut le remarquer dans le procédé que nous avons décrit.

La division des différentes qualités de cet émail n'est due qu'à celle du cobalt & des substances qui entrent dans sa composition, & aux justes proportions des unes & des autres; elle dépend aussi, ainsi que nous l'avons observé, de sa réduction aux moulins en poudre plus ou moins impalpable, & de la séparation des parties les plus déliées d'avec les plus grossières dans les précipités qui s'en font dans les cuves pleines d'eau, &c.

On trouve encore dans les auteurs *safre* ou *saffor*, pour désigner l'émail bleu; mais c'est aussi une erreur qu'il convient de rectifier; car le safre n'est autre chose qu'un mélange de cobalt & de cailloux, le tout calciné & réduit en poudre fine qui se vend ainsi sans avoir été vitrifié. Les Saxons qui préparent le *safre*, craignant que l'on n'en fasse de l'azur chez l'étranger, n'en vendent que très-peu, & lorsqu'on leur en demande, ils n'en livrent qu'à condition que l'on prend trente fois autant d'azur.

Le safre sert à vernir en bleu les porcelaines, les faïences & certaines poteries.

L'azur s'emploie dans la peinture, dans les blancheries, dans les papeteries, afin de donner aux toiles & au papier l'œil bleuâtre qui fait le beau blanc.

Chimie, Tome II.

Explication de la planche X. qui représente un fourneau à fondre le cobalt pour en faire l'azur.

La figure première est le plan à la hauteur du sol du fourneau.

A. Massif de maçonnerie élevé de six pouces au-dessus du rez-de-chaussée.

B. Cercle de fer qui lie ce massif.

C. Six piliers de maçonnerie pour porter la voûte du fourneau.

D. Passages des creusets dans le fourneau; les deux cercles ponctués désignent l'épaisseur des murs au-dessus de ces mêmes passages.

E. Escalier pour descendre à la chauffe.

F. La porte de la chauffe qui, se trouvant plus bas, est ponctuée ainsi que toute la longueur de la chauffe.

G. Passage de la flamme dans le fourneau; l'on y voit le dessus de l'un des arceaux servant de grille pour porter le bois dans la chauffe.

H. Massif de maçonnerie faisant la base d'un autre fourneau pour sécher le sable.

I. Autre escalier qui descend jusqu'au sol du cendrier, & par où l'on retire les braises, qui en même-temps sert de soupirail ou de passage à l'air pour animer la flamme, & lorsque le courant de l'air est trop fort, on en ferme le passage en tout ou en partie avec une porte de fer.

La figure deuxième est le plan du fourneau à la hauteur de la partie supérieure des creusets.

A. Massif de maçonnerie.

B. Les piliers qui supportent la voûte.

C. Plaque de fer.

D. Six petites portes par lesquelles on entre & sort la manière des creusets, qui servent en même-temps d'ouvreaux pour le passage des fumées & de la flamme: on les bouche à moitié avec une brique à chacun.

E. Six creusets pour la fonte des matières: ils sont placés chacun dans une embrasure.

F. Six briques posées sur les bords des creusets; elles servent à rompre la flamme qui vient frapper contre, & l'oblige de circuler tout autour.

R t r

il y a une de ces briques sur laquelle on voit en plan trois petits creusets d'essai, dans lesquels on met différens mélanges, afin de s'assurer si la couleur qui en provient est belle, &c suivant l'échantillon demandé.

G. Ouverture ménagée dans l'un des piliers par où passe une partie de la flamme pour sécher le sable vitrifiable.

H. Murs du fourneau où l'on met séchet ce sable.

I. L'intérieur du même fourneau.

L. Potte de ce fourneau.

La figure troisième est la coupe du fourneau sur la ligne A B.

A. Massif du fourneau.

B. Deux des piliers qui portent la voûte.

C. La voûte du fourneau qui est supportée par six piliers semblables aux deux que l'on voit en B.

D. Lit de terre & sable qui couvre la voûte, afin de lui donner plus de solidité, &c procurer plus de chaleur lorsque le fourneau est échauffé.

E. L'un des creusets que l'on voit dans son embrasure dans la partie postérieure du fourneau.

F. Deux autres embrasures semblables à la précédente, mais vues de côté avec deux autres creusets.

G. Trois ouvreaux du nombre des six par lesquels on met les matières dans les creusets, &c qui servent au passage de la flamme.

H. La chauffe où l'on met le bois.

I. Passage de la flamme dans le fourneau.

K. L'un des sept petits arceaux qui servent à porter le bois dans la chauffe, entre lesquels il y a des intervalles pour le passage des braises & de l'air qui anime la flamme.

L. Le cendrier qui reçoit les braises.

M. Conduit par lequel il passe assez de flamme & de chaleur pour sécher le sable.

N. Intérieur du fourneau servant à sécher le dit sable.

O. La cheminée.

La quatrième figure présente le fourneau vu de profil ou en élévation.

A. Massif de maçonnerie au-dessous du rez-de-chauffée.

B. Cercle de fer qui lie ce massif à la hauteur du rez-de-chauffée.

C. Le cendrier.

D. La porte de la chauffe.

E. L'une des six portes par lesquelles on fait entrer les creusets dans le fourneau, &c qui se bouchent par une maçonnerie faite en briques, lorsque les creusets sont placés.

F. L'un des ouvreaux.

G. Plaque de fer qui est une de celles vues en C de la figure deuxième.

H. Fourneau pour mettre séchet le quartz pulvérisé.

I. La cheminée de ce fourneau.

K. La porte par où l'on met le quartz dans le fourneau.

Vocabulaire des principaux termes employés dans l'art de fondre le cobalt pour en faire de l'azur en grand.

Aire, est le sol du fourneau.

Azur, verre bleu résultant de la fonte du cobalt avec du sable vitrescible.

Bismuth, demi métal qui se trouve souvent disséminé dans le cobalt.

Capule, est un vaisseau de fer.

Cendrier, est l'endroit du fourneau qui reçoit les braises.

Chauffe, est l'endroit du fourneau où l'on met le bois.

Cobalt, minéral particulier dont on fait l'azur. Creusets, vaisseaux de terre où l'on fond le cobalt.

Cuves, tonneaux où se précipite l'azur pulvérisé.

Email, l'on donne aussi ce nom au verre d'azur. Gâteaux d'une matière réguline dont on extrait le bismuth.

Grillage, est la calcination du minerai pour en chasser les substances volatiles.

Mélanges, composition de différentes substances pour en faire l'azur.

Moulins à broyer le verre d'azur en poudre impalpable.

Ouvreaux, portes du fourneau pour le passage de la flamme.

Quartz, caillou vitrescible que l'on ajoute avec le cobalt pour faire l'azur.

Réservoir, grand bassin où se précipite la mauvaise couleur.

Réverbère, est un fourneau qui se chauffe par la flamme.

Safre ou sasse, est un mélange non vitrifié de cobalt & de quartz.

Séchoir, est une étuve ou chambre chaude, où l'on fait sécher l'azur.

Smalt, on a aussi donné ce nom au verre d'azur.

Speïfs, matière réguline, composée de différens métaux & demi métaux qui, dans la fonte du cobalt, se précipite au fond des creusets.

B.

B. (Pharmacie.) Cette lettre, la seconde de notre alphabet, est employée dans les formules comme abréviation pour désigner un bol.

Dans la description des opérations chimiques ou pharmaceutiques, la lettre B seule, indique un bain, *balneum*; mais lorsqu'on emploie cette lettre seule comme signe d'abréviation, elle doit toujours être suivie d'un point; & quelquefois on y ajoute une autre lettre qui est l'initiale d'un autre mot, ainsi B. A. signifie bain de fable, *balneum arenae*, & dans les formules, ces mêmes lettres expriment le bol d'Arménie. *Bolus Armenus*. B. M. exprime le bain-marie, *Balneum mariae*. B. V. bain de vapeur.

Quelquefois ces lettres sont réunies & accolées; d'autres fois, elles sont séparées par un point. La lettre B. seule a été employée par Raymond Lulle, pour désigner son mercure; quelques chimistes l'ont employée coupée obliquement avec un trait, pour désigner le bismuth. Enfin, dans ces derniers temps, cette lettre qui est l'initiale des mots baryte, benjoin, bismuth, borax, bombique, est employée dans les nouveaux caractères chimiques publiés par MM. Adet & Hauffenratz. Voyez caractères chimiques & pharmaceutiques. Nous remarquerons encore que la lettre B. a souvent été changée en V. & quelquefois en P. Ainsi la bérone est désignée dans quelques écrivains, sous le nom de *vetonica*, & la vanille est nommée *bannila*.

BACANON. (Pharmacie.) Expression que l'on trouve dans les écrivains grecs & quelques pharmacographes anciens, pour désigner, dit Gorris, la semence du raifort ou du chou, & on trouve dans Paul d'Egine la formule d'une espèce d'électuaire fait avec cette graine, qu'il nomme *medicamentum dia-bacanon*.

BACCHANTE D'AFRIQUE. (Pharmacie.) *Baccharis ivafolia*. *Eupatorium Africanum*, &c. Pluk. Alm. 400. t. 328. C'est un petit arbrisseau toujours verd, qui croît naturellement au Pérou & en Afrique. On le cultive dans les jardins de botanique.

Les Indiens en prennent la décoction pour fortifier l'estomac.

(M. WILLEMET.)

BACCHANTE DU BRÉSIL. (Pharmacie.) *Baccharis Brasiliensis*. C'est un arbrisseau qui a le port d'un grenadier, qui croît naturellement au Brésil.

Les Brésiliens se servent de ses feuilles contuses, pour dissiper les douleurs & les rougeurs des yeux.

(M. WILLEMET.)

BACILE, CRISTE MARINE ou L'ASSE-PIERRE. (Pharmacie.) *Cerithium maritimum*. *Feniculum marinum*. Lobel. Icon. B. G. 2. C'est une plante ombellifère, vivace, qu'il ne faut pas confondre avec la *salicornia herbacea*, qui se vend en Lorraine sous le nom de *passé-pierre*, que l'on confit en salade, avec du vinaigre, comme les cornichons. C'est néanmoins l'erreur que la plupart des auteurs ont commise, il faut donc la réparer. On trouve la bacille dans les lieux voisins de la mer, parmi les rochers, en France, en Italie & en Espagne. Elle n'est pas beaucoup d'usage en pharmacie. On la regarde comme apéritive, distérique, atténuante, lithontriptique, détersive, dessicative; elle excite les règles, réveille l'appétit; on la donne contre la gravelle, la jaunisse, elle est propre à emporter les obstructions des viscères.

On confit aussi cette plante au vinaigre.

(M. WILLEMET.)

BADAMIER. (Pharmacie.) *Terminalia catalpa*. *Amygdalus Indica*. Rai, hist. 1521. C'est un très-grand & très-bel arbre, dont la forme pyramidale est comparable à celle du sapin, qui croît naturellement dans les forêts du Malabar. On le cultive aussi dans les jardins; ses amandes se mangent crues, & se servent sur les meilleures tables de l'Inde. Rhède dit qu'on en tire par expression une huile semblable à celle de l'olive, & qui ne rancit jamais. On en fait aussi des émulsions comme avec nos amandes; les Indiens employent le suc des feuilles du badamier mêlé avec du riz, pour modérer la colique, l'ardeur de la bile & les maux de tête qui ont pour cause les mauvaises digestions.

(M. WILLEMET.)

BADIANE ou ANIS ÉTOILÉ. (Pharmacie.) C'est le fruit étoilé d'un arbre de la Chine, du Japon, de la Tartarie & des îles Philippines, que Linnéus nomme *Illium anisatum*, & Lecluse *anum Philippinarum*.

Les peuples de ces contrées éloignées ont cet

Rrr 2

arbre en vénération, & le regardent comme sacré. Il est offert à leurs pagodes. Ils en brûlent l'écorce, comme un parfum sur leurs autels. Ils en étendent les branches sur les tombeaux de leurs amis, comme une offrande précieuse consacrée à leurs mânes.

Le bois de cet arbre a aussi l'odeur d'anis; il sert aux ouvrages de marqueterie & de tour.

Il faut choisir son fruit en étoile, compacte, un peu chagriné, d'un beau vert. Il est employé en médecine aux mêmes usages que l'anis d'Europe. Il fortifie l'estomac, dissipe les vents, excite les urines, &c. Les Chinois en mâchent souvent après le repas, pour faciliter la digestion & pour se parfumer la bouche.

Les Indiens préparent un esprit ardent avec ce fruit. Il est aussi employé par nos distillateurs & liquoristes. L'on en retire une huile essentielle & une essence ou teinture. Il entre dans l'infusion laxative, l'eau prophylactique, l'hydromel pour les enfans, & le sirop de manne.

En 1769, l'on découvrit dans la Floride occidentale une nouvelle badiane ou anis étoilé. L'arbre qui la produit, a été décrit dans les transactions philosophiques de Londres par Ellis. Il est nommé par le Pline du Nord, *Ulicium Floridanum*. Ce fruit est employé dans l'Amérique septentrionale, aux mêmes usages que ceux de l'anis de la Chine.

(M. WILLEMET.)

BADITIS. (*Pharmacie.*) Suivant Marcellus; on nommoit ainsi dans les Gaules, (*gallicè nominatur*), l'espèce de plante que les Grecs ont nommée *nymphaea*, & les Latins *clava Hercules*; & le même auteur ajoute que si après avoir écorcé la racine de cette plante; & l'avoir fait tremper dans du vinaigre, on en fait manger pendant dix jours à un enfant, on le rend eunuque & impuissant.

BAGUENAUDIER ou FAUX SÉNÉ. (*Pharmacie.*) *Colutea arborensens.* *Sena.* *Cord.* *Hist.* Le baguenaudier surnommé par le grand Boerhaave, *séné d'Europe*, est un arbrisseau d'une hauteur médiocre, dont les fleurs sont jaunes & légumineuses, auxquelles succède une gousse semblable aux siliques du séné qu'on nomme *siliculaire*. Ses feuilles sont ovales & opposées sur une même tige. Elles peuvent remplacer le séné existant, suivant le rapport de ce célèbre médecin de Gœttinge, de Bartholin, de Gaidel, de Tablès, de Charles Linnéus. C'est un purgatif doux, utile dans les fièvres intermittentes, la cachexie, la mélancolie & autres affections. Si l'on fume, en guise de tabac, les feuilles séchées de baguenaudier, elles purgent très-bien le cerveau & aiguissent singulièrement les sens. Cet arbrisseau croît spontanément en Italie, en Languedoc, en Provence & autres lieux de la France, vient facilement dans nos jardins & autres endroits cultivés. C'est un de ceux qui se naturalisent le plus volontiers dans les terrains où on le place. Il n'en est pas qui soit plus aisé de se multiplier, ni

qui donne des feuilles en plus grande abondance. Il seroit donc possible d'en faire tout-à-la-fois un objet d'utilité & d'agrément. Il fleurit au mois de mai, & c'est vers le milieu de septembre que nous estimons que les feuilles doivent être cueillies & séchées à l'ombre, avec les précautions connues de tous les herboristes. Nous croyons par analogie que les gousses de baguenaudier peuvent être proposées pour remplacer les follicules de séné oriental.

(M. WILLEMET.)

BAGUETTES. On entend par *baguettes* dans la chimie, de petits cylindres solides de verre qui servent à remuer les matières, soit solides ou liquides, pour les mêler & faciliter leur combinaison, dans des expériences que l'on fait dans des verres, des bocaux, &c.

Il est des opérations dans lesquelles l'on pourroit employer des baguettes d'une autre nature; mais il en est aussi qui exigent qu'elles soient de verre, sans qu'il y ait des matières courtoient le risque d'être altérées.

Il est absolument nécessaire qu'elles soient pleines, afin que les matières n'y entrent point, & qu'elles puissent servir à plusieurs opérations de nature différente, ce qu'elles ne pourroient faire sans cette condition.

Comme ces baguettes coûtent quarante sols la livre, & que les tubes de verre ne coûtent que 26 sols, on peut se servir de ces tubes aux mêmes usages, en fermant leurs extrémités à la lampe d'émailleuse. On en a d'ailleurs un nombre beaucoup plus grand, puisqu'ils sont creux, & qu'ils ne pèsent pas tant.

On fait aussi de ces baguettes en émail; mais celles de verre sont préférables pour beaucoup de raisons. On nomme aussi ces baguettes, *touches*.

On a aussi des baguettes ou verges de fer, qui servent à remuer quelques matières en fusion dans les creusets. Cet instrument ne mérite pas de figure, on le conçoit facilement.

BAGUETTE DIVINATOIRE. La baguette divinatoire est un instrument, par le moyen duquel des gens ont prétendu, & un assez grand nombre prétendent même encore, qu'on peut découvrir les métaux, les trésors, les mines, l'eau, le sel, &c., ensoins sous la terre, sans qu'il soit besoin de la fouiller. Il suffit, suivant les partisans de cette baguette, de la tenir à la main dans une situation horizontale, & de se promener dans les endroits où l'on veut découvrir les richesses que la terre recèle.

Si la baguette est conditionnée comme il faut, elle ne manquera pas de s'incliner même avec force, & malgré la résistance de celui qui la tient, sur les endroits où sont cachés les choses qu'on veut découvrir; mais on peut dire qu'il faut pour cela beaucoup de foi de la part du porteur de baguette, ou plutôt de la part de ceux qui la regardent.

dent. Il est aisé de sentir que l'effet de cette baguette est une chimère, qui n'a dû sa réputation qu'à l'avidité, à l'ignorance & à la crédulité.

Le fameux père Kirker, dans son ouvrage intitulé *mundus subterraneus*, dans lequel on trouve beaucoup de choses inutiles & instructives sur les mines, le moque avec raison de ces superstitieuses pratiques, & assure, d'après sa propre expérience, que tout ce qu'on en dit est entièrement faux. Cependant il n'a pas eu le courage de les abandonner tout-à-fait; il parait croire un peu aux sympathies, & propose même de nouvelles baguettes divinatoires de son invention, dont les effets, quoique un peu d'accord avec les causes physiques, ne sont cependant pas plus sûrs pour cela.

Le père Kirker croit, par exemple, qu'une baguette d'un bout seroit de sel gemme & l'autre de bois, & qu'on suspendroit en équilibre au-dessus d'une mine de sel, s'inclinerait sur la terre, & il se fonde sur une expérience qu'il a faite. Cette expérience consistoit à faire évaporer sur le feu une dissolution de sel gemme au-dessous de la baguette, & cette vapeur la faisoit réellement incliner. Il n'est pas nécessaire d'être fort avant en chimie, pour sentir que, quand même le père Kirker auroit fait évaporer de l'eau pure, au lieu d'une dissolution de sel au-dessous de la baguette, elle se seroit inclinée de même, à cause des parties d'eau qui se seroient attachées au bout salin de cette baguette, & que par conséquent un pareil secret n'est propre à rien.

Le même auteur propose aussi pour découvrir les mines de mercure, une baguette d'or par un bout & de bois par l'autre, dans l'espérance que les émanations du mercure s'attachant à l'or par préférence au bois, appesantiroient la baguette par un bout, & la seroient incliner. Mais qui ne voit que cet effet ne peut avoir lieu, à moins que le mercure ne soit réellement en évaporation? Or cela ne peut arriver que par des circonstances particulières & très-rare, puisqu'il faudroit; 1°. que le mercure fût dans la terre sous la forme de mercure coulant, & non sous celle de cinabre, comme il l'est ordinairement; 2°. qu'il éprouvât de la part de quelque feu souterrain, un degré de chaleur bien supérieur à celui qui règne habituellement dans l'intérieur de la terre, puisque ce dernier est bien éloigné d'être assez fort pour sublimer le mercure. Cette seconde baguette physique & chimique du père Kirker ne vaut donc guères mieux que la première, & il est fort à craindre qu'il n'en soit de même de toutes celles qu'on voudroit faire sur les mêmes principes, & à l'imitation de celles dont on vient de parler.

Enfin le même auteur assure très-positivement, & avec une candeur capable de persuader, qu'il a fait l'expérience de la baguette composée de moitié de bois d'aune & de moitié d'un autre bois non sympathique avec l'eau, & proteste que cette baguette suspendue en équilibre au-dessus d'une

source d'eau cachée, s'incline avec le temps par la partie qui est bois d'aune.

On conçoit bien que Macquer, de qui cet article est emprunté, estime à sa juste valeur les ridicules prétentions & les erreurs qui ont donné naissance à toutes ces idées sur la baguette divinatorie. L'état d'exhaustivité des sciences expérimentales depuis plus d'un demi-siècle, devoit faire espérer que de pareilles folies ne viendroient plus déshonorer la physique & retarder les progrès. Il est véritablement inconcevable que des impostures grossières en ce genre se soient encore renouvelées il y a quelques années, & que quelques hommes de mérite aient été encore réduits, au point de chercher à expliquer par les loix ordinaires de la physique, des faits prétendus que le temps n'a pas confirmés. En effet les prétendues découvertes de mines de charbon de terre faites aux environs de Paris par Bletton, & dont M. Thouvenel sembloit être aussi assuré que s'il les avoit vues, se sont réduites à rien; les fouilles immenses que l'on a faites pour les trouver ont été infructueuses, & elles attesteront long-temps aux amis de la vérité, que quelques hommes ont été trompés à la fin de ce siècle comme on l'auroit été dans le quinzième, & que la nature n'a donné à personne le prétendu pouvoir de reconnoître la présence de l'eau, des métaux & des bitumes cachés profondément sous terre. L'histoire des sciences qui fera passer ces erreurs à la postérité, lui dira en même-temps que les véritables physiciens y ont toujours résisté.

BAIE. (*Pharmacie.*) Il est essentiel pour les pharmaciens de savoir que la baie est une espèce de fruit mou, rempli d'une pulpe aigre, sucrée, altringente, ou amère & rarement fade, dans laquelle les semences sont placées sans ordre & sans arrangement réguliers, de sorte qu'elles sont pour-ainsi-dire libres & flottantes dans cette pulpe; c'est-là ce que les botanistes appellent *semina nidulantia*.

Il y a un assez grand nombre de baies employées en médecine, telles que les baies de sureau, d'hieble, de laurier, de nerprun, de groseille, de calis, &c.

Un pharmacien doit savoir assez de botanique pour bien connoître la différence de structure de ce fruit d'avec les autres fruits, & pour pouvoir, sans erreur, choisir les matières végétales qu'il doit traiter pour en extraire les médicaments que elles fournissent à la médecine.

BAIN, BAIN DE CENDRES, DE FUMIER, DE VAPEUR, BAIN-MARIE. Sc. On entend en chimie par ce mot, toute matière dans laquelle on peut plonger d'autres substances, soit pour leur communiquer une plus grande quantité de chaleur, soit pour leur en enlever une portion; mais c'est plutôt pour remplir la première condition que ces instrumens sont employés. On a donc distingué

les bains d'après la nature des substances qui les composent. De-là, il y a des bains de sable, de cendres, d'eau, de fumier, de vapeur, &c. &c. La propriété des bains pour communiquer ou retrancher du calorique, peut être considérée d'après l'attraction que les matières qui les forment ont avec le calorique. Plus cette attraction est grande moins ils ont d'efficacité pour échauffer les matières qui y sont plongées, cette propriété suit assez généralement les pesanteurs des corps moyens, c'est-à-dire qui forment les bains. Ainsi parmi les liquides, l'eau communique une plus grande quantité de calorique que l'alcool, celui-ci plus que l'éther.

L'or, parmi les solides, communiquera une plus grande quantité de calorique à la fois, que l'éraïn, l'un & l'autre étant même à une température égale.

Mais ces loix ne sont pas constantes à toutes les températures. L'éraïn avant qu'il ne soit fondu est incapable de communiquer autant de calorique aux corps que le mercure; mais quand il est devenu liquide, il peut s'élever à une température très-grande, tandis que le mercure lorsqu'il bout est au maximum de sa température, parce qu'une portion de lui-même enlève le calorique à l'aure à mesure qu'elle lui est communiquée. L'étaïn communique donc en vitesse, ce que le mercure donne par sa masse, & même plus. Il est vrai que l'étaïn quand il est chauffé avec le contact de l'air perd bientôt l'avantage qu'il a sur le mercure; il s'oxide très-vite, il se divise, & son contact avec les corps n'est plus si multiplié; d'ailleurs la capacité de l'oxide pour le calorique, qui en résulte est un peu augmentée.

Pour diminuer la température des corps, ce sont toujours les substances plus pesantes qui seront les plus avantageuses, si elles ne changent point d'état. Il est très-rare que l'on ait besoin d'employer des bains de métaux, & jusqu'à présent on n'y a pas même pensé, quoiqu'ils puissent sans doute être d'une grande utilité dans quelques opérations, & faire découvrir quelques vérités nouvelles sur les propriétés des corps.

Ce que nous venons de dire sur les propriétés de communiquer ou d'enlever le calorique aux corps de la part des bains métalliques, peut être appliqué à toutes les autres matières. L'on obtiendra toujours des effets d'aurant plus marqués, que les matières balancantes seront moins capables d'absorber le calorique. Sous ce point de vue les métaux doivent être envisagés comme des corps qui absorbent le calorique en raison directe du nombre de leur molécules, ce qui les met au-dessus de tous les autres corps puisqu'ils sont les plus lourds, & qu'ils le transmettent dans la même raison; & comme ces corps, au moins la plupart, ne changent d'état & ne se réduisent en vapeurs qu'à une température très-élevée, il en résulte qu'ils absorbent & communiquent dans le même-temps une plus grande quantité de calorique que tout autre corps.

Il est vrai que sous le même volume leur température s'élève moins vite que celle d'un corps léger, tel que l'alcool, l'éther, &c. mais toutes choses d'ailleurs égales, les bains formés de substances pesantes, sur-tout de métal, auront toujours l'avantage, car ils absorbent mieux le calorique & en laissent beaucoup moins perdre, quand toutefois la matière que l'on veut échauffer leur présente un grand contact.

Le sable est de toutes les matières celle que l'on emploie le plus communément aujourd'hui pour un grand nombre d'opérations; le plus pur & le plus fin mérite la préférence. Ce n'est pas pourtant que l'oxide de fer auquel il est souvent uni y nuirait; on doit choisir le plus fin, parce que les molécules peuvent se toucher plus intimement, former une masse d'un plus petit volume, & communiquer dans le même temps plus de calorique aux corps, que s'il étoit par petits morceaux: sa température s'élève d'ailleurs aussi beaucoup plus haut.

On se sert aussi très-souvent de bains de cendre mais il est moins commode que celui de sable; sa température ne s'élève pas aussi haut & n'est pas aussi égale dans tous les points du bain; il faut l'employer bien brûlée, bien fine, & autant qu'il est possible privée de charbon, car celui-ci ne laisse que difficilement pénétrer le calorique.

Le bain d'eau ou *bain-marie*, est d'un usage très-multiplié en raison des grands avantages qu'il présente; 1°. il est à la portée de tout le monde, par son abondance & son peu de valeur; 2°. l'équilibre du calorique s'établit facilement & assez également dans toutes ses parties; 3°. il communique un assez grand degré de chaleur; 4°. ce degré de chaleur est constamment le même, tant qu'il y a un espace libre pour l'issue de la vapeur d'eau.

On pourroit employer l'huile fixe au même usage, mais ce seroit un moyen fort cher, dont les inconvénients équivaleroient le léger avantage de quelques degrés de chaleur qu'il communiqueroit plus que l'eau.

L'alcool & l'éther pourroient aussi servir de bain, ils auroient l'avantage de ne communiquer que très-peu de calorique à la fois, à raison de leur légèreté; mais ces matières étant extrêmement chères, on ne s'en sert que pour des expériences de recherches & d'une grande importance.

Quant aux bains de fumier, ils n'ont pas plus d'efficacité que les bains de route autre matière, si ce n'est qu'ils ne demandent point de soins, & qu'ils ne coûtent rien; mais on ne peut pas s'en servir pour des expériences exactes, & qui exigent une chaleur égale, car on conçoit que la température des bains de cette nature doit varier sans cesse suivant une multitude de circonstances; la température de l'atmosphère, son humidité & celle du fumier lui-même, doivent faire varier continuellement l'état du calorique dans le fumier.

Cette différence est telle, que certains fumiers, & souvent le même, sont quelquefois à la température de l'air, & d'autres fois à un degré qui peut porter l'inflammation dans certains points du fumier.

Les alchimistes se servoient beaucoup de ce bain dans l'idée de se rapprocher des opérations de la nature, & former de l'argent & de l'or, comme si toutes les opérations des hommes n'étoient pas celles de la nature.

Le marc de raisin a aussi servi aux chimistes pour faire des vases; mais il est sujet aux mêmes inconvénients que celui de fumier, en raison des changements plus ou moins rapides qu'il subit.

Nous ne parlerons pas du bain de ventre de cheval, car il est en même-temps superflu & impraticable; on peut aisément se procurer par des moyens simples le même degré de chaleur que celui du cheval.

Après avoir parlé des matières principales qui servent à faire des bains, il est nécessaire de dire quelque chose des vases qui servent à les contenir. Ces vases sont de nature & de forme différentes suivant les nécessités. Comme ces vaisseaux la plupart du temps sont destinés à aller sur le feu, on les fait de substances qui peuvent y résister, comme de fer, de terre, &c.

Quand on n'a qu'une opération à faire à la fois, c'est une poêle de fer, de la forme d'une poêle à frire, dont on a coupé une partie de la queue. C'est le plus souvent de sable qu'est le bain que contiennent ces poêles. Elles ne durent que très-peu de temps, sur-tout quand elles sont souvent exposées à un grand feu; elles s'oxydent & bientôt elles sont percées; il est plus avantageux de se servir de chaudières de fonte qui coûtent moins cher, & qui ne s'oxydent point. On fait aussi de ces vases en terre mêlée, qui ne se cassent pas au feu, mais qui se délitent promptement & se réduisent en poussière; quand ils sont plus cuits & qu'ils ont éprouvé une demi-fusion, ils ne se divident point ainsi, mais ils se cassent facilement.

Les creusets se font souvent de vases dans lesquels on met du sable pour chauffer fortement pendant long-temps des matières renfermées dans des maras, des phioles à médecine, &c.

Quand on a beaucoup d'opérations à faire à la fois, on fait bâtir en briques sur un long tourneau un vase carré que l'on double ordinairement en tôle; c'est ainsi que sont construites les galeries sur lesquelles nous reviendrons à ce mot. On pourroit substituer aux briques & à la tôle une caisse carrée en fonte, d'une seule pièce, qui dureroit dix fois plus que le tourneau, & qui coûteroit beaucoup moins cher que les briques & la tôle.

Les bains servent à diverses opérations suivant le degré de calorique qu'ils peuvent communiquer; le bain de sable, par exemple, peut élever la température des matières qui y sont exposées aussi haut que le feu nu, & servir aux mêmes opérations; il a l'avantage sur le feu nu, de répandre

la chaleur avec plus d'égalité & de la retrancher par degrés plus insensibles, aussi faut-il avoir beaucoup d'attention lorsque l'on fait chauffer sur ce bain des matières susceptibles d'augmenter subitement de volume & de sortir des vases qui les contiennent, de ne point élever sa température jusqu'à ce point, car alors on ne pourroit pas, même en supprimant tout le corps combustible, diminuer assez promptement le calorique, parce que la masse de celle qui est dans le bain de sable agit toujours sur la matière; il faut dans ce cas, s'il est possible enlever le vase du bain.

Le bain d'eau & le bain de vapeur d'eau, ne s'élèvent qu'à 80 degrés, le baromètre étant à 28 pouces; ils agissent sur les végétaux & les animaux, sans les déorganiser entièrement, à la manière du bain de sable. Cependant il ne faut pas dire que la température de l'eau & de sa vapeur ne changent pas quelque chose à la matière interne des végétaux & des animaux; les changements de couleur, de consistance, d'odeur & de saveur que ces matières éprouvent, quoique d'une manière encore inconnue à la plupart des hommes, en sont des preuves sans réplique. Certainement la viande cuite dans l'eau n'est plus ce qu'elle étoit auparavant. Les légumes & autres matières cuites à la vapeur de l'eau dans la marmite américaine, sans avoir presque perdu de poids, changent aussi beaucoup dans leur nature intime. Ces changements, quoique fort intéressants, ne doivent point nous occuper ici, ils seront traités comme il convient, par M. Fourcroy, à leur lieu & place. Nous n'avons pas cru devoir faire dessiner de figures de bains, ils sont assez connus, même de ceux qui ne s'occupent pas en particulier de la chimie; nous verrons cependant aux mots CHAUDIÈRE, POÊLE, les figures de ces vases qui y servent communément. (M. VAUQUELIN.)

BAINS. (*Pharmacie.*) On se sert dans les laboratoires de pharmacie des différentes espèces de bains dont il a été question dans l'article précédent. La chaleur produite par le bain de fumier, le bain-marie, le bain de cendres, le bain de sable, est nécessaire pour un grand nombre d'opérations & de préparations pharmaceutiques; mais il n'y a rien de particulier à ajouter ici sur cerobjet, & ce qui a été dit pour la chimie convient également à la pharmacie.

BAION. (*Pharmacie.*) Surnom donné à une espèce d'emplâtre que Paul décrit dans son livre 7 chap. 18.

BALANCE. C'est un instrument indispensable dans un laboratoire de chimie. C'est à lui seul que cette science doit tous les progrès qu'elle a faits depuis quelque temps. C'est en déterminant avec exactitude le poids des matières que l'on combine & les produits de leur combinaison, que l'on est

parvenu à la connoissance certaine des principes de plusieurs corps, & des proportions de ces mêmes principes.

Il y a deux sortes de balances, la balance ordinaire, & la balance romaine ou le pèse.

La balance ordinaire est composée d'un fléau divisé en parties égales par un axe, d'une chaffe qui sert de point d'appui à l'axe, de deux bassins suspendus aux extrémités du fléau, & d'une aiguille qu'on appelle le juge, parce que c'est par son moyen que l'on établit l'équilibre entre deux corps lorsqu'elle répond exactement à un point fait sur la chappe au centre de gravité. Pour qu'une balance soit exacte, il faut 1°. que le point de suspension soit placé au centre de gravité, 2°. que l'axe présente le moins de surface possible à la chaffe qui le reçoit, & qu'il soit d'un acier bien trempé & bien poli. 3°. Que la chaffe soit aussi d'une matière très-dure & très-polie; on se sert avec avantage d'agate à pâte fine à laquelle on a donné le poli le plus doux possible. 4°. Que les bras du fléau soient le plus longs possible, afin que la différence entre les masses que l'on compare soit plus sensible; il ne faut cependant pas que cette longueur excède certaines limites, sur-tout dans les balances destinées à peser beaucoup de livres, car on seroit obligé, pour ne pas déformer le fléau, d'ajouter de la matière, & cette masse détruiroit la sensibilité que l'on cherche dans la longueur du fléau. 5°. Que la longueur des bras soit exactement semblable, car sans cela on ne pourroit avoir de comparaison entre les corps que l'on veut peser, puisqu'ils agiroient avec des vitesses différentes, & qu'il seroit possible qu'un corps plus léger fût en équilibre à un corps plus pesant.

La théorie de l'action des corps sur cette espèce de balance doit être rapportée à celle d'un levier du premier genre, dans lequel la puissance & la résistance sont également éloignées du point d'appui; si seroit inutile d'y insister, on la trouve développée dans tous les livres de physique.

La balance romaine, ou pèse, est encore un levier du premier genre, mais où la puissance a plus ou moins d'avantage sur la résistance, de sorte que l'on peut faire équilibre à une masse considérable avec un très-petit poids.

Cette espèce de balance est d'un usage très-commode, car l'on peut avec le même poids, souvent très-petit, peser différentes masses en éloignant plus ou moins le poids du point d'appui. Mais cet avantage est bien diminué par le peu de sensibilité de cette balance; elle ne peut approcher du poids vrai qu'à une très-grande latitude, aussi ne s'en sert-on que pour de grosses masses dans lesquelles on néglige de grandes fractions de livres & souvent même des livres entières. Ces balances ne doivent point entrer dans les laboratoires de chimie, & leur usage doit être borné au commerce.

C'est à cette espèce de balance qu'on doit rapporter celle de Sanctorius; cette balance a l'avantage

de faire équilibre par un de ses bras avec de petits poids à des grandes masses pesantes sur l'autre; elle a été destinée par le médecin dont elle porte le nom, à se peser soi-même & pouvoir changer facilement de poids, afin de connoître les pertes que l'on faisoit dans des espaces de temps donnés, &c.

Dans un laboratoire de chimie bien monté, il doit y avoir des balances de différentes grandeurs, afin de pouvoir peser depuis un quintal de livres jusqu'à $\frac{1}{100}$ de grain. On conçoit facilement qu'il est impossible de remplir ces deux extrémités avec le même instrument, & qu'il faut absolument le proportionner aux masses des corps qui doivent être pesés.

Les grosses balances ne sont jamais aussi exactes que les petites, parce que le nombre des parties qui pèsent sur le centre de gravité ou sur le point d'appui, y déterminent une attraction, un frottement qui diminuent la sensibilité de la balance. L'on est cependant parvenu à faire des balances qui sont susceptibles de trébucher ou d'osciller avec dix grains lorsqu'elles sont chargées de 150 ou même 200 livres. Des balances de cette espèce sont extrêmement précieuses, & ne font nécessaires que dans les laboratoires de chimie & dans les cabinets de physique où doivent éclore de nouvelles vérités sur les proportions des principes des corps, &c. Ces balances quoique fort exactes, sont encore bien éloignées du degré de sensibilité nécessaire pour peser certains corps précieux, tels que l'or, le diamant, &c. Celles qui servent à des opérations de cette nature sont faites sur de plus petites dimensions, & peuvent osciller par la présence d'un 500 de grains dans l'un de leurs plateaux.

Elles sont construites sur les mêmes principes que les grosses, il n'y a de différence que dans la nature plus identique, & dans un travail plus parfait de la matière. On les nomme balances d'essai.

Il est en général plus facile de se procurer pour de petites pièces l'acier plus semblable dans toutes les parties; l'axe sur lequel reposent la masse du fléau & le poids dont il est chargé, & la base qui le reçoit, sont plus délicats, mieux polis & conséquemment plus sensibles à l'impression des poids. Les poids dont on le charge ne sont pas proportionnels à ceux des grosses balances relativement à la base de l'axe. Pour que les balances conservent leur exactitude, & toute la sensibilité qui est nécessaire dans les expériences de chimie, il faut qu'elles soient renfermées dans des endroits secs & où il ne règne point de vapeurs acides sur-tout. On renferme même celles qui sont destinées à évaluer le poids des très-petites masses de matière dans des cages de verre faites exprès. Ces cages ont encore un autre avantage, c'est de mettre les balances à l'abri de l'air agité, qui sans cela s'oppose à l'établissement de l'équilibre, en permettant de peser,

lors même qu'elles sont fermées, au moyen d'une manivelle ou d'un cordon qui sortent au-dehors & qui élèvent ou abaissent le fléau suivant le besoin.

Lorsqu'on ne se sert pas souvent des balances il ne faut pas se contenter de les conserver dans un appartement sec; l'air flegme contient assez d'humidité pour les altérer à la longue, sur-tout quand sa température diminue & qu'il laisse précipiter un peu d'humidité; il est avantageux de les enfermer dans une boîte bien fermée au milieu du coton, ou bien dans le feu tout simplement quand ce sont de grands balances; avec cette précaution elles ne s'altèrent point, & leur justesse est conservée pendant long-temps.

On suspend les balances de différentes manières, suivant les usages auxquels elles sont employées; quand elles sont très-grandes & qu'elles sont destinées à supporter de grands poids, on les attache au moyen d'un piton fixé dans la poutre d'un plancher; c'est dans ces balances que l'on pèse les quintaux. D'autres balances sont assez légères & doivent supporter assez peu de poids pour qu'on les puisse facilement tenir à la main. Dans le commerce du détail où l'on a besoin de peser souvent & promptement, & où les deux mains sont nécessaires pour diriger les marchandises, les balances sont attachées à un support formé d'une tige métallique, fixée dans une masse de cuivre garnie en plomb à l'intérieur; cette tige qui est ordinairement de cuivre, est courbée en demi-cercle à sa partie supérieure, pour éloigner la balance & lui donner du jeu.

Pour conserver plus long-temps la sensibilité aux balances, on a imaginé de les supporter lorsqu'on ne s'en sert pas sur des points qui sont différents de celui où elle porte lorsqu'on s'en sert. Tantôt ces points d'appui sont aux extrémités du fléau, tantôt c'est sur une autre partie du couteau.

M. Fortin a construit, pour M. Fourcroy, une balance de ce genre, qui est fort ingénieuse, voyez fig. 2. cl. 2, elle est composée de deux cylindres contenus l'un dans l'autre, l'extérieur A est fixe & porte deux bras (BB), l'intérieur (CC) est contenu dans le premier, & peut monter & descendre à volonté; ce cylindre est divisé en deux parties, l'une (a) qui est encastrée dans le pied du premier cylindre & qui est susceptible de faire un demi-tour par le moyen d'une manivelle. (E) A la partie moyenne du cylindre intérieur, il y a une échancrure (F) dans laquelle entre une lame d'acier, (G) qui tient au morceau de cuivre auquel est attaché le plomb. A la partie inférieure de ce cylindre est une languette, (H) qui s'avance & qui est coupée sous un certain angle. Quand la balance est en repos, cette languette entre dans l'échancrure, (I) qui représente un plan incliné.

Dans cet état de repos la manivelle de la balance doit être placée à gauche, & lorsqu'on veut la mettre en mouvement, ou la tourner à droite; alors la portion inférieure du cylindre tourne, la partie la plus élevée de son plan incliné s'avance

Chimie. Tome II.

sous la languette de la partie inférieure du cylindre, & celui-ci est obligé de s'élever sans pouvoir tourner. Il faut concevoir que l'échancrure que ce cylindre porte dans son milieu n'est pas entièrement remplie par la lame d'acier qui y entre. Il reste un espace vide on haut & en bas qui lui permet environ un pouce de mouvement; ce cylindre intérieur en s'élevant rencontre le couteau qui est très-acéré, & lui présente deux plans d'acier très-durs & très-polis qui y sont foudés. A l'extrémité des bras (BB) sont fixés par des vis deux lames de cuivre (KK) qui s'élèvent perpendiculairement & qui portent deux pointes d'acier qui doivent coïncider avec deux autres pointes parcellées (LL) supportées sur la partie supérieure du fléau: quand la balance est parfaitement en équilibre, on voit ces parties de la balance détachées en (m) & en (n) milles en coïncidence. L'extrémité (o) du cylindre intérieur à deux échancrures pour admettre le fléau lorsqu'il est en équilibre; le cylindre extérieur, en a quatre pour le passage du fléau, & deux pour le couteau. Ces deux cylindres sont recouverts par une double calotte vue en (p.) & (q.)

On voit en (r) au bout d'une languette excédente, un cordon roulé sur une vis, au moyen de laquelle on peut élever & abaisser un cône de cuivre qu'il supporte, & qui doit correspondre avec une petite pointe fixée dans la base du cylindre extérieur. Cet à-plomb est représenté séparément en (t). Cette base & toute la balance est supportée par trois pieds semblables aux deux que l'on voit (s, t) qui sont percés par des vis qui servent à établir l'équilibre.

Les extrémités du fléau sont courbées en demi-cercle, dont l'extrémité relève, & est échancrée de manière à recevoir un crochet auquel sont attachés les cordons des bûssins. Cette disposition fait que dans toutes les inclinaisons du fléau, la ligne de traction se fait toujours à la même distance du point d'appui, & ne change point, comme cela a lieu constamment dans les balances ordinaires. On voit en S & en V les deux extrémités du fléau en perpétuelle, afin qu'on puisse reconnaître comment ils sont disposés.

Cette balance présente beaucoup d'avantages sur les balances qui ont été en usage jusqu'à présent; 1°. elle a un double repos qui ménage la sensibilité du couteau; 2°. elle a deux points de coïncidence qui dispensent d'une aiguille qui apporte toujours quelque inexactitude dans les pesées; 3°. la manivelle par le moyen de laquelle on fait tourner le plan incliné, & on élève le cylindre intérieur, donne la liberté de pouvoir enfermer la balance dans une caisse de verre & de peser de dehors; ce qui est très-avantageux pour les pesées délicates, où il est important que le mouvement de l'air n'influe point.

Cette balance est très-sensible; elle peut peser depuis 1 grain, jusqu'à 4 livres. Chargée de 4 li-

511

wres, elle trébuche encore à un quart de grain. Il seroit à désirer qu'elle se multipliât dans les laboratoires de chimie, & que son usage se répandit davantage. On en tireroit de grands avantages.

B A L A N C E D' E S S A I .

La balance d'essai est construite à-peu-près sur les mêmes principes que celle que nous venons de décrire; elle a comme elle un repos particulier sur les extrémités du couteau, qui ne s'appuyent sur rien, lorsqu'elle est mise en équilibre; le mécanisme intérieur est le même, quoique d'une forme un peu différente. On voit cette balance dans sa caisse, dont le devant est ouvert, *fig. 3, et 2.*

On voit une coupe de profil de cette balance, *fig. 12, et 2.* On remarque que la colonne de cuivre est creuse, & qu'un petit cylindre d'acier (A), surmonté d'un support d'acier, trempe & poli est contenu dans son intérieur. Au bas de cette tige est attaché un cordonnet de soie; (B) qui passe sur une poulie (C) placée quelques lignes au-dessus. Au bout du cordon est un rond de bois d'ébène (D), garni de velours en dessous, & qui est destiné à glisser sur la table avancée de la balance.

Quand la balance est sur son repos, les deux extrémités du couteau portent dans deux échancrures pratiquées dans l'intérieur des deux lames de cuivre qui terminent la colonne de la balance. On voit de face, *fig. 13*, une de ces plaques échancrées; on les voit réunies & remplies par les extrémités du couteau, *fig. 14, et 2*, représentée en perspective. La *figure 15* représente le couteau vu par son extrémité; on le voit tourné de côté, *fig. 16*; on voit dans la *fig. 17* les deux lames d'acier élevées & portant le couteau, comme quand la balance est mise en action.

On concevra maintenant que lorsqu'on voudra se servir de la balance d'essai, on doit tirer le cordonnet; celui-ci ramenant l'extrémité du cylindre de fer sur la même ligne que celle de la poulie, il montrera exactement de la différence qu'il y a entre ces deux lignes. Dans cette balance la différence est environ un ponce, duquel la balance s'élève ou peut s'abaisser.

En montant ainsi, le quarré d'acier dont il manque un côté rencontre le couteau du fléau, & met celui-ci en état de comparer les masses qui pèsent à ses extrémités; il faut que la masse de bois (D), garnie de velours, soit lourde pour faire équilibre au fléau, aux bassins, à la matière qu'ils contiennent, au quarré d'acier & à la tige qui le supporte, afin qu'il tienne toutes ces parties suspendues, sans qu'on soit obligé d'y tenir la main, & qu'elle ne retombe point au repos d'elle-même.

Les extrémités du fléau (E F) sont deux angles droits, l'un en montant, & l'autre en descendant; de ce dernier angle s'élèvent deux points entre lesquels est retenue la branche (I F) du bassin. Ces branches sont courbées ce dedans en dehors, &

portent un petit bassin en (G) sur ces petits plateaux se mettent d'autres plateaux (H) un peu plus grands, cette disposition est faite pour faciliter le travail & pouvoir mettre ou retrancher des matières dans les bassins. On voit sur la table interne de la caisse de la balance un niveau (I) qui sert à établir l'à-plomb entre toutes les parties de la balance; il est composé d'une bafe de cuivre, d'un cylindre de verre enchaîné par les deux extrémités par un étui de cuivre. Ce tuyau de verre est en partie rempli d'eau colorée & d'air; on n'y laisse d'air que ce qu'il en faut pour remplir l'espace contenu entre les deux cercles de cuivre qui tiennent le cylindre de verre. Pour savoir si la balance est d'à-plomb, on place le niveau sur le devant & sur un des côtés, & si l'air reste constamment dans chacune de ces positions entre les deux cercles, la balance est d'à-plomb. Si elle n'est pas d'à-plomb, on peut l'y mettre au moyen des pieds (K) de la balance qui sont en viselles & qui peuvent s'allonger & se raccourcir à volonté.

De la partie supérieure de la colonne s'élève un corps en cuivre (M) qui porte à sa partie supérieure une plaque solide divisée en plusieurs parties égales, & ce n'est que lorsque l'aiguille est parfaitement vis-à-vis la moyenne qu'il y a équilibre entre les deux bras du fléau; plus cette aiguille est longue, plus la différence de l'équilibre est grand, à raison du plus grand angle qu'elle décrit.

Quand on veut supprimer l'un des bassins, lorsque la balance est en équilibre, on soutient l'autre côté qui devient prépondérant avec le petit instrument que l'on voit en (L).

Cette balance doit être renfermée dans une caisse de verre, comme on la voit dans la *figure 3*.

La partie antérieure de cette caisse doit s'ouvrir, & lorsque la partie mobile est élevée convenablement, elle doit être soutenue par deux ressorts dont la force doit surpasser la pesanteur du chassis. Cette caisse a ordinairement comme dans le modèle, un tiroir, pour renfermer tous les ustensiles nécessaires pour l'emploi de la balance; la bruyelle (N) que l'on voit dans la caisse, sert à mettre dans les bassins les matières à peser & les poids.

Les poids dont on se sert avec cette balance ne sont point des poids de marc, on les nomme *poids de semie*, l'unité de ces poids est nommé *karat*; il représente un demi-grain; le karat est divisé en 32 parties que l'on appelle 32 de karat qui représentent des 64 de grain poids de marc. Ces poids étant destinés à apprécier celui de matières très-précieuses, telles que l'or, le diamant, il est nécessaire qu'ils soient extrêmement divisés.

Ces poids sont ordinairement aplatis & portent à leur partie moyenne un petit bouton, afin de se faire saisir plus facilement par la pince; les divisions des karats qui sont très-légères, & qui par conséquent n'offrent pas assez de matière pour l'or-

mer un bouton, sont relevés par un de leurs angles, & ils font quarrés. Ces poids font en or.

Pour peser l'argent, on se sert du dénier qui représente 3 grains. Chaque denier est divisé en douzième de denier qui représente un quart de grain ; & ces poids sont en argent ; ils sont renfermés les uns & les autres dans des boîtes où il y a autant de compartimens, qu'il y a de poids & de divisions de poids. Cette boîte est représentée *fig. 17. cl. 2.* Elle est couverte par un double couvercle, l'un qui se pose immédiatement sur les poids, & qui porte un bouton dans son milieu pour pouvoir être enlevé ; l'autre qui prend exactement sur celui-ci, & qui entre dans des coulisses, de sorte que les poids ne peuvent sortir de leurs bafes, lors même que la boîte est renversée. Le couvercle supérieur de ces boîtes est représenté *fig. 18. cl. 2.*

Beaucoup d'instrumens font nécessaires pour l'usage des balances d'essai ; il faut des ciseaux, des marteaux, des enclumes, des graters-boîtes, des limes, &c., instrumens sur lesquels nous reviendrons à leurs noms.

L'usage des balances d'essai n'a rien de particulier. Les principales précautions à prendre sont relatives aux matières précieuses que l'on y pèse, & elles seront indiquées aux mots COUPELLATION, ESSAI, &c.

Il faut seulement qu'elles soient parfaitement propres ; car le moindre corps étranger pourroit apporter une erreur dans les pesées. On fait qu'il faut agir avec la douceur qu'exige la délicatesse de cette balance. Elle doit être conservée dans un lieu sûr, & où il n'y a pas de vapeurs acides.

Pour en écarter l'accès des corps extérieurs, on enveloppe la caisse d'une seconde caisse de bois, & celle-ci d'une grosse toile. Par ce moyen on peut les conserver long-temps avec toute leur sensibilité.

BALANCE. (*Pharmacie.*) Quoique les détails des articles précédens relativement aux différentes espèces de balance ne soient pas essentiellement nécessaires au pharmacien, il ne peut cependant y avoir que de l'avantage à prendre ces connoissances dans l'exercice de cet art. Dans les laboratoires de pharmacie on n'a besoin que de 3 sortes de balance, celle pour peser plusieurs livres, une autre pour peser des onces, & une troisième pour peser les grains. c'est particulièrement à ces dernières que le pharmacien doit porter toute son attention ; elles servent à peser les médicamens les plus énergiques, les plus actifs, & ceux dont il est le plus important de donner des quantités exactes, telles que le muriate de mercure corrosif, ou *sublimé corrosif*, le tartrate d'antimoine & de potasse ou le *tartré stibié*, le kermès, &c. Les balances qui servent à peser les substances actives doivent être très-justes, & leurs plateaux formés avec des matières qui ne puissent point altérer les

médicamens qu'on y pèse ; c'est ordinairement d'argent pur que les pharmaciens font faire ces espèces de balances ; quelques-uns se servent de capsules de verre, ou de verres de montres ajustés pour faire ces balances, & cette méthode est assez bonne. D'après ce court exposé sur la nécessité d'avoir des balances très-justes, il n'est presque pas besoin de faire remarquer qu'on ne sauroit trop condamner l'habitude où l'on est dans quelques pharmacies, de donner sans peser & par le seul coup-d'œil le tartrate d'antimoine & de potasse, ou d'autres préparations aussi énergiques que celles-là. C'est une pratique dangereuse, qu'un homme éclairé & honnête ne doit jamais se permettre.

BALANCE HYDROSTATIQUE. Cette balance est un instrument avec lequel on détermine la pesanteur spécifique des corps. Pour cela il faut déterminer combien un poids donne d'un corps perd de sa pesanteur absolue lorsqu'il est plongé dans un liquide. On se sert de l'eau, parce que ce liquide est commun, & plus constamment semblable à lui-même. Lorsqu'on veut peser un corps dans l'eau, on le suspend à un des bras d'une balance, dont l'autre porte un bassin dans lequel on met des poids jusqu'à ce qu'il fasse équilibre parfait avec le corps suspendu dans l'air, & on note ce poids. On plonge ensuite dans l'eau ce même corps, alors l'équilibre est rompu, la balance penche du côté des poids, dont on retranche une partie jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli. La différence de pesanteurs du corps dans l'air & dans l'eau, donne sa pesanteur spécifique. Pour éviter les erreurs qu'on pourroit commettre pendant ces opérations, il faut avoir égard aux circonstances suivantes, 1°. l'eau dont on se sert doit être bien pure ; 2°. la température doit être exactement notée, ainsi que celle des corps qu'on y plonge. L'eau ne peut servir à déterminer la pesanteur spécifique que des corps plus pesans qu'elle, car s'ils étoient plus légers ils ne pourroient s'y plonger par leurs propres poids.

Dans ce cas, il faut avoir recours à des liquides plus légers que l'eau, tels que les huiles volatiles, l'alcool, l'éther, &c. dont le rapport de pesanteur avec l'eau soit connu. On sent aisément que la balance hydrostatique ne peut servir à peser des corps dissolubles dans l'eau ; il faut donc chercher un liquide qui soit plus léger & qui n'agisse pas sur ces mêmes corps. La balance hydrostatique pourroit servir en quelque façon d'aréomètre pour peser les liquides, en suspendant à un de ses bassins un corps quelconque, & sur-tout une boule de cristal dont on connoitroit exactement le poids dans l'air, & en plongeant successivement cette boule dans différens liquides, on en reconnoitroit le rapport par les pertes différentes que la boule y éprouveroit. Nous n'avons pas cru nécessaire de donner les

seure de la balance hydrostatique, parce qu'elle doit être décrite & gravée dans la physique.

BALANOS. (*Pharmacie.*) Mot grec adopté par les latins & employé par un grand nombre de pharmacographes, pour désigner le gland ou le fruit du chêne; mais par la suite on a employé cette dénomination pour désigner différentes substances dont la forme approchoit de celle du gland; ainsi on a donné ce nom à un coquillage marin, au fruit on noir de ben, que l'on distinguoit par l'épithète de *balanus myrteus* ou *glans myrtaria*. On a encore employé ce nom pour désigner un suppositoire.

• **BALAUSTES.** (*Pharmacie.*) On nomme balaustes les fleurs du grenadier qui entrent dans la préparation du syrop de myrthe, du syrop magistral, de la poudre astringente du codex de Paris, du vin astringent, des trochisques de karabé. (*Voyez* le mot **GRENADIER.**)

BALISIER. (*Pharmacie.*) *Canna indica*. *Cannacorus*. Rumph. Amb. 3. 177. t. 71. f. 2. Charmante plante indienne qui croît spontanément en Afrique, Asie & Amérique, entre les Indes; elle est pérennelle; on la cultive dans les jardins des curieux.

L'on dit sa racine détersive, apéitive, diuréti-que; on s'en sert rarement.

La graine du balisier teint en beau pourpre; il seroit à désirer qu'on pût fixer cette couleur & la rendre durable; divers oiseaux, les pigeons ramés sur-tout, sont fort friands de cette graine, ce qui rend leur chair amère. Barreire dit que les sauvages mangent aussi ces graines par délices dans quelques contrées. On ne se sert de ces mêmes graines en place de plomb pour tuer les animaux, elles servent aussi à former des chapelets, les feuilles sont employées par les Indiens à divers usages économiques.

(M. WILLEMET.)

BALITISTERA. (*Pharmacie.*) Dénomination barbare employée par quelques arabistes & alchimistes, pour désigner une terre rouge. (RULAND.)

BALLE D'ANTIMOINE. (*Pharmacie.*) On a ainsi nommé l'antimoine fondu & coulé dans des moules, de manière à former des petites boules ou balles, propres à être avalées; ces balles d'antimoine ont aussi été nommées *pillules perfoliées*.

BALLON. Les ballons sont des vases de verre arrondis, à une ou plusieurs ouvertures. Ils ont un col d'environ trois à quatre pouces, destiné à donner passage aux matières que l'on veut y mettre, ou recevoir le bec d'une cornue ou de tout autre vase. Les ballons qui n'ont qu'une seule ou-

verture, comme celui-ci, sont nommés ballons simples, on en voit un *fig. 1, cl. 6.*

Il y a d'autres ballons qui ont deux ouvertures, exactement opposées, l'une semblable à celle que nous venons de décrire dans le ballon simple, & l'autre qui se termine en une pointe, destinée à entrer dans un autre ballon pour faire communiquer leurs capacités; il est appelé, quand il est seul, *ballon à deux pointes* (*fig. 3, cl. 6.*), & quand il est réuni avec un autre, on nomme leur réunion *ballons enfiés*.

D'autres ballons, au lieu d'avoir les ouvertures opposées, les ont perpendiculaires l'une à l'autre; on peut les tourner tantôt en dessus, tantôt en dessous, suivant la nature des matières sur lesquelles on travaille. On la tourne vers la partie supérieure quand c'est un gaz qui doit se dégager, & que l'on conduit dans un autre vase par le moyen d'un tube qu'on y a mâtiqué; on peut le voir *fig. 3, cl. 6.* Quand c'est au contraire une ou plusieurs substances liquides que l'on veut séparer à mesure qu'elles arrivent dans le ballon, on la tourne en bas, & on l'ouvre en plaçant au-dessous un flacon pour recevoir la liqueur. Ce ballon se voit *fig. 6, cl. 6.* On fait aussi de ces ballons qui ont les quatre ouvertures dont nous venons de parler, & qui sont quelquefois nécessaires; on en voit un *fig. 7, cl. 6.*

C'est particulièrement dans les distillations simples & composées que sont employés les ballons; ceux qui sont tubulés servent spécialement aux distillations pneumatochimiques, & les simples aux distillations simples, où il n'y a pas dégagement de gaz. Les ballons tubulés coûtent infiniment plus cher que les ballons simples, à cause de la difficulté de leur exécution; il est avantageux d'après cela dans un laboratoire de chimie, & sur-tout dans les ateliers où l'on s'occupe de cette science en grand pour les arts de savoir soi-même faire aux ballons simples des ouvertures propres aux opérations que l'on a à faire, & diminuer par-là le prix de ces vases. Il est vrai que l'on ne peut pas appliquer un bouchon de cristal à ces ouvertures comme à celles des ballons tubulés, & qui ont un goulot excédent, mais l'on peut en faire qui peuvent recevoir des bouchons de liège, & sur-tout des tubes pour porter les gaz dans des bouteilles destinées à les recevoir.

Le meilleur moyen de percer des trous aux ballons, c'est de les mettre sur un tour fait exprès, & de poser légèrement & par degrés une mèche creuse à leur surface; au bout de plus ou moins de tours, on emporte la pièce du ballon & l'on a un trou parfaitement rond. Il ne faut pas appuyer trop fortement la mèche sur le ballon, car on courroit risque de le briser s'il étoit mince; il faut avoir soin aussi de temps en temps d'huiler la mèche, afin que le frottement & la chaleur soient moins grands, & que le ballon ne casse pas.

Quand on n'a pas à sa disposition un tour, l'on

peut employer pour le même objet un bûtin d'acier, triangulaire, bien dur & bien acéré. L'on perce, il est vrai, à l'aide d'un long espace de temps, des trous aux ballons, en faisant avec sa main l'office d'un tour; l'on abrège beaucoup l'opération quand on se reconforte à l'endroit où il convient de former le trou, une bulle dans le verre. Quand le trou est fait on l'agrandit avec une lime ronde, appelée queue de rat, que l'on prend d'abord très-petite, & à laquelle on en substitue d'autres plus grosses successivement jusqu'à ce que le trou soit d'une grandeur convenable.

L'on peut aussi, avec la lime seule, percer de pareils trous; je ne me suis jamais servi d'autres instruments pour percer les trous des ballons, & j'y réussis assez constamment, quand j'y mets le temps nécessaire. Depuis que l'on connoit l'appareil de Woulfe, les ballons ont pris toutes sortes de formes; il faut mouiller la lime afin que le trou se fasse bien uni & bien rond.

Il n'est pas nécessaire de dire qu'il y a des ballons de toutes les grandeurs, depuis 50 pintes jusqu'à 8 onces.

BALLON. (Pharmacie.) Les ballons servent très-souvent en pharmacie pour recueillir les produits des différentes distillations qu'on y pratique; il faut même qu'on ait dans les laboratoires pharmaceutiques les différentes espèces dont il a été parlé dans l'article précédent; car les procédés à la réussite desquels ils sont destinés, se présentent quelquefois dans les opérations nécessaires pour la préparation des médicaments. Ainsi tout ce qui a été dit dans l'article de chimie doit être appliqué à la pharmacie, & il n'y a d'autres distinctions à faire à cet égard, que le peu de nécessité d'une exactitude aussi grande pour la dose ou la proportion des produits pharmaceutiques, c'est pour cela qu'on ne se sert pas aussi souvent en pharmacie, des ballons à doubles tubulures destinés à transporter par des tubes les produits aériiformes qu'il est indispensable de recueillir & de connoître en chimie, & qu'on peut négliger dans les opérations pharmaceutiques. Voyez & méditez l'article précédent.

BALEINE. (Pharmacie.) La baleine fournit à la pharmacie une huile fluide & grasse, qu'on n'emploie que rarement sous le nom d'huile de poisson, & l'espèce d'huile concrète cristallisée qui étoit fort en usage autrefois en médecine; c'est ce qu'on nomme blanc de baleine. (Voyez ce mot.)

BALLOTE FÉTIDE. (Pharmacie.) La ballote fétide, *ballota nigra* de Linnéus, est une plante labiée, plus connue en pharmacie sous le nom de marrube noir. Voyez l'article MARRUBE.

BALSAMINE. (Pharmacie.) *Impatiens balsa-*

mina. Balsamina, Dnd. *Pempt.* 71. Plante annuelle, originaire des Indes, dont les fleurs atompales de diverser couleurs, sont l'ornement & le charme des parterres. Elle se trouve aussi spontanément au Japon. On la dit vulnérinaire, détersive, tonique, mais on s'en sert peu en médecine; le fruit passe pour rafraîchissant, un peu dessicatif; il apaise les douleurs, sur-tout celles des hémorrhoides, il est bon extérieurement pour les hernies, les brûlures, les blessures des nerfs, les maladies de la matrice, les fissures des mamelles, & pour effacer les cicatrices.

Tournefort indique la préparation d'un baume simple & d'un baume composé avec la balsamine & l'huile d'olive. L'hunberg rapporte que les Japonais teignent en rouge leurs ongles avec le suc de cette plante & l'alun; c'est sans doute le suc de la fleur.

(M. WILLEMET.)

BALSAMINE JAUNE. (Pharmacie.) *Balsamina noli me tangere. Noli me tangere, Column. esphr.* 1. 149. Plante annuelle indigène, qui se trouve aussi dans les bois de Virginie & du Canada.

Les feuilles, suivant Gesner, appliquées à l'extérieur, excitent puissamment les urines, ce qui a engagé Craton à recommander cette plante contre les douleurs néphrétiques. Buchward la regarde comme vulnérinaire, & prétend qu'on peut l'appliquer sur les hémorrhoides & sur les plaies des parties nerveuses; suivant d'autres, pile & appliquee sur de vieux ulcères, elle les deterge & les fait cicatriser. Boershaave & d'autres auteurs prétendent que les feuilles de cette balsamine sont pernicieuses en lavement; cette plante est émettique, purgative, aperitive; laxative, propre contre la goutte, les luxations & les pieds tumescés, propre à la teinture & pour l'ornement des jardins; les chèvres la mangent.

(M. WILLEMET.)

BALSAMIQUE. (Pharmacie.) Le mot balsamique est employé en matière médicale, & quelquefois en pharmacie, pour désigner les substances naturelles ou artificielles aromatiques, les plus suaves, les plus douces & même fâdes, tandis que les aromatiques simples ou franches sont assez chaudes & même brûlantes. Cette expression est aujourd'hui peu employée; elle ne se trouve que dans quelques préparations officinales ou magistrales, comme les *pitules balsamiques* de Morton, &c. aussi la discussion relative aux balsamiques est-elle plus relative à la thérapeutique qu'à la pharmacie; on la trouvera dans le dictionnaire de médecine. Voyez le mot BALSAMIQUE dans le dictionnaire de médecine.

BALSAMO-SACCHARUM. (Pharmacie.) Expression employée par quelques pharmacographes modernes pour désigner une sorte de remède

que l'on prépare en faisant tomber quelques gouttes d'un baume sur du sucre, &c que l'on fait prendre au malade sous forme bolaire.

BAMBOU. (*Pharm.*) *Arun do bambas. Arundo arbor.* C. B. 18. Plante des Tropiques, la plus grande de tous celles de la famille des graminées; elle est vivace, son suc est infiniment précieux; c'est un sucre natif. Les Indiens s'en servent pour les blessures faites aux testicules & au pèuit. On le dit aussi très-bon dans les affections colériques, dans la dysenterie. On lit, dans Garcia, qu'il apaise les chaleurs, soit internes, soit externes, dans les fièvres, dans les fluxions bilieuses, la strangurie, l'urine sanguinolente.

La décoction des feuilles & de l'écorce prise en boisson, nettoie les plaies du sang qui y étoit resté. Elle est bonne aussi aux femmes accouchées pour détacher la matrice.

La racine est diurétique, propre pour exciter les mois aux femmes.

Les cendres de toute la plante sont extrêmement propres à la fertilisation des terres. Les Indiens fabriquent avec le bois toutes sortes d'ouvrages. Il est sudorifique. Les petits vers sont les cannes qu'on voit en Europe chez les marchands merciers. On fait à la Chine une grande quantité de papier avec la pellicule ou le *liber*, qui enveloppe le bois de bambou. La plupart des livres imprimés à la Chine font de ce papier.

(M. WILLEMET.)

BANANIER OU FIGUIER d'ADAM. (*Pharmac.*) *Musa paradisiaca. Musa clus. exot.* 229. Le bananier est un petit arbre des plus communs, des plus utiles & des plus salutaires de tous ceux qui le cultivent dans les climats froids sous la zone Torride ou dans son voisinage; son fruit est la principale nourriture des nègres de nos colonies; on le nomme banane, les Egyptiens, dit Lemery d'après Prosper Alpin, en font une décoction dont ils se servent pour adoucir l'acreté des rhumes; car ce fruit est adoucissant, humectant, propre pour les inflammations de la poitrine & des reins. Il excite la semence, soit qu'on le mange cuit ou crud; l'écorce du fruit verte, réduite en charbon & pulvérisée, guérit les ulcères.

Voici les qualités que Linguet attribue au bananier; l'eau du tronc est bonne pour le cours de ventre, pour nettoyer les yeux chasteux; l'eau du bouton, pour détacher les ulcères. Les auteurs du jardin de Malabar alléguent que sa racine écrasée, bouillie dans du lait est bonne pour abattre les vertiges; que son suc mêlé avec du sucre est excellent pour apaiser la chaleur brûlante des reins & les douleurs excitées par les urines acres, &c pour soulager ceux qui ont trop fait usage du mercure; la moelle de l'arbre ou la substance médullaire blanche qui porte le fruit, étant écrasée &

prise avec du miel est bonne pour les affections des yeux; le beurre dans lequel on fait frire des rouelles du fruit produit le même effet; le suc qui distille par les incisions de la racine est très-astringent.

Les feuilles servent à divers usages économiques; les bœufs, les moutons & autres quadrupèdes aiment beaucoup les tiges du bananier.

(M. WILLEMET.)

BANANIER A GRAPES DROITES (*Pharmac.*) *Musa troglodytarum. Musa uranocopus.* Rumpf. 5 p. 137. t. 61. f. 2. Ce bananier croît dans les Moluques. On ne mange point son fruit crud parce qu'il irrite la bouche; mais cuit légèrement sous la cendre, il prend une consistance visqueuse & une saveur douce qui le rend comestible. Il provoque l'urine & la teint en rouge.

(M. WILLEMET.)

BANDEAU. (*Pharmac.*) Remède qu'on applique sur le front entre deux morceaux de linge longs & petits en forme de bande. Ce remède très-souvent employé par les anciens dans les maladies de la tête & des yeux, est plus généralement connu sous le nom de frontal.

BANDURE. (*Pharmac.*) *Nepenthes distillatoria Cantharifer.* Rumpf. Amb. 3. p. 121. t. 59. f. 2. L'antre de l'île de Ceylan remarquable par sa follicule qui a la figure d'un penis, de plus d'un pied de long & plus gros que le bras; elle est à moitié pleine d'une liqueur agréable à boire, sa racine est astringente, les feuilles rafraîchissent & humectent; le suc qu'on en retire pris intérieurement peut soulager dans les fièvres ardentes; appliqué extérieurement il est vanté contre les éruptions & les autres éruptions inflammatoires. Il est parlé de cette plante exotique dans les éphémérides des curieux de la nature d'Allemagne.

(M. WILLEMET.)

BAOBAB, ou PAIN DE SINGE. (*Pharmac.*) *Baobab. J. B. S. Adansonia digitata.* M. Adanson a donné l'histoire de cet arbre exotique dans les mémoires de l'académie royale des sciences 1765, c'est donc d'après ce célèbre naturaliste, que nous allons extraire cet article. Le baobab est, sans contredit, le plus gros arbre, non pas de tous ceux qui sont cités dans les livres anciens ou dans les relations des voyageurs, mais de tous ceux qui ont été bien vus, & bien comparés existants de nos jours par des botanistes suffisamment éclairés; lorsqu'on le regarde de près, il parait plutôt une forêt qu'un seul arbre.

Le baobab croît naturellement en Afrique. spécialement en Egypte & au Senegal. Ses feuilles & ses fleurs amoures au feu, ou cuites dans l'eau, sont émollientes & résolutes lorsqu'on les applique extérieurement en topique. La décoction peite

intérieurement modère la transpiration excessive, corrige ou emousse l'acreté des humeurs, & tempère la trop grande ardeur du sang, les inflammations internes, les irritations, les ardeurs d'urine, les fièvres.

Prosper Alpin rapporte que la pulpe du fruit de cet arbre, réduite en poudre, est connue depuis long-temps pour le nom très-impropre de *terre figillée de Lemnos*.

Le baobab, est l'arbre le plus utile & le plus salutaire de tous ceux qui croissent au Sénégal. Ses feuilles sont les parties dont les nègres font le plus d'usage. Le fruit est rafraîchissant, propre à éteindre les ardeurs de la soif; il est acide. La coque ou l'écorce ligneuse de ce fruit, servent aux nègres à faire un excellent savon. Le tronc de l'arbre creusé forme une boîte de la grandeur d'une petite chambre.

(M. WILLEMET.)

BAQUET. (*Chimie*) C'est un vase dont tout le monde connoît les usages ordinaires; mais il peut être employé avec un grand avantage dans beaucoup d'expériences de chimie, que tout le monde ne connoît pas. C'est avec ce simple instrument que l'illustre Priestley a découvert tant de corps nouveaux, & qu'il en a fait connoître la nature & les propriétés; ce fut là enfin, la première cuve pneumatochimique.

L'on peut faire ces cuves pneumatochimiques, en coupant par la moitié, les pièces dans lesquelles on transporte le vin.

Lorsqu'on veut se servir de ces vases pour cuves pneumatochimiques, on fait adapter sur le tiers du tour intérieur à 4 ou 5 pouces du bord une coulisse en bois ou en plomb, pour admettre une planche qui doit être échancrée à un ou à plusieurs endroits pour recevoir des tubes, & percée à différents endroits de trous communiquant avec des entonnoirs en bois ajustés au-dessous de la planche pour transvaser des gaz. Il est quelquefois avantageux d'en avoir d'ovales, ils sont pour quelques opérations plus commodes que les ronds.

Pour qu'ils durent long-temps en état de servir de cuve pneumatochimique, il faut les faire lier avec deux cercles de fer, l'un placé en bas & l'autre en haut; il est aussi bien essentiel à leur conservation qu'ils restent toujours remplis d'eau, parce que sans cela, ils se dessèchent, & en se desséchant successivement, ils sont bientôt détachés; on a d'ailleurs l'agrément de pouvoir s'en servir au moment où l'on en a besoin, sans être obligé d'attendre qu'ils soient imbibés d'eau & ne fuyent point. Non seulement les baquets peuvent servir à tous les usages auxquels sont employés les cuves pneumatochimiques, & être substitués à ces vaisseaux, mais ils peuvent aussi servir à faire beaucoup d'autres opérations, telles que des lavages, des dissolutions, des cristallisations, &c. ils ont

sur-tout l'agrément de n'être point chers, & d'être à la portée de tout le monde.

Si l'on se souvient que Schæle a fait des découvertes à jamais immortelles dans des vases simples, & que la plupart du temps étoient destinés à d'autres usages, l'on préférera sans doute ces baquets à des cuves de bois d'acajou, doublées de plomb, de places garnies de cuivre, &c. qui coûtent infiniment plus cher & qui n'ont véritablement pas plus d'avantage pour les hommes instruits.

On voit un de ces baquets avec la planche intérieure, figure 12, classé 5. & la planche détachée figure 54, même classe.

BARBARA ou **BARBARUM.** (*Pharmacie*.) Dénomination que l'on trouve très-fréquemment dans les médecins grecs & les anciens pharmacographes pour désigner un genre d'emplâtres secs, caustiques & dans lequel entre le bitume. Ces compositions emplâstiques sont ordinairement d'une couleur noire, à cause du bitume; & comme on leur attribuoit la propriété d'agglutiner, de réunir les plaies, on les a encore désignés sous le nom d'*enima barbara*. On trouve dans Marcellus, dans Celse, dans Paul, plusieurs formules différentes de ces emplâtres, qui tantôt font désignés sous le nom de barbara, & quelquefois sous celui de barbarum. Galien en rapporte aussi quelques formules, mais il ajoute qu'il ignore l'origine de cette dénomination.

BARBARÉE ou **HERBE DE Stc. BARRE** (*Pharmacie*.) *Erysimum barbarea*, *Barborea* J. B. hist. 1. 868. Plante indigène, vivace, de la famille des crucifères. Thunberg l'a rencontrée au Japon.

Les feuilles & la racine ont été proposées pour combattre le scorbut, rendre les urines plus abondantes, apaiser la colique humide, favoriser l'expectoration; contre l'hydropisie naissante, les maladies de la rate. Elle est encore vulnéraire & entre dans la décoction antiscorbutique de la pharmacopée de Paris. Ray dit que son suc est très-bon pour déterger & dessécher les virus ulcérés. L'on attribue à la semence de barbarée plusieurs des vertus précédentes.

Les feuilles restent vertes pendant tout l'hiver, sous la neige; les habitants des contrées boréales les mangent en salade, sur-tout dans la saison des noirs frimats.

Les herissiers ont su par la culture faire doubler les pétales de cette plante, ce qui augmente son agrément; elle orne parfaitement les places-bandes des jardins curieux.

(M. WILLEMET.)

BARBARICON. (*Pharmacie*.) Surnom donné à une espèce d'onguent *acupon*, dont Paul donne la description dans son livre 7. chapitre 19. Nias-

cellus décrit aussi un médicament sous le même titre.

BARBEAU, BLEUET ou ACIBFOIN. (*Pharmacie.*) *Centaurea cyanus*, *Cyanus*, J. B. 3. 21. Plante annuelle indigène, qui se trouve communément parmi les bleds; elle se cultive dans les jardins pour l'ornement, à cause de ses variétés: on en obtient des fleurs doubles & de toutes couleurs qui ont peu d'odeur.

L'infusion des fleurs de barbeau excite l'urine, aussi est elle recommandée dans l'hydropisie. L'on vante la poudré des fleurs avec leur calice, à la dose d'un gros pendant quelques temps pour guérir la jaunisse. Ray dit que cette poudré est utile étant appliquée sur l'érébèle, & suivant d'autres contre la galle, & que le suc exprimé de ces mêmes fleurs guérit les ulcères purrifs, vertus qui nous semblent fort incertaines, ainsi que celles d'être vulnérables, cordiales, toniques, astringentes, dentifriques, rafraîchissantes. Son eau distillée est vantée contre l'inflammation & la rougeur des yeux, la chassie & la faiblesse de la vue, ce qui lui a fait donner le nom d'eau de casse-lunette. Une poignée de feuilles de barbeau bouillies dans de la bière, la rend apéritive, dans la jaunisse & la rétention d'urine. Sa semence est amère & purge. Goertz assure qu'elle est bonne contre les convulsions.

On peut mêler la fleur de barbeau avec le tabac, ce qui le rend agréable. En exprimant cette fleur lorsqu'elle est récente, l'on en retire une belle couleur bleue de ciel, que les acides rougissent, & qui verdit avec l'alcali. On prépare cette couleur pour la peinture; on teint aussi le sucre, le sirop & les essences pharmaceutiques, par le moyen de cette couleur en un beau bleu céleste. Cette fleur entre dans la poudré fumigatoire ordinaire & dans les divers stermutatoires.

Toute la plante peut servir de fourrage aux bœufs, aux chèvres & aux moutons. La fleur est aimée des abeilles. Quelques-uns l'ont entré dans le mélange pour les pots pourris.

George-Rodolphe Roemer a consacré un opuscule uniquement à traiter du barbeau.

(M. WILLEMET).

BARBEAU (le grand) DES MONTAGNES. (*Pharmacie.*) *Centaurea montana*, *Cyanus major*, Lob. le 548. C'est une belle plante pérennelle, qui croît naturellement sur les hautes montagnes, & qui mérite une place dans les plates-bandes des jardins d'agrément.

Elle passe pour être anti-pestilentielle, agolutive, vulnérative & contre les ulcères de la bouche; elle ressemble d'ailleurs les mêmes principes

& les mêmes qualités que le barbeau ordinaire.

(M. WILLEMET.)

BARBE DE BOUC, DE CHEVRE, &c. (*Pharmacie.*) Les anciens pharmacographes, d'après l'opinion vulgaire, d'après des comparaisons plus ou moins fausses, ont désigné sous ces dénominations différentes espèces de plantes, dont il faut connoître l'acceptation actuelle pour entendre les formules qu'ils rapportent, ou les propriétés qu'ils leur attribuent; ainsi on a appelé *barbe de bouc*, *barba hirci*, quelquefois *barba perri* ou *petra*, la plante que nous nommons avec Linnéus *tragopogon pratensis*.

On a donné le nom de barbe de capucin au *lichen barbatus*. On a donné le nom de barbe de chèvre à l'*almair*. On appelle vulgairement barbe de Jupiter, l'*anthyllis barba Jovis*: la culture d'Europe est quelquefois nommée *barbe de moue*; on a appelé *barbe de Renard* l'*alragale* de Marseille & en général tous les adragans.

BARBE DE CHEVRE. (*Pharmacie.*) *Spiraea arvensis*, *Ancus*, Roy. Lugd. 6. 178. C'est une plante pérennelle, qui se trouve sur plusieurs montagnes de l'Europe; elle est dit-on sudorifique, tonique, vulnérative, consolidante, cordiale, bonne contre la diarrhée, les venins, les hémorrhagies; la racine offre les mêmes vertus & propriétés que les feuilles & les fleurs.

On peut employer la barbe de chèvre à garnir les haies; les fleurs qui présentent des filigames charmans, d'une blancheur extrême, sont aimées des abeilles; elles servent dans la belle saison d'asyle à divers insectes; les émeraudoines entre autres y abondent. Cette plante d'ailleurs demande peu de culture.

(M. WILLEMET.)

BARBE DE JUPITER. (*Pharmacie.*) *Anthyllis barba Jovis*, *Barba Jovis*, Dalech. hist. 194. C'est un arbrisseau argenté qui mérite une place dans l'orangerie pendant l'hiver, & il occupera dignement au printemps & en été une autre place dans les jardins variés pour l'agrément. Il croît naturellement en Espagne, en Provence, au levant, parmi les rochers, dans les lieux montagneux.

La décoction de ses feuilles & de ses sommités, passe en médecine pour être apéritive.

(M. WILLEMET.)

BARBOTINE ou SEMENCE A VERS. (*Pharm.*) *Artemisia contra*, *Artemisia judaica*, *Semen sativum*, Lob. ic. 756 *Semecina Jager epist.* 388. C'est la semence d'une espèce d'armoise, plante vivace, originaire de la Perse, de la Tartarie, du Mogol & autres contrées chaudes. Il faut choisir cette semence nette, nouvelle, bien nourrie, d'une odeur assez forte. C'est un des meilleurs vermifuges

vermifuges de la médecine, la dose est depuis demi-croûte jusqu'à un gros, c'est le *semen contra* des officines. Il passe pour être stomachique, apéritif, céphalique, contre les vapeurs, les vents, les glaires, propre à exciter l'appétit & à éloigner le dégoût. Il entre dans la poudre contre les vers composée de la pharmacopée de Paris, l'opiat de Salomon, les tablettes vermifuges de Charas. L'on prépare aussi de petites dragées contre les vers avec cette graine.

(M. WILLEMET.)

BARDANE. (*Pharmacie.*) * *Ardium Lappa. Bardana major.* Dod. pempt. 18. *Perfonata.* Cam. epit. 837. L'ante biennuelle, indigène, officinale, qui croît communément dans les prés & sur le bord des chemins, elle se trouve aussi fréquemment dans la nouvelle Ecosse, la Virginie, & au Japon.

On employe en médecine les racines spécialement, les feuilles, les semences & les fleurs. Les semences sont peu d'usage; elles sont amères, un peu stomachiques. Elles purgent, & excitent l'écoulement des urines, dir Vogel, c'est pourquoi on les prescrit dans la néphrétique, en poudre ou en émulsion. La feuille est sudorifique, stomachique, scabrigue, alexipharmique; plusieurs écrits modernes offrent des cures admirables de plaies & d'ulcères, obtenues par l'application de la feuille de bardane récente. A l'extérieur elle est résolutive, fondante, détersive, contre les ecchymoses, les tumeurs, le cancer, la céphalée, les luxations; on la fait macérer, on la réduit en cataplasme.

Les différens auteurs ne sont point d'accord sur les propriétés de la racine de bardane. M. Viter, dans la pharmacopée de Lyon, l'assure & s'exprime ainsi: « Elle a été proposée pour dissiper la fièvre-quarte automnale, fièvre-quarte par répercussion de la galle, pour aider la résolution de la pleurésie & de la péripneumonie, pour favoriser l'action du mercure dans la vérole, empêcher la salivation mercurielle, rendre à la guérison de la galle & des écrouelles, soulager dans l'asthme piteux, la goutte, & le scorbut. » Nous assurons, d'après notre expérience & la lecture des auteurs pharmacologistes, que la racine de bardane est un puissant remède en bien des cas, & que nous en croyons au témoignage de Linnéus, si bon juge en cette partie, qui la recommande contre la phlogose, la colique néphrétique, la goutte, la vérole, l'oedème, &c. D'autres auteurs lui ont reconnu des vertus diurétiques, trondantes, diaphorétiques, alexitères, vermifuges, dépuratives, laxatives, apéritives, résolutives, ce qui la rend utile dans bien des cas. C'est un excellent médicament dans les fièvres malignes, putrides, éruptives, la petite vérole, la rougeole, la rage, l'hémoptisie, les obstructions de la rate & du méientère, les affections des articulations, l'atrophie.

Chimie. Tome II.

phie. La pulpe ou la râpure des racines fraîches étendue sur un linge & appliquée chaude sur la partie malade, guérit l'extravasation du sang & les brûlures. Elle peut suppléer à la caloparaille, & sert avantageusement à combattre les maladies des moutons & des chevaux.

Il faut faire délécher la racine de bardane avec précaution, en la fendant & en la découplant, l'exposer ensuite au-dessus d'un four, pour en accélérer la dessiccation. Il faut la choisir charnue, succulente, éviter qu'elle soit ligneuse & pourrie.

Les jeunes pousses & les jeunes côtes de la bardane sont excellentes. La décoction de la racine teint les cheveux en jaune. Les chèvres, les bœufs & les brebis mangent assez volontiers les feuilles, ces feuilles ont encore la faculté d'attirer les punaises. Elles entrent dans l'onguent *populeum*. La racine avec les feuilles entrent dans l'emplâtre diabatant. Le codex de Paris prépare une eau distillée avec l'herbe verte & récente. Il fait entrer la racine dans la décoction & le vin antiscorbutique, l'onguent martial; l'on prépare aussi un extrait & l'essence de bardane composés; les hôpitaux d'Edimbourg se servent d'une décoction composée avec la bardane, les semences brûlées entrent dans le remède de mademoiselle Stephens pour la pierre.

(M. WILLEMET.)

BARNAPUS. (*Pharmacie.*) *Barnaas.* Expressions employées par quelques alchimistes pour désigner un tel nitreux que l'on retire de l'urine, &c. Quelques-uns employent ce mot pour désigner un vinaigre très-fort. (RULAND.)

BAROMETRE. (*Chimie.*) Le baromètre est, comme son nom l'indique, un instrument pour mesurer la pesanteur. Mais c'est à celle de l'air seulement qu'il sert.

Quoique les chimistes doivent faire présider le baromètre à la plupart de leurs opérations, qu'ils doivent en connaître la marche, & même corriger les erreurs qu'y apportent les corps extérieurs, cependant nous croyons qu'il serait inutile d'insister ici sur la préparation & sur la théorie, parce qu'elles sont sans doute expliquées en détail dans la physique, & que ce serait faire des doubles emplois qui deviennent onéreux aux lecteurs.

L'emploi du baromètre en chimie est de savoir à quelle pression les corps sur lesquels on agit sont soumis, ce qui est, comme le savent les chimistes, d'une très-grande importance, car tels corps qui n'ont qu'une action légère à la pression de 10 pouces de mesure, en ont quelquefois une très-énergique à celle de 28 ou 30 pouces, & vice versa pour d'autres corps, suivant leur nature particulière.

On se sert communément dans les expériences chimiques d'une portion de baromètre, appelée baromètre tronqué, parce qu'il est plus com-

Ttt

mode & qu'il peut être, appliqué à telle ou telle capacité en particulier. Ce baromètre est un tube de verre, fermé par un bout & ouvert par l'autre, & courbé de manière que les deux branches deviennent parallèles, comme celles d'un tube communiquant. On remplit ce tube de mercure pur, on chauffe ensuite le tube pour expulser l'air & l'humidité qui pourroient rester tant sur les parois du tube que dans l'intérieur du mercure; on fixe ce tube ainsi rempli de mercure sur une plaque de cuivre, divisée en pouces & en lignes.

On sent qu'il n'est pas possible de connoître la pesanteur absolue de l'air par ces espèces de baromètres, puisqu'ils n'ont que quelques pouces, & au plus un pied. On place cet instrument dans une capacité où on veut faire le vuide, & on connoît lorsque le vuide est assez avancé, combien on a tiré d'air du récipient. Quand le mercure s'approche du niveau dans les branches, ce qui ne peut jamais arriver à cause de l'imperfection des machines qui servent à faire le vuide, on dit que le vuide est fait à une ligne, deux lignes, &c. moins ou plus.

On peut, si l'on veut, ne retirer que la moitié, le tiers ou le quart de l'atmosphère dedans la capacité, ce que l'on détermine exactement par cet instrument; d'après cela l'on peut dire, telle expérience a été faite à telle ou telle pression atmosphérique. Cet instrument, annexé à la machine pneumatique, s'appelle aussi éprouvette, parce qu'il sert à connoître la bonté de la machine pneumatique. L'usage des baromètres est devenu si général & si nécessaire, qu'on lui a donné toutes les formes possibles. Il y a des baromètres à colonne droite, à colonne courbe, à cuvette, baromètre recourbé, à cadran, portatifs, &c. Il sera parlé en détail de tous ces baromètres, de leurs usages, de leurs avantages & de leurs inconvénients, dans le dictionnaire de physique, c'est pourquoi nous n'en dirons rien ici. (M. VAUQUELIN.)

BAROTE. M. Morveau a nommé d'abord barote la terre que l'on désigne aujourd'hui par le nom de baryte; on a pensé, en travaillant à la nouvelle nomenclature, que le mot baryte étoit plus près de son étymologie grecque, & qu'il étoit aussi plus d'accord avec le génie de la langue française. Bergman avoit déjà employé le mot *barytes* en latin, & plusieurs auteurs qui ont écrit dans cette langue avoient adopté cette dénomination. (Voyez le mot BARYTES.)

BAROTIQUE. C'étoit l'adjectif qu'on avoit employé d'après le mot barote, pour désigner les sel-neutres dont cette terre forme la base. Depuis qu'on a adopté le mot baryte, on dirait aussi l'adjectif barytique. (Voyez BARYTIQUE.)

BARRAS. (Pharmac.) On nomme ainsi la résine du pin qui découle depuis l'automne jus-

qu'à la fin du printemps, se sèche sur l'arbre & y forme des masses jaunâtres.

BARRELIÈRE A LONGUES FEUILLES. (Pharmac.) *Barleria longi folia.*

BARRELIÈRE A FEUILLES DE BUIS. (Pharm.) *Barleria buxifolia.* Ces deux plantes croissent spontanément dans l'Inde & à Malabar. Leur racine pousse pour être un puissant diurétique. Elles sont vivaces.

BARYO-COCALOU. (Pharmac.) Dénomination composée de deux mots grecs, qui signifient fruit ou coque, fâcheux ou dangereux, & que l'on trouve dans quelques pharmacographes pour désigner la plante que Linnéus a nommée *datura*, & que l'on connoît vulgairement sous le nom de pomme épineuse.

BARY-PICRON ou BATHY-PICRON. (Pharmac.) Dénomination composée de deux mots grecs, qui signifient fortement ou profondément amer, & qui a été employée par quelques écrivains pour désigner l'abynthe ou l'aurore, plantes fortement amères.

BARYTE. La baryte est une espèce de terre, découvrir il y a quelques années. Le mot baryte vient du mot grec *barys*, qui signifie pesant, & en effet la terre à laquelle nous donnons ce nom est la plus pesante de toutes les substances terreuses connues.

La baryte a d'abord été nommée *terre pesante* par MM. Gahn & Schéele, chimistes Suédois, qui en ont reconnu les premiers l'existence dans le spath pesant, nommé aujourd'hui *sulfate de baryte*. Bergman & M. Kirwan ont les premiers employé le mot latin de *barytes*. On a ensuite proposé & employé pendant quelque temps le mot barote, qu'on a changé en celui de baryte. La pesanteur spécifique de la baryte va au-delà de 4,000, suivant M. Kirwan. Elle est donc la plus pesante de toutes les terres, puisque la silice pèse 2,65, suivant le même auteur, l'alumine 2,000, la chaux 2,33 & la magnésie 2,31. La baryte n'existe jamais pure dans la nature, mais toujours combinée avec quelques acides. Elle a été découverte & regardée comme une substance particulière par les chimistes déjà cités. Messieurs Margraf & Monnet l'avoient cru de la nature de la terre absorbante ou calcaire, cependant ce dernier chimiste y avoit reconnu quelques caractères distinctifs, & il étoit porté à la regarder comme une terre différenciée de la chaux. Gahn, Schéele & Bergman, ont enfin caractérisé cette terre par sa dissolubilité, sa manière de se comporter au feu, ses combinaisons avec les acides, & sur-tout ses attractions différentes de celles de toutes les autres terres. Les propriétés de la ba-

ryte n'ont encore été que peu examinées, au moins comme matière isolée & pure. On a plus étudié ses combinaisons, & c'est sur-tout par les sels qu'elle forme avec les divers acides & par ses affinités très-singulières, qu'elle diffère des autres substances terreuses; en sorte que son histoire complète est renfermée dans celle de tous les sels barytiques, & qu'il est nécessaire pour la bien posséder de consulter tous les articles de ces sels depuis les acétites jusqu'aux sulfates. Voyez le mot SELS NEUTRES. Il ne doit donc être question dans cet article que des propriétés de la baryte isolée, & on ne doit indiquer que de simples généralités sur les combinaisons salines, &c.

Quoique, d'après cet ordre une fois établi, on ne doive décrire en détail le procédé qu'on emploie pour obtenir la baryte pure qu'à l'article du sulfate de baryte (Voyez ce mot), il est cependant indispensable de dire un mot ici de cette préparation. Pour se procurer la baryte, on décompose le sulfate de baryte en le chauffant fortement après l'avoir réduit en poudre fine avec un huitième de son poids de charbon; il résulte de cette décomposition du sulfure de baryte qui est aussi dissoluble dans l'eau que l'est peu le sulfate de baryte. On lessive la masse fondue, on décompose le sulfure de baryte par l'acide muriatique ou l'acide acétique, qui forment avec la baryte des sels dissolubles; on laisse bien déposer le soufre; on précipite ensuite la baryte par le carbonate de potasse, de soude ou d'ammoniaque; on obtient ainsi du carbonate de baryte; on le recueille promptement, on le met tout humide dans un creuset, & on le calcine fortement pour enlever l'acide carbonique, qui ne se volatilise bien qu'à la faveur de cette eau, & avant que le carbonate de baryte ait eu le temps de se condenser & de se dessécher; car on verra à l'article de ce sel combien l'acide carbonique y est adhérent lorsqu'il est bien sec & sur-tout cristallisé.

La baryte pure obtenue par ce moyen, est sous forme pulvérulente, d'une extrême finesse & d'une assez grande blancheur. La plupart des auteurs modernes disent qu'elle a une faveur analogue à celle de la chaux; mais je n'y ai jamais trouvé une acreté à beaucoup près aussi décidée sur la langue.

On ne fait point encore si elle est altérable par la lumière; conservée dans des poudriers ou bouteilles de verre, & exposée aux rayons du soleil, elle n'éprouve aucune altération sensible.

Le feu ordinaire de nos fourneaux ne la fait point entrer en fusion, elle donne au creuset d'argile dans lequel on la chauffe, une couleur bleue ou verdâtre, & elle prend elle-même une légère teinte de cette couleur. Cette propriété ne paroît pas dépendre de la réaction sur l'alumine, car des gros fragments de carbonate de baryte chauffés fortement, prennent sans se déformer une teinte verte jusques dans leur milieu. M. Darcet dit que la baryte se fond dans un creuset d'argile ou de

fer à un feu très-violent. La chaleur la plus forte que l'on puisse donner, celle qu'on produit en brûlant du charbon avec l'air vital, fait éprouver une altération bien plus remarquable à la baryte. Suivant M. Ehrman, elle se fond facilement, est fortement absorbée par le charbon, & se perd. M. Geijer a décrit ce phénomène absolument de la même manière. M. Lavoisier, dans ses mémoires publiés parmi ceux de l'académie en 1782 & 1783, a donné des détails encore plus exacts sur la baryte, traitée par le charbon allumé à l'aide de l'air vital. On a exposé, dit-il, avec les précautions convenables, de la baryte au courant d'air vital; en quelques secondes elle s'est fondue, elle s'est étendue & appliquée sur le charbon, après quoi elle a commencé à brûler & à détoner jusqu'à ce que presque tout fut dissipé. La portion de résidu qu'on a rassemblée n'étant encore que de la baryte, elle avoit le goût de la chaux éteinte avec moins de causticité; elle s'est effluée à l'air. Le goût de gaz hydrogène sulfuré qu'on a observé dans plusieurs de ces expériences, tenoit vraisemblablement à ce que la baryte qu'on avoit employée contenoit encore un peu de sulfate ou de sulfure. On teste, cette expérience répétée plusieurs fois sur de la baryte diversément préparée, a toujours donné le même résultat, c'est-à-dire, que cette terre s'a brûlée avec flammes & une sorte de détonation.

Dans les expériences décrites par M. Lavoisier, le résultat le plus singulier, & qui donne le plus à réfléchir, est l'espèce de combustibilité qu'elles annoncent dans la baryte. Cette propriété est très-différente de ce qu'on connoît jusqu'ici sur toutes les matières terreuses; elle semble s'accorder avec l'opinion que quelques chimistes ont prise de la baryte, en la regardant comme un oxide métallique; on reviendra plus bas sur cette conjecture en parlant de la nature intime de cette terre.

Exposée à l'air, la baryte y augmente de poids & se combine, quoique très-lentement, avec l'acide carbonique contenu dans l'atmosphère; cette combinaison est plus prompte quand la baryte est humectée; mais elle ne ressemble pas à la chaux, comme on l'a dit.

La baryte n'éprouve aucune altération de la part de l'air vital. On ne connoît point l'action de l'origène & de l'azote sur cette terre saline; peut-être contient-elle de l'azote, comme un de ses principes constitutifs; mais on ne fait point si elle peut en absorber, & conséquemment ce qui lui arriveroit dans cette combinaison.

La baryte se dissout dans l'eau, mais avec assez de difficulté, puisqu'il faut 900 parties de ce liquide à 10 degrés de température pour une partie de baryte. L'eau qui en est chargée donne une couleur verte foible à la teinture des fleurs de violettes, & sur-tout à celles de mauves ou de taves. La dissolution de baryte, exposée à l'air, se couvre d'une pellicule légère qui se reproduit à

mesure qu'on l'ehève. Cet effet est dû à l'acide carbonique de l'atmosphère; il est le même que pour l'eau de chaux, quoiqu'il soit beaucoup moins marqué.

La dissolution de baryte, évaporée dans des vaisseaux fermés, laisse la terre pour résidu, & c'est par le poids de ce résidu qu'on apprécie la solubilité de la baryte dans l'eau. On conçoit, d'après cela, qu'il faut se servir d'eau distillée dans cette expérience, comme dans toutes les dissolutions dont on veut connoître les proportions.

La baryte n'a qu'une action foible, soit par la voie sèche, soit par la voie humide, sur la silice & sur l'alumine; elle paroît cependant faciliter la fusion de ces terres, & elle prend une couleur verte ou bleuâtre, quand on l'a chauffée avec elles & sur tout avec la seconde. Elle paroît être susceptible de s'unir aux autres terres par la fusion; mais on a peu examiné les combinaisons vitreuses qu'elle forme avec elles, ainsi que les attractions qu'elle y exerce.

La baryte est vraisemblablement susceptible de se combiner avec les alcalis fixes, & ce genre de combinaisons alcalino-terreuses méritoit de fixer l'attention des chimistes qui ne s'en sont point encore occupés. (Voyez l'article (CHAUX).)

La baryte, unie à tous les acides, forme des sels neutres particuliers, qui ne sont en général décomposables par aucune autre base, en raison de la forte attraction de cette terre pour les acides. Presque tous les sels barytiques sont bien cristallisables, faciles à obtenir sous la forme régulière: on en trouvera les détails aux articles de chaque sel neutre.

La baryte, par l'attraction dont il vient d'être question, décompose tous les sels neutres & en sépare toutes les bases.

Elle est susceptible de se combiner avec le soufre, & le sulfure de baryte a cela de très-remarquable que, quoique composé de deux substances presque entièrement insolubles dans l'eau, il est très-soluble dans l'eau & très-cristallisable. Voyez le mot SULFURE DE BARYTE.

Cette combinaison facile de la baryte avec le soufre semble annoncer qu'elle doit s'unir de même à d'autres corps combustibles, & sur-tout avec le phosphore, le charbon; mais on ne connoît pas de pareilles combinaisons, & l'on n'a encore examiné que celles de la baryte avec la plupart des acides.

La baryte est la terre que l'on a trouvée le moins abondamment dans la nature. Il est vraisemblable qu'elle est plus abondante qu'on ne l'a cru. On ne la connoîtroit autrefois que dans le sulfure barytique ou le spath pesant; on l'a trouvée il y a quelques temps en Angleterre, combinée avec l'acide carbonique, & cristallisée comme un spath transparent. Nous décrirons ce sel à l'article CARBONATE DE BARYTE.

Quelques chimistes modernes croient que c'est

une chaux ou un oxide métallique; la pesanteur, celle des composés dans lesquels elle entre, le précipité qu'elle donne quand on mêle sa dissolution par les acides avec les prussiates alcalins, l'ont fait soupçonner telle depuis long-temps par Bergman. On assure que M. Gahn, disciple de ce célèbre chimiste, est parvenu à obtenir la baryte sous la forme de métal, mais ce fait mérite d'être confirmé. Les expériences de MM. Ehrman & Lavoisier sur la baryte traitée à un grand feu, n'ont point présenté de réduction métallique; l'épave de combustion ou de déflagration observée par le dernier, & dont il a été question plus haut, semble tenir à une sorte de réduction & à la séparation d'une matière métallique; mais il faut convenir que tous ces apperçus ne doivent point autoriser à regarder la baryte comme un oxide métallique, jusqu'à ce qu'on ait retiré un véritable métal en assez grande quantité pour pouvoir en déterminer la nature.

On peut donc dire qu'on ne connoît point encore la nature intime de la baryte, parce qu'on n'est pas parvenu à en séparer les principes, ni à imiter sa composition. J'y soupçonne, comme je l'ai déjà indiqué plus haut, la présence de l'azote ou base du gaz azote; mais je n'ai aucune expérience positive sur ce point.

La baryte pure n'est d'usage que dans les laboratoires de chimie; elle pourra quelque jour servir aux arts, lorsqu'on en connoitra mieux les propriétés, & lorsqu'on l'aura trouvée plus abondamment dans la nature. Les dissolutions de la baryte dans l'eau & dans les acides, sont employées comme réactifs pour reconnoître par-tout la présence de l'acide sulfurique. On choisit chaque sel barytique, suivant la nature de la liqueur ou de la substance dans laquelle on veut découvrir la présence & la quantité de l'acide sulfurique.

Quelques médecins ont déjà proposé & employé la baryte combinée avec les acides comme médicament; mais il n'y a encore rien d'exactement connu sur ses propriétés.

BASALTE. Le basalte est, suivant le plus grand nombre des auteurs de minéralogie, un produit volcanique, espèce de lave affectant la forme de prismes à plusieurs pans, regardée comme une véritable cristallisation par quelques-uns, & seulement comme le produit d'une simple retraite, d'un refroidissement, par la plupart des savans qui s'en sont occupés. Il est des minéralogistes qui pensent que le basalte a éprouvé une demi-fusion comme les laves: il en est d'autres qui se fondent sur les matières très-fusibles & très-altérables, renfermées dans les basaltes, telles que du schori, de la zéolite, &c., croyant que ces pierres sont des espèces de laves boueuses, qui ont enveloppé toutes ces matières dans leur cours, & se sont déposées dans des lieux plus ou moins éloignés des cratères volcaniques, d'où elles sont sorties, & qui par les pro-

près de la défection, se font fendues en toutes sortes de fens, de directions, en fragmens ou espèces de prismes à trois, à quatre, à cinq, à six & à sept pans, comme le font en général toutes les terres argileuses. Enfin il existe une troisième opinion sur l'origine des basaltes parmi les naturalistes. Quelques-uns sont persuadés que ces pierres sont des dépôts faits par l'eau, & n'ont rien de volcanique. Depuis quelques mois ces débats sur la formation des basaltes par le feu ou par l'eau, se sont renouvelés en Allemagne parmi les minéralogistes, & cette discussion n'est pas terminée. Quoi qu'il en soit de ces diverses opinions, qu'on trouvera sans doute discutées avec toute l'étendue nécessaire dans le dictionnaire de minéralogie auquel nous renverrons, la nature chimique du basalte ne doit pas moins être connue, & peut même répandre beaucoup de jour sur sa composition primitive. Il paroît, d'après le peu d'expériences qu'on a faites jusqu'à présent sur les basaltes, qu'ils diffèrent suivant les divers lieux qu'ils occupent, suivant leur couleur, leur ancienneté, &c. On en connoît de rougeâtres, de gris de fer, de gris de cendre, de blanchâtres, de compacts & assez durs pour faire feu avec le briquet, & recevoir un assez beau poli. Il y en a au contraire qui sont presque friables; on attribue cette friabilité à une espèce de décomposition par l'air, l'eau & les vapeurs acides souterraines. On sait que les basaltes dans les parties découvertes & exposées à l'air, se couvrent d'une couche jaunâtre, d'une espèce d'écorce qui est moins dure que leur intérieur, & qui paroît susceptible d'être enlevée par l'eau; & il est facile de voir que cette décomposition, cette friabilité dépend du fer qui est contenu dans ces pierres, & de son oxidation par l'air & par l'eau.

Le basalte est fusible à un grand feu; il donne un verre noir, transparent & très-léger, quand il a été bien fondu. C'est pour cela qu'on a proposé d'en faire des bouteilles, & qu'on a déjà établi dans les départemens méridionaux de la France, des verreries où l'on fond ainsî le basalte. MM. Faujas & Chaptal se sont spécialement occupés de cet objet, & leurs premières tentatives promettent un succès qui doit soutenir toutes les espérances de ceux qui sont à portée des basaltes. L'analyse de cette pierre, au rapport de M. Mongez, donne par quintal pour le basalte d'Ilande, 56 parties de silice, 15 d'alumine, 4 de chaux & 25 d'oxide de fer.

L'article que M. Kirwan a consacré au basalte, présente quelques résultats différens de ceux de Bergman. M. Kirwan range le basalte dans le genre des pierres siliceuses; c'est la dix-huitième espèce de ce genre dans son ouvrage minéralogique. Il confond dans cette espèce le basalte avec le trapp des Suédois, sous la dénomination ou la phrase suivante: terre siliceuse, mêlée avec 0,3 de son poids d'alumine, 0,17 de carbonate de chaux, 0,04 de magnésie, & 0,5 de fer. On appelle *basalte*,

dit-il, une pierre noire ou grise foncée, qui est communément ennoyée d'une croûte ferrugineuse, & cristallisée en colonnes opaques, triangulaires ou polyangulaires. Celle qui est informe ou qui se brise en gros morceaux épais & carrés, porte le nom de *trapp*. Leurs principes constitutifs & leurs relations avec les acides & avec le feu, sont exactement les mêmes.

Le tissu de cette pierre est ou grossier, rude & distinct, ou fin & impossible à discerner. La dernière sorte est rougeâtre. Elle est toujours opaque, & tombe en poussière par l'exposition à l'air. Il en est quelques échantillons qui sont très-difficilement du feu avec l'acier, quoiqu'elle soit toujours très-compacte. Elle est quelquefois parsemée de quelques particules brillantes, très-déliées. Sa pesanteur spécifique est de 3000.

Lorsqu'on la fait rougir au feu, & qu'on l'éteint dans l'eau, elle devient peu-à-peu d'une couleur brune-rougeâtre. Elle se fond *per-se* en une frise compacte dans un feu violent. Le borax la dissout aussi par la voie sèche; mais l'alcali minéral ne la dissout pas en entier.

Suivant Bergman, 100 parties de basalte en contiennent 52 de terre siliceuse, 15 d'argile, 8 de terre calcaire, 2 de magnésie & 25 de fer. (Bergm. tom. 3, page 213.) M. Meyer est, à très-peu de choses près, du même avis.

Voilà ce qu'on dit jusqu'à présent les chimistes sur le basalte. Mais ils n'ont point examiné un assez grand nombre d'espèces & de variétés de cette pierre, pour qu'on puisse affirmer qu'elle est toujours & par-tout de la même nature. Il est très-vraisemblable que les différences de couleurs, de tissu, de dureté, en indiquent dans la nature infinite des variétés de basalte, & sur-tout dans les proportions de silice, d'alumine, de chaux, de magnésie & d'oxide de fer, qui en contiennent la composition. C'est aux naturalistes placés dans le voisinage des lieux qui contiennent les diverses espèces de basalte, à faire les recherches chimiques nécessaires pour en déterminer la véritable composition.

BASES. Le mot *base* est fort employé en chimie, & à force de s'en servir dans différentes occasions, on a beaucoup étendu les dénominations. Il vouloit d'abord dire, comme l'expose Macquer dans son dictionnaire de chimie, tout corps qu'on considère comme dissous par un autre corps qu'il reçoit, qu'il fixe, & avec lequel il constitue un composé; alors on disoit *base d'un composé*. C'est ainsi qu'on nommoit *bases des sels neutres*, les terres, les alcalis & les oxides métalliques, qui, dissoutes jusqu'à saturation par les différens acides, forment des sels neutres par leur combinaison avec ces acides. C'est dans le même sens, pourfuit encore Macquer, qu'on dit des sels à base terreuse, à base alcaline, à base métallique, & nous ajouterons à base de chaux, à base de magnésie, à base de bay

ryte, &c. Cette expression de base employée ainsi, sembloit désigner que les matières ainsi nommées, étoient plus fixes, plus solides, plus insusceptibles, plus pesantes, que les acides auxquels elles étoient unies, & qu'elles pouvoient être considérées comme leur communiquant la plupart de ces propriétés. Mais il ne faut pas pousser cette idée trop loin, non plus que par rapport à la prétendue dissolution des bases par les acides : car 1°. il y a des bases, & sur-tout l'ammoniaque & plusieurs oxides métalliques, qui, loin de fixer les acides qu'elles absorbent, & de leur communiquer la plupart des propriétés qui les distinguent & les caractérisent, sont plus volatiles qu'eux, & particulièrement que ceux des acides qui, sont fixes & vitrifiables de leur nature, comme sont les acides phosphorique, boracique, arsénique, &c. 2°. Il est des bases qui, au lieu de donner leurs caractères aux acides auxquels elles sont unies, reçoivent au contraire d'eux les propriétés qui les caractérisent. 3°. Enfin il n'est pas à beaucoup près exact d'admettre dans les bases la propriété presque passive d'être dissolubles dans les acides, & de ne s'attribuer qu'à ceux-ci un effet actif dans les compositions. Macquer a fait fort bien remarquer que dans toute combinaison ou dissolution, les corps qui s'unissent, sont également actifs ; que leur action est réellement réciproque ; qu'ils se dissolvent en quelque sorte les uns & les autres ; & qu'enfin on peut dire avec Gellert, qu'un métal, une terre, un alcali, dissolvent un acide, aussi bien que de dire qu'un acide dissout un métal, une terre, un alcali ; ceci au reste sera exposé plus au long au mot DISSOLUTION.

Le mot base est encore employé pour désigner toute substance qui, au lieu d'être considérée comme unie à un acide, & formant avec lui un sel neutre, comme dans le cas précédent, est au contraire susceptible de former un acide avec l'oxygène. Dans ce sens, le soufre est la base de l'acide sulfurique, l'azote l'est de l'acide nitrique, le carbone de l'acide carbonique, le phosphore de l'acide phosphorique, l'arsenic, le tungstène, le molybdène sont les bases des acides arsénique, tungstique, molybdique, &c. Dans ce sens le mot base est souvent accompagné de l'épithète *acidifiable*, & il est synonyme du mot radical, qui à la vérité est plus souvent employé que le mot base. Ici c'est encore par comparaison entre la fixité, la densité, la pesanteur de ces bases ou de ces radicaux, & ces propriétés considérées dans l'oxygène ou le principe acidifiant, où elles sont si différentes, si peu sensibles, que le mot de base a été employé.

Enfin on emploie la même expression de base, pour désigner quelquefois l'abondance d'un principe, d'un composé, beaucoup plus grande que celle des autres principes qui entrent dans sa composition, & pour annoncer que ce principe étant le plus abondant, semble être en même-temps le plus utile à la composition. C'est dans ce sens qu'on dit que l'oxygène est la base de l'eau, le carbone la

base du bois où de la matière ligneuse, l'hydrogène la base de l'huile, le phosphate de chaux la base des os des animaux, le composé d'hydrogène & de carbone la base des matières végétales en général.

On voit donc que le mot base est une de ces expressions générales, auxquelles on a attribué différentes dénominations, différentes valeurs, suivant les diverses époques de l'histoire de la science où elles ont été reçues & adoptées, & qu'il sert plus à varier & à diversifier le langage chimique, qu'à rendre quelque idée exacte & précise ; aussi ne s'en sert-on que comme d'une espèce d'auxiliaire.

BASE. (Pharmacie.) Le mot base a une valeur bien différente en pharmacie de celle qu'on lui a donnée en chimie. La base d'une préparation pharmaceutique, est la partie de la formule dans laquelle consiste la plus grande vertu du médicament. C'est sur la base, sur sa nature, ses propriétés, sa dose, son état, ses altérations, sa conservation, son mélange exact avec les autres substances qui entrent dans une recette que l'attention du médecin doit principalement se porter ; puisque c'est la base d'une formule qui en fait le principal ingrédient, la première efficacité. On trouvera dans le dictionnaire de médecine tous les préceptes relatifs à l'art de formuler, & conséquemment à celui d'exécuter les formules, quant à ce qui concerne la base. Voyez le mot BASE dans le dictionnaire de médecine.

BASELLE ROUGE. (Pharmacie.) *Basella rubra. Gandola rubra. Rumph. Amb. 5. p. 417.* Nous avons eu la satisfaction de cultiver avec succès cette plante originaire des Indes orientales, au jardin royal des plantes du collège de médecine de Nancy. Cette plante d'un aspect agréable, se trouve dans la Guinée & au Japon, peut subsister deux ans. Cette baselle est potagère comme nos épinards, elle est relâchante. Le tronçon de ses tiges sert à former des suppositoires aux enfans Indiens. On se sert du suc de cette plante, pour faire mûrir & tomber les boutons de la variole que l'on a troqués.

On tire une belle couleur rouge de ses baies ; mais elle est peu durable, ou on ignore le moyen de la fixer. Les nègres savent peindre en violet avec ces baies, & les Japonnois, au rapport de M. Thunberg, teignent leur soie & leur coton en un beau rouge avec le même fruit.

*(M. WILLEMET.)

BASILEON. (Pharmacie.) Surnom donné à une espèce de collire dont Aëce donne la description ; & dont l'efficacité étoit vantée contre la faiblesse de la vue, les taches & les cicatrices de la cornée.

BASILICON, BASILIC. (Pharmacie.) Cette

dénomination qui vient du grec, & qui signifie royal, a été employée par les médecins grecs & adoptée par les botanistes & les pharmacographes, pour distinguer différentes substances ou préparations très-différentes; en pharmacie on l'a employée comme une épithète, pour désigner plusieurs espèces d'emplâtres, d'onguents, de ceras, souvent très-différens par leur composition. Ainsi Oribase donne la formule d'un emplâtre très-composé, qu'il nomme *basilicon*, Scribonius Largus en décrit un autre qu'il appelle *emplâtre*, *l'emplâtre basilicon de trisphon*. Celle en décrit encore un autre qu'il nomme encore *emplâtre basilicon ou noir*. Galien donne la formule d'une autre composition qu'il a nommé *malagma basilicon*, & dont il vante l'efficacité contre les affections du foie & de l'estomac.

On trouve aussi la formule d'un onguent plus simple, nommé dans quelques auteurs anciens *basilicon* d'Aristus le chirurgien; souvent encore désigné sous l'épithète de *tetrapharmacum*, parce qu'il est composé de quatre substances. Cette préparation est encore connue aujourd'hui sous le nom d'*onguent basilic*, & il est fort employé dans les traitemens chirurgicaux; nous en donnerons la description à l'article des onguens sous le titre d'*onguent de poix noire*. On trouve aussi dans Galien la description d'un collyre, qu'il surnomme *basilicon*.

Cette même dénomination a été aussi employée par les anciens, pour désigner différentes espèces de plantes; ainsi on appelle encore aujourd'hui *basilic* l'*Ocimum*. Les interprètes pensent qu'Hippocrate désignoit sous ce nom l'*ammi*; d'autres l'ont encore employé pour désigner un genre de satyrion.

BASILIC COMMUN. (*Pharmacie.*) *Ocimum basilicum*, *Basilicum majus*. *Trag.* L' plante annuelle, charmante par son odeur, originaire des Indes & de la Perse, qui se cultive dans les jardins.

Les feuilles, les sommets fleuris & la semence, sont diurétiques, provocatives, antilochiques, expectorantes, carminatives, alexitères, résolutives, cordiales, céphaliques, exhalantes, toniques, atténuantes, lactifères, digestives, nervines, diaphorétiques, utérines, balsamiques & sternutatoires; propres contre l'asthme, la toux, la syncope, la céphalalgie, les vertiges, la colique, les morsures vénéneuses; pour réveiller les forces vitales dans les maladies de faiblesse, dans le vomissement produit par des matières épaisses ou pituiteuses. C'est sur-tout l'infusion de ses feuilles & de ses fleurs préparées en guise de thé, dont on fait usage contre les maladies dénommées précédemment.

Le basilic est employé dans la cuisine en qualité d'épice & d'assaisonnement. Il entre dans les sachets, les poudres odorantes, le vin aromatique, le sirop d'armoise, l'onguent martial, la poudre pour les eucuphies & la poudre sternutatoire verte. Les abeilles aiment les fleurs des basilics.

Les feuilles entrent dans l'eau générale, l'eau

hystérique, l'eau de menthe composée, l'eau vulnérinaire, l'esprit carminatif de Syllivius.

Koenig a observé que la semence de basilic étoit propre contre l'équinancie, les aphtes, les fistules des mamelles; la fumigation a la propriété d'expulser le fœtus mort du sein de sa mère. Hoffman assure avoir employé utilement cette semence infusée dans du vin, contre la suppression des règles, & pour nettoyer la matrice de ses impuretés. Réduite en poudre, elle détruit les vermes. Elle entre dans la poudre réjouissante, la poudre *diarrhodon*, la poudre de gustette, le *tryphera* de Nicolas d'Alexandrie, la poudre de musc composée de Mesuë, la poudre de bois d'aloes composée du même, la poudre de l'électuaire de *gemmis*, & la poudre lithontriptique de Nicolas de Salerno. L'eau distillée de la plante est, suivant Boecet, un préservatif contre l'apoplexie, fortifie les parties génitales, chasse les vers.

(M. WILLEMET.)

BASILIC GENTIL OU PETIT BASILIC (*Pharmacie.*) *Ocimum minimum*, *Basilicum minus*. *Trag.* Il est doué des mêmes propriétés que le basilic commun.

(M. WILLEMET.)

BASILIC SAUVAGE. (*Pharmacie.*) *Clinopodium vulgare*. *Acinos*. *Lob. icon.* 304. Cette plante est indigène, perennelle, aromatique; elle se trouve fréquemment dans les lieux montagneux, incultes; ses qualités paroissent s'approcher de celles de l'origan. On lui attribue celles d'être vésicatoire, céphalique, apéritive, pectorale, emménagogue, résolutive, contre la mélancolie. M. Baion a consigné dans le journal de médecine, des observations sur les effets salutaires de cette plante contre les fleurs blanches. Thunberg a souvent rencontré au Japon ce Clinopode, sa fleur est recherchée des abeilles.

(M. WILLEMET.)

BASILICÉ. (*Pharmacie.*) surnom donné à un antidote décrit par Galien, & qu'il dit utile contre les morsures du chien enragé.

BASILIDION. (*Pharmacie.*) surnom donné à une espèce de collyre décrit par Galien.

BASILIS. (*Pharmacie.*) surnom donné à une espèce de collyre liquide décrit par Galien, qu'il nomme encore analeptique, & dont il vante l'efficacité contre la faiblesse de la vue.

BASSEC. (*Pharmacie.*) Expression employée par quelques écrivains arabistes pour désigner la corail.

BASSINE. Les bassines sont des vases de métal, qui servent à beaucoup d'opérations différentes. Quoiqu'elles soient plus communément employées en pharmacie qu'en chimie proprement dite,

la relation immédiate qui existe entre les opérations de ces deux sciences, nous a déterminés à en donner ici une courte description.

La nature & la forme des bassines varient presque autant qu'il y a d'opérations auxquelles on les emploie. Il y a des bassines d'argent, de cuivre, d'étain, de plomb, &c.

Les formes principales que l'on donne aux bassines, sont la forme plate & la forme conique, & chacune a son avantage pour certaines opérations.

Les bassines d'argent si elles n'étoient pas si chères, devroient être préférées; il est cependant des opérations qui nécessitent absolument leur emploi, & cet instrument est indispensable dans un laboratoire de chimie & de pharmacie, où l'on prépare tous les médicaments.

Il existe maintenant en France, un art que nous ont communiqué les Anglois pour doubler le cuivre en argent. Cet art fournit des vases qui peuvent remplacer les vaisseaux d'argent massif, & qui sont à la portée de tout le monde par leur prix.

Il n'est pas à craindre qu'ils soient bientôt usés; ils peuvent durer autant que la vie d'un homme, en servant tous les jours, lorsque la doublure a une ligne ou ligne & demie d'épaisseur.

Les bassines de cuivre peuvent servir à toutes les opérations, dans lesquelles il n'entre point de matières très-actives & susceptibles d'agir sur ce métal. Il faut avoir soin de n'y rien laisser refroidir, parce que les matières en refroidissant s'emparent d'une portion d'air, à l'aide duquel elles attaquent les bassines à la partie supérieure.

Les bassines d'étain ne sont que d'un usage très-borné pour les opérations de chimie, à cause de leur facile fusion; celles de plomb ont les mêmes inconvénients & ne sont pas beaucoup plus employées, on a tiré cependant un grand parti de la facile fusion, & de l'innocuité de l'étain en l'appliquant à la surface du cuivre, il joue là un rôle très-intéressant, 1°. il défend les matières que l'on y traite de l'action nuisible du cuivre; 2°. il partage par son union avec le cuivre une portion de son infusibilité; 3°. son application n'est pas difficile & conséquemment peu coûteuse.

Les bassines de plomb sont plus communément employées dans les arts en grand, où l'on travaille les matières salines turc-ou, que dans la chimie.

La forme des bassines est une chose qui ne doit point être indifférente pour les chimistes & les pharmaciens; la forme plate est avantageuse pour les évaporations, parce qu'elle présente & à la chaleur & à l'air un plus grand nombre de points de contact; on sent d'ailleurs que l'on gagne toujours beaucoup à prendre sur la profondeur pour la largeur, car les vapeurs d'eau formées en un plus grand nombre au fond, ont plus d'espace pour se dégager, n'ont pas une pression aussi considérable à vaincre, & elles arrivent presque sans perte à la surface du liquide. La figure 42 classe 1, représente

une bassine plate. La forme conique est nécessaire pour certaines opérations où il faut que les matières que l'on veut combiner aient entr'elles, pour cela, de nombreux points de contact souvent changés & renouvelles; c'est sur-tout pour la combinaison des huiles & des graisses avec les oxides métalliques, à laquelle combinaison on fait précéder l'eau pour modérer la chaleur, que ces bassines sont infiniment commodes, parce que les oxides métalliques tombant au fond avec les huiles qu'elles entraînent par une attraction particulière, peuvent être souvent agités & divisés dans toutes leurs parties, à l'aide d'une large spatule de bois. On voit une de ces bassines figure 43 classe 1. Ces bassines ont ordinairement des ailes de la même matière, mais qu'il est bon de garnir en bois ou en autre matière quelconque, pour pouvoir les saisir & les retirer du feu. Lorsqu'elles ne sont point ainsi garnies, on se sert de manipules de matières légères & peu conductrices de la chaleur, telles des morceaux de chapeau, de linge & d'elles quelconque.

Les bassines dans les arts, & particulièrement dans les raffineries de salpêtre, sont appelées bassineaux. (M. VAUQUELIN.)

BASSINE (Pharmacie.) La bassine est un des instruments les plus employés & les plus utiles dans un laboratoire de pharmacie. Elle sert aux décoctions, aux évaporations, à la préparation des sucs épais, des extraits, des robs, des confitures, à celle des emplâtres, des sirops, &c. Ce vaisseau est plus souvent fait en cuivre rouge, aussi beaucoup d'auteurs ont-ils témoigné leurs craintes sur l'emploi de ces instruments. On sait que quelques sucs épais, quelques extraits préparés dans des bassines de cuivre, ont offert aux observateurs des molécules de cuivre très-sensibles. M. Baume dit en avoir trouvé dans le suc de réglisse noir. M. Vauquelin en a également trouvé dans la casse cuite. Il seroit donc nécessaire de ne faire usage que de bassines d'argent pur, comme cela se pratique dans les pharmacies; les mieux montées en utensiles, & le cuivre même devroit être banni des laboratoires où l'on prépare les médicaments.

BASSOMBE. (Pharmacie.) Nom donné à l'*Acorus des Indes*. (Voyez ce mot.)

BATATTE. (Pharmacie.) *Convolvulus batatas*. Batatas C. B. 91. Plante esculente, vivace, originaire des Indes de la famille des lierons, qui se trouve naturalisée en Espagne, en l'ortugal, en Suède, dans la Pensylvanie, dans la Virginie, & qui peut l'être en France méridionale, car elle a été quelquefois cultivée en Angleterre.

Sa racine est tuberculeuse & farineuse comme la pomme-de-terre, la faveur en est infiniment plus délicate, elle offre une nourriture saine & peut

peut être employée de même que la pomme de terre. Son usage tient le ventre libre.

BATIA. (*Pharmacie.*) Dénomination de quelques anciens écrivains pour désigner une retorte ou cornue.

BATTITURE. (*Pharmacie.*) Expression générale pour désigner la partie qui se sépare d'un corps que l'on bat, ainsi on appelle battiture de beurre, l'espèce de serum pu peut-être qui se sépare lorsqu'on bat la crème; mais ce terme est plus généralement employé pour désigner les lames ou écailles qui se séparent des métaux rougis que l'on frappe sur l'enclume; ainsi on appelle, battiture de fer, de cuivre, les lames qui se séparent de ces métaux forgés & battus sur l'enclume; on emploie ces battitures dans quelques préparations pharmaceutiques, & ce ne sont qu'un oxyde ou un carbonate du métal.

BATYS, ou BATUS. (*Pharmacie.*) Dénomination que l'on trouve dans beaucoup d'anciens pharmacographes, & qu'ils employoient d'après les écrivains grecs, pour désigner l'espèce de plante que Linnéus nomme *rubus fruticosus*, & vulgairement la ronce ou ruisier des haies; le fruit de cette plante qui étoit fort recommandé pour le traitement des maladies de la gorge, est désigné dans les anciens écrivains sous le nom de *mura bati*, *mora batina*.

BAUCIA. (*Pharmacie.*) Dénomination employée par quelques anciens pharmacographes pour désigner le panais. *Pastinaca sativa*, Linn.

BATONS. (*Pharmacie.*) Le mot bâton est employé en pharmacie pour désigner quelques produits naturels ou quelques préparations particulières. On dit des bâtons de casse, de la casse en bâtons, pour désigner le légume ligneux qui contient la pulpe de casse. On dit également du sucre d'orge en bâtons, du suc du réglisse en bâtons pour indiquer la forme que l'on donne quelquefois aux suc épais, aux emplâtres, aux condits, &c.

Ce qu'on nomme bâtons de corail est une ancienne préparation qu'on faisoit avec de la poudre pour les dents & suffisante quantité de mûilage de gomme adragant; on en formoit de petits cylindres semblables à des tuyaux de plumes avec lesquels on se frottoit les dents.

BAUHINE PANACHÉE. (*Pharmacie.*) *Bauhinia variegata*, *Arbor S. Tomæ*, *Altera Zanoni*, *hist.* 26. t. 15. Arbre qui croît dans les lieux sablonneux du Malabar & des environs de Madras.

La décoction de sa racine, prise avec du sucre & du miel, est bonne contre la toux, la phtisie, chasse les vents & tue les vers des enfans, *ses Chimie, Tome II.*

fleurs infusées avec du sucre, s'emploient avec succès à la plaie du sucre rosé, pour un léger purgatif.

(M. WILLEMET.)

BAUHINE POURPRE. (*Pharmacie.*) *Bauhinia purpurea*. On trouve cet arbre dans les sols sablonneux du Malabar & de l'Inde. Ses fleurs sont purgatives.

(M. WILLEMET.)

BAUMES. On nomme *baumes* des matières huileuses, odorantes & aromatiques, d'une consistance liquide, un peu épaisse, qui découlent d'elles-mêmes de certains arbres, ou par des incisions qu'on y fait exprès pour en obtenir une plus grande quantité.

Ces baumes qu'on peut désigner plus particulièrement par le nom de *baumes naturels*, pour les distinguer de quelques compositions qui portent aussi le nom de *baumes*, ne doivent leur liquidité & leur odeur, qu'à une portion plus ou moins considérable d'huile essentielle qu'ils contiennent, & qu'on en peut retirer par la distillation au degré de chaleur de l'eau bouillante.

On peut même considérer les baumes comme de véritables huiles essentielles, qui ont perdu une portion du principe de leur odeur & de leur partie la plus subtile & la plus volatile. Leurs résidus, lorsqu'on a achevé de leur enlever par la distillation ce qui leur reste d'huile volatile, ressemblent parfaitement à ce qui reste après la rectification des huiles essentielles: ce sont de vraies résines, de l'analyse desquelles on retire absolument les mêmes principes que des résines naturelles; & ces dernières ne sont elles-mêmes autre chose que des baumes épuisés par la vétusté ou par l'action de l'air ou du soleil, de leur partie odorante & volatile.

Il est néanmoins probable, comme le remarque fort bien M. Pœrner, que plusieurs baumes naturels, quoique de même consistance que les résidus d'huile essentielle, sont plus riches en esprits odorans volatils, que ces derniers. Il suffit pour cela qu'une portion de l'huile étherée la plus subtile du végétal dont ils proviennent, ait été épaissie & comme fixée par son union avec quelque autre principe & particulièrement avec un acide.

Il y a plusieurs espèces de baumes naturels; ils ne diffèrent point essentiellement les uns des autres, mais seulement par leur odeur & leur degré de consistance, quoique ces deux qualités varient aussi beaucoup dans la même espèce de baume.

Les principaux baumes naturels sont le *baume blanc* ou de la Mecque, qui est le plus rare & le plus cher de tous; le *baume de tolu* & le *baume du Pérou en coque*, que M. Baume regarde comme le même baume, avec cette différence que le premier est liquide & le second presque sec; le *baume de copahu*, le *styrax liquide* & les *irichémines*.

On voit par cet extrait du dictionnaire de Mac-

V v v

quer, que rien n'étoit plus incertain & plus inexact en chimie, que la dénomination de baumes, qu'on donnoit ce nom tantôt à ceux des fucs résineux qui restent sous la forme fluide, tantôt à ceux dont l'odeur est la plus vive & en même-temps la plus agréable, & qu'on y comprenoit indistinctement plusieurs substances naturelles dont les propriétés étoient très-différentes les unes des autres. Buequer ayant bien remarqué cette inexactitude, & cherché le moyen de la faire disparaître & de porter dans la science chimique une méthode plus sûre & beaucoup moins équivoque, relativement à la dénomination de baumes, en l'appliquant à des substances qui jouissent de propriétés analogues, & qui pussent être regardées comme formant un véritable genre distinct de tous les autres corps connus. Pour remplir cette idée utile, Buequer a compris sous la dénomination de baumes, tous les fucs résineux, soit liquides, soit solides, qui contiennent un sel acide, & qu'on peut en extraire, soit en le sublimant par l'action du feu, soit en les lessivant par l'eau chaude & sur-tout par les liqueurs alcalines, par la chaux, &c. Il a rangé dans ce genre chimique, comme autant d'espèces distinctes, le benjoin, le baume du Pérou, le baume de tolu, le storax solide, le liquidambar, & le styrax liquide. Ces six fucs résineux contiennent tous le même acide, l'acide benzoïque dont les propriétés ont été examinées dans le premier volume de cet ouvrage; ils ne diffèrent les uns des autres que par la résine qui y est unie, & qui fait varier dans chacun d'eux la couleur, la consistance, l'odeur, la saveur, la fusibilité, &c. Cette distinction méthodique, cette disposition des baumes qui les sépare convenablement des résines proprement dites, dont le caractère est de ne point contenir un pareil acide, a été adoptée par le plus grand nombre des chimistes. Elle nous a servi pour caractériser les baumes, lorsque nous avons reformé il y a huit ans la nomenclature chimique.

Il paroît que l'on trouvera quelque jour un plus grand nombre de baumes que ceux que l'on connoît aujourd'hui. On a remarqué que la vanille exhale une vapeur odorante qui se condense en aiguilles blanches & cristallines autour de cette gouffe, & qui n'est que de l'acide benzoïque. La présence de cet acide annonçant celle d'une résine dans les matières végétales, il semble que la plante qui fournit cette précieuse gouffe, soit susceptible de donner un baume pendant sa végétation. Peut-être un grand nombre de végétaux sont-ils dans le même cas que la vanille. Les voyageurs qui s'intéressent aux progrès de l'histoire naturelle, ne doivent pas perdre de vue ce point de recherches.

BAUME DU CANADA. Le baume de Canada ou baume blanc du Canada, a la même transparence & la même fluidité que la térébenthine du sapin; il n'en diffère que par son odeur qui est plus suave,

& se rapproche de celle du citron ou du baume de la Mecque. On le retire en Canada, d'une espèce de sapin nommé *baumier de Gilead*, *abies taxifolia*, *odore balsami Gileadensis*, RAI, lequel ne diffère presque point du sapin ordinaire.

Le baume de Canada est composé des mêmes principes que la térébenthine, & comme c'est la plus pure des espèces de térébenthines qu'on trouve dans le commerce, les médecins préfèrent de l'employer pour l'usage intérieur.

BAUME DE COPAHU. Ce liquide nommé **BAUME DE COPAHU**, *balsamum Copaivum*, *balsamum de Copiba* aut *Copaiba*, *balsamum Copahu* & *balsamum Brasiliense*, n'a été rangé parmi les baumes, qu'à cause de sa fluidité. C'est un suc résineux, fluide, dont on distingue deux espèces; la première est d'un jaune pâle, parfaitement transparent, ayant à-peu-près la consistance de l'huile, quand il est nouveau, acquérant avec le temps une couleur plus brune & une consistance plus solide, d'une saveur amère, résineuse & un peu astringente; il découle par une incision qu'on fait à un arbre nommé *Copaiba*, MARGRAF. *Copaiba* & *Copaifera officinalis*. LINN. Suivant la description qu'en donne M. Jacquin dans son *histoire des plantes de l'Amérique*, cet arbre est élevé, fort touffu; son écorce est rude, cendrée, brune. Les feuilles sont composées de plusieurs folioles, souvent plus petites d'un côté que de l'autre, arrondies, d'un vert foncé en-dessus, plus pâle en-dessous, brillantes & dures, traversées par des nervures de couleur de rouille. Les fleurs naissent plusieurs ensemble à l'extrémité des rameaux; elles sont petites, blanches, composées de cinq pétales disposés en roses, elles renferment dix étamines, terminées par des anthères oblongues, & un pistil composé d'un embryon arrondi, soutenu par un petit support. Cet embryon est surmonté d'un style courbé & terminé par un stigmate obtus. Les pédaucels qui soutiennent les fleurs, sont longs & grêles; le fruit est arrondi, & se termine en pointe, à l'aide d'une portion du style qui y reste adhérent. Ce fruit qui devient noir en mûrissant, contient dans une pulpe douce un noyau dur, qui renferme une amande. Cet arbre croît près de Tolu, dans l'Amérique méridionale.

L'autre espèce de baume de Copahu qu'on trouve dans le commerce, est plus épaisse, d'un jaune foncé & un peu verdâtre, d'une odeur plus forte que la précédente, & s'approchant de celle de la térébenthine, d'un goût amer, aromatique & astringent. L'opinion la plus commune est que cette espèce se tire en faisant bouillir dans l'eau les différentes parties de l'arbre qui donne le vrai baume de Copahu. Plusieurs très-bons naturalistes, & entre autres M. Cartheuser, pensent que cette espèce de baume n'est qu'un mélange de véritable baume de Copahu, avec un peu de térébenthine.

Le baume de Copahu contient une grande

quantité d'huile volatile, qu'on en retire en le distillant avec de l'eau au degré de l'ébullition. Ce qui reste dans l'alambic, après l'extraction de l'huile, est une masse résineuse, coucrète, qui surnage l'eau. Cette masse est en entier dissoluble dans l'alcool. Si on la distille à feu nud, elle fournit une liqueur acide & beaucoup d'huile pesante, comme toutes les résines; il reste très-peu de matière charbonneuse.

Le baume de Copahu est employé en médecine comme vulnéraire & légèrement astringent. On en fait pas dans le traitement des ulcères qui affectent les conduits de l'urine & la poitrine, ou lorsque ces parties sont remplies d'une pituite épaisse qui leur ôte le ton qu'elles doivent avoir. On l'ordonne en substance, incorporé avec le suc, ou on en mêle quelques gouttes dans les extraits & les pilules, ou trituré avec le jaune d'œuf. On le fait entrer dans les boissons aqueuses; on le met aussi dans les lavemens, & on s'en sert extérieurement dans le pansement de certains ulcères fâcheux.

Cartheuser fait mention d'une autre résine liquide, qu'il regarde comme analogue au baume de Copahu, & qu'il croit même pourvue de vertus plus marquées; il la nomme *Kakafiri*. Elle découle d'un arbre dans l'Amérique; elle n'est que fort peu connue.

BAUME DE LA MECQUE. La résine connue sous le BAUME DE LA MECQUE, *opobalsamum*, de baume de Jude, d'Egypte, du grand Caire, de Syrie, de Constantinople, est un suc blanc, fluide, qui s'épaissit & brunit en vieillissant. Son odeur est forte, & tire sur celle du citron. C'est pour cela qu'on la nomme *baume*, quoiqu'il ne contienne pas de sel acide. Sa saveur est amère & aromatique. Il découle des incisions faites à un arbre, nommé par Linnéus, *amyris opobalsamum, foliis pinnatis, foliolis sessilibus*. Le caractère du genre de l'*amyris* est d'avoir le calice coupé en quatre segments, quatre pétales oblongs, un stigmate triangulaire. Le fruit est une baie charnue. Dans cette espèce, les feuilles sont composées de plusieurs folioles, posées sur la côte, sans pétiole. Les détails concernant l'espèce particulière d'*amyris* qui donne le baume de la Mecque, sont l'objet d'une dissertation que Linnéus a publiée à Upsal en 1764. La plante croît en Arabie, où elle a été découverte par Forskahl. Plusieurs personnes ont pensé fausement que le baume de la Mecque brun se retirait par la décoction des branches de l'arbre du baume. Cartheuser croit qu'une bonne partie du baume de la Mecque qui se trouve dans le commerce, n'est qu'un mélange du baume de Copahu, de belle térébenthine & d'un peu d'huile volatile de citron.

Le baume de la Mecque distillé à la chaleur de l'eau bouillante, fournit beaucoup d'huile volatile. Ce baume est entièrement dissoluble dans l'alcool.

L'eau précipite sa teinture en totalité, parce que cette substance ne contient point de sel volatil.

On loue beaucoup le baume de la Mecque, comme aromatique, vulnéraire & cicatrisant. On le prescrit dans les cas d'ulcères aux poulmons, aux reins, ou à quelou'autre viscère. On le donne incorporé avec le sucre, & sous la forme de bols. On l'emploie aussi mêlé avec le jaune d'œuf & délayé dans les boissons.

BAUME DE TOLU. Le baume de Tolu, ou baume de Carthagène, *balsamum Toluatum*, qu'on a long-temps confondu avec le baume du Pérou, est un suc balsamique & d'une odeur douce & agréable. On l'apporte quelquefois en larmes ou morceaux transparents, jaunâtres & tirant sur la couleur de l'or. Le plus souvent il est en masses grossières, opaques, d'un brun foncé, & renfermé dans de petits cocos; on le nomme dans cet état, *baume de Tolu en coque*; c'est dans cet état qu'on l'a souvent confondu avec le baume du Pérou. On le trouve aussi, mais rarement, sous la forme d'un fluide épais de couleur brune: il prend alors le nom de *baume brun fluide de Tolu*. On a cru pendant long-temps que ce suc étoit produit par le même arbre qui donne le baume de Pérou blanc, & que les différences qu'il y avoit entre ces deux sucs, ne venoient que de la manière dont on procédoit pour l'extraire, on croyoit que le baume blanc couloit naturellement, ou par incision du bœmier, & que le brun se tiroit par la décoction des feuilles & des branches de cet arbre; mais il est constant aujourd'hui que ces deux sucs sont de nature très-différente.

On peut aisément faire acquérir au baume solide de Tolu de la fluidité, en faisant tremper dans l'eau chaude les coques qui le renferment; il arrive même assez fréquemment que pendant la chaleur de l'été une partie de ce baume devient assez fluide pour s'écouler hors des coques.

L'arbre qui fournit le baume de Tolu a été nommé *Toluifera* par Linnéus. Ce naturaliste lui donne les caractères suivans. Le calice est en cloche divisée en cinq segments. Les pétales sont au nombre de cinq; ils renferment dix étamines. On ne découvre point de style dans la fleur. Cet arbre croît dans l'Amérique méridionale, dans un pays appelé Tolu, & par les Espagnols, Honduras, situé entre Carthagène & le Nom-de-Dieu. Cet arbre ne croît point au Pérou & le baume de ce nom a été confondu avec celui du Tolu, parce qu'on les donne souvent l'un pour l'autre dans le commerce.

Le baum: brun fluide de Tolu donne beaucoup d'huile volatile lorsqu'on le distille à l'eau bouillante; mais lorsqu'il est sec, il n'en fournit que très-peu à moins qu'on n'en mette en expérience une quantité considérable.

L'eau bouillante n'extraît de ce baume qu'un sel acide aromatique, semblable à celui que fournit le benjoin, & susceptible comme lui de se cristalliser.

sifier par le refroidissement de sa dissolution. On peut extraire le sel du baume de Tolu sec sous forme de fleurs par la sublimation. Ce qui reste après qu'on a retiré les fleurs, étant distillé à feu nu au fourneau de réverbère, donne les mêmes produits que le benjoin; savoir une liqueur acide & un sel acide aromatique, une huile empyreumatique pesante & cependant d'une odeur agréable. Le charbon qui reste dans la cornue après la distillation, est moins considérable que celui du benjoin, parce que le baume de Tolu est moins mélangé de corps étrangers.

Le baume de Tolu se dissout en totalité dans l'alcool; l'eau précipite la partie huileuse de cette teinture, mais le sel reste en dissolution, parce qu'il est, ainsi que celui du benjoin, dissoluble dans l'alcool & dans l'eau.

Le baume de Tolu est employé en médecine comme aromatique, vulnérinaire & antiputride. On le prescrit en substance, trituré avec du sucre ou mêlé à quelque extrait. On en prépare un syrup dont on fait beaucoup d'usage dans les maladies du poulmon; on ordonne quelquefois sa teinture à la dose de quelques gouttes mêlées aux boissons aqueuses. Les produits distillés du baume de Tolu, peuvent être employés comme ceux du benjoin dont ils ont les qualités dans un degré inférieur.

On trouve dans le commerce une espèce de baume brun fluide de Tolu, qui n'est qu'une composition qu'on croit faite avec l'huile distillée de benjoin qu'on a fait macérer sur les germes du peuplier à odeur de baume, & auquel on a ajouté une petite portion de vrai baume de Tolu; cette espèce de baume ne doit être employé qu'à l'extérieur.

BAUME DE SATURNE. Dénomination très-impropre de l'acétite de plomb dans l'état d'une dissolution épaisse. Voyez le mot ACÉTITE DE PLOMB pour connoître les différens états de ce sel employé en pharmacie.

BAUMES DE SOUFRE. On nommoit baumes de soufre, les dissolutions de soufre dans les huiles volatiles ou essentielles; on nomme aujourd'hui ces compositions, sulfures huileux, sulfures d'huile volatile.

BAUME DE SOUFRE ANISÉ. Dissolution de soufre dans l'huile volatile d'anis. Voyez sulfure d'huile volatile d'anis.

BAUME DE SOUFRE TÉRÉBENTHINÉ. Dissolution du soufre dans l'huile volatile de térébenthine. Voyez sulfure d'huile de térébenthine.

BAUME DU FÉROU. Le baume du Pérou a été confondu par un grand nombre d'auteurs de matière médicale avec le baume de Tolu, dont il se rapproche en effet par tous les caractères chimiques, & par les propriétés médicinales, il a à peu-

près la même odeur, la même saveur; comme lui il se fond, exhale un parfum agréable en brûlant, donne de l'huile volatile & de l'acide benzoïque. Mais le baume de Tolu vient d'un végétal connu sous le nom de *toluifera balsamum*, & celui du Pérou coule du *Peruvia* de Linnéus, qui croit dans un lieu fort éloigné de Tolu. Aublet dans son histoire des plantes de la Guyanne, nomme ce végétal *Houmire balsamifera*; Hernandez l'appelle *Hortioxist*, & Eison *Cobareiba*.

Le baume du Férou peut servir en chimie comme le benjoin, le baume de Tolu & le storax, à extraire l'acide benzoïque.

BAUME (Plante.) (Pharmacie.) La plante en question nommée vulgairement baume, & qui est employée dans la cuisine & dans la pharmacie, est une espèce de menthe. (Voyez MENTHE.)

BAUME DE CANADA. (Pharmacie.) L'espèce de térébenthine qui découle de l'épinette ou sapinette de Canada; c'est le *Pinus balsamea* de Linnéus, & l'*Abies Canadensis* du codex de Paris, page 1.

Le baume de Canada doit être transparent, plus ou moins liquide, d'une couleur blanchâtre, d'une odeur & d'une saveur beaucoup plus douces que celles de la térébenthine ordinaire. Il fait couler les urines, déterge les ulcères; il est vulnérinaire, excellent contre la gonorrhée & la leucorrhée. On le vend en Angleterre sous le nom de baume de Gilead; la dose à l'intérieur est depuis trois gouttes jusqu'à quinze & vingt.

En Canada on fait une boisson très-saine, avec les sommets des branches de cette sapinette. Ce petit arbre conifère se trouve aussi en Virginie.

M. Vitet se trompe dans la pharmacopée de Lyon, en attribuant le baume de Canada au *Pinus Canadensis* de Linnéus, c'est du *Pinus balsamea* qu'il découle.

(M. WILLET.)

BAUME DE COPAHU. (Pharmacie.) Réfine liquide qui découle d'un grand & bel arbre des forêts du Brésil, de la Guyane, des Îles Antilles & de Maragnan, que Linnéus nomme *Copaifera officinalis*.

Il faut choisir le baume de Copahu d'un goût âcre, amer, aromatique, d'une odeur pénétrante, limpide, de couleur jaunâtre. Il est vulnérinaire extérieurement, il convient comme remède balsamique, adoucissant, apéritif, diurétique, laxatif, dans les gonorrhées, les fleurs blanches, les ulcères des reins & de la vessie, la suppression des règles, les douleurs néphrétiques, le calcul, l'hydropisie, le crachement de sang, la dysurie des vieillards. La dose est de vingt ou trente gouttes dans quelque liqueur convenable, ou en pilules avec le sucre ou la poudre de réglisse. Il guérit aussi les fièvres intermittentes, si quelque temps avant l'accès on en donne six gouttes dans un bouillon. Il est utile

dans la diarrhée, & la dysenterie, quand il n'y a point de fièvre; il contient beaucoup d'huile étherée. L'incise assure qu'il guérit la phthisie. L'on en retire aussi une teinture avec l'esprit-de-vin rectifié: le baume de Copahu entre dans l'onguent martial.

L'infusion des feuilles de cet arbre, dit M. Jacquin, dans laquelle on dissout un jaune d'œuf pour des injections dans le canal de l'urètre, forme un excellent remède contre la gonorrhée.

Le bois est d'un rouge forcé, il est recherché des menuisiers & des ébénistes.

Frédéric - Guillaume Hoppe a composé une dissertation sur le baume de Copahu.

(M. WILLEMET.)

BAUME DE GILEAD. (Pharmacie.) *Balsamum Gileadense*. L'arbre qui le porte est nommé par Linnéus *Amyris Gileadensis*. Il est du même genre que celui d'où découle le baume de la Mecque. Le baume de Gilead diffère peu de celui de la Mecque.

(M. WILLEMET.)

BAUME DE LA MECQUE OU BAUME DE JUDÉE. (Pharmacie.) *Balsamum venum* J.B. Il découle d'un arbre égyptien, que Linnéus appelle *Amyris opobalsamum*, qui croît dans l'Arabie heureuse.

Ce suc doit être limpide, blanchâtre, acre, aromatique, & très-pénétrant; c'est un excellent vulnérinaire, un bon confortatif & un cosmétique; les médecins de Breslau ont un exemple frappant de guérison promptement guérie avec son usage. On le donne sous la forme de bol enveloppé dans du sucre ou délayé avec un jaune d'œuf dans une émulsion, dans du vin, dans du bouillon, ou quelque autre liquide convenable, depuis six gouttes jusqu'à vingt-quatre. Les Egyptiens s'en servent pour le préserver de la contagion de la peste; ils en prennent pour cela demi-gros tous les jours; ils en prescrivent dans les fièvres putrides, pour exciter la sueur. Il convient & opère de bons effets dans la gonorrhée, les fleurs blanches & la dysenterie; comme il incise la viscosité des humeurs, on peut le donner dans l'asthme; & comme vulnérinaire, dans les ulcères internes, spécialement des poulmons, des reins, pourvu qu'il n'y ait pas de fièvre; le baume de la Mecque a encore la réputation de guérir la corruption & la pourriture des viscères. Les femmes Egyptiennes le guérissent de la stérilité, soit en l'avant, soit en faisant des suppositoires, soit en fumigations. Elles l'emploient pour se rendre la peau du visage unie & douce, car on prétend qu'il empêche les rides: le baume de la Mecque sert à la préparation du lait virginal. Il entre dans la rhériaque, le Mithridate & les trochisques d'*Hedieroi*. Nombre d'auteurs ont écrit spécialement sur ce baume, dont le vrai est assez rare.

(M. WILLEMET.)

BAUME DU PÉROU BLANC. (Pharmacie.) *Balsamum Peruvianum album*. Cette liqueur résineuse découle d'un arbre exotique que Linnéus nomme *Peruvia*, qui est une espèce de *Saccharinum*, originaire du Pérou, du Mexique, & se trouve au Brésil, dans la nouvelle Angleterre. Ce baume est d'une couleur pâle, d'une odeur de benjoin, d'une saveur acre, amère, de la consistance du miel liquide, c'est celui qui sort par l'incision faite à l'arbre; mais on s'en sert rarement dans les pharmacies.

Hoffman, Lichman, Hadley, ont chacun donné une monographie sur le baume du Pérou; & les mémoires de Trévoux en offrent l'histoire naturelle & médicale; c'est sur-tout l'espèce suivante qui est la plus usuelle dans les boutiques.

(M. WILLEMET.)

BAUME DU PÉROU NOIR. (Pharmacie.) *Balsamum Peruvianum nigrum*. C'est un suc résineux, épais, pénétrant, d'une couleur roussâtre, tirant sur le noir, d'une odeur très-agréable de styrac & de benjoin, d'une saveur un peu acre. Le baume du Pérou a les mêmes vertus que celui de Copahu, mais outre cela il convient dans l'empyème, la vomique, les spasmes; il guérit la colique de Poitou, il rétablit le ton affaibli de l'estomac & des intestins; il est bon pour la paralysie; & le tinctement d'oreille. On le donne intérieurement depuis trois gouttes jusqu'à dix, dans un jaune d'œuf, ou mêlé avec du sucre. C'est un des meilleurs nervins, stomachiques, pectorans, traumatiques, antiputrides & diurétiques doux. A Hambourg, l'on fait usage d'une essence préparée avec ce baume. Le baume du Pérou liquide noir entre dans le baume de Guaiac, le baume de Tencarelle, le syrup balsamique d'Hoffman, les pilules tripartites de la pharmacopée de Londres, dans la thériaque ecclésiastique, l'orviétan, les pilules balsamiques de Morton, les pilules balsamiques & évacuantes d'Hoffman, l'esprit abstrait du même, le baume apoplectique, les pilules odorantes pour l'unguent & l'onguent martial.

(M. WILLEMET.)

BAUME DE TOLU. (Pharmacie.) *Balsamum de Tolu*. J. F. 1. 196. *Balsamum Toluatum solidum*. L'arbre d'où on le retire par incision, est désigné par Linnéus sous le nom de *Toulatro balsamum*. Il croît dans la province de Tolu près de Carthagène & dans l'Amérique méridionale.

Le baume de Tolu, est un suc résineux, tenace, sec, fragile, d'un rouge terne approchant de la couleur d'or, d'une odeur très-pénétrante qui approche de celle du benjoin, d'une saveur douce, agréable qui ne cause point de nausées. Il possède toutes les vertus des autres baumes. Il entre dans le baume traumatique de la pharmacopée de Londres, le baume nervin, le baume de commandeur.

C'est avec le baume de Tolu que l'on prépare le syrop balsamique. L'on retire aussi de ce baume une teinture avec l'alcool rectifié.

(M. WILLEMET.)

BAUMES ARTIFICIELS. (Pharm.) On a donné ce nom, dit M. Baumé, à des médicaments composés qui avoient à-peu-près la consistance visqueuse des baumes liquides naturels, & auxquels on attribuoit les mêmes vertus qu'à ces substances. Mais dans ces derniers temps, on n'a point eu d'égard à la consistance des médicaments, auxquels on a donné le nom de baumes. C'est ce qui fait que l'on a aujourd'hui dans la pharmacie des baumes liquides alcooliques, des baumes liquides de la consistance des huiles, des baumes épais comme les onguents, des baumes solides comme des emplâtres; il ne s'en trouve plus qui aient bien véritablement la consistance des baumes liquides naturels.

Les baumes alcooliques ont pour base l'alcool & plusieurs huiles volatiles; quelquefois on charge l'alcool de la teinture de plusieurs substances, avant de les mêler avec les huiles volatiles.

Les baumes qui ont la consistance des huiles fixes ou grasses, sont faits avec ces mêmes huiles, auxquelles on ajoute des matières odorantes qui changent peu leur consistance.

Les baumes qui ont la consistance d'onguent, sont le plus souvent des onguents proprement dits; quelques-uns cependant ne sont composés que de cire blanche, ou d'huile épaisse de muscade, qu'on a mêlé avec des huiles volatiles & odorantes; mais cela ne se pratique plus actuellement, à cause qu'elles rancissent avec trop de facilité.

Les baumes emplâtriques doivent leur consistance à de la cire, &c. Ils sont faits pour être odorans, & ne s'emploient que comme parfums. On les enferme dans des boîtes d'ivoire ou d'argent, & on les porte dans la poche: on donne à ces baumes une consistance solide, pour qu'ils soient plus commodes à porter sur soi, & afin que leur odeur se dissipe moins.

Plusieurs baumes se prennent intérieurement, les autres s'appliquent à l'extérieur.

On voit par cet exposé de M. Baumé, qu'il seroit assez méthodique de partager & de renvoyer les baumes composés ou artificiels en trois classes chimiques; savoir: 1°. dans celle des alcools composés; 2°. à celle des dissolutions huileuses, liquides; 3°. à celle des onguents. Mais comme on n'a pas à beaucoup près décrit tous les baumes alcooliques à l'article des alcools composés, & qu'il est cependant nécessaire de rendre complète dans ce dictionnaire l'histoire des préparations composées que l'on fait tous les jours en pharmacie, & qu'on emploie plus ou moins fréquemment aujourd'hui dans différentes parties de l'Europe, nous croyons utile de réunir ici par ordre alphabétique les principales espèces de ces préparations.

Nous en emprunterons la description de l'ouvrage de M. Baumé sur la pharmacie, en y inférant les remarques, les changements ou les additions que l'état actuel des connoissances pharmaceutiques rend indispensable.

BAUME D'ACIER OU D'AIGUILLES. (Pharmacie.) La préparation connue dans les pharmacies sous le nom de baume d'acier ou baume d'aiguilles, n'est point un véritable baume, suivant le sens que nous avons donné à ce mot dans l'article précédent; c'est une espèce de savon métallique, dont la consistance seule peut le rapprocher des compositions balsamiques artificielles; mais ce nom pharmaceutique étant consacré, nous décrirons ici cette composition.

Voici d'abord comment M. Baumé prescrit de faire le Baume d'acier.

℥ Aiguilles d'acier.....	℥ 5
Acide nitrique.....	℥ 3 j.

On met dans une capsule de grès l'acide nitrique avec les aiguilles. Lorsqu'elles sont dissoutes, on ajoute :

Huile d'olive.....	℥ ij.
Alcool.....	℥ ij.

On fait chauffer ce mélange légèrement pendant un quart-d'heure, en ayant soin de le remuer, alors on le serre dans un pot.

Ce baume est vulnérinaire; il est estimé propre pour les douleurs d'articulation, pour la goutte. On en frotte les parties affligées.

Plusieurs pharmacopées, continue M. Baumé, recommandent de mettre ensemble, & en même temps toutes les substances qui composent ce baume; mais j'ai remarqué que l'acide du nitre se portoit sur l'huile, & ne faisoit que corroder les aiguilles sans les dissoudre; elles restent alors dispersées dans la composition, ce qui produit un mauvais effet. Il vaut beaucoup mieux attendre qu'elles soient dissoutes avant d'ajouter l'huile & l'alcool. On recommande encore de laver ce baume après qu'il est fait, dans le dessein d'enlever vraisemblablement la portion d'acide nitrique, que l'on croit n'être point combinée avec l'huile & l'alcool; mais ce composé forme un savon qui se dissout en entier dans l'eau, lorsqu'on veut le laver, & il n'est pas possible d'en racher une portion: ainsi il est bon de ne le point laver & on ne veut pas le perdre.

Le fer, dans ce baume est prodigieusement divisé; il présente beaucoup de surface, c'est ce qui est cause qu'il durcit considérablement quelque temps après qu'il est fait. Il paroît que cette grande consistance qu'il acquiert, vient aussi de l'action insensible de l'acide nitrique sur l'huile. Cet acide perd toutes les propriétés acides dans

l'espace de quelques mois, & le baume d'aiguilles n'en a pas plus la saveur. Lorsqu'il est parvenu à ce degré d'endurcissement, il convient de le broyer sur le porphyre avec une suffisante quantité d'huile d'olive, pour le ramollir convenablement.

M. Vauquelin a inféré, il y a quelques mois dans mon *Journal des découvertes en médecine*, un nouveau procédé pour préparer le baume d'aiguilles. L'opération qu'il propose est beaucoup plus simple, plus courte, & donne un résultat plus constant que la méthode employée jusqu'ici.

Le procédé dont on se sert communément en pharmacie pour faire le baume d'aiguilles, est, dit, M. Vauquelin, si long, & a souvent un si mauvais succès, que j'ai cru très-utile d'en offrir un nouveau qui fut plus simple, moins coûteux & plus prompt. La plupart des pharmacopées prescrivent pour préparer ce médicament, de mêler ensemble des aiguilles d'acier, de l'huile d'olive & de l'acide nitrique. Il suffit d'exposer cette méthode pour faire sentir aux personnes instruites à combien d'inconvénients elle est sujette. En effet, avant que l'acide nitrique ait dissous les aiguilles, il a souvent brûlé & réduit l'huile en charbon; d'un autre côté, à mesure que l'acide nitrique agit sur les aiguilles, la portion d'huile qui n'est pas encore décomposée, réagit sur l'oxide de fer formé, & donne naissance à une espèce d'emplâtre qui enveloppe les autres portions d'aiguilles non encore oxydées ni par conséquent dissoutes, & empêche ensuite l'acide d'agir dessus, à moins qu'on n'entretienne long-temps la chaleur dans ce mélange; mais il arrive de-là un autre inconvénient, qui est dû à ce que l'acide nitrique brûle trop d'huile, & rend le baume ou dissoluble dans l'eau, ou incapable de servir aux usages auxquels on le destine. M. Baume a cependant évité une partie de ces inconvénients, en recommandant de dissoudre à part les aiguilles dans l'acide nitrique, & de mêler ensuite l'huile & l'alcool; mais comme l'acide nitrique oxyde plutôt le fer qu'il ne le dissout, il faut ensuite beaucoup de temps pour combiner cet oxyde avec l'huile d'olive, & cependant, l'acide nitrique excède à l'oxidation du fer, & la chaleur agissant sur l'huile & l'alcool brûlent l'une & la rendent dissoluble dans l'eau, & volatilisent l'autre, en partie étherifiée par l'acide nitrique. C'est pour obvier à ces longueurs, à ces incertitudes de réussite, que je propose la méthode suivante. Faites dissoudre dans de l'alcool autant qu'il sera possible de savon blanc à la température de 30 degrés, dans un matras à long col; mêlez ensuite cette dissolution avec une dissolution de sulfate de fer, substance qui n'est point chère; il se fait sur-le-champ une double décomposition & une double combinaison; la soude du savon s'unit à l'acide sulfurique du sulfate de fer,

& l'huile du savon se porte sur l'oxide de fer, & donne le baume d'aiguilles, qui se trouve entouré de toutes parts de l'alcool, dont il prend ce qu'il pourroit prendre dans la première méthode; mais comme ce baume n'est pas rongé comme celui des boutiques, parce que le fer n'y est pas assez oxydé, on peut y ajouter quelques gouttes d'acide nitrique & faire faire quelques bouillons au tout, & alors il aura la même couleur; ou bien si l'on ne veut pas faire la dépense de l'acide nitrique, l'on prendra au lieu d'une dissolution de sulfate de fer, une eau-mère rouge de ce sel, & cela reviendra au même.

BAUME DE VIE D'HOFFMANN. (*Pharmacit.*) Le baume de vie d'Hoffmann est une teinture composée, analogue à beaucoup d'autres préparations de ce genre; que nous aurions pu accumuler ici sous la même dénomination. Comme celle-ci est une des mieux faites & des plus actives, nous la décrivons d'après M. Baume, en négligeant d'ailleurs plusieurs autres préparations analogues qui ne font dues qu'aux préjugés de ceux qui les éliminent, & à la cupidité de ceux qui les vendent.

2^e Huile essentielle de lavande.

marjolaine.....	} aa... 3 j.
géroses.....	
macis.....	
cannelle.....	
citron.....	

rhue.....

de succin rectifiée..... } aa... 3 6j

ambre gris.....

alcool rectifié..... } x.

On concasse l'ambre gris, on le met dans un matras avec les huiles essentielles & l'alcool; on fait digérer à froid pendant plusieurs jours, ou jusqu'à ce que l'ambre gris soit dissous, alors on filtre la liqueur.

On emploie ce baume pour l'extérieur à cause de sa bonne odeur; mais on en fait aussi usage pour l'intérieur: il est fortifiant, on le recommande dans les coliques qui proviennent des diarrhées; mais il faut être très-circonspect dans son usage.

La dose est depuis 10 gouttes jusqu'à demi gros.

BAUME ACOUSTIQUE (*Pharmacit.*) Le baume acoustique est un mélange de plusieurs huiles & dissolutions huileuses, dont M. Baume décrit ainsi la préparation.

2 ^e l'huile de rhue par infusion.....	6
baume tranquille.....	ij.
de soufre térébenthiné.....	Gutt. x.

baume de Fioraventi est une teinture alcoolique distillée, & qui ne retient que la partie aromatique & une petite portion des huiles volatiles des substances avec lesquelles on a traité l'alcool. M. Baumé en donne la recette suivante.

℥ Térébenthine de Venise.....	lb j.
baies de laurier récentes.....	§ iv.
résine élém.....	§ ad... § j.
tacamahaca.....	§ ad... § j.
styrax liquide.....	§ 3 ij.
galbanum.....	} ad... § 3 ij.
encens mâle.....	
myrrhe.....	
gomme de lierre.....	
bois d'aloës.....	
galanga minor.....	} ad... § j.
gérofle.....	
canelle.....	
muscade.....	
zédoaire.....	
gingembre.....	
feuilles de dictanne de Crète.....	
aloës succotrin.....	
succin préparé.....	
Alcool rectifié.....	lb vj.

Après avoir concassé ces substances, on les fait macérer dans l'alcool pendant neuf à dix jours, alors on ajoute la térébenthine, on distille ce mélange au bain-marie, pour tirer tout le spiritueux; c'est ce que l'on nomme *baume de Fioraventi spiritueux*.

On enlève le marc resté dans l'alambic; on le met dans un cucurbit de terre vernissée ou de fer, & on distille par un feu de cendre chaude un peu supérieur au degré de chaleur de l'eau bouillante. On obtient une huile citrine qu'on met à part; c'est ce que l'on nomme *baume de Fioraventi huileux*. Enfin, en augmentant la chaleur, jusqu'à presque brûler les matières contenues dans la cucurbit, on obtient une liqueur en partie huileuse, & en partie aqueuse. On sépare l'huile, on la met à part, & l'on jette le phlegme comme inutile; c'est ce que l'on nomme *baume de Fioraventi noir*.

Le baume de Fioraventi spiritueux est un antipestilentiel; il résiste à la gangrène; il est vulnéraire. On l'emploie dans les coups de tête, pour les contusions, les meurtrissures, & pour résoudre le sang caillé. On le fait prendre intérieurement dans les maladies des reins & de la vessie, pour détéger les ulcères intimes de ces parties. On l'emploie dans les coliques néphrétiques. On en prend cinq à six gouttes dans du thé ou dans quelques boissons vulnéraires & diurétiques. Il soulage les douleurs de rhumatisme en en frottant les parties affligées. Dans les fluxions & les toriculis, on s'en sert avec succès pour détourner les fluxions des yeux & pour fortifier la vue en

Chimie, Tome II.

s'en frottant le bord des yeux; on s'en frotte les mains, & on les présente devant les yeux pour en recevoir les vapeurs.

BAUME DE LUCATEL. (Pharmacie.) Le baume de Lucatel est une composition irrégulière, de la nature des huiles mélangées, dont M. Baumé décrit ainsi la préparation.

℥ Cire jaune.....	§ vj.
vin d'Espagne.....	§ ij.
huile d'olive.....	§ ix.

On met ces matières dans une bassine d'argent; on les fait chauffer à petit feu, pour faire dissiper toute l'humidité du vin; ensuite on ajoute:

Térébenthine.....	§ ix.
fantal rouge pulvérisé.....	§ j.

On agite le tout avec un pilon de bois, jusqu'à ce que le mélange soit presque refroidi; alors on ajoute:

Baume noir du Pérou.....	§ j. §
--------------------------	--------

On le remue de nouveau avec le pilon de bois, jusqu'à ce que le mélange soit exact, on le ferte dans un pot.

Ce baume se donne intérieurement; il faut avoir l'attention de faire dissiper toute l'humidité; sans quoi, il moisirait à sa surface, & le baume rancirait au bout de quelque temps.

Il est estimé propre pour les maladies du poulmon & de la poitrine, pour cicatriser les ulcères. On le donne dans la pulmonie. La dose est depuis demi-gros jusqu'à 2 gros. On l'emploie aussi à l'extérieur, pour consolider les plaies récentes.

BAUME DE PAREIRA BRAVA. (Pharmacie.)

Le nom que porte cette composition, semble annoncer que c'est à la taciné de pareira brava qu'est due son efficacité; on va voir cependant d'après la recette que nous empruntons de M. Baumé, qu'elle contient des substances beaucoup plus actives que le pareira brava.

℥ Huile de scorpions.....	lb §
vin d'Espagne.....	lb j.

On met ces deux liqueurs dans une bassine d'argent, & l'on fait évaporer le vin, jusqu'à ce qu'il ne reste que son extrait; alors on met ce mélange dans un vase de grès ou de verre, avec

Baume de Copahu.....	§ ij. §
baume de soudre térébenthiné.....	§ tj.
styrax liquide purifié.....	§ j.
baume noir du Pérou.....	§ i.
mutiari d'ammoniaque purifié	
& pulvérisé.....	§ j.
racines de pareira brava pulvérisées.....	§ vj.

On mêle toutes ces substances avec un pilon de

Xxx

bois, & l'on agite le mélange, jusqu'à ce qu'il soit exact; on le conserve dans un pot pour l'usage.

Ce baume est diurétique; il est bon pour la pierre, la gravelle, pour la colique néphrétique; il fortifie les parties génitales: la dose est depuis demi-gros jusqu'à deux gros.

Nous recommandons de faire évaporer le vin dans une bassine d'argent, parce que cela est plus commode que dans tout autre vaisseau; mais il convient d'attendre à achever la composition dans un vaisseau de grès ou de verre à cause du baume de soufre qui seroit décomposé en grande partie par l'argent; on n'est pas exposé à cet inconvénient en employant des vaisseaux sur lesquels le soufre n'a point d'action; ceux de fer par conséquent ne peuvent point servir, & encore moins ceux de cuivre.

Quelques pharmacopées prescrivent de faire bouillir ensemble toutes les substances qui entrent dans la composition de ce baume, jusqu'à ce que le vin soit évaporé; & de passer ensuite ce mélange au travers d'une étoffe avec expression, & d'ajouter alors le baume noir du Lérou. Mais nous croyons que cette manipulation n'est pas bonne; 1°. pendant cette cuisson le baume de Copahu & le styrax liquide perdent toute leur huile essentielle, & le baume de soufre se décompose; 2°. le muriate d'ammoniac se cristallise après s'être dissous dans le vin; il reste sur l'étoffe avec le pareira brava en poudre, & ne peut produire aucun effet dans cette composition; 3°. Enfin le vin ne se trouve pas en assez grande quantité, pour extraire de la racine de pareira brava tout ce qu'elle contient d'efficace; la portion la plus active de cette racine reste sur l'étoffe en pure perte. L'our remédier à tous ces inconvénients, nous croyons qu'il vaut beaucoup mieux préparer ce baume par la méthode que nous venons de donner.

On ne fait plus d'usage du baume de pareira brava, depuis que l'on a renoncé à toutes les espérances qu'on avoit autrefois conçues sur les grandes vertus de la racine qui porte ce nom. Voyez le dictionnaire de médecine.

BAUME DE VIE DE LÉLIEVRE. (Pharmacie.)

Ce baume est trop fameux & trop généralement employé, pour que nous négligions d'en parler. A la vérité on a déjà décrit une composition analogue sous le titre d'*alcool d'aloës avec rhubarbe* à la page 129 de ce volume; mais le procédé que donne M. Baumé & que nous suivrons, diffère de ce qui est exposé à cet article; & d'ailleurs il est bon de retrouver à son rang alphabétique, une préparation dont on fait journellement, quoique presque toujours inconsidérément, un si grand usage. M. Baumé donne les détails suivans sur le baume de vie de Lélievre.

2/ Agaric..... } ad ... 3 ij.
racine de zédoaire.....
fleurs de soufre.....

Aloës fucotrin..... } ad ... 3 j.
thériaque..... }
rhubarbe..... 3 vj.
racines de gentiane..... 3 l.
safran Gâtinois..... 3 ij.
eau de vie..... tb ij.
sucré..... 3 iv.

Coupez l'agaric, la rhubarbe & le safran; concassez les racines de zédoaire, la gentiane & l'aloës; mettez toutes ces substances dans un matras, avec les fleurs de soufre, la thériaque & l'eau-de-vie; faites digérer ce mélange au bain de sable pendant plusieurs jours, en ayant soin de remuer le vaisseau de temps en temps, alors ajoutez-y le sucre; lorsqu'il sera dissous, passez la liqueur avec expression, laissez-la déposer pendant plusieurs jours, & tirez-la à clair. Le sucre qu'on fait entrer dans ce mélange est destiné à corriger la trop grande amertume de l'aloës.

Ce baume est stomachique, vermifuge, légèrement purgatif; la dose est depuis une cuillerée à café jusqu'à trois; les personnes sujettes aux hémorrhoides ne doivent faire usage de ce baume qu'avec beaucoup de modération, parce que l'aloës qui en fait la base est sujet à les exciter. Ce baume convient à l'extérieur, dans les plaies récentes, comme vulnéraire, détersif, & pour empêcher la suppuration.

Dans le temps que j'ai publié cette recette, dit M. Baumé, celui qui passoit pour être l'auteur préparoit le baume de vie comme je viens de le décrire; mais depuis qu'il a vu son secret imprimé, il a jugé à propos d'y faire des changemens considérables, qui, non-seulement le dénatureront, mais en changent pour-sinfi dire les propriétés; lorsqu'on mêle ce baume avec de l'eau, l'alcool s'unit à l'eau, & la substance résineuse de l'aloës & des autres ingrédients se précipite; l'auteur voudroit faire accroître que ce précipité est une matière impure, qui ne doit pas se trouver dans ce baume lorsqu'il est bien fait. On peut répondre à cela que ce baume, jusqu'à l'instant où j'en ai publié la recette, étoit donc mal préparé, puisqu'il se troublait lorsqu'on le mêloit avec de l'eau; mais c'est précisément le contraire; on le préparoit bien dans ce temps-là, & aujourd'hui on le prépare mal. Quoi qu'il en soit voici comme on fait ce baume lorsqu'on veut qu'il ne se trouble point avec l'eau. 1°. On supprime les fleurs de soufre; on fait bouillir dans une suffisante quantité d'eau toutes les autres substances à l'exception du sucre & de l'eau-de-vie; on passe la décoction avec expression, on fait rebouillir le marc dans une suffisante quantité d'eau, on passe de nouveau; on fait bouillir le marc encore une fois ou deux; on mêle toutes les li-

queurs; on les fait évaporer jusqu'à environ trois demi-septiers ou une pinte; alors on ajoute le sucre, & lorsqu'il est dissous on filtre la liqueur au travers d'une chausse de drap, à plusieurs reprises; on met la liqueur dans une bouteille, & on ajoute l'eau-de-vie; on laisse reposet le mélange & on le tire à clair trois ou quatre mois après, ou bien lorsqu'il est suffisamment éclairci. Dans toutes ces ébullitions la substance résineuse des ingrédients se décompose, elle devient hors d'état de pouvoir se dissoudre dans l'eau-de-vie; il ne reste enfin dans le baume que les matières purement extractives; c'est ce qui fait que lorsqu'on le mêle avec de l'eau, il n'en peut troubler la transparence; le mélange reste parfaitement clair & limpide, mais aussi il est visibole que ce baume ainsi préparé est moins bon que lorsqu'il est fait par le procédé que nous avons indiqué en premier lieu.

L'auteur a encore imaginé de déguiser son baume par quelques gouttes d'huile d'olive ou d'amandes douces, qu'il mettoit dans chaque bouteille, comme pour faire accroire que cette matière huileuse est celle des ingrédients, mais on peut être assuré que c'est une huile absolument étrangère à ce baume.

Nous ajouterons à ce qu'a dit M. Baumé, qu'il seroit aisé de varier & de multiplier à l'infini la nature des teintures ou alcools composés, en sorte qu'on seroit un grand nombre de baumes de vie, différens les uns des autres; c'est l'aloes & la rhubarbe qui en sont la base, & avant la préparation due à Lellivre, on en comptoit déjà une foule d'analogues dans les dispensaires & les pharmacopées. Voyez la pharmacopée de Lemery &c.

BAUME DE VINCEGUERE, DE LAITOURE OU DE L'ONDM. (Pharmacie.) C'est un mélange d'huiles essentielles, ou une mixture & non un baume: sa dénomination est impropre, dit M. Baumé; mais nous observerons qu'à cet égard elle ne l'est guère plus que celle de la plupart des autres baumes qui différencient tous plus ou moins les uns des autres; aussi est-ce seulement pour la commodité des lecteurs que nous présentons ici toutes les préparations connues sous le nom de baumes.

24. Huiles essentielles. rectifiées	
de lavande.....	} aa 3 j.
térébenthine.....	
pétrole.....	
genièvre.....	
gerosies.....	
Macis.....	} aa 5 ij.
muscade.....	
benjoin rectifié... 3 6	
Camphre.....	} aa.... 3 j.
sifran pulvérisé.....	
Musc.....	} aa.... 3 6
ambre gris pulvérisé...	

On met toutes les huiles essentielles dans un flacon qui bouche bien, on ajoute les autres substances, on fait digérer ce mélange à la chaleur du soleil pendant trois ou quatre jours, en l'agitant de temps-en-temps, on le laisse déposer & on le conserve sur son marc: on est dans l'usage de ne le donner jamais trouble.

Plusieurs pharmacopées prescrivent de la poudre de crapaud dans la recette de ce baume, mais cette substance animale, outre qu'elle répugne à bien du monde, ne peut communiquer aucune vertu à ce baume, c'est pour cette raison que je la supprime de ce mélange. On croit communément que le crapaud résiste au venin, & qu'il a la propriété de chasser le mauvais air, mais ce sont des vertus que les anciens lui ont attribuées gratuitement.

Le baume de Vinceguere est réputé très-bon pour purifier l'air pestiféré & pour se préserver des maladies contagieuses; on le faire de temps-en-temps, & on en fait brûler un peu dans la chambre qu'on occupe; pris intérieurement il est sudorifique, il est bon dans les fièvres malignes, dans la peste, dans la petite-vérole, la rougeole; mais c'est lorsqu'il convient d'exciter la transpiration, de faire suer & de ranimer. Ce remède est fort chaud. La dose est depuis une goutte jusqu'à huit ou dix, en bols ou imbibé dans un peu de sucre.

BAUME DU COMMANDEUR. (Pharmacie.) Le baume du Commandeur est une teinture composée, ou un alcool chargé de la partie résineuse & odorante de plusieurs substances aromatiques. Cette préparation a été décrite à l'article des alcools composés sous le n°. 10, page 3, second vol. Nous ne ferons qu'ajouter quelques réflexions qu'on trouve dans l'ouvrage de M. Baumé sur les propriétés & les différentes méthodes de préparer ce baume.

Ce baume du Commandeur sert pour l'intérieur & pour l'extérieur. Pris intérieurement, il est vulnérinaire, cordial, stomachique, il excite les règles, il convient dans la petite-vérole & les fièvres malignes, mais c'est lorsqu'il est nécessaire d'augmenter les forces & d'exciter la sueur. La dose est depuis dix gouttes jusqu'à quarante.

Pour l'extérieur il convient dans les plaies nouvelles & simples, qu'il consolide en empêchant la suppuration, & qu'il guérit ordinairement en fort peu de temps.

Les fleurs d'hypericum, & les racines d'angelique, fournissent beaucoup moins de substance dans l'alcool, que les autres drogues. La myrthe, l'oliban & l'aloes sont des gommés résines, qui ne se dissolvent qu'en partie dans l'alcool. Enfin le storax calanite, le benjoin & le baume du Têrou, sont des résines pures qui se dissolvent en entier dans l'alcool. Si l'on mettoit toutes ces matières en même temps, l'alcool se satureroit d'abord des résines & seroit hors d'état de pouvoir agir sur l'hypericum, & sur les autres substances que nous

avons placées à la tête de la formule, & il se dissoudrait une moins grande quantité de gommes résines.

On donne ordinairement le baume du Commandeur, préparé sans ambre gris, à cause de son odeur qui, quoique très-douce, incommoder cependant la plupart de ceux qui en font usage; mais comme les médecins prescrivent quelquefois celui qui en contient, les apothicaires doivent en avoir des deux façons. L'odeur de l'ambre gris n'est pas absolument forte; mais pour satisfaire au préjugé contraire, quelques personnes emploient à sa place le musc, dont l'odeur est beaucoup plus forte & absolument différente.

Lorsqu'on fait entrer dans les teintures composées, des baumes liquides, comme le baume de la Mecque, la térébenthine, &c. on doit toujours les mettre sur la fin, en même-temps que les résines sèches. Il en est de même des huiles essentielles; mais on ajoute ces dernières, lorsque les teintures sont séparées de leur marc.

On peut au lieu d'alcool, employer des eaux spiritueuses composées, pour préparer les teintures composées, comme nous l'avons dit à l'égard des teintures simples.

Il y a des substances végétales, auxquelles il faut ajouter des matières salines, acides ou alcalines, pour extraire ou pour exalter la couleur qu'elles peuvent fournir dans l'alcool, parce que la substance résineuse qu'elles contiennent, se trouve en quelque manière défendue de l'action de l'alcool, par la substance gommeuse. Nous choisissons pour exemple de ces teintures, celle de gomme laque dans laquelle entre en même-temps un alcool déjà chargé des principes d'autres substances.

BAUME HYPNOTIQUE. (*Pharmacie.*) Le baume hypnotique est un mélange d'huiles & de calmans qui doit sa principale efficacité à l'opium. D'après M. Baume on le prépare de la manière suivante.

2℥ Huile épaisse de muscade..... 3 ij.
d'olive..... 3 vj.
De semences de jusquiame.
de pavot blanc. } aa 3 j.
de benjoin seconde... (1)
de camphre.....

On fait liquéfier toutes ces substances, au bain-marie, dans un vaisseau clos, jusqu'à ce que le camphre soit dissous: alors on met dans un mortier de marbre.

Extrait d'opium..... 3 j. ℞

On le délaie avec trois gros environ de vin d'Espagne; on ajoute,

onguent populeum..... 3 j.
moelle de cerf..... 3 iij.
safran..... 3 j. ℞

On mêle d'abord toutes ces substances exactement, & l'on y réunit le premier mélange; on agite le tout jusqu'à ce que le baume soit bien mêlé; on le conserve dans une bouteille de large ouverture, & qu'on bouche bien.

Plusieurs pharmacopées font entrer dans ce baume de l'huile rosat, de l'huile violat & de l'huile nénuphar; mais ces huiles préparées n'ont pas d'autres vertus que l'huile d'olive, par laquelle nous les remplaçons.

Ce baume est calmant; il excite le sommeil, il apaise les douleurs de tête. On en frotte les narines, les tempes, les poignets.

BAUME HYSTÉRIQUE. (*Pharmacie.*) Le baume hystérique est un mélange de consistence d'onguent, fait avec les gommes résines regardées comme antihystériques & l'opium. M. Baume en donne la recette suivante.

2℥ Bitume de Judée..... }
alocs..... } aa... 3 j.
galbanum..... }
labdanum..... }
assa-fœtida..... 3 j.
Castor.... } aa..... 3 ℞.
opium..... }

On ramollit toutes ces substances dans un mortier qu'on a fait un peu chauffer; on délaie ensuite ce mélange avec

Huile essentielle d'absynthe.
de sabine... }
tanaisie... } aa. Gutt. vij.
de pétrole..... }
de jayet..... }
de succin..... } aa. Gutt. x.
essentielle de rhue. }
épaisse de muscade..... 3 ij.

On pile le tout dans un mortier, jusqu'à ce que le mélange soit exact; on le conserve dans une boîte d'étain pour l'usage.

Ce baume est propre pour les vapeurs & pour toutes les maladies hystériques. On le fait flatter, & on en applique sur le nombril. On peut aussi en faire prendre par la bouche, pour exciter les mois aux femmes, pour faire sortir l'arrière-faix. La dose est depuis 12 grains jusqu'à 2 scrupules.

On ne fait presque plus d'usage du baume hystérique.

BAUME NERVAL. (*Pharmacie.*) Le baume neural est une espèce d'onguent liquide composé d'huiles douces, d'huiles volatiles, de camphre & de

(1) De celle qui passe la seconde pendant l'analyse de cette résine.

baume du Pérou, qu'on n'emploie qu'à l'extérieur.
On le prépare de la manière suivante.

℥ Huile de palme..... } aa... 3 ij
épaisse de muscade...
moelle de cerf..... }
de bœuf..... }

Graisse de vipères... } aa..... 3 6
d'ours..... }
de blaireau... }

Huile volatile de lavande.
menthe... } aa..... 3 6
romarin... }
sauge... }
thym... }
gérolles... }

Campbre..... 3 j.
baume du Pérou..... 3 6
alcool..... 3 j.

On fait liquer ensemble l'huile de palme, l'huile de muscade, les moelles & les graisses animales, on les coule dans une bouteille de large ouverture, on ajoute les huiles volatiles & le baume du Pérou, que l'on a fait dissoudre auparavant dans l'alcool, on fait liquer ce mélange au bain-marie, & on le conserve dans une bouteille qui bouche bien.

Ce baume est propre pour fortifier les nerfs, dans la paralysie, l'apoplexie, la léthargie, pour les foulures, pour les dislocations, pour les rhumatismes. On en applique sur les parties malades, & l'on a soin de les froter assez long-temps, pour que le baume pénètre la peau.

BAUME OPPODELDOC. (*Pharmacie.*) La préparation connue sous le nom de baume oppodeldoc, est une teinture très-composée, un alcool chargé des huiles volatiles & de la résine d'un grand nombre de substances végétales. Quoique ce baume soit peu employé aujourd'hui, nous en donnerons la préparation d'après M. Baumé, parce qu'on l'insère encore dans toutes les pharmacopées.

℥ Racines seches de guimauve... }
consoude... } aa... 3 vi
gentiane... }
aristoloche... }
angelique... }

Sommités fleuries de sauge... } aa... 3 ij
fleurs de lavande... }
baies de genievre... }

Castor pulvérisé... } aa... 3 ij
camphre... }

Feuilles récentes de fenicelle... }
pied de lion... } aa 3 ij. 6
piloselle... }
langue de serpent... }
pervenche... }
romarin... 3 j.
Semences de tumin... 3 iv.
alcool rectifié... 3b ij.

On coupe menu ce qui doit l'être, on concasse ce qui est à concasser, on met toutes ces substances dans un matras avec l'alcool, on bouche le vaisseau, on le fait digérer pendant 24 heures sur un bain de sable chaud, ensuite on coule avec expression, & l'on ajoute,

Savon blanc... 3 viij.

On fait digérer de nouveau jusqu'à ce que le savon soit entièrement dissous, on conserve ce baume dans une bouteille qui bouche bien. Quelque temps après que ce baume est fait, une partie du savon se précipite sous la forme d'un coagulum; il convient de l'agiter chaque fois qu'on veut s'en servir, afin de le mêler avec la liqueur spirituelle.

Ce baume est vulnérable, nerval, il convient pour les foulures, les contusions, les dislocations, pour arrêter les progrès de la gangrène, il convient dans les douleurs de rhumatisme, dans la paralysie, il est un excellent résolvant. On en applique chaudement des compresses sur les parties affligées.

On n'en fait plus aujourd'hui que très-peu d'usage.

BAUME TRANQUILLE. (*Pharmacie.*) Le baume tranquille est une huile composée, dont on fait encore un grand usage dans les malades douloureux externes, les contusions, &c. M. Baumé en donne une description très-détaillée; nous l'emprunterons de son ouvrage.

℥ Feuilles de stramonium... }
morelle... } aa 3 iv.
phytolacca... }
bella-dona... }
mandragore... }
nicotianne... }
jussquiame... }
pavot blanc... }
poivre... }
perficaria... 3 j.
Crapauds... N°. v.
huile d'olive... 3b vj.

On nettoie & l'on coupe toutes ces plantes, on les met dans une bassine, avec les crapauds entiers & vivans & l'huile d'olive; on fait cuire ce mélange à petit feu, en les remuant de temps en temps avec une spatule de bois jusqu'à ce que

L'huile devienne d'une belle couleur verte, & que les plantes soient bien amorties & privées des trois quarts de leur humidité, alors on passe avec expression, on laisse déposer l'huile pour la séparer de ses fèces, on la fait chauffer légèrement, & on la verse dans une cruche dans laquelle on a mis les plantes aromatiques récentes suivantes, nettoyées & coupées grossièrement.

Feuilles de romarin.....	} ad. 3 j.
sauge.....	
grande absynthe....	
petite absynthe....	
hysope.....	
thym.....	
matjolaine.....	
coq de jardin.....	
menthe.....	
lavande.....	
furcan.....	}
millepertuis.....	
flours de	

On agite ce mélange avec une spatule, afin de faire baigner les plantes dans l'huile; on bouche la cruche avec du liège: on l'expose au soleil pendant quinze jours, ou au bain-marie pendant 10 à 12 heures. Lorsque l'huile est à demi refroidie, on la passe avec expression; on la laisse déposer pendant plusieurs jours, on la tire par inclination, & on la conserve dans une bouteille qu'on bouche bien.

Ce baume est anodin, calme les douleurs de rhumatisme: il fortifie les nerfs, il tempère les ardeurs de l'inflammation, appliqué sur les parties affligées. On le fait quelquefois entrer dans des lavemens calmans & adoucissans. La dose est depuis demi-once jusqu'à deux onces. Quelques personnes le font prendre intérieurement, on doit alors le faire avec beaucoup de prudence, à cause de la vertu des plantes narcotiques dont il est composé: il vaut mieux, lorsqu'il est nécessaire, avoir recours à des remèdes plus sûrs & mieux connus.

Les plantes qui composent cette huile composée, sont de deux espèces différentes; les unes sont inodores & ne contiennent rien qui soit insensible de se volatiliser au degré de chaleur que l'on emploie pour la faire cuire à l'air libre; les autres sont odorantes, & contiennent beaucoup d'huile volatile, qui se dissiperoit entièrement si on les traitoit de cette manière. Les unes & les autres fournissent dans l'huile beaucoup de principes qui lui donnent une couleur verte plus ou moins foncée.

La plupart des plantes inodores qu'on fait entrer dans cette huile, contiennent, non-seulement une matière résineuse pure, qui se dissout & se combine facilement avec l'huile; elles contiennent encore une grande quantité de gomme résine qui se dissout également dans l'huile, mais qui s'en sépare quelque temps après qu'elle est préparée & se

précipite sous la forme de grumeaux verdâtres & mous, qui donnent à cette huile une apparence cailloteuse; mais ils se liquéfient & se mêlent avec l'huile au moindre degré de chaleur: cette matière se dépose de nouveau quelque temps après qu'elle est rétrécie. Ces phénomènes prouvent que cette matière gommeuse est si bien combinée avec les matières résineuses, qu'elle devient par-là dissoluble dans l'huile; la matière gommeuse n'est point sans vertu, on a intention qu'elle tienne dans cette huile. C'est pour la conserver que nous avons recommandé de faire cuire à petit feu les plantes inodores, & de ne les priver qu'environ des $\frac{1}{2}$ de leur humidité; si on les faisoit trop chauffer & qu'on las desséchât entièrement, comme quelques personnes le recommandent, on feroit non-seulement s'évaporer cette matière gommeuse, mais on détruiroit encore la couleur des substances résineuses, parce qu'alors l'acide de l'huile se développe & agit sur ces matières colorantes de la même manière que l'acide sulfureux gazeux détruit les couleurs. On est d'autant plus en droit de soupçonner que les choses se passent ainsi, que j'ai remarqué que l'acide de l'huile, venant à se développer dans le temps qu'elle rancit, se réduit en vapeurs insensibles qui détruisent la couleur des papiers rouges & bleus, dont on se sert pour couvrir les pots & les bouteilles dans lesquelles on conserve ces mêmes huiles. Lorsque la cuisson des plantes inodores est finie, on passe l'huile, on la sépare de l'eau qui se trouve au fond, & on la fait tiédir pour la verser sur les plantes aromatiques, qu'on fait digérer ensemble dans un vaisseau clos, par ce moyen, on ne perd rien de leurs principes: ces plantes fournissent dans cette huile une nouvelle quantité de matières résineuses qui augmentent sa couleur verte. Mais pour avoir cette huile bien colorée, il faut employer toutes ces plantes dans leur état de fraîcheur; parce que lorsqu'elles sont fanées, elles ne fournissent pas à beaucoup près autant de couleur. Il paroît que cela vient d'une cause à-peu-près semblable à celle dont nous venons de parler.

Dans le temps que les plantes se fanent, elles souffrent une perdition d'humidité & elles éprouvent un mouvement insensible de fermentation, qui concentre & développe leur acide. Ce dernier principe agit sur la couleur des résines, & la détruit de plus en plus, mais en plongeant dans l'eau les tiges de ces plantes qui commencent à se faner, elles reprennent de la vigueur. J'ai remarqué qu'en cet état, elles acquièrent de nouveau la propriété de colorer les huiles comme auparavant, parce qu'apparemment la couleur de la résine se régénère.

Le baume tranquille ne peut avoir toutes les années une couleur verte également foncée, en employant toujours la même quantité de plantes. Cela vient, comme je l'ai fait remarquer en plusieurs endroits, de ce que ces plantes contiennent

moins de résine colorante dans les saisons pluvieuses que dans les années sèches.

Quelques personnes lui donnent la couleur qui lui manque, par l'addition d'une suffisante quantité de verd-de-gris, sans s'embarrasser des qualités vénéneuses qu'ils introduisent dans ce médicament: il est facile d'apercevoir les dangers auxquels on est exposé en faisant usage du baume tranquille coloré par un semblable poison.

Nous pensons qu'on peut retrancher les crapauds de cette composition, ils ne peuvent communiquer que peu ou point de vertu, & ne paroissent propres qu'à inspirer à quelques personnes beaucoup de répugnance pour ce médicament.

BAUME VERD DE METZ OU DE FEUILLET. (*Pharmacie*) Le baume verd de Metz est une espèce d'onguent liquide, qui ne prend point de consistance en raison de la petite quantité d'oxides métalliques, & du peu de chaleur qu'on emploie pour le préparer. M. Baumé en donne la formule suivante.

Verdet ou oxide de cuivre par l'acide acétueux.....	3 ij.
vitriol ou sulfate de zinc.....	3 j.
Huile de lin.....	3 vj.
d'olive.....	3 ij.
de laurier.....	3 j.
térébenthine.....	3 ij.
aloès.....	3 ij.
huile volatile de genièvre.....	3 j.
de giroflées.....	3 j.

On triture ensemble dans un mortier le verdet l'albès & le vitriol, réduits en poudre fine, avec un peu d'huile de lin; lorsque ces poudres sont suffisamment délayées, on ajoute le reste de l'huile de lin, les autres huiles & la térébenthine: on fait chauffer ce mélange légèrement, en posant le mortier sur la cendre chaude; lorsque ce mélange est exact, on le met dans une bouteille, & l'on ajoute les huiles essentielles; on agite la bouteille pour mêler ces huiles, & on conserve ce baume pour l'usage.

Le vitriol blanc est un sel à base métallique, qui ne se dissout point dans l'huile: il se précipite avec la partie gommeuse de l'aloès; qui ne se dissout point non plus; il n'y a que la partie résineuse de cette substance qui reste bien combinée avec ces huiles: le verdet se dissout en grande partie; il communique une belle couleur verte à ce baume. Il n'est d'usage que pour l'extérieur, il est bon pour ronger les mauvais chairs. Il mondifie les plaies & les ulcères; il cicatrise.

BAUME VULNÉRAIRE. (*Pharmacie*) Le baume vulnéraire est une espèce de teinture au vin & à l'eau-de-vie contenant les principes d'un grand

nombre de plantes, & mêlée avec son poids environ de térébenthine. M. Baumé en décrit la préparation de la manière suivante.

Feuilles récentes de grand plantain.....	
plantain long.....	
orpin.....	
bugle.....	
brunelle.....	
grande consoude.....	
sanicle.....	
languedescerpent.....	
véronique.....	3 ij.
absynthe.....	
herbe à Robert.....	
millefeuille.....	
pilelle.....	
Sommités de petite centauree.....	
lierre terrestre.....	
quintefeuille.....	
flours d'hypericum.....	

On hache ou l'on broye toutes ces plantes dans un mortier de marbre avec un pilon de bois, on les met dans un vaisseau avec.

Vin rouge.....	3 viij.
eau-de-vie.....	3 viij.
huile rosat.....	3 ij.

On fait macérer ce mélange dans un vaisseau clos, au bain-marie, pendant deux jours; ensuite on le fait chauffer un peu plus fort, on le passe avec expression, on laisse déposer l'huile, on la décante & l'on ajoute

Térébenthine.....	3 j.
-------------------	------

On fait chauffer de nouveau ce mélange, pour dissoudre seulement la térébenthine; on le conserve dans une bouteille qui bouche bien.

Il entre dans ce baume une grande quantité de plantes inodores, qui contiennent beaucoup de résine & de gomme résine colorante; l'eau-de-vie est très-propre à extraire ces substances & à les transporter dans l'huile. Le baume est long-temps à se dépuré, à cause de la partie spiritueuse de l'eau-de-vie, qui unit en quelque manière l'huile avec le principe aqueux des sucres des plantes: c'est pourquoi il faut attendre que l'huile soit bien déposée avant de la mêler avec la térébenthine, sans quoi ce baume seroit encore plus long-temps à se dépuré. Ce baume est vulnéraire, résoluif, bon pour les foulures, les meurtrissures, pour fortifier les nerfs & donner du ton aux fibres de la peau. On l'applique sur des compresses; on frotte aussi les parties avec la main remplie de ce baume.

BAUMIER. (*Pharmacie*) *Populus balsamifera*, *Tecamahoca foliis crenatis*, Pluck. *Almag.* 80.

C'est un arbre qui croît naturellement dans l'Amérique septentrionale, la Caroline, la Nouvelle Irlande, le Mexique, à Madagascar. Il se naturalise dans nos jardins. Quoique M. Duhamel assure n'avoir jamais vu de grands baumiets, il y en avoit deux assez considérables au jardin botanique de Nancy, âgés de plus de 40 ans; ils sont morts le même hiver, il y a quelques années.

Linnaeus rapporte dans la matière médicale, que le baumier produit la gomme *tacamahaca*; mais M. Jacquin a découvert depuis que cette résine découle du *fagaræ ostandra*. Puisqu'il en est ainsi, nous renverrons l'article de cette gomme-résine au mot TACAMAQUE, pour n'offrir ici que ce qui concerne exclusivement cette espèce de peuplier.

Les bourgeons sont vulnérables & sont préférables en médecine à ceux des autres peupliers. Les Sibériens les font infuser dans de l'alcool, pour s'en servir contre le scorbut, les excroissances vénériennes de l'urètre; ce médicament provoque les urines; son suc résineux est fortement balsamique.

(M. WILLEMET.)

BAURAC. (*Pharmacie.*) Expression des arabiques fort équivoque, par laquelle ils designoient un sel que d'autres ont nommé le nitre, & en général toute substance saline.

BDELLIUM. (*Pharmacie.*) Gomme-résine connue dès la plus haute antiquité. Malgré cela, le végétal qui la produit, n'est pas encore décrit avec vérité. Les anciens avoient une haute vénération & une grande confiance dans les vertus du bdellium, qu'ils employoient fréquemment en médecine. Ils en distinguoient de plusieurs sortes. Le meilleur bdellium doit être tenace, gluant, couleur de fer, tirant sur le noir, ou rougeâtre, à l'imitation de la myrrhe, à laquelle il ressemble encore par l'odeur & le goût; il pétille à la flamme d'une bougie, s'amollit dans la bouche, s'attache aux dents, doit être en petits morceaux, à-peu-près de la grosseur d'un noyau de cerise, raboteux, angulaire, fragile.

Hoffman recommande l'usage du bdellium dans les ulcères du poulmon, le flux immodéré des règles & des hémorrhoides. Il est d'ailleurs fortifiant, atténuant, vulnératoire, émollient, résolutif, pectoral, sudorifique, emménagogue; on le regarde comme un spécifique dans les maladies pituitieuses de poitrine, de la matrice, des reins, de la vessie, contre les fleurs blanches, la stérilité, l'épilepsie hyssérique, le calcul, les goîtes, l'hydropécie.

On le fait prendre en pillules depuis quelques grains jusqu'à un scrupule.

On le fait entrer dans la composition des emplâtres propres à fondre les tumeurs; à mûrir les ab-

cès, à résoudre les glandes engorgées, écroûteuses, à remédier à la foulure des tendons, du périoste, à la carie des os, aux hernies, aux nodosités. Il entre dans les fumigatoires utérins, pour faire sortir le fœtus mort & soulager les autres incommodités de la matrice; la fumigation de bdellium adoucit les douleurs hémorrhoidales. On purifie cette gomme-résine, en la délayant dans le vinaigre. On peut en retirer une huile essentielle par la distillation. Elle fait la base des pillules majeures & mineures de bdellium de l'antique Mesué, des trochisques de bdellium d'Avicenne, de l'onguent de bdellium de la pharmacopée d'Aufbourg. Elle fait encore partie du Mithridate, de l'onguent des apôtres, des trochisques *cyphos*, des emplâtres diabolanum gris, stiptique, diachylon gommé, & de mélior composé, de l'antidote de Mesué.

BECCABUNGA. (*Pharmacie.*) (*Gram.*) ou VERONIQUE AQUATIQUE. *Veronica beccabunga*. *Anagallis aquatica major*. C. B. 252. Plante indigène, aquatique, officinale, pérennelle, de la grande tribu des antiscorbutiques.

Le beccabunga est savoneux, dit M. Vogel, plein de suc, doué d'une vertu astringente & rafraîchissante. Il est excellent pour enlever les obstructions des viscères, la paralysie scorbutique, briser le calcul, exciter les règles, contre la goutte. Il est d'ailleurs diurétique, apéritif, hépatique, discutif. On fait usage principalement de son suc, qu'on boit tous les jours pendant long-temps, à la dose de trois à quatre onces.

Extérieurement le beccabunga est très-bon dans les inflammations, les plaies anciennes & récentes, l'œdème, les ulcères, les hémorrhoides ouvertes, les condylômes, les phlegmons, les érysiplèles.

On mange les jeunes pousses de cette plante en salade, au printemps. C'est une bonne nourriture pour le bétail, à l'exception du cheval.

L'on prépare avec le beccabunga une conserve, une eau distillée, un sirop avec le suc; ses feuilles entrent dans l'eau générale, la décoction antiscorbutique, le vin antiscorbutique & le sirop antiscorbutique, l'herbe entre dans l'eau antiscorbutique; elle est très-utile dans la médecine vétérinaire.

Le beccabunga est également en usage dans la nouvelle Irlande & la Virginie.

(M. WILLEMET.)

BECCABUNGA (Petit.) (*Pharmacie.*) *Veronica anagallis aquatica*. *Anagallis aquatica minor*. C. B. 252. Le petit beccabunga peut remplacer à coup sûr le précédent, parce qu'il contient les mêmes principes. Les observateurs agricoles ont remarqué qu'il étoit nuisible aux moutons.

M. Thunberg a rencontré cette espèce au Japon.

(M. WILLEMET.)

BEC

BEC DE GRUE. (*Pharmacie.*) Le bec de grue est une plante, ainsi nommée à cause de la forme de ses semences réunies qui imitent un bec allongé d'oïseau. Ce genre est connu aujourd'hui sous le nom systématique de géranion, tiré du mot latin *geranium*. (Voyez le mot GÉRANION.)

BECHION. (*Pharmacie.*) Dénomination des Grecs employée par plusieurs anciens pharmacographes, pour désigner le tussilage; on trouve aussi plusieurs préparations médicamenteuses sous le titre de *bechion*.

BÉCHIQUES. (*Pharmacie.*) Les béchiques sont tous les remèdes simples ou composés qui sont employés avec succès dans les maladies de la poitrine. Ce sont sur-tout les médicaments incisifs & expectorans qui portent ce nom. On trouvera tout ce qui est relatif à la nature, à la différence, aux propriétés, aux effets & à l'emploi des béchiques dans le dictionnaire de médecine. Il faut seulement remarquer ici que ce nom donné à des préparations pharmaceutiques, telles que des décoctions, des infusions, des suc épais, des tablettes, des pilules, &c. appartient plus à la thérapeutique & à la matière médicale qu'à la pharmacie, & que c'est au dictionnaire de médecine qu'on doit avoir recours pour prendre toutes les connoissances qui concernent les béchiques.

BECULO, BEGUGUELLA, BELECULO, BEXUGILLO. (*Pharmacie.*) Différentes dénominations données par les écrivains étrangers à l'ipeacacuanha.

BEDEGUAR. (*Pharmacie.*) Le bédégua est une espèce d'excroissance ou de galle, qui croît sur le rosier, & dont on distingue plusieurs espèces, entre autres le bédégua lisse & le bédégua chevelu. Cette excroissance est produite par la piquée de plusieurs espèces d'insectes à quatre ailes, des genres du cynips, du diptolipse. Les larves de ces insectes y vivent plus ou moins long-temps. (Voyez le dictionnaire d'histoire naturelle.) On attribuoit autrefois de grandes propriétés au bédégua; on le faisoit entrer dans plusieurs préparations pharmaceutiques; il y a déjà long-temps qu'on a rejeté toutes ces erreurs. Voyez le mot **BEDEGUAR**, dans le dictionnaire de médecine.

BEHENBLANC. (Petit.) (*Pharmacie.*) *Convolvulus behen*, *Behen album*. Rauv. Itin. 138. Plante vivace, originaire de l'Asie mineure, qui croît aussi spontanément sur le mont Liban; dont la racine est médicinale. Il faut la choisir aromatique, un peu âcre, de la grosseur d'un doigt, ridée, grisée à l'extérieur, blanche en dedans; elle ressemble assez à celle de la pyréthre.

Chimie. Tome II.

Il paroît par l'histoire du behen qu'il n'a pas été connu des anciens Grecs, & que ce sont les arabes qui les premiers en ont enrichi la matière médicale. Ils ont vanté cette racine comme un excellent fortifiant; ils ont assuré qu'elle étoit utile contre le tremblement. Suivant Lemery, la racine de behen blanc sortie, résiste au poison, tue les vers, augmente la semence, apaise les convulsions; la dose est depuis demi-gros jusqu'à un gros: il en fait le double en infusion. Malgré cette énumération de vertus, on fait rarement usage du behen; quelques-uns mêmes en doutent un peu.

(M. WILLEMET.)

BEHEN ROUGE. (*Pharmacie.*) *Statice limonium*. *Limonium maritimum majus*. C. B. 192. Cette espèce croît naturellement sur les marais inondés par la mer dans plusieurs parties de l'Angleterre, de la Virginie, de la nouvelle Ecosse & en Arabie. Elle est vivace; ses racines sont ridées, courbes, épaisses, de couleur rougeâtre à l'intérieur & brunes en dehors, d'une saveur astringente. On croit que la racine de behen rouge est propre pour ranimer les forces, arrêter les hémorrhagies. Geoffroy lui attribue les mêmes vertus qu'au behen blanc.

Le behen rouge entre dans plusieurs compositions arabes, entre autres dans l'électuaire de perles de Mesué, dans celui de musc. Il est employé dans l'Amérique septentrionale, & M. Thunberg l'a trouvé au Japon.

(M. WILLEMET.)

BELA-AYE. (*Pharmacie.*) M. Sonnerat rapporte (dans les mémoires de la société de médecine, année 1779), que les habitants de Madagascar nomment ainsi un arbre qui croît sur les montagnes, à vingt lieues dans l'intérieur des terres. Les naturels du pays en font entrer l'écorce dans une boisson qu'ils préparent avec la canne à sucre, & qu'ils appellent *rock*. Ils l'emploient également comme remède dans les dévoiements.

Cette écorce, dit M. Sonnerat, est un léger astringent & un excellent tonique; l'infusion en est inefficace; mais pour en retirer tout l'avantage que l'on peut en attendre, il faut l'administrer en poudre; après que le malade a été purgé, on lui en donne vingt-quatre grains le matin dans une petite tasse de thé, ou dans une petite quantité de bon vin; mais jamais dans du bouillon; le soir on lui en donne de même vingt-quatre grains. Le malade ne doit manger le matin que deux heures après avoir pris ce remède, & le soir il ne doit le prendre qu'une heure ou deux après avoir soupé. Après sept ou huit jours, il faut augmenter la dose, & en donner trente-six grains le matin seulement, & avec les mêmes précautions jusqu'à parfaite guérison. Alors il ne faut pas en donner le soir.

J'en ai fait prendre, dit M. Sonnerat, avec succès à plusieurs personnes, depuis mon arrivée à Paris. M. Mongez l'a également administré à un

Yyy

prêtre de Sainte-Geneviève qui avoit le dévotement depuis plus de dix-huit mois ; mon épouse doit le rétablissement de sa santé au bel-aye, qui l'aguerie d'un dévotement auquel elle étoit sujette, qui avoit duré depuis six ans, & qui avoit continué après les couches.

Comme on peut facilement se procurer cette substance par la voie de l'Isle de France, comme son usage peut être très-avantageux, sur-tout dans les hôpitaux, nous avons cru devoir en faire mention dans ce dictionnaire, quoiqu'elle soit peu connue, & qu'on ne l'ait pas encore inscrite au nombre des substances officinales.

PELLADONE. (*Pharmacie.*) *Atropa belladonna. Belladonna majoribus foliis & floribus. T. 77.*

L'histoire naturelle & botanique de cette plante indigène, délétère, mérite un article assez étendu. La belladone doit être placée à la tête du catalogue des plantes vénéneuses, soporifiques & dont les effets font toujours à craindre. Aussi M. Crantz, célèbre professeur en médecine à Vienne, en a fait le premier article de la seconde classe des venins stupéfiants de sa *matière médicale & chirurgicale*.

Toutes les parties de cette plante sont suspectes, mais les baies sont la plus délétère ; car nous trouvons dans les auteurs anciens & modernes l'histoire de plusieurs personnes mortes pour en avoir mangé. Marthiolo, Brunfels, Gesner, Lobel, Dodonée, Stalpel, Simon Pauli, Amatus Lusitanus, Weppfer, Schenckius, Albrecht, Zornius, Heucher, Fabri, Mappus, Boerhaave & plusieurs autres, en rapportent divers exemples. Nous avons été témoins à différentes fois, des effets pernicieux des baies de belladone, produits sur des personnes du département de la Meurthe. Quant à la racine, Théophraste prétend qu'un gros pris dans du vin produit un effet très-léger, deux gros en produisent davantage, trois rendent fou pour toute la vie. Calzariani, apothicaire à Venise, n'en faisoit prendre qu'un scrupule, pour détruire l'appétit, tandis que Gesner atteste qu'il en faut deux gros. L'usage & l'emploi de cette racine a eu souvent des suites fâcheuses, suivant le rapport de Hochstetter, par les excès dans les doses. Des vertus narcotiques ont été connues dans tous les pays. Voyez Jean Bauhin, Rai, Tournefort, &c. On l'a souvent substituée à la mandragore. Quand un médecin est appelé à temps, il a plusieurs moyens à opposer aux funestes symptômes occasionnés par la belladone. Nous citerons pour exemple les faits suivans, 1°. M. de Launay d'Hermont, docteur en médecine, à l'Aigle en Normandie, a constaté une observation dans les *Mémoires de l'Académie royale des sciences de Paris*, année 1756, par laquelle il conste que trois personnes ont été guéries avec une boisson abondante de petit-lait, les lavemens laxatifs, & ensuite un minoratif aiguillé d'émétique. 2°. M. de Nobleville, médecin à Orléans, a guéri trois jeunes filles, en leur faisant avan-

ler à chacune un verre de vinaigre. 3°. M. de Saint-Martin du Briouze, docteur en médecine, rapporte dans la *gazette salutaire*, 1763, & dans le *journal de médecine*, tome 18, qu'il remédia efficacement aux mêmes maux, en employant les bains d'eau tiède, l'huile & un lavement purgatif. 4°. M. Boucher, médecin à Lille, a donné une observation dans la *gazette salutaire* 1766, & qui se trouve dans le *journal de médecine*, tome 24, où il détaille la cure de cinq enfans auxquels il fit donner l'émétique, des lavemens purgatifs, une boisson édulcorée avec l'oximel, & une potion alexitéte. 5°. M. Pinard, professeur de botanique à Rouen, a traité le même cas qu'il a guéri avec la méthode précédente. 6°. M. Grunwald, médecin & rédacteur de la *gazette salutaire*, a secouru efficacement à Bouillon, un homme & sa femme empoisonnés avec la racine de belladone, quela femme avoit prise pour une racine potagère, & l'avoit fait bouillir dans la soupe. M. Grundwald leur ordonna l'émétique & des lavemens faits de petit-lait, avec un gobelet de vinaigre dans chaque. 6°. Un avocat de Nancy se promenant dans les bois des environs de cette ville, s'amusa à manger du fruit perfide de la belladone, les symptômes ordinaires se manifestèrent bien vite. Le rédacteur de cet article la dissipa au moyen de l'émétique, d'une potion alexipharmaque acidulée, d'une ample boisson de limonade ; il prit ensuite une médecine. Il s'est senti de cet accident pendant plusieurs années, sa tête ayant été embarrassée de temps à autre, avec une espèce d'aliénation d'esprit, & souvent une forte propension au sommeil.

Quand l'accident est très-récet, le plus court parti est certainement de faire rejeter par le vomissement les parties vénéneuses ; c'est le moyen le plus efficace de prévenir les symptômes dont le sujet est menacé. Lorsqu'ils ont lieu, le vinaigre & les autres acides végétaux sont les secours les plus appropriés, non-seulement aux effets de la belladone, mais encore à ceux du *stramonium*, de la mandragore, de la jusquiame, & de tous les végétaux soporifiques & stupéfiants. C'est une preuve que leur qualité délétère consiste dans une vapeur narcotique, d'une nature gomme-résineuse.

Des tentatives assez heureuses prouvent que les feuilles de la belladone prises en infusion, ont guéri plusieurs cancers invétérés. M. Juncker les employa sur plusieurs personnes atteintes de ce mal ; quelques-unes en tirèrent un grand soulagement, & quelques autres obtinrent une parfaite guérison ; mais c'est particulièrement M. Lambergen, professeur de médecine à Groningue, qui est le véritable apôtre de cette découverte. Elle est consignée dans une thèse qu'il composa en 1755. On y trouve la manière de s'en servir à l'intérieur, & l'histoire d'une cure miraculeuse opérée par ce nouveau remède sur un cancer ulcéré sur guéri en dix-huit mois par son usage. MM. Darlac, Amoureux, Vandenboch, Barrie, Collignon, &c. ont constaté

les mêmes expériences. M. Marteau, médecin à Aumale, rapporte encore dans le journal de médecine, tome 14, une pareille guérison, avec une nouvelle façon de préparer la belladone. C'est une tincture composée, dont M. Crantz a également enrichi sa *maître médicale*.

Notre siècle au reste n'a eu que le mérite de renouveler un remède déjà connu & employé par les anciens, non-seulement à l'extérieur, mais même à l'intérieur. Il y a des passages de Galien, d'Avicenne, & sur-tout de Prosper Alpin, qui prouvent cette assertion. Les Egyptiens, selon cet auteur, l'employoient à titre de rafraîchissant. Bon-tius dit qu'on s'en sert dans les Indes, contre les obstructions du foie & des autres viscères. Dioscoride en a vanté les effets. Mathioli, son commentateur, recommande l'eau distillée de toute la plante, à la dose de deux cuillerées, pour éteindre l'inflammation des viscères. Gesner prétend que le suc de ses baies réduit en consistance de sirop avec un peu de sucre, pris à la quantité d'une petite cuillerée, est excellent pour provoquer le sommeil & arrêter la dysenterie. Un ministre Danois en faisoit prendre l'infusion, également contre la dysenterie. Les baies étoient employées quelquefois par les anciens contre l'hydrophobie.

Les matières médicales vétérinaires disent qu'on peut employer en infusion les feuilles depuis demie-once jusqu'à une once, pour chaque animal. Les feuilles de la belladone appliquées à l'extérieur, sont adoucissantes, résolutive, relâchantes, anodines, calmantes, contre les hémorrhoides, les squirthes, les hernies, les ulcères carcinomateux, les tumeurs & durillons des mammelles, les érépelles, les phlegmons, le feu sacré & autres maladies qui proviennent de chaleur. Les dames italiennes employent l'eau distillée de cette plante comme cosmétique; c'est de-là que vient son nom de *belladonna*.

Il est à observer qu'il n'est presque aucun des auteurs qui conseillent cette plante, qui ne recommande d'apporter beaucoup de précaution dans son usage intérieur & extérieur.

Les peintres en miniature préparent un fort beau verd avec le suc de ses baies.

Il nous reste à dire un mot sur les écrivains qui ont traité de la belladone en particulier. 1°. En 1739, Alberici publica à Halle une dissertation, dans laquelle on trouve plusieurs particularités concernant cette plante. 2°. Gataker, Anglois, donna à Londres, en 1757, une brochure sur les bons effets de ce végétal pris intérieurement. 3°. Brom-feld père, premier chirurgien de S. A. R. la princesse douairière de Galles, & des hôpitaux de Saint-Georges & de Lock, a rédigé en Anglois des observations sur les différentes espèces de *solanum* qui croissent en Angleterre. Cet ouvrage a été traduit en François, en 1761, par M. Brom-

feld fils, docteur en médecine de l'université de Padoue, & membre de la société botanique de Florence. Ce livre fait mention des épreuves faites sur dix malades, par l'auteur même, qui paroît être très-impartial, & dont le résultat démontre en partie le danger de l'usage de cette plante, & avec quelle précaution on doit l'employer; il prétend en outre que les médecins d'Hollande ont fait les mêmes essais, sans en avoir retiré beaucoup d'avantage. 4°. M. Lambergen, professeur en médecine à Groningue, a fait soutenir une thèse sur la belladone, ainsi que nous l'avons déjà annoncé. Il y a encore sur cet objet une autre très-bonne thèse soutenue à Paris, en 1760, par M. Coste, dont la conclusion est: *ergo in cancro usus belladonnae tum internus, tum externus*. Le nombre des monographies sur la belladone est trop considérable, pour en augmenter cette liste, nous la terminerons, en annonçant le traité de MM. Munck, père & fils, médecins Allemands, sur les effets salutaires de la belladone, donnée principalement comme préservatif & moyen curatif de l'hydrophobie causée par la morsure des animaux enragés. L'on y trouve aussi des observations pratiques sur l'usage de la même plante administrée dans la mélancolie, la manie & l'épilepsie. Ce traité a été imprimé à Göttingue, en Allemand, 1785.

L'on trouve dans les pharmacies du Nord, l'extrait de belladone; ses feuilles entrent dans le baume tranquille & l'onguent populeum.

(M. WILLEMET.)

BELLE-DE-NUIT. (Pharmacie.) *Mirabilis Jalapa. Admirabilis Peruviana.* Clus. *hisp.* 287. La belle-de-nuit qu'on élève dans nos jardins, pour leur servir d'ornemens, est trop connue pour s'étendre sur son article. Elle fait partie de notre *maître médicale* indigène, imprimée à Nancy chez la veuve Leclerc, 1778. Sa racine est un excellent purgatif dans l'hydrophobie, la goutte & les maladies arthritiques: elle ne cède que faiblement aux vertus du jalap exotique. Nous en avons préparé un extrait qui, à la dose d'un gros, purge très-doucement.

Elle croît naturellement en Asie, au Pérou & au Japon. Les femmes Japonoises préparent un fard blanc, avec la farine de la graine de belle-de-nuit.

(M. WILLEMET.)

BÉLEMNITE. (Pharmacie.) La bélemnite qu'on nommoit encore *Pierre de lynx*, est un fossile qu'on croit provenir des pointes d'oursin. (Voyez le dictionnaire d'histoire naturelle des vers.) On en conservoit autrefois dans les pharmacies, & on les préparoit de différentes manières. On lui attribuoit de grandes vertus, alexitère, diaphorétique. On a enfin reconnu qu'elle étoit tout au

plus absorbante, & qu'elle ne méritoit aucune préférence sur la plupart des matières calcaires (Voyez le dictionnaire de médecine.)

BELLEVEDERF. (*Pharmacie.*) *Chenopodium Scoparia. Linaria Scoparia.* C. B. 212. Belle plante annuelle, qui croît spontanément au Japon, à la Chine, en Grèce; elle se cultive facilement dans nos jardins.

On dit qu'elle est apéritive, débilitante, déterfiv, atténuante, contre la galle, les démangeaisons, les maladies de la peau, soit qu'on l'emploie intérieurement, soit qu'on l'applique extérieurement. Les Chinois & les Japonais se servent beaucoup de cette plante en médecine.

La belvedere est propre à faire des balais, peut servir à fustiger, à former des buissons agréables & à chauffer, dit-on, les pumaises.

(M. WILLEMET.)

BELLICULES, belliculi (*Pharmacie.*) Quelques médecins & pharmacographes ont nommé ainsi des espèces de coquillages que l'on trouve sur les bords de la mer, qui sont blancs avec des taches jaunes, ou jaunes avec des taches & des stries blanches, mais dont la figure a quelque ressemblance à l'ombilic, aussi ces sortes de coquillages ont-ils été désignés sous le nom d'ombilics marins; quelques-uns les ont aussi nommés, *bellirica marina*. Quoi qu'il en soit les anciens faisoient usage de ces coquillages comme déterfifs, & ils entroient dans plusieurs préparations pharmaceutiques. Nicolas Myreplus les indique dans la formule d'un onguent qu'il recommande, contre les taches, les pustules du visage, &c.

BELLIRIC ou BELLERIC. (*Pharmacie.*) Surtout donné à une espèce des myrobolans. Voyez ce mot.

BELLIS. (*Pharmacie.*) Il y a deux espèces de plantes employées en pharmacie sous le nom de bellis; l'une est le *bellis major, chrisanthemum, leucanthemum* de Linnéus; elle est vulgairement nommée la grande marguerite. Voyez le mot CHRY-SANTHEME. L'autre, est le *bellis minor, bellis perennis* de Linnéus, matière médicale. On la nomme dans les boutiques petite marguerite, paquerotte. On leur attribue les vertus des aromates & des plantes composées en général. L'un & l'autre entre dans les alcools aromatiques composés. (Voyez les mots indiqués.)

BELZOE, BELZUM, BELZUINUM, RENEVIN, BENJUDACUM, &c. (*Pharmacie.*) différentes dénominations employées pour désigner le benjoin.

BEN. (*Pharmacie.*) On donne ce nom à une

espèce de semence que l'on apporte d'Egypte, de Ceylan, & que l'on nomme ordinairement noix de ben. Dioscoride, & d'après lui les anciens grecs, l'ont désigné sous le nom de *balanus myrsifera*, d'autres l'ont appelée *myro balanos*, expression que les latins ont rendue par les mots de *glans unguentaria*. L'line l'a nommée *glans Aegyptia*.

La forme de cette noix est tantôt oblongue, tantôt arrondie, la plus souvent anguleuse; sa coque est ligneuse, blanchâtre, & par rapport au volume, on en distingue deux espèces, l'une qui est la plus estimée, à la grosseur d'une noisette & on la nomme PETIT BEN, *ben parvum*, elle vient d'Egypte; l'autre plus grosse, & toujours d'une forme triangulaire, est nommée *ben magnum*. Elle vient de Ceylan. La différence de forme & de grosseur, que l'on observe dans ces semences, a fait penser au plus grand nombre des écrivains, qu'elles provenoient de deux espèces d'arbres distincts; cependant aujourd'hui quelques-uns commencent à penser que cette différence doit être attribuée au climat, & que ces semences sont fournies par l'espèce d'arbre que Linnéus a désigné sous le nom *Guilandina moringa*. Quoi qu'il en soit, on ne trouve guère dans le commerce que le petit ben, & il faut choisir celui qui est récent, dont la coque est blanchâtre, cotonneuse, se casse facilement, & contient une amande blanche & bien nourrie.

Les anciens employoient le ben pour différentes préparations dont ils faisoient usage non seulement à l'extérieur, mais encore à l'intérieur, comme purgatif, vomitif & fondant; mais aujourd'hui on se borne à retirer du ben une huile que l'on obtient par l'expression de ses amandes.

Pour cela, dit M. Baumé, on prend la quantité qu'on veut de noix de ben les plus récentes, & les plus grosses; on les casse une à une avec un petit marteau, on sépare exactement les coquilles qu'on jette comme inutiles, on met à part les amandes, on les pile dans un mortier de marbre avec un pilon de bois, jusqu'à ce qu'elles soient réduites en pâte; on en forme une boule qu'on met dans un petit sac de toile de coust, on ferme l'ouverture avec une ficelle qu'on serre bien, on met le sac à la presse, & on l'exprime par degré, l'huile sort peu à peu, on la reçoit dans une bouteille; lorsqu'il ne coule plus rien, on délie la presse, on ôte le marc du sac, on le pile de nouveau dans un mortier de marbre, on remet cette poudre dans le même sac, pour l'exprimer encore; on tire ainsi un peu d'huile qu'on met avec la première, ou vide le sac, & on jette comme inutile ce qu'il contient.

Cette huile qui est très-douce, & qui dans les dispensaires est nommée *oleum balantinum*, n'est fluide qu'à une température de douze ou quinze degrés au dessus de la glace; elle se conserve plusieurs années avant de devenir rance; à mesure

qu'elle vieillit elle se fice plus difficilement ; lorsqu'elle coule de la presse, elle est d'autant plus épaisse que la température est plus froide, & on peut dans les temps de gelée l'exprimer sans inconvénients, entre des plaques de fer chauffées dans l'eau bouillante ; mais il ne faut pas lui appliquer un plus grand degré de chaleur, l'huile seroit plus disposée à se rancir.

Les horlogers, ajoute M. Baumé, se servent de l'huile de ben, mais la consistance qu'elle prend en se figeant gêne les mouvemens ; on desiroit donc qu'elle ne fût pas sujette à se figer, & M. Salomé a reconnu que l'huile de ben qui coule la dernière pendant l'expression avoit cette propriété, & n'étoit pas plus sujette à se rancir que la première. Huit livres de ben nouveau fournissent trois livres de coquilles & cinq livres d'amandes. Ces amandes rendent ordinairement une livre treize onces d'huile.

Quoique très-douce, cette huile ne s'emploie qu'à l'extérieur ; elle est, dit-on, détersive, adoucissante, propre pour ôter les démangeaisons de la peau, & pour adoucir ; on la fait entrer dans des pomades adoucissantes, & comme elle se rancit très-difficilement, il conviendrait que les apothicaires s'en servissent pour graisser les marbres & pierres polies sur lesquelles ils étendent les tablettes qui se font par cuisson. Mais cette huile est plus souvent employée par les parfumeurs, pour tirer & conserver l'odeur de certaines fleurs, telles que celles du jasmin, de tubéreuse, &c. Pour cet effet, on prend un vaisseau de verre ou de terre cuite, large en haut, étroit par le bas, on y arrange de petits tamis de crins par étage, ensuite on met des fleurs par lits sur ces tamis & sur ces fleurs, du coton cardé imbibé d'huile de ben. Cette huile se charge ainsi de l'arôme des fleurs. On remet ce même coton sur de nouvelles fleurs, on exprime ensuite fortement du coton l'huile dont il étoit imbibé, & cette huile conserve l'odeur de la fleur.

Comme l'huile de ben est chère, elle est souvent adulterée dans le commerce ou falsifiée ; mais on reconnoitra ces adulterations ou substitutions frauduleuses, par les caractères que nous avons exposés.

(M. WILLEMET.)

BENEDICTA. (*Pharmacie.*) Mesuré a employé cette expression comme un terme générique pour désigner les remèdes solutifs ou purgatifs benins. (*Pharmaca benedicta.*) Mais dans la suite cette dénomination a été adoptée par les arabistes & par un grand nombre de pharmacographes pour désigner différentes compositions médicamenteuses. Ainsi nous trouvons dans le recueil de Nicolas Mirepus plusieurs espèces d'électuaires, qu'il nomme *anodinus benedicta*. Ces électuaires sont com-

posés de scammonée, de turbith, de différentes substances acres, aromatiques, réduites en poudre & incorporées avec suffisante quantité de miel ; leur formule est encore conservée dans un grand nombre de pharmacopées modernes sous les noms d'électuaires benedicta laxative, ou benedicta simple. Martin Ruland, Joseph Duchesne, ont donné le nom d'*aqua benedicta* à une liqueur éméétique qu'ils préparaient en faisant infuser de l'oxide sulfuré vitré d'antimoine dans du vin ; ce nom mystique a été employé pour désigner plusieurs autres compositions ; & nous trouvons encore dans nos pharmacies une formule de pilules souvent employées avec succès, & connues sous le nom de *pilula benedicta*, pilules bénites de Fuller ; nous en donnerons la description à l'article des PILULES.

Les anciens avoient aussi donné le nom de *benedicta* à la plante que nous appelons ordinairement benoite ou *carjophyllata* ; *Cean arbutum*. LINN.

BENJOIN. I. Le benjoin est un suc résine balsamique, une espèce de baume solide, dont on reconnoit deux espèces dans le commerce & qui vient du royaume de Siam, de l'île de Sumatra & de plusieurs autres endroits. On ignoreoit autrefois le végétal qui fournit ce baume ; Linnéus le fils l'a fait connoître sous le nom de *Terminalia benjoin*. Murray observe que l'écorce & le bois de cet arbre répandent en effet une odeur de benjoin, & cependant il doute que ce soit lui qui le fournisse. Plusieurs naturalistes ont pensé qu'il provenoit d'une espèce de laurier, nommé par Linnéus *Saururus benjoinum*, mais plusieurs botanistes modernes ne croient point à cette origine ; il résulte de-là qu'on ne connoit pas avec exactitude la source du benjoin.

Des deux espèces de ce baume, la plus pure est nommée benjoin amygdaloïde, parce qu'il est formé de larmes blanchâtres, demi-transparentes, oblongues, assez semblables à des amandes, qui sont enveloppées par un suc concret rougeâtre ou rouillé, grossi & très-cassant. L'autre espèce est le benjoin commun ; il est d'une couleur plus foncée, plus opaque, plus grossier dans son tissu, & ne présente point les larmes qu'on observe dans le précédent. C'est celui dont on se sert le plus communément en pharmacie & dans tous les arts où l'on emploie ce baume.

Le benjoin se fond par la chaleur ; il ressemble alors à une huile épaisse, il prend une demi-transparence ; il répand une odeur suave qui devient bientôt très-piquante & très-forte lorsqu'on augmente le feu. Alors il s'en dégage une vapeur blanche, qui, recue dans des appareils convenables, se condense & se cristallise en prismes fins, aiguilles, qu'on nomme en pharmacie fleurs de benjoin ; c'est un des procédés les plus généralement employés pour obtenir l'acide benzoïque.

(Voyez l'article de cet acide dans le premier volume.)

Il passe après cet acide, lorsqu'on distille le benjoin, une huile volatile qui n'est pas très-abondante, puis beaucoup de gaz hydrogène carboné. Il reste un charbon qui contient quelques acides de potasse, de sulfate & de muriate d'alcalis & de fer.

Chauffé avec le contact de l'air, le benjoin s'allume & brûle sans répandre une grande flamme, mais en donnant beaucoup de fumée.

L'eau bouillante le fond & en sépare l'acide benzoïque, mais jamais complètement, parce qu'il est enveloppé & défendu par la résine. En ajoutant un alcali & sur-tout de la chaux à l'eau, on enlève tout-à-fait l'acide benzoïque du benjoin, c'est même par ce dernier procédé qu'on extrait aujourd'hui cet acide. On précipite le benzoate calcaire par l'acide muriatique, qui a plus d'affinité avec la chaux que n'en a l'acide benzoïque; celui-ci, comme beaucoup moins dissoluble que le muriate calcaire, se sépare sous la forme de cristaux très-petits. Voyez l'histoire de cet acide dans le premier volume.

Les acides concentrés décomposent le benjoin comme toutes les autres substances végétales, & mettent à nu beaucoup de charbon; voilà pourquoi il noircit par le contact de l'acide sulfurique concentré.

L'alcool dissout le benjoin; l'eau sépare la résine de cette dissolution sous la forme de globules blancs qui prennent l'apparence du lait; voilà pourquoi on nomme cette préparation *lait virginal*; pendant cette précipitation l'acide benzoïque qui est dissoluble dans l'eau comme dans l'alcool, reste en effet dissous dans le mélange de ces deux liquides, & il n'y a que la résine qui soit précipitée.

Le benjoin sert dans les parfums. On ne l'emploie en chimie que pour se procurer l'acide benzoïque; il entre dans plusieurs compositions pharmaceutiques.

BENJOIN. (*Pharmacie.*) *Assa dulcis.* Baume d'une odeur charmante & agréable, qui coule par incision d'un arbre des grandes Indes, que l'on dit être autrefois un laurier; Linnéus pere l'ayant cru d'abord, l'a ensuite attribué au *croton benjoin*, Linnéus fils l'a supposé après découler d'un grand arbrisseau, qu'il a nommé *terminalia benjoin*, que nous nommons *badamier*; mais M. Driander ayant eu des renseignements certains de Samatra sur la véritable existence de cet arbre, en a donné une description anglaise dans le soixante-dix-septième volume des transactions philosophiques de Londres, sous le nom de *stirax benjoin*.

Il faut choisir le benjoin en masse, pur, odo-

rant, inflammable, brillant, pesant, donnant facilement la teinture dans l'esprit-de-vin, en larmes, ayant des taches comme des amandes cassées. Il est apéritif, pectoral, fondant, nervin, résolutif, antiallhumique, antiputride, cosmétique, ophtalmique; on l'ordonne en poudre depuis dix à trente grains dans des potions cordiales, pour exciter la diaphorèse, dans les fièvres malignes putrides, rougeoles, petites-véroles, pour s'opposer à la corruption; on en a vu de très bons effets. On le met aussi dans les potions béchiques, pour débarrasser les poumons. Il a peu d'action à l'extérieur, malgré cela on le fait entrer dans des onguens & emplâtres: si l'on en mâche, il calme les douleurs des dents. On se sert de sa teinture pour déterger les vieux ulcères. Il convient en fumigation pour purifier l'air des appartemens. Les parfumeurs l'emploient dans leurs pastilles & leurs caissettes. Il fait partie de l'encens composé, que l'on brûle dans les cérémonies du culte.

Le benjoin entre dans l'eau générale, l'eau de miel royale, la poudre céphalique odorante de Charas, la poudre fumigatoire, l'esprit balsamique de Schwertin, le baume de Commandeur, le baume apoplectique, les pilules de stix, le baume traumatique, la poudre pour embaumer les corps, les espèces pour cucuphès, l'huile de scorpion composée, l'onguent nervin, l'emplâtre stomachique, l'emplâtre céphalique, la pommade blanche, le mélange maïque, les pastilles odorantes pour fumer.

L'on prépare les fleurs de benjoin par la sublimation, elles entrent dans les tablettes de soufre composées, les pilules balsamiques de Morton, les pilules pectorales de la pharmacopée d'Edimbourg, & dans l'onguent contre la galle.

L'on retire du benjoin un esprit & une huile par la distillation; l'huile entre dans le baume de Leitour, le baume hypnotique. Sa teinture s'opère par l'alcool; quelques gouttes mêlées avec l'eau forment le lait virginal. La pharmacopée d'Ausbourg offre la manière de préparer & de composer les trochisques de benjoin, de Tenzel; la pharmacopée de Virtemberg donne la préparation d'une essence de benjoin simple, & même d'une composée.

(M. WILLEMET.)

BENOITE, GALIOTE ou RECISE. (*Ph.*) *Geum urbanum. Caryophyllata vulgaris.* C. B. 221. Plante européenne, usuelle, péronnelle, indigène, qui se trouve presque toujours dans les haies près des habitations. La racine exhale une odeur douce de gérosie, sur-tout lorsqu'elle est récente. Elle a un goût amer & un peu astringent. On la recommande infusée dans du vin pour la variole, les fièvres malignes & autres. Elle est aphrodisiaque, incisive, apéritive, résolutive, vulnéraire, usée

rine, tonique, céphalique, viscérale, pectorale, vermifuge, carminative, sudorifique, propre dans la suppression des règles, la cachexie, les pâles couleurs, les fleurs blanches, les contusions, les chûtes, la diarrhée, la dysenterie, les catarrhes, les fluxions, les palpitations, le flux céphalique, la jaunisse, les catarres, l'incontinence d'urine, le crachement de sang, les hémorrhagies, pour affermir le ton des fibres de l'estomac. Elle est aussi recommandée en poudre sur les cancers, ainsi qu'en décoction. On la donne en substance depuis demi-gros jusqu'à un gros en décoction & en infusion depuis deux gros jusqu'à demi-once pour chopine d'eau.

Il faut recueillir au printemps la racine de benoite, & la faire sécher avec précaution. Elle entre dans l'eau générale, l'eau épileptique, la thériaque d'Andromaque.

La racine de benoite est encore excellente pour raccommoquer le vin gâté, donne une saveur agréable à la bière, & peut servir à la confection des cuirs.

Rodolphe Boerhaave, membre de la société royale de médecine de Copenhague, a publié un intéressant écrit sur la benoite, présentée comme un nouveau remède, qui peut être substitué non-seulement dans les fièvres intermittentes, mais encore dans plusieurs autres maladies. Cet écrit parut d'abord en Latin, ensuite traduit en Allemand, & a reçu les honneurs de plusieurs éditions latines & allemandes. M. Boerhaave y réunit une foule d'observations satisfaisantes, sur la propriété fébrifuge de la racine de benoite, & plusieurs expériences faites pour constater l'efficacité antiseptique de cette plante, l'une & l'autre, suivant lui, supérieures au quinquina; un morceau de viande humectée avec de l'eau & saupoudrée de quinquina, a contracté de la pourriture avant un autre traité de même avec la benoite; il y a plus, ce dernier, après avoir été séché, a exhalé une odeur de girofle, tandis que celui pour lequel on avoit employé l'écorce du Pérou infectoit par sa fétidité. Selon notre auteur, les propriétés de la benoite sont fébrifuges, fortifiantes, balsamiques, légèrement astringentes, nervines, antispasmodiques, antiseptiques. Il l'a administrée avec les plus grands succès dans les fièvres intermittentes, dans la débilité des forces digestives, dans la diarrhée, les coliques ventrâles, les affections scorbutiques, les spasmodiques & hystériques, les hémorrhagies, le crachement, le pissement de sang, la trop grande abondance des règles, pour réveiller promptement les forces. On la donne en poudre, en électuaire, en décoction, en essence. Une once de cette dernière ou demi-once, suffisent ordinairement pour la guérison des fièvres intermittentes. Cet ouvrage est terminé par les observations de

divers médecins de Copenhague, qui viennent à l'appui des siennes.

L'usage de la racine de benoite est salutaire aux vieillards. Les feuilles de cette plante ne sont pas souvent employées; les actes de Berlin diffuses, qu'appliquées sur les ulcères, elles les mondifient; on a dit aussi qu'en topique sur le poignet avant l'accès, elles guérissent quelquefois les fièvres intermittentes; prises en infusion, elles sont recommandées contre la goutte. Elles sont mangées par une grande partie des animaux.

(M. WILLET.)

BENOITE AQUATIQUE. (Pharmacie.)

Geum rivale. Caryophyllata rivale. Scop. Carn. 369. Cette plante se trouve dans les endroits humides. Ses racines sont cylindriques, rousses, ou brunes, de la grosseur d'une plume d'oie, ont la propriété d'être astringentes, vulnéraires, contre la dysenterie, les fièvres intermittentes, propres aux tanneurs. Elles sont introduites depuis peu dans les pharmacies de Suède.

Cette benoite est aimée du bétail.

(M. WILLET.)

BENOITE DES MONTAGNES. (Pharmacie.)

Geum montanum. Caryophyllata montana. Matth. Diof. 362. Cette espèce croît sur plusieurs hautes montagnes de la France, de la Suisse, d'Autriche, les Pyrénées. Elle possède les mêmes vertus & propriétés que la précédente.

(M. WILLET.)

BENOITE DE VIRGINIE. (Pharmacie.)

Geum Virginianum. Caryophyllata Virginiana. Herm. Par. rad. Cette espèce appartient à l'Amérique septentrionale. On la cultive au jardin du roi; elle est bisannuelle; sa racine est très-vantée par les Indiens, comme anthelminthique. Linné en a observé de bons effets; elle se donne à petite dose. On la trouve dans les pharmacies de la nouvelle Ecosse & de la Virginie; elle sert dans cette hémisphère contre les fièvres intermittentes; elle est en outre astringente.

(M. WILLET.)

BENZOATES. On nomme *benzotes* les combinaisons salines neutres de l'acide benzoïque avec les bases terreuses, alcalines & métalliques. Ces composés sont encore très-peu connus. MM. Schéele & Lichtenstein qui ont écrit avec beaucoup de soin les propriétés de l'acide benzoïque, n'ont pas fait mention de son union avec les terres, les alcalis & les oxides métalliques. Nous rappellerons ici que l'acide benzoïque est volatil, très-odorant, soluble, plus âcre & aromatique qu'acide, qu'on

l'extrait par la sublimation ou par l'ébullition dans l'eau avec la chaux ; que le benzoate calciné qu'on obtient dans cette dernière opération, est décomposé par l'acide muriatique, qui précipite l'acide benzoïque de sa dissolution en petits cristaux grenus ; que lorsqu'on chauffe fortement l'acide benzoïque, on le décompose, quoique plus difficilement que la plupart des autres acides végétaux ; qu'il donne dans sa décomposition du gaz hydrogène carboné, de l'eau, de l'acide carbonique & du charbon à nud ; qu'il est inflammable à une haute température ; & qu'on le caractérise à cause de cette dernière propriété, par l'épithète d'*acide huileux*, d'*acide aromatique*. On a vu aussi dans le premier volume que l'acide nitrique le dissout, sans en changer la nature, sans faire varier sensiblement la proportion de ses principes, qu'il en est de même de l'acide muriatique oxigéné ; ainsi on peut dire que l'acide benzoïque est une des combinaisons acides végétales, les plus permanentes, les moins décomposables, une de celles dont les principes sont les plus adhérens, & dont l'analyse est conséquemment la plus difficile à faire.

Si tous les acides végétaux sont des espèces de composés ternaires, formés d'hydrogène, de carbone & d'oxigène, si on peut les regarder comme composés de radicaux binaires, hydrogène carboné, ou carbone hydrogéné, uni à des quantités diverses d'oxigène, ils ne diffèrent les uns des autres que par les proportions de ces trois principes primitifs. Ce résultat de toutes les expériences modernes sur les acides végétaux explique, 1°. pourquoi ils se réduisent tous par leur décomposition complète en eau & en acide carbonique, lorsque par les moyens d'analyse divers qui consistent en général à ajouter de l'oxigène à ces acides, on isole le carbone de l'hydrogène ; 2°. pourquoi ils sont presque tous susceptibles d'être convertis les uns dans les autres ; en effet s'ils ne diffèrent entre eux que par les proportions, il suffit de changer ces proportions, pour changer les acides eux-mêmes ; 3°. pourquoi toutes les matières végétales, quelque différentes qu'elles soient, étant toujours composées des mêmes principes primitifs, favoir l'hydrogène, le carbone & l'oxigène, il ne s'agit que de faire varier leur proportion, & le plus souvent de diminuer celle du carbone, & d'augmenter celle de l'oxigène, pour en former diverses espèces d'acides ; 4°. enfin pourquoi la plupart des acides végétaux se décomposent spontanément, ainsi que les sels neutres qu'ils forment avec les diverses bases salissables, à l'aide de la dissolution dans l'eau, & de l'influence du calorique même atmosphérique.

En appliquant ces vérités générales à l'acide benzoïque & à les composés salins, ou aux benzoates, on reconnoît que comme cet acide éprouve plus difficilement la décomposition commune,

que le plus grand nombre des autres acides végétaux, il est nécessaire d'admettre une liaison plus intime entre ses principes, que celle qui existe entre les principes des autres acides. Aussi peut-on prévoir que si l'on parvient à convertir par la suite quelques acides végétaux en acide benzoïque, ce ne sera qu'en fixant l'attraction & l'adhérence de leurs principes ; on est conduit par ces considérations à regarder l'acide benzoïque comme un des composés les plus solides des végétaux, comme un des derniers produits de la végétation ; aussi n'accompagne-t-il en général que des résines & des matières très-avancées dans la marche de la végétation.

Il faut convenir à la vérité que les benzoates n'ont été que très-peu examinés, & que si l'on excepte quelques observations consignées dans le journal de M. Crell, dont il sera question tout-à-l'heure, on n'a encore presque rien fait sur ce genre de sels. L'acide benzoïque n'ayant été connu jusqu'à présent que comme un produit pharmaceutique, employé en médecine sous le nom de *Stear de benjoin*, il n'est pas étonnant qu'il ait peu intéressé les chimistes, & qu'ils ne l'aient pas pris pour sujet de leurs recherches & de leurs méditations. Bergman dans sa dissertation sur les attractions électives, a dit quelques mots sur les benzoates alcalins & terreux. Suivant lui l'acide benzoïque se combine facilement avec les alcalis ; les sels qui en résultent sont cristallisables, mais déliquescents ; il en excepte le benzoate de soude. J'ai remarqué que le benzoate de baryte & le benzoate de chaux n'attirent point l'humidité de l'air.

L'eau de chaux décompose les benzoates de magnésie, d'alumine, & même ceux de potasse & de soude, suivant le même chimiste, mais elle ne décompose pas le benzoate de baryte ; il est vrai que la baryte pure ne sépare pas la chaux d'avec l'acide benzoïque.

M. Tromsdorf est le seul qui ait communiqué dans les annales de Crell une suite d'expériences sur les combinaisons de l'acide benzoïque avec les métaux. C'est d'après lui que nous indiquerons quelques-unes des propriétés des benzoates. Ces sels sont tous jusqu'ici des composés artificiels ; on n'en a encore trouvé aucun dans la nature ; il est vraisemblable cependant qu'il existe quelques benzoates alcalins ou terreux dans les végétaux ou les animaux, puisqu'on y trouve l'acide benzoïque. Si cet acide existe dans l'urine des enfans, comme l'a indiqué Schéele, & dans celle de quelques quadrupèdes, il paroît qu'on pourra l'y rencontrer combiné avec la soude & la chaux. On n'a trouvé dans aucun minéral connu, de traces de l'acide benzoïque & de benzoate ; il semble cependant que les bitumes pourroient présenter cet acide. Les benzoates,

benzoates; si l'on en excepte celui de chaux; ne sont encore employés ni dans la médecine, ni dans la chimie, ni dans les arts.

BENZOATE D'ALUMINE. L'acide benzoïque s'unit facilement à l'alumine très-divisée, & telle qu'elle est lorsqu'on vient de la précipiter du sulfate acide d'alumine par les alcalis, & lorsqu'elle est suspendue dans l'eau. Le benzoate d'alumine qui résulte de cette combinaison, n'a été examiné encore par aucun chimiste. J'ai observé, 1°. que ce sel cristallisoit par l'évaporation spontanée en petites aiguilles qui imitent les dendrites ou les borborisations; 2°. qu'il est très-dissoluble & d'une saveur amère & acerbe; 3°. qu'il est déliquescent; 4°. qu'il est décomposable au feu; 5°. que les acides sulfurique, nitrique, muriatique, fluorique, oxalique, citrique, tartraux & acétux, le décomposent & précipitent de sa dissolution dans l'eau l'acide benzoïque sous la forme de petits grains & de petites aiguilles cristallines.

Le benzoate d'alumine n'est d'aucun usage.

BENZOATE D'AMMONIAQUE. L'acide benzoïque se combine très-aisément avec l'ammoniaque, & décompose même le carbonate d'ammoniaque, en dégageant l'acide carbonique sous la forme de gaz. Le benzoate d'ammoniaque n'a point été examiné par les chimistes. Voici ce que j'ai reconnu des propriétés de ce sel. Il est très-dissoluble dans l'eau, plus dans l'eau chaude que dans la froide; il cristallise par le refroidissement; ses cristaux sont des petits grains ou des concrétions comme herboriées sur les parois des vases de verre; il est très-volatil & très-décomposable par la chaleur; tous les acides, excepté le boracique, le carbonique & ceux qui approchent de leur faiblesse, le décomposent en séparant l'acide benzoïque sous forme cristalline; la chaux, la baryte, la potasse, la soude, la magnésie & plusieurs oxides métalliques en dégagent l'ammoniaque, comme de tous les autres sels ammoniacaux.

Le benzoate ammoniacal n'est encore d'aucun usage; il pourroit être employé comme un fondant & un béchique incisif, très-actif dans les maladies du poulmon.

BENZOATE D'ANTIMOINE. J'emprunterai l'historique des benzoates métalliques, des expériences qu'a publiées, il y a quelques années, dans les annales de Crell, M. Tromsdorf sur la combinaison de l'acide benzoïque avec différents métaux. Suivant lui, l'acide benzoïque dissout facilement l'oxide d'antimoine; le sel qui en résulte reste sec à l'air, & se décompose au feu. Les sulfures & l'acide muriatique le décomposent séparément.

L'oxide d'antimoine employé par M. Troms-

Chimie, Tome II.

dorf, est celui qu'il a obtenu par la détonation de ce métal avec le nitre.

Il ne paroît pas que l'acide benzoïque ait de l'action sur l'antimoine. On ne connoît pas le rapport d'attraction qui existe entre l'oxide d'antimoine & l'acide benzoïque, par rapport aux autres acides. Il paroît cependant que l'acide benzoïque ne décompose pas les sels antimoniaux, & que le benzoate d'antimoine est décomposé par la plupart des acides. Ce sel n'est d'aucun usage.

BENZOATE D'ARGENT. L'acide benzoïque n'a nulle action sur l'argent; mais il se combine bien avec l'oxide de ce métal précipité de sa dissolution nitrique par le carbonate de soude: le benzoate d'argent est très-dissoluble dans l'eau, & très-peu dans l'alcool. Il est inaltérable à l'air; il se colore en brun par le contact des rayons du soleil; l'action du feu en sépare l'acide par la sublimation, & l'argent paroît alors dans son état métallique.

L'acide benzoïque décompose le nitrate d'argent; mais il paroît que c'est moins par une attraction plus forte pour cet oxide métallique, que n'en a l'acide nitrique, que par son action réductrice, ou par la tendance qu'il a, à lui enlever l'oxygène, & à le rapprocher de l'état métallique.

BENZOATE D'ARSENIC. L'arsenic n'éprouve aucune altération par l'acide benzoïque, & ne se dissout point dans cet acide; mais l'oxide blanc d'arsenic, précipité de sa dissolution par le carbonate de soude, se dissout facilement dans l'acide benzoïque. Cette combinaison produit un sel qui se cristallise en plumes longues & très-ménues. Ce sel se dissout dans l'eau chaude, & se cristallise par le refroidissement, comme le plus grand nombre des autres benzoates. Suivant M. Tromsdorf, il n'est point décomposé par les alcalis purs, ni par les carbonates alcalins; le soufre le décompose; il se sublime à un feu modéré, & se décompose à un feu violent. Le benzoate d'arsenic n'est d'aucun usage.

BENZOATE DE BARYTE. L'acide benzoïque dissout la baryte, & forme avec elle terre un sel neutre, qui cristallise assez bien, qui reste permanent à l'air, sans en attirer l'humidité, & qui n'est décomposable que par le feu & les acides plus puissans que lui. Aucun chimiste n'a encore examiné ce sel neutre.

BENZOATE DE BISMUTH. Le bismuth n'est point attaqué par l'acide benzoïque; mais son oxide se dissout assez facilement dans cet acide. Cette dissolution évaporée produit des cristaux blancs en forme de prismes fins, ou d'aiguilles inaltérables à l'air, qui se dissolvent dans l'eau, & très-faiblement dans l'alcool. Ce sel est décomposé par les acides sulfurique & muriatique; le feu en évapore & en altère l'acide. Voilà ce que dit M. Troms-

Zzz

dorf du benzoate de bismuth, aucun autre chimiste n'en a fait mention.

BENZOATE DE CHAUX. L'acide benzoïque se combine très-promptement & très-facilement avec la chaux; cette terre le sépare même complètement d'avec les sucs résineux auxquels cet acide est uni dans les baumes, tels que le benjoin, le storax, le liquidambar, le baume de tolu, &c. celui du l'érou. (Voyez le mot ACIDE BENZOÏQUE dans le premier volume.) Le benzoate calcaire est très-dissoluble dans l'eau; il se dissout beaucoup plus abondamment dans l'eau chaude que dans la froide; aussi cristallise-t-il facilement & promptement par le refroidissement de sa dissolution chaude bien chargée; on ne connoît pas la forme de ce sel cristallisé; il prend souvent celle de dendrites. La dissolution de baryte versée dans celle du benzoate de chaux se décompose & précipite la chaux. Les acides sulfurique, nitrique, muriatique &c. beaucoup d'autres, décomposent le benzoate calcaire, & précipitent de sa dissolution concentrée l'acide benzoïque sous forme de poussière blanche & cristalline; c'est de l'acide muriatique qu'on se sert ordinairement pour opérer cette précipitation.

Le benzoate calcaire, préparé immédiatement par l'action de la chaux sur le benjoin, retient une portion de résine, qui le colore en jaune, & qui donne une teinte rougeâtre à l'acide benzoïque qu'on en précipite par l'acide muriatique. Pour avoir ce sel bien pur & bien blanc, il faut dissoudre dans de l'eau avec suffisante quantité de chaux, de l'acide benzoïque purifié.

Le benzoate de chaux n'est encore employé que pour obtenir l'acide benzoïque. (Voyez le premier vol. & le mot BENZOATE.)

BENZOATE DE COBALT. M. Tromsdorf assure que le cobalt précipité de sa dissolution nitrique par le carbonate de soude, est faiblement attaqué par l'acide benzoïque, avec lequel il forme des cristaux en lames, qui sont décomposés par la potasse. Ce sel est un des moins connus de tous les benzoates.

BENZOATE DE CUIVRE. Aucun chimiste n'a connu ni décrit encore l'action réciproque du cuivre & de l'acide benzoïque. Suivant M. Tromsdorf, cet acide se combine bien avec l'oxide de cuivre précipité de sa dissolution nitrique par le carbonate de soude, il forme avec cet oxide des petits cristaux d'un verd foncé qui se dissolvent difficilement dans l'eau, & se point du-tout dans l'alcool. Les alcalis, & les carbonates de chaux & de baryte décomposent le benzoate de cuivre. Lorsqu'on expose ce sel au feu, l'acide s'évapore & l'oxide reste. On n'emploie encore à rien le benzoate de cuivre.

BENZOATE D'ÉTAIN. D'après les expériences de M. Tromsdorf, l'étain ni son oxide ne se dissolvent dans l'acide benzoïque; mais si l'on verse une dissolution de benzoate de potasse dans la dissolution nitro-muriatique d'étain, il se précipite du benzoate d'étain, qui se dissout dans l'eau à l'aide de la chaleur, qui est inattaquable par l'alcool, & qui se décompose par le feu. Ces détails sont bien loin de suffire pour faire connoître les propriétés du benzoate d'étain.

BENZOATE DE FER. Le fer est sans doute susceptible d'être attaqué par l'acide benzoïque dissous dans l'eau; M. Tromsdorf n'a point parlé de cette action. Suivant lui, l'oxide de fer se dissout facilement dans l'acide benzoïque. Les cristaux de benzoate de fer sont jaunâtres, d'une saveur douce; ils se dessèchent, se dissipent à l'air, & se dissolvent dans l'eau & dans l'alcool. L'acide gallique colore en noir cette dissolution, & l'acide prussique en bleu. Les alcalis purs & les carbonates de chaux & de baryte décomposent le benzoate de fer; le feu en dégage l'acide. L'oxide de fer, que M. Tromsdorf a soumis à cette expérience, avoit été précipité de la dissolution nitrique de ce métal, par le carbonate de soude. Le benzoate de fer n'a encore été employé à aucun usage; il pourroit présenter des propriétés médicales utiles.

BENZOATE DE MAGNÉSIE. L'acide benzoïque est susceptible de dissoudre facilement la magnésie; il n'a paru que le benzoate magnésien étoit cristallisable quoique deliquescent, & que cette terre obéissoit dans son union avec l'acide benzoïque, aux mêmes attractions que dans sa combinaison avec les autres acides. Au reste, on n'a point encore convenablement examiné les propriétés de ce sel, dont aucun chimiste n'a parlé & qui n'est d'aucun usage.

BENZOATE DE MANGANÈSE. M. Tromsdorf, n'a point examiné l'action réciproque du manganèse & de l'acide benzoïque, mais il a déterminé celle de l'oxide de ce métal. Suivant lui, l'oxide blanc de manganèse se dissout facilement dans l'acide benzoïque; les petits cristaux écailleux que cette dissolution fournit par l'évaporation, se dissolvent aisément dans l'eau, & difficilement dans l'alcool; les alcalis purs, & les carbonates de chaux & de baryte en précipitent l'oxide métallique; les cristaux de benzoate de manganèse sont inaltérables à l'air. On ne connoît pas les attractions de cet oxide avec l'acide benzoïque, relativement à celles des autres oxides métalliques pour le même acide.

BENZOATE DE MERCURE. Il n'y a aucune action entre le mercure & l'acide benzoïque; mais l'oxide de mercure précipité de sa dissolution

nérique par le carbonate de potasse, se dissout bien dans l'acide benzoïque; le benzoate de mercure forme une poudre blanche & sèche, sur laquelle l'air n'a point d'action; ce sel pulvérulent est dissous en petite quantité par l'alcool, & point du tout dans l'eau. La chaux en précipite en jaune l'oxide de mercure. Les acides sulfurique & muriatique, ainsi que le soufre, décomposent ce benzoate mercuriel; une chaleur douce le sublime tout entier, & un grand feu le décompose. On ne fait aucun usage du benzoate de mercure.

BENZOATE DE MOLYBDÈNE. On ne connaît point du tout le benzoate de molybdène; M. Tromsdorf n'a point parlé de cette combinaison.

BENZOATE DE NICKEL. Il en est de même du benzoate de nickel.

BENZOATE D'OR. D'après M. Tromsdorf l'acide benzoïque ne se combine avec l'or que lorsque ce métal est à l'état d'oxide. La dissolution de benzoate d'or donne des cristaux irréguliers qui se dissolvent difficilement dans l'eau, & qui sont inattaquables par l'alcool. Ce sel paraît être inaltérable à l'air; lorsqu'on l'expose à l'action du feu, l'acide benzoïque s'évapore, & on obtient par cette opération, l'or dans son état métallique. Le benzoate d'or n'est d'aucun usage.

BENZOATE DE PLATINE. L'oxide de platine se combine en petite partie avec l'acide benzoïque. Les cristaux jaunâtres qu'on obtient de cette combinaison résistent à l'air, se dissolvent difficilement dans l'eau, point du tout dans l'alcool exposés à l'action du feu, ils laissent pour résidu une poudre jaune. On n'emploie point le benzoate de platine; peut-être pourroit-il servir à faire réduire & fondre ce métal réfractaire.

BENZOATE DE PLOMB. Il paroît, d'après ce que dit M. Tromsdorf, que le plomb se dissout un peu dans l'acide benzoïque; les cristaux de benzoate de plomb font d'un blanc éclatant, ils se dissolvent dans l'eau & dans l'alcool. Les acides sulfurique & muriatique lui enlèvent & en précipitent le plomb. Ces cristaux sont inaltérables à l'air; le feu en dégage l'acide benzoïque. On ne fait aucun usage de ce sel.

BENZOATE DE POTASSE. La combinaison de l'acide benzoïque avec la potasse, se fait promptement & facilement. Le benzoate de potasse qui en résulte n'a encore été que peu examiné. Il cristallise sans doute très-régulièrement: car en laissant refroidir une dissolution de benzoate de potasse dans l'eau chaude, on obtient un dépôt pulvérulent en apparence mais composé d'une grande quantité de petites aiguilles très-ferrées les unes contre les autres, & les gouttes de cette dissolution

qui restent sur les parois des vases de verre, y offrent bientôt des horborisations, des dendrites, qui annoncent la même cristallifabilité. La dissolution de benzoate de potasse est décomposée par la plupart des acides, qui en précipitent l'acide benzoïque sous la forme de poussière. La baryte & la chaux paroissent avoir plus d'affinité avec l'acide benzoïque que n'en a la potasse, puisqu'elles l'enlèvent à ces alcalis suivant Lieberman. Au reste, il s'en faut de beaucoup, que les propriétés du benzoate de potasse aient été convenablement examinées: ce sel n'est encore d'aucun usage.

BENZOATE DE SOUDE. L'acide benzoïque se combine aussi-bien avec la soude qu'avec la potasse. Le benzoate de soude qui résulte de cette combinaison, est très-dissoluble & cristallisable; il ressemble par ses décompositions connues au benzoate de potasse; il en diffère surtout en ce que ses cristaux ne sont pas deliquescents, suivant Lieberman. Ce sel n'est pas encore connu.

BENZOATE DE TUNGSTÈNE. Aucun chimiste n'a encore indiqué les propriétés de cette combinaison. (Voyez l'UNGSTÈNE.)

BENZOATE DE ZINC. Le zinc comme très-susceptible de décomposer l'eau, pourroit être dissoluble dans l'acide benzoïque liquide; mais on n'a point examiné l'action réciproque de ces corps. Suivant M. Tromsdorf, l'oxide de zinc précipité de sa dissolution nérique par le carbonate de potasse, se dissout facilement dans l'acide benzoïque. Cette dissolution donne des cristaux en horborisations qui se décomposent à l'air, se dissolvent dans l'eau & dans l'alcool. Les alcalis purs, & les carbonates de chaux & de baryte décomposent ce sel, le feu en évapore l'acide: Ce sel n'est d'aucun usage.

BENZIQUE. (Acide.) Acide benzoïque est le nom qu'on donne dans la nomenclature méthodique, adoptée par les chimistes Français depuis 1788, au sel acide concret qu'on retire du benjoin & des autres gommés. Il étoit autrefois nommé, *fleurs de benjoin, sel de benjoin, sel volatil de benjoin*. On en a fait l'histoire dans le premier volume de ce dictionnaire, page 42. Comme cet article avoit été rédigé par M. Morveau plusieurs années avant l'établissement de la nouvelle nomenclature, il le nommoit alors acide benzonique, & les sels neutres qu'il formoit devoient alors être nommés benzones. (Voyez le mot BENZOATES.)

BENZONIQUE. (Acide.) C'étoit le nom que donnoit M. Morveau à l'acide benzoïque, avant la nouvelle nomenclature.

BERBELICE. (Pharmacie.) Cette expression que l'on trouve dans l'ouvrage de Nicolas Myre-

sur, sur la composition des remèdes, y est employée pour désigner l'espèce de plante que nous nommons tussilage, & Leon Fuich remarque avec assez de vraisemblance, que cette expression paroit être une corruption du mot grec *berchion*, qui avoit été employé pour désigner cette plante.

BERBERIS. (*Pharmacie.*) Dénomination arabe généralement adoptée par les pharmaciens & les botanistes, pour désigner un arbrisseau épineux décrit par Galien, sous le nom d'*oxyacanthe*, que l'on nomme vulgairement épine-vinette, vinetier; *Berberis vulgaris* de Linnéus. Cet arbrisseau, qui croit naturellement sur les montagnes du département de la Côte-d'Or, & dans beaucoup d'autres endroits de la France & de l'Europe, porte un petit fruit charnu d'une belle couleur rouge, qui contient un pépin oblong, dur & ligneux; ces fruits, qui sont d'une saveur acide, sont disposés sur une grappe, & mûrissent pendant l'automne. Le bois & sur-tout les racines sont d'une belle couleur jaune, & ont une saveur amère & astringente. Leur décoction dans l'eau donne une belle teinture jaune, amère, qui devient noire par l'addition du sulfate de fer. L'infusion des graines ou pépins est visqueuse, rougeâtre & l'addition d'une solution de sulfate de fer y produit sur-le-champ un précipité épais, noirâtre. Les baies qui sont acides fournissent par la trituration & l'expression un suc légèrement visqueux, qui s'éclaircit par le repos, & prend une belle couleur rouge, brillante; il est d'une saveur très-acide, & le sulfate de fer en rend la couleur légèrement brune & verdâtre.

Toutes les parties de cette plante ont été autrefois fort recommandées pour l'usage médical; les fruits dans leur état de maturité, ainsi que leur suc, étoient prescrits comme rafraîchissants, anti-puétrides, alexi-pharmiques & astringents, surtout celles des racines, étoient regardées comme un purgatif; on employoit la décoction en gargarisme contre les aphtes, on la conseilloit également contre les diarrhées, les écoulemens muqueux de l'utérus, le crachement de sang; les feuilles étoient recommandées comme astringent léger, enfin les graines desséchées étoient regardées comme un roburant & astringent puissant, & elles entrent dans quelques poudres & électuaires dont les anciens nous ont laissé les formules; aussi trouvons-nous dans les anciens pharmacopées qu'on préparoit avec le suc de berberis un rob, un sirop, qu'on en formoit des trochisques, des tablettes, qu'on en conservoient le suc, enfin qu'on en retiroit un sel, dont Simon Pauli (*quadrupartit. botan.*) & Hoffmann (*dans la pharmacopée de Schröder*) nous ont conservé la formule; nous la rapportons, parce qu'elle pourroit engager quelques chimistes à examiner la nature de ce sel & fournir quelques vues nouvelles pour la connoissance des acides végétaux.

Prenez deux livres de suc de berberis & deux onces

de suc de limons, faites digérer pendant deux jours au bain de sable, filtrez pour séparer les parties muqueuses, & faites évaporer le suc à une très-douce chaleur jusqu'à la réduction à moitié; alors mettez le vaisseau dans un endroit frais, & après quelques jours vous trouverez, aux parois du vase un sel cristallisé, que l'on obtient en décantant la liqueur; on peut aussi faire une nouvelle évaporation du suc & obtenir une seconde cristallisation du sel.

Ce sel, que les écrivains disent être fort agréable par son acidité, étoit fort recommandé dans les porions, les tiânes, contre les fièvres inflammatoires & putrides. Bergius pense que l'on ne devroit pas négliger l'usage médical du bois de berberis à cause de son astringence particulière, & de sa faveur astringente; cependant cette plante est aujourd'hui peu employée en pharmacie; on prépare seulement un sirop avec le suc de son fruit. Dans les pays où cet arbrisseau croit abondamment, comme dans le département de la Côte-d'Or, on confit ses fruits pour l'agrément des tables, on fait avec les racines, & sur-tout avec leur écorce jaune, une teinture solide pour les laines, & les ébénistes en emploient les racines pour quelques ouvrages.

BERCE ou FAUSSE BRANCURSINE.

(*Pharmacie.*) *Heracleum sphondylium*, *Spondylium*, *Matth. H. 77*. Plante bisannuelle, ombellifère, indigène à toute l'Europe, commune dans les prairies & les lieux humides.

On dit qu'elle est incisive, apéritive, laxative, paragonique, propre aux maladies du foie, à l'épilepsie, aux suffocations de la matrice, aux maladies du cerveau. Vogel prétend que la berce n'est point emolliente ni propre à la pique polonoise, ainsi que plusieurs auteurs l'avoient assuré. Le suc de cette plante aspiré par le nez fait couler la pituite lorsque l'on est enrhumé. Les habitants du Kamtschatka se lavent les cheveux avec ce suc exprimé au printemps pour se garantir de la vermine, & trouvent que ce remède est le seul qui leur réussisse; les fleurs sont vantées pour guérir les ecchymoses des oreilles; les femences sont pénétrantes, stomachiques, antispasmodiques, diurétiques, céphaliques, elles conviennent à la jaunisse & pour exciter les règles aux femmes. La décoction de la racine est laxative, soulage les personnes sujettes aux vapeurs, guérit l'orthopnée. La racine appliquée en cataplasme dissipe les callosités.

Les anciens mettoient la berce au nombre des cinq plantes émollientes; c'est la brancursine des Allemands: elle donne une belle couleur verte à l'eau-de-vie. Elle est comestible en Russie, en Pologne, en Sibirie & dans le Kamtschatka. Les Polonois & les Lithuaniens font avec ses feuilles & sa semence une boisson qui tient lieu de bière aux pauvres gens. La berce est de la plus grande ressource pour les Kam-

chadales : il en metten dans tous leurs mets, en font de l'eau-de-vie par la distillation, & ne peuvent fe passer de cette plante dans leurs cérémonies religieufes. Mais nous croyons que c'est à la berce de Sibérie (*heracium Sibericum*) qu'il faut attribuer ces dernières propriétés économiques & alimentaires.

Les feuilles de la berce offrent une nourriture agréable aux lapins, aux lièvres & à tout le bétail. Cartheufer a fait fouteuir une thèse fur cette plante.

(M. WILLEMET.)

BERCE A FEUILLES LARGES. (*Pharmacie.*) *Heracleum lancces, Panacea heracleum.* Dod. *Pempt.* 307. Cette efpece fe trouve fur les monts Apennins. Philippe Miller prétend qu'elle eft mife dans les pharmacopées au rang des plantes médicinales, que l'on s'en fert peu en Angleterre, & fon commentateur François lui attribue les vertus que l'on a attribuées à la berce commune.

(M. WILLEMET.)

BEREDRIAS. (*Pharmacie.*) Surnom donné à une compofition que décrit Aëtius. *Tetrabibl.* IV, *fermon.* 4, & qu'il nomme xero-myron, c'est-à-dire, ougeut fec, comme l'interprète fon traducteur.

BERGAMOTTE. (*Pharmacie.*) La bergamotte eft une efpece de citron ou d'orange, dont l'odeur eft très-lorte & la faveur très-âcre. L'huile volatile & l'eau aromatique de l'écorce fraîche de ce fruit étoient autrefois fort employées pour les parfums. La plupart des amateurs de parfums ne l'eftiment plus aujourd'hui; on n'en fait prefque point d'ufage en pharmacie; on y fubftitue l'écorce d'orange ou de citron. Cependant beaucoup de difpenfaires préfcrivent de tirer l'eau aromatique & l'huile volatile des fleurs & des écorces de cet arbre; ils en préfcrivent une conferve, un firop, une pommade; ils le font entrer dans l'eau générale, les gouttes amères, l'efprit carminatif, l'efprit aromatique huileux, & dans un grand nombre d'autres compofés pharmaceutiques. Les fleurs & les fruits de bergamotte ont les mêmes vertus que les fleurs & les fruits du citron & de l'orange.

BERLE ou ACHE D'EAU. (*Pharmacie.*) *Sium latifolium, Sium.* Rivin. pent. 78. Plante ombellifère, vivace, indigène, aquatique, antifeorbutique, apéritive, emmenagogue, diurétique, fébrifuge, antiephrétique, débilitative, incifive, tonique, contre l'hydropifie, la cachexie, le chloroïs, la dyfentérie, les maladies chroniques dans lefquelles il faut rétablir le reflort des parties folides & la fluidité des liquides, pour hâter les règles & l'accouchement, expulfer les calculs des reins. A l'extérieur, la berle eft réfolu-

tive, contre les phlegmons, les éréfipelles, les tumeurs, l'oedème, les écrouelles, les taches du vifage. Les racines ont plus d'activité que les feuilles.

Les feuilles jaunes & tendres peuvent fe manger en falade. Elles font dangereufes aux vaches & aux veaux, principalement pendant l'arrière-faifon. La racine eft délétère à l'homme & anti-épidémique aux oifeaux. L'on prépare une eau diftillée avec la plante verte.

La berle entre dans l'eau antifeorbutique de la pharmacopée de Paris.

Les deux efpeces fuivantes font douées des mêmes propriétés que la berle précédente.

BERLE A FEUILLES ÉTROITES. *Sium angustifolium, Berula.* Cod. Paris. p. XX.

BERLE. (petite) *Sium nodiflorum, Sium minus.* Rivin. pent. 78.

(M. WILLEMET.)

BERLE AROMATIQUE, SISON AMOMUM, ou FAUX AMOME. (*Pharmacie.*) *Sium aromaticum, Lamark.* Ses femences font brunes, d'un goût aromatique, & ont l'odeur de l'amome en grappe des boutiques; les racines ainfi que les femences font diurétiques, carminatives ou propres à difloudre les matières vifqueufes & plumeufes dans lefquelles l'air fe trouvant embarrasfe fe raréfie & caufe des diftentions douloureufes dans l'eftomac & dans les inteflins. Ainfi elles font très-propres pour guérir les coliques ventueufes, elles excitent & provoquent les mois, & font contraires aux maladies de la rate.

Les graines de cette berle font mifes au nombre des quatre femences chaudes mineures; elles entrent dans la compofition de la thériaque de Venife; l'on peut en retirer une huile effentielle & une eau diftillée.

(M. WILLEMET.)

BERNICARIUM NITRUM ou BERENICARIUM. (*Pharm.*) Aécé, Nicolas Myrepius, préfcrivent dans plufieurs de leurs formules d'employer un fel qu'il nomme *nitrum bernicarium*. Galien en fait aufli mention, & il paroît que ce fel étoit ainfi diftingué, parce qu'on le tiroit de Bérénice, ville des Troglodytes; mais étoit-ce bien le fel qu'on a nommé par la fuite nître ou nitrate de potaffe? Nous pouvons en douter, car Actuarius, dans fon livre VI, fait mention d'une efpece de nître, qui eft, dit-il, mol, brûlé, & que l'on nomme *beronicon*, circonstance qui peut faire croire que ce fel défigné par les anciens étoit plutôt une efpece de foute ou de potaffe.

BERS. (*Pharmacie.*) On a décrit fous ce nom une efpece d'efleuaire narcotique ftimulant, dont les Egyptiens, fuivant quelques voyageurs, font

usage par partie de plaisir, pour se procurer une forte d'ivresse, de délire gai & momentané. Prosper Alpin, qui avoit demeuré quelque temps en Egypte, confirme cette assertion; & dans le livre IV de la médecine des Egyptiens, il rapporte la formule de cet électuaire : on la trouve aussi dans beaucoup d'autres pharmacographes.

Cet électuaire est composé de

Semences de jus-	} de chacun 5 gros.
cuiaime blanche.	
poivre blanc.....	} 1 gros & demi.
opium très-pur.....	
safran.....	1 gros 18 grains.

Euphorbe.....	} de chacun 18 grains.
imperatoria.....	
nard indien.....	
miel choisi.....	5 onces 2 gros.

Mélez le tout selon l'art. Quelques pharmacographes observant que cet électuaire est fort liquide à cause de la quantité de miel, ont conseillé d'en diminuer la dose; d'autres pour remplir le même objet, ont conseillé de faire cuire lentement le miel, ce qui évapore la partie aqueuse & donne plus de solidité à la composition : enfin le plus grand nombre s'accorde à conseiller de retrancher l'euphorbe à cause de son acreté. Au reste cette préparation n'est point employée dans la pratique de la médecine, & on trouve dans les plus anciens pharmacographes un grand nombre de formules analogues, dans lesquelles ils combinioient l'opium avec les stimulans les plus acres & les aromatiques les plus chauds, telle est sur-tout cette préparation fameuse si longtemps décrite dans nos dispensaires sous le nom de philonium. Voyez ce mot.

BERYTION. (*Pharmacie.*) Nom donné à un remède ophtalmique, ou collyre employé par Berytion contre le larmoyement. On trouve aussi dans Galien, sous cette même dénomination, la description d'une paffille utile contre les dysenteries.

BES ou BESSIS. (*Pharmacie.*) Dénominations employées dans les anciens pharmacographes, pour désigner un poids de huit onces. Voyez POIDS ET MESURES.

BESANUM ou BESASA. (*Pharmacie.*) Suivant Oribase & Paul d'Egine, les Sytiens appelloient ainsi cette espèce de plante que les habitans de Cappadoce ont nommée *moly*, que d'autres ont appelée *zarmala* ou *harmala*, & qui fut plus généralement connue sous le nom de *rhue sauvage*. Paul d'Egine, livre 7, décrit une espèce d'électuaire qu'il nomme *dia-besasa*.

BESTO. (*Pharmacie.*) Dénomination employée

par quelques anciens médecins & pharmacographes, pour désigner l'espèce de plante que l'on a nommée *saxif-age*; & c'est sans doute d'après cette dénomination, que l'on trouve dans Aëtius un antidote décrit sous le titre de *befiana antidotus* ou *bistoma*.

BETEI. (*Pharmacie.*) *Piper betel*, herbe. Tab. Plante grimpante & rampante comme le lierre; elle croit naturellement aux Indes orientales. Sa feuille rarefie la pituite du cerveau, fortifie l'estomac & affermit les gencives. Les Indiens la mêlent avec l'arêque, le cardamome, les giroflées & autres ingrédients. Ils mâchent continuellement cette composition, pour se procurer une haleine douce & agréable. C'est ce qu'on appelle *betel* des Indiens, dont les voyageurs font si souvent mention dans leurs descriptions.

(M. WILLEMET.)

BETOINE. (*Pharmacie.*) *Betonica officinalis*. *Betonica purpurea*, C. B. 235. Plante européenne, officinale, pérennelle, commune dans les friches & les prairies.

Elle est céphalique, diurétique, utérine, vulnéraire, détersive, cordiale, stomachique, viscérale, fébrifuge, anodine, antiscorbutique, peccorale, alexitère, acoustique, résout doucement les embarras qui se sont formés dans les viscères, guérit la jaunisse, provoque les règles, les lochies, soulage les gouteux; contre l'engourdissement, les eruptions occasionnées par les acides, la consomption. Ses feuilles qu'il faut faire sécher avec précaution, réduites en poudre, sont un excellent sternutatoire, même pour les chevaux, introduites dans les narines, y demeurant l'espace d'un quart-d'heure, sont salutaires dans la chassie séreuse, sur-tout récente, cuites dans le lait; c'est l'antidote des vaches malades, pour avoir brouillé des plantes délétères des marais. Les feuilles de betoine réduites en poudre, entrent dans les emplâtres & topiques pour les plaies de la tête.

La betoine plant aux brebis, & les fleurs aux abeilles. Les feuilles, les fleurs & les sommets sont d'usage en médecine. L'on en prend en guise de thé, & l'on en fume comme le tabac; l'on en retire une eau distillée; l'on en prépare un sirop simple, un sirop composé selon la pharmacopée de Lemer, une conserve, un extrait, un emplâtre & un céra.

La racine de betoine purge par haut & par bas, effet bien différent des feuilles & des fleurs de cette plante; ce qui prouve que les diverses parties d'un même individu, peuvent avoir des vertus différentes, suivant la nature des sucs qu'elles contiennent, & la différence d'organisation; si on l'emploie, c'est à petite dose.

Les feuilles de betoine entrent dans l'eau vulnéraire, l'eau générale, l'eau impériale, le sirop d'armoise composé, le sirop de scotch composé

du dispensaire de Paris, la poudre diarrhodon de Nicolas de Salerne, la poudre contre la rage, la poudre sternutatoire, le baume polychreste de Bauderon, le grand emplâtre lumineux, l'emplâtre *gratia dei*, l'onguent martial, l'onguent mondificatif d'ache.

Les fleurs entrent dans la poudre de Guttère des anciens.

Antoine Musa, médecin d'Auguste, a composé un traité uniquement consacré à la bétoine (ses autres principaux monographies sont Eysel & Camerarius.

(M. WILLEMET.)

BETTE ou POIRÉE. (*Pharmacie.*) *Beta vulgaris*. Plante potagère, bisannuelle, qui croît naturellement sur les rivages maritimes de l'Europe australe, & qui se cultive aisément dans les jardins. M. Thunberg l'a trouvée au Japon. Elle offre trois variétés à racines dures & cylindriques, savoir 1°. la bette blanche, 2°. la bette blonde à carde, 3°. la bette rouge. La même plante donne encore quatre autres variétés à grosses racines rapiformes, qui sont : 1°. la betterave rouge; 2°. la betterave jaune; 3°. la betterave blanche; 4°. la betterave champêtre, ou la tachine de disette de M. l'abbé Commerell.

Les bettes, indépendamment de leurs qualités nourissantes & alimentaires, sont réputées en médecine comme émollientes, adoucissantes, relâchantes, digestives, apéritives, tafiaissantes, délayantes, humectantes, céphaliques, fébrifuges, errhines; contre les inflammations, les éruptions, le feu sacré, la furie, la céphalalgie, la teigne, les excoriations, les ulcérations; propres à purifier le sang, à adoucir les douleurs occasionnées par les panaris, à panser les vésicatoires, & à alimenter le bétail.

On dir que les racines ont la propriété d'effacer les lentilles & les taches farineuses de la peau; l'on peut s'en servir encore contre l'alopecie, l'odontalgie, les hémorroides; pulvérisées elles sont sternutatoires; on en retire du suc.

Les bettes sont connues & en usage dans l'Amérique septentrionale; elles servent encore à fabriquer des suppositoires.

M. l'abbé Commerell a publié un mémoire sur la betterave champêtre ou racine de disette, relativement à son utilité économique, dans lequel il ose assurer que cette plante est inconnue des botanistes. Comment peut-on faire de pareilles assertions sur la fin du dix-huitième siècle?

M. Buchon a fait imprimer une dissertation sur la betterave & la poirée, leurs espèces, variétés, cultures, usages, propriétés; c'est ce que nous possédons de mieux sur ces plantes.

Les feuilles de la bette sont comptées au nombre de cinq plantes émollientes. Elles entrent dans

la décoction émolliente pour les lavemens, du dispensaire de Paris.

(M. WILLEMET.)

BEURRE. Le beurre est une espèce d'huile concrète qui se sépare du lait, & que l'on croit passer immédiatement de l'état d'huile végétale contenue dans les aliments à l'état émulsif qui constitue le lait. On en fera l'histoire complète à l'article du LAIT. Nous nous contenterons de faire observer dans celui-ci, que le beurre n'est pas tout entier contenu dans le lait, que l'huile qui le forme & qui fait partie intégrante de cette liqueur animale éprouve une altération à mesure qu'elle s'en sépare, & qu'elle en occupe la surface sous la forme de crème; qu'elle absorbe l'oxygène atmosphérique, que c'est pour cela que le contact de l'air est nécessaire à sa formation; que celle-ci ne consiste pas dans une simple séparation. Ce point de doctrine d'accord avec toutes les découvertes modernes sur l'oxygène, sera prouvé par tous les faits qui en dépendent, & qui peuvent l'appuyer, à l'article du lait.

Il est presque inutile d'ajouter ici, que le beurre diffère par sa quantité, sa consistance, sa saveur, sa couleur, son odeur, & par toutes les propriétés, suivant les diverses espèces de lait d'où on le retire, mais même suivant l'état des animaux, leurs aliments, leur âge. (Voyez le mot LAIT.)

Comme le beurre a des propriétés très-connues & des caractères très-sensibles dans sa consistance onctueuse & grasse, son aspect, sa fusibilité, &c. on a comparé beaucoup de substances naturelles ou artificielles à cette substance, & on en a très-improprement désignées par le nom de beurre. Voyez les mots suivants.

BEURRE. (*Pharmacie.*) Le beurre est assez employé en pharmacie. On l'applique seul sur les blessures, les brûlures, &c. quoique sa qualité onctueuse, inviscante, adoucissante, n'ait quelquefois. On le dit maturatif. Il entre dans plusieurs onguents, & spécialement dans ceux de tuthie, d'arhanita, l'onguent brun, ou de la mère, &c. (Voyez le mot LAIT, *Pharmacie.*)

BEURRE d'ANTIMOINE. On a nommé beurre d'antimoine le muriate d'antimoine sublimé que l'on obtient en distillant le muriate de mercure corrodé avec l'antimoine. Ce nom a été donné à ce produit, parce qu'il se fige & se cristallise en refroidissant en une masse d'un gris blanc, d'un coup d'œil gras & onctueux, & parce qu'il se fond à une douce chaleur. Ce composé est très-âcre & très-caustique. Voyez pour sa préparation, ses propriétés & ses usages, l'article ANTIMOINE. Il est inutile de dire que ce produit diffère en tout du beurre, & que ce n'est que par son aspect & sa fusibilité qu'il a quelques analogies avec cette matière animale.

BEURRE D'ANTIMOINE. (*Pharmacie.*) Le beurre d'antimoine est un des caustiques les plus utiles & les plus employés pour détruire promptement les virus introduits sous la peau dans la morsure des animaux enragés, &c. *Voyez* le mot **ANTIMOINE.** (*Pharmacie.*) Et le mot **MURIATE SUREIMÉ D'ANTIMOINE.** (*Pharmacie.*)

BEURRE D'ARSENIC. Le beurre d'arsenic est le produit de la décomposition du muriate de mercure corrodé par l'arsenic, & non pas par l'oxide d'arsenic, comme l'ont dit quelques chimistes, en particulier M. Baumé dans sa chimie expérimentale & raisonnée. Ce produit ne se fige ou ne se cristallise que difficilement; il est d'une très-grande acreté; on l'a proposé en chimie pour l'analyse des eaux minérales sulfureuses. *Voyez* le mot **ARSENIC.**

BEURRE DE BISMUTH. En distillant le muriate de mercure corrodé avec le bismuth, ce sel est décomposé, l'oxygène abandonne le mercure & se porte sur le bismuth; celui-ci une fois oxidé, s'unit à l'acide muriatique, & ce muriate de bismuth se sublime en une masse grise, fusible, volatile, concrescible, qu'on nomme improprement beurre de bismuth. *Voyez* pour ses propriétés le mot **BISMUTH.**

BEURRE DE CACAO. La fève du cacao grillée & exprimée, ou bouillie dans l'eau, donne une huile concrète, grasse, douce, fusible à une douce chaleur, d'une consistance plus forte que celle du suif & du beurre, & qui ressemble cependant au beurre par plusieurs de ses propriétés; c'est pour cela qu'on lui a donné le nom de beurre de cacao. *Voyez* les mots **CACAO**, **CHOCOLAT**, **HUILES FIXES.**

BEURRE DE CACAO. (*Pharmacie.*) Le beurre de cacao est fort employé en pharmacie; il sert souvent d'excipient pour des pilules; on en forme des suppositoires que l'on aiguise avec différents remèdes, ou que l'on souponde de différentes substances. *Voyez* le mot **CACAO**, *Pharmacie.*

BEURRE DE CIRE. On a nommé beurre de cire, le produit huileux distillé de la cire, parce que ce produit est beaucoup moins solide que la cire. *Voyez* le mot **CIRE.**

BEURRE DE COCO. Le coco, ce fruit si précieux par tous les produits utiles qu'il donne, fournit aussi une huile concrète, analogue au beurre, que les habitants du pays où il croît, emploient comme le beurre, & qui en a plusieurs des propriétés. *Voyez* le mot **COCO.**

BEURRE DE MUSCADE. On retire de la muscade légèrement grillée réduite en poudre & soumi-

se à la presse, une huile concrète, jaunâtre, d'une très-forte & très-bonne odeur, qui est un composé d'huile fixe solide, & d'une certaine quantité d'huile volatile odorante & résineuse. *Voyez* pour les propriétés de cette huile mixte, le mot **MUSCADI.**

BEURRE D'ÉTAIN. En distillant le muriate de mercure corrodé avec l'étain, l'oxygène abandonne le mercure, se porte sur l'étain, le brûle & le rend susceptible de s'unir à l'acide muriatique. Il résulte de cette combinaison qui s'opère dans le moment où elle a lieu une température très-élevée, deux espèces de muriate d'étain; l'un est le muriate suroxygéné d'étain, très-volatile, fumant à l'air, qu'on nommoit dans l'ancienne nomenclature *liqueur fimaeste de Libavius*; l'autre est le muriate d'étain simple, plus fixe, solide, cristallisable, non fumant, qui reste au-dessus du mercure réduit ou de l'amalgame, dans la cornue. Le mot beurre d'étain ayant été appliqué à ces deux espèces de muriates, on avoit distingué la première par le nom de beurre d'étain liquide ou volatil, & la seconde par celui de beurre d'étain solide ou fixe. *Voyez* l'article **ÉTAIN**, où les propriétés de ces sels sont exposées en détail.

BEURRE DE ZINC. Le zinc décompose le muriate de mercure corrodé, comme le font la plupart des métaux blancs. Il résulte de l'union de l'acide muriatique avec l'oxide de zinc un sel volatil concrescible, qui se sublime dans le récipient. *Voyez* les mots **MURIATE** & **ZINC.**

BEZEC ou **ALBEZEC.** (*Pharmacie.*) Expression des écrivains arabes pour désigner le corail rouge; cependant Manard remarque que dans Avicenne, ces expressions sont employées pour désigner une espèce d'anagallis à fleurs rouges.

BEZOARD. **B. ORIENTAL** & **B. OCCIDENTAL.** **B. FOSSILE.** Le nom de bezoard est donné depuis long-temps à une concrétion, qu'on trouve dans la vésicule ou les intestins des animaux. On l'a distingué en bezoard oriental & bezoard occidental; le premier est plus rare & beaucoup plus prisé que le second.

On a donné par l'analogie de la forme & des couches successives, le nom de bezoard fossile à des concrétions minérales calcaires ou gypseuses, formées par couches comme les calculs animaux.

Après avoir rapporté les détails donnés sur les bezoards animaux par M. Valmont-Bonnet dans son dictionnaire d'histoire naturelle, nous y ajouterons quelques considérations relatives à leur nature chimique trop peu connue, & nous inférerons à la suite, des détails précieux donnés par M. Daubenton sur la comparaison des bezoards orientaux & occidentaux, avec les bezoards fossiles.

Le bézoard, dit M. Valmont-Bomare, est une pierre qui se trouve dans le corps de certains animaux ; & dans différentes parties ; celles que l'ellomac, le canal salivaire, les intestins, la vésicule du fiel, la vessie & les reins. Ces divers bézoards diffèrent par la forme & le volume, il y en a qui ressemblent à une sève, d'autres qui sont ronds ou oblongs, ou ovales, tantôt unis, tantôt raboteux ; &c. Il y en a depuis la grosseur d'un pois jusqu'à celle de la tête d'un adulte ; mais on les connoît mieux en les examinant dans les cabinets des curieux ; que par les descriptions qu'on en pourroit donner.

On distingue principalement les bézoards en orientaux & en occidentaux. Les *orientaux*, du *chère des Indes*, donnent le bézoard oriental ; *Pyrsal* ou *chaméris* ; ou la *chère du Pérou*, donne le bézoard occidental ; les *chères* *amériques* donnent les bézoards ordinaires ; ceux qui viennent d'Égypte, de Perse, des Indes, de la Chine, sont irés d'une espèce de *bois*. Il y a aussi des bézoards du *caiman*, du porc-épic, du singlier, de la tortue, de l'éléphant, du cheval, du mulet, du rhinocéros, de la vache, du chien, du bœuf, du castor, de l'homme, &c.

Les bézoards sont composés de couches concentriques, de couleur verdâtre ou olivâtre, tachetées en blanc dans leur épaisseur. Toutes les lames n'ont pas la même couleur ni la même épaisseur ; elles s'écrasent sous la dent, ont une saveur glutineuse, urineuse, & donnent une légère teinte à la salive. On remarque presque toujours au centre du bézoard quelques corps étrangers, tels que des pailles, du poil, des grains, du bois, des noix, &c. Ces corps ont servi de point d'appui pour la formation des couches. Les bézoards sont quelquefois comme les géodes en les agitant, l'effet produit par le corps dur qui avoit servi de point d'appui, & qui s'est détaché.

On attribue au bézoard, sur-tout à l'oriental, de grandes vertus *sudorifiques*, on croit qu'il chasse le venin hors du corps, ces bézoards sont d'autant plus chers, qu'ils sont plus gros. Comme les vrais bézoards sont rares, on en fait de *factices*, par exemple, la composition *arabique* *de Goa* ou de *Malacca*, sont de faux bézoards. Voici la manière dont on s'y prend.

On fait, avec des *sortes d'essences de mer*, des coquilles d'huîtres broyées sur le porphyre, du *gris* & du *gris* *gris* une pâte que l'on roule en boulettes, de la forme des bézoards, & qui on roule ensuite dans des feuilles d'or. Ceux qui veulent imiter davantage les bézoards, ne le recouvrent point de feuilles d'or. Cette supercherie seroit cependant utile pour imiter les *bezoards* de *bois*, s'il étoit vrai, comme on lit dans une observation des éphémérides, que les *bezoards* de *bois* ont une couleur d'or & un brillant métallique lorsqu'on a enlevé les premières couches.

Chimie, Tome II

On distingue ces bézoards factices, en imprimant une trace sur un morceau de papier fort & de cire, de crasse ou de char, si la trace a vient d'un animal véritable ou olivâtre, c'est la marque que le bézoard est naturel, du moins jusqu'à présent on n'a pu donner cette propriété aux bézoards factices. Les bézoards naturels s'imbibent d'eau & d'alcool, et tombent en fluëques, & sont conservés avec les autres.

De tous les bézoards, celui du porc-épic *dit-porc*, est le plus cher. Il est gris & se vend à l'once & au toucher, d'une couleur verdâtre ou jaunâtre ; on en trouve aussi de rouges & de noirs, on auroit pû se croire le cas qu'on en fait en Hollande. Nous avons vu un de ces bézoards de la grosseur d'un œuf de pigeon ; chez un juif à Amsterdam, qui le vouloit vendre 8000 fr. On les trouve dans les pays & en Portugal, 10 liv. 10 s. (un ducat) par jour, aux gens qui se croient atteints de contagion, & qui s'en préservent en les portant en amulettes, comme on le fait en Allemagne des pierres d'agle ; pour faciliter l'accouchement, de l'aimant en France, pour guérir de la fièvre du pied en Espagne, pour préserver de la gravelle. Voilà un tableau assez frappant de la superstition & des folies de l'imagination humaine.

C'étoit à ces connaissances que l'on étoit borné en histoire naturelle, dans le temps où M. Valmont-Bomare écrivoit cet article ; elles faisoient, & elles font encore préjugément la base de la médecine, relativement à l'usage médical de ces concrétions ; mais d'un côté, les faits chimiques ont ajouté beaucoup d'exactitude à ces notions préliminaires, & de l'autre, la manière médicale s'est débarrassée de toutes les opinions erronées qu'on s'avoit adoptées sur les prétendues vertus des bézoards. Tout ce que les observations modernes ont constaté sur les bézoards, se trouvera compris dans les remarques suivantes.

On ne trouve abondamment de bézoard que dans les animaux qui habitent des climats chauds. Ceux des pays tempérés sont plus rares.

C'est une erreur que dans les entomacs & les insectes des animaux frugivores ou herbivores, que l'on rencontre les bézoards ; les carnivores semblent être exemptés. C'est cependant à tort, comme on va le voir par les numéros suivants, que quelques auteurs en ont conclu que les bézoards pouvoient être toujours regardés comme des résidus de la nourriture végétale.

Si d'après cette idée, on attribue plus de vertus aux bézoards orientaux, en raison des herbes plus exaltées qui croissent dans les montagnes de l'Asie ; & moins d'efficacité aux bézoards occidentaux, à cause des plantes qui ont moins de force, on commet une grande erreur. Il y a en Amérique des plantes aussi aromatiques & aussi

êtres que dans l'Inde, & les bézoards devroient participer à leurs vertus.

4°. Au lieu de regarder les bézoards comme toujours formés par les résidus de nourriture végétale, il faut les considérer comme des concrétions de différentes substances salines déposées & plus ou moins cristallisées dans diverses cavités du corps des animaux, suivant la nature & la quantité des liquides qui les tenoient en dissolution.

5°. Non-seulement les bézoards paroissent différer de nature suivant les espèces d'animaux auxquels ils appartiennent; mais ils sont encore essentiellement différents les uns des autres dans le même animal, suivant les lieux qu'ils occupent. C'est ainsi que dans l'homme, les calculs que l'on trouve dans la vésicule du fiel sont très-différents de ceux qui se forment dans les reins & dans la vessie.

6°. Il faudra donc des analyses très-multipliées & très-variées pour connoître toutes les différences énoncées ici, & à peine a-t-on même commencé à entrevoir la nécessité de ces analyses.

7°. C'est une erreur bien singulière, que celle qui a régné pendant si long-temps parmi les médecins sur la nature identique des divers bézoards, sur le prétendu tartre qui les forme, & sur l'analogie de propriétés qu'ils leur ont attribuées d'après celle qu'ils avoient supposée dans leur composition.

8°. Dans le temps où l'on employoit beaucoup les bézoards orientaux, on avoit prétendu les distinguer d'avec les préparations artificielles, par la propriété de laisser une trace verdâtre sur le papier couvert de céruse ou d'oxide de plomb blanc; mais comment ne concevoir-on pas que rien n'étoit si facile que de communiquer cette propriété aux bézoards artificiels, en les imprégnant d'une matière animale un peu humide? car la propriété de colorer l'oxide de plomb tient manifestement à un peu de gaz hydrogène sulfuré, & l'on fait qu'il s'en forme & qu'il s'en dégage de toutes les substances animales altérées.

9°. La couleur dorée & métallique que l'on donnoit à quelques bézoards factices, & qui étoit plus propre à imiter les bézoards occidentaux que les bézoards orientaux, vient manifestement de ce que plusieurs concrétions calculeuses animales présentent cet aspect brillant. M. Valmont donne, comme on l'a vu, de cette coloration naturelle; mais elle n'est rien moins que problématique pour ceux qui ont étudié cette partie, & qui ont fait des collections de calculs. J'ai vu trois fois des calculs tirés de la vessie du bœuf, & qui avec la grosseur, & à-peu-près la forme des petits pois, étoient d'une couleur jaune dorée comme certaines pyrites; on fait que les dents de plusieurs ruminans offrent un enduit brillant analogue à la couleur que nous indiquons

ici, & on trouvera cet objet discuté plus bas par M. Daubenton, dans une dissertation que nous insérerons dans cet article sur la comparaison des vrais bézoards & des bézoards solides ou minéraux.

10°. La plupart des vrais bézoards sont bien éloignés de jouir des vertus qu'on leur a attribuées, & sous ce point de vue, les bézoards factices sont infiniment plus efficaces que les naturels. En effet, on les compose avec du musc, de l'ambre gris, &c. qu'on incorpore avec des terres calcaires; au moins a-t-on dans ces compositions des matières odorantes, aromatiques, balsamiques, résineuses, gomme-résineuses, qui ont les propriétés qu'on leur connoît dans l'état de pureté.

11°. Parmi la nombreuse suite de bézoards ou de concrétions calculeuses que j'ai recueillies pour en faire l'analyse comparée, & qu'il m'a jusqu'ici été permis d'examiner, j'ai sur-tout été frappé de la différence que ces matières présentent dans l'homme & dans les quadrupèdes. La pierre, ou le calcul de la vessie humaine, est la seule qui soit un acide particulier. (Voyez dans le premier volume l'article de l'ACIDE LITHIQUE. Voyez aussi l'article URINE. Cet acide lithique n'a encore été trouvé que dans la pierre vésicale & l'urine de l'homme. Le calcul biliaire humain est très-différent du calcul vésical; c'est une huile concrète analogue au blanc de baleine. (Voyez BILE.)

12°. Le calcul rénal du cheval est un mélange de phosphate & de carbonate de chaux. (Voyez CALCAIRE.) Le calcul intestinal du même animal, qui acquiert un volume immense, qui pèse quelquefois plusieurs livres, & qui offre un amas considérable de cristaux lenticulaires, arrangés symétriquement & en couches concentriques autour d'un noyau, nous a donné par l'analyse un mélange de phosphate de magnésie & de phosphate d'ammoniaque; il est vrai que nous avons soupçonné, M. Vauquelin & moi, que l'animal d'où ce calcul avoit été tiré, avoit pris de la magnésie; mais nous n'avons pas pu en acquiescer la preuve.

13°. On n'a point du tout examiné, à les concrétions de la glande piniale, si fréquentes dans le cerveau de l'homme & dans celui des quadrupèdes; & les calculs salivaires & amygdalins dans l'homme & quelques quadrupèdes; & les calculs des poumons humains qui forment quelquefois par l'expectoration; & les calculs rénaux & vésicaux d'un grand nombre de quadrupèdes sauvages & domestiques. Par exemple, Morsani a trouvé que les rats contenoient presque toujours des pierres ou graviers dans les reins; mais il n'a pas même songé à connoître la nature de cette espèce de bézoard; & on n'a même pas fait l'analyse du vrai bézoard oriental, & on l'a employé en médecine, comme tant d'autres substances sans le connoître.

14°. La formation des calculs ou des bézoards, doit être examinée jusque dans les végétaux. On

fait que le bambou contient souvent une concrétion nommée *Tubashier* par les Arabes, & que plusieurs Anglois viennent de trouver qu'elle est composée presque entièrement de silice. J'ai vu dans le cabinet de M. Jussieu, mon confrère, des bérzoards sphériques blancs, jaunâtres ou laiteux, polis à leur surface, & semblables à l'ivoire : on dit qu'ils proviennent du coco, personne n'a encore indiqué la nature de ces bérzoards végétaux.

En attendant que tous ces travaux qui promettent d'importantes découvertes soient entrepris & poursuivis avec le zèle & les recherches convenables ; je consignerai ici une dissertation sur les comparaisons des bérzoards animaux avec les bérzoards fossiles, faites par M. Daubenton, à l'occasion d'un granit ou granitèle globuleux de Corse, dont cet habile naturaliste a cherché à expliquer la formation.

On a cru faciliter l'étude de l'histoire naturelle, dit M. Daubenton, en donnant le même nom à des choses de nature différente ; on s'est trompé, c'étoit l'obscurcir au lieu de l'éclaircir, & mettre de la confusion entre des choses qui étoient très-distinctes en elles-mêmes ; c'est ce qu'il est arrivé au nom de bérzoard, soit qu'il vienne du mot *paran* ou *parar*, qui est le nom du bouc en langue persanne ; ou du mot *belzuar*, qui signifie un contre-poison en hébreu ou en chaldéen ; c'est une preuve que le nom de bérzoard n'a d'abord été donné qu'à des concrétions qui se trouvent dans le corps de quelques animaux de l'Asie ; on ne fait pas précisément quels sont ces animaux ; mais il y a lieu de présumer sur les relations des voyageurs, qu'ils ressembleront aux boucs & aux gazelles ; au moins il est certain qu'ils sont du nombre des animaux à pieds fourchus, qui ont des cornes ; le bérzoard qu'ils donnent est au-dehors & au-dedans de couleur d'olive brune, foncée pour l'ordinaire, & même noireâtre ; sa surface est luisante & polie.

Après la découverte de l'Amérique, on a aussi donné le nom de bérzoard à des concrétions qui se sont trouvées dans des animaux de cette partie du monde, & qui ont une couleur blanchâtre dans l'intérieur. Leur surface externe n'est pas aussi luisante & aussi polie que celle des bérzoards orientaux ; elle a une couleur blanchâtre, mêlée de jaune ou de noir, le plus souvent avec des teintes brillantes, qui semblent être dorées ou bronzées ; pour distinguer ces concrétions de celles de l'Asie, on les a nommées bérzoards occidentaux, & alors le bérzoard proprement dit & anciennement connu, a été appelé *bérzoard oriental*.

On a abusé du nom de bérzoard en donnant la dénomination de bérzoard fossile à une concrétion de carbonate de chaux qui n'est que de la craie pure. M. Fourcroy a dissous un de ces prétendus bérzoards dans de l'acide nitrique : il n'en est resté qu'un atome de terre silicee. J'ai vu plusieurs de ces bérzoards qui venoient de Sicile ; ils étoient comme des bérzoards, de forme approchant de

la ronde ou de l'ovale ; les plus gros n'avoient pas plus d'un pouce & demi de diamètre.

Tous les bérzoards sont composés de couches concentriques, formées autour d'un noyau ; mais les concrétions ne peuvent être regardées comme bérzoards, que lorsqu'elles viennent du corps de l'homme ou des animaux ; celles qui appartiennent au règne minéral sont bien différentes ; on peut en prendre une idée par les observations que je vais rapporter ici, & qui sont tirées d'un mémoire que j'ai lu à l'académie des sciences sur un granitèle globuleux.

Cette pierre ne diffère du granitèle des Italiens, qu'en ce qu'elle renferme des globules d'environ 2 pouces de diamètre ; c'est pourquoi je l'appelle granitèle globuleux : la différence qui se trouve entre ces deux pierres n'est pas essentielle, puisque elles sont de même nature ; elle ne vient que des circonstances de leur formation.

Le granitèle simplement dit a été formé par un mélange confus de petits fragmens de quartz & de schorl qui se sont agglutinés, & qui ont pris une forte adhérence les uns avec les autres.

Le granitèle globuleux est aussi un mélange de quartz & de schorl ; mais ces deux substances sont disposées séparément & successivement par couches concentriques, qui forment plusieurs globules placés la plupart les uns contre les autres, & tous réunis en masse, & pour-ainsi-dire cimentés par un mélange confus de schorl & de quartz, qui est du granitèle simple.

Il est certain que les globules du granitèle globuleux n'ont pu se former que dans des cavités du granitèle simple, ou avant la formation de ce granitèle. Je vais prouver que ces globules ne sont pas formés dans des cavités.

Lorsqu'il y a une pierre dans une cavité qui se remplit d'eau chargée de molécules pierreuses, susceptibles de cristallisation, ces molécules s'attachent & se cristallisent contre les parois de la cavité ; la couche extérieure des globules du granitèle globuleux est de quartz, qui est bien susceptible de cristallisation. Si cette couche s'étoit formée contre les parois d'une cavité, sa surface intérieure seroit hérissée de pointes de quartz pyramidal, ce qui n'est pas ; donc cette couche n'est pas formée dans une cavité. Il en est de même des autres couches de quartz & des couches de schorl, dont les globules dont il s'agit sont composés.

Au contraire, si la formation de ces globules a commencé au milieu de l'eau par un noyau, comme les pierres de la vessie, qui sont de vrais bérzoards, il s'est formé plusieurs couches successives de schorl & de quartz autour du noyau des globules du granitèle : cette structure n'a pu se faire que par des mouvemens de rotation en différens sens, qui ont empêché toute cristallisation régulière, parce que celle-ci ne peut se faire que dans un liquide en repos.

Il y a au centre des globules du granité glorieux, un noyau de granité simple, & autour de ce noyau, des couches successives, plus ou moins épaisses de schorl ou de quartz, ou mélangés de ces deux substances, en différentes proportions.

On peut avec beaucoup de vraisemblance se faire une idée des causes qui ont formé ces deux substances, & qu'on les voit disposées par couches autour d'un noyau. L'eau mine des rochers, en détache des fragmens; elle brise ces fragmens en les charriant, & se charge de leurs molécules. Dans cet état on lui donne la dénomination de *sar lapiaistique*, parce qu'elle forme des pierres par le dépôt des molécules qu'elle tendit en suspension. Ces molécules s'insinuent entre les fragmens de pierres qui ont déjà été entraînées au fond de l'eau, s'y attachent & en font des masses de pierres. Si ces fragmens & ces molécules sont de quartz, il y aura des carrières de quartz; si ils sont de schorl, il y aura des carrières de schorl-spathique; si des fragmens de quartz & de schorl ont été en même temps charriés par l'eau, celle-ci formera par le dépôt de ce mélange une carrière de granité. On peut entendre de cette manière la formation des pierres mélangées confusément, composées de plusieurs pierres de natures différentes; mais comment les mélanges réguliers peuvent-ils se faire par couches distinctes, planes ou circulaires?

Pour avoir une opinion vraisemblable sur ces deux objets, il faut considérer que les fragmens de pierre que l'eau entraîne, & les molécules qu'elle dépose, ne sont pas de même nature par-tout & en tout temps. Cette variété dépend de la nature des rivières que la mer entame, & des vents qui dirigent ses flots. Ainsi le flot qui viendra d'une rive formée par du quartz ou du schorl, entrainera des fragmens de l'une ou de l'autre de ces pierres, & sera chargé de leurs molécules. Tant que le même vent durera, le dépôt des eaux de la mer sera le même dans les lieux où l'action de ce vent s'étendra. Mais dès qu'il s'élèvera un autre vent sur les mêmes eaux, leur cours changera, & leur dépôt se fera dans d'autres lieux & sur des dépôts d'autres substances qui l'auront précédé. Ainsi il y aura deux couches de différentes substances pierreuses l'une sur l'autre; elles seront planes, si la direction du flot est en ligne droite; ce qui se fait le plus souvent. Mais lorsque l'eau reçoit différentes impulsions, & que son mouvement est composé, son dépôt ne peut pas former des couches planes; & si, par-tout, s'étant agitées en différens sens, la surface est irrégulière, convexe ou concave en différens endroits. Un mouvement de l'eau circulaire & rapide doit faire rouler, tourner en rond, & même frotter des corps pierreux au fond des rivières ou de la mer. Si l'eau est chargée de molécules pierreuses, elles s'attachent à ces corps solides, & quoiqu'ils soient en mouvement, & formeront tout autour des couches additionnelles. Je

vais donner des preuves évidentes & palpables de cette assertion.

Il suffit de faire voir les incrustations qui se trouvent dans des conduites d'eau, sur le lit de certains ruisseaux, autour des plantes qui ont été submergées par une inondation, &c. Il est certain que ces incrustations se font formées dans l'eau, & même dans l'eau courante. On a aussi la preuve que plus le mouvement de l'eau a de force, plus ces incrustations ont de solidité & de dureté. Les eaux de la montagne de Saint-Estève en Liscane, près de Sienna, déposent des matières calcaires ou gypseuses dont elles sont chargées. On fait tomber ces eaux à assez haut sur un plan, d'où elles rejaillissent de tous côtés contre des modèles de médailles & de bas-reliefs, placés verticalement, qu'elles incrustent; plus elles jaillissent avec force, plus la matière pierreuse qui s'attache aux modèles, a de consistance, & mieux elle prend l'empreinte de ses moules. Sans la force du jaillissement, la matière de l'incrustation resteroit poreuse & friable. Ces faits prouvent que le mouvement de l'eau n'empêche pas qu'il ne se forme des incrustations au milieu de ce fluide.

Reste à prouver comment ces incrustations peuvent prendre des formes rondes ou arrondies, telles qu'on les voit sur les bézards & les conceptions que l'on a appelées *micconies*, *pyrolites*, *dragées de Tivoli*; en effet celles que les Italiens ont nommées *confetti di Tivoli*, ressembloient si bien à des dragées, qu'on les prendroit pour des anis, au premier coup d'œil. Le procédé que suivent les confiseurs pour faire des anis dans un sirop de sucre, peut donner quelque idée de la manière dont se forment les concrétions rondes dans l'eau.

On met au fond d'une bassine des graines d'anis, de coriandre ou de celeri; on verse dessus un sirop de sucre, on agite continuellement ces graines avec une spatule de bois, pour les empêcher de se collecter les unes contre les autres. Le mouvement que la spatule communique au sirop de sucre, suffit pour donner de la rondeur à la concrétion qu'on le sucre forme autour des graines. Le mouvement circulaire de l'eau est encore plus favorable, pour donner une forme arrondie aux concrétions pierreuses qui se forment autour des corps solides que l'eau agit & frotte, comme il arrive dans les lieux où il y a un remous, ou dans l'entraine des mouvements du corps de l'homme & des animaux agités dans leur vallée.

Il se fait un remous, lorsque dans les marées l'eau de la mer s'oppose au courant des fleuves; le point d'embouchure, ou lorsqu'une rivière entre dans une autre. Il y a aussi des remous causés par d'autres obstacles qui détournent le cours de l'eau, tels qu'un angle saillant dans le bord d'une rivière, une île au milieu de ses eaux, une baie dans le rivage de la mer, la rencontre des courans, &c. différentes directions; enfin toutes les circonstances qui contraindent ou qui augmentent le mouve-

ment de l'eau, les détroits de la mer, les arches des ponts ; entre leurs piles, le cours de l'eau est serré, & par conséquent accéléré : au sortir de ce détroit, l'eau se porte de chaque côté, & fait un tournoïement dont le centre est marqué à la surface par une concavité en forme d'entonnoir ou d'ombilic. Les tournoïements qui se font dans la mer, doivent produire de très-grands effets ; ils causent des abîmes ; ils doivent soulever des corps solides, & les soutenir au centre de leur rotation.

Lorsque le noyau d'un globule de granitéle se trouve ainsi soulevé & agité au milieu d'une eau chargée de molécules de schorl ou de quartz, ces molécules s'attachent autour de ce noyau, & forment des couches successives, dont les surfaces doivent être polies par le frottement de l'eau. La substance des couches sera différente, lorsque l'eau leur fournira des molécules d'une autre nature ; ce changement doit arriver nécessairement, toutes les fois que l'eau fonce un nouveau terrain dans l'abîme ou dans les rives qu'elle entame, ou lorsque le vent l'amène d'un rivage dont le terrain est de nature différente. Il résulte de toutes ces causes que les couches des globules de granitéle doivent être concentriques, & varier par la nature de leur substance, & par leur grosseur & leur épaisseur, & de plus la nature & l'épaisseur des couches doivent le correspondre dans les globules qui sont formés en même-temps & en même lieu : on reconnoît aisément tous ces caractères dans les globules du granitéle.

J'ai beaucoup insisté sur leur formation, parce que c'est une opération fréquente dans la nature, & qui produit de grandes masses. Il y a des carrières de pierre calcaire, composée de très-petits globules, il y en a aussi de différentes grosseurs.

Les globules, après avoir été soutenus dans l'eau pendant leur formation au centre d'un mouvement de rotation, s'écartent de ce centre par différentes circonstances ; alors ils tombent nécessairement au fond de la rivière ou de la mer, & entrent dans le dépôt qui s'y trouve, en sont entourés, & s'y incorporent. Si ce dépôt est propre à faire du granitéle, & si les globules sont composés de couches de schorl spatique & de quartz, c'est un granitéle globuleux.

Tous les bezards sont composés de couches concentriques, & plusieurs ont au centre un corps étranger qui est le noyau sur lequel porte leur première couche ; on a trouvé dans les bezards orientaux des marcasites, du talc, des cailloux, du gravier, des pailles, des brins d'herbes, du bois, des semences de plantes ressemblantes à celles des plaiéoles, des noyaux de cerises, de mirabolans, de casse, de tamarins, de l'acacia d'égypte, &c. Ces différentes substances, & principalement les semences de plantes qui sont au centre des bezards orientaux, donnent lieu de croire qu'ils se forment dans l'estomac ou dans les intestins des ani-

maux. Car, s'ils se trouvoient dans la vessie du fiel, dans les reins, dans la vessie ou dans les autres cavités du corps, ils n'auroient pas si souvent pour noyau des substances qui ne peuvent y pénétrer que par des accidens & des hazards fort extraordinaires. Au contraire ces substances entrent aisément avec les aliments dans l'estomac & dans les intestins. J'ai trouvé dans la panse des bœufs que j'ai disséqués, grand nombre de graviers qui auroient pu faire le noyau de plusieurs bezards.

Eontius dit que les bezards orientaux sont dans le ventre des animaux qui les produisent ; il y a de ces animaux dans différentes provinces de la Perse. Kœmpfer s'étant informé de ce que l'on pensoit dans ce pays, au sujet de la partie des animaux dans laquelle le bezard se forme, rapporte que c'est le pylore ou le fond du quatrième estomac ; que si le bezard ne s'y engendre pas, au moins il y séjourne, & y prend de l'accroissement, & que s'il n'est pas bien engagé dans les plis de l'estomac, il passe par le pylore, il suit le conduit intestinal, & il sort avec les excréments ; mais ces faits ne sont pas prouvés. Aucun observateur n'a ouvert un animal portant des bezards, pour savoir précisément quelles parties les renferment. Kœmpfer n'a traité du bezard que sur des récits dont la plupart sont peu vraisemblables.

J'ai fait une observation qui peut donner lieu de présumer que les bezards se forment dans l'estomac ou dans les intestins des animaux. J'ai remarqué sur les dents machelières des ruminans, tels que les bœufs, les bœliers, les bœcs, les buffles, les gazelles, les cerfs, les daims, les chevreaux, &c. une couche de matière noirâtre & luisante, avec des teintes brillantes qui paroissent être dorées & bronzées ; dans les endroits où cette matière a de l'épaisseur, elle recouvre un tarte blanchâtre. J'ai aussi vu, sur plusieurs bezards occidentaux, une couche de matière ressemblante à celle qui revêt les dents machelières des animaux ruminans, elle a les mêmes couleurs & les mêmes teintes brillantes & dorées ; cette matière ne peut venir que des herbes que broient les animaux & qu'ils machent, lorsqu'ils ruminent ; les sucs qu'ils en expriment s'attachent à leurs dents & y forment une sorte de tarte analogue aux sucs concrets des herbes crues, dont ils se nourrissent. On ne peut guère douter que les mêmes sucs qui s'épaississent & se durcissent sur les dents des animaux ruminans, ne s'épaississent & ne se durcissent aussi sur la surface extérieure des couches des bezards qui se trouvent dans leurs estomacs ou dans leurs intestins, puisque les bezards occidentaux sont revêtus d'une manière ressemblante à celle qui revêt les dents, & que le caractère singulier des reflets dorés & bronzés est aussi éclatant sur les bezards que sur les dents. Les bezards orientaux n'ont point de ces reflets, mais leur surface est aussi luisante que celle de la ma-

tière qui recouvre les dents, elle a le même fond de couleur, & leur substance paroît avoir des rapports avec les fucs concrets des herbes; on pourroit soupçonner qu'elle est composée en partie de ces lacs, & en partie d'une matière tarteuse ou pierreuse, colorée par ces fucs concrets & mêlée avec eux: en observant au microscope la matière qui est sur les dents & celle du bézoard oriental, j'ai vu ces parties terreuses ou pierrees.

Le même mélange de ces parties avec des fucs concrets qui s'attachent aux dents, se fait aussi dans l'estomac & dans les intestins; je suis porté à croire qu'il y forme des bézoards en s'y pelotonnant ou s'attachant aux noyaux des matières étrangères qui s'y trouvent. Dès qu'une première couche enveloppe un noyau, c'est déjà un petit bézoard; en roulant sur les parois de l'estomac ou des intestins, il se polit comme la matière qui revêt les dents est polie par le frottement des lèvres, des joues & de la langue: une seconde couche succède à la première, & les autres se forment successivement de la même façon. Lorsque l'on ouvre un bézoard, on voit que ces couches sont de différentes épaisseurs; mais elles ont toutes à-peu-près le même poli sur leur surface extérieure.

La forme des bézoards dépend de celle de leurs noyaux, principalement lorsqu'ils ne sont composés que d'un petit nombre de couches, la plupart sont ronds ou arrondis; il y en a d'oblongs, d'anguleux & de formes très-irrégulières; plus ils deviennent gros, plus ils s'arrondissent, parce que les endroits les plus saillants étant plus exposés au frottement; les couches y prennent moins d'épaisseur que dans les endroits plats ou concaves.

Lorsqu'un bézoard cesse d'acquies de nouvelles couches, les anciennes s'usent & se détruisent dans les endroits les plus convexes; alors on voit à l'extérieur leur épaisseur & leurs joints comme une agate-onyx. Les bézoards ne perdent donc rien de leur dureté dans le corps de l'animal, quoiqu'ils n'y prennent plus d'accroissement. Comment peut-on croire, comme le dit Koempfer, qu'ils se ramollissent, se dissolvent & se détruisent, lorsque l'animal passe plusieurs jours sans manger? Le même auteur ajoute, avec aussi peu de vraisemblance, que le bézoard n'est pas dur & solide dans le corps de l'animal; qu'au contraire on l'en tire mou & friable, comme un jaune d'œuf durci dans l'eau bouillante; que pour conserver le bézoard dans son entier & dans tout son lustre, on le met dans la bouche pour lui donner le temps de durcir: il est pourtant bien certain qu'il se polit dans le corps de l'animal durant tout le temps de sa formation, puisque toutes les couches sont polies sur leurs faces extérieures; d'ailleurs en le tenant dans la bouche on ne lui donneroit pas plus de dureté ni de poli qu'il n'auroit pu en prendre dans le corps de l'animal, puisqu'on le mettroit de nouveau dans un liq. où il auroit à-peu-près la même

chaleur & la même humidité. Il me semble que Koempfer avoit été mieux instruit, lorsqu'il a dit que la formation du bézoard dépend de la qualité des herbes dont l'animal se nourrit; les plantes glutineuses, aromatiques, résineuses, qui croissent sur les lieux élevés des pays chauds, reçoivent de la nature du sol, de la qualité de l'air & de l'action du soleil, les fucs propres à former des bézoards orientaux. La structure du corps doit aussi contribuer à cette formation, car il ne paroît pas que toutes les espèces d'animaux produisent des bézoards, même dans les pays chauds.

J'ai lieu de présumer que dans tous les pays les fucs des herbes produisent sur les dents machélières des différentes espèces d'animaux ruminants dont j'ai fait l'énumération, une matière qui a des reflets de couleur dorée ou bronzée, car je l'ai remarquée sur tous les individus de ces espèces que j'ai disséqués, ou dont j'ai seulement vu les squelettes: mais cette matière ne s'attache aux bézoards que dans les pays où se trouvent les animaux qui donnent les bézoards occidentaux qui en sont revêtus, on dit que c'est en Amérique; la matière brillante & dorée revêt leurs couches successives sans pénétrer dans l'intérieur de ces couches, ou au moins sans y porter sa couleur brune, comme dans le bézoard oriental; car la substance intérieure des couches du bézoard occidental est blanche ou jaunâtre: il y a lieu de croire que ce bézoard vient d'un animal ruminant, & que ceux qui ne sont pas revêtus d'une matière dorée viennent d'animaux qui n'ont rien de cette matière sur les dents. J'ai vu un bézoard trouvé dans le colon d'un cheval, il n'a aucune écorce dorée, aussi les dents du cheval n'en ont point; mais pourquoi les fucs concrets qui forment cette écorce sur les bézoards occidentaux, ne se mêlent-ils pas avec la partie tarteuse ou pierreuse comme dans le bézoard oriental? Pourquoi la surface de ce bézoard n'a-t-elle pas des reflets de couleur dorée ou bronzée comme les bézoards occidentaux? Ces différences ne viennent peut-être que de celles qui sont dans la qualité des fucs, des plantes & des parties pierrees ou tartareuses; lorsque les parties cristallines sont abondantes & pures, leur cristallisation se fait peut-être avec trop de force pour permettre le mélange du suc concret des plantes.

La cristallisation du bézoard occidental est fort régulière quoique confuse, & paroît très-pure. Après avoir cassé une des couches de ce bézoard, on aperçoit à l'œil nud, dans l'épaisseur de la couche, de petites stries transversales & brillantes, & on reconnoît que ce sont des aiguilles cristallines qui paroissent dirigées de dedans en dehors, depuis la face interne de la couche jusqu'à la face externe; les plus grandes de ces aiguilles s'étendent d'une face à l'autre, & laissent entre elles des intervalles remplis par des aiguilles plus petites qui tiennent aux grandes comme des branches à

une tige ; toutes ces aiguilles grandes & petites , ont moins de grosseur à leur origine que dans le reste de leur étendue ; elles semblent naître d'un point d'où sortent plusieurs aiguilles divergentes & dirigées plus ou moins obliquement , & les grandes aiguilles paroissent être un faisceau d'aiguilles plus menues : elles font toutes rayées transversalement par de petites lignes blanchâtres , placées fort près les unes des autres , & parallèles aux faces de la couche ; ces lignes indiquent peut-être les différens degrés de l'accroissement de chaque aiguille ; celles qui traversent les couches & qui sont traversées elles-mêmes par des lignes parallèles , peuvent , à ce qu'il m'a paru jusqu'à présent , faire le caractère distinctif des béroards occidentaux qui se forment dans les estomacs ou les intestins des animaux ruminans , comme il y a lieu de le présumer à l'inspection des teintes dorées & bronzées qui sont sur la plupart de ces béroards , dans lesquels j'ai vu des aiguilles traversées par des lignes parallèles : de onze de ces béroards que j'ai observés dans leurs parties internes , sept ont des teintes dorées & bronzées ; quoiqu'elles manquent aux autres , je n'en suis pas moins porté à croire que ceux-ci ont aussi été formés dans les estomacs ou dans les intestins , parce qu'ils ont le même caractère de cristallisation ; il y a d'autres béroards que l'on pourroit regarder comme occidentaux , parce qu'ils sont très-différens des béroards orientaux , & qu'ils se forment dans les intestins des animaux.

BÉZOARD MINÉRAL. Le béroard minéral est une préparation chimique & pharmaceutique , qui consiste à traiter le muriate d'antimoine sublimé ou beurre d'antimoine , avec de l'acide nitrique. C'est un oxide d'antimoine très-oxidé ou surchargé d'oxygène , qu'on recommandoit autrefois comme remède , qu'on n'emploie plus depuis long-temps , & qui , sous le point de vue chimique , est presque un acide métallique. Voyez le mot ANTIMOINE.

BÉZOARDIQUE. On a employé pendant quelque temps le nom d'acide béroardique , pour désigner l'acide qui forme le calcul urinaire humain ; alors ce calcul étoit confondu avec tous les calculs qu'on trouve dans les autres animaux & qu'on nomme béroards. Depuis que la différence entre ces concrétions est bien connue , on nomme la matière du calcul de la vessie humaine , acide lithique. (Voyez la conclusion de l'article ACIDE premier vol. page 407.)

BÉZOARDIQUES. (Pharmacie.) L'orqu'on attribuoit des vertus très-énergiques & très-utiles aux béroards orientaux , on avoit tant de confiance dans leurs propriétés , qu'on en transportoit l'expression à celles d'autres médicaments réputés très-acrés ; on faisoit donc alors une classe de remèdes

béroardiques , & on y rangeoit les substances aromatiques , diaphorétiques , sudorifiques , &c. Les béroardiques étoient presque entièrement regardés comme des cordiaux. Cette expression a été donnée par suite à plusieurs préparations pharmaceutiques , qui ne sont plus employées aujourd'hui. (Voyez le mot BÉZOARDIQUES dans le dictionnaire de médecine.)

BI-CONGE. *Bi-congius* (Pharmacie.) dénomination d'une mesure pour les liqueurs. Voyez MESURE.

BIDENT OU CORNIAT (Pharmacie.) *Bidens tripartita*, *Hipparium aquaticum*, Dod. pempt. 595. Cette plante est indigène , vivace , & commune en Europe , dans les fossés & les lieux aquatiques.

Quoique peu d'usage en médecine , on la dit mondificative , détergative , résolutive , alexitère , vulnératoire , & sternutatoire , suivant le commerce littéraire de Nuremberg. Cette plante offre un succédané à l'acnelle de Ceylan ; elle donne une teinture jaune , & peut servir à la nourriture des bœufs & des moutons. Ce bident est aussi connu en Amérique & se trouve au Japon.

(M. WILLEMET.)

BIDENT PENCHÉ (Pharmacie.) *Bidens cernua*, *Verbena pulchriori* forte, Luter J. B. R. 194. *Verbena vulgaris folio integro*. Pont. diff. 248. Cette plante se trouve également dans les endroits aquatiques. Le savant Nobelius a fait soutenir une dissertation , dans laquelle il prouve que cette plante possède les mêmes vertus que l'acnelle de Ceylan , qui est le *bidens acmella* de Linnéus , aussi appelle-t-il le bident penché l'*acmella Palatina*.

Cette plante donne aussi une teinture jaune.

(M. WILLEMET.)

BIERRE. La bière , *cervisia* , est une liqueur vineuse qu'on peut faire avec toutes les graines farineuses , mais pour laquelle on préfère communément l'orge. C'est , à proprement parler , un vin de grain.

Les farines de toutes les graines , extraites par une suffisante quantité d'eau , & abandonnées à elles-mêmes au degré de chaleur propre à la fermentation spiritueuse , subissent naturellement cette fermentation , & se changent en liqueur vineuse ; mais comme toutes ces matières rendent l'eau mucilagineuse & collante , la fermentation ne peut se faire que lentement & imparfaitement dans une pareille liqueur. D'un autre côté , si l'on diminue assez la quantité de matière farineuse , pour que son extraction ou sa décoction eût un degré de fluidité convenable , cette liqueur se trouve soit chargée d'une si petite quantité de matière fermentescible , que la bière ou le vin qui

en résulteroit seroit sans force, & auroit à peine de la faveur.

On a trouvé le moyen de remédier très-bien à ces inconvéniens, par des préparations préliminaires qu'on fait subir au grain.

Ces préparations consistent à le faire tremper d'abord dans de l'eau froide, pour qu'il s'en imbibé & qu'il se rende jusqu'à un certain point; après cela, on l'étend en tas à un degré de chaleur convenable, à l'aide de laquelle, & de celle de l'humidité qu'il a imbibée, le germe commence à se développer; on arrête cette germination aussitôt que le germe commence à se montrer, ce qui se fait par une prompte dessiccation. Pour accélérer cette dessiccation, & la rendre plus complète, on torréfie légèrement le grain en le faisant couler dans un canal incliné & chauffé à un degré convenable, ou bien on l'expose sur des claies au-dessus des braïes allumées.

Cette germination & cette légère torréfaction changent beaucoup la nature de la matière mucilagineuse fermentescible du grain. La germination atténue considérablement, & détruit en quelque sorte totalement la viscosité du mucilage, & celle, lorsqu'elle n'est pas portée trop loin, sans lui rien ôter de sa disposition à fermenter; au contraire, elle le change en un suc un peu sucré, comme il est aisé de s'en assurer en mangeant des graines qui commencent à germer. La légère torréfaction contribue aussi, pour sa part, à atténuer la matière mucilagineuse fermentescible du grain. Lors donc qu'il a reçu ces préparations, il est en état d'être moulu, & d'imprégner l'eau de beaucoup de sa substance, sans la réduire en colle, & sans la rendre trop visqueuse. Ce grain ainsi préparé, se nomme *malt*. On broie donc ensuite le malt; on en tire toute la substance dissoluble dans l'eau & fermentescible, à l'aide de l'eau chaude; on évapore cette liqueur en la faisant bouillir dans des chaudières jusqu'à un degré convenable, & on y met quelque plante d'une amertume agréable, comme le houblon, pour relever la faveur de la bière; & la rendre capable de se conserver plus long-temps. Enfin, on met cette liqueur dans des tonneaux pour la laisser fermenter d'elle-même: c'est la nature qui fait le reste de l'ouvrage; il ne faut que l'aider par les autres conditions les plus favorables à la fermentation vinéuse.

Telle est la manière dont Macquer considère la théorie de la formation de la bière dans son dictionnaire de chimie, car on voit bien qu'il n'a point eu l'intention de décrire l'art du brasseur; & en effet les détails de cet art appartiennent à d'autres parties du dictionnaire encyclopédique. Mais l'exposé de Macquer est incomplet; il ne suffit pas pour faire concevoir la production de cette liqueur, & les phénomènes de sa formation. Pour suppléer à ce qui manque à cet article, nous y joindrons l'article que Buquet a consacré dans

son ouvrage sur la chimie végétale; & nous le ferons suivre de quelques remarques théoriques; que l'état actuel de la chimie permet d'ajouter aux idées de ces deux auteurs.

La bière, dit Buquet, est une espèce de vin qu'on obtient en faisant fermenter le corps muqueux contenu dans les graines farineuses; ce corps muqueux n'est pas dans un état aussi favorable à la fermentation que l'est celui des fruits sucrés & succulents; aussi est-on obligé d'ajouter ce qui lui manque pour subir une exacte fermentation: c'est là l'objet de l'art du brasseur.

On fait de la bière avec du blé, de l'orge & de l'avoine. On pourroit même dans le besoin en faire avec d'autres substances farineuses; mais à Paris c'est l'orge qu'on emploie de préférence pour procéder à la fabrication de la bière, on met tremper l'orge dans l'eau pendant 30 & même 40 heures, ou jusqu'à ce qu'il soit suffisamment ramolli, ce qu'on connoît lorsqu'en pressant le grain il s'écrase facilement sous l'ongle. Le grain en sortant de l'eau est d'abord mis en tas, il reste en cet état pendant 24 heures; après ce temps on en forme des couches épaisses de 8 à 9 pouces, & on le laisse germer. Lorsque le germe commence à paroître, on retourne les couches pour donner de l'air au grain; & lorsqu'enfin ce germe a acquis plusieurs lignes de longueur, on porte le grain à la touraille pour le sécher. Cette touraille est composée d'un très-grand fourneau surmonté d'une trémie, dont les côtés sont construits en brique de manière à ne pouvoir être altérés par le grand feu qu'on fait dans le fourneau. La partie supérieure de la trémie est un plancher de carreau de brique, percé de petits trous; quelquefois, ce sont plusieurs tringles de bois, sur lesquelles on étend une toile de crin nommée *la faire*. C'est sur cette toile qu'on place le grain, & à mesure que la chaleur du fourneau lui fait perdre toute son humidité, on le retourne, & on fait complètement sécher tous les germes. On passe ensuite le grain par un crible de fer pour en séparer la poussière & les germes défectueux, nommés *spavillons*. Au bout de quelques jours, on porte ce grain au moulin pour le réduire en une farine de moyenne grosseur, qu'on a nommée *maïs*. Si la farine est trop grosse, l'eau n'en retire pas tout ce qu'on peut en retirer; si au contraire elle est trop fine, elle forme avec l'eau une pâte que ce fluide a beaucoup de peine à délayer. Le *maïs* est porté dans une cuve nommée *cuve-matière*. C'est un tonneau très-large à deux fonds; l'inférieur est plein, le supérieur est percé d'une infinité de trous faits en cônes. La base de ces trous qui a environ trois quarts de pouce de diamètre, regarde le fond plein; & le sommet qui n'a guère qu'une ligne est tourné en haut. Il y a deux pouces environ entre le fond plein & le faux fond sur lequel on étend la farine. Dans un des coins de la cuve-matière, on place un tuyau de bois nommé *pompe*

à jeter *trümpe*. Cette pompe traverse le faux fond, & sert à porter l'eau sur le fond plein.

L'eau qu'on emploie pour brasser doit être chaude, & l'habitude seule sert à donner le degré de chaleur convenable. L'eau chauffée dans des chaudières, est conduite par une gouttière dans la pompe à jeter *trümpe*; & lorsqu'elle a rempli l'espace qui se trouve entre les deux fonds de la cuve matière, elle passe par les trous du faux fond avec une rapidité proportionnée à la vitesse qu'acquiert l'eau en rombant de la chaudière par la pompe. Cette force est telle, que la farine qui recouvre le faux fond est portée à la partie supérieure de la cuve, & répartie dans toute la masse de la liqueur. Plusieurs ouvriers, munis chacun d'une pelle de fer percée dans son milieu, agitent la farine & la délayent dans l'eau aussi parfaitement qu'il est possible. La liqueur est alors fort trouble. On laisse déposer la farine ou le fardeau proprement dit, & l'eau surnaissante se nomme le *premier mi-tier*. On la fait couler par une ouverture pratiquée dans le second fond de la cuve; elle traverse en s'écoulant la farine ou le fardeau, & se charge davantage. Le premier métier chauffé de nouveau est reversé sur la farine qu'on délaye une seconde fois. On laisse encore déposer le fardeau, & la liqueur surnaissante ou le *second mi-tier*, étant tiré à clair, on y mêle 3 ou 4 livres de houblon par chaque pièce, & on fait cuire le tout dans de grandes chaudières. La bière qu'on veut faire blanche doit être moins cuite que la bière rouge. Lorsque la liqueur a acquis le degré de cuisson convenable, on la porte avec le houblon dans des bacs où elle perd la plus grande partie de sa chaleur. De ces bacs, on la fait couler dans la cuve où doit se faire la fermentation tumultueuse, & qu'on nomme *cuve guilloire*. On ne remplit qu'en partie cette cuve, & on y met de la levure, qui est l'écume épaisse que rejette la bière dans sa fermentation secondaire. C'est cette levure qui développe le mouvement fermentatif, & lorsqu'il a déjà acquis quelque force, on ajoute peu à peu de nouvelle liqueur; & ce n'est que lorsque la fermentation est parfaitement établie qu'on achève d'emplir la cuve, encore faut-il avoir l'attention de laisser assez d'espace vide pour contenir les écumes à mesure qu'elles se forment. Lorsque ces écumes commencent à s'enfoncer dans la liqueur, c'est un signe que la fermentation tumultueuse est achevée. On brouille alors le tout, c'est ce qu'on nomme *battre la guilloire*. On tire la bière dans les tonneaux, & quelque temps après la fermentation secondaire s'établit. Il sort des tonneaux une mousse légère qui tombe dans des baquets où elle s'affaisse & forme une bière qui sert à remplir les tonneaux à mesure qu'ils se vident. Lorsque la fermentation est complètement achevée, il ne s'élève plus de mousse. On nomme *levure* l'écume épaisse qui ne s'affaisse pas dans les baquets; on la conserve pour servir de levain

Chimie, Tome II.

à de nouveaux métiers. On ne bouche les tonneaux que lorsqu'il ne sort plus de mousse.

Lorsque l'on examine toutes les manœuvres usitées dans la préparation de la bière, il est aisé de se convaincre que l'art fait beaucoup dans cette fermentation, tandis que la nature fait tout ou presque tout dans celle du vin.

La germination qu'on fait subir à l'orge *arétumée* & détruit la viscosité du mucilage contenu dans le grain; sa saveur, qui étoit fade, devient sensiblement plus agréable, & ce corps muqueux fade, se rapproche davantage des corps muqueux sucrés, & devient propre à subir une forte fermentation. L'eau qu'on ajoute se charge de ce principe muqueux; & comme cette dissolution n'a pas assez de consistance, on l'épaissit par la cuisson. La partie extractive du houblon qu'on y joint sert d'entraves à l'alcool à mesure qu'il se forme, & donne pour ainsi dire du corps à la bière. Cette matière extractive tient en quelque sorte lieu du sel tartareux, & de la partie colorante qui se trouvent dans le vin; l'addition de la levure détermine la véritable fermentation spiritueuse, qui sans cela se feroit mal, ou passeroit à l'acide. On fait que les raisins qui donnent un suc trop aqueux, sont sujets à cet inconvénient. Le mouvement des parties aqueuses ne trouvant point assez de résistance lorsque la liqueur est trop fluide, il ne se produit point de chocs, point de décomposition, ou au moins elle est trop lente: l'esprit ardent ne se forme point en assez grande quantité, la liqueur tourne bientôt à l'aigre. C'est précisément ce qui arriveroit à la bière qui n'a jamais la viscosité du suc des raisins, si on ne la déterminoit promptement à fermenter, par l'addition de la levure qui donne lieu à la production d'une plus grande quantité d'esprit ardent.

On retire par la distillation de la bière, une eau-de-vie nommée *eau-de-vie de grains*. Elle a un saveur que beaucoup de personnes trouvent désagréable; ce qui n'empêche cependant pas d'en faire usage dans les pays où on ne peut pas se procurer facilement l'eau-de-vie de vin.

La bière est d'un usage fort commun; elle a les mêmes inconvénients que le vin, & l'ivresse qu'elle procure est beaucoup plus dangereuse. Les Anglois préparent des bières médicamenteuses par fermentation & par infusion, comme on fait en France avec le vin. Les boulangers emploient la levure de bière pour faire lever le pain moelleux. Comme cette substance est dans un état de fermentation actuelle, elle développe très promptement dans la pâte le mouvement fermentatif, & le pain qui en résulte est beaucoup plus léger que celui qu'on fait avec le franc levain ou la pâte déjà aigrée.

On fabrique une espèce de bière avec la décoration des branches de sapinorte du Canada. Suivant le procédé que M. Duhamel rapporte, on fait bouillir de l'eau dans une chaudière capable de

B b b b

contient un quart de plus qu'une barrique; on jette dans cette eau un fagot de branches de sapinette, qui doit avoir 21 pouces de circonférence auprès du lien. On continue de faire bouillir jusqu'à ce que l'écorce se détache des branches; on jette ensuite dans la décoction un boisseau d'avoine, qu'on a fait préalablement rôtir dans une poêle de fer, & 15 biscuits de mer, ou 12 à 15 livres de pain coupé par tranches & également rôtis. Lorsque le tout est cuit, on retire la chaudière de dessus le feu. On retire avec soin les branches de sapinette, & lorsque le pain & le grain sont précipités au fond de la liqueur, on ajoute 6 pintes de mélasse, ou 12 à 15 livres de sucre brut, & on entonne la liqueur dans une barrique qui a contenu du vin rouge. Lorsque on veut qu'elle prenne plus de couleur, on y laisse de la lie & 5 à 6 pintes de ce vin. Lorsque la décoction n'est plus que tiède, on y délaye une chopine de levure de bière qu'on brasse bien fort. On a soin de laisser le bondon des tonneaux ouverts, la fermentation se développe, & à mesure que l'écume sort, on remplit exactement le tonneau pour ne le fermer que lorsque la fermentation est complète. Si on n'attend pas exactement ce dernier terme, on obtient alors une boisson plus piquante.

Dans la préparation de cette liqueur, l'avoine & le pain fournissent le corps muqueux; la décoction de sapinette supplée au houblon; la maltité augmente la quantité de muqueux sucré; la levure de bière & la lie de vin sont propres à développer le mouvement fermentatif.

Il seroit on ne peut pas plus aisé de varier à l'infini ces sortes de boissons, en prenant pour sujet de la fermentation différens farineux, & les parties extractives amères ou atomiques de différentes plantes.

Quoique l'article de Bucquet que nous venons de consigner ici, soit bien plus exact que celui de Macquer, & qu'il soit plus avancé dans la théorie, sur-tout par rapport à la production de la matière sucrée dans le grain germé, il ne contient point encore tout ce que la science chimique fournit de données pour en concevoir entièrement la formation & pour bien connoître la bière. Nous ajouterons donc à ces détails quelques réflexions; 1°. sur les matières diverses qu'on peut convertir en bière; 2°. sur le développement de la matière sucrée dans les grains céréales; 3°. sur les phénomènes de la fermentation de la bière; 4°. sur la nature de la bière comparée à celle des autres liqueurs vineuses & sur son usage.

I. L'orge, le bled, l'avoine, ne sont pas les seules matières avec lesquelles on puisse faire de la bière; toutes les grains céréales ou toutes les semences des graminées peuvent également y servir. On a employé il y a quelques années à Paris le bled de Turquie ou mayas avec succès à la préparation de la bière. M. Parmentier s'est réuni

pour ce travail à M. Longchamp, & ils ont parfaitement réussi. On fait aussi qu'on fait fermenter le riz, & qu'on obtient de cette espèce de bière une liqueur éryvante, un alcool très-fort, qu'on connoît sous le nom de rack. Il est donc certain que toutes les semences des graminées ont la même propriété à cet égard. On réussiroit également avec le millet, le seigle, & c'est manifestement à la matière amylacée combinée à une substance extractive, qu'il est due la tendance à fermenter que présentent toutes ces graines.

II. Ce n'est pas seulement pour détruire la viscosité de la substance muqueuse des grains qu'on y développe la germination. Macquer n'a présumé vu que cet effet dans l'art de les faire germer, & Bucquet n'a pas assez insisté sur la production de matière sucrée qui accompagne cette germination. Il est bien reconnu aujourd'hui qu'il n'y a que la substance sucrée qui soit susceptible d'éprouver la fermentation vinuse & de former de l'alcool, il est donc nécessaire que les grains contiennent une certaine proportion de cette substance pour passer à la fermentation vineuse. La germination y développe du sucre, & cette observation faite depuis très-long-temps, est la véritable origine de la découverte de la bière. Mais comment une substance fade & inette, la féculé amylacée qui constitue la plus grande partie de la substance des grains, peut-elle se convertir en matière sucrée? Ce beau problème n'a point assez fixé l'attention des chimistes; il est vrai qu'on ne pouvoit concevoir la possibilité de le résoudre avant les découvertes des modernes sur la nature & la composition naturelle des substances végétales. Voyons si depuis les nouvelles acquisitions de la science à cet égard, on peut espérer d'atteindre à cette solution. Les analyses les plus exactes des mucilages, des gommes & des féculés amyliacés, ont appris que ces substances sont formées d'hydrogène, de carbone & d'oxygène, qu'elles sont des espèces d'oxides qui ne diffèrent du sucre que par des proportions différentes de principes, & vraisemblablement par moins d'oxygène; en sorte qu'il faudroit qu'en ajoutant de l'oxygène aux gommes ou aux féculés, & peut-être en changeant en même-temps la proportion relative de l'hydrogène & du carbone, on changeroit leur nature & on les convertiroit en sucre. La germination ne peut pas s'effectuer sans eau; ce fluide pourroit bien être décomposé par la matière des grains, & son oxygène se porter sur la féculé, la gomme ou l'extrait, ou bien ces substances détremées par l'eau pourroient bien céder une portion de leur carbone ou de leur hydrogène, en sorte que la proportion de l'oxygène y augmentant donneroit naissance au sucre. Sans doute on ne sait pas encore comment s'opère ce changement de proportion dans les principes du mucilage fade, pour le convertir en mucilage sucré; si c'est aux dépens de l'eau & par

l'addition de son oxygène, ou seulement par la soustraction de quelques principes & l'augmentation proportionnelle de l'oxygène qui y est tout contenu. Mais de quelque manière que cette conversion s'opère, elle n'en est pas moins certaine & ne mérite pas moins d'être considérée par les chimistes comme une opération naturelle. Cette conversion est bien plus étendue qu'on ne l'a dit jusqu'à présent; la maturation des fruits arrachés de dessus l'arbre & conservés dans des fruitiers est un phénomène analogue. C'est à une espèce de fermentation qui précède nécessairement la fermentation spiritueuse, que cette formation de matière sucrée doit être attribuée. Il en sera reparlé sous ce point de vue à l'article FERMENTATION.

III. Quand une fois la matière sucrée est formée dans les grains & dissoute par l'eau, celle-ci, chargée en même temps d'extrait & de mucilage, devient susceptible de passer à la fermentation vineuse; la liqueur se couvre de mousse; elle est agitée d'un mouvement intellin; il s'en dégage une très-grande quantité de gaz acide carbonique qui remplit la partie supérieure des cuves; c'est dans cette atmosphère que M. Prietley & M. Chaulnes ont fait leurs expériences sur ce qu'on appelloit alors l'air fixe; c'est au-dessus des cuves de bière en fermentation qu'on va puiser ce gaz acide plus lourd que l'air, à l'aide de cruches qu'on y plonge, qu'on fait cristallifier les alcalis en les saturant de cet acide; c'est cette couche de gaz délétère qui est si dangereuse pour les animaux qui y sont exposés. La formation & le dégagement de cet acide accompagnent nécessairement la production de l'alcool. Voyez le mot ALCOOL. A mesure que ces phénomènes le passent, la liqueur perd de sa viscosité & de sa saveur douce; elle devient piquante & un peu acre; elle est enfin de la bière, lorsqu'après avoir été mise dans des tonneaux, elle a continué quelques jours à y fermenter. Suivant la quantité relative du malt & d'eau, le temps qu'on met à la décoction, l'époque où on tire la bière, on a les diverses espèces de cette liqueur, blanche, rouge, forte, légère, piquante, douce, &c., que les Anglois distinguent par les noms de *porter*, *ale*, &c.

IV. La bière ressemble au vin proprement dit par l'alcool qu'elle contient; on peut en retirer ce produit par une distillation faite avec soin, mais elle ne contient point de tartre, & elle est chargée d'une grande quantité d'extrait & de mucilage. Voilà pourquoi sans doute elle est beaucoup plus nourrissante que les vins ordinaires, & pourquoi plusieurs individus engraisent par l'usage continu de la bière. C'est aussi parce que cette liqueur est chargée de principe muqueux qu'elle ne peut pas réussir comme les vins pour dissoudre des matières végétales ou animales, & qu'elle n'est que peu

employée pour la composition des médicaments.

Cependant plusieurs médecins ont cru pouvoir donner à la bière des propriétés médicamenteuses, soit en y faisant séjourner différentes matières végétales, soit même en faisant fermenter ces matières avec elle; mais on sent que cette dernière pratique doit altérer la nature des substances végétales, & n'est pas propre à communiquer à la bière les qualités dont elles jouissent elles-mêmes.

BIÈRE. (*Pharmacie.*) Nous avons déjà dit à la fin de l'article précédent, que l'on a proposé d'employer la bière pour la préparation de quelques médicaments composés. On l'a recommandé dans les mêmes cas que le vin, & il est probable que l'usage de cette liqueur, comme excipient dans les formules, est né dans les pays où le vin étoit rare & où la bière étoit au contraire très-abondante. Ainsi l'on a dû prescrire des bières médicamenteuses en Angleterre, en Hollande, en Flandre.

Il y a, en général, deux classes de préparations pharmaceutiques qui portent le nom de bières médicamenteuses; la première classe comprend toutes celles que l'on fait en ajoutant à la décoction de grains germés des plantes médicamenteuses, afin de les faire fermenter avec elle; mais cette méthode est manifestement mauvaise, & ne remplit point le but qu'on se propose, puisque la fermentation détruit dans le plus grand nombre des végétaux les propriétés qui déterminent leur efficacité médicamenteuse. On ne doit donc pas avoir de confiance dans ces bières pharmaceutiques préparées par la fermentation.

La seconde classe renferme les bières préparées par macération. La méthode générale de préparer ces médicaments consiste à laisser plus ou moins long temps macérer dans de la bière bien faite, les différentes substances végétales dont on veut faire passer les propriétés dans cette liqueur fermentée. Ces bières sont faites ou avec une seule plante, amère, astringente, aromatique, ou avec plusieurs végétaux de différente nature. Il faut observer à l'égard de cette préparation, que la bière étant déjà une dissolution de la matière extractive & muqueuse de l'orge, & le plus souvent même une dissolution très-chargée de ces principes; les plantes qu'on y laisse macérer, ne fournissent point en général autant de matériaux qu'elles en donnent au vin ou à d'autres liqueurs moins saturées encore. Cependant les plantes amères, aromatiques, astringentes ou acres, antiscorbutiques, communiquent sur-tout à la bière blanche assez de vertus pour que cette liqueur médicamenteuse puisse être utile dans les maladies qui en indiquent l'usage. Ainsi les bières préparées avec le quinquina, la centauree, les racines amères, le cresson, le raifort, le cochléaria, la beccabunga, la scille, le colchique, &c. ont les propriétés de ces substances. Il faut avoir l'attention de ne pas y faire macérer des plantes

B b b b a

trop aqueuses, ou des plantes fraîches en trop grande quantité, qui affoiblissent la liqueur par l'eau qu'elles y ajouteroient; il faut aussi préparer ces bières en petite portion à la fois, parce qu'elles sont susceptibles de s'altérer & de se gâter promptement, & de les tenir dans un lieu frais, & dans des vaisseaux exactement bouchés. On peut varier beaucoup les bières médicamenteuses, suivant les indications qu'on se propose de remplir avec ces préparations.

BIGNONE ou FLEURS BLEUES. (*Pharmacie.*) *Bignonia carulea*. Arbre qui croît dans les îles de Bahama, & dans les forêts de la Guiane & de l'île de Cayenne.

Son écorce est purgative & vomitive contre les dévoiements & la dysenterie.

(M. WILLEMET.)

BIGNONE DE L'INDE. (*Pharmacie.*) *Bignonia Indica*. Arbre oriental, assez élevé, dont les Indiens se servent des feuilles en cataplasme pour guérir les ulcères.

(M. WILLEMET.)

BIJON. (*Pharmacie*) Dénomination employée pour désigner le suc balsamique & résineux qui, pendant l'été, filtre naturellement à travers l'écorce des pins & sapins; ce suc plus fluide, plus transparent que le galipot ou la térébenthine que l'on obtient par l'incision des arbres, ressemble beaucoup, disent les auteurs, au baume blanc du Pérou; mais comme il est peu abondant, il est rare dans le commerce, & souvent on débite sous ce nom une térébenthine ou galipot, délayé avec l'huile volatile de térébenthine.

BILE. Il n'y a point de matières animales plus importantes à connaître que la bile. Cette liqueur joue un très-grand rôle dans l'économie animale. On en voit les preuves dans l'étendue du viscère qui sert à la préparer, dans le lieu qu'il occupe, dans les organes sur lesquels il a une influence immédiate, dans la consistance parmi les animaux, puisqu'on le trouve jusque dans les insectes & dans les vers, dans la gravité des maladies produites par ses altérations, & sur-tout dans les indices fondés sur les différents caractères des évacuations bilieuses que les médecins tirent de leurs observations sur cette humeur, qui colore les excréments de beaucoup de nuances diverses, & qui en fait varier la consistance, l'odeur, ainsi que toutes les propriétés. Pour bien connaître tout ce que l'analyse de la bile peut apporter de lumières dans la physiologie animale, il faut observer ici que la bile reçoit une très-grande quantité de sang veineux qui vient des viscères abdominaux; que ce sang qui coule très-lentement, a parcouru beaucoup de parties graisseuses; qu'il est plus ou moins surchargé d'hydrogène & même

de graisse toute formée; que la bile est destinée à couler dans le duodénum, à s'y mêler aux aliments déjà en partie modifiés, dissous dans l'estomac, & à y opérer un nouveau chéminement. Il est aussi nécessaire d'observer que la bile paroît donner à une partie du sang qui va au foie, un caractère particulier qui se rapproche du sang veineux. On doit encore rappeler ici; 1°. que le sang veineux paroît être surchargé d'hydrogène & privé d'une partie du calorique libre que contient le sang artériel; 2°. que le foie a un volume très-considérable dans le fort des animaux à sang chaud avant qu'ils aient respiré, & qu'il semble remplir une grande partie des fonctions du poulmon.

La bile ou le fiel est une liqueur d'un vert plus ou moins jaunâtre, d'une saveur très-amère, d'une odeur fade & nauséabonde, qui, après avoir été séparée du sang dans le foie, est recueillie chez le plus grand nombre des animaux, excepté les insectes & les vers, dans un réservoir membraneux placé sous le foie, & qu'on nomme vésicule du fiel. On n'a encore que peu examiné la bile humaine par la difficulté que l'on éprouve à s'en procurer une certaine quantité, c'est celle de bœuf qu'on a presque toujours soumise aux expériences chimiques. Cependant on en a fait assez sur la bile humaine, pour savoir qu'elle a beaucoup d'analogie avec celle des quadrupèdes.

Cette liqueur est d'une consistance presque gélatineuse ou glaireuse; elle file comme un sirop épais; en l'agitant, elle moussé comme l'eau de savon. Cependant sa consistance varie comme sa couleur; on la trouve quelquefois en partie coagulée.

Si on la distille au bain-marie, elle donne un phlegme qui n'est ni acide ni alcalin, mais qui est susceptible de passer au bout d'un certain temps à la putridité. Ce phlegme m'a souvent présenté un caractère singulier, celui d'exhaler une odeur aromatique suave & bien marquée, fort analogue à celle de l'ambre ou du musc. Cette expérience a été faite un grand nombre de fois dans mon laboratoire; elle réussit sur-tout en distillant de la bile de bœuf un peu altérée & conservée depuis plusieurs jours. La même odeur se développe toujours dans la bile épaisse & gardée depuis long-temps. Cette observation a déjà été faite par plusieurs chimistes.

Lorsqu'on a séparé de la bile toute l'eau qu'elle peut fournir au bain-marie, on la trouve dans l'état d'un extrait plus ou moins sec, d'un vert foncé ou brun. Cet extrait de bile, ou plutôt cette bile épaisse attire l'humidité de l'air; il est très-tenace & très-poisseux; il est presque entièrement dissoluble dans l'eau. En le distillant à la cornue, il donne un phlegme jaunâtre & alcalin, une huile animale empyreumatique, beaucoup de carbonate ammoniacal, un fluide élastique mêlé d'acide carbonique, de gaz hydrogène carboné, & de gaz azote. Il reste, après cette

opération, un charbon assez volumineux, moins difficile à incinérer que ceux de la plupart des autres substances animales. Suivant M. Cadet, qui a donné à l'académie en 1767, un très-bon mémoire sur l'analyse de la bile, ce charbon contient du carbonate de soude, une terre animale, c'est-à-dire, du phosphate de chaux, un peu d'oxide de fer. Il faut observer que la distillation de la bile à feu nu demande à être conduite avec lenteur, parce que cette substance se boursoffle considérablement. Quant au sel que M. Cadet indique dans le charbon de la bile, & qu'il croit être analogue au sucre de lait, on sent bien qu'il est impossible que cette matière air résisté à la chaleur forte, nécessaire pour réduire la bile à l'état charbonneux. En observant avec soin ce qui arrive à de la bile chauffée à soixante degrés, on voit qu'elle se coagule comme une matière albumineuse, & qu'elle se prend en une masse filante, & en partie floconneuse; on reconnoît à cet effet la présence de la matière albumineuse dans cette liqueur. J'ai aussi observé dans les produits de la bile distillée à la cornue & rectifiés, un peu d'acide prussique en partie libre, & en partie combiné avec de l'ammoniaque.

La bile exposée à l'air à une température chaude de quinze à vingt-cinq degrés s'altère très-promptement; son odeur devient d'abord fade & nauséabonde; sa couleur se détruit & se change, il s'empécit des flocons mucilagineux blanchâtres, elle perd sa viscosité, & elle prend bientôt une odeur fétide & piquante. Lorsque la putréfaction est fort avancée, son odeur devient suave & comme ambrée. M. Vauquelin a découvert qu'en faisant chauffer de la bile de bœuf au bain-marie, & en l'évaporant un peu, elle se conserve ensuite plusieurs mois sans s'altérer, comme cela a lieu pour le vinaigre que l'on fait bottillir. Il a trouvé que la bile de bœuf altérée, exhale une odeur fétide, & dont la couleur est brune, sale & trouble, devient d'un beau vert, perd son odeur lorsqu'on la chauffe, & qu'il s'en sépare alors quelques flocons albumineux & concrets; elle n'est plus ensuite aussi sujette à s'altérer que dans son état naturel.

La bile se dissout très-bien dans l'eau, sa couleur passe alors au jaune plus ou moins clair, suivant la quantité d'eau que l'on y ajoute.

Tous les acides décomposent la bile à la manière des savons, & ils y produisent de plus un coagulum, en raison de l'albumine qu'elle contient. Si on filtre ce mélange, & si l'on évapore la liqueur filtrée, on en obtient un sel neutre formé par l'acide qu'on a employé, & la soude. Cette belle expérience due à M. Cadet, démontre la présence de la soude dans la bile; la matière restée sur le filtre dans ces expériences est épaisse, visqueuse; elle est composée de deux substances différentes, l'une est de l'albumine épaisse, coagulée, l'autre est amère & très-inflammable, sa

couleur & sa consistance varient suivant la nature & le degré de concentration de l'acide qu'on a employé pour la séparer. J'ai observé qu'en général, l'acide sulfurique lui donne une couleur verte soucée; l'acide nitrique un peu concenré, une couleur jaune, brillante, & l'acide muriatique, un vert clair très-beau; au reste, ces couleurs varient beaucoup suivant l'état de la bile & celui des acides. Ce précipité à été regardé comme une substance analogue aux résines, sur-tout par M. Van-Bochaute, chimiste à Bruxelles, qui a donné une dissertation sur la partie colorante de la bile. Le précipité de la bile par les acides se boursoffle, se fond & s'enflamme sur les charbons ardents; il se dissout en totalité dans l'alcool, & l'eau le précipite comme les sucs résineux. L'action des acides démontre donc que cette humeur est un véritable savon formé par une huile analogue aux résines unie à la soude; ils annoncent aussi la présence d'une certaine quantité de matière albumineuse dans cette liqueur animale; c'est cette matière qui est la cause de la coagulation de la bile par le feu, par les acides, par l'alcool; c'est elle qui est le siège de la putréfaction.

Les sels neutres alcalins mêlés à la bile, l'empêchent de passer à la putréfaction. Les sels ammoniacaux sont décomposés par la bile; les sels neutres terreux se décomposent & la précipitent.

Les dissolutions métalliques sont décomposées par la bile qu'elles décomposent en même-temps; la soude contenue dans cette humeur, s'unit à l'acide de la dissolution, & l'huile colorée de la bile se précipite combinée avec l'oxide métallique.

La bile s'unit facilement aux huiles, & elle les enlève de dessus les étoffes, comme le fait le savon. Voilà pourquoi la bile de bœuf est employée par les dégraisseurs.

La bile ou le savon biliaire se dissout dans l'alcool, qui en sépare la matière albumineuse épaisse. La remuure de bile n'est pas décomposée par l'eau, ce qui démontre que cette substance est un véritable savon animal également soluble dans l'eau & dans l'alcool. L'éther la dissout aussi très-facilement.

Le vinaigre décompose la bile comme les acides minéraux; en évaporant la liqueur filtrée, on obtient de l'acétite de soude bien cristallisé.

Il suit de ces diverses expériences, que la bile est un composé de beaucoup d'eau, d'un atome particulier, d'un mucilage albumineux, d'une huile concrécible particulière, & de carbonate de soude. M. Cadet dit avoir trouvé un sel qu'il croit être la nature du sucre de lait, & dont M. Van-Bochaute a confirmé depuis l'existence; mais il est vraisemblable que cette prétendue matière saline est plutôt analogue à la substance huileuse, féculente, brillante & cristalline, quo

Poullietier a trouvée dans les calculs biliaires humains, & dont il va être question.

A ces considérations, à ces résultats d'analyse de la bile, je réunirai ici les expériences particulières que j'ai faites sur cette humeur, dans un cours au lycée en 1788, & qui ont été insérées dans les annales de chimie.

I. La bile est une liqueur savonneuse composée de résine & d'alcali, suivant plusieurs chimistes. J'ai fait connoître, il y a dix ans, qu'elle contenoit encore une autre substance analogue à l'albumine de l'œuf.

II. L'acide muriatique oxigéné détruit la couleur de la bile, & en coagule la partie albumineuse qui se précipite en flocons blancs; le savon biliaire reste en dissolution, & semble n'être que de l'eau pure; car il a perdu sa couleur & son odeur; mais il conserve toute son amertume. Si l'on a mis plus d'acide muriatique oxigéné qu'il n'en faut pour coaguler l'albumine, cet excès agit peu-à-peu sur l'huile du savon; & redevient de l'acide muriatique ordinaire, décompose une partie du savon, & en sépare l'huile sous forme concrète, & avec une couleur blanche.

Comme il paroît que ce n'est qu'en fournissant de l'oxigène à l'albumine, que l'acide muriatique oxigéné coagule la bile; il est vraisemblable que la portion de cet acide revenu à son état simple, décompose une certaine quantité de savon biliaire, & que, par conséquent, l'albumine doit être toujours mêlée d'un peu de résine, ou d'huile concrète de la bile.

III. Si dans la bile traitée par l'acide muriatique oxigéné, & qui a perdu sa couleur, on met un acide simple, comme l'acide sulfurique, muriatique, &c., il se fait sur le champ un précipité blanc, concret & de la consistance de la graisse. Ce précipité blanc, qui est l'huile de la bile un peu altérée par l'oxigène de l'acide muriatique, se délaie parfaitement dans l'eau, & s'y dissout même lorsqu'elle est chaude. Cette propriété est très-singulière; car la foudre qui la rend ordinairement dissoluble, n'y est plus restée, puisqu'elle s'est unie à l'acide dont on s'est servi pour décomposer la bile.

Cette huile concrète, blanche, se dissout à froid dans l'alcool; & lorsqu'on emploie la chaleur pour accélérer cette dissolution, il se forme une certaine quantité d'éther: ce qui paroît tenir à l'oxigène que cette huile contient, & qui, en passant dans l'alcool, change les proportions de ses principes. La dissolution alcoolique, exposée à l'air, perd peu-à-peu son alcool & s'épaissit; mais elle ne devient que très-difficilement solide. Si, lorsqu'elle est épaissie comme un sirop, on la mêle à de l'eau, elle s'y unit parfaitement; ce qui sembleroit annoncer que le savon biliaire n'a pas été dé-

composé; mais quand on ajoute à cette dissolution un acide quelconque, il se fait sur le champ un précipité.

Une autre expérience qui n'est pas moins singulière, c'est que si l'on met une nouvelle quantité d'alcool dans la dissolution d'huile de la bile épaissie à l'air, & qu'on y ajoute ensuite de l'eau, il se forme un précipité abondant.

IV. Le même phénomène sur la dissolubilité de cette matière huileuse de la bile dans l'eau, avoit été observé, il y a quelques années, dans mon laboratoire. Après avoir précipité la prétendue résine de bile par un acide, on voulut laver cette matière colorante, pour emporter l'excès d'acide & la substance saline qu'elle pouvoit contenir; l'eau qu'on employoit emportoit à chaque fois une portion de la résine elle-même; il paroît qu'on auroit tout dissous, si on avoit continué de la laver ainsi. L'eau qui avoit dissous cette matière, donnoit un précipité par l'addition d'un acide. Ce second précipité est également dissoluble dans l'eau, lorsqu'il est privé de tout excès d'acide. Il sembleroit donc que la matière colorante de la bile, regardée jusqu'ici comme une espèce de résine, est en partie dissoluble dans l'eau, & ne prend un caractère apparent d'indissolubilité dans ce liquide, que par la présence d'un acide.

V. On avoit pensé que la matière blanche que l'on séparoit de la bile de bœuf par l'acide muriatique oxigéné, avoit quelque analogie avec la matière blanche & cristalline des calculs de la vésicule du fiel de l'homme; mais on s'est bientôt aperçu qu'elle en différoit par plusieurs caractères; 1°. elle est plus dissoluble que cette dernière dans l'alcool, d'où elle ne se précipite point en petites lames, comme la matière cristalline du calcul biliaire humain; 2°. elle se dissout dans l'eau; ce que ne fait pas la matière cristalline du calcul; 3°. elle est beaucoup plus molle & plus fusible que cette dernière; sa fusibilité égale à-peu-près celle de la graisse, (elle a lieu à 32 ou 33 degrés,) tandis que la matière cristalline des calculs biliaires humains ne se fond qu'à une chaleur au-dessus de 90 degrés, & reste solide à quelques degrés au-dessus de l'eau bouillante.

VI. Lorsque la bile a perdu son huile par l'action d'une forte chaleur, il faut beaucoup de temps pour réduire son charbon en cendres; pendant qu'on le fait rougir, la foudre se volatilise si facilement, que la cendre encore noire qu'en résulte, ne contient plus d'alcali, & n'en fournit aucune trace dans l'eau. L'incinération est donc un procédé détectueux pour connoître les principes fixes de la bile, & sur-tout pour déterminer leur proportion.

La bile considérée dans l'économie animale, est un suc qui paroît servir à la digestion. Sa qua-

fiut favoneuse la rend capable d'unir les matières huileuses à l'eau. Sa saveur amère indique qu'elle stimule les intestins, & qu'elle favorise leur action sur les alimens. Roux, célèbre médecin chimiste de la faculté de Paris, que la mort a enlevé beaucoup trop tôt à ces deux sciences, croyoit que la bile avoit encore pour principal usage d'évacuer hors du corps la partie colorante du sang. Il paroît qu'elle est décomposée dans le duodenum, par les acides qui existent ou qui se développent presque toujours dans les organes de la digestion. Au moins est-il certain qu'elle est fort altérée, sur-tout dans sa couleur, lorsqu'elle fait portion des excréments qu'elle colore. Aussi les bons médecins tirent-ils souvent des inductions très-utiles de l'inspection de ces matières, pour savoir quel est l'état de la bile, des intestins où elle coule, & celui du foie qui la sépare. Mais cet usage de la bile par rapport à la digestion, à la formation, à la coloration & à la sortie des excréments, n'est pas le seul que l'on doive connoître dans cette liqueur. La masse considérable que présente le foie comparé aux autres viscères, la grande quantité de sang qui y est versée, annonce une bien plus grande influence dans les fonctions de ce viscère & dans les usages de la bile qu'il prépare. En analysant la chair ou le parenchyme du foie, on y trouve une grande quantité de graisse; un hazard m'a fait découvrir que ce viscère semble être en grande partie composé d'une huile concrète, analogue au blanc de baleine. C'est dans l'histoire de la bile que doit être placée celle de la nature chimique de l'organe destiné à la préparer. J'insérerai donc ici ce que j'ai consigné à cet égard dans les annales de chimie, tome 3. J'y joindrai l'analyse du foie de rat, qui a été faite par M. Vauquelin, & qui a été communiquée aux savans dans le même ouvrage, tome 10.

O B S E R V A T I O N

Sur un changement singulier opéré dans un foie humain par la putréfaction.

On ne connoît que très-peu jusqu'à présent la nature intime ou la composition des différens tissus fibreux qui composent le corps des animaux. Si l'on en excepte les os dont l'analyse a été bien faite par Chédeu & les chimistes qui l'ont suivie, la chair musculaire, les membranes, les tendons, les ligamens, la pulpe cérébrale & nerveuse, le parenchyme des viscères, qu'on a regardé presque comme une seule & même substance plus ou moins travaillée, organisée, animalisée, ne sont point réellement connus; tout annonce que leur matière composante n'est pas la même, que les élémens qui les forment, sont dans des proportions très-différentes, & que leur tissu composé de principes autrement combinés, est ainsi destiné à différens usages. En attendant que l'analyse exacte ait

répondu à ces questions, il faut recueillir avec soin tous les faits qui peuvent y servir. J'ai déjà ramassé plusieurs de ces faits dans différens ouvrages; celui que je vais offrir est de nature à pouvoir répandre quelque lumière sur la bile & les maladies du foie.

Feu M. Poulletier de la Salle qui avoit consacré sa vie à l'étude des sciences utiles, & qui cultivoit sur-tout l'anatomie & la chimie médicale, avoit exposé à l'air un morceau de foie humain suspendu à une ficelle; ce morceau sans se détruire par la putréfaction, avoit d'abord répandu une odeur infecte; des larves d'insectes, & sur-tout du dermeste du lard, de la bruche, &c., l'avoient rongé; enfin il s'étoit desséché peu-à-peu & réduit en une matière grise & friable. Il y avoit plus de dix ans qu'il étoit ainsi exposé, & depuis trois ou quatre il ne paroissoit plus subir de nouvelles altérations. M. l'Oulleter desira de connoître sa nature, & le porta dans mon laboratoire, en mai 1785. Le premier aspect de ce morceau de foie l'auroit fait prendre pour une substance terreuse, analogue à l'agrite minérale. Mais en l'examinant de plus près, on y voyoit encore des portions de membranes desséchées, & conservant une couleur brune & des filets vasculaires également desséchés: frotté sous le doigt, il étoit gras & doux au toucher, comme une forte de savon.

L'examen que nous fîmes de ce foie, nous donna des résultats très-différens de ceux que son aspect sembloit annoncer.

1°. On en a mis un petit morceau sur un charbon allumé; il s'est d'abord ramolli; il exhaloit une odeur de graisse brûlée; il s'est bientôt tout-à-fait fondu, boursofflé, poirci, & il a laissé une matière charbonneuse, légère, qui, chauffée très-fortement, s'est convertie en une cendre blanche. Cette première expérience annonçoit que cette substance animale n'étoit pas réduite à un squelette purement terreux, comme son premier aspect l'auroit pu faire croire, & nous engagea à mettre plus de soin dans son analyse.

2°. Quoique nous ne pussions pas espérer d'obtenir un résultat bien exact de la distillation de cette matière, en raison de la petite quantité que nous pouvions soumettre à cette expérience, nous avons cru devoir la tenter sur une demi-once. Il a passé d'abord quelques gouttes d'une eau blanche, d'une odeur fade; une fumée blanche plus épaisse & manifestement huileuse, a bientôt succédé au premier produit; cette vapeur s'est condensée en une matière blanche, concrète, adhérente au col de la cornue; alors il s'est répandu une odeur très-infecte; l'huile concrète a pris une couleur rousse; on a obtenu du gaz hydrogène carboné. Il a paru qu'une grande partie de la substance du foie avoit passée sans décomposition. On a remarqué que l'huile concrète, ramassée dans le col de la cornue & dans le ballon, avoit une ap-

parence lamelleuse & cristalline. Les produits n'ont montré aucun caractère d'acide ni d'alcali.

3°. Un gros de ce foie séché a été mis dans deux onces d'eau distillée, une petite partie parut se dissoudre dans l'eau, à l'aide de la chaleur. Cette dissolution étoit blanchâtre, opaque, elle avoit une légère odeur savonneuse, & présentoit une grande quantité de bulles par l'agitation; elle avoit une odeur fade & verdâtre faiblement le sirop de violettes. L'eau de chaux sans la précipiter sensiblement, a rendu fort odeur un peu scride. La portion de foie non dissoute par l'eau, s'est fondue par la chaleur, & s'est cristallisée en se refroidissant. Elle a exhalé une odeur grasse, & a fini par s'enflammer.

4°. On a traité un gros de foie desséché par une once de lessive de potasse caustique à froid & par la simple trituration, l'alcali a paru agir très-sensiblement sur cette substance; il s'est dégage une légère odeur d'ammoniacque; la lessive est devenue moussueuse. En chauffant ce mélange, la liqueur a pris une couleur brune. Elle exhaloit l'odeur de l'acide chauffé; après environ un quart-d'heure d'ébullition, on a filtré la liqueur toute chaude; elle étoit d'une couleur rousse foncée; elle a passé assez bien à travers du papier joseph. En refroidissant cette dissolution est devenue concrète, brune; l'eau distillée bouillante la dissolvait en toute proportion & sans laisser de résidu; toute la matière du foie avoit été dissoute par l'alcali fixe, même la portion membraneuse & fibreuse que nous y avons décrite. La dissolution dans l'eau moussait très-fortement par l'agitation; en refroidissant elle s'est troublée & a déposé quelques flocons blancs légers. L'eau de chaux l'a décomposée & précipitée en flocons abondants. Les acides en ont opéré de même la décomposition, ainsi que les sels neutres terreux. Il n'étoit pas douteux que l'alcali avoit dissous une matière grasse, huileuse, & formé un savon homogène. L'indissolubilité de la matière du foie dans l'eau, ou au moins sa très légère solubilité, annonçoit qu'elle consistoit pour la plus grande partie dans une substance huileuse, concrécifiable, très-dissoluble dans les alcalis, & formant facilement du savon avec cet ordre de matières salines. Il ne s'agissoit plus que de connoître la nature de cette matière huileuse, & de déterminer si elle n'étoit pas réunie avec quelques autres substances animales. L'expérience suivante a répandu beaucoup de lumières sur cet objet.

5°. Un gros de foie humain desséché, réduit par le pilon en une espèce de poudre grasse, a été traité par deux onces d'alcool donnant 36 degrés à l'aréomètre de M. Baumé. On a aidé l'action de cette liqueur par une chaleur douce; après deux jours de contact, l'alcool avoit une couleur rousse, une odeur légèrement scride étoit ajoutée à celle qu'il a coutume de répandre. On a filtré ce liquide pour séparer la portion dissoute de la partie sur laquelle l'alcool n'avoit point eu d'action; une goutte

de cette espèce de teinture versée dans l'eau, donna un nuage blanc, très-épais, & une précipitation très-sensible. Evaporée dans une capsule de porcelaine, à la chaleur du bain de sable, elle laissa une plaque jaunâtre qui paroisoit au premier coup-d'œil être une matière résineuse. Cependant l'eau appliquée à cette matière en a dissous une petite partie, & lui a donné une couleur blanche & une forme grenue qui l'a fait ressembler à une huile grise concrète.

La portion du foie non dissoute par l'alcool, pesoit un demi-gros après avoir été séché, l'alcool avoit donc enlevé à-peu-près la moitié de son poids. Quatre autres onces de ce dissolvant appliquées en deux reprises à ce morceau de foie, en ont dissous encore une partie; il est resté près de 20 grains non dissous, & on reconnoit que ce résidu étoit formé de membranes & de vaisseaux qui avoient échappé à l'alcool. Les parties dissoutes par cette liqueur dans les deux dernières opérations, ressembloient entièrement à la première; l'eau leur enlevait aussi une petite quantité de matière colorante & savonneuse. La substance séparée de la dissolution dans l'alcool par l'eau, & précipitée en flocons blancs, a été examinée à part. C'étoit celle sur laquelle il a paru nécessaire de fixer plus particulièrement son attention. Les propriétés qu'elle a présentées, nous ont conduits à un résultat entièrement différent de ce qu'on savoit jusques-là sur l'analyse animale. Nous avions séparé 17 grains de cette substance pure, & débarrassée de la portion dissoluble dans l'eau. Elle étoit d'une couleur jaunâtre, douce & grasse au toucher, comme une huile concrète; on l'a mise dans un matras qu'on a plongé dans l'eau chaude. Elle s'est ramollie & entièrement fondue, avant que l'eau fut bouillante; & toute-à-fait liquide, elle avoit une couleur jaune brune, & une légère odeur de cire fondue; la légitimité qui distinguoit cette substance avant l'action de l'alcool, n'existoit plus après sa dissolution dans cette liqueur; quand elle a été bien liquéfiée, on l'a coulée dans une capsule de porcelaine; elle s'est fixée en une plaque solide, cassante, très-lisse par sa face attachée à la couverture de la capsule. Elle se cassoit net & avec un petit bruit; on voyoit dans son intérieur un tissu lamelleux & manifestement cristallin. L'alcool chaud la dissolvait complètement; elle a présenté toutes les propriétés de l'huile animale concrète qu'on nomme dans le commerce *huile de baleine*; avec la seule différence qu'elle n'étoit pas aussi sèche, aussi blanche, aussi transparente que le vrai blanc de baleine, & qu'elle étoit d'ailleurs plus dissoluble dans l'alcool, que ne l'est cette huile animale.

6°. On a mis deux gros de foie desséché, coupé en petits morceaux dans un matras qu'on a tenu dans de l'eau chaude à 68 degrés du thermomètre de Réaumur. Une partie du foie s'est ramollie & s'est fondue; l'effort de la pression a séparé la portion d'huile liquéfiée, & cette huile rendue concrète

ciété par le froid, présentoit, à très-peu de chose près, les caractères de celle que l'alcool avoit dissoute. Les deux seules différences que nous y avons reconnues, étoient 1°. que l'huile extraite immédiatement du foie, avoit plus de couleur & de sécheresse que celle que l'alcool avoit enlevée à cette matière animale; 2°. qu'elle contenoit une portion de savon que l'eau avoit séparé de la dissolution alcoolique dans le premier cas.

7°. Cette portion de matière savonneuse, regardée d'abord comme un extrait dans nos premières expériences, a fixé ensuite notre attention; il étoit certain que l'eau comme l'alcool, l'enlèveroit au foie desséché; mais il falloit reconnoître exactement sa nature. Le peu de foie altéré que nous avions pour faire nos essais, ne pouvoit pas suffire aux expériences nombreuses, nécessaires pour avoir une connoissance exacte des principes qui forment ce savon, & de leurs proportions. Pour ce que nous avons pu déterminer, c'est que ce savon paroît formé de la même huile concrétissable, que celle qui avoit été extraite par l'expression & par l'ammoniaque & la soude. Nous avons même conjecturé qu'avant l'altération complète de ce foie, & la conversion totale en substance huileuse concrète, cette huile étoit d'abord dans l'état savonneux, une entièrement à la soude & à l'ammoniaque. Ce qui nous a conduit à cette conjecture, c'est que la portion du savon ammoniacal qui restoit encore dans ce morceau de foie, & dont la présence étoit démontrée & par l'odeur ammoniacale dégagée par la chaux vive, & par sa dissolubilité dans l'eau, nous a paru être plus abondante dans la portion la plus profonde & la moins exposée à l'air du morceau de foie que nous avons examiné.

Les faits qui ont été exposés ont, comme je l'ai déjà annoncé, été découverts au commencement de l'année 1785; ils étoient consignés dans mon journal d'expériences, & j'attendois d'autres faits analogues, pour les lier à l'ensemble de l'analyse animale; en un mot, je ne le regardois que comme une simple découverte isolée, lorsqu'en 1786 une grande occasion d'examiner des matières animales enfoncées dans la terre, à toutes les époques depuis pins de 42 ans jusqu'à quelques mois; celle de la fouille du cimetière des Innocens m'offrit, dans les débris des corps, un savon ammoniacal, formé par une substance huileuse, entièrement analogue à celle qui seloit la base du fais desséché dont j'ai fait l'histoire. La nature & les propriétés de ces matières animales converties en une huile semblable au blanc de baleine, unies à une grande quantité d'ammoniaque, sont la matière d'un mémoire qui sera consigné dans l'article de la putréfaction. Il me suffira d'annoncer ici que la conversion de la substance du foie en une huile concrète, analogue au blanc de baleine, n'a plus été pour moi un fait isolé, & à l'obscurité la plus vive à tout-à-coup éclairé ce point de l'analyse animale. Il m'a paru démontré

Chimie. Tome II,

que par les progrès d'une décomposition lente, beaucoup de parties molles éprouvoient dans le corps des animaux morts une conversion semblable à celle du foie qui fait l'objet de ce mémoire. J'ai reconnu encore que sans véritable altération putride, le corps des quadrupèdes & même celui de l'homme, contenoit cette substance huileuse concrète, comme le cerveau & la cavité vertébrale des cétacés; enfin que dans quelques cas cette matière huileuse se trouve plus abondante, & s'amasse dans plusieurs cavités, où elle forme des concrétions souvent très-nuisibles à l'économie animale. Je dirai ailleurs comment cette substance grasse concrète, qu'on extrait si abondamment du corps des cétacés, diffère de la graisse ou de la matière adipeuse. Je tâcherai de faire voir ou de déterminer comment la base des organes mous des animaux se convertit en cette espèce d'huile concrète, comment l'ammoniaque se forme en même-temps dans le corps des animaux. Je terminerai ici l'histoire du premier des faits qui s'est présenté à moi dans la découverte de cette singulière substance, & pour ne point interrompre l'ordre des découvertes auxquelles celle-ci m'a pour-ainsi-dire conduit, je crois devoir joindre à ce mémoire, mes observations sur la nature de la substance feuilletée, trouvée par feu M. Poulletier, dans les pierres biliaires humaines, & sur celle de quelques concrétions de la vésicule du fiel, qui n'ont point encore été décrites par les médecins.

DES CALCULS BILIAIRES.

Toutes les fois que la bile séjourne dans la vésicule par une cause quelconque, & sur-tout par les serremens spasmodiques, comme dans la mélancolie, les accès hystériques, les longs chagrins, &c. elle s'épaissit, & donne naissance à des concrétions brunes, légères, inflammables, d'une saveur amère très forte, qu'on appelle calculs biliaires. Ces concrétions sont souvent en très-grand nombre; elles descendent la vésicule, elles la remplissent quelquefois entièrement; elles produisent des coliques hépatiques violentes, des vomissemens, l'ictère, &c. J'en distingue trois variétés, les uns sont bruns, noirs, irréguliers, tuberculeux, & formés comme par grumeaux; les autres, plus durs, bruns, jaunâtres ou verdâtres, offrent des couches concentriques, & sont souvent recouvertes d'une croûte sèche, une & grise. Leur forme, est ordinairement anguleuse & polyèdre. La troisième variété comprend des concrétions blanches & ovoïdes plus ou moins irrégulières, couvertes d'une écorce blanchâtre & souvent inégale, formées de couches comme sphériques ou de lames cristallines, transparentes & souvent rayonnées du centre à la circonférence.

Les calculs biliaires de la seconde variété ont été examinés par Poulletier, il a observé qu'ils

Cccc

confidérable, & à peine en obtient-on quelques grains d'un gros de calculs biliaires.

Les pierres de la vésicule du fiel des quadrupèdes, & spécialement celles du porc, que les bouchers ont grand soin de ramasser pour l'usage de la peinture, sont dissolubles dans l'alcool, mais ne contiennent pas de matière cristalline. Voilà les quatre faits que j'ai pu recueillir de M. Boullart lui-même.

Je conservois depuis plusieurs années deux vésicules du fiel absolument remplies de pierres biliaires, lorsqu'en 1783, la découverte que je fis sur la nature huileuse du foie des bœufs, découvrit dont il a rendu compte dans le mémoire précédent, me conduisit à rechercher si elles pouvoient être les concrétions biliaires. J'en traiai deux onces en une fois par l'alcool, & voici ce que j'observai. Ces pierres étoient polies, à quatre faces les unes sur les autres, tris ou dehors, & d'un vert brun en dedans; deux livres d'alcool suffirent à peine pour dissoudre, à l'aide d'une chaleur douce, les deux onces de calculs biliaires réduits en poudre. Il y eut même quelques portions plus brunes & plus dures qui résistèrent de se dissoudre. On filtra la dissolution chaude; elle passa très-claire avec une couleur jaune un peu verdâtre; en refroidissant, elle déposa promptement une grande quantité de cristaux blancs, brillans, en lames ou paillettes, semblables à celles de l'acide boracique concret, & qui bien démontré par cette expérience que cette matière avoit été dissoute par l'alcool chaud, & s'étoit précipitée par le refroidissement de la liqueur. On recueillit sur un filtre près d'un gros de ces cristaux. Voici les phénomènes qu'ils présentent.

1°. Exposés au feu dans une cuiller d'argent, ils se fondirent promptement & se réduisirent en un liquide jaune, nacré, sans très-peu volumineux en comparaison des lames, & se ressemblant à du plomb fondu. Ce liquide, semblable à une huile, exhaloit une odeur grasse analogue à celle de la cire fondue; en continuant de le chauffer, il répandit une vapeur blanche très-piquante, absolument comme une huile rôtie, par le refroidissement, il se prit en une masse concrète un peu brune, sèche, & assez cassante; présentant dans la cassure des faces & des lames brillantes, qui annonçoient une cristallisation, ou au moins une tendance à cristalliser très-remarquable. Ces phénomènes se succédèrent rapidement, & se ont lieu à une chaleur assez foible. Si l'on chauffa tout à coup & fortement la matière cristalline, elle se réduisit tout à fait en vapeur, & ne laissa qu'une tache jaune brunâtre dans la cuiller.

2°. Cette matière n'éprouva aucune altération de la part de l'eau; elle ne s'y dissout point; traitée

avec l'eau bouillante, elle s'y fond & s'élève comme une huile à la surface de ce liquide; elle y devient concrète par le refroidissement.

3°. Les alcalis fixes caustiques liquides, dissolvent à froid cette substance. En triturant légèrement ces cristaux dans un mortier avec une lessive caustique de potasse & de soude concentrées, on les voit disparaître & se fondre dans les sels. Cette dissolution est très-dissoluble dans l'eau, elle mouffe par l'agitation; les acides, les sels neutres, terreux, & métalliques la décomposent; en un mot, elle présente toutes les propriétés du savon. Ces expériences préliminaires ne laissoient point de doutes sur la nature huileuse de ces concrétions, & les suivantes me servirent à déterminer plus exactement les caractères de cette espèce d'huile concrète & cristalline.

4°. L'acide nitrique sans la brûler ou l'enflammer, comme il fait à beaucoup d'huiles, la dissout tranquillement sans chaleur, sans effervescence, qu'on ne remarque qu'un peu à celle du camphre, qu'on nomme communément dans les pharmacies huile de camphre. L'eau la décompose, & en sépare des flocons & des lames cristallines sans altérations.

5°. L'alcool chaud en dissout une quantité assez grande; la plus grande partie se sépare sous forme cristalline par le refroidissement.

Ces derniers résultats me montrèrent l'analogie la plus frappante entre le blanc de balaie & cette substance cristalline extraite des calculs biliaires; entre cette dernière & la matière du foie desséchée à l'air, il n'étoit point douteux que la source de cette huile concrète ne fût dans le foie même. Un troisième fait aussi important que les deux autres, a mis cette vérité hors de doute.

On n'a décrit avec soin que depuis quelques années (1) une espèce particulière de concrétions biliaires, différentes de celles qui se trouvent le plus communément dans la vésicule du fiel, c'est-à-dire, des calculs cristallins, arrondis ou polygones, formés de couches concentriques, grès en dehors, brunes en dedans; celles dont je veux parler ne sont jamais aussi nombreuses que les premières dans la vésicule; on ne l'en a jamais trouvée remplie, comme cela a été observé, sur-tout pour les pierres biliaires ordinaires, presque toujours même on n'en a trouvé qu'une seule, d'un volume à la vérité plus considérable que celui des calculs biliaires les plus communs. Ces concrétions solitaires ont quelquefois la grosseur d'un œuf de pigeon; ordinairement elles présentent le volume d'un œuf de petit oiseau; elles sont d'une forme à-peu-près ovoïde, quelquefois cylindriques, toujours à-peu-près arrondies, mais très-rarement inégales en dehors. Leur couleur est

1. Voyez Walther, de concretis crystallinis vetricibus vespasii humidi roretis, in-folio, page 49. Histoire de la Faculté de médecine, année 1779, page 228. M. Vicq-d'Azis est celui qui a le mieux distingué ces espèces de concrétions biliaires cristallines des calculs biliaires ordinaires. Il en a fait grand usage.

blanche; quand on les casse, au lieu de couches concentriques brunes, on de bile simplement épaissie & déposée par couches, comme dans les plus communes de ces pierres, on trouve une structure lamelleuse cristalline ou striée, brillante, blanche, douce & onctueuse au toucher; quelquefois cette concrétion, au lieu d'offrir des grandes lames qui mesurent tout son diamètre, ne présente que des stries; elle varie aussi pour la couleur: outre le blanc brillant, argenté, ou plutôt micacé, il en est de jaunes, de verdâtres. Souvent cette concrétion est entremêlée de bile brune en masse; toujours on y observe un noyau de bile épaissie. Après Haller qui annonce dans une dissertation publiée en 1749 beaucoup de faits sur les calculs biliaires, Walter est celui qui a le mieux indiqué la structure de l'espèce qui nous occupe ici. M. Vicq-d'Azyr a traité cet objet avec plus de soin & d'exactitude encore que Walther. Mais il remarque avec raison, que les chimistes ne connoissent point la nature de ces concrétions. Il observe cependant, après en avoir décrit toutes les variétés, & après avoir présenté, pour-ainsi-dire, toutes les nuances de ces cristallisations animales, depuis la pierre biliaire ordinaire semée de quelques stries ou de quelques paillettes, jusqu'à celle qui est entièrement formée de cette matière cristalline, que cette matière paroît être la même que celle qui a été trouvée par Poulletier de la Salle dans les pierres biliaires communes. En effet les propriétés chimiques sont parfaitement analogues, comme les expériences que j'ai faites & que j'ai décrites me l'ont appris. Ces concrétions biliaires cristallines se ramollissent & se fondent à la chaleur comme la cire, mais à une température plus basse, & absolument comme le blanc de baleine. Elles se figent & se cristallisent par le refroidissement; l'eau n'a nulle action sur elles; l'alcool chaud les dissout, & il s'en sépare une grande partie par le refroidissement & sous la forme de lames brillantes & talqueuses. En un mot, elles m'ont présenté toutes les propriétés de la substance résidue du foie desséché & pourri à l'air, & des cristaux brillans que l'alcool sépare des calculs de bile épaissie.

Il paroît donc, 1°. que les espèces de concrétions cristallines se forment dans la vésicule, lorsque la matière analogue au blanc de baleine qui fait partie des humeurs contenues dans le foie est trop abondante pour rester en dissolution dans la bile; 2°. que les pierres biliaires ordinaires qui ne semblent être que de la bile épaissie, doivent, en grande partie, leur concrétion & leur formation à la présence de cette matière huileuse concrecible, & à la tendance à se concrétier; 3°. que cette matière abondamment contenue dans les pores, & peut-être même dans le parenchyme ou la propre substance du foie, est la source de plusieurs maladies de ce viscère, & notamment des concrétions de la vésicule du fiel.

En rassemblant tous les faits que j'ai consignés,

sur la nature du parenchyme du foie & des calculs biliaires, on pourroit soupçonner que le foie sert particulièrement à évacuer cette humeur huileuse hors du corps humain. J'ai fait voir ci-dessus que la base colorante de la bile, qui est unie à la soude dans cette liqueur, n'est point une véritable résine, comme l'ont annoncé plusieurs chimistes, & qu'elle a quelques analogies avec la matière des concrétions cristallines; enfin tout annonce dans le système du foie, un organe destiné à absorber la substance huileuse du sang & à priver cette humeur de la grande quantité d'hydrogène dont elle est surchargée, comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans cet article.

Il ne fera pas hors de propos de terminer cet article par quelques réflexions sur l'usage des fondans des calculs biliaires.

On a proposé le savon, le mélange d'huile de térébenthine & d'éther, &c. pour fondre ces calculs biliaires. Il est important d'observer qu'on n'en trouve dans la vésicule des boeufs qu'après les saisons sèches & la disette des fourrages frais, & qu'ils disparaissent au printemps & dans l'été, lorsque les animaux mangent abondamment des végétaux verts & succulents. Les bouchers sont fort au fait de ce phénomène; ils savent que c'est depuis le mois de novembre jusqu'au mois de mars que ces pierres existent dans ces animaux, & qu'à cette époque on n'en trouve plus. Ce phénomène fait assez connoître la puissance des sucs favonneux des plantes pour fondre les calculs biliaires. Cependant on ne doit point croire que les remèdes, quelques actifs & quelques volatils qu'ils soient, puissent parvenir en assez grande quantité dans la vésicule pour y dissoudre les calculs biliaires avec la même énergie qu'ils le font dans nos expériences.

Je crois que la cessation du spasme, & conséquemment la dilatation du canal cholédoque, est la véritable cause des bons effets des mélanges éthers proposés par M. Durande, dont je conseille d'ailleurs de supprimer l'huile de térébenthine, d'autant plus qu'il paroît démontré que, très-échauffante d'ailleurs, elle n'a d'avantage que comme diminuant la volatilité de l'éther, & que des observations ont déjà prouvé que le jaune d'œuf, & sans doute aussi beaucoup d'autres substances, peuvent être employées de même & sans avoir les mêmes inconvénients.

Examen chimique du foie de raie, (Roya botia Linnæus, par M. Vauquelin.)

Il n'est personne qui ne sache combien est volumineux le foie de raie en comparaison des autres viscères, tels que le cœur, l'organe respiratoire, &c.; qui ne sache combien sont délicats & tendres la structure & le tissu de cet organe; qui n'ait aperçu même à l'œil, combien il a le caractère gras; celles qui spécialement sont vivres par état à la préparation des aliments, connoissent bien tous

cés caractères ; elles ne peuvent pas ignorer , par exemple , qu'en faisant cuire cette matière dans l'eau , il en sort une grande quantité d'huile , qui reste liquide à la température ordinaire de l'atmosphère.

La couleur du foie de raie est grise , légèrement rosée lorsqu'elle est fraîche ; il y en a de plusieurs couleurs très-différentes , cela varie beaucoup.

Sa saveur est huileuse & salée , son odeur est marécageuse , & plus ou moins analogue à celle qui se répand dans les poissonneries de poisson de mer.

Première expérience. Un morceau de foie de raie , jeté dans l'eau bouillante , & laissé dans ce liquide pendant quelques minutes , reste sans se diviser , en une seule masse , qui acquiert même de la consistance & de la solidité. Dans cette opération , la chaleur & la force qui rapprochent les molécules du foie de raie , en expriment une huile légèrement jaune , qui reste liquide à la température de 10 degrés ; le foie de raie diminue de volume , mais sa forme ne change pas , si on ne le fait pas bouillir trop long-temps.

Seconde expérience. Une once 4 gros $\frac{1}{2}$ de foie de raie broyée dans un mortier de marbre , se font réduire très-facilement en une espèce de bouillie par l'action du pilon ; on voyoit manifestement à la surface de cette matière , des gouttes d'huile blanche ; on a ajouté 4 onces d'eau distillée froide , les matières se sont combinées assez facilement , & elles ont pris une couleur blanchâtre ; mais étendues d'une plus grande quantité de ce liquide , elles font devenues du plus beau blanc de lait , ou à-peu-près comme de l'orgeat très-étendu d'eau. On a passé la liqueur dans un tamis de soie très-fin , & cependant il n'est rien resté de la matière hépatique , si ce n'est la membrane du péritoine qui le recouvrait , & quelques portions du foie lui-même qui avoient échappé à l'action du pilon , mais qui se réduisoient en lait. Quelques heures après , il est venu hager à la surface de l'émulsion du foie de raie avec l'eau , une espèce de crème jaunâtre , & assez semblable à celle qui se forme sur du lait étendu d'eau ou sur une émulsion d'amandes ; c'est sans doute une portion d'huile qui se sépare & emporte avec elle une petite quantité de parenchyme. Cette émulsion est décomposée par les acides , même les plus foibles , qui la réduisent en petits grumeaux , qui se séparent de la liqueur claire , & qui vont occuper la partie supérieure , comme cela a lieu dans la décomposition des savons par les acides.

On a recueilli cette crème , & on l'a agitée pendant long-temps dans un mortier de marbre avec un pilon de bois. Cette manœuvre n'a point fait sortir de là un beurre , comme cela a lieu pour le lait de vache , mais une huile , à la vérité plus

épaisse que celle qui a été extraite par l'action du feu dans une des expériences suivantes. La parénchymateuse & albumineuse s'est prise en grumeaux , qui sont devenus bruns à l'air. Le papier bleu de mauves étoit verdi par cette dissolution , & celui de tournesol qui avoit été rougi par le vinaigre , a été ramené à sa première couleur. On verra plus bas , que la cause de l'alcalinité de cette liqueur tient à l'ammoniaque , provenant d'un commencement d'altération qu'avoit déjà subi le foie de raie depuis la mort de cet animal.

Troisième expérience. Le papier sur lequel le foie de raie a séjourné , devient huile & transparent absolument , comme quand on a répandu de l'huile à sa surface ; ceci indique une nature très-huileuse du foie de raie. Il est bien vrai , comme nous l'avons soupçonné plus haut ; que la propriété alcaline du foie de raie , est due à de l'ammoniaque , car le papier de tournesol rougi par le vinaigre , & remis à sa première couleur par cette substance , est redevenu rouge à l'air au bout de quelques heures , c'est-à-dire , quand l'ammoniaque a été dissipée , aussi le charbon du foie brûlé dans un creuset ne contenoit rien d'alcalin , comme on le verra plus bas , ce qui étoit arrivé s'il eût contenu de la soude ; cette ammoniaque s'y étoit formée par un commencement d'altération.

Quatrième expérience. On a pris 4 onces de foie recouvert de sa membrane , on les a écrasés dans un poëlon de faïence avec une cuiller d'étain , & on a chauffé légèrement ; aux premiers degrés de chaleur la matière s'est prise en grumeaux , desquels il se séparoit une grande quantité d'huile légèrement jaune ; on a continué de chauffer très-doucement , jusqu'à ce qu'il cessât de s'élever des vapeurs , alors on a passé l'huile au travers d'un linge fin , & par une forte pression on a séparé la plus grande partie de cette substance d'avec le parenchyme ; celui-ci étoit , comme on l'a dit plus haut , divisé en grumeaux d'une couleur un peu brune ; ils pesoient 4 gros 36 grains , mais il contenoit encore beaucoup d'huile , qu'il étoit impossible de faire sortir , & par conséquent impossible d'estimer ; l'huile qui a passé à travers le linge , pesoit 1 gros 7 grains. En réunissant les deux poids de l'huile & du parenchyme , nous avons 2 onces 3 gros 36 grains ; d'où il est clair qu'il y avoit une once 4 gros 36 grains d'eau : on pourroit y ajouter quelques atomes d'ammoniaque qui se font volatilisés au commencement de l'opération ; mais c'est si peu de chose , qu'on ne croit pas devoir en parler dans l'évaluation des principes secondaires du foie de raie.

Cinquième expérience. On a mis les 4 gros 36 grains de parénchyme du foie dont on avoit extrait l'huile par la chaleur , dans un creuset d'argile , & on l'a fait brûler à l'air libre. Après la combustion

tion du charbon, on a eu 8 grains d'une matière blanche à demi fondue, & qui étoit légèrement adhérente aux parois du creuset. On a mis cette matière avec de l'acide muriatique; à l'instant de l'effusion de l'acide, il s'est dégagé une vapeur sulfureuse, & bientôt la liqueur a pris une couleur légèrement jaune, mais il ne s'est produit aucune effervescence. On a mis de l'eau de chaux dans cette liqueur, & il y a eu un précipité qui étoit du phosphate de chaux. Les cendres du foie de raie sont donc du véritable phosphore de chaux.

Sixième expérience. On a pris 2 gros d'huile de foie de raie, & on a versé par-dessus de l'acide muriatique oxygéné, jusqu'à ce qu'elle cessât de lui faire perdre son odeur sur le champ, c'est-à-dire, jusqu'à l'époque où elle a été saturée d'oxygène comme huile, & sans être séparée en ses principes. Cette huile est devenue blanche comme de la graisse, son épaisseur a été aussi augmentée; elle étoit à-peu-près semblable à celle de la cire qu'on a tenue pendant quelque temps entre les doigts.

Septième expérience. Environ douze heures après l'extraction de l'huile de foie de raie, on a souflée à sa surface, on a aperçu qu'en continuant cette insufflation, il se formoit une pellicule blanche opaque, qui se divisoit ensuite en petites lames qui se mêloient avec l'huile, & y formoient comme autant de corps étrangers. Cette huile répandue en couches minces sur un vase de verre, s'épaississoit bientôt après, & devenoit opaque. On a remarqué que cette pellicule, & ces corps blancs & opaques qui se sont rassemblés au fond de l'huile, sont des globules d'eau emportés par l'air expiré, chacun de ces globules d'eau, quoique détendu du contact de l'air, par une couche d'huile, s'est entouré de *byssus fessica* de Linnéus. Comment la semence ou le germe de cette plante a-t-elle été portée dans cette humidité? Vient-elle de la poitrine, de l'air expiré, ou de l'huile? Ce ne peut pas être dans l'air atmosphérique qu'elle a été prise après l'expiration, car elle a été poussée par un tube de verre très-étroit.

Ces expériences prouvent d'une manière bien directe, que le foie de raie contient plus de la moitié de son poids d'huile toute formée entre ses molécules. La liquidité de cette substance grasse, démontre combien la respiration très-bornée chez ces animaux, influe sur la consistance de leurs parties, & spécialement sur le caractère de la graisse. Le foie des hommes & des quadrupèdes présente aussi quelquefois lorsqu'on le coupe ou qu'on le déchire, des traces d'huile, mais il s'en faut de beaucoup qu'elles soient aussi abondantes que chez les animaux amphibies nageants. Dans certaines parties du bas-ventre, dans les maladies du foie, ce viscère, comme l'ont remarqué les

médecins, se gonfle, devient presque blanc, ou plutôt gris comme celui de la raie, & prend enfin un caractère très-gras.

Les foies des volatils, & sur-tout des oies, qu'on expose à une haute température, & qu'on nourrit avec du lait, prennent aussi ce caractère; il est vraisemblable que le sang, en passant dans le système des artères mésentériques, spléniques, & hépatiques, & ensuite dans les divisions de la veine-porte subit, de grands changements dans sa nature intime, soit, comme l'ont dit les physiologistes, qu'il dissolye de la graisse dans le bas-ventre, ce qui n'est guère probable, soit plutôt qu'en parcourant ces différentes régions avec beaucoup de lenteur, le carbone qu'il contient, s'empare & lui seul de l'oxygène qui n'a été pour ainsi-dire, qu'interposé entre les molécules de tous les principes dans les poumons par la respiration, & que par conséquent, étant très-long-temps à regagner la poitrine, il prenne un caractère gras par la surabondance de l'hydrogène, & la communication aux organes qu'il nourrit, & dont il repare les pertes. Si cet effet a lieu chez les hommes & les quadrupèdes, dont la respiration est très-grande, dans les vaisseaux desquels le sang circule avec rapidité, il doit être infiniment plus marqué dans ces animaux singuliers, & pour-ainsi-dire horribles, comme le dit Linnéus, qui peuvent vivre pendant long-temps dans la fange ou la boue la plus infectée sans respirer, & qui, lorsqu'ils respirent, ne le font que d'une manière très-bornée, puisque leurs organes respiratoires sont très-peutés en raison de la masse de leur corps, & ne peuvent admettre par conséquent qu'une très-petite quantité d'air, qui ne parvient dans toute la masse des humeurs, que longtemps après, qu'il a été reçu, en raison de la lenteur avec laquelle ces humeurs se meuvent. Aussi ces animaux sont-ils tous plus ou moins mous & cartilagineux, pâles & même sans couleurs dans toutes leurs parties; aussi, ne sont-ils que très-peu sensibles, & ne jouissent-ils que d'une agilité très-médiocre. L'attribue aussi la prééminence du foie dans ces animaux sur tous les autres organes, au défaut de la respiration; de même que la liquidité & l'oleagineux, pour ainsi-dire de leur cerveau.

BILE. (Pharmacie.) On emploie l'extrait du fiel de bœuf & de plusieurs autres animaux comme un très-bon médicament stomacique; il supplée au défaut & à l'inertie de la bile, il donne du ton à l'estomac & rétablit les fonctions de ce viscère affaibli; mais il demande de grandes précautions dans son usage, parce qu'il est acide & échauffant, & il ne doit être administré qu'à petite dose, sur-tout chez les personnes sensibles & irritables. Quelques gens de l'art attribuent des vertus particulières au fiel des poissons, mais l'expérience n'a point du tout prouvé cette assertion, qu'il faut ranger dans la classe trop nombreuse

Des préjugés qui existent dans la matière médicale.

Non-seulement on a choisi la bile de quelques animaux particuliers, & sur-tout celles des poissons, de la carpe, du brochet, &c. mais on la prépare d'une manière particulière. C'est ordinairement par l'évaporation conduite jusqu'à la consistance d'extrait solide, qu'on dispose la bile à entrer dans les formules pharmaceutiques, car il est très-rare qu'on prescrive cette matière seule & sans addition. On la fait communément entrer dans des pilules avec des extraits amers; des préparations de fer, des écorces ou des racines en poudre. Il faut remarquer que l'extrait de bile, ou la bile épaisse; attire l'humidité de l'air, & que les pilules qui la contiennent se ramollissent & perdent facilement & promptement leur forme. Aussi, ne doit-on faire ces pilules qu'en petite quantité, & renouveler souvent leur préparation. On doit se garder de mêler la bile épaisse avec des acides, des sels neutres terreux, des sels métalliques; qui la décomposent, & qui forment un résidu chimique très-différent de ce qu'on vouloit d'abord donner. Voilà ce que le pharmacien doit savoir sur la bile, considérée comme faisant partie de plusieurs formules magistrales.

Quant aux différences des biles des divers animaux, le pharmacien doit exécuter scrupuleusement les ordonnances faites par le médecin, préparer comme il s'est prescrit les biles diverses, sans permettre de substituer la bile de boeuf à celles qu'on lui demande; il doit au contraire profiter de l'occasion d'exécuter ces formules particulières pour examiner les propriétés de la bile des oiseaux ou des poissons qu'on lui demandera, & les comparer à celles de la bile de boeuf. Le pharmacien doit toujours se souvenir que son art est un de ceux qui plus occupé que tout autre de préparer une grande quantité de matières différentes, &c. d'observer leur réaction réciproque, peut le plus contribuer au perfectionnement des analyses chimiques.

BISBESE. (*Pharmacie*) Dénomination des Arabes, pour désigner le macle.

BISMUTH. Le bismuth, *Bismuthum* ou *Vismuthum*, nommé autrefois *étain de glace*, (1) est un métal fragile, d'un blanc jaunâtre, fort pesant, dispose en grandes lames. Il s'enfonce un peu par les corps de marteau, mais il le brise bientôt en petites gaillottes; et se finit par se réduire en poudre. Il perd dans l'eau un dixième de son poids. Muschenbroeck dit, qu'un pesantier spécifique de 9,000 à 10,000 en fusion il donne 8,7168, après qu'on l'a fortement frappé 9,6188. Il est

susceptible de cristalliser en prismes polygones, qui se disposent en volutes grecques quarees, ou en trémies creusées entièrement semblables à celles du muriate de soude. Il n'a que très-peu d'odeur &c de saveur.

Le bismuth est souvent sous forme métallique dans la nature. On le reconnaît à fa couleur brillante jaunâtre, à fa mollesse, telle qu'il se laisse couper au couteau, à fa forme lamelleuse, & surtout à fa grande fusibilité. Il est ordinairement cristallin en lames triangulaires, qui sont posées les unes sur les autres par recouvrement. Il y a des échantillons dans lesquels lequelque métal est sous la forme d'octaèdres très-réguliers. Sa gangue est ordinairement quartziteuse; on en trouve à Scala, en Nésie, en Dalecarlie, & à Schneeberg en Allemagne.

Plusieurs minéralogistes modernes doutent de l'existence de la mine de bismuth arifénice. Cependant quelques-uns décrivent cette mine, & assurent qu'elle est chatoyante, souvent disposée en petites lames luisantes, d'un gris clair. Elle est aussi, suivant ces derniers, presque toujours mêlée de bismuth natif & de colbat, dont l'oxide sous forme d'efflorescence rougeâtre, se fait quelquefois remarquer à la surface des échantillons.

La mine de bismuth sulfureuse, ou le sulfure de bismuth natif, reconnue par tous les minéralogistes, est d'un gris blanchâtre, quelquefois tirant sur le bleu, à facettes ou en prismes aiguillés. Cette mine a l'éclat & la couleur de la mine de plomb, nommé sulfure de plomb, ou *galène*; elle présente presque toujours des facettes quadrées mais jamais on n'y voit de véritables fragmens cubiques; elle se coupe au couteau; elle est fort rare; on l'a trouvée à Balthain en Suède & à Schneeberg en Saxe.

Cronstedt parle aussi d'une mine de bismuth *mariale*, qu'il dit se rencontrer en grosses écailles cuboïformes, à Kongsberg en Norwège.

Enfin le bismuth se rencontre quelquefois dans l'état d'oxide. Il est sous la forme d'une efflorescence granuleuse, d'un jaune verdâtre & jamais rouge, à la surface des mines de bismuth. M. Kirwan croit que cet oxide de bismuth natif, est uni à l'acide carbonique. Quelques minéralogistes assurent qu'il y a un sulfate de bismuth mêlé à cet oxide.

Pour faire l'essai d'une mine de bismuth, on se contente de la fondre à une douce chaleur, dans un creuset, &c à l'aide d'une certaine quantité de flux réductif. Comme le bismuth est volatil, on doit le fondre le plus vite possible il vaut mieux même faire cet essai dans des vaisseaux fermés, comme le recommande Crasner.

La fonte en grand des mines de bismuth, n'est

[illegible]

pas plus difficile ; on fait une fosse en terre, on la couvre de bûches, qu'on place près les unes des autres ; on allume le bois, & on jette par-dessus la mine concassée ; le bismuth se fond & coule dans la fosse, où il se moule en pain orbiculaire. Dans d'autres endroits, on incline un tronc de pin creusé en canal, sur lequel on met un lit de charbon de bois ; on jette le bismuth dans cette espèce de caisse ; on le verse dans des moules de fer, ou dans des lingotières.

Le bismuth n'est que peu altéré par le contact de l'air. Il est extrêmement fusible, il se fond long-temps avant de rougir. Chauffé dans des vaisseaux fermés, il se sublime en entier. Si on le laisse refroidir lentement, il se cristallise en volutes grecques. C'est une des substances métalliques qui se cristallise le plus facilement. M. Brongniart est le premier chimiste qui ait bien réussi à cette cristallisation.

Si on tient le bismuth en fusion avec le contact de l'air, sa surface se couvre d'une pellicule qui se change en un oxide gris verdâtre ou brun, nommé *cendre* ou *chaux de bismuth* ; 19 gros de bismuth calcinés dans une capsule de verre, ont donné à M. Baimé 20 gros 34 grains d'oxide. Le bismuth chauffé jusqu'à rougir, brûle avec une petite flamme bleue peu sensible ; son oxide s'évapore sous la forme d'une fumée jaunâtre, qui se condense à la surface des corps froids, en une poussière de même couleur, nommée improprement *fleur de bismuth* ; cette poudie ne doit sa volatilisation qu'à la rapidité avec laquelle le bismuth brûle ; car si on l'expose seul au feu, elle se fond en un verre verdâtre, au lieu de se sublimer. Geoffroy le fils a observé, que sur la fin cet oxide de bismuth sublimé devient d'un beau jaune d'orpiment.

Les oxides de bismuth gris ou brun, sublimé & vitreux, ne sont que des combinaisons de ce métal avec la base de l'air vital ou l'oxygène. Ils ne se réduisent pas sans addition, parce qu'il y a beaucoup d'adhérence entre les deux principes qui les composent. Mais le gaz hydrogène, le charbon & toutes les matières combustibles organiques qui contiennent l'hydrogène & l'azote de ces corps, sont capables de les décomposer, & de leur rendre leur état métallique en s'emparant de l'oxygène avec lequel ces corps ont plus d'affinité que n'en a le bismuth.

M. Darcet ayant exposé du bismuth dans une boule de porcelaine non cuite à la chaleur du four qui cuit cette dernière substance, ce métal a coulé au-dehors par une crevasse du creuset ; la portion restée dans ce vaisseau, y a formé un verre d'un violet sale, tandis que le bismuth fondu à l'extérieur de la boule, étoit jaunâtre. Il paroît, d'après ce fait & plusieurs autres semblables, que les verres métalliques faits avec ou sans le contact de l'air, diffèrent les uns des autres.

Le bismuth, se ternit un peu à l'air, & il se

forme une rouille blanchâtre à sa surface. Il n'est point attaqué par l'eau, & il ne se combine point aux terres ; mais son oxide s'unit avec toutes les matières terreuses, & en facilite la fusion ; il donne une teinte jaune verdâtre aux verres dans la combinaison desquels on le fait entrer.

On ne connoît que peu l'action des substances salinoterreuses & des alcalis sur ce métal. Cependant j'ai remarqué que le bismuth, ainsi que son oxide, est dissoluble dans l'ammoniaque, quoiqu'ils ne soient ni l'un ni l'autre attaquables par les alcalis fixes. On verra à l'article de plusieurs métaux, & sur tout du zinc, qu'ils sont dissolubles dans les alcalis fixes comme dans l'alcali volatil. L'oxide de bismuth paroît donc différer de celui du zinc, par exemple, en ce qu'ayant une assez grande affinité pour l'ammoniaque, il n'en a presque point pour les alcalis fixes, tandis que l'oxide de zinc en a sensiblement pour tous les alcalis.

L'acide sulfurique concentré & bouillant est altéré par le bismuth ; cet acide se décompose en partie, & laisse exhaler du gaz acide sulfureux. La masse qui reste dans le vaisseau après la décomposition d'une partie de l'acide est blanche ; on sépare par l'eau, la portion qui est dans l'état salin, de celle qui est presque pur oxide & qui ne contient que très-peu d'acide ; la lessive évaporée fournit un sulfate de bismuth en petites aiguilles délicates. Ce sel peut être décomposé par le feu, par les substances salinoterreuses, par les alcalis, & même par l'eau en grande quantité. On ne connoît point le sulfate de bismuth.

L'acide nitrique dissout le bismuth avec une rapidité étonnante, ou plutôt ce métal décompose l'acide, & lui enlève très-prompement une partie de son oxygène. Le mélange s'échauffe beaucoup ; il s'en dégage des vapeurs rouges très-épaisses. Si l'on fait cette combinaison dans l'appareil pneumatique, on obtient une très-grande quantité de gaz nitreux ; c'est un moyen très-prompt & très-commode de se procurer ce gaz. Il faut cependant observer que si l'expérience est faite avec une grande quantité de bismuth en poudre fine, & de l'acide nitrique concentré, on n'obtient que du gaz azote, & même on n'obtient quelquefois aucun gaz. Dans ce dernier cas, il s'est formé de l'ammoniaque, & on peut le dégager de la dissolution ou de l'oxide de bismuth sec par la chaux vive. Il se précipite pendant cette dissolution, une poudre noire que Lémery a prise pour du bitume, que l'œr a regardé comme un oxide de bismuth très-calciné. M. Baimé l'a prise pour du soufre ; peut-être est-ce du charbon ; la dissolution nitrique de bismuth est sans couleur lorsqu'elle est chargée, elle dépose des cristaux sans évaporation. Ce dernier moyen combiné avec le refroidissement, fournit un nitrate de bismuth, sur la forme duquel les chimistes ne sont nullement d'accord. M. Baimé dit que on s'en est disposé en grosses aiguilles ouilles en polissoir d'acier.

diamant par un bout. M. Sage définit ces cristaux des prismes tétraèdres, un peu comprimés & terminés par deux pyramides tridres obtuses, dont les plans sont un rhombe & deux trapèzes. Par une évaporation lente, s'en ai obtenu des rhombes aplatis fort gros & analogues au spath calcaire d'Islande.

Le nitrate de bismuth détonne faiblement, & par scintillations rouges; il se fond & se boursouffle, & il laisse un oxide d'un jaune verdâtre, qui se réduit pas sans addition; ce sel exposé à l'air perd sa transparence en même-temps que l'eau de sa cristallisation se dissipe. Dès qu'on essaye de le dissoudre dans l'eau, il la rend blanche, laiteuse, & y forme un précipité d'oxide de bismuth.

Il en est de même, si l'on verse beaucoup d'eau dans la dissolution nitrique du bismuth; la plus grande partie de l'oxide de ce métal, se précipite sous la forme d'une poudre blanche nommée *blanc-de-fard* ou *magister de bismuth*. Cent grains de ce métal dissous dans l'acide nitrique, donnent 113 grains d'oxide précipité, en raison de l'oxigène qui s'y est fixé. Pour avoir ce précipité très-blanc & très-fin, il faut le préparer avec une grande quantité d'eau. Les femmes s'en servent pour blanchir la peau; mais il a l'inconvénient de noircir lorsqu'il est en contact avec des matières odorantes & combustibles; c'est même un des oxides métalliques, dans lesquels cette propriété est la plus énergique. Quoique le nitrate de bismuth soit en grande partie décomposé par l'eau, il en reste cependant une portion en dissolution, & cette portion ne peut être précipitée que par la chaux ou les alcalis. Ce caractère d'être précipité par l'eau appartient à toutes les dissolutions de bismuth.

L'acide muriatique agit difficilement sur ce métal; il faut que cet acide soit concentré, & qu'on le tienne long-temps en digestion sur le bismuth; cette dissolution réussit encore mieux en distillant une grande quantité d'acide muriatique sur le métal; il s'exhale une odeur fétide de ce mélange; on lave le résidu avec de l'eau qui se charge de la portion d'oxide métallique unie à l'acide. Le muriate de bismuth cristallise difficilement; il est susceptible de se sublimer, & de former une sorte de sel mou, fusible, nommé improprement *safran de bismuth*, qui attire fortement l'humidité de l'air; l'eau le décompose, & en précipite un oxide blanc. L'acide muriatique oxigéné brûle promptement le bismuth. Si on jette ce métal en poudre dans du gaz acide muriatique oxigéné, il brûle avec une flamme blanche, jaunâtre, très-sensible, & il prend la forme d'une poudre blanche; c'est alors du muriate de baryte.

On ne connoît point l'action des autres acides minéraux sur le bismuth. Parmi les acides végétaux il n'en est que très-peu dont on ait examiné l'action sur le bismuth. On ignoreoit presque entière-

Chimie, Tome II.

ment celle des acides citrique, malique, benzoïque, gallique, oxalique & même tartareux sur ce métal. Pott a dit que les acides du citron, du carotte, du bois distillé, formoient à l'aide de la chaleur des dissolutions d'une saveur amère & styptique. Bergman assure que l'acide oxalique ternit le bismuth, que son oxide se dissout dans l'acide, & qu'il donne un sel blanchâtre, pulvérulent, presque indissoluble dans l'eau; l'acide oxalique versé dans la dissolution nitrique de bismuth, y forme un précipité en grains polygones, transparents, que l'eau ne dissout presque point & ne décompose pas.

L'acide gallique précipite en jaune le nitrate de bismuth.

L'acide acétique dissout le bismuth à l'aide de la chaleur. Cette dissolution a une saveur amère & styptique; elle cristallise difficilement. Pott observe que l'oxide de bismuth fait par l'acide nitrique; est bien dissoluble par l'acide acétique, & que cette dissolution est cristallisable. Suivant Wessen-dorf, deux gros de bismuth dissous dans une once d'acide acétique concentré, forment une liqueur jaunâtre d'une saveur douce. Le métal se précipite bientôt en oxide noir. En sublimant la masse on a un sel blanc, brillant, d'une saveur douce, un peu astringente & soluble dans l'eau. On n'a point encore examiné l'action des acides animaux sur le bismuth, ni les sels que forme son oxide avec les acides.

Le bismuth est oxidé par le nitre ordinaire, mais sans détonation sensible. Ce métal ne décompose point du tout le muriate ammoniacal, mais son oxide en sépare complètement l'ammoniaque. On obtient dans cette expérience une grande quantité de gaz ammoniac, & le résidu contient la combinaison de l'oxide métallique avec l'acide muriatique. Si le bismuth n'agit point sur le muriate ammoniacal, en raison du peu d'action que l'acide muriatique a sur ce métal, la propriété de décomposer ce sel, dont jouit son oxide, est bien remarquable, & elle prouve qu'il se rapproche des substances salines.

Le muriate sur-oxigéné de potasse oxide très-promptement le bismuth.

Le gaz hydrogène altère la couleur du bismuth, & lui donne une teinte violette. Le bismuth lui enlève une partie du soufre qu'il tient en dissolution. Ce gaz est bien plus rapidement décomposé par l'oxide de bismuth, qui du blanc passe au noir, parce que l'hydrogène absorbe l'oxigène de l'oxide & le soufre s'unit au bismuth.

Le soufre se combine facilement au bismuth par la fusion; il en résulte une sorte de mine grise, bleuâtre & brillante, qui cristallise en belles aiguilles tétraèdres, semblables par leur couleur & leurs reflets aux plus beaux morceaux de sulfure d'antimoine.

Le bismuth, dit M. Pelletier dans son mémoire sur la phosphoration des métaux, n'a paru avoir

Dddd

peu d'assimilé avec le phosphore, j'ai cru même pendant long-temps que ce métal se refusoit à ce genre de combinaison; je l'ai fondue de diverses manières, & toujours avec très-peu de succès, comme l'on pourroit le juger par le détail des expériences suivantes.

J'ai fondu dans un creuset un mélange de deux onces de verre phosphorique, de deux gros de charbon en poudre & de deux onces de bismuth, le tout en poudres pendant la fusion il s'est dégagé beaucoup de vapeurs de phosphore; ayant retiré le creuset du feu, j'y ai trouvé le bismuth bien fondu, & occupant la partie inférieure du creuset; il étoit couvert d'un verre à demi-transparent, un peu litéux.

Ayant examiné le bismuth, j'ai observé qu'il ne différoit point sensiblement à l'aspect du bismuth ordinaire; il en avoit la couleur & la cassure; essayé au chalumeau, il donne au moment où il entre en fusion une petite flamme verte du resse, il s'y comporte comme le bismuth ordinaire.

J'ai fait un mélange de deux onces de bismuth & de deux onces de verre phosphorique; ayant procédé à la fusion, j'ai obtenu un calor de bismuth absolument semblable à celui de l'expérience précédente; le verre phosphorique qui le recouvrait avoit perdu de sa transparence; il étoit assez semblable à la couleur du jade.

J'ai encore tenté la phosphoration du bismuth en fondant un mélange d'une once d'oxide de bismuth, d'une once & demie de verre phosphorique, de deux gros de poudre de charbon. Le bismuth que j'ai obtenu de cette réduction ne m'a point paru plus phosphoré que celui des expériences précédentes.

J'ai aussi tenté la phosphoration directe du bismuth; j'ai donc fait fondre dans un creuset fixe des grains de ce métal, & lorsqu'il a été fondu j'y ai projeté par parties de petites morceaux de phosphore; ayant ensuite retiré le creuset du feu, j'ai examiné le bismuth que j'ai trouvé très-adhérent au fond du creuset; sa cassure étoit celle du bismuth, au chalumeau il a donné une très-petite flamme verte au moment où il est entré en fusion. Exposé quelque temps à l'air, il prend une couleur irisée; si on le lime & que l'on jette la limaille sur un charbon bien allumé, l'on voit qu'il se dégage de petites flammes verdâtres qui ont l'odeur de phosphore. Je dois avertir que pour bien observer cette phosphorescence, il faut être dans un endroit obscur.

L'on jugera d'après ce que je viens de rapporter sur la phosphoration du bismuth, que ce métal retient peu de phosphore. Je n'en évalue point la proportion à plus de quatre livres pour cent.

On ne connoît pas bien l'action de l'arsenic sur le bismuth, on sait que ce métal ne s'allie point au cobalt, & qu'il en reste séparé dans la fonte.

On ne connoît pas l'alliage du bismuth avec le tungstène & le molybdène.

Le nickel, dit Cronstedt, forme avec le bismuth un métal cassant & écailleux. La dissolution par l'acide nitrique peut séparer: quoiqu'imparfaitement, ces deux matières métalliques; par la propriété que nous connoissons au nitrate de bismuth d'être décomposé par l'eau.

L'alliage de manganèse avec le bismuth est inconçu.

L'antimoine s'unit au bismuth, mais on n'a point encore examiné cet alliage avec soin.

Le zinc & le bismuth ne forment point d'alliage connu, quoiqu'il paroisse pouvoir être utile dans les arts.

Le mercure dissout très-aisément le bismuth qui s'y combine en toutes proportions. Il résulte de cette combinaison une matière brillante, triable & plus ou moins solide, suivant la quantité de bismuth. Cette amalgame est susceptible de cristalliser en pyramides à quatre pans, qui quelquefois se réunissent en octaèdres. Le plus souvent on la trouve cristallisée en lames minces, qui n'ont point de forme régulière. On obtient cette cristallisation en faisant fondre cette combinaison, & en la laissant refroidir lentement. Lorsque on la chauffe dans une cornue, elle ne donne que très-difficilement le mercure, qui lui sert de dissolvant.

L'étain & le bismuth donnent, suivant Gellert, un alliage cassant & à facettes cubiques. Les poivriers allient quelquefois ce dernier métal à l'étain pour lui donner de la blancheur & de la dureté. Comme il lui communique beaucoup de roideur, & qu'il est plus cher que le zinc qui produit les mêmes effets sur l'étain, les ouvriers ne peuvent pas l'employer à plus d'une livre ou d'une livre & demie par quintal, & l'on n'a rien à craindre de ses effets sur l'économie animale, effets qu'une analogie marquée avec le plomb dans toutes les propriétés du bismuth, pourroient faire soupçonner semblables à ceux de ce métal dangereux. On peut départir le bismuth de l'étain à l'aide de l'acide muriatique, qui dissout le dernier & laisse le premier sous la forme d'une poudre noire, pourvu qu'on l'emploie frais. L'acide nitro-muriatique produit le même effet lorsque il est étendu d'eau.

Le plomb s'allie avec le bismuth, & donne un métal mixte d'un grain fin & serré, qui est aigre & cassant. Le mercure dissout le plomb avec la plus grande facilité. On fait cette amalgame en versant du mercure chaud dans le plomb fondu; elle est blanche & brillante, elle acquiert de la solidité au bout d'un certain temps; triturée avec celle de bismuth, elle devient aussi fluide que du mercure coulant. Il est bon d'observer que ce singulier phénomène a lieu dans l'union de trois métaux très-fusibles, très-pesants & plus ou moins volatiles.

Le fer ne forme point d'alliage avec le bismuth.

Le cuivre s'unit au bismuth & forme, suivant

Cellere, un alliage d'un blanc rougeâtre à facettes cubiques.

L'argent s'allie très-bien au bismuth & forme avec lui un métal mixte fragile, dont la pesanteur spécifique est plus grande que celle des deux métaux pesés séparément.

L'or s'unit au bismuth, & lui le blanchit en le rendant aigre & cassant. Comme ce métal est très-oxydable & très-fusible, il est aisé de le séparer d'avec l'or par l'action du feu combiné avec celle de l'air.

Le platine s'allie très-bien avec le bismuth, qui le rend d'autant plus fusible que ce dernier est en plus grande quantité. Cet alliage est aigre & cassant; il devient jaune, pourpre & noirâtre à l'air; on ne peut coupler ce métal mixte qu'avec la plus grande difficulté; il ne forme jamais qu'une masse peu ductile.

Le bismuth est employé par les potiers d'étain pour donner de la dureté à ce dernier métal. Il pourroit être substitué au plomb dans l'art de coupler les métaux parfaits, parce qu'il a, comme ce métal, la propriété de se fondre en un verre que les coupelles absorbent. Geoffroy le cadet a trouvé beaucoup de rapport entre ce métal cassant & le plomb. On ne peut que soupçonner les effets du bismuth sur l'économie animale; on croit avec assez de vraisemblance que son usage seroit dangereux comme celui du plomb. On connoît même quelques mauvais effets de ce métal appliqué extérieurement.

On se sert de l'oxide de bismuth, appelé *blanc de fard*, pour blanchir la peau; mais il faut alors éviter avec soin toutes les matières très-odorantes; & sur tout celles qui sont fluides. Le voisinage des boucheries, des voleries, des écuries, des latrines, même des odeurs fortes, influe tellement sur cet oxide, qu'il lui donne une couleur plus ou moins noire. La vapeur des suifures alcalins, celle des acides, produisent le même effet avec beaucoup d'énergie. On fait en physique une expérience qui prouve cette propriété. On trace des caractères avec une dissolution de bismuth sur le premier feuillet d'un livre blanc composé d'une centaine de pages; on imprime le dernier feuillet d'un peu de sulfure alcalin; quelques instans après la vapeur hépatique, portée par l'air qui circule entre tous les feuillets, arrive à l'extrémité du livre, & colore en brun foncé les caractères tracés sur la première page. On a dit que le gaz hydrogène sulfuré ou hépatique traversoit le papier; mais M. Monge a prouvé que c'est l'air qui le porte ainsi de feuille à feuille, puisqu'en collant ces feuillets les uns aux autres la coloration n'a plus lieu.

BISMUTH. (Méallurgie.) C'est un demi-métal ou métal imparfait, qu'on appelle aussi étain de glace; il est composé de petites lames ou feuillets minces poisés les uns sur les autres, & c'est après

l'étain la plus fusible de toutes les substances métalliques; sa couleur est d'un blanc jaunâtre, il se réduit très-aisément en poadre.

On trouve beaucoup de bismuth en Bohême & en Saxe, mais il se trouve presque toujours mêlé dans les filons avec des métaux & demi-métaux, & notamment avec le cobalt; on trie, aussi exactement qu'il est possible, le minéral de bismuth de toutes ces substances qui lui sont étrangères, afin de le fondre séparément pour en obtenir ce demi-métal.

Tout le bismuth que nous avons vu en Allemagne sort du sein de la terre à l'état vierge ou natif, c'est-à-dire, qu'il n'est minéralisé ni par le soufre, ni par d'autre, & c'est qu'il n'y a proprement que de celui-là dont on tire parti en Saxe par la fonte en grand, qui n'est qu'une espèce de liquation qui se fait sans fondants & sans addition de philosophie, d'autant plus aisément que ce demi-métal entre en fusion à un degré de chaleur très-faible. Nous avons donné au mot AZUR la manière, par la fonte en grand, d'extraire le bismuth du minéral de cobalt, qui souvent y est mêlé & disséminé en petits grains; nous ne répéterons point ici ce procédé en usage en Saxe, soit que le minéral de bismuth soit mêlé avec d'autres substances métalliques, soit qu'il se trouve simplement accompagné de sangue ou matrice.

Enfin pour tirer le bismuth de son minéral, il ne faut pas plus de travail que pour tirer l'antimoine du sien.

BISMUTH. (Pharmacie.) On a dit dans l'article précédent que le bismuth avoit été comparé au plomb par ses effets sur l'économie animale; on l'a craint comme ce dernier métal. Cependant il n'y a nulle expérience exacte sur ce point. Le bismuth ou ses oxides sont peu employés en pharmacie. Cependant on faisoit entrer autrefois l'oxide de bismuth dans quelques compositions extérieures, que l'on rangeoit parmi les desiccatifs. On n'en fait plus aujourd'hui aucune espèce d'usage, & le bismuth n'existe même plus parmi les drogues dans les laboratoires ou les magasins de pharmacie.

BISTORTE. (Pharmacie.) *Polygonum bistorta*. Bistorta. Cam. épit. 683. On cultive cette plante dans les jardins. Elle croît spontanément dans les pays chauds, sur le sommet des montagnes, dans les lieux humides. Elle est vivace.

La racine est officinale, & doit être classée parmi les plus forts astringens. La plupart des auteurs en recommandent l'usage dans le vomissement, l'avortement, les diarrhées, la gonorrhée, les fleurs blanches, l'esquinancie, la dysenterie, l'hémorrhagie & autres écoulemens tantérieurs que sanguins; dans les fièvres intermittentes, particulièrement la fièvre quarte, les petites vérolas, la rougeole, la peste & autres fièvres malignes; contre les hernies, les ulcères, les plaies, les chan-

cles & les maux de dents. Elle est vulnérable, balsamique, antiscorbutique, tonique, sudorifique; mais il faut l'administrer avec connoissance de cause. Il faut la choisir récente, grosse, bien nourrie & suffisamment desséchée, brunie en dehors, rougeâtre en dedans.

On mêle de la poudre de cette racine avec la farine en Suède, pendant les années de disette. Les Kamischadals & les habitants de la Sibérie en mangent, après l'avoir fait bouillir préliminairement dans de l'eau qu'ils rejettent; les Russes mêlent de cette racine avec d'autres ingrédients, pour amorcer les poissons. Elle sert encore à la teinture, & pourroit être utile aux tanneurs. L'herbe est aimée du bétail; la semence peut être employée à la nourriture des oiseaux de basse-cour.

La racine de bistorte entre dans la décoction, la poudre & les pillules astringentes, le diascordium, l'orvietan, le vinaigre thériaque.

(M. WILLEMIT.)

BISTORTIER. (*Pharmacie.*) Instrument de pharmacie; c'est un rouleau ou un cylindre parfaitement rond & poli, fait de buis ou de tout autre bois très-dur, dont on se sert pour mélanger les poudres des éciutaires. On s'en sert aussi pour étendre & aplanner les tablettes.

BISTORTIER. (*Pharm.*) Instrument de pharmacie qui, comme l'indique le nom latin, sert à agiter ou mélanger les poudres qui doivent entrer dans une composition médicamencieuse, épaisse, telle qu'un électuaire; cet instrument doit toujours être fait d'un bois dur & poli, quelquefois il a la forme d'une espèce de pilon à long manche, avec lequel on ne peut piler que par un bout; d'autres fois, c'est un simple rouleau ou cylindre de bois, parfaitement rond & égal à ses deux extrémités. Lorsqu'il a cette forme, on peut non-seulement employer une de ses extrémités, pour mélanger les poudres dans un électuaire, mais encore on s'en sert pour étendre & aplanner les pâtes dont on forme les tablettes & pastilles.

BITHYNOS. (*Pharm.*) Surnom donné à une pastille décrite par Galien, & une espèce d'emplâtre décrit par le même auteur, & qu'il dit être utile contre l'hydropisie.

BITUMES. On a coutume de ranger les bitumes parmi les minéraux, & de les regarder comme un genre des corps combustibles que le règne minéral renferme. Mais cette manière de voir ne peut être conforme à la vérité, qu'autant qu'on confond parmi les minéraux tous les corps placés dans la terre & même dispersés à sa surface, lorsqu'ils n'ont ni l'organisation végétale, ni l'organisation animale, qu'autant qu'on comprend dans la même classe tous les corps ensevelis dans les couches du globe, sous le nom de fossiles. Mais cette confusion ne subsistera pas toujours; elle sera détruite, lorsqu'on ne tiendra plus à cette distinction

de trois règnes qui, en généralisant trop les idées, les restreint & les resserre dans une conception trop étroite. En effet, que faire de la lumière, du calorique, de l'air, de l'eau, des gaz, dans cette distinction des trois règnes? Pourquoi ne point former un règne particulier de ces êtres? Comment n'a-t-on pas senti qu'il y a une différence essentielle entre les couches minérales, proprement dites pierreuses & dures, & les couches surajoutées aux premières, formées de débris d'animaux marins, de coquilles, & celles fur-tout qui tiennent des matières combustibles, végétales & animales ensevelies? Pourquoi ne pas distinguer ce règne de couches modernes ajoutées aux couches antiques & primitives du globe? Pourquoi embrasser d'une même idée, & rapprocher par une même dénomination, des corps que la nature a si grandement séparés par la composition intime & par les époques diverses de leur formation? Pourquoi ne pas faire ces notables différences, en donnant le nom de fossiles aux matières vraiment ensevelies sur le globe primitif, & qui en cachent depuis long-temps la face primitive?

En suivant cette idée, c'est dans la classe des fossiles, & non dans celle des minéraux, qu'il faut placer les bitumes. C'est d'après cette idée que nous allons les considérer.

Les bitumes sont des substances combustibles, huileuses, solides, molles ou fluides, dont l'odeur est forte, âcre, aromatique, & qui sont beaucoup plus composées que les corps minéraux combustibles, parmi lesquels on les a placés jusqu'ici. On les trouve formant des couches ou des tas irréguliers dans l'intérieur de la terre, ou suintant à travers les rochers, ou nageant à la surface des eaux. Leur caractère est de brûler le plus souvent avec une flamme rapide, lorsqu'on les chauffe avec le contact de l'air, comme le font les matières formées par les organes des végétaux & des animaux, auxquelles on a donné le nom d'*huiles*. Leur analyse est beaucoup moins exacte que celle des matières terreuses, salines ou métalliques, ou des véritables minéraux, parce que l'action du feu les altère singulièrement, & en extrait des principes qui réagissent les uns sur les autres, à mesure qu'ils se volatilisent. C'est une analogie frappante que les bitumes ont avec les substances animales & végétales; & cette analogie dans l'analyse, en annonce déjà une dans leur origine. On retire par la distillation des bitumes une eau odorante, plus ou moins colorée & saline, un sel acide, souvent concret, quelquefois de l'ammoniaque & des huiles qui, de légères qu'elles font dans le commencement, deviennent d'autant plus épaisses & colorées, que la distillation est plus avancée, & que le feu est plus actif. Il reste après cette analyse un charbon plus ou moins volumineux, épais, léger, rare, brillant ou compact, suivant les différentes espèces de bitumes. Cette analyse indique que ces corps inflammables ont une origine végétale ou

animale, comme nous le dirons avec plus de détail, lorsque nous aurons parcouru l'ensemble de leurs propriétés génériques.

Les bitumes éprouvent quelques altérations de la part de la lumière ; lorsqu'ils sont fluides, leur couleur se fonce, & leur odeur se modifie dans des vaisseaux transparents. L'air les épaissit par l'évaporation successive de leur humidité, dont l'atmosphère se charge d'autant plus promptement que l'air est plus sec. Leur principe odorant ou leur arôme se dissipe en même proportion, & ils passent peu-à-peu de l'état de fluidité à la ténacité & à la solidité, mais il faut un grand nombre d'années pour leur faire éprouver cette dernière altération.

L'eau dans laquelle on fait bouillir les bitumes, ne les dissout pas ; mais elle se charge de leur principe aromatique, & elle exhale l'odeur qui leur est propre. Il semble donc que l'eau a plus d'affinité avec leur principe odorant que la matière huileuse du bitume, & peut-être pourroit-on ainsi ôter à ces corps toute leur odeur. Mais en réfléchissant à cette propriété, on est porté à croire que c'est une petite portion du bitume même qui se dissout dans l'eau, & que si jusqu'actuellement on a regardé les bitumes comme entièrement indissolubles dans l'eau, c'est seulement parce que leur dissolubilité est en effet si faible, qu'elle paroît presque nulle. La même application de ce principe a lieu pour les huiles volatiles. Voyez l'article des huiles.

On n'a point essayé l'action des matières salino-terreuses sur les bitumes. Cependant la chaux paroît capable, ainsi que les alcalis purs, de s'unir avec ces matières combustibles, & de former avec elles des composés solubles dans l'eau, auxquels on donne le nom de *syvon*.

On a peu examiné la manière dont les acides minéraux concentrés sont susceptibles d'agir sur les bitumes. On fait seulement qu'ils les dissolvent ou les brûlent suivant leur état de concentration, comme ils font à l'égard des huiles.

On n'a pas plus examiné l'action des sels neutres, du gaz hydrogène, du soufre & des métaux sur les bitumes ; & en général les propriétés chimiques de ces corps ne sont que très-peu connues. Ce travail est entièrement neuf, & il offriroit certainement des résultats utiles, à ceux qui le suivroient dans les principales espèces de ces corps.

Les naturalistes se font beaucoup plus occupés de l'origine & de la formation des bitumes, que les chimistes ne l'ont fait de leur analyse. Il y a eu plusieurs opinions sur cet objet. Les uns ont pensé que ces corps combustibles appartiennent en propre au règne minéral, & qu'ils sont aux métaux ce que les huiles & les résines sont aux êtres organiques. Cette analogie qui a quelque chose de séduisant pour l'imagination, ne s'accorde pas avec les faits ; car on ne connoît rien dans le règne minéral qui ait le caractère huileux. Aussi l'opinion de ceux qui attribuent les bitumes à des substan-

ces végétales enfouies dans l'intérieur de la terre, & altérées par l'action des acides minéraux, a-t-elle eu beaucoup plus de partisans que la première. En effet, tout atteste que les bitumes proviennent des matières organiques. Il se rencontre constamment dans leur voisinage un grand nombre de ces matières sous des formes très-reconnoissables ; d'ailleurs ils ont eux-mêmes les caractères chimiques des substances formées par la vie, & l'on est parvenu à les imiter jusqu'à un certain point, en combinant des huiles avec l'acide sulfurique concentré. L'histoire chimique des matières végétales apprend que cet acide mis en contact avec les huiles volatiles les durcit, les noircit, leur donne une odeur forte & piquante, & semblable à celle des bitumes. Mais ces corps sont-ils uniquement formés par les végétaux entoués, comme l'on avancé la plupart des naturalistes, & les animaux n'y contribuent-ils point pour quelque chose ? La grande quantité de bitumes qui existe dans l'intérieur de la terre, comparée avec le peu de bois ou d'arbre qu'on rencontre dans leur voisinage, & sur-tout le peu d'abondance des matières huileuses que ces végétaux contiennent, semblent s'opposer à ce qu'on attribue entièrement l'origine des bitumes aux individus du règne végétal. D'un autre côté, l'abondance de ces corps combustibles dans des endroits où l'on ne trouve que quelques traces des végétaux, & l'existence presque constante des dépouilles d'animaux entassées au-dessus des bitumes, doivent porter à croire que ces êtres organiques ont contribué pour beaucoup, & peut-être même plus que les végétaux, à la formation de quelques-uns. Observons encore que les couches successives de quelques bitumes qui se trouvent en masses continues dans l'intérieur du globe, annoncent que ces corps ont été déposés lentement & par les eaux, & que leur formation correspond à l'époque, où des amas immenses de coquilles & d'autres corps marins ont été formés par la mer. Ils ont donc été dans un état fluide, & ils se sont durcis par le laps de temps & par l'action des corps salins ou d'autres agents que l'intérieur de la terre contient en quantité. Elle est l'opinion que M. Parmentier a adoptée sur l'origine du charbon de terre, & qu'il a présentée avec toutes preuves : qu'il lui a été possible de rassembler dans un mémoire qu'il a lu à l'ouverture des cours du collège de pharmacie, il y a quelques-années. Les huiles & les graisses des animaux marins paroissent donc être un des matériaux dont la nature se sert pour former certains bitumes, tandis qu'il en est d'autres dont l'origine est manifestement végétale, & qui sont dus à des résines ou à des huiles volatiles enfouies & altérées dans la terre.

Les bitumes sont en assez grand nombre. Les naturalistes en ont fait plusieurs genres. En les considérant chimiquement, nous les regardons comme des espèces ou des sortes, parce qu'ils ont en effet tous les mêmes caractères, relativement à leurs

propriétés chimiques; les uns sont liquides, d'autres jouissent d'une consistance molle; il en est qui sont solides, & parmi ces derniers, les uns sont durs & susceptibles de poli, les autres sont friables. Nous en connoissons cinq sortes bien distinctes qui comprennent une grande quantité de variétés que nous indiquerons. Dans l'histoire de chacune de ces sortes, les cinq sortes sont le *succin*, l'*asphalte* ou *bitume de Jude*, le *jayet*, le *charbon de terre* & le *pitru*. Nous ne rangerons plus l'ambre gris parmi les bitumes, mais parmi les produits des animaux.

Cet article n'ayant été consacré qu'au genre des bitumes, & n'exposant que les caractères généraux de ces corps, ce sera dans les articles particuliers de chaque sorte, que nous considérerons leurs caractères ou leurs propriétés spécifiques & leurs usages.

BITUMES. (*Pharmacie.*) Il n'y a rien à ajouter à ce qui a été exposé dans l'article précédent, par rapport aux bitumes considérés comme un genre de corps employés en pharmacie. Les usages, l'emploi & les propriétés pharmaceutiques des bitumes en particulier, ne peuvent être traités que dans l'article qui sera destiné à chaque sorte. Voyez les mots **ASPHALTE**, **CHARBON DE TERRE**, **JAYET**, **PETROLE**, **SUCCIN**.

BLANC. Le blanc est une des couleurs qu'on observe le plus souvent dans les opérations & les produits chimiques. Tous les sels terreux & alcalins cristallins, les sels formés par les oxides des métaux blancs unis aux acides, les dissolutions de ces différents sels, beaucoup d'oxides métalliques, le plus grand nombre des liqueurs salines, huileuses, alcooliques, éthérées, sont blancs.

Dans la théorie des couleurs, le blanc est regardé comme le produit de la réflexion complète des rayons lumineux. Aussi est-il accompagné constamment de la lumière la plus vive, & souvent de l'éclat ou du brillant, comme on le voit dans les métaux dont le plus grand nombre ont cette couleur. C'est encore en raison de cette réflexion totale des rayons lumineux qui constituent le blanc, que les corps durs de cette couleur, s'échauffent moins fortement & moins promptement par le contact de la même quantité de lumière que les corps autrement colorés. (Voyez le mot **COULEURS.**)

BLANC D'ALBÂTRE. C'est le nom que quelques peintres ont donné à l'espèce de blanc qui est préparé avec de l'albâtre gypseux, pur, calciné, broyé à l'eau. On fait un beau blanc de cette espèce avec l'albâtre de l'agny. Ce blanc est donc dû à la suite de chaux, privé d'abord de son eau de cristallisation, & calciné de manière à ce qu'il prenne le beau blanc des sels desséchés; on lui redonne ensuite son eau, mais avec lenteur, & on le broyant parfaitement; ce blanc est sur-tout fait pour être employé à la colle, quelques personnes prétendent qu'on peut l'employer à l'huile;

mais il doit alors devenir transparent, & couler en quelque sorte sur la palette.

BLANC DE BALEINE. Le blanc de baleine, improprement nommé *sperma ceti*, est une matière huileuse, concrète, cristalline, à demi-transparente, & d'une odeur particulière, qu'on retire du crâne du cachalot, dans deux cavités séparées du cerveau. On le purifie par la lixiviation, & en le séparant d'une autre huile fluide & inconcréscible qui est mêlée avec lui. Cette substance présente des propriétés chimiques très-singulières, qui la rapprochent d'un côté des huiles fixes, & de l'autre, des huiles volatiles.

Le blanc de baleine se fond à trente-cinq degrés du thermomètre de Réaumur; cette propriété le rend très-propre à faire des espèces de bougies & de chandelles, d'autant plus qu'il brûle avec une flamme blanche, très-claire, très-nette & sans mauvaise odeur. On fait une grande quantité de ces chandelles dans l'Amérique septentrionale. Il y en a aussi des manufactures en Angleterre. Enfin, il y a quelques années qu'on en a établi une à Paris, rue de l'écluseur, fauxbourg Saint-Louis. Elle est due aux soins & aux lumières de M. Lepescheux; son procédé consiste à laisser reposer dans des caisses de bois garnies de plomb, des huiles de poisson, il se précipite au fond de ces caisses des masses de blanc de baleine qui, dissous d'abord dans l'huile animale, s'en sépare peu-à-peu par une véritable cristallisation. A mesure que cette précipitation a lieu, l'huile s'éclaircit, se purifie & devient beaucoup plus propre à la lampe. Quand l'huile est bien claire, on la décante, on enlève le blanc de baleine déposé au fond, on le met à la presse pour en séparer une portion d'huile, on le tond à une chaleur douce, on le soumet plusieurs fois de suite à la presse & à la fusion; il devient ensuite blanc, cristallin & argenté. Dans cet état on le moule en espèces de bougies qui sont d'un blanc éclatant, d'une transparence & d'un brillant beaucoup plus beaux que la cire.

Si on le distille à feu nu, le blanc de baleine ne donne point de phlegme acide comme les huiles fixes, suivant M. l'houvenel; mais il passe tout en entier, & presque sans altération, dans le récipient des qu'il commence à bouillir, & il laisse dans la cornue une trace charbonneuse. En répétant cette opération, il perd sa forme solide & reste fluide sans être plus volatil.

Le blanc de baleine exposé à l'air chaud, jaunit & devient rance, mais moins facilement que les autres huiles fixes concrètes. L'eau dans laquelle on le fait bouillir ne donne, par l'évaporation, qu'un léger résidu mucoso-onctueux.

L'alcali caustique dissout le blanc de baleine, forme avec lui un savon qui acquiert peu-à-peu de la solidité jusqu'à devenir friable.

Les acides nitrique & muriatique n'ont aucun

action sur lui. L'acide sulfurique concentré le dissout en altérant la couleur, cette dissolution est précipitée par l'eau, comme l'huile de camphre.

Le blanc de baleine s'unit au soufre comme les huiles fixes.

Les huiles fixes & volatiles dissolvent le blanc de baleine à l'aide de la chaleur; l'alcool chaud le dissout aussi, & le laisse précipiter par le refroidissement. Une once cinq gros d'alcool à trente-huit degrés de l'aréomètre, dissolvent six grains de blanc de baleine à la température de soixante degrés; tout se précipite par le refroidissement.

L'éther opère cette dissolution à froid, ou par la chaleur de la main.

Le blanc de baleine seroit-il aux huiles fixes ce que le camphre est aux huiles volatiles? Il diffère réellement de la cire qui paraît être aux premières de ces huiles ce que la résine est aux dernières.

J'ai trouvé dans les matières animales, & principalement dans le parenchyme du foie desséché à l'air, dans les muscles humains putréfiés, & dans les concrétions biliaires humaines, une matière qui jouit de caractères fort analogues à ceux du blanc de baleine. Il me paroît que cette substance est très-abondante dans les matières animales, & que c'est une espèce d'huile qui appartient particulièrement à ce règne, car on ne connoît rien de semblable dans les végétaux; mais ce corps huileux concret n'est pas particulier aux baleines & aux cachalots, il seroit convenable de lui donner un nom différent de celui qu'il porte.

Quoique les principales propriétés du blanc de baleine soient connues dans les considérations précédentes, nous croyons devoir y ajouter les détails donnés par M. Thouvenel, dans un mémoire sur les substances animales médicamenteuses, parce que cet auteur est le seul qui ait traité avec soin, & par ses propres expériences, cette matière huileuse.

Le blanc de baleine, dit M. Thouvenel, est bien caractérisé, & très-aisément reconnaissable par son état concret & sec, qui le rend pulvérisable, par sa propriété de cristalliser, même assez régulièrement, & en conservant une sorte de transparence, par sa saveur & une odeur particulières, odeur *sauroline* qui est d'autant plus sensible, que le blanc de baleine est plus récent, & qui se confond par la suite avec l'odeur rance. Le rapport de ces deux odeurs a souvent fait accuser de rancidité & rejeter de la pharmacie le blanc de baleine le plus inaltéré. Cette altération est plus tardive dans le blanc de baleine que dans les autres corps gras concrets, sur-tout ceux du règne animal. On remarque la même odeur native dans l'huile incoercible & très-tendue, avec laquelle le blanc de baleine est mêlé, non-seulement dans le cruet & la colonne épinière, mais encore dans les autres parties de l'animal vivant, & dans laquelle il se sépare après la mort par le refroidissement. La préparation ultérieure du blanc

de baleine ne consiste qu'à lui enlever les dernières portions de cette huile incoercible, ce qui s'obtient par la seule pression.

L'efflu du blanc de baleine sur les charbons, n'est pas accompagnée du pétilement, & sous forme de chandelle, de la fumée désagréable que donnent les autres corps gras soumis aux mêmes épreuves. La lumière vive & l'éclatance de ces chandelles, leur fait encore donner la préférence dans les pays où l'on travaille le blanc de baleine. Cette graisse a aussi l'avantage de ne point tacher les étoffes.

Ces premières qualités annoncent dans le blanc de baleine l'absence, ou du moins une plus petite quantité, & une combinaison plus intime de cette incoercibilité que les chimistes admettent dans la mixture des graisses pesantes, & de laquelle ils font dériver la différence qui existe entre ces dernières & les huiles volatiles. La distillation du blanc de baleine à feu pur, semble confirmer cet aperçu, puisqu'il passe de la corne dans un récipient à un degré de feu capable de se faire bouillir, sans donner ni de phlegme, ni d'acide; & en laissant seulement une trace légère de matière charbonneuse. Il ne présente pas non plus l'odeur vive & piquante, ni l'odeur empyreumatique aussi marquée que les autres graisses. Le blanc de baleine a pourtant éprouvé de l'altération dans ce procédé, puisqu'il a perdu une partie de sa concrescibilité, & qu'après trois ou quatre rectifications, il est parfaitement fluide. Il n'en est pas pour cela plus volatil, car il faut employer le même degré de feu pour la dernière opération que pour la première; cette propriété est très-remarquable, & sert à établir une différence entre ces sortes d'huiles grasses rectifiées, & les huiles empyreumatiques proprement dites, c'est à-dire celles qui résultent de la décomposition des substances aqueuses, (desquelles nous parlerons ci-après.) Leur odeur les distingue encore d'une manière plus marquée. Celle de l'huile de blanc de baleine, rectifiée quatre ou cinq fois, n'est pas si pénétrante ni si désagréable que celle des autres graisses pareillement rectifiées. Au reste, je crois qu'il y a à cet égard, & à plusieurs autres, entre les matières grasses végétales & animales, des différences que les chimistes n'ont point aperçues.

La distillation du blanc de baleine à l'eau bouillante, n'offre rien de remarquable, sinon que l'eau de cette décoction est un peu louche, & qu'ayant été filtrée & évaporée, elle donne un petit résidu jaunâtre d'une matière mucoso-onctueuse, amère, résidu qui est plus abondant, si on a soumis aux mêmes expériences un autre corps gras, sur-tout une huile végétale, ce qui appuie encore notre première conséquence.

La décoction a rendu le blanc de baleine plus solide & plus soluble dans l'alcool. Cette dissolution est encore favorisée, si on verse sur de l'al-

cool le blanc de baleine, auparavant dissous dans l'éther sulfurique; il se fait sur-le-champ une séparation d'autant moins considérable, que l'alcool est plus chaud; mais en exposant le mélange sur un bain de sable pour en dissiper l'éther, la transparence se rétablit & subsiste après cette dissipation totale. Alors, si on laisse refroidir, il se fait une abondante précipitation, ou plutôt une espèce de cristallisation à demi-transparente du blanc de baleine. L'alcool en retient encore, comme on peut s'en assurer en le filtrant & en l'évaporant.

L'éther a sur les matières grasses, & notamment sur le blanc de baleine, une action plus marquée que l'alcool. La dissolution s'en opère à froid, mais plus promptement & plus abondamment à l'aide d'une douce chaleur, celle de la main, par exemple. Le refroidissement & l'évaporation du dissolvant produisent une cristallisation plus ou moins régulière, & différemment configurée pour les différens corps gras concrets; celle du blanc de baleine est ordinairement en écailles transparentes, assez analogues à celles de l'acide boracique. Celle du beurre de cacao & du suif, se présente sous la forme de mamelons opaques, groupés, qui ne ressemblent pas mal à l'acétire calcaire. Il reste une plus grande quantité d'éther unie à la matière grasse cristallisée dans le premier cas que dans le second, ce qui indique encore une plus grande affinité de ce menstrue avec le blanc de baleine qu'avec les autres.

Les huiles essentielles se comportent à-peu près, pour la dissolution & la cristallisation du blanc de baleine, comme l'éther, l'union de ces substances est seulement plus intime dans ce cas-ci; elle est encore beaucoup plus forte avec les huiles grasses, qui, cependant, exigent le concours de la chaleur pour opérer la dissolution du blanc de baleine. J'ai tenté inutilement plusieurs moyens pour séparer ces deux matières. Ce fait porte à croire que l'huile animale inconcevable, que l'on fait être mêlée avec le blanc de baleine dans l'animal vivant, & de laquelle il se sépare après sa mort par le simple refroidissement, & par la pression, n'est pas de même nature que ces huiles grasses végétales.

Les phénomènes & les produits que l'on obtient, en traitant immédiatement & à feu nud le blanc de baleine avec le soufre, sont bien remarquables & dignes de l'attention des chimistes, mais comme ils m'ont paru ne différer en rien de ceux que présentent les autres matières grasses, soumises aux mêmes expériences, je ne m'y attèrerais pas ici, où il s'agit moins de chercher à connaître leur combinaison intérieure, que d'indiquer leurs rapports mutuels.

Le dernier moyen de comparaison auquel j'ai soumis le blanc de baleine, a été de le traiter avec les acides & les alcalis. Les acides nitrique & muriatique n'ont pas d'action sur lui. L'acide

sulfurique concentré le dissout en altérant sa couleur, & il en est séparé par l'addition de l'eau (à la manière du camphre). L'alcali étendu d'eau, & tenu en digestion avec le blanc de baleine, n'éprouve & ne lui fait éprouver aucune altération. L'alcali caustique, ou la lessive des savonniers, se combine avec le blanc de baleine liquéfié, & forme avec lui une matière savonneuse. Ce savon acquiert avec le temps beaucoup de consistance, au point même de devenir friable. Sa combinaison paroît moins intime, & sa dissolution dans l'eau, moins homogène que celle des savons ordinaires faits avec les huiles grasses végétales. Au reste, ces dernières montrent entre elles, à cet égard, quelques différences. Par exemple, le savon composé avec l'huile d'amandes douces, est plus solide que celui fait avec l'huile d'olive. Cela vient probablement de ce que celle-ci est plus grasse, plus mucilagineuse, & l'autre plus tenue, plus sèche ou plus siccatrice, & par conséquent sous cet aspect, plus analogue au blanc de baleine. Cette conjecture est encore fondée sur ce que l'espèce de savon que fournit le beurre de cacao tient le milieu pour la solidité & l'homogénéité entre celui des huiles grasses végétales non concrètes, & le blanc de baleine... Enfin, si l'on fait cuire ce dernier pendant long-temps avec du minium ou oxide de plomb rouge dans de l'eau, on obtient une masse emplastique très-dure, à laquelle on peut donner plus de souplesse, en y ajoutant une certaine quantité d'huile grasse. L'huile rectifiée de blanc de baleine, ou le blanc de baleine distillé plusieurs fois & fluide, prend aussi la forme savonneuse avec l'alcali caustique, & se comporte, dans cette combinaison, comme les autres graisses pareillement rectifiées. Il en est de même de la dissolution avec l'alcool, laquelle est toujours proportionnée au degré de rectification qu'elle a reçu par des distillations répétées.

Il résulte de toutes les expériences ci-dessus, que le blanc de baleine est vraiment une substance de nature grasseuse, mais différente, à plusieurs égards, des autres matières grasses, animales & végétales. Les analogies & les différences que l'on apperçoit dans les qualités agréatives, dans les rapports avec les divers menstrues probatoires de la chimie, dans la décomposition violente, ou par le moyen du feu, en un mot, dans tous les procédés analytiques, comparés du blanc de baleine & des autres corps gras, fluides & concrets, annoncent dans le premier une plus grande ténuité & une plus parfaite homogénéité, une mixture plus simple & plus intime. Du reste, il n'est pas possible de déterminer d'une manière plus précise les différences du plus au moins, ou les simples nuances qui existent dans la constitution intérieure de ces substances congénères, comme dans celle de tous les autres genres de corps naturels. C'est à ce terme, que la chimie expérimentale est obligée de s'arrêter.

réter, & de céder à l'observation le droit d'explorer ultérieurement les qualités des matières que cette chimie lui a fait connoître.

L'induction très-naturelle que fournit la connoissance chimique du blanc de baleine, & qui me paroit aussi-bien fondée que les choses de cet ordre puissent l'être, est que, si ce médicament possède réellement quelques vertus particulières, autres que celles des corps gras usités, ces vertus doivent être très-égères, peu faillantes, sujettes à manquer leur effet, & par conséquent difficiles à manifester d'une manière incontestable.

Telle est la manière dont M. Thouvenel a traité le blanc de baleine. Il est arrivé par ses expériences à saisir les rapports & les différences de cette matière concrète, d'avec les autres huiles solides ; il a fort bien senti qu'après avoir apprécié les nuances de ces différences & de ces rapports, la chimie, à l'époque où il écrivait, ne pouvoit pas aller au-delà. Mais aujourd'hui il lui est permis de porter ses vues plus loin ; elle peut espérer de trouver la raison de ces différences dans une analyse exacte & par la recherche de la nature & de la proportion des principes du blanc de baleine, comparées aux mêmes résultats obtenus sur d'autres matières huileuses analogues. En comparant le blanc de baleine à l'huile concrète que j'ai séparée du foie desséché, à celle qui existe en abondance dans les calculs biliaires, à la matière grasse des cadavres convertis en gras, (Voyez les mots BILE & L'UTÉRACON.) j'ai trouvé des différences dans la forme, la siccité, la fusibilité, la dissolubilité dans l'alcool, dans l'éther, qui sont très-notables, mais qui ne m'ont point empêché d'en saisir la ressemblance. Ce sont des matières du même genre, mais qui diffèrent par des caractères spécifiques. Il reste donc à déterminer 1°. la véritable composition de ces huiles concrecibles, cristallisables, qui ne sont ni des beurres, ni des suifs, ni des cires, qui n'existent point dans les substances végétales, qui diffèrent des huiles concrètes des plantes, comme les huiles liquides des animaux diffèrent des huiles liquides des végétaux ; 2°. la composition diversifiée des espèces qui constituent ce genre nouvellement distingué d'huiles animales cristallisables, leurs rapports entr'elles & avec les huiles animales liquides, leur formation. Ces découvertes sont maintenant au pouvoir de la chimie, & elles seront faites par ceux qui se livreront aux travaux qu'elles exigent. Déjà j'ai fait voir à l'article de la BILE, qu'en traitant son huile faiblement regardée comme une résine, par l'acide muriatique oxygéné, on la couvriroit en une substance sèche & concrète, analogue au blanc de baleine. La décomposition lente des matières animales solides, ensoûlés en masse, prouve encore par la conversion des muscles & des ligaments en gras, que les matières fibreuses, albumineuse & gélatineuse peuvent passer à l'état d'huile concrecible. On est donc sur la voie des découvertes que j'indi-

Chimie. Tome II.

que ; elles sont liées aux progrès de l'analyse animale, qui ont été si rapides depuis dix ans, & qui promettent d'aller encore avec plus de rapidité, lorsqu'un plus grand nombre de travailleurs s'occuperont de cette belle partie de la chimie. On n'oubliera pas sur-tout dans ce travail sur le blanc de baleine & les huiles animales concrecibles qui s'en rapprochent, de rechercher quelle est la cause de sa formation si abondante dans les coïtées, & quel peut être l'usage de cette matière dans les cavités du crâne & de la colonne épinière ; pour quoi en général elle paroît être en plus grande quantité dans les animaux qui respirent peu que dans ceux qui respirent beaucoup d'air, & dont le sang est chaud ; pourquoi dans ces derniers l'huile concrecible & cristallisable semble être cantonnée dans l'émonctoïre du foie & de la bile, tandis qu'elle est par-tout dans les animaux à sang froid.

BLANC DE BALEINE. (*Pharmacie.*) Il n'y a rien à ajouter à ce qui a été dit dans l'article précédent sur le blanc de baleine considéré pharmacologiquement. Si l'on ne considéroit que l'usage qu'on en fait aujourd'hui comme médicament, il seroit presque superflu d'en parler. Les grandes propriétés qu'on lui avoit attribuées autrefois, ont en quelque sorte disparu, depuis qu'on a mieux apprécié en général les vertus des huiles en médecine. Ces propriétés, ces vertus du blanc de baleine ont été présentées en détail & estimées à leur juste valeur dans le dictionnaire de médecine, dans lequel on a consacré un grand article à ce médicament.

On fait donc seulement ici, relativement à la pharmacie, que le blanc de baleine est quelquefois encore employé dans des bols, des pilules, rarement dans des boissons concentrées ou érudues, qu'on le triture avec des gommes, du sucre, du blanc d'œuf, pour l'introduire dans des liqueurs ; qu'il ne faut pas employer l'alcali fixe qui le met dans l'état savonneux ; qu'on doit se rappeler qu'il n'est dissoluble que dans l'alcool chaud.

On fait encore dans les pharmacies un médicament qui porte le nom de *blanc de baleine*. C'est un emplâtre préparé avec la cire, le blanc de baleine & une huile, & qu'on fait au moment de l'employer. (Voyez EMPLÂTRES.)

BLANC DE BISMUTH. (*Pharmacie.*) Le blanc de bismuth ou de fard, étoit autrefois préparé dans les pharmacies, comme un cosmétique dont l'usage intéresse la santé ; il ne l'est plus aujourd'hui pour cet objet que dans les laboratoires des parfumeurs. (Voyez BISMUTH.)

BLANC DE BOUGIVAL. Ce blanc nommé aussi blanc d'Espagne, est une espèce de craie bien lavée, que les peintres employent en détrempe ; on ne peut pas l'employer à l'huile, il n'a pas assez de corps suivant l'expression des artistes, c'est-à-dire qu'il ne s'unit point à l'huile, & ne

Eccé

fait point corps avec elle comme le fait un oxide métallique.

BLANC DE CRAIE. C'est ainsi qu'on désigne en peinture, le blanc commun préparé à la détrempe & avec la craie blanche ordinaire. (*Voyez COULEURS.*) On distingue chez les peintres le blanc de craie d'avec le blanc de bouillax ; l'un & l'autre cependant n'est que de la craie bien lavée ; mais le blanc de craie est plus dur & plus fin, on s'en sert à faire des crayons.

BLANC DE CREMS. Le blanc de crems est une espèce de céruse plus belle que celle de France, qui est préparée à Crems, petite ville d'Allemagne dans la Basse-Autriche sur le Danube. Ce blanc est très-cher ; il ne s'emploie qu'à la palette. (*Voyez FLOMB.*)

BLANC DE CÉRUSE. On appelle blanc de céruse, le blanc préparé avec le plomb & mêlé avec de la craie ordinaire. On le connoît plus souvent dans les arts sous le nom de céruse. Le mot blanc de céruse, est plus souvent employé pour désigner la peinture blanche faite avec cet oxide de plomb mêlé de craie. *Voyez BLANC DE PLOMB, CÉRUSE & PLOMB.*

BLANC DE FARD. On nomme ainsi l'oxide de bismuth précipité du nitrate de ce métal par l'eau, parce qu'on s'en sert pour couvrir la peau d'un enduit blanc ou de fard. *Voyez BISMUTH.*

BLANC DE PLOMB. Le blanc de plomb est un oxide blanc de ce métal, préparé en laissant macérer des feuilles de plomb dans du vinaigre. c'est une espèce d'acétite de plomb avec un grand excès d'oxide. Il est fort employé en peinture & fait presque la base de toutes les couleurs, de tous les tableaux. Malheureusement il a deux grands inconvénients ; l'un d'exposer les hommes qui l'emploient à une colique violente, qu'on nomme colique de plomb, colique des peintres ; *Voyez* ce mot dans le dictionnaire de médecine. L'autre, d'être très-altérable & très-réductible par un grand nombre de corps combustibles, & sur tout par le gaz hydrogène ; en sorte que comme il passe au brun par le contact de ce gaz, les tableaux dont il fait le fond se colorent toujours, & finissent par devenir presque entièrement bruns ; on éviteroit ces deux inconvénients, en substituant à l'oxide de plomb celui de zinc. (*Voyez les mots BLANC DE ZINC, & PLOMB.*)

BLANC DE PLOMB. CÉRUSE. (*Métall.*) Les Hollandais & les Anglois, en font une grande quantité, je vais détailler leur fabrication. Ces substances ne sont qu'une espèce de chaux de plomb corrodé par l'acide du vinaigre réduit en vapeurs, ainsi que le procédé va le démontrer ;

l'on y verra que la céruse ne diffère du blanc de plomb, qu'en ce qu'elle est mêlée de craie en plus ou en moindre quantité, ce qui en fait varier le prix.

Le plomb dont les Hollandais se servent pour cette fabrication, vient d'Angleterre, en saumons ou lingots du poids de 250 livres ; ils le fondent dans une chaudière de fer coulé, avec celui qui a été séparé de la céruse, & le coulent en feuilles ou lames qui, en présentant plus de surface, le mettent en état d'être attaqué, par l'acide du vinaigre plus promptement. Cette chaudière, avec un diamètre de trois pieds & demi sur 18 pouces de profondeur, est fixée par une maçonnerie de briques, dans laquelle on a ménagé par-dessous une grille, un cendrier & une cheminée du côté opposé ; on y fait usage du charbon de terre. Lorsque le plomb est fondu, sans avoir d'autre chaleur que celle qui est nécessaire pour le tenir en fusion, on le coule dans des moules de fer battu ou tôle, dont la forme est plate & d'un carré long d'environ 2 pieds, sur 4 à 5 pouces de largeur, avec un rebord de 2 lignes, & un manche en bois à chacune de leurs extrémités. On a trois de ces moules à cet usage, qui sont rangés les uns à côté des autres, sur des tréteaux de 3 pieds de hauteur, & placés exactement de niveau pour éviter l'inégalité que la moindre inclinaison occasionneroit dans les feuilles.

Un des deux ouvriers qui sont employés à cette première opération, puise du plomb dans la chaudière avec une cuiller de fer, d'une capacité suffisante à contenir assez de métal pour couler trois feuilles à la fois ; il verse dans le moule le plus éloigné de lui, que je nommerai le premier, le tiers du plomb en commençant par l'extrémité à sa gauche, & revenant vite jusqu'à l'autre extrémité à sa droite, de manière qu'il couvre toute la surface intérieure d'une lame de plomb très-mince, à peu près égale en épaisseur dans toute son étendue ; il en fait autant au second & troisième moule. Le métal est bientôt refroidi & figé, alors chacun des ouvriers prend le premier moule par les manches, & le renversant sur une planche mobile qui est placée à côté, ils en font détacher la lame de plomb ; ils agissent de même en mettant par-dessus celles du second & du troisième, & portent ensuite les trois feuilles sur d'autres planches destinées à les recevoir, où elles sont amoncelées. ils recommencent à en former de nouvelles & à procéder comme il vient d'être dit.

Les ouvriers ne trempent jamais les moules dans l'eau pour les refroidir, parce que, disent-ils, le plomb ne s'y attache que lorsqu'il est trop chaud ; & si le cas arrive, ils ont l'attention de ralentir le feu sous la chaudière. Lorsque la surface du bain de plomb est trop chargée de crasse ou chaux métalliques, on les enlève avec une écumoire, pour être mises à part & refondues en lingots ; ainsi l'on ne perd que le déchet ordinaire que fait ce métal à chaque fois qu'il est mis en fusion. A

mesure qu'il diminue dans la chaudière, on y introduit un nouveau faumon, ce qui peut contribuer encore à refroidir le bain s'il étoit trop chaud.

Les lames de plomb ne font point d'une égale épaisseur, on en a de deux espèces; celle du plus grand nombre est d'une demi-ligne, les autres d'un bon riers de plus. L'habitude fait que l'ouvrier ne se trompe point dans ses proportions; par la suite du procédé, on verra l'emploi des unes & des autres.

Ces sceilles ou lames de plomb, sont exposées à la vapeur de l'acide du vinaigre, dans des pots ou espèces de creufets faits d'une terre commune rouge dans la cassure, & vernissée en dedans, plus ouverts dans le haut que dans le bas, & de 7 à 8 pouces de hauteur: leur plus grand diamètre est de 4 à 5 pouces. Pour retenir le plomb & l'empêcher de tomber au fond des pots, on y assujettit, un peu au dessus du tiers de sa profondeur, un morceau de bois de trois quarts de pouces en carré, coupé de la longueur du diamètre.

Les pots dont on se sert dans les fabriques de céruse d'Amsterdam, me paroissent plus avantageux, & méritent la préférence; ils diffèrent des autres, en ce qu'en les fabricant, on y a ménagé intérieurement, & au tiers de leur hauteur, trois pointes saillantes placées triangulairement, qui tiennent lieu par conséquent des morceaux de bois qu'on est obligé de mettre dans les autres, pour retenir le plomb. A un de ces pots que j'ai mesuré, j'ai trouvé 6 pouces & demi de profondeur, & deux pouces de distance depuis le fond jusqu'au niveau des pointes triangulaires.

Chacun de ces pots ayant été remplis de vinaigre, jusqu'à la hauteur de ces points d'appui, de façon que le vinaigre & le plomb ne puissent se toucher en aucune partie, on y introduit les lames ou sceilles que l'on a auparavant roulées sur elles-mêmes en spirale, de manière à laisser un petit espace entre les circonvolutions, & de grosseur convenable à remplir l'intérieur des pots, depuis les points d'appui jusqu'à leur embouchure, en les plaçant verticalement. On se sert du vinaigre de bière, dont on trouve plusieurs fabriques dans chaque ville de la Hollande. Le lieu destiné à recevoir les pots préparés comme il vient d'être dit, est une espèce de halle d'environ 15 pieds de largeur sur 60 de longueur, fermé d'un côté par un mur, dans laquelle on a formé quatre encaissements égaux, qui ne sont séparés d'abord que par les piliers en bois qui soutiennent la charpente, mais ensuite par de forts plateaux afin qu'ils soient indépendans. Sur une couche de fumier de 4 pieds d'épaisseur très-ferré, on arrange les pots garnis de vinaigre, & des lames de plomb roulées, les uns à côté des autres, sans fumier entre deux, mais recouverts de lames de plomb les plus épaisses que l'on met dans toute leur longueur & des planches par-dessus. On fait un nouveau lit de fumier,

un autre rang de pots, de lames de plomb & de planches, que l'on répète jusqu'à ce qu'il y en ait cinq de la même contenance; chacun de ces rangs est composé de 750 pots, par conséquent chaque encaissement est de 3,750, ce qui forme un total de 15,000 pots. Pour retenir le fumier & les pots à mesure que l'on forme les rangs, on applique contre les piliers les plateaux dont on a parlé, en les plaçant de champ les uns sur les autres, jusqu'à ce que les encaissements soient remplis.

On laisse les pots dans cet état ordinairement pendant un mois & quelquefois cinq semaines, ce qui dépend sansdoute de la saison & de la qualité du fumier; dans un des rangs que j'ai vu entièrement à découvert, j'ai remarqué que tous les pots ne travailloient pas également; dans les uns la lame de plomb étoit convertie en céruse, dans d'autres, elle l'étoit en partie; ailleurs il n'y avoit que la surface qui fut un peu attaquée; inégalité qui provient sansdoute de ce que le fumier s'échauffe plus dans un endroit que dans un autre. A l'égard des lames de plomb plus épaisses qui recouvrent les pots, elles forment une croûte ou écaille de céruse plus dure & plus compacte; ces écailles sont mises à part pour en faire le blanc de plomb. Lorsque le fumier a servi plusieurs fois, & que l'on juge qu'il n'est plus capable de donner assez de chaleur, on lui en substitue de nouveau, mais il sert encore d'engrais pour les terres: il n'en est pas demême du vinaigre qui reste dans quelques-uns des pots, il est rejeté comme trop aisé.

Les rouleaux de plomb en partie convertis en céruse au sortir des pots, sont portés sur des bancs ou espèces de tables longues très-solides, où l'on en fait la séparation d'avec les morceaux de plomb qui n'ont pas été corrodés, soit en les brisant ou broyant avec les mains, soit en frappant dessus avec une masse de bois revêtue en fer, ayant soin de les arroser de temps en temps avec de l'eau pour que la céruse ne s'élève pas en poussière, & que les ouvriers n'en soient pas incommodés.

Cette céruse est mise dans une grande fébille de bois avec de l'eau, d'où on la retire pour la broyer sous des meules, il y a deux moulins à cet usage placés à côté l'un de l'autre, dont la construction est la même que celle de nos moulins à farine, mais beaucoup plus petits, & avec cette différence que le mouvement se fait par-dessus, à l'aide d'un cheval attaché à un bras de levier de 8 pieds de longueur; dans le haut est fixé un rouet horizontal du même diamètre que les meules, & dont les dents engrenent dans une petite lanterne placée au-dessus de chacune d'elles, mais dont l'axe vertical est le même que celui de la meule qui fait par conséquent les mêmes révolutions, ces meules peuvent avoir 24 à 26 pouces de diamètre.

Comme les deux moulins ne travaillent jamais
E e e 2

ensemble, l'axe de la lanterne est fixé de façon dans le haut qu'on peut le détourner assez pour le sortir de l'engrenement du rouet, & faire mouvoir celui des moulins que l'on veut. Ils sont à Rotterdam à la même hauteur; mais à Amsterdam on en a trois qui sont placés par gradation les uns au-dessus des autres, de manière qu'à mesure que la céruse a été broyée dans le premier, elle coule dans le second, & du second au troisième, d'où elle tombe dans un cuvier destiné à la recevoir.

L'ouvrier qui conduit le moulin, prend dans la scille ou cuve, de la céruse avec une cuiller percée, & la verse dans l'ouverture du centre de la meule où est l'axe; c'est alors qu'on ajoute plus ou moins de craie pour faire le mélange. Après qu'elle a été broyée dans le premier moulin, on la broie de nouveau dans le second, dont on a rapproché davantage les meules pour la mieux diviser. Ces meules travaillent trois semaines de suite plus ou moins sans être repiquées; l'on estime qu'elles peuvent broyer dans un jour 15 quintaux de céruse ordinaire, & seulement 10 quintaux de blanc de plomb, ce qui n'est pas surprenant, puisque celui-ci est plus dur & qu'il doit être broyé plus fin. Ce blanc de plomb se fait avec les écailles provenant des lames qui recouvrent les pots; on les passe trois fois sous les meules, ayant soin de les rapprocher encore à la troisième, & en observant de ne le broyer que dans le temps où les meules ont été fraîchement piquées; comme celui-ci est plus dur que la céruse ordinaire, & qu'il n'est pas d'une aussi grande conformation, ils s'en fabriquent très-peu.

La dernière préparation que l'on donne à la céruse après avoir été broyée deux fois, est celle de la faire sécher; cette opération se fait avec beaucoup de précaution dans des petits pots de terre commune sans vernis, dont la forme est celle d'un cône renversé, que l'on remplit de cette matière encore dans l'état de boue, & que l'on porte sur de larges étagères en planches, construites dans un bâtiment fort long & fort étroit, dans les faces ou côtés duquel on a pratiqué un grand nombre de volets à charnière qui se replient du bas en haut, s'ouvrent & se ferment à volonté, pour garantir la céruse du soleil & de la pluie, qui nuiraient à sa blancheur. Après cinq ou six semaines de séjour dans les pots, elle s'en détache & forme une seule masse dans le milieu; on les renverse alors sur les étagères, on chacun d'eux laisse un pain de céruse de quatre pouces de hauteur égal au diamètre de sa base; on la laisse dans cet état, jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement sèche, pour lors on en ôte les bavures avec un couteau, & chacun de ces pains est plié séparément dans un papier & lié avec une ficelle; ils sont ensuite mis dans des barils, pour être exportés & vendus dans le commerce.

A l'égard du blanc de plomb qui a été broyé trois fois, on le fait sécher de la même manière

dans de semblables pots, mais plus petits; on le nomme alors blanc de plomb d'écailles.

Il me reste à parler du procédé qu'on suit en Angleterre, & sur-tout de ce qui peut différer de la méthode des Hollandais.

Dans la fabrique de Scheffield, comté d'York, on se sert de deux espèces de moules pour couler le plomb en lames; les premiers sont semblables à ceux des Hollandais, avec cette différence que dans un de leurs côtés longs, ils ont une échancrure de deux ou trois pouces, par laquelle s'écoule l'excédent du métal qui a formé la lame; l'autre espèce de moule est de forme ronde avec un diamètre de neuf à dix pouces, les lames qui en proviennent sont destinées à recouvrir les pots.

A côté de la chaudière on a un tonneau plein d'eau pour rafraîchir les moules, dont la trop grande chaleur rendroit les feuilles trop épaisses. Il n'en est pas de même en Hollande, puisque, comme nous l'avons dit, cet inconvénient n'a lieu que lorsque le plomb est coulé trop chaud.

On a vu quelques fabriques se servir de plomb laminé pour cette préparation; mais on n'y trouve pas les mêmes avantages que dans la méthode que nous avons rapportée, qui est préférable à tous égards; elle est moins dispendieuse & plus expéditive; d'ailleurs les pores du plomb étant plus ouverts, ce métal est beaucoup plus susceptible de recevoir l'impression de l'acide du vinaigre.

Les pots ou creusets à contenir les lames de plomb roulées, diffèrent un peu dans leur forme, qui néanmoins est également bonne pour le même but; ceux-ci ont dans leur fond une partie plus étroite, ou, pour mieux dire, une recoupe, dans laquelle on met le vinaigre. Les dimensions sont à-peu-près les mêmes.

Lorsque le plomb a été exposé pendant six semaines ou deux mois à la vapeur du vinaigre, on n'en fait point la séparation d'avec la céruse comme en Hollande, en frappant les lames avec une masse; on se sert d'un blutoir ou grille placée dans une caisse bien fermée & mise en mouvement par une roue à eau. La grosseur des trous est celle d'un pois; tout le plomb qui provient de cette séparation est rebattu avec le neuf pour couler de nouvelles lames.

La céruse est ensuite broyée dans deux moulins, comme cela se pratique à Amsterdam, c'est-à-dire, que l'un est plus élevé que l'autre; les dimensions des meules sont un peu plus grandes, mais elles ne sont point essentielles.

Quand on a suffisamment de céruse broyée dans le cuvier de réception, au-dessous du second moulin, on en décante l'eau dans une grande cuve enterrée à chaque côté, & au-dessus de laquelle on a pratiqué six rangs de caisses ou réservoirs joints ensemble, ne se communiquant que par leur partie supérieure, & formant une espèce de labyrinth.

On agite fortement l'eau chargée de céruse dans la grande cuve, & quand on juge qu'elle est assez divisée, on la puise pour la verser dans un des réservoirs, où en circulant & parcourant les divisions elle dépose la céruse, de manière qu'elle retombe claire dans la grande cuve. *Voyez* LEVIGATION.

On retire la céruse qui s'est déposée dans ces caisses pour la mettre dans une plus grande, toujours avec de l'eau, & quand il y en a suffisamment en provision, on décante cette eau & on enlève la céruse avec des cuillers, dont chaque morceau conserve la forme, c'est dans cet état qu'on la porte dans un grenier ouvert de tous les côtés pour la faire sécher, mais ces côtés sont garnis de toiles pour empêcher la poussière d'y entrer; elle n'est parfaitement sèche qu'après qu'elle a été ainsi exposée pendant quatre mois en été & six mois en hiver. Une chaleur artificielle la ferait sécher plus promptement, mais on risquerait de la faire jaunir.

BLANC DE PLOMB. (*Pharmacie.*) On emploie quelquefois en pharmacie l'oxide de plomb blanc, sous le nom de blanc de plomb, pour quelques préparations officielles ou magistrales. Il en sera question dans l'article du PLOMB. (*Voyez* le mot PLOMB.)

BLANC D'ŒUF. (*Pharmacie.*) Le blanc d'œuf est une matière albumineuse dont on se sert souvent en pharmacie pour décolorer ou clarifier les sucres fâbles, le petit lait, les décoctions pour les sirops & un grand nombre d'autres liqueurs qu'on peut chauffer sans altération jusqu'à la température qui coagule cette substance animale. Il est encore ajouté à plusieurs médicaments, & sert à un assez grand nombre d'usages pharmaceutiques, qui seront exposés à l'article de l'ŒUF. (*Voyez* le mot ŒUF.)

BLANC DES CARMES. Le blanc des carmes qui ne diffère des autres blancs qu'en ce qu'il est préparé avec de la chaux éteinte, un peu de térébenthine, & de la colle de gants, est susceptible de recevoir par le frottement d'une brosse un poli qui imite le marbre ou le flué. Il ne peut s'employer que sur du plâtre neuf & bien uni. (*Voyez* l'ART DU PEINTRE.)

BLANC DE TROYE. C'est un des noms par lesquels on désigne la craie dans les boutiques où l'on vend les couleurs pour la peinture. *Voyez* CARBONATE DE CHAUX.

BLANC DE ZINC. M. Guyton Morveau a proposé, il y a environ dix ans, de substituer au blanc de plomb un oxide de zinc précipité de la dissolution de sulfate de ce métal, par le carbonate de potasse. Cet oxide, bien lavé & broyé, est d'un beau blanc, & peut rivaliser à cet égard avec le

blanc de plomb; mais il a deux avantages sur ce dernier, qui sont bien faits pour lui allier la préférence, lorsqu'il sera plus connu des peintres; l'un est relatif à son innocuité; l'autre consiste dans son inaltérabilité par les vapeurs combustibles. *Voyez* le mot ZINC.

BLANC-MANGER. (*Pharm.*) Quoique le blanc-manger qu'on prépare dans les cuisines ou les officines de toutes les maisons, & qu'on sert sur les tables, soit plutôt un mets agréable, nourrissant & assez léger qu'un véritable médicament, nous croyons devoir décrire cette préparation, parce qu'elle forme une espèce d'aliment médicamenteux. Voici comment cette préparation est décrite dans la pharmacie de M. Baume.

℥ Gelée de corne de cerf.....	℥ viij.
sucre raffiné.....	℔ iv.
amandes douces écorcées.....	℔ j.
eau de fleurs d'orange.....	℔ j.
esprit de citron.....	Gutt. iij.
zestes de citrons récents.....	℔ 3 f.

On échauffe un mortier de marbre avec de l'eau bouillante, on y pile les amandes & les zestes de citrons avec un pilon de bois, en y ajoutant la gelée qu'on a fait liquéfier au bain-marie; la chaleur du mortier, en tenant cette gelée fondue, favorise son action sur les amandes, & il se forme un lait d'amandes, dont la gelée liquide fait l'excipient. On met fur la fin l'eau de fleurs d'orange & l'esprit de citrons; on passe la liqueur par une étamine très-propre; on met le vaisseau où on l'a recueillie dans un endroit frais; la gelée se fige & forme une masse tremblante, blanche, opaque, d'une saveur & d'une odeur très-agréables, qui est le blanc-manger. Cet aliment convient aux personnes qu'il faut restaurer & calmer; on peut le rendre médicamenteux en y faisant entrer des semences calmantes ou froides, &c., mais il y a des estomacs qui ne le digèrent que difficilement, à cause du suc d'amandes qui y est en assez grande abondance; quelques personnes y ajoutent un peu d'amandes amères, dont elles aiment le goût, il fait alors souvent un véritable mal à plusieurs individus qui ont les nerfs très-sensibles à l'action du principe odorant & vireux des amandes amères.

BLANC-RAISIN. (*Pharmacie.*) Le blanc-raisin est un nom qui vient par corruption de celui de blanc de Rhazis; c'est un onguent fait avec la cire blanche, l'huile d'olive & l'oxide de plomb blanc, qui n'est pas cuit ou chauffé, & que l'on prépare par le simple mélange exact. *Voyez* pour les doies, la préparation & l'usage, l'article ONGUENT DE CERUSE OU ONGUENT BLANC DE RHAZIS.

BLANCHET. (*Pharmacie.*) Les apothicaires nomment ainsi un morceau carré d'étoffe de laine

qu'on attache par les quatre coins sur un carreau, pour y filtrer les sirops, ou quelque autre fluide visqueux qui ne passeroient pas, ou du moins très-difficilement & trop lentement à travers le papier; on choisit ordinairement pour cet usage une étoffe blanche, raison pour laquelle on a donné le nom de blanchet au morceau que l'on emploie.

Cette étoffe doit être grosse, & son tissu sera plus ou moins serré, suivant la nature des substances que l'on doit filtrer. S'il s'agit seulement de filtrer un sirop préparé par l'infusion, la décoction, ou le suc d'une plante, le tissu de l'étoffe sera médiocrement serré; il doit l'être davantage si la liqueur à filtrer tient en suspension des subances terreuses, métalliques, pulvéreuses.

Toutes les fois qu'on emploie un blanchet il faut avoir soin de le faire tremper, laver en grande eau & sécher avant de s'en servir de nouveau; mais cette attention ne suffiroit pas encore pour tous les cas, il est des liqueurs qui en filtrant entraînent dans le tissu de l'étoffe, les parties les plus fines de la poudre ou de la substance médicaméteuse qu'on y avoit fait infuser; disséminées dans le tissu de l'étoffe, ces molécules s'en détachent quelquefois difficilement par un premier lavage, sur-tout s'il est fait dans l'eau froide, & si on passoit à travers le blanchet une nouvelle liqueur, elle entraineroit les parties étrangères que la première filtration a laissées dans le tissu de l'étoffe; ce qui, comme on le sent très-bien, altéreroit les propriétés du remède qu'on prépare, ainsi nous avons vu des vomissements produits par l'usage d'un sirop d'oeillets, parce qu'on l'avoit fait passer dans une chausse d'étoffe, qui précédemment avoit servi à filtrer un sirop préparé avec l'oxide vitreux d'antimoine. Cette observation doit faire sentir au pharmacien qu'elles attentions il doit apporter dans l'usage des blanchets & filtres d'étoffe, qui ont déjà servi à quelque préparation. Sans doute il seroit à désirer qu'on n'employât jamais deux fois la même étoffe, au moins est-il indispensable d'avoir l'attention de ne point passer de décoctions calmantes, adoucissantes, &c. sur une étoffe qui a servi précédemment à filtrer une liqueur chargée d'une poudre antimoniale, ou de quelque autre substance vomitive, irritante, dont les molécules peuvent être retenues dans le tissu de l'étoffe. Enfin il faut renouveler souvent les blanchets & autres filtres d'étoffes de laines, car après quelques temps de service leur tissu se resserre, s'épaissit, & la filtration se fait très-lentement.

BLANCHIMENT. Quoique le mot blanchiment soit employé dans plusieurs arts, pour exprimer l'opération qu'on fait subir à beaucoup de substances colorées, soit par la nature, soit par l'art, & pour les rappeler au blanc, il est plus particulièrement & presque généralement employé pour l'art d'enlever au fil ou aux toiles de chanvre, de lin & de coton, la couleur sauve que la

nature a donnée aux faisceaux fibreux de ces plantes. On pourra voir dans le dictionnaire des arts tout ce qui est relatif à ce procédé ordinaire de blanchir les toiles, & qui consiste à les exposer à l'air sur des prairies, pendant plusieurs mois, & à les passer d'abord dans des lessives alcalines, ensuite dans du lait aigri. Il ne sera ici question du blanchiment que pour y rendre compte d'une découverte chimique de Schéele, & de l'heureuse application que M. Berthollet en a faite. La description de son procédé & les détails qu'il a donnés sur ce nouvel art dans les annales de chimie, feront voir quels succès on peut attendre des découvertes chimiques pour le perfectionnement des arts, & combien il est important que les personnes qui sont à la tête des manufactures ou qui veulent en élever de nouvelles, prennent des connoissances étendues de chimie. M. Berthollet a rendu un service signalé à sa patrie & à tous les pays du monde où l'on cultive & où l'on travaille le lin, le chanvre, le coton. Quand il n'auroit rendu que ce seul service par l'heureuse application de la chimie, son nom mériteroit d'être placé dans la liste trop peu nombreuse des bienfaiteurs de la société. Ce seroit affoiblir cette histoire importante d'un art chimique nouveau, que de ne pas emprunter son propre langage. (*n* présentera donc ici les divers articles qu'il a insérés dans les annales de chimie, les lettres qu'il a reçues de plusieurs manufacturiers, un mémoire de M. Chaptal sur le même objet, & nous terminerons cet article par un mémoire de M. Berthollet sur la théorie de la decoloration par l'acide muriatique oxigéné.

Description du blanchiment des toiles & des fils par l'acide muriatique oxigéné, &c.

L'on doit non-seulement à Schéele la découverte de l'acide muriatique oxigéné, mais encore celle des effets qu'il produit sur les parties colorantes des végétaux. « C'est dans l'état élastique (dit ce grand chimiste) que le decolorant le mieux les qualités de cet air (gaz acide muriatique oxigéné.) On met au bain de sable une corne de verre, dans laquelle on a versé de l'acide muriatique sur la manganèse; on y adapte de petits ballons de la contenance d'environ douze onces d'eau, dans lesquels on met à peu-près deux gros d'eau, sans autre lut qu'une bande de papier gris au col de la corne. Au bout d'un quart-d'heure on aperçoit l'air jaune dans ce ballon, qu'on enlève. Si le papier a été bien posé, l'air sort avec force; on ferme aussi-tôt le ballon, & on en met un autre: on peut ainsi remplir plusieurs ballons avec l'acide muriatique déphlogistiqué; mais il faut arranger la corne de manière que les gouttes qui s'élèveront jusqu'à son col puissent y retomber. L'eau sert à retenir les vapeurs de l'acide. Je prends plusieurs ballons pour n'être

pas obligé de répéter à chaque expérience une pareille distillation ; il ne faut pas en employer de gros, parce qu'à chaque fois qu'on les ouvre, il se dissipe à l'air une bonne partie de l'acide.

« Ce que j'ai soumis à l'examen dans cet acide muriatique déphlogistiqué, étoit dans le col du ballon que j'avois bouché.

» Le bouchon a jauni comme par l'eau-forte.

» Le papier bleu de tournesol est devenu presque blanc, toutes les fleurs rouges, bleues, & jaunes, même les plantes veittes, ont jauni en peu de temps, & l'eau du ballon a été changée en un pur acide muriatique soible.

» Les alcalis ni les acides, n'ont pu rétablir les couleurs des fleurs & des plantes. »

Je repris les expériences de Scheele, & je tâchai de répandre un plus grand jour sur la nature de l'acide muriatique oxygéné, & sur ses principales propriétés. Je fis voir qu'une partie de l'acide muriatique dissolvait l'oxide de manganèse, en chassant une partie de la base de l'air vital ou oxygène, qui étoit en excès dans l'oxide de manganèse pour que cette dissolution pût s'opérer ; que cet oxygène privé de l'état élastique, ou le trouvant, suivant l'expression de M. Priestley, dans l'état naissant, & étant par-là, très-disposé à former de nouvelles combinaisons, s'unissoit avec une autre portion de l'acide muriatique, & que cette combinaison constituoit le gaz acide muriatique oxygéné. J'ai développé cette théorie dans plusieurs mémoires qui se trouvent dans le recueil de l'académie de 1785 & des années suivantes, & dans le journal de physique de Juin 1785 & d'août 1786 ; mais ainsi que les personnes qui ne se sont point occupées de la chimie, soient en état non-seulement d'exécuter le procédé que je vais décrire, mais encore de le modifier & de l'étendre, je vais rappeler quelques expériences dont j'ai donné le détail en perdant de vue les autres parties de la théorie, pour insister sur la composition de l'acide muriatique oxygéné, & sur l'action qu'il exerce sur les molécules colorantes.

Selon Scheele, « l'acide muriatique dépouillé du phlogistique, qui est une de ses parties constituantes, ne s'unit avec l'eau qu'en très-petite quantité, & ne la rend pas fort acide. » Il y a apparence qu'il se contenta d'examiner l'eau qui n'avoit été en contact avec le gaz que pendant le temps de l'opération, & qu'il en conclut que ce gaz s'y dissolvait très-peu, de manière qu'il lui parut préférable de soumettre à ses expériences ce gaz même, que l'eau qui n'en devoit être que faiblement imprégnée, & qui, en même-temps devoit contenir un peu d'acide muriatique qui passe dans la distillation lorsqu'on ne prend pas les précautions nécessaires pour le retenir dans un flacon intermédiaire.

Le premier objet que je me proposai, ce fut d'examiner la dissolubilité du gaz acide muriatique

oxygéné par l'eau, parce que je m'imaginai que si je pouvois en obtenir une dissolution un peu concentrée, il me seroit plus facile de soumettre à différentes épreuves cette liqueur qu'un simple gaz. Je m'aperçus bientôt que ce gaz se dissolvait dans l'eau plus facilement & en plus grande quantité que le gaz acide carbonique ou air fixe, & que l'eau qui s'en saturait, acquéroit une odeur très-vive, une couleur jaunâtre, & des propriétés très-marquées. J'avois fait ces premières épreuves en agitant l'eau en contact avec le gaz de la manière dont on imprègne ordinairement l'eau d'acide carbonique ; mais la vapeur suffoquante qui s'exhalait, me fit substituer à ce procédé celui de M. Woulfe. Je plaçai entre la cornue & les flacons remplis d'eau destinée à s'imprégner de gaz, un petit flacon que j'entourai de glace pour retenir la vapeur muriatique qui n'étoit pas oxygénée ; j'entourai également de glace les flacons remplis d'eau. J'observai, dans cette opération, que l'eau étant saturée de gaz, celui-ci prenoit une forme concrète, & se précipitoit lentement au fond de l'eau.

Si l'on remplit d'eau imprégnée du gaz qui s'est dégagé, c'est-à-dire, d'acide muriatique oxygéné, un flacon dont une tubulure prolongée & recourbée plonge sous un récipient rempli d'eau, & si ce flacon est exposé à la lumière du soleil, on voit bientôt s'en dégager des bulles qui passent dans le récipient, & qui sont de l'air pur, de l'air vital ou gaz oxygène. Lorsque les bulles ont cessé de se dégager, la liqueur a perdu son odeur, sa couleur, & toutes les propriétés distinctives ; ce n'est plus qu'une eau légèrement imprégnée d'acide muriatique ordinaire. Cette expérience simple doit suffire pour se convaincre que l'acide muriatique oxygéné n'est réellement qu'une combinaison de l'acide muriatique avec la base de l'air vital ou oxygène, qui se trouve si abondamment dans l'oxide noir de manganèse, qu'il suffit de pousser cet oxide à un grand feu, pour en retirer une grande quantité, & alors il n'est plus propre à former de l'acide muriatique oxygéné, parce qu'il est dépouillé de cette partie d'oxygène qui doit se combiner avec une partie de l'acide muriatique.

Remarquons que la lumière a la propriété de dégager l'oxygène qui étoit combiné avec l'acide muriatique, en lui rendant l'élasticité dont il étoit privé en partie, ce que ne peut faire la simple chaleur. Il parait que la lumière se combine avec l'oxygène, & que c'est à cette combinaison qu'est dû l'état élastique de l'air vital qui, en perdant de nouveau son élasticité par la combustion, c'est-à-dire, par une combinaison rapide avec quelque corps, laisse échapper encore le principe de la lumière, & en même temps il se dégage beaucoup de chaleur dont nous ignorons jusqu'à présent les véritables rapports avec la lumière.

Si l'on plonge dans l'acide muriatique oxygéné

des couleurs végétales, elles disparaissent plus ou moins promptement & plus ou moins complètement. Lorsqu'il s'y trouve un mélange de différentes parties colorantes, les unes disparaissent plus facilement, & neissent appercevoir que celles qui résistent davantage, & qui ont cependant éprouvé une altération plus ou moins grande. Ce sont ordinairement les parties jaunes qui résistent le plus, mais toutes finissent par disparaître; & lorsque l'acide muriatique oxygéné a épuisé son action, il se trouve ramené à l'état d'acide muriatique; les parties colorantes lui ont enlevé l'oxygène, & ont acquis par cette combinaison de nouvelles propriétés, en perdant celle de produire les couleurs. Je ne m'occuperai point à présent des propriétés de ces parties oxygénées. L'acide muriatique oxygéné doit donc la propriété de détruire des couleurs à l'oxygène, qui non-seulement s'y trouve combiné abondamment, mais encore qui y tient très-peu, & qui passe facilement en combinaison avec les substances qui ont quelque affinité avec lui. Et rapports des parties colorantes, si variées dans la nature, avec l'oxygène, avec la lumière, avec les alcalis & les autres agents chimiques, doivent former une partie de la physique bien intéressante & presque entièrement nouvelle: après avoir observé l'action qu'exerce en général l'acide muriatique oxygéné sur les parties colorantes, je pensai qu'il pourroit produire le même effet sur celles qui colorent les fils & les toiles, & que l'on a pour objet de détruire ou de séparer dans le blanchiment; mais je ne me bornerai pas à décrire le procédé, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui: il ne sera pas inutile pour ceux qui voudront l'exécuter, que je donne l'histoire des essais imparfaits par lesquels j'ai commencé.

D'abord je me servois d'une liqueur très-concentrée, & je la renouvellois lorsqu'elle étoit épuisée; jusqu'à ce que les fils ou toiles me parussent blancs; mais je m'aperçus bientôt qu'ils étoient considérablement affoiblis, & même qu'ils perdoient entièrement leur solidité; alors j'affoiblis un peu la liqueur, & je parvins à blanchir la toile sans l'altérer. Mais elle jaudioit promptement lorsqu'elle étoit conservée, & sur-tout lorsqu'elle étoit échauffée, ou lorsqu'on lui faisoit subir une lessive alcaline. Je réfléchis sur les circonstances du blanchiment ordinaire, & je tâchai d'en imiter les procédés, parce que je pensai que l'acide muriatique oxygéné devoit agir comme l'exposition des toiles sur les pres, qui seule ne suffit pas, mais qui paroît seulement disposer les parties colorantes de la toile à être dissoutes par l'alcali des lessives. J'examinai la rose, soit celle qui se précipite de l'atmosphère, soit celle qui vient de la transpiration nocturne des plantes, & j'observai que l'une & l'autre étoit saturée d'air vital, au point de détruire la couleur d'un papier teint faiblement par le tournesol. Peut-être les anciens préjugés sur la raison de mois de mai, fai-

son où la transpiration des plantes est abondante, tiennent-ils à quelques observations de cette espèce.

J'employai donc alternativement des lessives alcalines & l'action de l'acide muriatique oxygéné. Alors j'obtins un blanc solide; & comme sur la fin du blanchiment ordinaire, on passe les toiles dans du lait aigri ou dans de l'acide sulfurique, étendu d'une grande quantité d'eau, j'essayai aussi de passer des toiles dans une dissolution très-étendue d'acide sulfurique, & j'observai que le blanc en prenoit plus d'éclat.

Lors que je fis usage des lessives intermédiaires, j'appris qu'il n'étoit point nécessaire d'employer une liqueur concentrée, & d'y laisser à chaque immersion les toiles long-temps plongées. J'évitai par ce moyen deux inconvénients qui auroient rendu ce procédé impossible à pratiquer en grand. Le premier est l'odeur suffoquante de la liqueur qu'il seroit très-incommode & même très-dangereux de respirer long-temps, odeur qui à découragé plusieurs personnes qui ont tenté de s'en servir. Le second est le danger d'affoiblir les toiles. Je renonçai aussi à cette époque à mêler l'alcali avec l'acide muriatique oxygéné, ainsi que je l'avois pratiqué dans la plupart de mes premiers essais. (Journal de physique 1785).

J'ajoutai peu près le terme où en étoient mes expériences, lorsque je fis des essais en présence du célèbre M. Watt. Un coup d'œil suffit à un physicien dont le génie s'est exercé si long-temps sur les arts. Bientôt M. Watt m'écrivit d'Angleterre, que dans une première opération il avoit blanchi 500 pièces de toiles chez M. Grigot, qui a une grande blanchisserie à Glaicow, & qui continuoît à faire usage du nouveau procédé.

Cependant M. Bonjour qui m'avoit aidé jusques-là dans mes essais, & qui joint beaucoup de sagacité à des lumières très-étendues en chimie, s'associa avec M. Constant, appreneur de toiles à Valenciennes, pour former dans cette ville un établissement. Le projet fut traversé par les préjugés & par l'intérêt des blanchisseurs, qui craignoient la concurrence d'une méthode nouvelle. M. Constant ne put même se procurer un terrain dans la ville de Valenciennes; mais M. de Bellangy favorisa cette entreprise, & céda un terrain qui présente toutes les commodités convenables, mais qui étant à une certaine distance de Valenciennes, aura le désavantage de l'éloignement, s'il étoit formé quelque établissement à Valenciennes même. M. Bonjour avoit abandonné les justes espérances que lui donnoient à Paris ses connaissances & ses talens. Il n'avoit trouvé dans l'entreprise à laquelle il s'étoit dévoué, que les dégoûts qui accompagnent ordinairement les procédés nouveaux des arts. Il s'adressa au bureau du commerce, non pour faire valoir les services qu'il devoit rendre, mais pour demander qu'on le mît à couvert des désavantages & des obstacles que lui avoient préparés les préjugés

Jugés & les intérêts opposés qu'il avoit rencontrés dans Valenciennois, en lui accordant un arroundissement de deux lieues autour de Valenciennois & de Cambrai, dans lequel il put seul, pendant quelques années, exercer l'art-nouveau, sans gêner en rien la liberté de ceux qui voudroient en tenir aux anciens procédés, ou en pratiquer de nouveaux dans lesquels on ne seroit aucun usage d'acide muriatique oxigéné. Il offroit d'instruire dans son établissement de tous les détails du procédé, tous ceux qui voudroient en faire usage, & qui auroient l'aveu de l'administration. Peut-être que si sa demande eut été accueillie, l'établissement de Valenciennois eût inspiré plus de confiance à ceux qui se sont chargés de faire les avances nécessaires. Peut-être y eussent-ils bôné leurs tentatives, au lieu d'établir le procédé à Courmay, comme ils viennent de le faire; peut-être plusieurs artistes se feroient-ils formés sous la direction de M. Bonjour, & auroient-ils déjà fait un grand nombre d'établissements dans nos provinces, en évitant les tentatives infructueuses qui pourroient donner du discrédit à un art utile.

Lorsque je conçus l'espérance que ce procédé pourroit s'exécuter en grand, je chetai à diminuer le prix de la liqueur, en décomposant le sel marin dans l'opération même qui servoit à la former; mais soit que j'employasse de l'acide sulfurique trop concentré, soit que les proportions des ingrédients fussent mal choisies, je n'eus qu'une quantité de liqueur qui me fit juger qu'il étoit préférable de se servir de l'acide muriatique, &c. je l'employai dans les doses que j'ai indiquées dans mes premiers mémoires; c'est-à-dire, que je distillai trois parties d'acide muriatique concentré avec une partie d'oxide de manganèse; mais un habile chimiste de Rouen, M. Decroix, qui faisoit aussi des épreuves, dans la vue de faire un établissement dans cette ville, publia dans les affiches de Normandie qu'il avoit trouvé un moyen de se procurer l'acide muriatique oxigéné, à un prix fort inférieur à celui du procédé que j'avois indiqué. Aussi-tôt je revins à ma première épreuve; j'en chargai M. Welter, jeune & ingénieux chimiste, qui me fit observer qu'il devoit être avantageux d'employer l'acide sulfurique, & l'opération réussit d'une manière satisfaisante. J'en instruis M. Bonjour & M. Watt. Ce dernier m'apprit qu'il avoit fait ce changement dès les premières épreuves, long-temps avant que M. Chapel décrivit aussi cette opération dans un mémoire qu'il envoya à l'académie des sciences. Ce n'est pas le seul changement que M. Watt avoit fait; il avoit encore substitué un tonneau dont j'ignore la construction, à l'appareil de Woulfe, dont je me suis servi; mais avant que M. Watt m'en parlât de son appareil, M. Welter m'imagina un, qui est non-seulement très-commode pour préparer l'acide muriatique oxigéné, mais qui est encore très-propre à plusieurs autres opérations chimiques, & dont je vais indiquer la construction, avec quelques changements

Chimie, Tome II.

avantageux que M. Molay a faits. On trouvera les détails dans la planche & dans son explication qui seront à la fin de cet ouvrage.

Le but de cet appareil est de multiplier les surfaces par lesquelles le gaz se trouve en contact avec l'eau, parce que ce n'est qu'au point de contact que la combinaison peut s'opérer; la partie du gaz qui n'a donc pu se combiner dans l'espace intérieur où il est d'abord conduit, passe dans la cuvette qui est au-dessus, par le tube qui est destiné à lui donner une issue.

Le vase qui est intermédiaire entre le tonneau pneumatique & le matras distillatoire, est destiné à retenir la partie de l'acide muriatique qui n'est pas oxigénée; on met dans ce vase un peu d'eau, dans laquelle on fait plonger un tube de verre qui doit surpasser en hauteur la colonne d'eau que le gaz a à vaincre dans le tonneau. Le gaz qui vient du matras, comprime l'eau qui est dans ce vase, avec une force égale à celle qui s'oppose à son dégagement, de manière que l'eau s'élève dans le tube de sûreté, & y forme une colonne égale à celle de l'eau qui presse sur le tube par lequel le gaz parvient dans le tonneau; mais si pendant l'opération il se fait un refroidissement soudain ou une absorption rapide du gaz, l'eau redescend dans le tube, & l'air atmosphérique entre & empêche qu'il ne se forme un vide qui produiroit la résorption de la liqueur, & qui seroit cassier le vaisseau distillatoire.

Ce tube de sûreté qui est également dû à M. Welter, peut s'appliquer avec succès aux autres distillations pneumatiques, ainsi qu'on peut en avoir un exemple au mot APPAREIL.

Si l'on a un bon oxide de manganèse qui soit formé de petits cristaux, & qui contienne très-peu de matières étrangères, les proportions qui m'ont paru les plus convenables pour les substances qu'on doit mettre en distillation, sont les suivantes:

- 6 onces d'oxide de manganèse réduit en poudre.
- 1 livre & de sel marin également réduit en poudre.
- 12 onces d'acide sulfurique ou vitriolique concentré.
- De 8 à 12 onces d'eau.

Si l'oxide de manganèse contient des terres ou substances métalliques étrangères, il faut en augmenter la quantité proportionnellement à son impureté. L'on reconnoît après l'opération, si l'on n'a employé une quantité suffisante, parce qu'il en doit rester un peu qui n'a pas été décomposé, & qui ait retenu la couleur noire; on règle d'après cette observation la quantité qu'on doit en employer dans les opérations suivantes.

Lorsqu'il se trouve du spath calcaire, mêlé avec l'oxide de manganèse, ce qu'on reconnoît par l'effervescence qui se produit aussitôt qu'on y verse un peu d'acide sulfurique, il est bon de le laver,

Ffff

avant l'opération, avec de l'acide sulfurique étendu d'eau, pour en séparer la partie calcaire qui seroit embarrassante par l'effervescence qu'elle produiroit ; après quoi l'on fait sécher cet oxide. (1)

Il faut ajouter plus ou moins d'eau, non-seulement selon le degré de concentration de l'acide sulfurique, mais aussi selon la quantité de matière que l'on met en distillation ; & cette quantité est considérable, l'acide doit être plus étendu que si elle est petite. Il seroit plus avantageux d'employer un acide qui n'auroit pas été concentré, puisque l'opération par laquelle on le concentre, ajoute à sa valeur, & qu'on est obligé d'y remettre de l'eau ; mais pour cela il faudroit que le lieu où il se fabrique fût voisin, parce que si le transport en est considérable, la concentration peut être une économie.

Lorsque les matières sont préparées, il faut mêler avec soin l'oxide de manganèse avec le sel marin, introduire le mélange dans le vaisseau distillatoire placé sur un bain de sable, verser sur ce mélange l'acide sulfurique qu'on a étendu auparavant, & dont on a laissé dissiper la chaleur qui s'est dégagée par le mélange de l'eau, & adapter promptement à l'ouverture du matras le tube qui doit porter le gaz dans le vaisseau intermédiaire. Il ne faut pas oublier que dans cette opération les luts demandent une attention particulière.

Les proportions des vaisseaux doivent être telles, que le matras distillatoire ait environ un tiers de vide, & que pour la quantité qu'on a énoncée, le tonneau contienne 100 pintes d'eau, & qu'il ait de plus un vide de la contenance d'environ 10 pintes, parce que, lorsque le gaz vient se loger sous les cuvettes destinées à la recevoir, l'eau doit avoir un espace libre pour pouvoir s'y élever.

Avant de commencer l'opération, il faut remplir d'eau le tonneau pneumatique. Le mélange étant fait, le gaz qui commence bientôt à se dégager, chasse d'abord l'air atmosphérique qui est dans l'appareil ; lorsqu'on juge que l'air atmosphérique est passé sous les cuvettes, on l'évacue par le moyen d'un tube recourbé qu'on introduit alternativement sous chaque cuvette, & pour chasser l'eau qui est entrée dans ce tube, on y souffle avec force ; on laisse ensuite l'opération se continuer sans feu, jusqu'à ce qu'on aperçoive que les bulles se rallongent. Alors on donne un peu de feu ; il ne faut pas le pousser dans les commencemens ; mais on l'augmente peu à peu, & il faut parvenir à l'ébullition sur la fin de l'opération. On connoît qu'elle approche de la fin, lorsque le tube par lequel le gaz se dégage, & le vaisseau intermédiaire s'échauffent. Lorsque le gaz ne se dégage plus qu'en petite quantité, on cesse le feu, on attend que le vaisseau distillatoire ne conserve plus qu'un peu de chaleur

pour le déluter, & on y verse alors de l'eau chaude, pour que le résidu reste en dissolution, & qu'il soit plus facile de l'en retirer ; on verse ensuite le résidu dans un grand vaisseau de laine à le recueillir pour l'usage que j'indiquerai. L'opération est plus ou moins longue, selon la quantité de la matière ; avec la quantité prescrite, elle doit durer cinq à six heures ; il est bon de ne pas la précipiter, parce qu'on retire une plus grande quantité de gaz. Une seule personne peut conduire plusieurs appareils, auxquels on peut donner des proportions beaucoup plus grandes que celles qui ont été indiquées.

Le vaisseau intermédiaire se remplit peu à peu d'une liqueur qui est de l'acide muriatique pur, mais faible. Cependant on peut faire plusieurs opérations, sans l'en extraire ; mais lorsqu'on juge qu'il n'y a plus assez d'espace vide, on retire cet acide par le moyen d'un siphon, & lorsqu'on en a une assez grande quantité, on peut le substituer au mélange d'acide sulfurique & de manganèse, & faire dans une semblable opération, si on n'a pas d'autre usage à en faire. Pour qu'il ne passe qu'une petite quantité d'acide muriatique non oxigéné, le premier tube doit faire un angle droit ou même un angle plus ouvert avec le corps du matras.

Il faut pendant l'opération mouvoir de temps en temps l'agitateur, pour favoriser l'absorption du gaz dans l'eau ; lorsque elle est achevée, la liqueur a la force convenable pour servir au blanchiment. On peut mettre une moindre proportion d'eau dans le tonneau, & en étendre ensuite la liqueur dans les proportions indiquées.

Dans cet état de concentration, quoique la liqueur conserve une odeur assez vive, elle ne peut cependant être nuisible ni même fort incommode à ceux qui en font usage. Néanmoins il est à propos de la conduire dans les baquets où on a arrangé les toiles, par des canaux de bois que l'on adapte à la tubulure placée à la partie intérieure du tonneau.

Il est bon de tirer du tonneau la liqueur aussitôt qu'elle est préparée, parce qu'elle a de l'action sur le bois.

Il faut préparer la toile en la laissant tremper 24 heures dans de l'eau, ou encore mieux dans de la vieille lessive, pour en extraire l'appret ou pareu ; ensuite il faut la soumettre à une ou deux bonnes lessives, parce que toute la partie qu'on peut en extraire par les lessives, auroit détruit la pureté de une partie de la liqueur dont il importe de ne gêner la quantité. Après cela on lave avec soin la toile, puis on la dispose dans les baquets, de manière qu'elle puisse être imprégnée de la liqueur qui doit y couler, sans qu'aucune partie soit pressée ou gâtée. Les baquets, ainsi que le tonneau, doivent être construits sans fer, parce que ce métal réduit en oxide par l'acide muriatique oxigéné,

(1) Il n'a paru que lorsque l'oxide de manganèse contenoit beaucoup d'azote, il étoit peu propre à former l'acide manganique oxigéné.

produiroit des taches de rouille, qu'on ne peut ôter du linge que par le moyen du *fel d'oselle*.

La première immersion doit être plus longue que les suivantes, elle peut durer trois heures; après cela, on retire la toile, on la lessive de nouveau, on la remet ensuite dans un baquet, pour y faire couler de nouvelle liqueur; il suffit que cette immersion soit d'une demi-heure. On retire la toile en exprimant la liqueur; on la lessive, & on lui fait subir de nouvelles immersions. La même liqueur peut servir jusqu'à ce qu'elle soit épuisée; lorsqu'on la trouve fort affoiblie, on peut y en ajouter une partie de récente.

Lorsque la toile paroît blanche, à part quelques fils noirs, & les linéaires, on l'imprègne de savon noir, & on la frotte avec force; ensuite on lui fait subir la dernière lessive & la dernière immersion.

On ne peut déterminer le nombre de lessives & d'immersions nécessaires, parce qu'il varie selon la nature de la toile. Cependant les limites de ce nombre sont entre quatre & huit pour les toiles de lin & de chanvre.

Je ne puis point donner d'indication sur la meilleure manière de faire les lessives; cet art si utile est encore livré à la routine & à des usages variés dans les différens endroits.

Je dirai seulement qu'il m'a paru avantageux de rendre l'alcali caustique, en y mêlant un tiers de chaux; mais alors il faut avoir soin que la lessive coule à travers un linge, pour que la terre calcaire, ne se mêle point avec la toile, parce que les molécules qui s'y trouveroient interposées, pourroient la corrompre par leur dureté. Par ce moyen, la lessive rendue plus active, n'a pas besoin d'une aussi grande quantité d'alcali, & cependant pourvu qu'elle ne soit pas trop forte, la toile n'en est pas altérée, malgré le préjugé contraire qui est assez général. J'ai aussi remarqué qu'il étoit inutile & même nuisible que les lessives fussent de longue durée; mais il faut qu'elles soient très-chaudes & assez fortes, autrement les toiles blanchies par l'acide muriatique oxygéné, se colorent & redeviennent rouilles, lorsqu'on les soumet à de nouvelles lessives. C'est un accident qui a eu lieu dans des épreuves dont je vais parler.

M. Caillaud s'étoit livré à Paris à un grand nombre d'essais en petit sur le nouveau blanchiment; mais la plupart de ces essais avoient été faits sur du coton qui est beaucoup plus facile à blanchir, & qui n'a pas besoin de lessives aussi fortes & aussi nombreuses que le lin ou le chanvre. Il alla à Saint-Quentin, pour faire des opérations sur les toiles de ce pays; mais il éprouva que toutes les toiles qu'il avoit blanchies à la satisfaction des gens de l'art, reprenoient de la rouille lorsqu'on les exposoit à une lessive ordinaire, ou même lorsqu'on

les abandonnoit pendant quelque-temps dans un magasin.

M. Decroisille éprouva à Rouen le même accident sur les toiles qu'il avoit blanchies; enfin, j'observai le même défaut dans des échantillons que j'avois blanchis dans mon laboratoire. Cependant M. Bonjour à Valenciennes & M. Welter à Lille, soutenoient que les toiles & fils qu'ils avoient soumis au blanchiment, conservoient parfaitement leur blanc dans toutes les épreuves auxquelles on les soumettoit. Je me convainquis bientôt que l'imperfection de mon blanchiment tenoit à la manière dont j'administrais les lessives.

Je me contentois dans les essais en petit, que je répétai dans mon laboratoire, de verser la dissolution alcaline chaude dans un vase où je mettois les échantillons; elles s'y refroidissoient promptement, & n'agissoient point d'une manière suffisante; mais, dès que je tins ces échantillons dans la liqueur que j'entretois à une chaleur voisine de l'ébullition pendant l'espace de deux ou trois heures, ils ne furent plus sujets aux mêmes inconvénients; c'étoit donc uniquement la faiblesse des lessives qui avoit causé les accidents que nous avions éprouvés. MM. Caillaud, Decroisille & moi. Il faut qu'à la dernière lessive les toiles ne changent pas de couleur, & c'est l'indice le plus sûr que le blanchiment est achevé; cependant après cette dernière lessive, il convient de mettre pendant quelques instans la toile dans la liqueur.

Après cette dernière immersion, il faut plonger ces toiles dans du lait aigri ou dans de l'eau qu'on a acidulée avec de l'acide sulfurique; je ne connois pas la proportion la plus convenable d'acide sulfurique; mais il m'a paru qu'on pouvoit employer avec succès & sans danger une partie en poids de cet acide sur 50 parties d'eau. Il faut tenir les toiles pendant environ une demi-heure dans cette liqueur tiède; après cela, il faut les exprimer fortement & les plonger tout de suite dans de l'eau ordinaire, parce que, s'il se faisoit une évaporation, l'acide sulfurique concentré par-là les attaqueroit. Les toiles bien lavées n'ont plus besoin que d'être séchées & apprêtées à la manière ordinaire, selon leurs différentes espèces. (1)

Il est bien important de veiller à ce que l'eau ne soit pas trop chargée d'acide sulfurique. C'est à une intention de cette espèce que j'ai attribué un accident qui est arrivé à M. Bonjour. On lui avoit envoyé des toiles pour constater la bonté du blanchiment. Il fit deux opérations, dont une fut destinée aux toiles les plus fines, telles que gazes & batistes, & l'autre aux toiles plus grossières. Le blanchiment des premières réussit parfaitement; mais la personne qu'il avoit chargée d'aciduler l'eau, ayant mis pour une petite quantité de toile la mé-

(1) J'ai reconnu qu'un des usages de l'acide sulfurique employé après le blanchiment des toiles, est d'enlever une portion de fer qu'elles contiennent.

me dose qu'on avoit coutume d'employer pour une quantité beaucoup plus considérable, les toiles furent fort affoiblies, accident qui n'étoit jamais arrivé dans les opérations qu'il avoit conduites pendant plus d'une année.

Le blanchiment des toiles de coton est beaucoup plus facile & plus court, deux lessives, tout au plus trois, & autant d'immersions dans la liqueur, leur suffisent; & comme elles blanchissent beaucoup plus facilement, il est avantageux, lorsqu'on a en même-temps à blanchir des toiles de lin, de chanvre & de coton, de réserver pour les toiles de coton les liqueurs qui ont été déjà affoiblies par celles de lin ou de chanvre; car il est important d'épuiser ces liqueurs autant qu'il est possible, & celles qui sont considérablement affoiblies suffisent encore pour le coton, quoiqu'elles n'exercent presque aucune action sur le chanvre & sur le lin.

Les fils offrent dans le blanchiment ordinaire beaucoup plus de difficultés que les toiles, à cause des surfaces multipliées qu'il faut présenter successivement à l'action de l'atmosphère; ils présentent une partie de ces difficultés dans le blanchiment par l'acide muriatique oxigéné. Cependant on trouve en dernier résultat plus d'avantage dans ce blanchiment que dans celui des toiles. M. Welter a formé à Lille, avec deux associés, un blanchiment de fil, qui a beaucoup de succès, & il en a déjà commencé quelques autres. Il a éprouvé qu'il falloit dix ou douze lessives & autant d'immersions pour quelques espèces de fils. Pour que les fils soient environnés de liqueur, il faut les mettre sans les presser dans un panier qui lui permette de pénétrer dans toute la surface. Lorsqu'elle est fort affoiblie, il est également avantageux de l'employer pour le blanchiment du coton.

J'avois, dans le commencement de mes expériences, essayé si la vapeur ne seroit pas précieuse à l'acide muriatique oxigéné en liqueur, & j'avois observé qu'elle blanchissoit avec beaucoup de promptitude; mais quelques précautions que j'ai prises, il m'a paru qu'on en faisoit une perte considérable, que les parties de la toile qui y étoient les plus exposées étoient sujettes à être affoiblies, & qu'il étoit plus difficile d'obtenir l'égalité du blanchiment.

Pour prévenir tous les accidents qui peuvent résulter de l'énergie trop grande de la liqueur, il est important d'avoir un moyen pour en mesurer la force. M. Decroixille a imaginé pour cela de se servir de la dissolution d'indigo dans l'acide sulfurique. On prend une partie d'indigo réduit en poudre fine avec huit parties d'acide sulfurique concentré; on met ce mélange dans un matras que l'on tient pendant quelques heures au bain-marie. Lorsque la dissolution est achevée, on étend de mille parties d'eau. Pour éprouver la force de l'acide muriatique oxigéné, on met une mesure de cette dissolution dans un tube de verre gradué, & on ajoute de la liqueur jusqu'à ce

que la couleur de l'indigo soit détruite. Il faut déterminer combien de mesures d'une liqueur dont on a apprécié la bonté par des expériences directes sur la toile; sont nécessaires pour détruire une mesure de la dissolution d'indigo; & ce nombre servira à déterminer la force respective de toutes les liqueurs qu'on voudra lui comparer. M. Watt s'en est servi de la même manière d'une dissolution de cochenille.

Dans le commencement de mes épreuves, on me pria d'aller à Javelle pour y montrer la manière dont il falloit préparer l'acide muriatique oxigéné, & s'en servir pour le blanchiment. Je ne faisois aucune difficulté de montrer ce procédé, que je desirois de voir se propager; j'allai même deux fois à Javelle; j'y exécutai la distillation de l'acide muriatique oxigéné dans des vaisseaux que j'y portai, & j'y blanchis quelques échantillons de toile. A cette époque, j'employois encore une liqueur concentrée, & j'y mêlois un peu d'alcali. Quelque temps après, les manufacturiers de Javelle publièrent dans différents journaux qu'ils avoient découvert une liqueur particulière qu'ils appelloient *lessive de Javelle*, & qui avoit la propriété de blanchir les toiles par une immersion de quelques heures. Le changement qu'ils avoient fait au procédé que j'avois exécuté en leur présence, consistoit en ce qu'ils mettoient de l'alcali dans l'eau qui reçoit le gaz, ce qui fait que la liqueur se concentre beaucoup plus, de manière qu'on peut ensuite l'étendre de plusieurs parties d'eau pour s'en servir. Voici les proportions qui m'ont donné une liqueur pareille à la prétendue lessive de Javelle: deux onces & demie de sel, deux onces d'acide sulfurique, six gros d'oxide de manganèse, & dans le flacon où vient se concentrer le gaz, une livre d'eau & cinq onces de potasse qu'il faut y faire dissoudre. La liqueur de Javelle a un œil rougeâtre qui provient d'un peu de manganèse; on qui passe dans la distillation, parce qu'on ne se sert pas de vaisseau intermédiaire, ou parce que la plupart des potasses en contiennent, ainsi que je m'en suis assuré. Cette liqueur peut être étendue de dix à douze parties d'eau, & malgré cela, elle blanchit plus promptement que la liqueur simple; mais sans parler des imperfections de la méthode qui est décrite dans l'annonce de Javelle, & qui ne peut être suffisante que pour le coton, l'on ne peut blanchir avec l'acide muriatique oxigéné engagé de cette manière avec l'alcali, qu'une quantité de toile bien moins considérable que celle qu'on blanchiroit avec la même quantité d'acide muriatique oxigéné qui seroit simplement combiné avec l'eau, parce qu'il se forme une partie de ce sel neutre qui est connu à présent sous le nom de *sel neutre sulfurigén de potasse*, & dans lequel l'oxigène se concentre. Or tout l'oxigène qui entre dans la composition de ce sel, est devenu inutile au blanchiment; car le muriate oxigéné de potasse ne détruit point les couleurs, ainsi que je l'ai annoncé.

et dans mon mémoire sur quelques combinaisons de l'acide muriatique oxigéné, dans lequel j'ai donné en détail tous les phénomènes que présente la potasse avec l'acide muriatique oxigéné (mém. de l'acad. de Turin.) Ajoutez à ces considérations l'augmentation de prix, qui provient de la quantité de potasse dans laquelle on reçoit le gaz, & cependant l'un des anciens entrepreneurs de Javelle a demandé en Angleterre un privilège exclusif pour ce nouveau procédé de son invention.

J'espère que les détails que je viens de donner pourront guider ceux qui voudront entreprendre le nouveau blanchiment; l'observation nous donnera sans doute des moyens de le perfectionner, & j'instruirai le public de ce qui parviendra à ma connoissance. Il y a, par exemple, une partie importante sur laquelle je ne puis rien dire encore particulièrement; c'est le moyen de retirer la soude du résidu des distillations que j'ai prescrit de rassembler dans un vase pour cet usage. J'ai essayé sur ce résidu un procédé que M. Morveau m'a communiqué & qui lui appartient, & j'en ai retiré la soude. M. Morveau a bien voulu à ma prière faire des expériences sur ce résidu, & d'après ses premiers aperçus, il présume que le bénéfice qu'on pourra en tirer couvrira à-peu-près tous les frais de l'acide muriatique oxigéné, de sorte que cette liqueur ne coûtera presque rien, & qu'il ne restera que les dépenses des lessives. Je connois plusieurs procédés propres à remplir cet objet; mais je ne puis en disposer, parce qu'ils m'ont été confiés sous le secret.

Si la fabrication de l'acide sulfurique étoit réunie au procédé du blanchiment, cette substance à laquelle est due la plus grande partie du prix de la liqueur, reviendrait à beaucoup plus bas prix qu'elle ne se vend, sur-tout en épargnant les frais de la concentration. L'on a l'espérance de voir perfectionner la fabrication de cet acide par la suppression du nitre, & par la diminution de la perte des vapeurs. (encyclopédie méthodique page 357.) Cette réunion ferait nécessaire pour réduire à rien le prix de la liqueur.

Enfin, l'art des lessives pourrait être perfectionné par le secours des machines, & lorsque l'action de l'alcali est épuisée parce qu'il est saturé, soit de matière extractive, soit de parties colorantes, on pourrait au moins dans les endroits où le combustible est à bon marché, les évaporer jusqu'à siccité, & rendre son activité à l'alcali en calcinant les matières qui le satureroient.

Si donc à présent que l'acide muriatique oxigéné revient à-peu près à trois deniers la pinte de Paris dans les provinces qui ne sont pas sujettes à l'impôt de gabelle (1), on trouve déjà avantageux le nouveau blanchiment même pour la dépense di-

recte, lorsqu'il est bien dirigé; l'on ne peut douter qu'il ne puisse le devenir beaucoup plus par les économies que je viens d'indiquer; mais pendant que la liqueur conservera quelque valeur, il y aura toujours une grande inégalité en faveur des toiles fines, parce qu'à surface égale elles ont beaucoup moins de masse, & qu'elles blanchissent plus facilement; ainsi une aune de toile fine exige beaucoup moins de liqueur qu'une aune de toile grossière, & de plus une livre de toile fine en demande moins qu'une livre de toile grossière.

Ce n'est pas seulement par les frais du nouveau procédé, comparé rigoureusement avec ceux du blanchiment ordinaire, qu'il faut juger de ses avantages; il en présente de particuliers qui seroient propres à compenser un prix supérieur. Les toiles & les fils qui dans quelques endroits demandent plusieurs mois pour être blanchis, peuvent l'être facilement dans cinq ou six jours, même dans un grand établissement; car une opération qui ne se fait que sur quelques pièces, peut sans difficulté se terminer dans deux ou trois jours. Pendant l'hiver, le nouveau blanchiment peut s'exécuter aussi-bien qu'en été, seulement la dessiccation exige plus de temps.

L'habitant de la campagne dont la famille occupe les intervalles de loisir à la filature, est obligé d'attendre la saison favorable pour envoyer ses fils & ses toiles souvent à une grande distance où on leur fait subir un long blanchiment; cependant les besoins le pressent, il est obligé de les livrer à perte à des commerçans intermédiaires qui mettent un impôt sur son indigence. Mais si des établissemens destinés à la préparation de l'acide muriatique oxigéné se multiplient assez, celui qui aura tissu une toile pourra la blanchir lui-même, & jonir de tout le fruit de son travail aussi-tôt qu'il sortira de ses mains.

Le commerçant, dans une saison défavorable au blanchiment ordinaire, ne peut remplir ses engagements de d'une manière onéreuse; il est obligé d'employer des fonds considérables pour remplir ses magasins dans la saison où le blanchiment s'exécute. Il se trouve souvent dans l'impuissance de se livrer à des spéculations heureuses, & de profiter des occasions favorables qui se présentent dans un moment inattendu, parce qu'il faudroit trop de temps pour blanchir les toiles dont il auroit besoin.

Le consommateur trouvera aussi son avantage, puisque non-seulement il doit en dernière analyse résulter quelques diminutions sur le prix des toiles & des fils, mais encore le nouveau blanchiment administré comme il doit l'être, diminue beaucoup moins la solidité originaire du lin & du chanvre que les opérations longues & multipliées du

(1) Ce mémoire a été écrit en 1789, depuis cette époque, l'impôt de la gabelle a été supprimé, le sel est très-bon marché, & tous les calculs scilicet alors (sur son prix) doivent être raisonnés, comme le prix du sel dans les différens lieux où se font faire les établissemens. Ainsi les avantages de ce procédé sont aujourd'hui beaucoup plus considérables qu'ils l'étoient en 1789.

blanchiment ordinaire. Il paroît même par des expériences de M. Decroisille, que l'acide muriatique oxygéné en refermant les pores du coton, lui donne plus de solidité, & qu'en même temps il lui communique la propriété de prendre des couleurs plus éclatantes. De ce que les toiles sont moins usées, il en résulte un inconvénient aux yeux de quelques commerçans, c'est qu'elles paroissent moins fines que les toiles de même qualité blanchies à la manière accoutumée. M. Ponceau a même été obligé de chercher les moyens d'user les toiles qui avoient été blanchies à la manière accoutumée dans l'établissement qu'il dirige. On sent que ces moyens ne sont pas difficiles à trouver; mais ceux qui voudront s'en passer profiteront d'une plus grande solidité.

Et ces vastes prairies qui, dans les pays les plus fertiles, sont abandonnées aux toiles qu'il faut y tenir étendues pendant toute la belle saison, parviendrai-je à les conquérir à l'agriculture; pour laquelle leurs productions sont perdues pour la plus grande partie?

Si je ne me fais pas illusion, le procédé que j'ai décrit doit être distingué de ceux qui contribuent aux simples progrès des arts; il mérite une recommandation particulière auprès de ceux qui veillent sur la prospérité publique, puisqu'outre les intérêts du commerce, il peut contribuer directement à vivifier les campagnes, qui sont la première source de nos richesses, & qui ont tant de droits à nous inspirer de l'intérêt.

Je vais passer à la description de quelques autres usages auxquels on peut employer l'acide muriatique oxygéné. Il paroît qu'on peut s'en servir avec succès pour détruire le fond garancé des toiles peintes. Lorsqu'on a imprimé ces toiles avec différens mordans, on les passe dans la garance où les dessins prennent différentes nuances suivant la nature des mordans; mais le fond de ces toiles reçoit aussi la couleur de la garance; cette couleur est beaucoup moins solide que celle qui a été fixée par les mordans, & il faut la détruire par le moyen de la bouze de vache & du son, & par de longues expositions sur le pré. Je cherchai à suppléer à ces moyens par l'acide muriatique oxygéné, mais j'observai que les couleurs qui devoient être conservées étoient elles-mêmes fort altérées. M. Henry, savant chimiste de Manchester, éprouva que les carbonates, soit de potasse, soit de soude, empêchoient ce mauvais effet de la liqueur, & qu'il s'en est servi depuis lors avec succès; j'ignore les détails du procédé qu'il suit. M. Decroisille m'écrivit à-peu-près dans le même temps, qu'il avoit fait la même observation, & que la vérité bien-tôt me servant du procédé que j'ai décrit à l'oc-

casion de la lessive de Javelle, en étendant de beaucoup d'eau la liqueur qu'on obtient par-là. M. Oberkampf, à qui je communiquai ce procédé, & qui ne néglige rien de ce qui peut établir la perfection de sa belle manufacture de toiles de Jouy, ne tarda pas à commencer les essais qu'il vient de continuer avec M. Royer, & qui promettent un heureux succès pour les couleûrs dans lesquelles le fer n'est pas encore employé, car celles là sont affoiblies & les rouges au-contre prennent plus d'éclat que par le procédé ordinaire; mais ce que je connois de cet art n'est pas encore porté à une assez grande perfection, pour que j'en présente les détails. (1)

Il sera probablement plus important pour le procédé des toiles peintes que pour le blanchiment, de pouvoir déterminer la force comparative des liqueurs; mais la dissolution d'indigo ne peut être employée à cet usage, parce qu'elle ne se décolore qu'imparfaitement lorsqu'il y a un mélange d'alcali, selon l'observation que m'a communiquée M. Watt: au-contre la dissolution de cochennille remplit parfaitement cet objet.

M. Henry & Decroisille ont aussi observé qu'on pouvoit employer avec succès la liqueur composée d'acide muriatique oxygéné & d'alcali, pour aviver le coton qu'on a teint en rouge d'Andrinople.

J'ai fait voir qu'on pouvoit blanchir, par le moyen de l'acide muriatique oxygéné, la cire végétale qui est verte; je n'ai pu lui donner un blanc égal à celui que prend la cire ordinaire, mais elle ne retenoit qu'un teint jaune, & elle s'étoit fort rapprochée par les autres propriétés, de la cire ordinaire. J'avois aussi éprouvé que la cire jaune pouvoit blanchir par ce moyen; mais il m'avoit fallu refondre cette cire, & répéter plusieurs fois l'opération pour la bien blanchir; & j'avois jugé que les frais seroient trop considérables pour pouvoir substituer ce procédé à celui dont on fait usage.

M. le chevalier Landriani m'a écrit que M. le baron de Born avoit éprouvé que la cire jaune se blanchissoit fort bien lorsqu'on l'exposoit à la vapeur de l'acide muriatique oxygéné, & qu'il se proposoit de faire un établissement de ce blanchiment. Ici la vapeur n'offre pas les principaux inconvénients dont j'ai parlé pour les toiles, & je ne serois pas surpris qu'on pût se servir avantageusement de ce procédé.

J'ai annoncé dans mes premiers mémoires que l'on pouvoit se servir de cette liqueur pour éprouver la solidité des couleurs, & pour découvrir dans quelques instans quelles dégradations l'injure du temps devoit y produire. Un grand nombre d'expériences m'ont convaincu de ce

(1) Il paroît, par ce que j'en viens d'apprendre de M. Taglos, chimiste manufacturier de Manchester, où l'on commence de ces nouveaux établissemens, que l'on n'a pas toujours besoin d'ajouter de l'alcali à l'acide muriatique oxygéné; & que les couleurs qui ont été teintes par ce moyen ne sont pas toujours affoiblies. Ces effets variés dépendent probablement des procédés différens dont on se sert pour imprimer les toiles.

propriété, & je n'ai rencontré jusqu'à présent qu'un très-petit nombre d'exceptions; je crois même que l'on ne fera jamais trompé lorsqu'on mettra dans la même liqueur, pour servir d'objet de comparaison, un échantillon d'une même couleur, & de la bonté de laquelle on fera assuré.

M. Hausseman de Colmar a éprouvé, ainsi que je le tiens de M. Diétrich, que l'on pourroit détruire la couleur quelconque d'un drap par le moyen de l'acide muriatique oxygéné, en le passant ensuite dans une légère dissolution d'acide sulfurique, pour dissoudre les parties métalliques qui se trouvent dans plusieurs teintures. Il faut cependant observer (& c'est une propriété dont on peut encore tirer avantage) que l'acide muriatique oxygéné colore en jaune les substances animales; je suis par-là porté à croire que le procédé de M. Hausseman est sur-tout applicable aux substances végétales.

Addition à la Description du blanchiment, &c. tome 6 des annales de chimie, p. 204.

Je me suis proposé, en publiant la description du blanchiment par l'acide muriatique oxygéné, de communiquer tout ce que je pourrois ajouter à ce procédé, soit par mes propres observations, soit par ses correspondances, lorsqu'on ne s'y a point imposé le secret, & il doit paroître naturel que les personnes qui se dévouent à cet art, se réservent les améliorations auxquelles elles sont parvenues, car il n'y a pas de propriété plus respectable que les découvertes de l'industrie.

M. Welter a éprouvé qu'il étoit avantageux de terminer le procédé par l'exposition des fils & des toiles sur le pré, pendant trois ou quatre jours, pendant lesquels il faut les arroser quelquefois, & après cela, les laver dans de l'eau pure. Il croit que cette exposition est indispensable pour leur ôter une nuance jaunâtre qu'ils conservent; mais il observe que le coton n'a pas besoin de cette opération.

D'autres personnes ont blanchi à l'entière satisfaction des gens de l'art, sans cette exposition, & dans plusieurs expériences, je me suis convaincu que l'on pouvoit amener le lin au blanc le plus parfait sans elle; cependant lorsque le fil & la toile se trouvent comprimés dans quelques parties, comme il est bien difficile qu'ils ne le soient dans les opérations en grand, ces parties conservent un œil jaune qui exigeroit quelquefois plusieurs opérations pour être effacé par-tout également; ce qui augmenteroit les frais, & tendroit à affoiblir le lin, au lieu qu'une courte exposition sur le pré dissipe cette nuance. Cette pratique me paroit donc devoir être adoptée pour le lin; elle n'exige qu'un terrain très-peu étendu, & elle n'entraîne qu'un faible désavantage pour le temps.

Loin que M. Desroville ait renoncé à l'établissement qu'il a formé à Rouen, comme je l'ai dit

sur une relation fautive, il y a fait divers changemens avantageux au procédé, ainsi qu'on devoit l'attendre des soins de cet habile chimiste. Il me permet de publier ce passage d'une de ces lettres.

« On vous a trompé, Monsieur, lorsqu'on vous a dit que mon établissement pour la composition & emploi de votre lessive n'avoit point eu lieu; il est maintenant en pleine activité. Nous blanchissons au même prix à-peu-près que les vareuriers, les grosses étoffes de coton & les toiles fines de lin pour chemises, les bas, bonnets &c., en fil & coton. Je me flatte d'avoir perfectionné votre découverte. Mon grand récipient distillatoire est dans un genre tout-à fait nouveau; j'en ai totalement banni le bois; chacun de mes matras contient 60 livres d'acide sulfurique, &c. J'ai banni également le bois pour les vases où je plonge les sujets à blanchir. Notre blanc est maintenant plus estimé que le plus beau blanc que fissent les Anglois avant votre découverte. Le coton filé, blanchi par votre lessive, prend avec beaucoup d'avantage la teinture dite d'Andrinople, on évite, par ce moyen, environ un tiers de la main-d'œuvre. Il faut moins d'huile dans les apprêts; votre lessive d'ailleurs, employée dans certaines circonstances du procédé, concurrence avec les autres drogues, produit une couleur beaucoup plus belle. Votre découverte sera des plus utiles à notre ville; bien des marchands trouvent leur compte à donner des étoffes à déteindre, & je leur rends les étoffes aussi saines & aussi blanches que si jamais elles n'eussent subi teinture ou impression. »

La substitution d'une matière, qui ne soit pas attaquée par la liqueur au bois pour le tonneau pneumatique & pour les baquets, est très-importante pour le succès de ce blanchiment, parce qu'on évite par-là une perte considérable de liqueur, qui porte son action sur le bois, & les frais de réparation des vases qui se détruisent promptement.

J'ai présent de plonger dans l'eau la toile qu'on fait agitée par l'acide sulfurique; cette préparation ne suffit pas, il faut la plonger dans une légère lessive caustique, médiocrement chaude, & l'y tenir pendant quelques instans.

Lorsqu'on fait couler immédiatement la liqueur dans les baquets, ainsi que je l'ai prescrit, il faut avoir soin de la bien mêler avec l'agitateur, parce qu'autrement la liqueur la plus saturée qui occupe le fond s'écouleroit la première, & auroit une trop grande action. L'on peut se passer d'agitateur, & alors ne laisser couler que la moitié ou les trois quarts de la liqueur qu'il faut mêler avec la quantité d'eau qui lui convient, selon les proportions que j'ai établies, & le reste de la liqueur qui se trouve très-faiblement imprégnée sert, avec l'eau qu'on ajoute, pour l'opération suivante.

Plusieurs personnes ont entrepris le procédé sans avoir des notions de chimie, ou sans faire at-

tention à la qualité des fils & des toiles, & elles n'ont pu réussir, ou bien les frais ont été trop grands, selon leurs combinaisons.

Il ne faut pas se flatter, quelque simple que soit ce procédé, de pouvoir l'exécuter sans être guidé dans les commencemens par une personne qui soit familière avec les opérations de chimie. Je dois insister plus que jamais sur les frais de l'opération : l'on ne peut espérer une diminution ou même une égalité de frais relativement au procédé ordinaire, que pour le blanchiment des toiles fines, à moins qu'on n'ait un bon procédé pour retirer la soude du résidu de la distillation, & sans cette condition, l'on ne doit entreprendre le blanchiment de celles qui ne sont pas fines, que dans le cas où les avantages qui résultent de la célérité de l'opération, & de la facilité de l'exécuter en tout lieu & en toute saison, & de la diminution des fonds morts qu'exige le commerce des toiles, pourroient dédommager de l'excès du prix.

Il n'est pas possible d'établir des données, d'après lesquelles on puisse se déterminer dans chaque cas particulier ; mais l'engagement que cet objet peut intéresser, de commencer par des essais, & d'établir par leur moyen des calculs dans lesquels il ne faut point chercher à se flatter, d'un autre côté, on ne doit point bien laisser imposer par les pertes auxquelles on est sujet avant que d'être familiarisé avec les opérations ; mais il est peu dispendieux de suivre pendant quelque temps les essais par lesquels on a l'avantage de se disposer aux opérations en grand.

Extrait d'une lettre de M. Charles Taylor à M. Berthollet. Ann. de chimie, tom. VII, p. 144.

Le blanchiment sur les principes que vous avez établis s'est fort étendu dans notre voisinage, & est exécuté par différentes personnes avec beaucoup de succès. J'ai remarqué dans ce que vous avez dit (ann. de chim., tom. II, p. 187) une erreur que j'attribue à la difficulté que j'ai à m'exprimer avec clarté en français. Vous supposez que je vous ait dit que les couleurs où entre le fer ne sont pas toujours effacées par l'acide muriatique oxigéné ; mais, ce que j'ai voulu vous dire, c'est que les fonds blancs des pièces blanchies par l'acide muriatique oxigéné étoient aussi purs & aussi blancs que ceux des pièces qui avoient été blanchies à la manière ancienne, & après cela blanchies par l'acide sulfurique délayé, lorsqu'on les imprimoit ensuite & qu'on les passoit dans la cuve de garance comme à l'ordinaire. Je n'ai pas voulu dire que les couleurs noires imprimées sur le coton n'étoient pas détruites ou effacées par l'acide muriatique oxigéné. Je trouve que les couleurs imprimées sont plus vite effacées que celles qui sont teintes. Les échantillons que je vous envoie ont été faits avec du coton non-blanchi ou du fil de coton dans son état naturel qui a été blanchi, sans que celui qui avoit

été teint auparavant ait souffert dans sa couleur par le procédé qu'il a supporté en même temps.

Lettre de M. J. M. Hauffman à M. Berthollet, 23 juin 1791. Ann. de chim., tom. II, p. 237.

J'aurois été bien embarrassé l'hiver dernier, si, au moyen de l'acide muriatique oxigéné mêlé avec la potasse, je n'avois blanchi 3 à 4000 pièces de toile de coton & de lin, imprimées & garancées en toutes nuances. Depuis j'ai encore blanchi 300 pièces de toile de coton sortant du métier du tisserand, & qui étoient destinées pour être imprimées en bleu & en rouge camayeux par les planches de cuivre. J'ai fait ce blanchiment en faisant préalablement toïner, par le moyen d'un moulinet, quatre fois de chaque côté vingt-cinq pièces de dix aunes à chaque opération dans une chaudière contenant une faible lessive de potasse caustique bouillante, & en leur faisant faire, après les avoir lavées, trois tours par le moyen du moulinet, dans la cuve qui contenoit l'eau chargée d'acide muriatique oxigéné. Je vous donnerai de plus amples détails sur ces opérations dans une autre lettre.

Je remplis avec d'autant plus de plaisir l'engagement que j'ai pris de vous communiquer mes observations sur l'usage de l'acide muriatique oxigéné pour les toiles d'impression, que vous m'apprenez que vous desirez en faire la comparaison avec les procédés que l'on suit dans la manufacture de M. Oberkampf, & que par ces communications réciproques, le procédé pourra se perfectionner.

L'alkali dont je me sers communément est la potasse ordinaire ; je charge sa dissolution d'une quantité plus ou moins grande d'acide muriatique oxigéné. La liqueur agit plus ou moins efficacement, plus ou moins promptement, en raison de l'excès de l'alkali, ou celui de l'acide muriatique oxigéné : dans le premier cas, l'on n'avance pas assez, & dans le second l'on risque de trop égarer les couleurs, fait tout, l'effeuillage est obligé de s'absenter, & de confier l'opération à des ouvriers. Je tâche de saisir le juste milieu, & comme l'on n'a pas toujours des ingrédients de même qualité, j'ajoute de la dissolution d'alkali à la liqueur si elle agit avec trop de force sur les couleurs ; & dans le cas où l'alkali prédomine trop, je lui fais absorber une nouvelle portion d'acide muriatique oxigéné.

Il y a trois ans que je me suis servi de l'alkali caustique combiné avec l'acide muriatique oxigéné ; j'ai retiré dans ce procédé du muriate oxigéné de potasse, & il m'a paru que la liqueur préparée de cette manière agissoit trop promptement sur les couleurs, & trop lentement si l'alkali s'y trouvoit en excès, ce qui me fait croire que l'affinité de l'acide muriatique oxigéné ne s'empare pas de beaucoup celle du gaz acide carbonique avec l'alkali, d'autant

d'autant plus que ce dernier ne me paroît se laisser chasser de l'alcali que lorsqu'on continue de plus en plus l'absorption de l'acide muriatique oxigéné. D'après cela la portion d'alcali qui reste combinée avec l'acide carbonique, ou plutôt la combinaison mixte de celui-ci & de l'acide muriatique oxigéné avec l'alcali, ne doit pas présenter le même obstacle dans le blanchement des toiles d'impression que la liqueur qui contient un excès d'alcali caustique.

Je prépare en deux temps la liqueur dont je me sers pour le blanchiment ; je place un récipient, ou plutôt une cloche d'étain, dans une cuve de pierre à grain fin, laquelle je remplis avec une lessive faite avec vingt-cinq livres de potasse ordinaire, & deux cens livres d'eau. Le dégagement se fait dans un grand fâcon qui a servi à contenir l'acide sulfurique de Javel ; je place ce fâcon dans une chaudière de cuivre posée sur un fourneau, & lorsqu'un mélange de trois livres de manganèse d'Ilmenau en Saxe, de neuf livres de sel marin, & de quatre livres d'acide sulfurique de Javel, étendu avec autant d'eau, a donné tout l'acide muriatique oxigéné qui peut s'en dégager à une chaleur augmentée peu-à-peu jusqu'à l'ébullition du bain-marie ; je répète aussitôt la même opération, & avant de me servir de cette liqueur, je l'affoiblis avec sept, huit à neuf parties d'eau. Si les vaisseaux sont assez grands, je double la dose des ingrédients, & je ne fais qu'une opération.

C'est d'un tube de plomb que je me sers pour introduire le gaz sous le récipient d'étain. Je n'ai pas besoin d'agitation pour renouveler les surfaces & favoriser l'absorption, parce que l'éruption des bulles produit assez cet effet.

Ayant fait une absorption du gaz acide muriatique oxigéné dans une cuve garnie en plomb & remplie d'une dissolution d'une partie de potasse caustique sur huit parties d'eau, il se forma beaucoup d'oxide de plomb, qui de jaunâtre qu'il étoit d'abord devint de plus en plus rougeâtre, ensuite brun, & qui finit par se dissoudre en partie dans la lessive, en lui communiquant une couleur transparente de pourpre foncé ; une petite partie de cette liqueur donnoit à l'eau, sans la troubler, une nuance violette & lilas très-agréable. Cette teinture pourprée, séchée sur un morceau de toile de coton, perdit sa couleur & le laissa blanc. J'aurois dû saturer d'acide muriatique oxigéné cette teinture, pour voir si elle ne perdrait pas sa couleur, & ne laisseroit pas précipiter un oxide de plomb. La liqueur préparée avec la potasse ordinaire & étendue avec suffisante quantité d'eau, n'agit pas sensiblement sur le plomb, de sorte que l'on peut très-bien se servir de vases faits avec ce métal pour le blanchiment : je me sers depuis quelque temps d'une chaudière de cuivre & sans déavantage.

Ce qui, dans le plus grand nombre de cas, nuit beaucoup à l'éclat & à la beauté des cou-

Chimie, Tome II.

leurs de garance, qu'on soumet à l'ancien blanchiment, & qui devient d'une nécessité indispensable pour le nouveau, c'est que toutes les couleurs des toiles imprimées doivent être bien saturées de garance, afin qu'elles puissent céder le superflu à l'oxigène de la liqueur en même temps que celui-ci devint celles qui doivent disparaître pour rétablir le blanc. Il faut également que les nuances se trouvent toutes bien proportionnées, pour que celles qui doivent être faibles ne disparaissent pas avec celles qui doivent laisser le fond blanc.

De toutes les nuances qui s'obtiennent au moyen des substances végétales & animales à l'aide des mordans, ce sont les rouges de garance qui résistent le mieux à l'action de la liqueur ; le noir & les nuances qui en dérivent s'altèrent plus facilement, sur-tout lorsqu'on les produit avec les noix de galle, le sumach & des substances analogues ; excepté la garance, qui adhère plus fortement à l'alumine & à l'oxide de fer que toute autre substance végétale & animale. Les couleurs appliquées sur des fonds blancs de quelques nuances qu'elles soient, rouges, noires, lilas, violettes, &c. résistent beaucoup mieux à l'action de la liqueur que les fonds couverts de mêmes couleurs ; & ce qu'il y a de plus surprenant, c'est qu'ils sont altérés en raison de leur intensité, c'est-à-dire, que les fonds des couleurs les plus foncées souffrent le plus promptement. Si donc on peut blanchir à la fois & en les faisant souvent tourner, vingt à trente pièces imprimées en fond blanc, & dix à seize pièces en fonds couverts en couleurs de rouge clair ou rose, de violet & lilas, il est fort prudent de ne faire tourner au moulinet qu'une seule pièce à la fois de fonds rouge, mordoré, puce, marron & noir, parce que si l'on réunît deux ou plusieurs de ces pièces, elles risquent de devenir inégales par le peu de temps qu'elles peuvent rester dans la liqueur.

Lorsque la liqueur est récente, l'on ne doit passer chaque pièce à fond foncé que cinq, six, sept à dix tours de moulinet ; mais lorsqu'elle s'est affoiblie par l'usage qu'on en a fait, l'on peut y passer chaque pièce de dix à vingt fois.

Il faut absolument que pour les opérations l'opérateur exerce ses yeux ; tout dépend ici du comp-d'œil ; il faut qu'il soit exact, sans quoi l'on s'expose à affoiblir & à altérer les couleurs.

Les différentes nuances de jaune, d'olive, de merde-d'oie, de carmelite, d'orange, de capucine, &c., que l'on se procure au moyen des mordans par la teinture en gaude, guer-citron & autres substances végétales, propres à produire ces nuances, ne résistent que très-peu de temps à l'action de la liqueur, de sorte que pour blanchir les pièces teintes en pareilles couleurs, l'on ne peut se dispenser d'avoir recours à l'ancienne méthode, à moins qu'on ne ménage le blanc par d'autres voies, ou par l'ébullition dans l'eau du

fon. En étendant une portion de liqueur dans une grande quantité d'eau, l'on parviendroit bien à procurer le blanc sans altérer beaucoup les nuances précédentes; mais dans ce cas il ne faudroit traiter qu'une pièce à la fois, & renouveler le bain pour chaque pièce, ce qui n'est pas praticable en grand. L'on peut aussi ajouter au bain une petite portion de nouvelle liqueur après chaque pièce qu'on y passe.

Lorsque la liqueur a cédé tout son oxygène aux parties colorantes, elle se trouve colorée par l'action que son excès d'alcali a exercée sur ces parties, & c'est une marque certaine qu'elle n'est plus propre à blanchir. L'on peut encore s'en convaincre en y versant un peu d'un acide quelconque, qui n'en dégage plus de gaz muriatique oxygéné. Lorsque la liqueur exerce son action, & que l'oxygène se combine avec les parties colorantes, il s'en dégage une odeur qui m'a paru ressembler à celle du raifort.

Pour tirer le meilleur parti possible de la liqueur à blanchir, il faut bien dégorger les pièces qui sortent des chaudières de teinture: pour cet effet, après les avoir foulées & rincées, on les fait premièrement bouillir dans l'eau de son; ensuite dans l'eau de savon, & après avoir répété à chacune de ces opérations le foulage & le rinçage, on peut les exposer sur le pré pendant quelques jours, ce qui ménage & favorise beaucoup l'action de la liqueur. (1) Cette préparation préliminaire a encore l'avantage de rendre les couleurs beaucoup plus solides, & par conséquent de les faire mieux résister à l'action de l'oxygène; cependant cette observation ne regarde que les fonds blancs & les fonds couverts en violets, lilas & roses, mais pour les fonds qui sont foncés, tels que les rouges de cécise & de sang, les puceux, marrons, &c. je conseillerois simplement de les faire bouillir dans l'eau de son & non dans l'eau de savon; je m'entendrai sur les raisons de cette différence en parlant dans une autre occasion des observations que j'ai faites sur les teintures à garance, j'ajouterai seulement ici qu'après avoir tiré les pièces de la liqueur, & les avoir foulées & rincées, on ne fera pas mal de les passer légèrement dans de l'eau de savon bouillante, ce qui rehaussera l'éclat des couleurs. Il est presque superflu de prévenir que ces sortes d'opérations ne peuvent convenir qu'aux indiennes de bonne qualité, car les indiennes ordinaires ne supporteroient pas cette fatigue, qui terniroit les couleurs au lieu de les embellir. Les

fonds noirs pour deuil ne peuvent non plus être soumis au blanchiment artificiel, parce que les noirs ordinaires que l'on teint au moyen du bois de Campêche, n'y téfileroient pas du tout, & ceux que l'on obtient en employant la garance risquent de tirer plus ou moins à la nuance de marron, selon la solidité qu'on leur aura donnée par la manière de les garancer, & l'action plus ou moins forte & continuée plus ou moins long-temps de la liqueur à blanchir.

Schéele est le premier chimiste qui se soit aperçu que l'acide muriatique oxygéné diffère de l'acide muriatique ordinaire, par la propriété de décolorer les substances végétales; & vous, Monsieur, vous êtes le premier qui en ayez fait une application heureuse & utile aux arts. Il ne reste plus de doute que la liqueur à blanchir ne produise son effet que par son oxygène, qui se combine d'abord avec les parties colorantes & ensuite avec la substance décolorée même, lorsqu'on la laisse exposée à son action, & dont elle affoiblit & détruit à la fin la structure, en changeant la manière d'être de ses parties constituantes. Si donc l'exposition sur le pré produit un effet analogue, on ne peut l'attribuer qu'au gaz oxygène qui fait partie de l'air atmosphérique, & si cet effet a lieu plus lentement, ce ne peut être que parce que l'oxygène se trouve étendu dans une trop grande masse d'autres fluides, tandis qu'il se laisse très-bien concentrer dans la liqueur à blanchir. L'air atmosphérique m'a toujours paru agir plus promptement sur les pièces exposées sur le pré, lorsque ses couches sont déplacées & renouvelées par le vent, & sur-tout lorsque le calorique en étendant les molécules intégrantes des couleurs & des parties fauves, favorise son action; l'arrosement & les dédications multipliées contribuent beaucoup aussi à accélérer le blanchiment des pièces, ce qui peut provenir de l'air atmosphérique qui se trouve disséminé dans l'eau. En considérant avec attention dans toutes les saisons froides & chaudes, venteuses & calmes, la marche du blanchiment naturel, je serois tenté de croire qu'en même-temps que l'oxygène exerce son action sur les couleurs, les liquides & fluides en emportent une partie.

Il résulte de ce que je viens d'exposer sur le blanchiment artificiel des toiles imprimées, que les fabricans d'indiennes peuvent s'en servir avec avantage en hiver. Comme nous sommes suffisamment poutvins de prés, qui, pour notre commo-

(1) Si les toiles que l'on destine à l'impression ont été préalablement bien blanchies, elles sortent plus pures de toutes les saletés ou général, & blanchissent ensuite plus facilement & plus promptement. Soit sur le pré, soit par la liqueur, il seroit donc important de rendre un blanc parfait, sur-tout aux toiles de coton des Indes, qui peignent ordinairement par le degré de blancheur avant de les soumettre à l'impression; mais comme on en reçoit qui ont le défaut d'être bien foulées, & de se déchirer facilement, je n'ai pas osé depuis entreprendre le blanchiment complet dans la crainte de les affaiblir davantage; car lorsqu'une fois les toiles de coton ou de lin ont acquis un certain degré de blancheur, il ne faut pas s'imaginer qu'elles ne souffrent absolument rien par l'action de l'oxygène, soit qu'on achève de les blanchir sur pré ou par l'acide muriatique oxygéné, encore moins faut-il croire qu'elles acquièrent plus de solidité en les blanchissant davantage, comme quelques personnes veulent le faire croire.

dité se trouvent en face de notre fabrique, & comme nous ne manquons jamais de provisions pour les pinceautages; & pour la succession de nos travaux, je préfère de faire usage du blanchiment naturel en été, & de cela d'autant plus, qu'il exige moins de surveillance de ma part. Je vous ai déjà dit que j'avois blanchi l'hiver dernier avec la liqueur oxigénée trois à quatre mille pièces de toutes les longueurs; je compte faire, bien davantage dans le courant de celui-ci.

Lorsque j'établis dans ma fabrique l'usage de la teinture en galle & en guér-citron, quantité de nos pièces teintes en jaune, capacines; morde-d'oie, carmeline, &c. furent tachées pendant qu'elles étoient imprégnées d'eau par l'atouchement du fer, ce dont je m'assurai par la liqueur du prussien de potasse, &c. qui, jusqu'alors ne m'étoit arrivé avec aucune autre couleur; depuis lors cet accident n'arrive plus que très-rarement, parce que j'ai recommandé très-fort à tous les ouvriers d'éviter aux étendages & par-tout ailleurs, l'approche du fer que j'ai banni de toutes les brouettes, brancards, &c. J'ai observé que le fer oxidé à la surface filsoit plus promptement ces sortes de couleurs que le fer non oxidé. Dans le premier cas, on peut croire que les couleurs & l'oxide de fer exercent une action réciproque, & dans le second cas je croirois facilement que l'oxigène faisant partie constituant des molécules colorantes de la galle & du guér-citron, agit d'abord au moyen de l'eau sur le fer en l'oxidant, & que les parties colorantes réticent avec force cette nouvelle combinaison pour former par ce moyen des nuances fixes. Peut-être aussi pourroit-on expliquer ce phénomène par la décomposition de l'eau. Je me propose pour éclaircir ce fait, de mettre en contact des chiffons de toiles teintes en jaune avec des copeaux de fer non rouillé dans un flacon rempli d'eau, pour voir s'il ne se fait pas un dégagement de gaz hydrogène pendant que le jaune se charge.

Réponse de M. Berthollet aux deux lettres précédentes.

Je me suis occupé moi-même de l'usage de l'acide muriatique oxigéné pour les toiles imprimées, parce que j'ai prévu qu'il falloit combiner ses effets avec un grand nombre de circonstances qui ne pouvoient être observées autre part, que dans un atelier où l'on pût assavoir toutes les tentatives aux combinaisons très-variées des couleurs. Personne n'étoit plus propre à ce genre d'épreuves que vous, Monsieur, qui réunissez aux lumières de la physique les connaissances de l'art. M. Widmer a mis également beaucoup de soin & de sagacité dans les opérations qu'il a dirigées dans la

célèbre manufacture de M. Oberkamp. Je vais donner un précis de son procédé & de ses observations qui ont dû se rencontrer avec les vôtres sur plusieurs objets.

L'appareil dont se sert M. Widmer est semblable à celui que j'ai décrit, & il s'en fait indifféremment pour la préparation de l'acide muriatique oxigéné & pour la liqueur mêlée de potasse, mais son récipient est formé d'une grande fontaine de grès, dans laquelle il a placé trois couvercles de terre cuite, & sous celui qui est inférieure vient s'ouvrir un tube de verre qui apporte le gaz. Ce récipient contient trois-cens-six livres d'eau, dans laquelle il fait dissoudre trente-six livres de potasse ordinaire. Pour s'assurer cette quantité d'eau alcalisée, il met en distillation vingt livres de sel marin; sèche & réduit en poudre, sept livres & demie de manganèse, également réduites en poudre, vingt livres d'acide sulfurique concentré (1) qu'il étend de poids égal d'eau. Il fait sécher le sel & il le réduit en poudre, parce qu'il a remarqué que par ce moyen la décomposition se faisoit mieux & plus promptement.

La liqueur qu'on obtient par cette opération doit être étendue de vingt à vingt-quatre parties d'eau lorsqu'on veut en faire usage, & on la modifie selon les circonstances, ainsi qu'on le verra. Vous nous apprenez qu'on peut se servir d'une cuvette d'étain, mais elle doit se détruire peu à peu par l'action du gaz; car si l'on met une lame d'étain dans l'acide muriatique oxigéné, l'on voit bientôt une gelée se former à sa surface. Il me paroit donc plus avantageux d'employer des cuvettes de terre cuite ou de pierre, comme le gaz se combine facilement avec la liqueur alcaline, on pourroit peut-être se contenter de deux cuvettes ou même d'une seule; cependant M. Widmer prétend qu'il est mieux d'en employer trois.

La proportion d'acide sulfurique que vous employez est beaucoup trop petite pour retirer toute la quantité de gaz qu'on peut obtenir des quantités de sel & d'oxide de manganèse, dont vous faites usage. Vous avez, sans doute, observé que cette proportion étoit plus convenable pour faire l'opération à la chaleur de l'eau, & je présume que vous aurez été déterminé à ne pas employer le bain de sable, par la difficulté de vous procurer des vaisseaux distillatoires plus convenables que les grands bacons qui servent à contenir l'acide sulfurique; car ces bacons sont très-sujets à se casser à la chaleur que prend le bain de sable.

La liqueur préparée, comme je l'ai dit ci-devant, est soustraite du récipient du grès, & transportée dans une grande cuve de pierre qui est surmontée d'un moulinet, par lequel on fait

(1) L'on a observé qu'il convenoit d'augmenter un peu la proportion d'acide sulfurique que j'ai indiqué pour la préparation de l'acide muriatique oxigéné. (*Ann. de chimie, tom. 35.*)

tourner les pièces de toiles jaunies, après y avoir ajouté la quantité convenable d'eau.

Le procédé s'exécute sur des toiles qui ne doivent point être exposées sur le pré, ou qui, après avoir été traitées à la manière ordinaire, doivent seulement être achevés par l'action de la liqueur.

Dans le premier cas, on passe les toiles au fond deux fois après le garantage; mais la seconde fois, on ajoute au bain de son une certaine quantité de savon, ensuite on leur fait subir une immersion dans la liqueur; après cela, on les laisse encore au son & au savon; & on achève par une dernière immersion; mais l'on ne parvient pas par ce moyen à donner à leur fond un blanc aussi beau que par l'exposition sur le pré, de sorte que l'on ne fait usage de ce procédé que pendant l'hiver, ou lorsqu'il faut satisfaire à des demandes pressées.

Lorsque les toiles imprimées ont été traitées par le procédé ordinaire, on les finit très-bien avec la liqueur, & l'on se sert à présent de cette méthode mixte, soit en été, soit en hiver, pour la plus grande partie des toiles qui n'ont pas des couleurs qui puissent être altérées facilement par la liqueur. Écartons d'abord M. Widmer sur les attentions qu'exige le procédé.

Lorsque les toiles qui n'ont point subi l'action de la liqueur sont fortes & denses, l'augmentation d'énergie de la liqueur y est d'autant de l'acide muriatique oxygéné si au contraire les couleurs sont faibles, & si elles n'ont rien à perdre, quoique leur fond ne soit pas blanc, j'affaiblis l'action de la liqueur, ou pour mieux dire, je l'alcalinise en l'alcalinisant avec du carbonate. Ainsi les couleurs ne sont point du tout ou du moins ne sont que très-peu altérées, & cependant le fond blanchit, très-toufflement. J'ai toujours remarqué que, lorsqu'on veut porter la liqueur à une force telle, que son action soit très-prompte, on étoit sujet à se tromper & à trop altérer les couleurs, sans rendre le fond de la toile blanche, en proportion de ce qu'on fait perdre aux couleurs. Aussi je modifie la liqueur, de manière que je puisse y laisser les toiles au moins une heure à une heure & demie, & si j'avois suffisamment de cuves, je la modifierois au point que je puisse laisser les toiles environ douze heures, ce qui me paraitroit préférable. Je ne fais pas mouliner les toiles continuellement, parce que cela occasionne une évaporation qui affaiblit trop promptement la liqueur. J'ai soin de ne pas mettre trop de toiles à la fois dans la cuve, afin qu'elles soient bien à l'aise. Le noir & les couleurs qui en dérivent, quand elles sont bien imprimées & bien garannées, ne sont pas plus attaquables par la liqueur à blanchir que les rouges;

mais leur solidité dépend de plusieurs circonstances. J'ai toujours observé que le mordant du noir ne se combinait pas si facilement avec les toiles, que le mordant du rouge, ce qui paroit prouver que son affinité avec la toile est moindre que celle de l'alumine; mais lorsque le noir s'altère facilement, cet accident provient presque toujours de ce que l'imprimeur a employé la couleur un peu trop sèche, ou qu'il a laissé sécher son chafis ou même la couleur après la planche; de sorte que lorsqu'il l'applique sur la toile, elle se trouve collée & non combinée avec elle, ou seulement en petite quantité. Il arrive alors que dans les bains de bouze de vache & dans les lavages qu'on fait subir aux toiles avant le garantage, & dans celui-ci même, les parties du mordant qui n'étoient pas bien imprégnées dans la toile, mais seulement collées dessus, se détachent, & ne laissent que peu de mordant, qui par conséquent ne donne qu'une nuance faible, & qui peut être altérée facilement. Cet inconvénient a-t-il lieu, quand il fait de grandes sécheresses accompagnées de hâles ou l'obfcurcissement quelquefois avec le mordant rouge, mais bien rarement.

J'ai éprouvé différentes fois que dans les couleurs qui avoient été altérées, &c. même en parties détachées par l'action de la liqueur, les mordants n'étoient point du tout attaqués; j'ai pu en garancer les toiles quand les couleurs avoient en partie disparu, la matière colorante de la garance se fixoit comme auparavant, & que les secondes couleurs étoient aussi belles & avoient autant de solidité que les premières.

Ce que je desirerois sur-tout pour la perfection de ce procédé, seroit un agent qui indiquât en même-temps la force acide & la force alcaline de la liqueur; je pourrois alors facilement confier à un ouvrier le blanchiment des toiles peintes, au lieu qu'actuellement je suis obligé de surveiller continuellement moi-même ces opérations.

Il m'est arrivé de me servir pour préparer la liqueur, de potasse qui étoit tombée en deliquescence à l'air, & j'ai éprouvé qu'alors la liqueur jaunissoit beaucoup plus les rouges, mais que le noir y résistoit plus long-temps.

L'on a observé comme vous, Monsieur, que les couleurs qui sont dues à la gaudé, ne pouvoient pas soutenir l'action de la liqueur; mais M. Widmer imagina qu'en affaiblissant l'énergie du gaz acide muriatique oxygéné par sa combinaison avec l'urine, il pourroit en conserver encore assez pour détruire la couleur du fond, sans attaquer celle qui est fixée par les mordants. L'épreuve parut réussir; mais le fond qui au sortir de cette liqueur étoit d'un blanc de 10 à 12 parties d'eau, sembloit blanc, & reprenait une teinte jaune par la dessiccation. Nous exa-

(1) Lorsque l'alcali se trouve en excès trop considérable dans la liqueur dont on fait usage pour la rétablir par l'insufflation de l'acide muriatique oxygéné, on renverse le résidu dans le récipient, & on l'imprime de nouveau par, de sorte qu'on lui fait servir la liqueur, jusqu'à ce qu'elle soit chargée de parties colorantes dont la liqueur a été débarrassée, & qui se sont combinées avec l'alcali.

minimes ensemble ce phénomène, & nous apperçûmes que l'on pouvoit détruire parfaitement le fond jaune sans nuire aux couleurs fixées, si l'on se servoit, soit pour mêler à la liqueur, soit pour laver la toile d'eau, qui ne contient pas de sels à base terreuse, mais que ces sels étant décomposés par les parties colorantes de la gaude, celles-ci se fixoient par le moyen de la terre, & ne pouvoient être détruites par la liqueur. Nous n'avons pu vaincre cet obstacle, mais je présume que cette liqueur pourroit être utile pour quelques teintures, & d'autres épreuves donnent à M. Widmer l'espérance de pouvoir employer l'acide muriatique oxygéné pour les toiles qui ont subi le gaudage.

Vous refusez votre assentiment à l'observation de M. Decroizille, dont j'ai parlé relativement à l'effet sur l'acide muriatique oxygéné. Lorsque le coran a déjà subi un autre blanchiment, il ne doit plus être traité qu'avec beaucoup de circonspection par cette liqueur, qui alors peut l'altérer & même le détruire.

Les toiles de coton blanchies par l'acide muriatique oxygéné, présentent avec celles qui ont subi le blanchiment ordinaire, une différence qui les fait distinguer sûrement par le seul contact, même après qu'elles sont imprimées, & M. Oberkampf y trouve un tel avantage, soit par la perfection du blanc qui insinue sur les couleurs qu'on leur donne ensuite, ainsi que vous l'observez, soit pour la qualité de la toile, qu'il préfère celles qui ont été blanchies de cette manière, quoique jusqu'à présent le prix de ce blanchiment ait été pour lui supérieur à celui du blanc ordinaire. L'on va voir quelques observations de M. Widmer sur cet objet.

J'ai blanchi l'été dernier par l'acide muriatique oxygéné environ 200 pièces de toile mixte de lin & de coton écru. Je les ai fait imprimer avec une pareille quantité de même toile, mais qui avoit été blanchie par le procédé ordinaire. J'ai chaque fois fait garancer nombre égal des deux espèces de toiles, & leur ai toujours fait subir ensemble les différentes opérations. J'ai constamment éprouvé que les pièces qui avoient été blanchies avant l'impression par le nouveau procédé, étoient après avoir été garancées, beaucoup plus blanches que les autres & les couleurs toujours plus vives & beaucoup plus fortes. Nous fûmes même toujours obligés d'assoir les couleurs par la liqueur soiblement alcalisée. Cette méthode présente donc un grand avantage sur l'autre, puisque les toiles blanchissent plus facilement au sortir de la garance, qu'on peut donner un blanc beaucoup plus beau aux fonds, & que les couleurs fixées par les mordans, y sont retenues avec plus de force que sur celles qui sont blanchies par l'ancien procédé. Je crois tenir de croire que par l'ancienne manière de blanchir les toiles écruës, les parties colorantes ne sont pas parfaitement détruites, ou que les parties oxygénées ne sont pas entièrement enlevées de

dedans les toiles où elles forment une espèce d'enduit autour de leurs fibres, lequel se combine lui-même avec les parties colorantes en leur donnant un fond fauve, & les empêche de se fixer aussi fortement que sur les toiles qui ont été préalablement bien blanchies. J'ai observé un phénomène qui a beaucoup fixé mon attention, & qui me semble être bien d'accord avec cette théorie. On le remarque sur-tout après que les toiles ont passé deux fois au son; les couleurs de celles qui ont été blanchies avant l'impression par l'ancienne méthode, sont sensiblement plus terreuses, plus ternes & plus sales que celles des autres.

Vos expériences, Monsieur, & celles de M. Vidmer, ont déjà porté bien loin le procédé dont vous vous êtes occupé. Puissent rous ceux qui exercent une industrie éclairée, considérer leurs découvertes & leurs observations, comme un tribut qu'il est glorieux de payer aux sciences & aux arts.

Addition aux lettres de M. Hauffmann à M. Berthollet. Ann. de chim. T. 12, p. 141.

Pour ne pas nuire à l'attraction des parties colorantes de la garance ou autre substance employée à la teinture, il faut absolument, avant de teindre les toiles de coton ou de lin imprimées avec des mordans, les débarrasser de toutes les parties salines. On parvient à ce but, en tenant long-temps dans de l'eau corante les pièces qui sortent de l'impression, ou en les faisant passer l'une après l'autre dans une chaudière d'eau bouillante. L'exposition dans une eau courante n'emporte pas toujours, sur-tout en hiver, & lorsque les toiles sont fines & serrées, toutes les parties salines qui sont opiniâtrement retenues par la gomme & par l'amidon dont on se sert pour épaissir les mordans, & la simple ébullition dans l'eau fait que les parties salines, qui consistent principalement en acétate de fer & en acétate d'alumine, laissent évaporer une partie de leur acide, & déposent sur la surface des toiles une portion d'alumine & d'oxide de fer, par le moyen desquels les objets blancs se salissent dans la teinture, & se reblanchissent plus ou moins difficilement. On remédie à cet inconvénient, en ajoutant à l'eau bouillante de la bouse de vache.

Après avoir tenté plusieurs autres ingrédients, pour les substituer à la bouse de vache, j'ai essayé le carbonate de chaux ou la craie pilée, & quoique j'aie laissé à l'acide acideux tout le temps de s'évaporer par une distillation complète, & par un repos de plusieurs jours, il restoit néanmoins encore assez de cet acide, pour former dans les mordans avec la craie de l'acétate de chaux, qui, au moyen de la chaleur de l'eau bouillante, s'est insinuée entre la surface de la toile & l'alumine, & assoupli l'adhérence de l'alumine & l'a enlevée. Les premières pièces que l'on y a passées, n'ont pas perdu beaucoup de l'intensité de la couleur que

l'on ne parviendroit par l'action de la garance ou d'autres substances colorantes ; mais en continuant d'y passer un grand nombre d'autres pièces imprimées en mordans, on obtient successivement des nuances de plus en plus pâles. Le muriate de soude, ainsi que tous les sels neutres, alcalins & terreux, qui sont dissolubles dans l'eau, produisent le même effet que l'acétate de chaux. L'oxide de fer jouissant d'une force d'adhésion plus considérable que l'alumine, ne se laisse pas enlever sensiblement, & procure toujours des couleurs & des nuances passables.

Si au lieu de passer en bouze de vache bouillante les toiles de coton ou de lin imprimées en mordans d'alun coucouque, on les fait bouillir quelque temps dans l'eau de savon ; elles n'attirent nullement les parties colorantes de la garance ou d'une autre espèce. L'on pourroit croire que la potasse caustique ayant la propriété de dissoudre l'alumine par la voie humide, c'est effectivement par la base alcaline du savon que les toiles imprimées perdent la faculté d'attirer les parties colorantes ; mais je me suis assuré que la dissolution de potasse saturée d'acide carbonique, laquelle n'a pas la propriété de dissoudre l'alumine, produit un effet pareil, lorsqu'on y fait bouillir les toiles imprimées. Le fil de coton ou de lin préparé pour recevoir le rouge de Turquie étant soumis à l'ébullition dans l'eau de savon, perd pareillement la propriété de se teindre. Ces effets me semblent donc analogues à ceux de l'acétate de chaux, du muriate de potasse & autres sels neutres dissolubles, dont l'action est aidée de la chaleur.

Si, après avoir passé les toiles imprimées en bouzues de vache bouillante, on les soumet même pendant quelques heures à l'action de la dissolution de potasse combinée avec de l'acide muriatique oxigéné, les bases que les mordans auront déposées, ne souffriront absolument rien de la part de cette liqueur, & elles attireront les parties colorantes, comme si on ne les avoit pas exposées à l'action de la liqueur oxigénée. Le fil de coton ou de lin préparé pour recevoir le rouge de Turquie, se comporte à cet égard absolument de la même manière que les toiles de coton ou de lin imprimées. Il résulte de-là, que si les toiles n'avoient pas reçu un beau blanc avant de les avoir données à l'impression, on pourroit achever de les blanchir avant de les teindre. Il faudroit cependant prendre les précautions nécessaires pour produire un beau blanc sans affaiblir les toiles.

L'on peut entièrement décolorer les toiles imprimées & saturées de parties colorantes de la garance ou autres substances, dans une dissolution de potasse combinée avec une quantité d'acide muriatique oxigéné, double de celle qui entre dans la liqueur ordinaire, dont je me sers pour blanchir ; le départ des couleurs se fait dans

moins d'un quart-d'heure. Si l'on n'étend pas cette dissolution avec des toiles décolorées de cette manière à l'action de la garance ou d'autres substances colorantes, les couleurs reparoîtront telles qu'elles étoient auparavant, de sorte que si l'on avoit, par accident, trop fatigué les couleurs des toiles imprimées, & que garances dans une liqueur oxigénée ordinaire, l'on n'auroit qu'à les teindre une seconde fois, & les couleurs reparoîtroient de nouveau, il n'y auroit alors de perdu que les frais de la première teinture & du blanchiment ; ceci me paroît mériter l'attention des fabricans d'indiennes.

Un écheveau de coton rouge d'une manufacture de France, plus beau & plus solide que les meilleurs rouges de Turquie, que j'avois décoloré parfaitement avec la liqueur fortement oxigénée, reprit de nouveau les parties colorantes de la garance, & devint plus foncé. Je lui fis perdre cet excès de couleur par l'avgivage.

Quand l'alumine des toiles imprimées & du fil de coton préparé pour le rouge de Turquie est bien saturée de garance, elle ne peut être entièrement emportée par l'eau de savon bouillante ; malgré la quantité de savon & la durée de l'ébullition, il reste une très-forte nuance rouge, ce qui prouve que les parties colorantes de la garance garantissent l'alumine de l'action du savon.

La dissolution de potasse combinée avec une quantité double d'acide muriatique oxigéné, étant exposée dans des vases ouverts en plein jour, perd de son oxigène, ce qui n'arrive pas avec une liqueur oxigénée ordinaire. Les rayons du soleil produisent probablement cet effet.

Observations sur l'acide muriatique oxigéné, par M. Chaptal ; acad. des sciences, ann. 1788.

Nous devons au célèbre Schéele la découverte de l'acide muriatique oxigéné ; mais c'est M. Berthollet qui nous a fait connoître sa nature, ses usages & ses principales propriétés, en répétant les belles & nombreuses expériences qu'on a faites de nos jours sur cette substance. J'ai observé quelques faits nouveaux, je crois en avoir éclairci d'autres qui n'avoient été qu'entrevis, & je vais présenter en peu de mots tout ce qui m'a paru mériter d'être connu.

La propriété qu'a l'acide muriatique oxigéné de blanchir la toile, le coton & la cire jaune coupés en tranches, est un fait dont M. Berthollet a déjà enrichi les arts ; mais j'ai cru qu'on pouvoit étendre ses applications ; & en conséquence, j'ai fait quelques expériences sur le moyen de blanchir le papier, dont voici les résultats.

1°. Le papier brouillard mis dans cet acide oxigéné y blanchit sans s'altérer ; les chiffons de grosse & mauvaise toile dont on se sert dans les papeteries pour faire ce papier, blanchissent dans cet acide, & fournissent ensuite un papier de qua-

lité supérieure. J'ai blanchi par ce procédé un quintal de pite destinée à fournir du papier brouillard, & on a évalué à vingt-cinq pour cent l'augmentation de valeur dans le produit, tandis que les frais de l'opération rigoureusement calculés, ne le renchérissoient que de sept pour cent.

La propriété qu'a cet acide de blanchir le papier sans en altérer le tissu, le rend précieux pour réparer les livres vieux & les estampes fumées; des estampes dégradées à tel point qu'on avoit de la peine à distinguer le dessin, ont été réparées & rafraîchies d'une manière si étonnante, qu'elles paroissent neuves; de vieux livres salis par cette teinte jaune qu'y dépose le tems, peuvent être si bien rétablis, qu'on les croiroit sortir de la presse.

La simple immersion dans l'acide muriatique oxigéné, & un séjour plus ou moins long, suivant la force de la liqueur, suffisent pour blanchir une estampe; mais lorsqu'il est question d'un livre, il faut d'autres précautions. Comme il est nécessaire que l'acide mouille tous les feuillets, on a l'attention de bien ouvrir le livre, & de faire reposer la couverture sur les bords du vase, de façon que le papier seul trempe dans la liqueur, on sépare adroitement les feuillets qui peuvent être collés ou réunis pour que tous s'imprègnent également; la liqueur prend une teinte jaune, le papier blanchit, & deux ou trois heures après on retire le livre pour le plonger dans l'eau pure, qu'on renouvelle de tems-en-tems pour enlever l'acide oxigéné qui peut rester, & faire disparaître l'odeur désagréable dont il est imprégné.

Ce procédé m'a assez bien réussi, c'est même le premier que j'ai mis en usage; mais trop souvent la couleur de mes livres a été bigarrée, quelquefois plusieurs pages n'ont pas été du tout blanchies, & j'ai été forcé d'en venir à un procédé plus sûr. On commence par découper les livres & les mettre en feuillets; on place ces feuillets dans des cases qu'on a pratiquées dans un baquet de plomb avec des liteaux très-minces, à tel point que les feuillets posés à plat, ne font séparés l'un de l'autre que par des intervalles à peine sensibles; on verse ensuite l'acide en le faisant tomber sur les parois du baquet, pour que les feuillets ne soient point dérangés, & lorsque l'opération est faite, on soutire l'acide par un robinet placé dans le fond du baquet, l'on remplace cette liqueur par de l'eau fraîche, qui lave le papier, & le prive de l'odeur de l'acide oxigéné; on le met ensuite sécher, on le lisse & on le relie. J'ai rétabli par ce moyen plusieurs ouvrages précieux qui n'avoient plus de valeur par le mauvais état où ils se trouvoient. On peut encore poser les feuillets verticalement dans le baquet, & cette position présente quelques avantages, en ce qu'elles se déchirent moins facilement, & à cet effet, j'ai fait construire un cadre

en bois que j'assujettis à la hauteur que je crois convenable d'après la hauteur même des feuillets que je veux blanchir; ce cadre soutient des liteaux de bois très-minces qui ne laissent entr'eux qu'un intervalle de demi ligne; je place deux feuillets dans chacun de ces intervalles, & les assujettis avec deux petits coins de bois que j'enfonce entre les liteaux & qui pressent les feuillets contre ces mêmes liteaux; je donne la préférence à ce procédé avec d'autant plus de raison, que lorsque l'opération est faite, j'enlève le cadre avec les feuillets & les plonge dans l'eau fraîche.

Par cette opération, non-seulement les livres sont rétablis, mais le papier en reçoit un degré de blanc qu'il n'a jamais eu; cet acide a encore le précieux avantage de faire disparaître les taches d'encre qui trop souvent déprécient les livres ou les estampes. Cette liqueur n'ôte point les taches d'huile ou de graisse; mais on fait depuis longtemps qu'une soible dissolution de potasse (alkali caustique) est un sûr moyen d'enlever ces marques.

Lorsque j'ai eu à réparer des estampes si délabrées, qu'elles ne présentent que des lambeaux collés & rapportés sur un papier, j'ai craint de perdre ces fragmens dans la liqueur, parce que le papier se décolle, & dans ce cas j'ai la précaution d'enfermer l'estampe dans un grand bocal cylindrique, que je renverse sur un verre dans lequel j'ai mis le mélange convenable pour développer le gaz acide muriatique oxigéné. Cette vapeur remplit l'intérieur du bocal & réagit sur l'estampe, en dévore la crasse, détruit les taches d'encre, & les fragmens restent collés & conservent leur position respective.

Le procédé qui consiste à blanchir le papier & les estampes par le moyen de la vapeur de l'acide muriatique oxigéné, peut être aussi employé pour blanchir la toile & le coton. Après plusieurs essais faits dans mon laboratoire, je me suis décidé à faire une expérience en grand sur plusieurs pièces de bûlin en écu: dans une des chambres de plomb de ma fabrique ayant 20 pieds en carré, j'ai placé une grande terrine dans laquelle j'ai mis 6 livres de manganèse & 12 d'acide muriatique fumant; j'avois disposé dans cette chambre 10 aunes de bûlin soutenu & suspendu à des morceaux de bois minces & cylindriques, fixés à des pieds droits assujettis contre les parois; les portes ont été exactement fermées & malfriquées; 24 heures après, j'ai pratiqué des ouvertures & donné peu-à-peu des issues à la vapeur suffoquante de cet acide oxigéné; trois jours après, il m'a été possible de pénétrer dans la chambre, & d'examiner mon étoffe; je l'ai trouvée très-souple & douce au toucher, légèrement humectée, à-peu-près comme sont les habits, lorsque l'air est humide. L'étoffe m'a paru d'abord parfaitement blanchie, mais un examen plus exact m'a convaincu que les parties qui étoient sur le bois, n'étoient pas entièrement dé-

colorées ; en outre j'ai observé que les portions d'étoffe les plus éloignées du foyer des vapeurs , avoient une nuance plus sombre ; mais il est facile de remédier à ces divers inconvéniens , 1°. en multipliant les foyers dans l'intérieur de la chambre ; 2°. en communiquant un mouvement à l'étoffe, pour que toutes les parties se présentent successivement , & que l'action de la vapeur sur chacune d'elles soit égale.

Le fil & le coton en écheveaux suspendus dans cette atmosphère de vapeur, n'ont été blanchis qu'à la surface , & je me suis convaincu que ce procédé n'est applicable qu'aux étoffes ; & comme il est très-économique, je ne doute pas qu'on ne l'adopte pour blanchir les toiles & les étoffes de coton ; il ne seroit même pas nécessaire d'employer une chambre de plomb, un espace quelconque dont on peut garnir les parois en bois, en plâtre ou avec des mastics, peut suffire pour cette opération.

Comme les arts commencent à s'emparer de cette substance , & à en tirer le plus grand avantage , j'indiquerai un procédé simple & économique dont on peut se servir dans quelques circonstances.

Pour oxigener l'acide muriatique, il n'y a qu'à l'affoiblir & le mêler dans un flacon très-fort avec l'oxide de manganèse, de façon que le mélange n'occupe pas toute la capacité du vase ; il se forme des bulles à la surface de ce liquide, l'espace vide se remplit d'une vapeur verdâtre, & au bout de quelques heures, on peut affoiblir l'acide avec l'eau & l'employer ; il a une saveur acide, parce qu'il n'est pas saturé d'oxigène ; mais il possède toutes les vertus de l'acide muriatique oxigéné. On peut employer ce procédé, lorsque le temps ne permet pas de monter un appareil distillatoire, pour se procurer de l'acide muriatique oxigéné par les procédés ci-dessus.

Je joindrai à ce mémoire quelques observations que j'ai été dans le cas de faire sur l'action du gaz muriatique oxigéné. Le procédé que j'ai mis en usage, consiste à mettre le corps qu'on veut exposer à l'action de ce gaz, dans un récipient qu'on lute à une corne tubulée, placée sur un bain de sable : on introduit l'oxide de manganèse & l'acide muriatique par la tubulure & les vapeurs qui se dégagent, remplissent le récipient, & exercent leur action sur les corps qui y sont contenus de cette manière.

1°. Les huiles pesantes s'y épaississent ; celle d'olive y blanchit & prend la consistance d'un onguent ; elle y acquiert de la pesanteur & ne surnage point l'eau ; elle se combine difficilement avec la potasse fondue & avec l'ammoniaque ; elle

n'est soluble ni dans l'eau ni dans l'alcool, se boursouffle sur le charbon, s'enflamme & donne beaucoup de fumée ; si on la laisse long-temps exposée à l'air, elle y prend insensiblement la blancheur & la consistance ; l'action d'une forte lumière hâte le passage.

Les huiles volatiles s'y colorent en général , & s'y épaississent sensiblement ; mais l'effet est moins prompt & moins marqué que sur les huiles pesantes. (1)

2°. Si dans l'atmosphère de gaz muriatique oxigéné on expose de l'acide acétique, il prend en peu de temps une odeur analogue à celle de l'acide acétique, & il y acquiert la propriété de dissoudre le cuivre, & de former des cristaux de Vénus.

J'ai observé que le même acide acétique, distillé sur l'oxide de manganèse, s'oxigenoit à tel point qu'il dissolvait le cuivre, tandis que cet acide n'a point cette propriété, quand il n'est point surchargé d'oxigène.

3°. Le cuivre exposé à la vapeur de l'acide muriatique oxigéné, s'y calcine & se recouvre d'une couche d'oxide qu'on peut en détacher aisément par la plus légère secousse. Cet oxide de cuivre peut se dissoudre dans l'acide acétique, & former des cristaux de Vénus ; on peut l'employer dans tous les cas où le verdet est d'usage ; la couleur en est un peu plus verte que celle du verdet gris du commerce ; mais lorsque ce dernier a été complètement desséché, ces couleurs se rapprochent & diffèrent peu.

Mémoire sur l'action que l'acide muriatique oxigéné exerce sur les parties colorantes, par M. Berthollet, lu à l'académie royale des sciences, le 5 mai 1790, & inséré dans les annales de chimie, tome 6, page 210.

Lorsque je me suis occupé des propriétés de l'acide muriatique oxigéné, j'ai cherché à déterminer d'une manière générale en quoi consistoit l'action qu'il exerce sur différentes substances ; j'ai indiqué particulièrement quels étoient les changements de couleurs qui sont produits dans les oxides métalliques par l'accession de l'oxigène ; mais ces effets étoient d'une application facile. Il n'en est pas de même des changements qu'éprouvent les parties colorantes qui sont disséminées dans les substances végétales ou animales, & dont la nature est encore peu connue, je me suis empressé plutôt à faire quelques faits dont l'application pouvoit être utile aux arts, qu'à analyser les modifications de ces substances. Je me proposois de revenir sur ces phénomènes, ou j'espérois que d'autres chimistes s'en occuperoient. « Les rapports des parties colorantes si variées dans la nature, (disois-je dans ma

(1) Scheele a fait à peu-près les mêmes observations, & M. Berthollet les a confirmées, & en a présenté les divers phénomènes.

description du blanchiment, &c., (ann. de chim., tom. II,) avec l'oxigène, avec la lumière, avec les alcalis & les autres agens chimiques, doivent former une partie de la physique bien intéressante & presque entièrement nouvelle. »

Depuis lors, M. Fourcroy a lu à l'académie un excellent mémoire dans lequel il prouve que l'oxigène doit entrer dans la composition de plusieurs parties colorantes; qu'en se combinant avec elles, il modifie leurs couleurs dans une gradation qu'il a suivie, & que plus elles en sont saturées, plus les couleurs deviennent fixes & immuables.

Les opinions auxquelles je suis conduit par les faits que je vais présenter, ne s'accordent pas entièrement avec celles de M. Fourcroy; mais je dois prévenir que je ne regarde moi-même une partie des idées que j'exposerais, que comme de simples conjectures que je me suis permises, parce qu'elles peuvent conduire à de nouvelles observations.

Lorsqu'on blanchit du lin sous la forme de fil ou de toile par le moyen de l'acide muriatique oxigéné, cet acide perd l'oxigène, & les parties qui lui ont enlevé ce principe, deviennent propres à se combiner avec les alcalis. En répétant l'action de l'acide muriatique oxigéné & celle des alcalis, toutes les parties colorantes sont enlevées successivement, & le lin devient blanc.

Le blanchiment consiste donc à rendre par le moyen de l'oxigène les parties colorantes qui sont fixées dans les filaments du lin solubles par les alcalis des lessives, & l'acide muriatique oxigéné fait avec plus de promptitude & d'énergie ce qu'opère l'exposition sur les prés dans le blanchiment ordinaire. Telle est la théorie du blanchiment, que j'ai exposée dans mon mémoire; mais je vais la suivre d'une manière plus détaillée, examiner la combinaison des parties colorantes du lin avec les alcalis, & déterminer les changemens qu'elles éprouvent par l'action de l'oxigène.

Le fil écu étant traité avec une dissolution de potasse pure ou caustique à une chaleur qui approche de l'ébullition, lui donne une couleur fauve foncée, & en détruit la saveur caustique. Si l'on fait une seconde lessive, les mêmes phénomènes se présentent à un moindre degré; mais si l'on n'a pas encore épuisé le fil, on y parvient par une troisième lessive, ce qui dépend, comme il est facile de l'appréhender, de la force & de la quantité de la liqueur alcaline. Dès que le fil est épuisé, l'alcali suffisamment étendu d'eau n'en éprouve plus aucune altération, & ne produit aucun changement dans sa couleur.

Qu'on passe alors ce fil dans l'acide muriatique oxigéné, dans lequel il commence à acquérir de la blancheur, & qu'ensuite on le lessive, l'alcali perd

de nouveau sa causticité, & prend une couleur foncée, comme dans les premières lessives.

Nous avons deux dissolutions alcalines, l'une qui a été saturée des parties colorantes du fil avant l'action de l'acide muriatique oxigéné, & l'autre qui l'a été après cette action.

Qu'on sature d'un acide ces dissolutions alcalines, elles se rouillent & forment un dépôt abondant d'un jaune fauve. Qu'on filtre & qu'on fasse sécher le dépôt, il devient noir & pulvérulent; celui qui provient du fil avant l'action de l'acide muriatique oxigéné, est un peu moins noir; mais cette différence de couleur paroît dépendre d'un peu de matières étrangères qui doivent se rencontrer dans le fil écu, puisque dans les autres expériences, ces deux substances montrent absolument les mêmes propriétés.

De cette première observation on doit conclure que le fil de lin contient des parties colorantes qui peuvent lui être enlevées immédiatement par les lessives, mais qu'il en contient d'autres qui doivent éprouver l'action de l'oxigène, pour être rendues solubles, & que par cette action, ces dernières acquièrent précisément la nature de celles qui étoient solubles d'elles-mêmes par les alcalis; de sorte que l'acide muriatique oxigéné ne produit pas dans ces parties colorantes un autre changement que celui par lequel elles sont disposées naturellement à se dissoudre dans les alcalis. Je mets sous les yeux de l'académie de ces deux espèces de parties colorantes; & comme dans les expériences elles ont présenté les mêmes propriétés, je les confondrai dans la suite de ce mémoire.

Cette partie colorante se dissout très-peu dans l'eau pure, & quand elle a été lavée, elle n'altère point la teinture de tournesol. La potasse la dissout facilement & abondamment. 50 grains de carbonate de potasse rendus caustiques par la chaux, en ont dissous près de 100 grains; mais 50 grains de carbonate de potasse en ont dissous avec la même quantité d'eau, à-peu-près un quart de moins, en formant une combinaison triple.

L'on voit par-là qu'il est avantageux d'employer l'alcali caustique dans les lessives dont on se sert pour le blanchiment, & comme cet alcali se combine promptement avec les parties colorantes, il n'y a aucun inconvénient à l'employer dans cet état, ainsi que je m'en suis convaincu par plusieurs expériences.

Home (1) prétend que l'eau de chaux affoiblit le lin; quoi qu'il en soit de cette observation, il ne reste pas d'eau de chaux avec l'alcali caustique quand l'on n'en met qu'une proportion convenable; par exemple, une partie de chaux contre deux de potasse ordinaire, ainsi que je l'ai prescrit, je dis potasse ordinaire, parce que si l'on fait usage de potasse qui ait été fortement calcinée

(1) Essai sur le blanchiment des toiles.
Chimie, Tome II.

selle que la *caffoude*, on peut se passer de chaux, ou du moins, il faut en diminuer la quantité, parce que l'alcali s'y trouve presque dans l'état caustique; mais il convient de ne pas avoir de la chaux surabondante par les raisons qu'on va voir.

L'eau de chaux produit dans la dissolution alcaline des parties colorantes un précipité abondant, dans lequel les parties colorantes se trouvent combinées avec la chaux ou avec le carbonate de chaux. La liqueur qui surnage retient très-peu de couleur; mais si l'on met un excès de dissolution, le précipité se forme difficilement & en petite quantité.

L'on voit, par-là; 1°. que la partie colorante du lin a plus d'affinité avec la chaux qu'avec les alcalis; 2°. que par le moyen de l'eau de chaux, on peut séparer en grande partie d'une dissolution alcaline, la substance colorante dont elle étoit saturée; mais s'il se trouvoit de l'eau de chaux dans la lessive dont on se sert, on s'exposeroit à précipiter sur le lin la partie colorante qui en feroit ensuite séparée difficilement.

Cette propriété qu'a l'eau de chaux de précipiter les parties colorantes des lessives, pourroit peut-être s'appliquer au blanchiment en grand. J'ai blanchi du fil en n'employant dans chaque lessive qu'une dissolution bien saturée de parties colorantes & ensuite précipitée par l'eau de chaux; mais comme cette dissolution étoit nécessairement fort étendue d'eau, il a fallu un plus grand nombre de lessives. On pourroit lui rendre une force suffisante par une addition convenable d'alcali. Je ne sais cependant si l'avantage seroit assez grand pour récompenser des embarras, des manipulations, peut-être vaudroit-il mieux faire évaporer les lessives, & calciner le résidu pour détruire les parties colorantes, & rétablir l'activité de l'alcali.

Si l'on mêle la dissolution d'alcali saturée de parties colorantes avec des dissolutions métalliques, l'on obtient des précipités de différentes couleurs, & qui sont dûs à une combinaison de l'oxide métallique avec les parties colorantes. Je ne m'arrêterai pas à la description de ces précipités qui ne m'ont rien offert d'assez intéressant.

Ce que j'ai dit du lin doit s'appliquer au chanvre, dont les parties colorantes sont de la même nature. Les fils de l'une & de l'autre substance perdent du quart jusqu'au tiers de leur poids par les opérations du blanchiment; mais le coton a des parties colorantes d'une nature différente, elles sont beaucoup plus solubles d'elles-mêmes par les alcalis, & d'un jaune pâle, ainsi qu'on peut le voir dans celles que je mets sous les yeux de l'académie. Peut-être ces parties colorantes sont-elles de nature différente dans les différentes espèces de coton; mais j'ai éprouvé que les cotons roux blanchissoient fort bien par l'action

successive des lessives & de l'acide muriatique oxigéné.

Il faut remarquer que lorsque le lin commence à être épuisé de parties colorantes, & qu'on le plonge dans l'acide muriatique oxigéné; il devient blanc, quoiqu'il puisse donner encore à l'alcali avec lequel on le fait bouillir, des parties colorantes qu'on peut précipiter par les acides, & qui sont alors semblables à celles dont j'ai parlé jusqu'à présent; & lorsqu'on ne s'est pas servi de lessives assez chaudes pour dépouiller le lin de ses parties colorantes, il reprend peu-à-peu de lui-même une couleur jaune, sur-tout si on lui fait éprouver une certaine chaleur.

Si l'on verse de l'acide muriatique oxigéné dans une dissolution alcaline saturée de parties colorantes, sa couleur foncée disparaît, & si on la fait évaporer jusqu'à siccité, le résidu est jaune.

Les parties colorantes vertes des végétaux deviennent blanches par l'acide muriatique oxigéné; mais par l'ébullition elles deviennent jaunes.

Si l'on mêle de l'acide muriatique oxigéné avec une dissolution d'indigo par l'acide sulfurique étendu d'eau, l'on fait passer la couleur à un fauve plus ou moins foncé, selon la quantité d'eau, & si après cela on fait évaporer, il reste une substance particulière d'un fauve brun; mais si l'on fait passer une grande quantité de gaz muriatique oxigéné dans une dissolution semblable, l'on finit par détruire toute la couleur, & il ne reste plus qu'une substance blanche par l'évaporation.

Lorsqu'on fait passer de même une grande quantité de gaz muriatique oxigéné dans une infusion de noix de galle, sa couleur se fonce, devient d'un fauve sombre, & il se forme un dépôt abondant qui est noirâtre. L'infusion de fumach fait un dépôt pareil mais moins abondant.

L'on voit donc que l'acide muriatique oxigéné agit de différentes manières sur les parties colorantes; que plusieurs espèces de parties colorantes peuvent blanchir & disparaître par la combinaison de l'oxigène, qu'alors quelques circonstances, telles principalement qu'un degré de température un peu relevé les ramène à un jaune qui est quelquefois si foncé qu'il paroît noir, comme on l'observe dans les parties colorantes du lin; mais le plus ordinairement, il les fait passer immédiatement à la couleur fauve.

Pour expliquer ces faits, je rappellerai quelques propriétés de l'acide muriatique oxigéné.

1°. Les couleurs des oxides métalliques sont changées selon la proportion d'oxigène qu'on leur donne, soit par le moyen de l'acide muriatique oxigéné, soit par toute autre oxidation.

2°. J'ai prouvé que l'acide muriatique oxigéné détruiroit l'ammoniaque, parce que son oxigène se combinant avec l'ammoniaque forme de l'eau, & nous devons à M. Fourcroy une belle observation sur cette nouvelle combinaison, par laquelle il a fait voir qu'il se dégageroit de la lumière comme

dans les autres combustions lorsqu'on faisoit l'expérience avec du gaz ammoniacal. J'ai prouvé aussi que l'hydrogène de l'alcool & de l'éther formoit de l'eau avec l'oxygène de l'acide muriatique oxygéné. (Mémoire sur la décomposition de l'esprit-de-vin & de l'éther, acad. 1785.)

3°. Ce n'est pas seulement sur les parties colorantes que l'acide muriatique oxygéné agit différemment selon les circonstances. Ainsi, si l'on met un peu de sucre dans cette liqueur, il est changé en acide citrique, observation nouvelle très-intéressante qui est due à M. Vauquelin ; mais si l'on fait passer beaucoup de gaz muriatique oxygéné dans une dissolution de sucre, & qu'ensuite, on fasse évaporer la liqueur, le résidu présente tous les caractères du caramel ou sucre brûlé.

Dans l'espèce de combustion que l'acide muriatique oxygéné fait éprouver au sucre & à plusieurs autres substances, l'oxygène se combine avec l'hydrogène qui entre dans sa composition ; car l'on vient de voir que cette combinaison se forme facilement ; & au contraire, le charbon n'est pas attaqué par cette liqueur, ou du moins, il l'est beaucoup plus difficilement.

C'est précisément ce qui arrive lorsqu'on soumet une substance combustible à un degré de chaleur élevé, ou qu'on lui fait subir une légère combustion, avec cette différence, que si la substance contient beaucoup d'hydrogène, si c'est, par exemple, une huile, un degré de chaleur élevé peut lui donner l'apparence d'un commencement de combustion en chassant sous la forme de gaz une partie de l'hydrogène qui entroit dans sa combinaison ; ainsi, lorsqu'on fait bouillir une huile, il s'en dégage du gaz hydrogène, & elle devient brune & même noire.

Lors donc qu'on fait éprouver à une substance organisée un degré de chaleur élevé, on lui donne l'apparence d'une substance qui a éprouvé une légère combustion, ou parce que l'on combine de l'oxygène avec une partie de l'hydrogène en formant de l'eau, soit que l'oxygène exsistât dans cette substance, soit qu'il vienne de l'atmosphère.

Par-là, cette substance devient, selon l'intensité du phénomène, jaune, fauve, brune, & dans le langage vulgaire, on dit qu'une substance a roussi lorsqu'elle a éprouvé cet effet.

D'où peut venir ce changement de couleur ? Il vient incontestablement de ce que le charbon devient prédominant, & cela est si vrai, que l'on n'a qu'à pousser l'opération jusqu'à son extrême, comme on le fait dans la distillation, la substance qui a commencé par un jaune faible, passe de-là jusqu'au noir, & enfin, il ne reste plus que le charbon. Ce qui se passe dans un vaisseau fermé a lieu également avec le contact de l'atmosphère, parce que la combustion de l'hydrogène, c'est-à-dire, sa combinaison avec l'oxygène, peut se faire à un degré de chaleur inférieur à celui qui

est nécessaire à la combinaison du charbon, de sorte que, si la combustion est très-lente, si la chaleur ne s'élève pas au degré nécessaire à la combustion du charbon, tout l'hydrogène se consume, & la substance reste noire, & dans l'état de charbon.

Il me paroît donc que lorsque l'acide muriatique oxygéné donne aux parties colorantes une couleur jaune fauve ou brune, cela dépend de ce que l'oxygène se combine avec l'hydrogène qui entroit dans leur composition, & que par-là le charbon est pour-ainsi-dire isolé, & donne la couleur qui lui est propre : l'analyse confirme cette explication.

J'ai distillé les parties colorantes du lin ; elles m'ont donné une huile fort épaisse, un peu d'ammoniaque, & elles m'ont laissé 24 parties de charbon sur 100 ; mais l'huile en contenoit : il s'est sans doute dégagé de l'acide carbonique & du gaz hydrogène carboné ; de sorte que le charbon forme au-delà du tiers de ces parties colorantes. J'ai dit que l'infusion de noix de galle & celle de sumac devenoient brunes par l'action du gaz acide muriatique oxygéné, & qu'il s'y formoit un précipité noir ; ce précipité est du charbon presque pur.

L'acide nitrique agit de la même manière que l'acide muriatique oxygéné, & il rend jaunes, fauves, brunes, les substances sur lesquelles se porte son action ; c'est ainsi qu'il réduit en charbon l'huile de gayac, & c'est ainsi qu'il a changé l'indigo en une substance brune qu'a décrite M. Hauffman dans un mémoire très-intéressant qui se trouve dans le journal de physique (mars 1788,) de même que l'acide muriatique oxygéné l'a fait dans l'expérience que j'ai décrite.

L'on a vu que les parties colorantes du lin, ainsi que la partie verte-des végétaux, pouvoient être blanchies par l'acide muriatique oxygéné, mais qu'elles devenoient jaunes, soit en leur faisant éprouver un certain degré de chaleur, soit par le laps de temps : il peut se faire qu'alors l'oxygène se combine avec les parties colorantes sans s'unir immédiatement avec l'hydrogène ; mais que peu-à-peu cette union se forme, sur tout si on la favorise par la chaleur.

Lors même qu'une partie colorante a perdu une partie de son hydrogène, elle peut devenir blanche, en se combinant avec une plus grande quantité d'oxygène ; ainsi, les parties colorantes du lin qui forment une dissolution noire avec l'alcali, perdent presque entièrement leur couleur, lorsque l'on y verse une quantité suffisante d'acide muriatique oxygéné, & l'indigo qui est devenu fauve brun, perd entièrement sa couleur lorsque l'acide muriatique oxygéné épuise son action sur lui.

De même l'acide nitrique commence par rendre brun le suc & les autres substances végétales & animales sur lesquelles il agit, & ensuite la dissolution perd toute couleur par cette action con-

Hhhhh 2

nuée; il est vrai que dans ces circonstances une partie du charbon est changée en acide carbonique.

L'acide sulfurique fait passer également du jaune au noir, les substances sur lesquelles il agit, en isolant leurs parties charbonneuses; mais les phénomènes qu'il présente diffèrent en quelque chose de ceux produits par l'acide muriatique oxigéné & l'acide nitrique: je ne propose de les décrire dans une autre circonstance.

Il arrive peut-être très-rarement, que l'acide muriatique oxigéné & l'acide nitrique ne donnent point d'oxigène à la substance dont ils isolent le charbon; ainsi, les parties colorantes du lin paraissent recevoir de l'oxigène qui s'y unit sans former de l'eau, & qui leur donne la propriété de se combiner avec les alcalis, les terres & les oxides métalliques.

Je dois revenir sur quelques-unes des explications que j'ai données dans le mémoire sur la *combinaison de l'air vital avec les huiles*. (mém. de l'acad. 1785.) J'ai attribué dans ce mémoire, l'épaississement des huiles par l'acide muriatique oxigéné, & le changement des huiles volatiles en résine, à l'oxigène qui s'y combine & qui en augmente la pesanteur spécifique.

Il me paroit probable qu'une partie de l'hydrogène se combine avec l'oxigène pour former de l'eau; de-là vient que leur couleur passe au jaune & même au brun. Cependant il doit aussi se combiner de l'oxigène en commun avec les autres principes, conformément aux observations précédentes, & quelquefois il s'en combine sans que leur couleur change, alors il est probable qu'il ne s'opère pas de combustion; c'est ainsi que la cire paroit contenir de l'oxigène; mais l'action de l'oxigène sur les huiles, l'influence qu'il a sur leurs propriétés & sur leurs différens états, exigent de nouvelles observations.

Tous les phénomènes dont je viens de parler, ont un rapport immédiat avec plusieurs autres que la chimie a analysés; ainsi, j'ai fait voir que les oxides métalliques qui sont caustiques agissent sur les substances animales, parce que l'oxigène qui n'étoit retenu que par une faible affinité, se combine avec elles & leur faisoit éprouver une légère combustion; je dois ajouter que cette combustion ne se porte que sur l'hydrogène qui est abondant dans les substances animales, & de-là vient que ces substances jaunissent & passent jusqu'au noir, parce que le charbon y devient prédominant.

L'hydrogène de l'huile animale a une très-grande disposition à se combiner avec l'oxigène; de-là vient qu'elle noircit par le contact de l'air en se charbonnant, pendant que l'eau qui se forme se dépose au fond du vase qui la contient, ainsi que l'a prouvé M. Lavoisier (éléments de chimie tome 1.)

Les huiles dans lesquelles on tire l'éincelle

électrique, laissent dégager du gaz hydrogène, & l'on voit des portions charbonnées se déposer, suivant l'observation de M. Monge.

Enfin, l'on peut établir une longue comparaison entre l'action des acides nitrique, sulfurique, muriatique oxigéné, & toutes les causes qui tendent à rendre le charbon prédominant dans une substance, soit en chassant l'hydrogène, soit en opérant sa combinaison avec l'oxigène; mais il y a des phénomènes, qui, sous d'autres apparences, ont encore de grands rapports avec les précédents, & qui, par la différence même qu'ils présentent, servent à confirmer les principes que j'établis, parce qu'on voit clairement les causes de cette différence.

J'ai prouvé que l'acide muriatique oxigéné détruisoit l'ammoniacque, parce que l'oxigène se combine avec l'hydrogène qui entre dans la composition de cet alcali; j'ai fait voir que la combinaison de l'ammoniacque & de l'acide nitrique éprouvoit une pareille décomposition; que l'oxide de cuivre combiné avec l'ammoniacque le réduisoit par l'union de l'oxigène avec l'hydrogène, & que les phénomènes de la détonation de l'or & de l'argent fulminans étoient dus à une cause semblable. Dans tous les cas, il y a une combustion pareille à celle que j'analyse; mais il n'y a pas la même progression de couleurs, parce que les substances qui éprouvent cette combustion ne contiennent point de charbon.

Il ne faudroit pas conclure de ce qui précède, que je regarde toutes les couleurs jaunes comme dues à la partie charbonneuse des substances colorantes. Pour peu qu'on ait examiné ces substances, on reconnoit que des compositions très-différentes peuvent donner une même couleur; ainsi l'indigo est bien différent du bleu de nos fleurs, du bleu de l'oxide de cuivre & du bleu de Prusse.

Je ne prétends point non plus que l'oxigène ne puisse s'unir en petite quantité à quelques parties colorantes, sans en affoiblir la couleur & sans la faire passer en jaune; il y a même long-temps que je me suis convaincu que l'indigo, qui forme une couleur verte, lorsqu'il est combiné avec un alcali, avec la chaux, ou avec un oxide métallique, reprend sa couleur & se sépare de ses dissolvans, en reprenant une petite portion d'oxigène qu'il avoit perdue; car l'acide muriatique oxigéné très-faible lui rend sa couleur bleue par le moyen de l'oxigène.

J'ai fait voir précédemment, que l'oxigène pouvoit se combiner avec les parties colorantes sans y produire sensiblement les effets de la combustion, & qu'alors il en effaçoit la couleur & les blanchissoit; j'ai fait voir de plus que lors même que les parties colorantes avoient éprouvé une combustion fort avancée, & qu'elles étoient devenues d'un brun foncé, une surabondance d'oxigène pouvoit déguiser les effets de la combustion, & faire disparaître la couleur qui lui étoit due;

car on se rappelle que la dissolution alcaline des parties colorantes du lin, perd sa couleur par l'assuif de l'acide muriatique oxygéné. Cet effet doit être également déguisé dans plusieurs phénomènes chimiques & dans plusieurs opérations de la nature, & alors on est obligé à le laïsser par des rapports moins directs : je vais en donner des exemples.

M. Lavoisier a prouvé que les acides végétaux ont pour base l'hydrogène & le carbone, & l'on fait que par le moyen de l'acide nitrique l'on peut successivement les transformer depuis l'acide tartareux jusqu'à l'acide acéteux. On attribue les différents états par lesquels ils passent aux différentes proportions d'oxygène avec la même base ou le même radical. Sans exclure cette cause, je pense que c'est à la diminution de l'hydrogène que sont principalement dus ces changemens, l'acide tartareux en contient beaucoup, car l'on retire une quantité considérable d'huile de sa distillation ; l'acide oxalique n'en donne plus, ce qui ne prouve pas qu'il ne contient pas d'hydrogène, mais ce qui prouve qu'il en contient moins.

On attribue le changement du vin en acide acéteux, à la seule absorption de l'oxygène ; mais il me paroit probable, toujours par les mêmes raisons, que l'oxygène agit de deux manières dans cette occasion, qu'il détruit la plus grande partie de l'hydrogène qui forme le spiritueux du vin, & qu'il se combine avec une petite portion de ce principe & avec le carbone ; de-là vient que cette fermentation a besoin d'être secondée d'un certain degré de chaleur.

Toutefois il faut éviter de donner trop d'extension à ces principes ; quoique l'hydrogène ait la propriété de s'unir facilement avec l'oxygène & à une température inférieure à celle qu'exige le charbon, il arrive cependant, par le concours d'autres affinités, que le charbon se combine avec l'oxygène pendant que l'hydrogène échappe à cette combinaison, & même s'accumule dans une substance ; c'est ce qui a lieu dans la fermentation spiritueuse, dans laquelle le charbon forme une grande quantité d'acide carbonique, pendant que l'hydrogène produit la partie spiritueuse de la liqueur.

Dans la respiration, c'est aussi principalement la matière charbonneuse qui se dégage sous la forme d'acide carbonique ; & de-là vient que les substances animales contiennent beaucoup d'hydrogène, que l'on en retire ensuite sous la forme d'huile, soit dans la distillation, soit par l'action de l'acide nitrique.

Je reviens à des applications plus immédiates des observations que j'ai faites sur les parties colorantes du lin.

Considérant que ces parties colorantes se trouvent combinées aux fibres de l'écorce du lin dont on forme le fil, j'ai pensé que l'écorce des arbres devoit me présenter des phénomènes analogues.

Il faut d'abord observer que les bois donnent presque tous, par l'ébullition dans l'eau, une liqueur d'un fauve tirant plus ou moins sur le jaune, sur le rouge, sur le brun, & que l'écorce donne une pareille liqueur, mais beaucoup plus chargée & d'une couleur plus foncée.

J'ai épuisé, par des ébullitions répétées, du bois & de l'écorce de noyer, de tilleul & de prunier, réduits en poudre grossière ; plus on épuise ces substances, plus leurs couleurs se foncent. L'écorce de prunier, de tilleul & celle de noyer sont devenues presque noires, après cela l'alcool en a extrait fort peu de chose ; l'alcali caustique n'a pris qu'une légère couleur avec le bois ; mais il a pris par l'ébullition avec les écorces, une couleur très-foncée d'un fauve brun foncé, mais tirant plus ou moins sur le rouge ; en répétant cette opération jusqu'à ce que l'alcali ne se chargeât plus de couleur, il n'est resté que des élémens de fibres qui ne retenoient presque plus de couleur & qui ne formoient que du quart au tiers du poids de l'écorce épuisée par l'ébullition.

J'ai versé de l'eau de chaux sur cette dissolution alcaline ; il s'est fait un précipité abondant, mais moins foncé que celui des parties colorantes du lin ; il s'est aussi formé, par les dissolutions métalliques, des combinaisons avec les oxides. L'acide muriatique versé sur la dissolution alcaline, y produit un précipité abondant, mais qui se sépare difficilement & qui se redissout par l'agitation ; de sorte qu'on n'en peut séparer que très-peu par la filtration. L'acide muriatique oxygéné versé sur cette dissolution, en détruit la couleur ; l'on obtient par l'évaporation un résidu jaune qui ressemble beaucoup à celui des parties colorantes du lin traité de la même manière.

L'écorce des arbres est donc composée pour la plus grande partie, d'une substance colorante insoluble dans l'eau & dans l'alcool, & qui a des grands rapports avec les parties colorantes de l'écorce du lin.

Les différences qui se trouvent entre ces deux substances, ne dépendent peut-être que du rouissage du lin, car il me paroit probable que cette opération ne consiste, comme on le dit, que dans la dissolution & la fermentation du mucilage, qui unit l'écorce à la partie ligneuse. Je suis porté à croire que dans cette opération, les parties colorantes éprouvent un commencement de combustion, c'est-à-dire qu'elles perdent un peu le caractère huileux, qu'une partie de leur hydrogène est détruite, & qu'elles prennent un peu d'oxygène.

Cette assertion m'engage à rappeler une différence qui se trouve entre les fils & les toiles selon leurs couleurs ; les fils jaunes sont à-peu-près d'un quart ou d'un cinquième plus difficiles à blanchir par le nouveau procédé que ceux de même qualité qui sont d'un fauve brun, & que l'on présumeroit à la vue devoir blanchir beaucoup plus difficilement. Les renseignemens de quelques blanchif-

feurs, m'ont appris que cette différence étoit encore plus grande dans le procédé ordinaire. Il est probable qu'elle dépend du rouissage, & que les fils qui blanchissent le plus facilement, sont ceux dont les parties colorantes ont été les plus altérées dans cette opération.

J'ai cueilli au mois de mars des feuilles de charme de l'année précédente, elles ne m'ont presque rien donné par l'alcool & par l'ébullition dans l'eau; mais j'en ai extrait par l'alcali caustique une grande quantité de parties colorantes qui se sont encore plus rapprochées par leurs propriétés chimiques des parties colorantes du lin que celles de l'écorce; mais elles étoient d'une couleur plus claire & plus jaune.

L'on fait que la partie verte des végétaux est d'une nature résineuse; elle contient, par conséquent, beaucoup d'hydrogène, qui est dû à la décomposition de l'eau dont l'oxygène s'exhale. Elle perd ce caractère, lorsque le froid ralentit la circulation propre aux végétaux, & sur-tout que la lumière agit beaucoup moins dans les jours obscurs & courts de l'hiver. Il paroît que l'air vital de l'atmosphère agit alors sur cette partie colorante, qu'il y produit une légère combustion; que par-là le charbon devient prédominant, modifie sa couleur, & la fait passer au jaune.

La partie colorante verte n'est pas fixe dans les feuilles; elle est tenue en dissolution par le suc qui se met dans la plante; il y a donc apparence qu'elle est entraînée avec lui dans les vaisseaux de la plante; mais qu'elle s'altère peu-à-peu, soit par l'action de l'air qui paroît porté dans l'intérieur des végétaux par des vaisseaux particuliers, soit par une altération dans les parties analogues à celle que produit la fermentation, & que le résultat de ces changemens est de lui donner une couleur plus ou moins fauve, parce que la partie charbonneuse y devient prédominante. Ce que je dis de la couleur verte doit aussi s'appliquer aux parties colorantes des fleurs, & à celles de la seconde écorce qui est verte. On fait que lorsque l'on fend le bois, & qu'on l'expose à l'air, il y prend une couleur plus ou moins foncée.

Les parties colorantes s'altèrent de plus en plus dans l'écorce, très-probablement par l'action de l'air atmosphérique; elles s'y accumulent parce qu'elles y perdent peu-à-peu la fluidité nécessaire. De-là vient que les écorces donnent ordinairement par l'ébullition une liqueur beaucoup plus colorée que les bois. Enfin par l'action continuée des mêmes causes, ces parties colorantes perdent la fluidité, & sont rejetées à l'extérieur des fibres.

Je vais rappeler les objets dont je me suis principalement occupé dans ce mémoire.

Les fils & les toiles de lin & de chanvre blanchissent, parce qu'on les dépouille des parties colorantes qui forment du quart au tiers de

Il n'y a qu'une petite portion de ces parties qui soit en état d'être dissoute par l'alcali.

Pour les rendre solubles, il faut que l'oxygène de l'atmosphère, de la rosée ou de l'acide muriatique oxygéné se combine avec elles. De-là vient la nécessité d'altérer l'action des lessives & de l'oxygène.

Quand ces parties sont dissoutes par l'alcali, on peut les précipiter par l'eau de chaux. On peut aussi les combiner avec les oxides métalliques par le moyen des dissolutions métalliques.

Les acides précipitent ces parties colorantes des alcalis; le précipité est fauve, brun; mais quand il sèche il paroît noir.

Avant que d'être dissoutes par l'alcali, elles paroissent blanches; mais par la chaleur & la lessive elles deviennent fauves.

L'acide muriatique blanchit également les parties vertes des végétaux; mais l'ébullition les rend jaunes.

L'oxygène agit sur les parties colorantes, ou en se combinant simplement avec elles, & il ne fait qu'affaiblir leur couleur ou la blanchir;

Ou bien il détruit une partie de l'hydrogène, & alors, il change la couleur en jaune ou en fauve plus ou moins foncé;

Ou enfin il agit des deux manières, ce qui paroît le plus ordinaire; mais dans ce cas, un effet peut l'emporter sur l'autre.

Lorsque l'acide muriatique oxygéné rend une couleur jaune, fauve, brune, il produit cet effet en rendant le charbon prédominant, comme il arrive lorsqu'on soumet une substance à une forte chaleur ou à une légère combustion, ce qui est prouvé par la manière dont il agit sur l'infusion de noix de galle & de sumach, sur le sucre & sur l'indigo.

L'acide nitrique & même l'acide sulfurique rendent jaunes, fauves, brunes, noires, les substances sur lesquelles ils agissent, également en augmentant la proportion du charbon, & en diminuant celle de l'hydrogène. Les oxides métalliques qui sont caustiques agissent de même sur les substances animales.

Ces phénomènes, & plusieurs autres, dans lesquels il se fait une légère combustion, dépendent de ce qu'à une température basse, l'hydrogène a plus de disposition & de facilité que le carbone à s'unir avec l'oxygène; mais le contraire peut avoir lieu par un concours d'affinités, comme dans la respiration & dans la fermentation vineuse.

La diminution de l'hydrogène n'est pas indiquée par le changement de couleur, si la substance qui l'éprouve ne contient pas de charbon, comme dans la destruction de l'ammoniaque; elle ne l'est pas même, quoique cette substance contienne du charbon, si l'oxygène se fixe avec abondance.

Lorsque l'acide nitrique change la nature de

quelques acides végétaux, il paroît que c'est principalement en diminuant la proportion de l'hydrogène, qui, avec le carbone, forme le radical.
* La partie verte des feuilles & de la seconde écorce des arbres paroît être la principale source des parties colorantes qui se trouvent dans les bois & dans l'écorce.

Cette partie verte prend une couleur fauve par l'action de l'oxygène, & par cette action continuée qui lui fait éprouver de plus en plus une espèce de combustion; elle finit par perdre, sur-tout dans l'écorce, la propriété de circuler dans les vaisseaux; elle est rejetée à l'extérieur, & elle fait la plus grande partie de la substance solide des écorces.

BLANCHIR. Le mot **BLANCHIR**, outre qu'il exprime en chimie la propriété de devenir blanc à l'air dont jouissent beaucoup de substances, est employé dans un grand nombre d'arts chimiques, pour désigner la décoloration qu'on communique à beaucoup de corps. Il se dit plus particulièrement dans les deux cas suivans.

Blanchir les roiles au pré, c'est les décolorer par le contact de l'eau, de l'air & du soleil. On a trouvé un moyen de les blanchir bien plus promptement par l'acide muriatique oxygène. Voyez ci-dessous le mot **BLANCHIMENT**.

Blanchir le cuivre, c'est le recouvrir d'étain, l'étamer. Voyez le mot **ÉTAMAGE**.

BLANCHIR. (Pharmacie.) Expression employée par nos apothicaires, pour désigner la macération que l'on fait d'un fruit, d'une graine, dans l'eau chaude ou froide; ainsi on fait blanchir les amandes douces, en les faisant tremper quelques minutes dans l'eau chaude pour en détacher la peau; on fait blanchir les tiges d'angelique, de laitue, les racines d'énula campana, d'iris, d'éringium, &c., en les faisant macérer pendant quelque temps, soit dans l'eau bouillante, soit dans une dissolution plus ou moins chargée de muriate de soude ou sel marin; on prépare de même les noix, les amandes vertes & beaucoup d'autres fruits que l'on doit confire au sucre. Cette opération a pour objet d'attendrir la plante que l'on fait macérer, d'ôter une partie de la saveur de celles qui en ont une très-forte, de les dépouiller d'une partie de leur couleur, ou enfin d'en séparer la peau qui les recouvre; lorsque les tiges, racines ou fruits que l'on a ainsi fait macérer dans l'eau, ont acquis le degré de mollesse ou de blancheur que l'on désire, on les enlève avec une écumoire, on les met égoutter sur un tamis de crin, & on les confit au sucre. Les apothicaires faisoient autrefois un grand nombre de préparations semblables avec les racines d'énula campana, d'éringium, &c., & qu'ils nommoient *confits*. Bauderon dans sa pharmacopée en rapporte plusieurs formules; mais aujourd'hui ces préparations sont abandonnées aux confiseurs, qui en font un objet d'agrément pour les tables.

BLANCHNON. (Pharmacie.) Dénomination que l'on trouve dans Oribase, & qui a été employée par quelques anciens pharmacographes, pour désigner la fougère. Nicander la désigne sous le nom de *bletron*.

BLATTAIRE ou **HERBE AUX MITTES.** (Pharmacie.) *Verbascum blattaria*, *Blattaria*, Dod. *Pempt.* 143. Plante Européenne, annuelle, qui, dit-on, est émolliente, vermifuge, apéritive, détergative. On prétend aussi qu'elle chasse les mittes, & spécialement celles des livres.

Nous cultivons la blattraire à fleur blanche, dans notre jardin de botanique; elle est bisannuelle.

(M. WILLEMET.)

BLEDE DE TURQUIE ou **MAIS.** (Pharmacie.) *Zea mays*, *Mays gravis aureis*, T. 531. *Frumentum Indicum*, Cam. *Ept.* 186. Plante céréale, transplantée en Europe au commencement du quatorzième siècle, dont l'emploi sert à la nourriture des hommes & des animaux. Elle vient de l'Amérique, se trouve aussi au Japon & à la Chine. Sa culture est aisée.

Les Américains & les Mexicains préparent avec ce grain des liqueurs fermentées, spiritueuses, & de la bière qui enivre.

Le bled de Turquie est, dit-on, apéritif, diurétique, adoucissant, émollient, rafraîchissant, maturatif. Quelques-uns emploient la farine, pour faire des cataplasmes attractifs, propres à faire suppurer les abcès & guérir les tumeurs occasionnées par les maux de dents.

Le suc des feuilles est antiplogistique, contre les éréthésiles.

L'on confit au sucre, dans l'Amérique septentrionale, la hampe du maïs, qu'on trouve dans les officines.

L'on confit au vinaigre, à l'instar des cornichons, ses jeunes épis femelles, rendres, & ses grains récemment formés: ce qui fait un mets délicieux & un assaisonnement agréable.

La paille sert aux couchages.

(M. WILLEMET.)

BLEDE DE VACHE. *Melampyrum arvense*, (Pharm.) *Triticum vascinum*, Dod. *Pempt.* 541. *Parietaria montana boeica*, Chuf. 605. Plante annuelle, indigène à l'Europe, qui croit dans les champs, parmi les plantes céréales.

La farine de sa semence est, suivant les polypharmques, émolliente, résolutive, détergative, contre les enflures, les difficultés d'uriner. Mêlée avec celle de froment, elle rend le pain qui en résulte, noir, bleuâtre, amer. Elle peut rendre service dans les années de disette.

La plante est agréable aux vaches, aux bœufs, aux moutons, aux chevaux, & la graine à la volaille.

M. Thunberg a trouvé ce mélangement au Japon.
(M. WILLEMET.)

BLED DE VACHE DES PRÉS. (*Pharmacie.*) *Melampyrum pratense. Parietaria sylvestris.* L. Clus. Hist. La semence de cette espèce est, dit-on, aphrodisiaque.

(M. WILLEMET.)

BLED FRANC OU FROMENT. (*Pharmacie.*) *Triticum hybernum. Siligo spica mutica.* Lobel. Icon. 25. *Bled ou froment d'été. Triticum aestivum.* Voici sans contredit la plus précieuse à l'humanité, puisqu'elle fait la nourriture de la plus grande partie de l'espèce humaine, depuis la Perse jusqu'au Portugal. Nous l'allons considérer relativement à l'art de guérir. La chirurgie emploie sa farine comme résolutive, digestive, contre les érysipèles, les douleurs, les inflammations.

Le levain est attractif.

La mie de pain est émolliente, anodine, attractive. Elle entre dans la décoction blanche, les trochisques de vipères & les trochisques escarrotiques de minium.

Le son est détersif, adoucissant, rafraîchissant ; contre la diarrhée, la dysenterie, les rhumes invétérés, la toux opiniâtre. Il entre dans la décoction détersive de la pharmacopée de Paris.

L'amidon est pectoral, incrassant, arrête le crachement de sang, & il est cosmétique. Il entre dans le suc de réglisse blanc, la poudre diarragacanthé froide, celle de Hali, les espèces *Diaireos*, les trochisques béchiques, les trochisques escarrotiques & les trochisques blanchissifs.

Cette plante, de première nécessité, sert encore dans les arts & métiers. L'on prépare une huile de bled.

(M. WILLEMET.)

BLED NOIR A BEAUCOUP DE FLEURS. (*Pharm.*) *Polygonum multiflorum.* C'est une nouvelle espèce que M. Thunberg a découverte à Nagasaki dans le Japon. Il en a donné la description dans sa flore Japonaise. Il assure que sa racine est cordiale.

(M. WILLEMET.)

BLED NOIR OU SARRAZIN. (*Pharmacie.*) *Polygonum fagopyrum. Fagopyrum.* Dod. Pempt. 511. *Fagoriticum.* J. B. L. 993. Plante indigène d'Afrique, qui nous est venue dans le quatorzième siècle. Elle est céréale, annuelle, & on la cultive dans nos champs. Ce bled est comestible ; mais il donne un pain noir, assez désagréable, propre aux gens de la campagne, facile à digérer. On fait avec la farine de sarrazin une bouillie dont le peuple en Danemarck use beaucoup. Cette bouillie & les gâteaux que l'on prépare avec la même farine, offrent une nourriture qui convient aux vieillards, dont le ventre est trop resserré. L'on cuit le bled sarrazin avec la carotte, pour en faire de la bière.

On se sert avantageusement de ce grain en Suisse pour nourrir la volaille.

En médecine il est détersif, résolutif, apéritif, rafraîchissant, émollient, humectant, contre les inflammations des mamelles & des testicules. Sa farine forme d'excellents cataplasmes maturatifs. Le son qui en provient, sert heureusement aux jardiniers, pour préserver de l'humidité pendant l'hiver les cellules où ils conservent leurs plantes en bouchant avec les interstices des planchers.

Le suc de la plante récente guérit le larmolement involontaire, l'herbe nourrit le bétail, la fleur est aimée des abeilles ; elles en retirent beaucoup de miel en automne.

Le sarrazin fait partie des plantes de l'énumération de la pharmacopée de Paris.

(M. WILLEMET.)

BLENDE. C'est le nom que les minéralogistes donnent à la mine de zinc sulfureuse, qui est nommée *sulfure de zinc* par les chimistes français. Voyez les mots **SULFURE & ZINC.**

BLEPHARIQUES, BLEPHARICA des grecs. (*Pharmacie.*) Dénomination employée par Aétius & par quelques anciens pharmacographes, pour désigner les colliers & les poudres destinées pour les maladies des paupières.

BLETTE. (*Pharm.*) *Amaranthus blitum. Blitum album & rubrum.* C. B. 118. Cette plante potagère, commune, annuelle, est originaire des contrées & régions méridionales. Elle se trouve abondamment en Saxe ; elle est émolliente, humectante, rafraîchissante. Quelques auteurs prétendent qu'elle convient dans la dysenterie & dans l'écoulement immodéré des règles, le crachement de sang, les insolations, la toux & les piquures vénéneuses. La fumigation provoque, dit-on, les règles supprimées, hâte l'expulsion du fœtus & de l'arrière-faix.

Ses feuilles entrent dans les décoctions, lavemens & cataplasmes émollients.

La blette se trouve dans la nomenclature des plantes officinales de la pharmacopée de Paris.

M. Thunberg l'a observée au Japon.

(M. WILLEMET.)

BLEU. Le bleu est une espèce de couleur qu'on observe très-fréquemment en chimie, dans les matières végétales & minérales. On distingue des bleus naturels & des bleus artificiels. Les principaux bleus naturels parmi les minéraux, sont le bleu de montagne, la pierre bleue connue sous le nom de *lapis lazuli*, le feld spath bleu, le saphir, le cristal de roche bleu. Les bleus minéraux factices ou artificiels sont le bleu de Prusse, les cendres bleues, l'oxide de cuivre ammoniacal, le bleu d'azur ou d'émail.

Les

Tes bleus naturels des végétaux se trouvent dans les fleurs, mais ils sont pour la plupart très-passagers & très-alterables; le plus beau bleu, & presque le seul en même-temps qu'on prépare avec les végétaux, est l'indigo.

Quoique le règne animal présente un grand nombre de nuances bleues dans les plumes des oiseaux, dans les étuis & les ailes des insectes, &c. ces bleus ne sont point employés, & on n'en connoît pas la nature. Parmi les bleus que l'on doit à l'art, le bleu de Prusse doit en grande partie sa naissance aux matières animales qui forment un des principes nécessaires de ce bleu. Voyez les articles de ces bleus.

BLEU D'AZUR. Le bleu d'azur est pour les uns la préparation du *lapis lazuli*, & pour les autres l'oxide de cobalt vitreux. Voyez BLEU D'OUTRE-MER & BLEU D'EMAIL.

BLEU D'EMAIL. On nomme *bleu d'email* le verre coloré par l'oxide de cobalt, & réduit en poudre fine. Ce nom lui est donné, parce qu'il est employé pour colorer en bleu les émaux sur la faïence, la porcelaine, les métaux, &c. Voyez COBALT.

BLEU DE MONTAGNE. Le bleu de montagne est un oxide de cuivre bleu natif qu'on trouve en effet dans les montagnes qui contiennent des mines de ce métal. Voyez CUIVRE.

BLEU DE PRUSSE. Ce bleu artificiel est nommé *bleu de Prusse*, parce que c'est à Berlin qu'on en a fait la découverte. Ce composé est dans la nomenclature méthodique du prussiate de fer. Voyez cet article & celui du FER.

BLEU D'OUTRE-MER. Le bleu d'outre-mer est fait avec le *lapis lazuli* réduit en poudre fine. C'est le plus beau, le plus fixe & le plus inaltérable de tous les bleus. Le nom d'*outre-mer* lui est donné en l'honneur, parce qu'il vient des pays au-delà de la mer. Voyez le mot LAPIS LAZULI.

BLEU VÉGÉTAL. On donne quelquefois ce nom au bleu d'indigo & à celui du tournesol, quoique ces deux bleus soient extrêmement différens l'un de l'autre. Voyez les mots INDIGO & TOURNESOL.

Il est vraisemblable qu'on trouvera quelque jour d'autres bleus végétaux que les précédens. J'ai vu il y a quelques jours, (25 Juillet 1792.) un bleu végétal, assez joli, préparé par M. l'apothicaire de Toulouse, avec l'écorce de radix rouges bouillie dans l'eau mêlée à une dissolution d'alun, & précipitée par l'alcali fixe. C'est une espèce de lacque dont il fera question ailleurs. Voyez les mots COULEUR & LACQUE.

BLEUET. (*Pharmacie.*) Le bleuët, espèce de *Chimie. Tome II.*

centaurée très-commune, qui vient dans les moissons, aux environs de Paris, qu'on cultive dans les jardins, & qui est connue dans les pharmacies sous ce nom, ainsi que sous celui de *caust-lunettes*, y est employé pour en extraire par la distillation avec l'eau, ce qu'on nomme *eau de bleuet* ou de *caust-lunettes*, qu'on a regardée comme un très-bon remède dans les maladies des yeux.

BOCAL. *Vase de chimie.* Les bocaux sont des vases de verre plus ou moins grands, & de forme plus ou moins différente. Ils peuvent être en général considérés comme un cylindre creux, fermé par un bout & ouvert par l'autre. Les parois de ce vase s'élèvent quelquefois directement, sans aucune inflexion; quelquefois aussi près de leur extrémité, on y fait une compression qui y laisse une fosse circulaire. Leur fond est ordinairement plat ou peu concave, afin qu'ils s'appuyent plus solidement.

Ceux dont les parois montent perpendiculairement jusqu'à leur extrémité, sont ordinairement bouchés avec des couvercles de verre ou bien de carton. Ceux au contraire qui ont une rigole vers la partie supérieure, sont ordinairement couverts d'un papier ou d'un parchemin fixé avec une ficelle que reçoit la rigole. Souvent cependant on les couvre avec des chapeaux de carton faits exprès, & qu'on vernit pour qu'ils durent plus long-temps, & qu'ils puissent être lavés.

Ces vases servent à mettre des poudres, des sels de toutes espèces, &c. Il faut les choisir bien forts, droits, & autant qu'il est possible sans bulles.

Les gravures offrent un bocal dont les parois sont droites, & un bocal à bord renversé.

BOCAL, BOCAUX. (*Pharmacie.*) Les bocaux ou poudriers sont fort employés dans les boutiques de pharmacie, pour conserver un grand nombre de substances naturelles ou de produits cristallins, solides ou pulvérulents. On en a de toutes les grandeurs; on les couvre soit d'un simple papier, soit d'un parchemin, soit d'un couvercle de carton peint, soit d'un couvercle de bois ou de fer blanc. On ne doit mettre dans ces vases que les substances qui ne sont ni déliquescences, ni susceptibles de s'altérer par l'air & la lumière; car l'un & l'autre pénétreraient très-facilement ces vases transparents & mal bouchés; il faut aussi n'y point laisser long-temps les substances odorantes.

BOCHET & quelquefois BOUCHET. *Bochetum.* (*Pharm.*) Ce mot que l'on trouve très-souvent, sur-tout dans les écrits des médecins & chirurgiens français des dixième & dix-septième siècles, étoit employé pour désigner une décoction médicamenteuse, peu chargée, qui servoit de boisson ordinaire aux malades, même pendant leur repos. On

nommoit ainsi plus particulièrement la seconde décoction des bois ladorifiques, dont les malades faisoient usage indistinctement suivant leur foie. La première décoction qui étoit plus chargée, étoit réservée & donnée séparément à des temps déterminés. Paré donne aussi le nom de *bouchet* ou *hypocras d'eau*, à une légère décoction de trois gros de cannelle & de deux onces de sucre dans douze livres d'eau, dont il faisoit sa boisson ordinaire dans une maladie dont il fut affecté.

BOIS. Le bois proprement dit, la substance ligneuse des végétaux, n'a point assez fixé l'attention des chimistes, & on l'a confondu dans la plupart des ouvrages de chimie avec des matières dont il diffère beaucoup. Dans les premiers temps où l'on s'est occupé de l'analyse végétale, on regardoit le bois comme une espèce de terre, & on le nommoit résidu terreux des végétaux; c'étoit ainsi que dans l'espèce d'analyse des écorces, des tiges, des racines, des végétaux employés en médecine, analyse à l'aide de laquelle on essayoit d'éclaircir la matière médicale, lorsqu'on parloit de ces matières épuisées par les dissolvans ou mentrues aqueux, alcoolique, &c., on qualifioit leurs bases solides, qui avoient échappé à l'action de ces menstrues, du nom de terres; on disoit alors la terre du quinquina, la terre de l'ipécacuanha, &c. On trouve à chaque page ces expressions dans les ouvrages d'auteurs très-estimés de Neumann, de Cartheuser, de Geoffroy, dans la pharmacopée de Londres, &c. Cependant lorsque la chimie plus éclairée dans ses analyses compliquées des corps organiques, & plus riche en instrumens propres à faire connoître la nature & la composition des corps, a commencé il y a quelques années à saisir les principales différences des matériaux qui composent les végétaux, on a cherché à rapprocher le bois de ceux de ces matériaux avec lesquels il a réellement le plus d'analogie, & je l'ai moi-même il y a dix ans comparé à une scéule grossière. Mais les recherches auxquelles j'ai eu occasion de me livrer depuis sur plusieurs substances végétales, & en particulier sur le quinquina, m'ont mieux instruit sur cet objet, & j'ai reconnu qu'au lieu d'assimiler le bois à une scéule, quelque grossière qu'on la suppose, il avoit des caractères qui le distinguoient de cette substance, & qui exigeoient qu'on le regardât comme une matière particulière *sui generis*, ayant ses propriétés spécifiques, ses attractions individuelles, & sur-tout une composition propre. Je crois devoir donner ici ce que j'ai déjà recueilli sur les propriétés ligneuses, & ce qui commence pour ainsi-dire l'histoire chimique de ce principe végétal.

On doit d'abord observer que pour avoir la matière ligneuse pure il faut, après avoir choisi une partie végétale qui en contient beaucoup, telle qu'une racine solide, une écorce dure, ou du bois proprement dit, & l'avoir réduit en poudre très-

fine, l'épuiser par de longues macérations & de fortes décoctions dans de grandes quantités d'eau, par des infusions répétées dans l'alcool. Quand la matière est sans aucune saveur, quand l'eau & l'alcool n'en retirent plus absolument rien, & sortent sans couleur & sans goût, alors la substance ligneuse est pure. C'est un corps absolument insipide, sec, & même gravelleux sur la langue, indissoluble dans l'eau, & c'étoit en raison de ces propriétés qu'on l'avoit regardé comme de la terre. Mais en l'examinant par d'autres réactifs, par d'autres instrumens que l'eau, on reconnoît bientôt qu'il est fort éloigné de la nature des terres. Chauffé avec le contact de l'air, lorsque la température qu'on lui communique excède celle de l'eau bouillante, il brunit, exhale une odeur piquante; & en l'échauffant davantage il brûle & s'enflamme; bientôt il paroît embrasé & reste long-temps rouge sans le consumer, comme on l'observe dans ces masses faites avec le tan pressé dans des moules, que l'on connoît dans les tanneries sous le nom de *mottes à brûler*. Si on étouffe la combustion après quelques minutes d'inflammation, ce qui reste à toutes les propriétés du charbon de bois ordinaire; on y trouve même de la cohérence, quoique les molécules qui l'ont formé aient été auparavant incohérentes & en poussière. Si l'on chauffe le corps ligneux dans des vaisseaux fermés, on en retire une eau rougeâtre chargée d'un acide particulier qui a été décrit sous le nom d'acide ligneux dans le premier volume, & qu'on nomme acide pyroligneux dans la nouvelle nomenclature. Cet acide doit manifestement son origine à la matière ligneuse; il n'est produit que par elle, il n'existe point dans les produits des matières végétales qui ne contiennent pas de bois & qu'on traite par le feu; c'est à la composition particulière du bois qu'on doit attribuer sa formation. La proportion & la disposition des principes qui constituent le corps ligneux sont nécessaires pour la production de cet acide; ainsi donc la formation de cet acide empyreumatique, est un des caractères propres du corps ligneux, & il suffiroit seul pour le distinguer de toutes les autres substances végétales. Mais il en existe encore un qui lui appartient en propre, & qui doit être tiré de la manière dont il est altéré par les acides. L'acide sulfurique concentré noircit le corps ligneux plus promptement qu'il ne fait la plupart des substances végétales, & on reconnoît bientôt par cet effet comparé, que le bois contient plus de carbone, que tous les autres matériaux des plantes. L'acide nitrique dissout le bois à l'aide de la chaleur, & le convertit en plusieurs acides végétaux; & sur-tout en acide oxalique, en acide malique, en acide acétique. On voit dans cet effet le partage de l'oxygène de l'acide nitrique sur différentes proportions d'hydrogène & de carbone séparés par l'effet de cet oxygène; on trouve aussi qu'à mesure que ces acides se forment, une très-grande

quantité de carbone est enlevée & combinée avec les premières portions d'oxygène qui se séparent de l'acide nitrique, en forte qu'il se dégage beaucoup plus de gaz acide carbonique avec le gaz nitreux, que cela n'a lieu dans le traitement de toutes les autres matières végétales par l'acide nitrique.

Je conclus de ces recherches, que le bois est non-seulement un corps particulier, *sui generis*, qu'il faut distinguer de toutes les autres substances végétales, mais que ce corps diffère sur-tout des autres matériaux des végétaux par la grande quantité de charbon qui entre dans sa composition; c'est à cette proportion de carbone qu'il doit sa solidité, sa durabilité, sa forme organique, qu'il retient encore après le dégagement de son hydrogène; c'est de tous les matériaux qui forment les végétaux celui qui contient le plus de carbone, & c'est aussi le dernier corps que produit la végétation, dont le grand travail consiste à fixer de l'hydrogène & du carbone. (Voyez le mot VÉGÉTATION.)

BOIS D'ALOËS. (*Pharmacie.*) Le bois d'aloës est nommé *agalochum* ou *asphaltum* par les auteurs de matière médicale; il entre dans les goutes anodynes angloises, l'eau générale, le syrop de vipère, l'opiare de Salomon, la confection alkerkes, la poudre d'ambre, les trochisques *hedicroi*, le baume de Fioraventi, les pastilles odorantes, l'élixir de vitriol, &c.

BOIS DE BAUME. (*Pharmacie.*) *Amyris balsamifera xylobalsamum.* Off. Ce bois aromatique est produit par le baumier de la Jamaïque & des Indes. Il doit se choisir en petits rameaux couleur des cendres, tivés en dehors. Les Arabes en brillent pour parfumer leurs mosquées & leurs appartemens.

Le bois de baume est inséré dans l'énumération des médicaments simples de la codex de Paris. Il entre dans les trochisques d'*hedicroi*. Il est, selon Lemery, exotique, stomacal, résiste au venin, &c sert dans les maladies contagieuses épidémiques.

(M. WILLEMET.)

BOIS DE BRÉSIL. (*Pharmacie.*) Le bois de Brésil qui vient d'un arbre appelé par les habitants de ce pays *ibirapitanga*, est distingué en plusieurs espèces, qu'on croit ne différer les uns des autres que par le lieu d'où elles viennent. L'arbre qui le fournit, est le *escholopia bicoloris* de Linnéus; le plus estimé est celui de Fernambouc. (Voyez ci-dessous.) On choisit le bois de Brésil en bûches lourdes, compactes, sans moëlle, sans aubier, sans devenant plus rouge à l'air qu'il ne l'est dans ses éclats récents, d'un goût légèrement sucré. On le distille à l'altingent, sébrifuge, stomachique;

on le faisoit même entrer autrefois dans plusieurs préparations pharmaceutiques; il n'est plus d'usage, & ne sert qu'en teinture. Voyez TEINTURE.

BOIS DE BRÉSIL OU DE FERNAMBOUC. (*Pharmacie.*) *Cajupira Brasiliensis. Pseudo-santalum rostrum.* Sloan. *jam.* N. B. Il est tiré d'un grand arbre du Brésil, de la Jamaïque, de la Caroline, qui est sur-tout employé à la teinture. Il passe pour être altringent; son infusion est regardée comme sébrifuge & bonne contre l'ophthalmie.

(M. WILLEMET.)

BOIS DE CAMPÊCHE OU DE LA JAMAÏQUE. (*Pharmacie.*) *Hematoxylon Campechianum. Lignum Campechianum.* Sloan. *jam.* N. B. C'est un grand arbre épineux, à fleurs papilionacées, qui croît à Saint-Domingue, à la Jamaïque & dans l'Amérique, sur-tout aux environs de Campêche; transplanté à la Cayenne, il s'y est naturalisé. Son bois est pesant, rouge, compact, & sert à teindre en rouge ou en violet. Il est officinal. En Angleterre, on le donne comme altringent, contre la dysenterie, dans les maladies de l'estomac. Les Anglois préparent avec ce bois un extrait, qu'ils louent contre le cours de ventre. Voyez les pharmacopées de Londres & d'Edimbourg.

Ses feuilles sont céphaliques, antiseptiques.

Sa graine est une excellente épice; elle chasse les vents, fortifie l'estomac. L'on prépare avec une liqueur sucrée très-agréable. Elle est recherchée par plusieurs espèces d'oiseaux.

Browne rapporte qu'il découle du tronc & des premières branches de cet arbre, une gomme d'un rouge foncé noirâtre, friable, souvent de la grosseur d'un œuf de poule, de saveur douce, que l'on transporte en Angleterre.

(M. WILLEMET.)

BOIS DE COULEUVRE. (*Pharmacie.*) *Lignum colubrinum.* Ce bois vient d'un arbre du même genre que ceux qui fournissent la noix vomique & la fève de S. Ignace; c'est le *Strychnos colubrina* de Linnéus. Aussi craint-on ses effets âcre, vomitif & purgatif quant il est récent. On l'a recommandé bien sec contre les morsures des serpents. On en tiroit autrefois une huile qu'on donnoit à la dose d'un demi-gros, contre les vers, dans les fièvres intermittentes & dans les morsures des vipères ou des serpents vénéreux. On ne l'emploie plus du tout, non plus que ses produits.

BOIS DE COULEUVRE. (*Pharmacie.*) *Strychnos Colubrina. Clematis indica spinosa foliis luteis.* C. B. P. Cet arbre du même genre que celui qui

liiii 2

donne la noix vomique, se trouve au Malabar, dans les îles de Timor, de Solor & de Ceylan. Le bois de couleur est ainsi appelé, ou parce qu'il guérit la morsure des serpens, ou parce que son écorce extérieure est tachetée comme la peau de la vipère. Outre cette propriété, Boerhaave assure que ce bois convient aux fièvres intermittentes, qu'il est vermifuge, contre la cardialgie, la colique, la gonorrhée. Malgré ces excellentes propriétés, bien des observateurs le disent suspect; ce qu'il y a de certain, c'est qu'il fait vomir, qu'il purge, excite la sueur pris à petites doses. Il efface les taches de la peau.

On le trouve classé parmi les médicaments simples & officinaux de la pharmacopée de Paris.

(M. WILLET.)

BOIS DE FER. (*Pharmacie.*) *Syderoxylon infernale*. Ce bois est ainsi nommé, parce qu'il a la dureté du fer. On l'emploie aux ouvrages de menuiserie. Il est susceptible d'un très-beau poli. Les Indiens en font divers outils & instrumens; les sauvages de l'Amérique en faisaient leurs flèches. L'arbre qui fournit ce bois se trouve au cap de Bonne-Espérance.

L'on fait usage de l'écorce de cet arbre dans les maladies où il faut exciter la transpiration.

(M. WILLET.)

BOIS DE FERNAMBOUC. Quoique le bois de fernambouc soit une espèce de bois de Brésil, auquel nous avons déjà consacré un petit article de pharmacie, nous croyons devoir en reparler ici à cause de l'usage chimique que Bergman en a fait & recommandé pour l'analyse des eaux. Dans la seconde dissertation du premier volume de ses opuscules, ce célèbre chimiste dit, lettre (B.): La teinture aqueuse de fernambouc est rouge, mais les alcalis la font aisément passer au bleu. On colore du papier avec cette teinture en la faisant cuire avec un peu d'amidon blanc; & comme les réactions se marquent aussi bien sur le papier, on peut se passer de la teinture, qui exige un appareil plus embarrassant. Un grain de carbonate de soude récemment cristallisé, dissous dans 4195 grains d'eau, peut donner à ce papier une couleur bleue, toible à la vérité, mais pourtant sensible: un œil exercé pourra même distinguer cet effet quand il n'y auroit que la moitié du sel indiqué dans l'eau. Les acides jaunissent le papier teint par le fernambouc & lui restituent sa couleur, quand elle a été altérée en bleu par les alcalis. On voit d'après cela que Bergman a conseillé ce réactif à cause de sa grande sensibilité; mais M. Morveau dans sa traduction de cette dissertation, remarque qu'il y a de véritables difficultés pour se procurer la teinture du bois dont parle le chimiste Suédois. Il y a lieu de croire, dit M. Morveau, que

le bois connu en France sous le nom de Fernambouc, n'est pas le même que celui dont parle ici Bergman, car on ne peut douter de son exactitude dans une observation de cette importance; & cependant je n'ai pu sûrement une teinture qui donnât les changemens de couleur qu'il annonce. Après l'avoir tenté inutilement avec tous les bois de Fernambouc que j'ai pu trouver ici (à Dijon) dans le commerce, je me suis adressé à M. Valmont-Bomare, qui a bien voulu m'en procurer du vrai, ou du moins de celui qui réunissoit les qualités par lesquelles on étoit convenu de distinguer cette espèce de bois de Brésil, & sur lequel conséquemment il ne pouvoit me rester aucun doute. Voici les résultats de mes essais.

La teinture de ce Fernambouc est d'un rouge tirant au jaune; le papier sur lequel on l'a fixée par le moyen d'un peu d'amidon, paroît en effet d'un rouge un peu plus décidé; mais soit que l'on verse de l'alcali dans la teinture, soit que l'on ajoute de la teinture dans de l'eau plus ou moins chargée d'alcali, ou qu'on y plonge le papier rouge, au lieu de prendre une couleur bleue (*caruleuse*) la teinture passe au rouge vineux, & le papier prend seulement une teinte pourpre ou violacée; lorsqu'ils ont été ainsi altérés, les acides leur restituent leur première couleur, & les jaunissent très-promptement si on emploie la dose nécessaire pour reprendre l'alcali.

M. Delaval, dans ses recherches expérimentales sur la cause des changemens de couleur, (pag. 18. de la trad. française) assure aussi que l'infusion du bois de Brésil, ou du bois de Campêche, devient pourpre par l'addition de l'alcali: le jus de groseilles lui a présenté les mêmes changemens.

On voit d'après ces observations de M. Morveau, que le bois de Fernambouc proposé par Bergman, pour indiquer les alcalis, ne remplit pas en France le but annoncé par le chimiste Suédois. Mais nous avons tant de moyens même dans les matières colorantes, soit dans le tournesol rouge par les acides qui devient bleu par les alcalis, soit dans la teinture de raves & celle de fleurs de mauve qui deviennent d'un vert très-brillant, qu'on peut bien se passer du réactif colorant indiqué par Bergman.

BOIS SAIN. (*Pharmacie.*) Voyez GAROU.

BOIS SAINT. (*Pharmacie.*) Voyez GAIAC.

BOIS SUDORIFIQUES. (*Pharmacie.*) On a coutume de comprendre sous cette dénomination dans les pharmacies, le gayac, le sassafras, la squine & la falsaparille, quoique de ces quatre substances, il n'y ait que le gayac qui soit un véritable bois; les trois autres font des racines. Voyez

les articles, GAYAC, SALSEPAREILLE, SASSAFRAS, SQUINE.

BOIS DE RHODES. (*Pharmacie.*) *Genita canariensis. Cistus canariensis sempervirens & incanus comm. hort.* 2, 103. Le sentiment des botanistes est partagé sur le végétal dont on retire ce bois aromatique; les Antilles en fournissent beaucoup, ainsi que le Levant, les îles Canaries, la Martinique; les ébénistes & les parfumeurs en font usage.

Il est diurétique, cordial, céphalique & sudorifique, la pharmacopée de Paris indique une huile essentielle de bois de Rhodes & une eau distillée, qui a la même odeur que l'eau rose: ce bois entre dans les parfums, la poudre sternutatoire, le baume apoplectique, l'eau générale, la confection alkerma, la pommade blanche & l'essence royale.

(M. WILLEMET)

BOIS DES MOULQUES ou PAVANA. (*Pharmacie.*) *Croton tiglium. Pinus indica, nucleo purgante.* C. B. 492. C'est un arbrisseau médiocre des Indes orientales.

Le bois est purgatif, sudorifique, alexipharmaque, contre les vers; on le recommande comme un spécifique dans l'hydropisie, la leucophlegma, & dans plusieurs maladies chroniques. Il faut choisir le pavane léger, spongieux, pâle, revêtu d'une écorce grise, d'une saveur mordicante & caustique, d'une odeur ingrate.

(M. WILLEMET.)

BOIS D'INDE. (*Pharmacie.*) On ne fait pas exactement d'où provient le bois d'Inde; les uns le confondent avec le Fernambouc & le bois de Campêche; d'autres veulent que ce soit un bois réellement différent: il en est qui prétendent que c'est le bois de l'arbre qui donne la feuille d'Inde ou le *malabarium*. Au reste cette incertitude est peu importante pour la pharmacie, dans laquelle on n'emploie presque plus nul part le bois d'Inde. On assure qu'il est astringent & stomachique. Il n'entre aujourd'hui dans aucune préparation pharmaceutique.

BOIS GENTIL ou JOLI BOIS. (*Pharmacie.*) *Daphne mezereum, mezereum Germanicum.* Lob. *hist.* 159. C'est un charmant arbrisseau indigène de l'Europe, dont les fleurs précoces, annoncent les beaux jours & la fin de la mauvaise saison des frimats.

Toutes les parties du bois gentil, prises intérieurement, bouleversent tout à fait l'estomac; excitent le vomissement, évacuent avec impétuosité par haut & par bas les humeurs séreuses, sur-tout celles qui sont fluides: elles attaquent, corrodent & enflamment les parties intérieures; elles raclent les viscères, elles ouvrent les orifices des vaisseaux sanguins; elles allument les fièvres, elles excitent des cardialgies & des superpurga-

tions; elles ôtent toutes les forces. Malgré ces qualités malfaisantes & délétères, qui nous ont été transmises par les anciens, & qu'il ne faut pas toujours croire à la lettre, quelques uns prescrivirent le mézérion aux hydropiques, pour évacuer les humeurs séreuses; la dose de l'écorce & des feuilles est depuis six grains jusqu'à demi-scrupule; la saveur de ses baies ne parait pas désagréable, mais au bout d'une heure on ressent à la gorge une chaleur brûlante & douloureuse qui dure pendant douze heures. Les Lapons avalent deux ou trois de ces baies pour faire crêver la vomique de l'œsophage, & cela leur a assez bien réussi jusqu'ici. Six ou huit semences purgent avec violence, mais avec moins de danger lorsqu'on les prend entières, qu'écrasées, car alors leur acreté est si grande, qu'elles sont capables d'enflammer l'estomac. Il ne faut donc pas moins que des tempérans de fer, tels que ceux des Finlandais, pour pouvoir supporter comme eux la dose de deux grains de cette semence pour la toux, & jusqu'à vingt-sept pour les fièvres intermittentes. Ils poussent même l'abus qu'ils en font, jusqu'à donner cette baie dans l'atrophie. Les vieilles femmes Russes s'avient d'un étrange expédient pour se donner un air de jeunesse, c'est de se frotter les joues avec les baies de mézérion, afin de les faire enfler & rougir. On recommande de se servir de sa racine comme d'un stérion qu'on fait passer par les oreilles, pour guérir les maladies des yeux. On est venu à bout, au rapport du Baron de Haller, d'un ulcère cancéreux à la joue, en employant la décoction aqueuse de cette racine: la formule suivante qui se trouve dans le nouveau dispensaire de Lewis, est souvent employée avec succès en Angleterre, contre les excoeloses.

Décoction de racine de mézérion.

» Prenez de racine de mézérion concassée ou réduite en poudre grossière, trois onces. »

» D'eau commune, six livres. »

» Mélez, faites bouillir à petit feu, & réduisez aux deux tiers: ajoutez sur la fin demi-once de réglisse effilée; puis passez. La colature se prend à la dose de quatre onces, trois fois le jour. »

Cette décoction est vantée comme un remède efficace pour détruire les nodus végétariens; & on assure qu'elle a réussi dans des cas où les mercuriaux administrés avec soin tant à l'intérieur qu'à l'extérieur n'avoient point eu de succès.

Nous n'avons pas manqué d'enrichir notre matière médicale indigène de ce médicament; il seroit à désirer que l'on s'occupât à faire de nouvelles expériences avec le mézérion, & nous ne doutons pas qu'il seroit possible de rencontrer dans ce végétal de notre hémisphère, un médicament héroïque, que les drogues exotiques ne nous offriroient pas.

Pallas rapporte dans sa flore Russe, que les habitants du Nord se guérissent de maux de dents,

en mettant un petit morceau de racine de bois gentil sur la dent malade, ce qui excite la salive. L'écorce de la racine, selon Alexandre Ruffel, est spécifique contre les *nodus* vénériens & les douleurs ostéocopes nocturnes. Il rapporte seize observations de cures opérées par l'usage d'une tisane dont cette écorce fait la base : l'écorce du mézérion sert avec avantage aux cautères & aux exutoires, comme celle du garou ou saint-bois, qui est aussi du même genre. Nous avons fait faire une pommade avec cette écorce récente, qui faisoit l'effet d'un épispasme doux. Elle est propre à l'extérieur contre la galle, les ulcères, les dartres, les loupes & les carcinomes. Cette écorce est officinale en Suède.

La graine fait moultir les renards, & les loupes; elle entre, ainsi que les feuilles, dans l'onguent de *Arbanite*.

Les chèvres & les brebis se nourrissent des feuilles.

Gleditsch dit que les abeilles retirent beaucoup de miel des fleurs de cet arbrisseau.

Le mézérion fournit une teinture rouge.

(M. WILLEMET.)

BOIS IMMORTELU DE CORAIL. (*Pharmacie.*) *Erythrinum Corallodendron*. Arbre épineux de la Guyane, dont l'emploi est de longue durée. Il est commun aux Antilles. Toutes ses parties sont, dit-on, stomachiques.

(M. WILLEMET.)

BOIS NÉPHRÉTIQUE. (*Pharmacie.*) *Guilandina moringa*. *Moringa oleifera*. Lamarck Encyclop. 1. p. 398. Cet arbre croît dans les lieux sablonneux du Malabar, de Ceylan, & autres régions des Indes orientales.

Son bois pris en infusion, excite le cours des urines, agit contre les graviers, le scorbut, les obstructions, la colique néphrétique, les exanthèmes, les vers, l'hydropisie acide. Il est apéritif, fébrifuge, laxatif, lithontriptique.

Le suc de cet arbre est regardé des Indiens comme un bon antispasmodique. Le bois néphrétique entre dans le dénombrement des médicaments simples de la pharmacopée de Paris.

(M. WILLEMET.)

BOIS PUANT. (*Pharmacie.*) *Anagyris foetida*. *Anagyris*. *Clus. Hist.* 193. C'est un joli arbrisseau qui croît naturellement en Espagne, dans l'Italie, la Sicile & autres contrées méridionales. On lui attribue une puissance emménagogue, anthelmintique.

Les feuilles passent pour résolutives, capables de provoquer & de faciliter l'accouchement.

Ses semences sont éminemment émetiques.

(M. WILLEMET.)

BOISSONS. (*Pharmacie.*) Le mot *boissons* est

un de ces termes généraux & vagues, qui désignent en pharmacie l'ensemble de toutes les préparations liquides qu'on y prépare pour l'usage des malades. Les rinfases, les apozèmes, les decoctions, les infusions quelconques, les bouillons, les dissolutions salines, les eaux minérales artificielles, les potions purgatives, antispasmodiques, cordiales, calmantes, les juleps, les mixtures, les sucs d'herbes, &c. sont autant de boissons de différents genres qui exigent chacune des soins & des préceptes particuliers dans leur préparation. On ne doit exposer ces préceptes & les méthodes qui les renferment, que dans chaque article qui les concerne.

Tout ce qu'on peut dire sur ces boissons en général, c'est qu'elles sont de deux sortes, ou *étendues* ou *concentrées*; qu'il faut les préparer avec assez de soins, pour que leur saveur, leur couleur, leur odeur, leur consistance ne répugnent pas aux malades, ou au moins leur répugnent le moins possible. Il faut que le pharmacien diminue autant qu'il est en lui, par la propriété, la forme des vases, les désagréments qui accompagnent en général l'usage de ces médicaments. Au reste il se pose question de toutes ces attentions commandées par l'état même des malades, aux articles indiqués ci-dessus. On se contentera de faire remarquer ici qu'il dépend souvent du pharmacien de diminuer ces désagréments, en prenant garde à la quantité du liquide, qu'on laisse souvent à son choix. Je n'insisterai ici que sur cette principale précaution, parce que j'ai été bien des fois témoin de ce défaut dans la préparation des médicaments en boissons. Voyez les mots *APOZÈMES*, *TISANE*, *POTIONS*, &c.

BOL, BOLAIRE. Les mots *bol* & *terre bolaire* ont servi depuis long-temps, & servent encore en minéralogie, pour désigner des espèces d'argiles fines, plus ou moins chargées d'oxide de fer. L'état d'oxidation de ce dernier fait varier la couleur & la nuance des bols; il y en a de rose, de rouge pâle, de rouge pourpre & de brun. Ils deviennent tous plus ou moins rouges par un feu. Voyez les mots *ARGILE*, *FER* & *OCRE*.

BOL D'ARMÉNIE. (*Pharmacie.*) Parmi les diverses espèces de terres bolaires, on a préféré depuis long-temps le bol d'Arménie pour les usages pharmaceutiques. L'innéus le nomme *argilla rosula*, & il en fait la troisième variété sous le nom de *rubra*. C'est une terre argileuse, d'une couleur rouge pâle, douce & onctueuse sous le doigt. Quoiqu'on la nomme *bol d'Arménie*, l'usage observe qu'on connoît sous ce nom beaucoup de terres différentes, & on l'apporte d'un grand nombre d'endroits divers. On attribuoit autrefois de grandes propriétés au bol d'Arménie. Voyez le dictionnaire de médecine. C'est pour cela qu'on le faisoit entrer dans un grand nombre de compo-

sions pharmaceutiques, & entr'autres dans le disacordium, la thériaque, la confection hyacinthe; le poudre antidyfentérique, les trochisques d'alkekengé, la pierre médicamenteuse, &c. On devroit supprimer cette terre de tous les médicamens internes, où elle ne peut que nuire.

BOLS. (*Pharm.*) On donne en pharmacie le nom de *bols* à des préparations composées molles, que l'on moule en spiréroides allongées ou en cylindriques, & qu'on prescrit pour quelques doses. On fait entrer dans ces préparations des électuaires, des extraits, des poudres. La plupart des auteurs de pharmacie les confondent avec les électuaires ou les opiates, parce que la manière de les préparer est la même. Les bols sont faits en général par le mélange exact des poudres végétales, des extraits, des sirops, des sels, &c. Tout ce qu'on doit recommander pour leur préparation, consiste à bien mélanger dans un mortier ou avec la mollette les substances qui les composent, à ne pas y faire entrer des matières déliquescentes, & à les envelopper de poudre, pour qu'ils ne se collent point les uns aux autres.

BOLCHON. (*Pharmacie.*) Expression employée par quelques auteurs pharmacographes, pour désigner le *bœdium*.

BOLET ou AGARIC ODORANT. (*Pharm.*) *Boletus foetidus* *Fungus sativus*. Trill. Ph. 168.

L'agaric odorant est une plante parasite qui croît sur les arbres ou sur le bois mort, sans aucun pédicelle, & dont la substance fongueuse est plus dure que dans les autres champignons; il est garni de pores ou tuyaux.

Cette espèce est aisée à reconnaître; 1°. à sa couleur blanche en dessus & en dessous, teinte quelquefois de roussâtre ou de jaunâtre; 2°. à l'agréable odor qu'elle répand, & qu'elle conserve souvent pendant plusieurs jours; 3°. au lieu qu'elle habite, qui est toujours sur des tiges.

Sterbeck est le premier botaniste qui ait parlé de l'agaric odorant d'une manière à le faire connaître. Après lui, peu d'amateurs s'en sont spécialement occupés, jusqu'à ce que Linnéus l'eut remarqué en Laponie. Il vit les jeunes gens le rechercher avec soin, & le garder dans une poche, où ils portaient devant le pubis. C'est ainsi qu'ils le parquent, lorsqu'ils vont faire leur cour à leurs maîtresses. « 19 plaisants Vénus! s'écrie Linnéus, toi à qui suffisent à peine dans les contrées étrangères les perles & les diamans, la pourpre & la soie, la danse, la musique, les spectacles, ici tu es satisfaite d'un simple fungus sans suc & sans couleur! »

Malgré ces particularités, l'agaric odorant a été négligé par nos botanistes modernes. M. Enslin, médecin Allemand, a publié en 1785 une dissertation, uniquement à son occasion. Il dit que

les François n'en font: aucune mention dans leurs catalogues généraux. On le trouve, malgré cette assertion, dans plusieurs de nos flores nouvelles. Quant à nous, nous l'avons rencontré en abondance dans diverses faulx de la Lorraine & en Alsace.

Les médecins paroissent l'avoir connu avant les botanistes: du moins on en faisoit déjà usage dès l'an 1676, contre la phthisie pulmonaire & la consommation Boecler en a parlé dans sa matière médicale; il est cité dans la pharmacopée de Wirtemberg, & dans le dispensaire universel de Triller. Il est connu depuis long-temps à Erlangen. L'illustre Schmedel s'en est servi utilement pendant plus de trente ans, & M. le professeur Wende l'ordonne souvent.

Comme ce végétal indigène peut être d'une grande ressource chez le pauvre comme chez le riche, on doit savoir gré à M. Enslin d'en avoir fait connaître plus particulièrement les propriétés médicinales, & la manière de l'employer.

Il donne l'histoire de plusieurs phthises pulmonaires guéries par le bolet odorant, dont on se sert aussi quelquefois avec succès contre d'autres maladies, particulièrement contre celles du genre nerveux, où les auteurs recommandent le guy de chêne: la manière de faire prendre l'agaric odorant, est en poudre mêlée avec du sucre, ou réduit en électuaire avec le miel ou quelque sirop. La dose en est depuis un scrupule jusqu'à un gros, & on la répète plusieurs fois dans le jour. On l'augmente, selon que la maladie est plus ou moins avancée, plus ou moins dangereuse. Il est bon d'avertir les pharmaciens que, vu sa ténacité, ce fungus est difficile à réduire en poudre. Il faut donc, avant de commencer la pulvérisation, l'imprégner de mucilage de gomme arabique ou adhésive, ensuite le faire sécher à une douce chaleur, ou bien l'humecter de temps-en-temps, pendant la trituration, avec de l'esprit-de-vin très-rectifié, qui s'évaporant bientôt, ne peut altérer les vertus. Quant à la décoction de ce bolet qu'on met quelquefois en usage, M. Enslin ne l'estime pas beaucoup, la grande ténacité du végétal empêchant son efficacité de le communiquer à l'eau. Il pense de même de son eau distillée.

On met de l'agaric odorant dans les habits, pour en éloigner les insectes.

(M. WILLEMET.)

BOMBIATES. Les bombiates sont dans la nomenclature moderne, des sels neutres formés par l'acide bombique uni aux différens bases terreuses, alcalines & métalliques. M. Chausser, médecin de Dijon, est le premier chimiste qui ait reconnu & distingué l'acide contenu dans la chrysalide du ver à soie. Il nous a appris à l'obtenir pur, par le mélange de la liqueur tirée de cet insecte avec l'alcool, ou par la simple infusion des chrysalides dans l'alcool, & par la distillation de

cette infusion ; mais il n'a rien dit des combinaisons de cet acide avec les bases. Ainsi les bombiates offrent un objet de recherches entièrement nouvelles pour les chimistes.

BOMBIATE D'ALUMINE.

BOMBIATE D'AMMONIAQUE.

BOMBIATE D'ANTIMOINE.

BOMBIATE D'ARGENT.

BOMBIATE D'ARSENIC.

BOMBIATE DE BARYTE.

BOMBIATE DE BISMUTH.

BOMBIATE DE CHAUX.

BOMBIATE DE COBALT.

BOMBIATE DE CUIVRE.

BOMBIATE D'ÉTAIN.

BOMBIATE DE FER.

BOMBIATE DE MAGNÈSE.

BOMBIATE DE MANGANÈSE.

BOMBIATE DE MERCURE.

BOMBIATE DE MOLYBDÈNE.

BOMBIATE DE NICKEL.

BOMBIATE D'OR.

BOMBIATE DE PLATINE.

BOMBIATE DE PLOMB.

BOMBIATE DE POTASSE.

BOMBIATE DE SOUDE.

BOMBIATE DE TUNGSTÈNE.

BOMBIATE DE ZINC.

Aucun de ces bombiates n'ayant encore été examiné, nous n'avons absolument rien à dire sur leurs propriétés.

BOMBIQUE. Nom actuel de l'acide qu'on tire de la chrysalide du ver à soie.

BOMBYCIN. C'est le nom que M. Moreau avoit d'abord donné à l'acide bombyque avant l'adoption de la nouvelle nomenclature. C'est sous ce nom qu'il est décrit pag. 410 du premier vol. de ce dictionnaire.

BONDUC A GOUSSÉS LISSES. (*Pharmacie.*) *Guilandina nuga, Nuga silvarum.* Rumph. Amb. 5. p. 94. C'est un arbrisseau plus petit que le fuivant, qui croît à Amboine, dans les lieux pierreux vers le bord de la mer ; on emploie la décoction de sa racine comme diurétique & contre le calcul.

(M. WILLEMET.)

BONDUC RAMPANT. (*Pharmacie.*) *Guilandina bonducella. Bonduc vulgare minus polyphyllum.* L'Hum. gen. 25. C'est un arbrisseau rampant, épineux, qui croît dans les Indes & à l'île de l'ance. Les habitants du Malabar s'en servent comme d'un spécifique pour les hernies. Ses baies dissipent les vents, soulagent dans la colique, forment l'estomach, provoquent les règles & chassent la pierre. Les nègres font avec le fruit des bonducs une espèce d'émulsion qu'ils emploient pour guérir les gonorrhées. Ils font encore avec le bois de ces arbrisseaux une tisane contre la même maladie.

(M. WILLEMET.)

BON-HENRI ou EPINARD SAUVAGE. (*Pharmacie.*) *Chenopodium bonus Henricus. Lepanthum unguiculatum.* C. B. 115. Cette plante commune en Europe dans les lieux incultes, sur le bord des chemins, conservera plus longtemps la mémoire d'Henry IV, que la statue de bronze placée sur le pont-neuf de Paris. Elle se trouve en Virginie, mais rarement. Elle est vivace, vulnérante, émolliente, hydragogue, résolutive, détergative, vernicifuge, laxative, attractive, aphrodisiaque, anodine, alexitère, antiphtisique, contre la pleurésie, les parais, &c.

Linck assure que cette plante récemment appliquée sur les parties adématisées, guérit totalement ces enflures ; il dit avoir appris avec étonnement d'un bouvier ses propriétés. Il ajoute que la poudre de bon-henry mêlée avec une espèce de pomade, guérit la galle sous les yeux.

Ses feuilles contuses & réduites en liniment avec du beurre frais, apaisent les douleurs des hémorroïdes. Le cataplasme de toute la plante, soulage dans la goutte. En Angleterre c'est une des cinq plantes émollientes.

Dans plusieurs pays, l'on mange les jeunes riges en manière d'asperges, & ses feuilles en guise d'épinards. C'est aussi une bonne nourriture pour les chèvres & les brebis.

Jean-I. Hippolyte Eysel, professeur de médecine en l'université d'Étort, a fait une dissertation sur le bon-henry. Il fait partie de la nomenclature des médicaments

médicaments simples du codex de Paris & de la matière médicale Américaine.

(M. WILLEMET.)

BONNE-DAME. (*Pharmacie.*) Voyez AR-
RÔCHE BLANCHE.

BONNET DE PRÊTRE. (*Pharmacie.*) On

nomme bonnet de prêtre le fusain, à cause de la forme de son fruit. (Voyez FUSAIN.)

BORATE. On nomme borate dans la nomenclature méthodique de la chimie, le genre de sels formés par la combinaison de l'acide boracique avec les diverses bases terreuses, alcalines & métalliques. On a généralement très-peu examiné ces combinaisons salines ; on verra par les articles suivans, qu'il n'y a que le borate avec excès de soude qui ait occupé jusqu'ici les chimistes ; puisqu'il est des sortes de ce sel ne sont point encore connues, il seroit difficile de pouvoir faire une histoire exacte du genre qui les comprend, ou des borates en général. Cependant si l'on se rappelle les propriétés distinctives de l'acide boracique, on y trouvera de quoi fixer les caractères généraux des borates, ou du genre de sels composés qu'il forme ; car on doit toujours se souvenir que les caractères chimiques des genres de sels composés ne peuvent être puisés que dans les propriétés de leurs acides, tandis que les caractères spécifiques de chaque sorte ne doivent être fournis que par la base ; ainsi la faiblesse de l'acide boracique, son peu d'attraction pour toutes les substances possibles, la fixité & la vitrescibilité de cet acide, suffisent pour faire concevoir que les borates doivent être en général susceptibles d'être décomposés par presque tous les autres acides, que ceux-ci doivent séparer de leur dissolution l'acide boracique sous la forme de sels exaédres, que traités au feu ils doivent être fixes & infusibles de se vitrifier, soit dans leurs deux composans, lorsque la base qui sature l'acide boracique est fixe comme lui, soit dans son acide seul, lorsque la base qui lui étoit unie étant volatile, a été d'abord séparée par la chaleur. Ajoutons à ces considérations générales, qu'on peut regarder comme renfermant les vrais caractères du genre des borates, que l'acide boracique est si faible, qu'il n'agit ni sur les terres sèches & cohérentes, ni sur les métaux ; qu'il n'a pas dans sa tendance pour s'unir à leurs oxides, la force de rendre l'eau décomposable par les corps combustibles.

Il est un genre de recherches qui tiennent immédiatement à la nature de cet acide, & qui pourroient éclaircir sur ses combinaisons avec les terres & les oxides métalliques ; ce sont celles qui tiennent à sa fixité & à sa vitrescibilité. Les combinaisons qu'on ne peut pas faire avec l'acide boracique dissous & les bases terreuses ou métalliques,

Chimie, Tome II.

pourroient être tentées par la fusion & ce genre d'expériences dont les chimistes ne se sont point encore occupés, pourra conduire à trouver ce qui manque à la science ; en attendant qu'elles soient suivies, nous n'aurons presque rien à dire sur toutes les diverses sortes de borates ; & les articles qui leur sont destinés dans ce dictionnaire, contiendront plutôt des avis aux chimistes de s'occuper, que des détails sur leurs propriétés.

Voici comment Bergman s'explique sur les borates métalliques. L'acide du borax attaque difficilement les métaux ; le moyen le plus facile pour y parvenir, est celui des affinités doubles ; mais pour éviter toute erreur, il faut que le borax soit saturé de sel sédant ; il prend un peu plus que son poids égal de ce dernier sel, avant qu'il cesse entièrement de réagir par sa base alcaline surabondante. J'ai versé goutte à goutte de la dissolution de borax ainsi saturé, dans les dissolutions métalliques privées, autant que j'ai pu de leur excès d'acide. L'or, le platine, l'argent, le bismuth & le manganèse dissous dans les menstrues qui leur conviennent, n'ont souffert aucun changement ; au lieu que les dissolutions de mercure, de plomb, de cuivre, de fer, d'étain, de nickel, de cobalt & de zinc, se sont troublées aussitôt, & ont donné des sels métalliques presque insolubles.

Quant aux attractions électives de l'acide boracique pour les bases, qui doivent influencer sur l'histoire & les propriétés comparées des diverses espèces de borates, Bergman les indique dans l'ordre suivant : La chaux, la baryte, la magnésie, la potasse, la soude, l'ammoniaque, l'alumine, les oxides de zinc, de fer, de manganèse, de cobalt, de nickel, de plomb, d'étain, de cuivre, de bismuth, d'antimoine, d'arsenic, de mercure, d'argent, d'or, & de platine.

BORATE D'ANTIMOINE. Le sel que doit former l'acide boracique avec l'oxide d'antimoine, n'a point encore été examiné par les chimistes. Il paroît que l'acide boracique n'a aucune action à chaud comme à froid sur l'antimoine, & que cet acide est cependant susceptible de se combiner avec l'oxide de ce métal. On en juge par la propriété qu'a le borate de soude de précipiter plusieurs dissolutions d'antimoine. Mais ces expériences même n'ont point été suivies avec assez de soin pour qu'on puisse rien dire sur le borate d'antimoine. Cette combinaison saline est donc trop peu connue pour avoir été employée jusqu'ici à aucun usage.

BORATE D'ALUMINE. L'alumine sèche ne s'unit que très-difficilement à l'acide boracique, qui n'a d'action sur cette terre qu'à l'aide de la chaleur, cependant il la dissout quand elle vient d'être précipitée & qu'elle est suspendue dans une grande masse d'eau. On n'a point encore examiné la com-

Kkkk

binaison de l'acide boracique avec l'alumine, que nous nommons borate d'alumine ou borate aluminieux.

On sait que si l'on verse une dissolution de borate sur saturé de soude ou de borax du commerce dans une dissolution de sulfate acide d'alumine, il se forme un précipité léger & floconneux. L'acide sulfurique; quitte l'alumine pour s'unir à la soude, cette terre se combine avec l'acide boracique, qui se sépare en même temps; & ce nouveau sel formant d'abord un précipité, se redissout peu-à-peu.

Cette liqueur est susceptible ensuite d'être précipitée par l'alcali fixe; elle donne par l'évaporation une masse visqueuse & astringente, dans laquelle le sulfate de soude & le borate d'alumine sont confondus. Cette espèce de borate est décomposée par les mêmes intermédiaires alcalins & terreux que l'alun; au reste, on n'en a point examiné avec assez de soin les propriétés. Il n'est d'ailleurs d'aucun usage.

BORATE D'AMMONIAQUE. Le borate d'ammoniaque, ou borate ammoniacal, formé par la combinaison saturée de l'acide boracique avec l'ammoniaque, n'a encore été examiné par aucun chimiste. Voici ce que j'ai observé sur quelques-unes de ses propriétés.

J'ai dissous de l'acide boracique bien pur dans de l'ammoniaque ou alcali volatil caustique, jusqu'à ce que la saturation m'ait paru complète; j'ai étendu cette dissolution dans un peu d'eau, & j'ai fait évaporer au bain de sable environ la moitié de la liqueur; elle a fourni par le refroidissement une couche de cristaux réunis, dont la surface offroit des pyramides très-peu. Ce sel a une saveur piquante & urineuse; il verdit le sirop de violette, il perd peu-à-peu sa forme cristalline, il devient d'une couleur brune par le contact de l'air; il paroît être dissoluble dans l'eau; la chaux en dégage l'ammoniaque.

Telles sont les principales propriétés, que je lui ai reconnues par un premier examen; mais je n'ai point tenté assez d'expériences pour en connoître plus à fond la nature.

Le borate ammoniacal n'est absolument d'aucun usage. Il paroît être décomposable par la chaleur qui en dégage l'ammoniaque & qui fond l'acide boracique.

BORATE D'ARGENT. Sel presque entièrement inconnu. L'acide boracique n'a aucune action sur l'argent, mais il paroît s'unir à son oxide; il est vrai qu'en versant une dissolution de borate de soude dans une dissolution nitrique d'argent, il ne se forme point de précipité, suivant l'observation de Bergman. On sait encore que l'acide boracique sec fondu sur l'argent à la chaleur du chalumeau ne l'attaque point & sert à en souder les surfaces, comme le borax lui-même; mais on n'a pas exami-

né quelle seroit l'action de cet acide sur le métal à une haute température.

BORATE D'ARSENIC. Cette est combinaison absolument inconnue.

BORATE DE BARYTE. On ne connoît point d'autre cette combinaison de l'acide boracique avec la baryte.

Bergman assure que l'acide du borax est un de ceux qui a le moins d'affinité avec cette substance salino-terreuse, & il le place dans sa table au-dessous de la plupart des acides végétaux & animaux. Il est vraisemblable cependant qu'en raison de l'attraction que cette terre a en général pour tous les acides, elle s'unir à l'acide boracique, y adhère aussi fortement que les autres bases, & forme avec lui un sel cristallisable. Le borate de baryte n'est absolument d'aucun usage; on ne le prépare même point encore dans les laboratoires de chimie.

BORATE DE BISMUTH. Sel entièrement inconnu; Bergman observe que les dissolutions de bismuth ne sont pas précipitées par celle du borate de soude.

BORATE DE CHAUX OU CALCAIRE. On a peu examiné la combinaison artificielle de l'acide boracique avec la chaux; il est cependant certain que l'acide boracique est susceptible de s'unir à la chaux, puisque cette dernière décompose le borate sur saturé de soude, & y forme un précipité abondant qui est manifestement du borate de chaux. MM. les chimistes de Dijon ont observé que l'acide boracique concret traité au feu avec la chaux éteinte, a donné une matière faiblement agglutinée & sans adhérence au creuset. Cette matière jetée dans l'eau n'a pas présentés les phénomènes de la chaux, ce qui prouve qu'il y avoit une véritable combinaison. M. Haumé dit avoir saturé de l'eau de chaux avec du sel *fedorif*; cette liqueur évaporée à l'air, ne lui a point donné de cristaux, mais des pellicules jaunâtres qui avoient une faible saveur d'acide boracique. Enfin, MM. les académiciens de Dijon ont fait digérer au bain de sable de l'eau chargée de cet acide sur de la chaux éteinte à l'air. Cette dissolution filtrée a donné un précipité blanc & abondant par l'alcali fixe. Les diverses expériences ne font qu'indiquer la dissolubilité de la chaux par l'acide boracique, & l'ordre d'attraction de cet acide pour cette terre; mais elles ne nous apprennent rien sur les propriétés du sel neutre qui résulte de cette combinaison.

On verra à l'article **BORATE MAGNÉSIO-CALCAIRE**, qu'il existe dans la nature une combinaison d'acide boracique & de chaux.

BORATE DE COLBAT. Sel presque entièrement inconnu. L'acide boracique paroît n'avoir aucune

action sur le cobalt ; en versant dans une dissolution de cobalt par les acides sulfurique ou nitrique une dissolution de borate sur saturé de soude ou de borax du commerce, on obtient un précipité gris-foncé, formé en partie par l'acide boracique uni à l'oxide de cobalt, on n'a point examiné les propriétés de ce précipité qui est en grande partie composé d'oxide de cobalt, en raison de l'excès de soude qui se trouve dans le borax ordinaire avec lequel on a fait cette expérience.

BORATE DE CUIVRE. L'acide boracique n'ayant pas d'action directe sur le cuivre, même à l'aide de l'eau, on ne peut pas faire par un moyen direct le borate de cuivre. Cependant en laissant pendant quelque temps une dissolution d'acide boracique en contact avec de la limaille de cuivre, on voit ce métal se rouiller, se couvrir d'un oxide vert blanchâtre, qui pourroit bien être en partie du borate de cuivre ; mais cette expérience n'a point été faite avec assez de soin, pour que nous regardions cette conclusion comme exacte. On obtient une espèce de borate de cuivre, en précipitant une dissolution de ce métal dans les acides nitrique ou acéteux par un borate alcalin saturé. Ce borate de cuivre formé dans ce cas, est d'une couleur verte pâle ; il paroît être peu soluble dans l'eau ; on n'en a point examiné les propriétés ; il n'est employé à aucun usage.

BORATE D'ÉTAÏN. On ne connoît point du tout la combinaison de l'étain avec l'acide boracique ; on fait seulement que cet acide n'a pas d'action sur le métal dont il s'agit ; on n'a point même essayé de précipiter les dissolutions d'étain par celle de borate sur saturé de soude, ou celle de borax ordinaire qu'on emploie le plus ordinairement dans les laboratoires de chimie.

BORATE DE FER. Il semble que le borate de fer doive être un des plus faciles à préparer & à obtenir parmi les borates métalliques, en raison de la prompte & facile oxidation du fer, & de sa grande tendance pour s'unir aux acides. Cependant on n'a encore rien dit de la combinaison du fer avec l'acide boracique, & on ne connoît aucune propriété du borate de fer. En versant une dissolution de borax ordinaire, ou borate avec excès de soude, dans une dissolution de sulfate de fer, on obtient un précipité jaunâtre, qui paroît être du borate de fer. Il semble aussi qu'on puisse combiner l'oxide de fer avec l'acide boracique par la fusion, puisque l'une & l'autre de ces substances sont fusibles & fixes. Peut-être même cette combinaison existe-t-elle, ainsi que celle du même acide avec l'étain, dans les produits de l'art de l'émailleur, puisque l'on emploie souvent dans cet art les oxides d'étain & de fer avec le borax. Mais tous ces faits n'ont point encore été conve-

nablement examinés ; aussi on se doute bien que le borate de fer n'est encore d'aucun usage.

BORATE DE MAGNÉSIE. On donne le nom de borate de magnésie, ou borate magnésien, à la combinaison de l'acide boracique avec la magnésie. Ce sel n'est presque pas connu. Bergman a observé que lorsqu'on jette de la magnésie dans une dissolution d'acide boracique, elle s'y dissout, mais lentement. La liqueur évaporée donne des cristaux grenus sans forme régulière.

Ce sel se fond au feu sans se décomposer. Les acides le décomposent en s'emparant de la magnésie, & en séparant l'acide boracique de la première combinaison. L'alcool lui enlève aussi cet acide, & laisse la magnésie à nud ; celle-ci n'adhère donc point fortement à l'acide du borax.

On ignore, comme l'on voit, presque toutes les propriétés de ce sel sur lequel les chimistes n'ont encore fait que très-peu d'expériences, & qui n'est d'aucun usage.

On verra dans l'article suivant que le borate de magnésie existe dans la nature.

BORATE DE MANGANÈSE. On ne connoît point du tout la combinaison de l'acide boracique avec le manganèse ; il paroît même qu'il y a peu d'attraction entre cet acide & l'oxide de manganèse, puisque Bergman dit, qu'une dissolution de borate de soude n'a point précipité celle de manganèse.

BORATE MAGNÉSIO-CALCAIRE. Les chimistes pensent depuis longtemps que tous les composés salins, tous les sels neutres qu'ils forment par art, existent dans la nature, & leurs idées à cet égard ont toujours devancé les découvertes faites sur les minéraux. Lorsqu'en 1778 je travaillois à la première édition de mes éléments de chimie, lorsqu'en me livrant à professer la chimie à la même époque, je m'appliquai à présenter aux étudiants un système méthodique des substances salines composées ou neutres plus complet & mieux ordonné qu'on ne l'avoit pu faire jusqu'à lors, j'ai dit publiquement dans mes cours, & imprimé dans plusieurs endroits de mes ouvrages, que tous les composés salins créés par les chimistes n'étoient vraisemblablement que des imitations de composés naturels, & qu'en continuant avec le même zèle qu'on manifestoit alors, l'analyse des morceaux de minéralogie, on trouveroit des sels dont on ignoroit alors la nature & l'existence dans la terre ou dans le règne minéral. Ce soupçon s'est changé depuis ce temps en certitude ; la minéralogie ayant été cultivée par les chimistes, on a bientôt découvert plusieurs sels que les minéralogistes avoient confondus avec différens sels, ou avec des pierres. Telle a été la découverte des phosphates de chaux, de plomb, de fer, des arseniates de plomb, de fer, de

Kkkk

runfantes des mêmes métaux, des carbonates de baryte & de magnésie: telle est aussi celle du borate de magnésie & de chaux qui est due à M. Weftrumb, & qu'on avoit confondu avec un quartz. Nous donnerons ici l'analyse de M. Weftrumb, des curieux de la nature de Berlin en 1788, tom. 9, page 1. & inférée dans le tom. 2. des annales de chimie.

Près de Lunebourg, dans le duché de Brunsvick, est une montagne stratifiée de sulfate de chaux qui porte le nom de *Kalkberg*. Au haut de la montagne, on voit une fente dans laquelle il y a des cristaux d'une forme singulière; ils se trouvent dans un sulfate de chaux tendre, rougeâtre, qui constitue la paroi de la fente: lorsqu'on arrache ce gypse, ils s'en détachent. Depuis long-temps on les connoissoit à Lunebourg, sous le nom de *Würfelftein* (pierres cubiques); mais on n'en faisoit aucun cas, & peut-être ne seroient-ils encore connus que dans cette ville, si M. Lalin n'avoit excité l'attention du public par cette curiosité d'histoire naturelle.

S P R E M I E R.

Caractères & extérieurs des cristaux.

La forme de ces cristaux paroît d'abord cubique; mais en les regardant avec soin, sur-tout ceux qui se font parfaitement conservés, on voit que ce sont des solides à 26 faces.

Leur couleur est communément blanche, souvent grise, & quelquefois tirant sur le violet d'améthyste.

Ils sont pour la plupart opaques; quelques-uns sont demi-transparens, d'autres, (c'est le plus petit nombre) le sont entièrement.

La plupart de ces cristaux sont inégaux & comme corrodés à la surface, & rarement on en trouve qui se soient parfaitement conservés. Plusieurs paroissent intimement pénétrés de la substance qui a corrodé leur surface, & alors le marteau les réduit aisément en une poudre grossière; lorsqu'on en examine les grains à la loupe, leur texture paroît plutôt en rayons qu'en lames. Cependant la cristallisation de cette pierre n'est rien moins qu'en rayons, elle est évidemment formée de lames. Je possède quelques cristaux dont les côtés sont un peu écornés: il est facile de reconnoître dans les sautes, la texture lamelleuse. Le noyau de ces cristaux a la même forme & les mêmes troncutures que ceux-ci.

Leur dureté est très-considérable; ils raient le verre & sont fortement feu au briquet.

Leur pesanteur spécifique égale celle du quartz & du feldspath. Je trouvais, par plusieurs expériences exactes, qu'elle étoit à celle de l'eau: 2,566 : 1,000. Enfin, plusieurs de leurs propriétés les rapprochent du quartz, & d'autres des feld-

spath. Ils ont en cela beaucoup d'analogie avec le spath adamantin, dont je n'ai pu jusqu'ici leur comparer qu'un très-petit morceau.

§ I I.

Manière dont ces cristaux se comportent avec l'eau, les acides & le feu.

Si l'on fait bouillir de l'eau sur ces cristaux entiers ou pulvérisés, ils n'éprouvent presque aucune altération, seulement l'eau dissout le sulfate de chaux qui est disséminé à leur surface, ou qui recouvre les endroits corrodés.

Lorsqu'on met ces cristaux entiers dans les acides, on n'aperçoit aucune effervescence; ils peuvent même y rester plusieurs jours sans que leur poids souffre la moindre diminution. A l'aide de la chaleur, les acides émoussent le tranchant de leurs crêtes.

Si on les expose au feu pendant plusieurs heures, en les entretenant toujours rouges foncés, leur poids s'altère, mais leur éclat est détruit; si on les fait rougir à blanc pendant long-temps, ils perdent $\frac{1}{2}$ pour 100. Il m'a paru qu'ils décrépitoient lorsqu'on commençoit à les chauffer, comme le feldspath cristallisé. Un feu très-violent paroît émousser légèrement les arêtes, sans diminuer leur dureté; ils se laissent ensuite diviser facilement; ils attaquent encore les corps les plus durs qu'on y emploie.

Si on leur fait subir dans un creuset le plus haut degré de feu imaginable, ils se réunissent d'abord, & se fondent enfin en un verre jaunâtre. Ces expériences prouvent que le *Würfelftein* ne contient ni sulfate de chaux, ni gaz, ni eau (1), & que ce n'est pas un quartz noble mais une pierre mélangée qui a beaucoup de rapport avec le feldspath cristallisé.

§ I I I.

Expériences qui me firent connoître quelques-unes des parties constituantes de ces cristaux.

La dureté considérable de cette pierre & ses autres propriétés, me firent présumer que je ne pourrais la décomposer par les acides seuls; j'en fis rougir fortement 100 grains, que je pulvérisai dans un mortier de porcelaine: cette quantité augmenta d'un demi-grain par cette opération. Je mêlai ces 100 grains $\frac{1}{2}$ avec 100 grains de carbonate de soude; je mis ce mélange dans un creuset & je le fis chauffer; à peine ce dernier étoit-il rouge, que le mélange commença à fondre. La poudre pierreuse tomba au feu, & ne se combina pas en entier avec l'alcali. Je décantai la masse fondue, je fis *parcuire* (of kochen) le creuset, & évaporer la matière liquide. Le résidu étoit jaunâtre, je l'arrosai d'acide muriatique, avec lequel il subit une

(1) Abstraction faite, sans doute, de l'eau de cristallisation.

forte digestion. Il me resta 55 grains d'une substance sablonneuse, qui, chauffée avec trois parties d'alcali, se fondit en un corps transparent, soluble dans l'eau. Je le regardais alors comme de la silice; mais on verra bientôt que je me trompais fort, & que c'étoit probablement un sel formé par la combinaison de l'acide boracique avec la chaux & la magnésie.

Le prussiate de potasse ferrugineux non saturé, précipita $\frac{1}{2}$ de grain d'oxide de fer de la dissolution muriatique; j'en précipitai ensuite la substance terreuse par la soude. J'édulcorai ce précipité, je le séchai, & je le fis dissoudre dans l'acide sulfurique. Je séparai de cette dissolution le sulfate de chaux qui s'y étoit formé, j'en précipitai l'alumine par la magnésie, & la magnésie par la soude; je décomposai les sulfates peu solubles de chaux & d'alumine par une lessive alcaline bouillante; je calcinai chacune des terres que j'avois obtenues, dans un creuset rouge, & pesé préalablement, enfin je trouvai dans 100 grains de cette pierre cubique.

D'une terre que je pris d'abord pour de la silice..... 55 grains

De chaux.....	2
De magnésie.....	$\frac{3}{2}$
D'alumine.....	2
D'oxide de fer.....	0 $\frac{1}{2}$

Somme.....	63
Déchet.....	37

Total..... 100

37 grains de perte étoit un déchet beaucoup trop considérable sur 100 grains; il falloit que j'eusse commis quelqu'inexactitude en opérant. Je cherchai à retrouver ce que j'avois perdu dans les creusets & dans les liquides qui me restèrent; mais je n'y trouvai rien, du moins je n'y trouvai pas ce que je cherchois, de l'acide sulfurique & une terre. (1)

§ I V.

Décomposition du quartz cubique par l'acide muriatique.

I. Le déchet considérable qu'avoit éprouvé la pierre cubique dans les expériences précédentes, m'engagea à tenter de la décomposer par d'autres moyens.

J'en fis rougir une nouvelle portion, je la pulvérisai, j'en mis 100 grains dans un petit matras, je les arrosai d'une once d'acide muriatique très-

concentré, & de quelques onces d'eau; enfin, je chauffai le matras, j'entretenis le mélange dans une ébullition continue, & à mesure que l'eau s'évaporait, j'en versois de nouvelle. La dissolution se fit peu-à-peu sans que je pusse m'en apercevoir. Comme après 12 & même 24 heures d'ébullition il restoit encore au fond beaucoup de poudre pesante, je continuai à faire bouillir pendant quatre jours, & cependant après un si long temps, tout n'étoit pas dissous; j'ajoutai encore 8 gros d'acide muriatique & quatre onces d'eau, & je fis bouillir le tout pendant 24 heures. Alors enfin tout fut dissous, à l'exception d'une petite quantité d'une substance blanche pulvérulente.

II. Cette opération donna lieu à un phénomène entièrement nouveau pour moi. Si-tôt que la dissolution approchoit d'un certain degré d'épaissement, il se formoit à la surface de beaux cristaux feuilletés, qui, peu-à-peu, la couvroient en entier &omboient en faisceaux au fond du vase avec une apparence huileuse; enfin tout se figeoit en une belle masse saline d'un blanc jaunâtre.

Ce sel ne pouvoit être de la zéolite, dont les dissolutions dans les acides ne cristallisent point, mais se coagulent. Je ne présumai pas non plus que ce pût être du muriate de magnésie. Ce n'étoit pas du muriate d'alumine qui donne par l'évaporation une matière gommeuse, ni du muriate de baryte qui cristallise en cubes (2), ni enfin du muriate de chaux qui se fige en une masse informe (3). C'étoit encore moins une combinaison de quelque terre simple avec un autre acide; enfin, il me parut que c'étoit un sel entièrement nouveau; mais je ne pus déterminer précisément alors ce que c'étoit.

III. Je fis dissoudre dans l'eau la masse saline, d'un blanc jaunâtre (II.); il me resta un grain d'une terre blanche que les acides ne purent dissoudre au plus haut degré d'ébullition. Elle ne perdit rien de son poids après avoir été rougie au feu, & s'unifia à la soude par la fusion; c'étoit donc de la silice.

IV. J'évaporai de nouveau la dissolution & lorsqu'elle fut presque réduite à siccité, je l'arrosai d'un mélange d'une partie d'alcool sur trois d'eau; je filtrai, & tout se trouva dissous, à l'exception d'un grain de sulfate de chaux.

V. Dans la dissolution qui avoit passé au filtre, je versai peu-à-peu huit grains $\frac{1}{2}$ de prussiate de potasse non saturé; je laissai le mélange reposer pendant quelques jours, je le filtrai, & je trouvai sur

(1) Ce déchet provenoit sans doute, comme on le verra dans la suite, de ce que l'acide boracique contenu dans cette pierre étoit volatil.

(2) Je n'ai jamais obtenu le muriate de baryte sous une forme cubique, comme l'avance ici M. Weftramb. Voyez l'article MURIATE DE BARYTE.

(3) Le muriate de chaux cristallise en beaux prismes à huit pans. Voyez l'article MURIATE DE CHAUX.

le filtre quatre grains $\frac{1}{2}$ de prussiate de fer. Ayant ensuite fortement chauffé ce sel dans un creuset préalablement rougi & pesé, j'obtins deux grains $\frac{1}{2}$ d'oxide de fer attirable à l'aimant; & comme huit grains $\frac{1}{2}$ de prussiate de potasse ferrugineux contiennent un grain $\frac{1}{2}$ de cet oxide, il en résulte que 100 grains de *Würflein* contiennent un grain d'oxide de fer entièrement sec & pur.

VI. Je fis évaporer ensemble dans une capsule de porcelaine, la dissolution & l'eau d'édulcoration du prussiate de fer pour épaissir ce mélange; j'y versai ensuite une goutte d'acide sulfurique, mais il ne se forma point de précipité qui démontrât la présence de la baryte.

VII. Je versai ensuite goutte à goutte dans la dissolution de l'oxalate de potasse saturé, aqueux; il précipita une poussière blanche qui, rassemblée, edulcorée & séchée, pesoit vingt-trois grains un quart; après avoir été fortement chauffée, elle pesoit dix grains $\frac{1}{2}$, & c'étoit de la chaux pure.

VIII. Je fis évaporer la liqueur fumageante, & pour en dégager l'acide muriatique, j'y versai soixante grains d'acide sulfurique, & je deséchai entièrement le mélange par l'évaporation spontanée. Ayant levé le papier qui couvroit la capsule de porcelaine, je le vis avec surprise couvert de cristaux d'un blanc d'argent. Je pris d'abord ces cristaux pour de l'acide oxalique sublimé; mais ils ne précipitoient point l'eau de chaux, & ils étoient sans saveur; je les rassemblai, je versai de nouvelle eau sur ce qui restoit, & je fis encore évaporer la dissolution.

Le papier se couvrit encore de très-beaux cristaux, enfin j'en recueillis en tout sept grains.

Ces cristaux se dissolvoient également bien dans l'eau & dans l'alcool; la dissolution aqueuse rougissoit les papiers colorés en bleu par la teinture de tournesol; la dissolution spiritueuse brilloit avec une flamme verte. Ces deux liqueurs précipitoient lentement en jaune l'oxide de mercure de sa dissolution dans l'acide nitrique.

De-là je conclus que ces cristaux étoient de l'acide boracique, & que le quart cubique n'étoit autre chose qu'une combinaison de cet acide avec une des substances salino-terreuses.

IX. J'arrosai d'alcool la masse sèche, & peu à peu elle fut edulcorée par quarante-huit onces de cette liqueur. Ayant fait évaporer la dissolution, j'obtins une substance blanche, brillante, jaunâtre en quelques endroits, qui pesoit quatre-vingt-deux grains. Ces quatre-vingt-deux grains furent dissous dans l'eau, & lorsque j'eus filtré, le liquide déposa une poussière noire provenant de la réaction de l'acide sulfurique & de l'alcool. Par l'évaporation, cette dissolution donna des cristaux blancs feuilletés, qui avoient l'éclat de l'ar-

gent. Je les tassai sur un filtre, je les édulcorai avec de l'eau; & je fis sécher le filtre à l'air libre; ces cristaux pesoient ensemble soixante-deux grains. La lessive qui me restoit, donna, par l'évaporation spontanée à l'air, trente-quatre grains d'acide boracique, plutôt d'un brun jaune que blanc. Le sel contenoit un peu d'acide sulfurique, dont je n'ai pu entièrement le purifier.

J'avois obtenu en tout, de 100 grains de quartz cubique, 103 grains d'acide boracique; mais comme cet acide étoit sous forme cristalline, & que par conséquent il contenoit de l'eau, & que d'ailleurs il étoit chargé d'un peu d'acide sulfurique, on peut dire (& l'on en verra la preuve plus bas) qu'il avoit tout au plus dans cette quantité 68 à 70 grains d'acide boracique sec & pur.

X. Je fis dissoudre dans l'eau la matière sèche dont j'avois séparé l'acide boracique par l'alcool, & j'évapurai la dissolution jusqu'à la siccité la plus parfaite. Il ne se sublima plus d'acide boracique. Je fis ensuite redissoudre toute cette substance dans l'eau, je la précipitai à chaud par le carbonate de soude, je rassemblai & j'edulcorai le précipité, j'évapurai de nouveau la lessive, je fis dissoudre le résidu dans l'eau, je filtrai la dissolution; enfin je répétai encore une fois ce travail, & j'obtins en tout 34 grains de terre.

XI. Ces 34 grains furent dissous dans de l'acide sulfurique surabondant, mais affaibli; la dissolution étoit parfaitement claire, elle ne déposa point de sulfure de chaux. Je mis peu à peu dans cette dissolution 16 grains $\frac{1}{2}$ de carbonate de magnésie; il se forma un précipité gélatineux. Je fis un peu évaporer le mélange & je le filtrai; il laissa sur le filtre du sulfate d'alumine, qui, séché, pesoit 3 grains $\frac{1}{2}$; je fis bouillir ce dernier avec le double de son poids d'alcali & un peu d'eau; j'obtins par-là 1 grain $\frac{1}{2}$ d'alumine, que la calcination réduisit à 1 grain.

XII. Je précipitai ensuite la magnésie par le carbonate de soude; je la rassemblai, je l'edulcorai, je la séchai; j'évapurai encore les dissolutions salines, jusqu'à ce qu'elles ne me parussent plus contenir de cette terre; je rassemblai celle qui s'en étoit successivement séparée, elle pesoit 47 grains.

Après avoir séparé les 16 grains $\frac{1}{2}$ de carbonate de magnésie avec lesquels j'avois précipité le sulfate d'alumine, je chauffai ce qui me restoit pendant 4 heures, au bout desquelles je trouvai 13 grains $\frac{1}{2}$ de magnésie.

XIII. J'essayai les terres que m'avoit données cette analyse; elles me parurent toutes très-pures.

XIV. Enfin, je pris 32 grains de l'acide boracique entièrement blanc & sec (IX.), 17 grains du brun jaunâtre (IX.), & 3 $\frac{1}{2}$ de celui qui s'étoit

sublimé (VIII.), je projetai le mélange dans une cornue, & je chauffai celle-ci à rouge au bain du sable. Il ne se sublima que peu d'acide boracique, & il se trouva à-peu-près 18 grains d'acide sulfurique aqueux dans le récipient; la cornue fut entretenue toute pendant quelques heures. Après l'opération, ce vaisseau pesoit 34 grains de plus qu'antérieurement; donc 100 grains de quartz cubique contiennent 68 grains environ d'acide boracique.

XV. Des expériences que je viens de rapporter, il suit que ces cristaux cubiques auxquels on avoit donné le nom de quartz, ne sont ni du quartz, ni du feldspath, mais un produit du règne minéral entièrement nouveau & inconnu jusqu'ici, dont les parties constituantes sont,

L'acide boracique qui y domine.

La magnésie.

La chaux.

L'oxide de fer.

Le sulfate de chaux paroît s'y trouver accidentellement, & s'être introduit par hazard dans les petites fentes qui se trouvent à la surface des cristaux; je ferai tenté de regarder aussi comme accidentelle la présence de l'alumine & de la silice dans ce sel; peut-être ces deux terres provenoient-elles du mortier dans lequel j'avois trituré le prétendu quartz cubique; peut-être d'autres expériences les feront-elles ranger parmi ses parties constituantes.

§ V.

Résumé des parties constituantes du prétendu quartz cubique.

J'ai répété ces expériences avec tout le soin & l'exactitude que me le permettoit la petite quantité de cristaux que je possédois, seulement au lieu de 100 grains je n'en ai analysé que 50; & au lieu d'acide muriatique, j'ai employé une fois l'acide nitrique, & une autre fois l'acide sulfurique. Si-tôt que je pourrai me procurer une quantité suffisante de quartz cubique, je répéterai & je décrirai plus exactement ces expériences. Toutes celles que j'ai faites se sont parfaitement accordées sur les résultats principaux, & m'ont appris que 100 grains de *Wiesfleiter* contiennent,

D'acide boracique cristallisé, 100 grains, qui, par la fusion, se réduisent à.....	66	68
De magnésie.....	13 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{2}$
De chaux.....	10 $\frac{1}{2}$	11
D'alumine.....	1	1
D'oxide de fer.....	1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$
De silice.....	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$
Somme.....	92 $\frac{1}{2}$	96 $\frac{1}{2}$

Ce qui, retranché de 100 grains que j'avois analysés donne

déchet.....	7 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$
-------------	-----------------	-----------------

(1) *Expériences sur l'acide boracique retiré du prétendu quartz cubique.*

I. L'acide boracique retiré de ces cristaux, fut dissous également bien dans l'eau & dans l'alcool.

II. La dissolution alcoolique brûloit avec une flamme verte.

III. La dissolution aqueuse précipita en jaune l'oxide de mercure de l'acide nitrique.

IV. Il se fondit seul en verre à un feu modéré.

V. En exposant au feu de distillation le plus violent un mélange de parties égales d'acide boracique & de muriate de soude, l'acide muriatique se dégagea. Le résidu dissous dans l'eau donna par l'évaporation spontanée, des cristaux polyèdres, hexagones & cubiques de véritable borate de soude.

VI. L'acide boracique se comporta de même avec le nitrate de potasse; ce sel fut décomposé, & l'acide boracique s'unit à la base avec laquelle il forma du borate de potasse.

§ VI.

Je laisse aux minéralogistes à classer ce nouveau produit du règne minéral; mais en attendant qu'ils lui aient assigné une place dans leurs systèmes, je l'appellerai à cause de la texture feuilletée & de ses parties constituantes *spath boracique de magnésie & de chaux*. (1)

Probablement des recherches plus étendues feront trouver l'acide boracique dans plusieurs autres substances minérales, peut-être dans beaucoup de corps, dans les gemmes, &c. il se pourroit que cette découverte nous donnât la solution de nombreux problèmes que présente la minéralogie, & principalement de ceux qui ont rapport à la cristallisation des minéraux.

Nous ajouterons à l'analyse de ce sel donné par M. Westrumb, les expériences faites par Heyer, & publiées dans les annales chimiques, sous le titre suivant: *Quelques expériences sur le quartz cubique ou borate calcaire*; M. Heyer, travailloit en même-temps que M. Westrumb à l'analyse du quartz cubique de Lunébourg. La description qu'il donne des caractères extérieurs de cette pierre est parfaitement conforme à celle qu'en a faite M. Westrumb. M. Heyer a trouvé que dans de l'eau distillée, dont le ponce cube pesoit 595, 125 grains, la pesanteur spécifique du quartz cubique étoit de 2,076 à 3,457. Les

(1) M. Heyer de Brunswick, à qui je fis part il n'y a pas long-temps de mes résultats, vient de m'apprendre qu'il a, comme moi, vu de l'acide boracique des cristaux cubiques de Lunébourg.

(2) Spath boracique de magnésie & de chaux, c'est à-dire, borate magnésio-calcaire.

cristaux les plus transparents étoient aussi les plus plus pesans. Les résultats des expériences faites sur cette pierre par M. Heyer, sont à peu-près les mêmes que ceux qu'obtint M. Westrumb, nous allons cependant les rapporter, pour faire connaître les moyens dont chacun de ces savans s'est servi pour parvenir au même but.

Première expérience. Quatre de ces cristaux parfaitement transparents, pesant 60 grains, tenus pendant une demi-heure dans de l'eau distillée bouillante, ne diminuèrent pas de poids ; il n'en fut rien dissous. Roués trois fois de suite, & chaque fois éteints dans de l'eau distillée, ces cristaux parurent perdre leur transparence, & lorsqu'ils refroidirent, il en étoit quelques parcelles ; leur poids demeura le même ; mais ils étoient troubles & fendillés. On les réduisit aisément dans un mortier d'agate en poudre grossière qu'il ne fut pas facile de rendre plus fine ; le mortier en fut sensiblement attaqué. Cette poudre pesoit encore 60 grains ; sa couleur tiroit sur le jaune ; ce qui pouvoit provenir de ce que mon mortier d'agate étoit ferrugineux. Je mis cette poudre dans un vase de verre ; je l'arrosai d'acide nitrique qui parut ne produire aucun effet à froid ; en conséquence je chauffai le mélange, bientôt la poudre diminua, & il se forma des cristaux. J'étendis d'eau ce mélange, & lorsque les parties non dissoutes se furent déposées, je décantai la liqueur claire, & je chauffai ce dépôt avec du nouvel acide nitrique. Par cette seconde opération, tout fut dissous, à l'exception d'une substance très-peu abondante, sur laquelle de nouvel acide n'eut plus d'action. Ce résidu filtré, lavé & séché, pesoit deux grains & un quart ; je jugeai que c'étoit de la silice.

Je voulus précipiter avec de l'ammoniaque la dissolution étendue d'eau ; mais je n'obtins qu'un peu de dépôt jaune, que j'eus de la peine à détacher du vase dans lequel j'édulcorai & le séchai. Ce n'étoit que de l'oxide de fer qui provenoit certainement du mortier d'agate. La facilité avec laquelle ma dissolution s'étoit cristallisée, me frappa ; car l'acide nitrique ne produisit cet effet avec aucune des terres connues ; mais je redoublai d'attention, en voyant qu'il ne se faisoit plus de précipité avec une plus grande quantité de carbonate ammoniacal (1). Comme je me désois de ce carbonate, je l'essayai avec de l'ammoniaque ; il reprit une couleur d'opale. L'alcool troubla pareillement ma dissolution. De-là je conclus qu'il ne falloit attribuer ce précipité qu'à l'alcool de l'ammoniaque ; je continuai donc à y verser de l'alcool, jusqu'à ce que le mélange ne se troublât plus. Je rassemblai le précipité sur le filtre, je

l'édulcorai, le séchai, & j'obtins 52 grains d'une poudre blanche brillante ; sur cette poudre j'ajoutai de l'acide sulfurique, afin de séparer la chaux ou la baryte qui pouvoient s'y trouver : tout fut dissous avec effervescence, à l'exception de cinq grains. Ayant fait dissoudre ces cinq grains dans beaucoup d'eau, j'en précipitai par un alcali une terre blanche, dont je parlerai plus en détail ci-dessous. Je laissai reposer pendant huit jours dans un vaisseau de verre, la liqueur combinée avec de l'alcool, & deux je venois de séparer le précipité, il s'y forma une grande quantité de petits cristaux que j'eus puis détacher des parois du verre, & que l'eau d'alcool n'attaqua pas ; ils furent dissous avec effervescence par l'acide sulfurique. Je versai toute la dissolution d'acide sulfurique dans une cornue que je mis au bain de sable. J'y fis évaporer l'eau du mélange à un feu doux ; & sur la fin je fis rougir la cornue ; il se dégagea beaucoup de vapeur blanche, puis il se forma un sublimé blanc qui fut redissous en partie par l'acide sulfurique qui s'élevoit. Quand il ne se dégagea plus rien ; je broyai une petite partie de ce sublimé avec un peu de carbonate de soude, alors il se développa une odeur d'ammoniaque. Je fis dissoudre le résidu dans l'eau, & je chauffai la dissolution ; il resta un peu de sel que je regardai comme du sulfate ammoniacal. La liqueur distillée étoit parfaitement claire, & la cornue, ainsi que le récipient, n'étoient aucunement attaqués. Elle fit effervescence avec les acides, & je la pris pour de l'acide sulfurique foible ; il y avoit au fond de la cornue une substance pulvérulente de poids de 35 grains, qui fut presque entièrement dissoute par l'eau distillée. Je l'exposai au feu, & j'y ajoutai pareille quantité de carbonate de soude qui la troubla, & précipita en grande quantité une substance blanche qui fut sensiblement diminuée par l'édulcoration. Lorsque l'eau n'en enleva plus rien, je fis dissoudre le résidu dans l'acide sulfurique avec lequel il fit effervescence. Cette dernière dissolution se troubla quelque temps après, en continuant à évaporer encore un peu la liqueur. Il se forma de nouveau quelques cristaux déliés que je pris pour du sulfate de chaux ; j'étendis le tout d'eau ; je le remis au feu & y ajoutai un peu d'alcali ; il s'ensuivit une seconde fois une terre blanche, qui, avec celle dont il a été parlé plus haut, pesoit 6 grains, & n'étoit autre chose que de la chaux. Je fis évaporer avec l'eau employée à l'édulcoration, la liqueur filtrée à laquelle j'avois ajoutée du carbonate de soude ; lorsqu'elle fut évaporée presque jusqu'à siccité, j'y aperçus quelques cristaux d'un blanc de lait, qui, d'après leur forme, ne pouvoient être que du borate de soude. Malheureusement cette expérience étoit déjà trop compliquée, pour que je

(1) Depuis que j'ai vu que la potasse précipite souvent l'alumine sous forme d'une gelée qui se dissout dans la solution de la chaux, & qui trouble ensuite son acide, je me suis occupé de ce carbonate d'ammoniaque qui précipite les liqueurs dans lesquelles je puis que'il y a de l'alumine.

pussé la continuer. Elle me démontra qu'il n'y avoit dans le quartz cubique, ni acide fluorique, ni acide phosphorique; mais qu'il étoit très-vraisemblable qu'il contenoit de l'acide boracique; car l'acide fluorique adroit attaqué la cornue, le résidu de la cornue eut été vitrifié, si c'eût été de l'acide phosphorique, le degré de feu étant assez fort pour cela.

DEUXIÈME EXPÉRIENCE. J'avois fait bouillir en même-temps pendant une demi-heure, de l'eau distillée sur deux cristaux de quartz cubique entièrement opaque & poreux, & pesant ensemble 12 grains. Il s'étoit dégagé beaucoup de bulles d'air; ils n'avoient rien perdu de leur poids; je les avoit fait rougir & éteints trois fois dans l'eau distillée, ils s'étoient séparés en plusieurs gros morceaux dans lesquels on voyoit distinctement de l'ochre rouge qui causoit probablement leur opacité. Ce travail ne diminua pas leur poids, ils se laissent broyer plus facilement que les autres dans un mortier de verre blanc; mais leur poids s'accrut de deux grains. J'y versai de l'acide nitrique avec lequel je les mis en digestion, & tout sur dissout à deux grains près. La dissolution se cristallisa, l'ammoniaque separa environ un demi-grain d'oxide de fer de la dissolution évendue de beaucoup d'eau, & l'alcool en sépara 12 grains d'une substance pulvérulente & brillante, que je fis pareillement dissoudre dans l'acide sulfurique, avant d'en séparer la chaux qui pouvoit s'y trouver, & tout fut dissous à peu de chose près; je mis dans la dissolution 12 grains de carbonate de soude cristallisé. Le mélange devint d'un blanc laiteux; je le mis en digestion à un feu peut-être trop violent, car en regardant le lendemain le vase, je trouvais au papier qui servoit de couvercle, une portion de cristaux feuilletés & brillants. Il y en avoit même à l'orifice du verre, & le reste de la masse étoit sec. Voilà à-peu-près où j'en étois, lorsque M. Vestrumb m'écrivit que les cristaux cubiques de M. Laffus étoient composés d'acide boracique & de chaux, d'un peu de fer, de silice. Je trouvai donc une conjecture confirmée par-là, & je crus m'en convaincre absolument par l'expérience suivante.

TROISIÈME EXPÉRIENCE. Je broyai dans le mortier de verre blanc 60 grains de cristaux parfaitement transparents, rouges & éteints trois fois de suite comme les précédents; la poudre pesoit 72 grains. L'acide nitrique y causa une légère effervescence, occasionnée peut-être par les petites portions de verre qui s'y étoient mêlées. Je fis évaporer l'acide à moitié, la plus grande partie de la poudre fut dissoute, & toute la liqueur fut remplie de cristaux en feuillets & en aiguilles; j'enlevai avec soin les cristaux, & sans toucher au dépôt, je les fis égoutter dans un vase de verre, je mis encore de l'acide nitrique sur le précipité, &

Chimie. Tome II.

le traitai comme auparavant. Après la digestion, j'enlevai de nouveau une quantité considérable de cristaux, & comme il n'y avoit plus que très-peu de parties dissoutes, j'étendis la liqueur dans de l'eau chaude distillée, & lorsqu'elle fut clarifiée, je décantai, & je fis digérer de nouveau le résidu de l'acide nitrique, & il resta 8 grains de poudre fine. Je fis encore évaporer toutes les liqueurs qui me restèrent de ces opérations, jusqu'à ce que le tout fut réuni en une masse cristalline. Je mis celle-ci dans un entonnoir; je la fis égoutter, & la liqueur que je recueillis me donna encore quelques cristaux par l'évaporation. Tous les cristaux que j'avois obtenus parfaitement secs, pesoient 57 grains; il est possible qu'il en soit resté quelques grains dans le nitrate de chaux. Ces cristaux contenoient fort peu de chaux; car lorsque je voulus en faire du borate de soude, en les faisant dissoudre dans deux onces d'eau distillée chaude avec du carbonate de soude cristallisé, la liqueur ne se troubla que faiblement. Le dépôt peu abondant qui se forma, ne pesoit sûrement pas la huitième partie d'un grain. En y mettant du carbonate alcalin, l'effervescence fut faible. Je l'attribuai à l'air atmosphérique adhérent à l'alcali; je fis évaporer lentement le mélange, il resta une masse un peu cristalline, sur laquelle étoit une liqueur gommeuse & tenace: croyant que je n'y avois pas mis assez d'alcali, j'y ajoutai encore 30 grains sur lesquels je versai de nouvelle eau, & je recommençai l'évaporation. La plus grande partie du mélange forma de petits cristaux; il resta au-dessus un peu d'une liqueur qui n'étoit plus tenace, & qui faisoit effervescence avec les acides. Jugeant que c'étoit de l'alcali surabondant, je lavai ces cristaux avec de l'eau; je les fis sécher sur du papier; ils pesoient 88 grains. Non-seulement ils avoient la forme & la blancheur du borate de soude, ils se boursouffèrent même sur des charbons ardens, & ils se vitrifièrent facilement.

La seconde expérience prouve suffisamment que le fer qui étoit dans les cristaux, ne s'y étoit trouvé qu'accidentellement; que par conséquent il n'est pas nécessaire à leur formation. Il ne me restoit plus qu'à examiner si la poudre indissoluble dans l'acide, & que j'avois pris pour de la silice, étoit une des parties constituantes du quartz cubique, ou si elle provenoit de mes mortiers.

QUATRIÈME EXPÉRIENCE. Je mis un morceau de ces cristaux dans l'acide sulfurique concentré, & l'y laissai en digestion pendant 8 jours, de manière que la liqueur qui s'évaporait pendant le jour, étoit remplacée pendant le froid de la nuit. Après ce temps, les arêtes seulement étoient devenues blanchâtres, & il ne paroissoit pas qu'il s'en fût dissous la moindre portion, tandis que les cristaux réduits en poudre, y furent facilement dissous.

CINQUIÈME EXPÉRIENCE. Je mis le cristal de l'expérience précédente dans un têt de porcelaine blanche ; je l'environnai de carbonate de soude, & le mis au feu. L'alcali fondit, mais le cristal resta entier, & ne parut pas avoir été attaqué, d'où il paroît que les alcalis n'opèrent pas plus sur les cristaux entiers, que les acides.

SIXIÈME EXPÉRIENCE. Je broyai un cristal qui pesoit douze grains dans un mortier de cuivre avec un pilon de fer. J'obris une poudre d'un gris centré foncé, que je fis digérer avec de l'acide nitrique & de l'acide muriatique. La dissolution se fit complètement, à l'exception de 3 ou 4 grains qui n'avoient point été broyés assez fins.

SEPTIÈME EXPÉRIENCE. Il est probable que dans la première expérience il s'étoit perdu un peu de chaux, & j'avois des raisons pour la séparation du résidu non cristallisé de la troisième expérience.

Je broyai dans un mortier de verre un cristal qui pesoit 12 grains, & qui auparavant avoit été touché & étoit plusieurs fois dans l'eau. La poudre pesoit 14 grains. J'y ajoutai 24 grains de carbonate de soude cristallisé ; je fis fondre le tout dans un têt de porcelaine, à un feu modéré, & j'obris une masse presque vitreuse, qui eut de la peine à se dissoudre, quoique j'eusse versé dessus un peu d'eau distillée chaude. & que je l'eus fait bouillir quelque temps dans le têt. Je versai encore plusieurs fois de l'eau bouillante, & après avoir continué pendant 2 jours le lavage, sans que la masse eût diminué sensiblement, je la détachai, mais pas assez exactement, pour ne pas enlever avec elle quelques parcelles de porcelaine ; car la masse s'étoit soudée à l'email. Je broyai cette masse avec de l'eau ; je filtrai & je joignis ce qui en resta sur le filtre, avec la portion que j'avois déjà séparée par des lotions ; je fis sécher sur le filtre le dépôt blanc qui pesoit 10 grains, & je le fis dissoudre à froid avec l'acide nitrique. Je filtrai & je jetai le résidu, jugeant que c'étoit de la silice avec un peu d'email de la porcelaine. Je précipitai la dissolution qui avoit été filtrée avec de l'alcali ; le précipité que j'obtiens pesoit 3 grains après avoir été rougi ; il faisoit effervescence avec l'acide sulfurique, & à mesure qu'il se dissolvait, il se précipitoit de nouveau ; c'étoit donc en grande partie de la chaux.

J'aurois désiré pouvoir faire des expériences plus exactes, relativement à la chaux ; mais les cristaux me manquèrent. En attendant, je crois pouvoir conclure de cette expérience, que ces cristaux si durs sont composés d'acide boracique, d'environ un quart de terre calcaire, lorsqu'ils sont privés de leur eau de cristallisation, & d'un tiers seulement, lorsqu'ils ont encore la forme cristalline ; & ce qui me confirme dans cette opinion, c'est que la décomposition de ces cristaux, au

moyen de l'alcali par la voie sèche, est beaucoup plus difficile que par les acides. J'avois fondé dans un creuset un petit cristal pulvérisé avec de l'alcali & il m'avoit été impossible de faire dissoudre la masse dans l'eau. J'eus donc recours à l'acide nitrique, encore faut-il 8 jours pour le dissoudre en entier. Peut-être réussiroit-on mieux avec une plus grande quantité que l'on pourroit alors sortir du creuset.

HUITIÈME EXPÉRIENCE. Pour voir si je pourrais faire artificiellement des cristaux semblables, je fis dissoudre au feu, dans 2 livres d'eau distillée ; une demi once d'acide boracique cristallisé, que j'avois retiré du borax de soude par l'acide sulfurique. J'y mis peu-à-peu 2 gros de carbonate de chaux pilée ; ses premières portions seulement firent effervescence. Elle provenoit peut-être de l'acide sulfurique qui étoit attaché aux cristaux ; je fis bouillir le tout pendant un certain temps, je le versai encore chaud dans un verre ; je lavai le vaisseau avec une livre d'eau bouillante, parce qu'il s'étoit fait un dépôt considérable, & je la joignis à l'autre liqueur. Le mélange que j'avois versé dans le verre, étoit d'un blanc laiteux ; il s'étoit fait un dépôt considérable, & je ne crois pas qu'il y ait eu une quantité notable de dissolution. Cependant j'ai exposé à l'air ce mélange légèrement couvert, à un endroit où le soleil ne pouvoit pas donner, afin de laisser évaporer doucement toute la liqueur. La suite me fera voir si j'ai atteint mon but.

N. B. M. Heyer soupçonant qu'il pouvoit bien y avoir de l'acide boracique dans le sulfure de chaux qui sert de gangue aux cristaux de borate magnésio-calcaire, a analysé ce sulfure. Il n'y a trouvé que de l'acide sulfurique & de la chaux.

BORATE DE MERCURE. On connoît un borate de mercure formé dans la précipitation de la dissolution nitrique de ce métal par celle de borate de soude. Ce précipité est en poussière jaunâtre, peu dissoluble ; on n'a point encore examiné ce sel, dont quelques personnes avoient proposé l'usage en médecine.

BORATE DE MOLYBDÈNE. Absolument inconnu.

BORATE DE NICKEL. Bergman a remarqué que ces dissolutions de nickel sont précipitées par le borate de soude, en un sel presque insoluble. On ne connoît pas les propriétés de cette combinaison.

BORATE D'OR. Il paroît qu'il n'existe que très-peu d'attraction entre l'oxide d'or & l'acide boracique, puisque, d'après la remarque de Berg-

man, une dissolution d'or n'est pas troublée par celle du borate de soude.

BORATE DE PLATINE. Il en est de même du platine; l'acide boracique n'a que peu d'attraction pour l'oxyde de ce métal, puisque la dissolution de platine n'est pas précipitée par celle de borate de soude.

BORATE DE PLOMB. Les dissolutions de plomb sont abondamment précipitées par la dissolution de borate de soude. Le précipité blanc qui se forme dans ce cas est très-peu soluble; & on n'en connoît pas d'ailleurs les propriétés chimiques.

BORATE DE POTASSE. On n'a encore connu le borate de potasse que dans le résidu de la décomposition du nitrate de potasse faite par l'acide boracique.

On fait, d'ailleurs, que ces deux substances salines, l'acide boracique & la potasse, sont très-susceptibles de s'unir immédiatement, & qu'il résulte de cette union un sel neutre analogue au borate de soude, tel est le résidu du nitre de potasse décomposé par l'acide boracique. M. Baumé dit que ce résidu est en masse blanche, demi-fondue, &c que, dissous dans l'eau, il lui a fourni un sel en petits cristaux. Le borate de potasse est donc fusible, & cristallisable; les acides purs le décomposent, ainsi que le borate de soude. On ne connoît rien de plus sur ce sel, qu'il seroit nécessaire d'examiner comme on a fait le borate de soude. Naron a connu la possibilité de faire ce sel en combinant directement de l'acide boracique avec la potasse; il l'a même bien distingué du borax ordinaire, ou à base de soude; mais il n'a rien dit sur les propriétés particulières de ce borate. Ce sel n'est d'aucun usage.

BORATE DE SILICE. J'indique un borate de silice, parce que l'acide boracique étant fixe & fusible de sa nature, il a la propriété d'entretenir dans sa fusion la terre silicee. Ces deux matières fondues ensemble forment un verre transparent, dans lequel il est aisé de voir qu'il y a une union intime entre la silice & l'acide boracique. On n'a point examiné les propriétés de ce composé qui méritent cependant de fixer l'attention des chimistes, parce qu'il entre dans plusieurs arts, ou au moins parce qu'il pourroit devenir utile. Il paroit, d'après le peu d'observations que j'ai commencées sur cette combinaison, que l'acide boracique y est en grande partie masqué par la silice, & qu'on n'y reconnoît presque plus les caractères acides.

BORATE DE SOUDE. C'est le nom de la combinaison neutre de l'acide boracique avec la soude. Ce sel est peu connu, le borax du commerce n'est point du tout de la même nature; il contient un grand excès de soude; & on n'a examiné que les propriétés de ce dernier.

BORATE SURSATURÉ DE SOUDE, BORATE DE SOUDE AVEC EXCÈS, ou BORAX DU COMMERCE. Le borax avec excès de soude ou borax commun, est un sel composé, formé par la combinaison de l'acide boracique avec la soude en excès.

L'histoire de ce sel qui nous vient des Indes orientales, est fort incertaine. On ne fait pas encore positivement si c'est un produit de la nature ou de l'art. En effet, si la découverte de l'acide boracique en dissolution dans les eaux de plusieurs lacs de Toscane, dont il a été fait mention dans l'histoire de cet acide, peut faire présumer que le borate de soude est un produit de la nature, plusieurs faits que nous rapporterons plus bas, semblent démontrer qu'il est possible de former ce sel de toutes pièces par certains procédés, & peut-être aura-t-on quelque jour des minières artificielles de borax, comme on a aujourd'hui des minières artificielles dans différentes parties de l'Europe.

Le borax est sous trois états dans le commerce; le premier est le borax brut, *tinkal* ou *chrysolite*, qui nous vient de Perse, il est en masses verdâtres, grasses au toucher, ou en espèces de cristaux opaques, d'un vert de porcelaine, qui sont des prismes à six pans, terminés par des pyramides irrégulières. On trouve même deux variétés de ces cristaux verdâtres différentes par la grosseur dans le commerce. Ce sel est très-impur, & mêlé de beaucoup de matières étrangères à sa composition.

La seconde espèce de borax est connue sous le nom de borax de la Chine; celui-ci est un peu plus pur que le précédent, il est en petites plaques ou en masses irrégulièrement cristallisées, d'un blanc sale; on y aperçoit des rudimens de prismes & de pyramides, mais confondus ensemble, sans aucun arrangement symétrique; on observe, sur ces cristaux, une poussière blanche qui en enduit la surface, & que l'on croit de nature argileuse.

La troisième espèce est le borax de Hollande, ou le borax raffiné. Il est en portions raffinées de cristaux transparents & assez purs; on y reconnoît des pyramides à plusieurs faces, mais dont la cristallisation a été interrompue. Cette forme indique d'une manière certaine, que la méthode employée par les Hollandais pour raffiner ce sel, est la dissolution & la cristallisation.

Enfin on prépare à Paris, dans les laboratoires de MM. Lesguilliers, droguistes, rue des Lombards, un borax purifié qui ne le cède en rien à celui de Hollande, & qui, peut-être, a un plus haut degré de pureté. Outre ces quatre espèces de borax, un pharmacien de Paris, M. la Pierre, a cru découvrir qu'il s'en forme journellement dans les eaux de savon mêlées à celles des cuisines, qu'un particulier laisse séjourner dans une espèce de fosse; il en retire, au bout d'un certain temps, de vrai borax en beaux cristaux;

mais ce fait annoncé il y a plus de dix ans, n'a point été confirmé depuis.

On n'est donc pas instruit sur la formation du borax ; il paroît seulement qu'il s'en produit dans les eaux stagnantes qui contiennent des matières grasses. Quelques auteurs assurent qu'on le fait artificiellement en Chine, en mêlant dans une fosse de la graisse, de l'argille & du fumier, couchés par couches, en arrosant ce mélange avec de l'eau, & en le laissant ainsi séjourner pendant quelques années. Au bout de ce temps, on lessive ces matières, on évapore la lessive, & on obtient le borax brut ; d'autres ont cru qu'on le tiroit d'une eau qui se filtre à travers des mines de cuivre. M. Baumé dit positivement, que le premier de ces procédés lui a fort bien réussi. (Chin. expériment. tom. II, page 152.)

Le borax purifié est en prismes à six pans, dont deux sont plus larges, avec des pyramides triédres. Il présente d'ailleurs beaucoup de variétés dans sa cristallisation. Sa saveur est styptique & utérine ; il verdit le sirop de violette, parce qu'il contient un excès de soude ; c'est pour le distinguer de celui qui est saturé d'acide boracique ou du vrai *borate de soude*, que nous lui laissons le nom de borax ; nous le nommons aussi borate sur saturé de soude, pour désigner la nature de sa combinaison.

Lorsqu'on l'expose à l'action du feu, il fond assez vite à l'aide de l'eau de sa cristallisation ; il perd peu à peu cette eau, & acquiert un volume considérable ; il est alors sous la forme d'une masse légère, poreuse & très-friable, que l'on désigne sous le nom de borax calciné ; le volume considérable, la forme lamelleuse & poreuse que prend ce borax dans sa calcination, viennent de ce que l'eau qui se dégage dans l'état de vapeur, soulève la portion de la substance saline à demi desséchée en pellicules légères, & de ce que les bulles qu'elle forme crévant à la surface du sel, ces pellicules se dessèchent entièrement, & se placent les unes sur les autres, de sorte à laisser des intervalles entr'elles. Le borax calciné n'est nullement altéré dans sa composition ; il n'a perdu que son eau de cristallisation, qui fait à-peu-près six onces par livre. On peut lui rendre sa première forme en le dissolvant dans l'eau, & en le faisant cristalliser ; mais lorsqu'on continue de chauffer ce sel calciné, il se fond dès qu'il commence à rougir, & forme un verre très-fusible, transparent, un peu verdâtre, qui se ternit à l'air, & qui se dissout dans l'eau. Le borax n'a point changé de nature par cette fusion, on peut le faire repaître avec toutes les propriétés qui lui sont particulières, par le moyen de la dissolution & de la cristallisation.

L'air n'altère point ce sel, il s'effleurit cependant à sa surface, en perdant une portion de son eau de cristallisation. Il paroît même que cette efflorescence n'est pas toujours la même dans les

différens borax purifiés, celui de la Chine s'effleurit beaucoup moins que celui de Hollande, & celui-ci plus que le borax purifié à Paris. Cette légère différence dépend, sans doute, des procédés qu'on a suivis dans la purification, de la manière dont on le fait cristalliser, de la quantité d'eau que ses cristaux contiennent suivant la rapidité plus ou moins grande avec laquelle ils se sont formés, & peut-être aussi des différentes proportions d'acide boracique & de soude qui entrent dans la composition.

Le borax est très-dissoluble dans l'eau. Il faut douze parties d'eau froide pour dissoudre une partie de ce sel ; six parties d'eau bouillante en dissolvent une. On obtient ces cristaux par le refroidissement de sa dissolution ; mais les plus beaux & les plus réguliers se forment dans une dissolution qu'on laisse évaporer lentement à la température ordinaire de l'atmosphère.

Le borax sert de fondant à la terre élicée, & il forme avec elle un verre assez beau, on l'emploie dans la préparation des pierres précieuses artificielles, ou des verres durs.

Il vitrifie également l'argille, mais avec beaucoup de difficulté & beaucoup moins complètement ; telle est la raison pour laquelle il adhère aux creusets dans lesquels on le fait fondre.

On ne connoît pas bien l'action de la baryte & de la magnésie pures sur le borax de soude. Bergman place cependant ces deux substances avant les alcalis dans la première colonne de sa table des affinités ; ce qui annonce qu'elles sont susceptibles de décomposer ce sel ; mais il dit dans sa dissertation que les affinités de la terre pesante & de la magnésie avec l'acide boracique, ne sont point encore exactement déterminées.

La chaux a réellement plus d'affinité avec cet acide que n'en a la soude. L'eau de chaux précipite la dissolution de ce sel ; mais pour en opérer tout-à-fait la décomposition, il faut faire bouillir de la chaux vive avec le borax de soude ; alors le dépôt qui se forme est un composé salin peu soluble de la chaux avec l'acide boracique, tandis que la soude caustique reste en dissolution dans l'eau.

La potasse paroît décomposer le borax de soude, comme elle le fait à l'égard de tous les autres fels neutres à base de soude ; l'ammoniaque ne l'altère en aucune manière.

La plupart des acides ont une action bien marquée sur ce sel. Si, dans une dissolution bouillante de borax de soude, on verse avec précaution de l'acide sulfurique concentré jusqu'à ce qu'il y ait un léger excès d'acide dans la liqueur, on obtient par le refroidissement du mélange filtré un précipité très-abondant & disposé en petites écailles brillantes, c'est l'acide boracique ; on le lave avec de l'eau distillée, & on le fait sécher à l'air pour l'avoir bien pur ; en évaporant & laissant refroidir la dissolution ainsi préparée, on en ob-

tient plusieurs reptiles de l'acide boracique. A la fin, on ne retire plus que du sulfure de soude formé par l'union de l'acide sulfurique qu'on a employé avec la base alcaline du borax.

L'acide nitrique & l'acide muriatique décomposent de même le borax de soude, parce qu'ils ont, comme l'acide sulfurique, plus d'affinité avec la soude que n'en a l'acide boracique. On retire des dernières évaporations de ces mélanges du nitrate ou du muriate de soude.

La découverte de l'acide boracique paroît être due à Berchier, mais on a coutume de l'attribuer à Homborg, qui a le premier décrit avec assez d'exactitude dans les mémoires de l'académie pour 1702, un procédé pour l'obtenir. Ce chimiste découvrit ce sel sublimé, dans la distillation d'un mélange de sulfate de fer calciné, de borax, de soude & d'eau. Comme il crut que la première de ces matières contribuoit beaucoup à la formation, il l'appella *sel volatil narcotique de vitriol*.

Louis Lemery, fils aîné du fameux Nicolas Lemery, a beaucoup travaillé sur le borax de soude, & a découvert en 1728 qu'on pouvoit obtenir l'acide boracique appelé alors *sel sodatif*, par l'acide sulfurique pur, & que les acides nitrique & muriatique en donnoient de même; mais il employoit toujours la sublimation. C'est à Geoffroy le cadet qu'on doit l'analyse complète du borax de soude. Il a prouvé en 1732 qu'on obtenoit l'acide boracique par évaporation & par cristallisation, & en examinant le résidu de ces opérations, il a démontré que la soude étoit un des principes du borax. Les travaux de Baron sur ce sel, présentés à l'académie en 1749 & 1748, ont ajouté à ces découvertes deux faits importants pour la connoissance du borax de soude. Le premier, c'est que les acides végétaux le décomposent aussi-bien que les acides minéraux. Le second, c'est qu'on peut refaire du vrai borax, en unissant l'acide boracique avec la soude: ce qui prouve que cet acide est tout formé dans ce sel, & que les acides que l'on emploie pour le précipiter, ne contribuent en rien à sa formation.

L'acide fluorique & l'acide carbonique même, quoiqu'un des plus foibles, paroissent être susceptibles de décomposer le borax de soude, & d'en séparer l'acide boracique. Ce dernier s'unit facilement au borax du commerce, dont la base alcaline demande, pour être entièrement saturée d'acide boracique, un peu plus de cet acide que le poids total du borax. Bergman pense même que ce sel n'est bien neutre & bien saturé, & que les propriétés alcalines qui y dominent ordinairement, ne peuvent être masquées que par cette addition d'acide boracique. On n'a point encore examiné les propriétés de ce sel neutre ou vrai borate de soude.

Les sels neutres, alcalins, sulfuriques, nitriques & muriatiques, n'ont aucune action sur le borax de soude.

Ce sel fondu avec des matières combustibles, comme le charbon, acquiert une couleur rougeâtre; mais on ne connoît pas l'altération qu'il éprouve de la part de ces matières.

Le borax du commerce est d'une très grande utilité dans plusieurs arts. On l'emploie dans la verrerie, comme un excellent fondant, ainsi que dans la docimastie. On s'en sert avec grand avantage dans les foudroirs, parce qu'il fait couler l'alliage destiné à fonder. De plus, il entretient les surfaces des métaux que l'on veut réunir, dans un ramollissement très-propre à cette opération, & en les recouvrant, il empêche que le contact de l'air ne les altère.

Tel est l'article que j'ai consacré à ce sel dans mes éléments de chimie. J'y ajouterai ici ce que M. Valmont Bomare a dit sur l'histoire naturelle & la purification de ce sel, dans un mémoire lu en 1766 à l'académie des sciences, & qu'il a inséré dans son dictionnaire d'histoire naturelle.

Le borax dit M. Valmont est un sel d'un grand usage en médecine, & très-employé par divers artistes.

Les naturalistes le désignent comme un sel fossile; des chimistes le placent aussi dans le règne minéral. Des commerçans prétendent que cette substance n'est point un corps naturel, mais un produit de l'art. Divers auteurs ont dit que le borax naissoit ou se trouvoit dans des mines de cuivre en Asie, dans les mines d'or & d'argent des grandes Indes & de la Tartarie, & sur-tout dans l'île de Ceylan. Malgré tous les travaux qu'on a tenté sur ce sel pour en découvrir la nature, & quoiqu'en aient pensé ou soupçonné la plupart des écrivains & des artistes, il paroît qu'on est toujours fort incertain sur l'origine & le raffinage du borax.

Je me propose de donner ici, non-seulement une bonne description du *rinkal* & des différentes espèces de borax connues dans le commerce, mais encore leur origine, leur usage, la manière de raffiner le borax à l'instar des Hollandais, & de discuter quelques points chimiques, tendant à éclaircir ou à confirmer les notions que nous avons de la nature & de la formation de ce sel singulier. Le borax brut, ou crud & grossier, tel qu'il nous vient de l'Inde orientale, ressemble à une terre grasse, grumeleuse, assez pesante, d'une saveur de sucre, & d'alcali de soude ou de sel marin. Dans cet état il contient beaucoup de corps étrangers, différemment colorés, terreux & pierreux. Il n'est pas rare d'y trouver des cristaux d'un borax à demi-transparent, verdâtre & comme rhomboïdaux: on nomme ce sel, *borax gros & brut de l'Inde*.

On trouve aussi dans le commerce du borax en pain; il ressemble à du sucre peu transparent & candi, ou à un amas confus de tarte vitriolée. On le nomme *borax en rocher de la Chine*.

L'autre espèce de borax est assez transparent,

luisant, d'un blanc mat, d'une figure octogone & dure, & qui, à un coup d'œil, ressemble assez à l'alun. On le nomme *borex raffiné d'Hollande*, *borex depuratus albus*, *ostangularis WALLERII* (1). Son goût est d'abord assez doux; il devient ensuite âcre, piquant; mis sur des charbons embrasés, son odeur qu'il est suive au commencement, devient ensuite alcaline & urinale.

Le raffinage du borax est une espèce de manipulation que les Hollandois annoncent comme un secret; mais ils s'en sont fait trop gratuitement un privilège exclusif. Je puis dire d'avance, qu'il en est du raffinage du borax comme de celui du camphre. Pendant combien de temps n'a-t-on pas dit que le camphre ne se pouvoit purifier que par la liquéfaction? Quelques-uns cependant soupçonnoient que cette résine si singulière pourroit être purifiée par la sublimation: tant d'incertitudes auroient dû faire tenter l'expérience, mais chacun parloit le langage de son auteur; il n'y avoit que les Hollandois qui savoient seuls profiter de notre crédule complaisance, jusqu'au moment (en 1761) où j'ai communiqué à l'académie des sciences que le véritable procédé du raffinage du camphre brut, se réduisoit à une simple sublimation, au procédé que j'ai décrit avec les détails nécessaires pour accélérer & faciliter l'opération. Si l'on eut tenté en France la purification du borax brut de l'Inde, & qu'on l'eut rendu public, on auroit qu'on peut en faire le raffinage sans l'intervention de l'eau de chaux vive & d'autres matières qu'on a prétendu ou ignorer ou soupçonner. Enfin on auroit déjà que la purification du borax est fondée sur le même procédé usité pour les autres sels que l'on purifie par la voie de la dissolution, filtration, évaporation & cristallisation.

Etant à Amsterdam, un riche négociant de cette ville me fit entrer dans un de ces fameux laboratoires, où l'on ne fait des opérations de chimie qu'en grande cuisine. La théorie est bannie de ces espèces d'ateliers; la pratique seule conduit la main de l'ouvrier, qui ne manque jamais de réussir, & de produire à son maître un bénéfice dont la spéculation lui tient lieu de toutes réflexions physiques. Ce fut dans ce laboratoire Hollandois où je pusai diverses instructions, dont je rendrai compte dans un instant.

Le borax brut nous est apporté de Bengale & d'Ormusen on trouve aussi dans la grande Tartarie.

De tous les vaisseaux Européens qui mouillent dans le Bengale, ce sont ceux des Hollandois qui apportent le plus de borax; je fais même que ce qu'en apportent quelquefois les François, ou les Anglois est aussitôt revendu à quelques négociants d'Amsterdam qui ont l'art de le purifier. Les Vénitiens ont eu les premiers la réputation de raffiner

ce sel; mais ils prétendent que la longue guerre des Turcs avec les Persiens ayant interrompu toute espèce de commerce dans les échelles de l'évant, ceux qui avoient à Venise l'art de raffiner le borax des Indes, manquant de matière à borax, périrent de misère & périrent avec eux le secret. Que ce fait soit ou non, toujours est-il vrai que les Vénitiens & tous les Européens tirent aujourd'hui & uniquement le borax raffiné des droguistes d'Hollande, & que ceux-ci font un mystère de la manière de le raffiner.

L'auteur du dictionnaire du citoyen dit à cet égard, que le grand secret des Hollandois est l'économie & leur application à rendre la main-d'œuvre à très-bon marché, pour empêcher les autres nations de tenter la même chose; le secret qu'ils appliquent effectivement à plusieurs autres objets du commerce, tel que la préparation du minium, du cinabre, du sublimé corrosif, les huiles de muscade, de girofle, de bois de rose, de sassafras, de géroline, de cul-tawan, de vanille, &c. de plusieurs autres matières dont ils font seuls le commerce à l'exclusion de toutes autres nations.

Je reviens au borax, comme étant la seule matière que je me suis proposée de traiter.

La quantité de borax qui m'a passé par les mains ou que j'ai eu occasion de voir dans les magasins de Marseille, de Londres, d'Amsterdam &c. de plusieurs autres endroits de l'Europe, joints aux recies de plusieurs négocians Arméniens, & voyageurs instruits que j'ai entendus dans mon dernier voyage, tant en Angleterre qu'en Hollande, tout me porte à dire que le borax se tire par l'irrigation d'une terre grasse & saline, laquelle se trouve en manière de dépôt dans des espèces de puits creusés exprès en certains cantons de la Perse & du Mogol, & où l'on n'a l'art de purifier ce sel qu'à demi, même à l'aide d'une seconde dissolution. Le procédé usité dans l'Inde pour cette dernière purification de borax appelle *borex gras brut de l'Inde*, diffère peu de ce qu'on lit dans le premier vol. de notre minéralogie, première édition 1761, page 344. &c. d'après la lettre qui m'avait été écrite en 1774 d'Aliphan. Voici le précis de cette lettre.

Le borax tire son origine d'une terre grasse, sablonneuse, grasse, que l'on trouve en Perse & dans le Mogol, proche des torrens de Hadziar-bron, &c. notamment au bas des montagnes de Furberth, d'où il découle une eau melleuse, laiteuse, âcre, irrivible & comme savonneuse. Lorsque la terre est dure & par morceaux, on l'expose à l'humidité de l'air, ou elle s'amolli & devient marbrée en sa superficie. Cette terre ou pierre à borax, & cette eau, sont les matières, les matières premières du borax. On ramasse aussi une eau qui est de la consistance d'une geleée très-

(1) J'ai exposé aux yeux de l'académie ces différents espèces de borax, & tous les expériences que j'ai faites sur ce sel.

claire, qu'il se trouve en Perse dans des fosses très profondes, près d'une mine de cuivre jaune; cette liqueur a un œil verdâtre, & la saveur d'un sel laqué. On mélange la pierre à borax avec l'eau savonneuse de la liqueur gélativeuse, on les lessive on fait évaporer la liqueur jusqu'à consistance requise, puis on la verse à demi refroidie dans des fosses enduites de glaise blanchâtre; on couvre ces fosses d'un toit ou chapeau enduit de la même matière. Au bout de trois mois on trouve un dépôt terreux, grisâtre, d'un saveur visqueuse, saline & nauséabonde, entremêlée de quelques cristaux plus sales, verdâtres & assez opaques; quelquefois aussi le dépôt est grisâtre & peu renacé, mais d'un goût plus alcalin. On dissout aussi ce dépôt terreux & salin; on procède comme ci-dessus, on verse la liqueur dans une autre fosse semblable à la première, & deux mois après l'on y trouve encore un dépôt terreux, mais plus salin, rempli d'un plus grand nombre de cristaux plus réguliers, demi transparents. Tel est le borax qui on apporte en Europe sous le nom de *borax orat*.

Celui qui m'a assuré en 1766 que ce procédé est toujours le même dans l'Inde, m'a dit aussi que le produit des fosses à borax des districts de Patna, du Lékhan, de Visapour, de Golconde & de quelques autres contrées en Mogol, étoit porté à Bengale, tandis que le produit des fosses de Schirax, de Kerman & de quelques autres lieux de la Perse, étoit porté à Gommone, ou Bender-Abby. Le même narrateur m'assure qu'avant la guerre des Turcs contre les Persans, les Arméniens alloient, par Summe, près l'ancienne Babylone, où il y avoit aussi des puits ou fosses à borax, & que là ils achetoient le borax brut, & l'apportoient aux Vénitiens, qui alors avoient l'art de le raffiner; il me montra aussi un borax naturel qu'il me dit se trouver tantôt dans des cavernes en Perse, & tantôt dans un lac du grand Thibet (1). Ce borax natif qu'il me donna, est blanchâtre, formé par couches & un peu sablonneux, d'un goût très-alcalin & peu sucré, ou moins fade que le

borax ordinaire. On l'appelle *sel de Pers*. En cet état il ne peut fondre, il lui manque l'ongueur du *zinkal*, qu'on lui donne à volonté (2); c'est de ce sel dont les femmes tartares se servent quelquefois pour adoucir la peau des bras & du visage.

On me fit en même temps observer la forme & la nature des instrumens dont on se servoit dans le laboratoire Hollandois: l'examen d'abord le ramis à filtrer, le tissu de la soie étoit gardi entièrement de fils de cuivre jaune; cette circonstance, jointe à la nature & à l'emplacement du réservoir qui contient la liqueur comme gélativeuse, & dont il est fait mention ci-dessus, me firent un peu réfléchir sur l'origine de la partie terreuse & de la portion verte cuivreuse soupçonnée par les uns & comme démontrée par M. Cadet. C'est cette même couleur verte du borax brut qui a fait dire à presque tous les auteurs, que le borax naît dans différentes mines de cuivre; on a même avancé que le borax dans ce cas étoit préférable pour les arts à celui qu'il se tiroit des autres mines.

Examinons maintenant si les Hollandois ajoutent ou diminuent la dose du cuivre dans la purification qu'ils font du borax, & si les artisans qui font usage de ce sel emploient également celui qui est transparent, sans couleur, très-rassis, & celui qui est peu transparent verdâtre & qui contient plus de cuivre enapparence.

Dans le laboratoire déjà cité, j'appris

1°. Qu'ils distinguoient deux sortes de borax brut, l'un apporté par mer de Gommone & de Bengale, & étoit le plus commun; l'autre étoit un borax de caravane, apporté par terre de Bender-Abassy en Spahban, & jusqu'au Gilhan. Là, on l'embarque sur la mer Caspienne jusqu'à Astracan, & de-là on l'apporte par terre à Petersbourg, & de Petersbourg par mer à Amsterdam. Le borax de caravane est presque tous en cristaux verdâtres.

2°. Que 100 livres de borax brut de l'Inde ne donnoient que 80 livres de borax purifié.

3°. Que ce sel dans son état d'impureté est si difficile à se dissoudre dans l'eau, qu'il faut s'y

(1) M. Biot, chirurgien, fut l'un des vaisseaux de la compagnie des Indes, à communiquer les détails suivants à M. Baillier, de l'Académie de Rouen, (à peu près dans le même temps que nous avons eu ce mémoire.)

« Le borax est un sel fossile qu'on tire d'un endroit du royaume du grand Thibet, nommé *Sendul*, il y a, dans ce lieu-là, un grand lac de cinq lieues de diamètre. Dans un certain temps de l'année, les gens du pays débouchent dans ce lac, qu'ils en retirent pour être porté dans les usages de la vie. On ne le retire qu'à l'époque où le lac est plein, ou sous pluie. Alors sept ou huit hommes se jettent dans l'eau après s'être bien bouché la bouche & les oreilles, sans cette précaution, cette eau leur feroit enfler tout le corps, ce qui arrive souvent. Ils le rangent en file dans l'eau, & tous naagent avec les mains & les pieds pour détacher le borax qui est au fond, ils le ramènent ensuite dans des bœufs pour le bien laver en le faisant entrer dans les eaux. Ils le font passer ainsi de main en main jusqu'à ce qu'il soit devenu blanc, qu'il soit devenu un grand vaie attaché à un poteau au milieu du lac. Quand ce vaie est plein, le mettent le sort dans un outre ou sac de peau, & au moyen d'une corde, ils tirent le borax hors du lac sans y faire d'autres préparations. On ne retire pas autre chose dans ce lac, il n'y a seulement après de cet endroit un minéral blanc. En parlant de Negral pour aller à Sendul, lieu du borax, il faut marcher entre le Lac au & la Tramonien le chemin est à peu près le même. » Ce borax ne trouve pas un autre lieu.

(2) Cette substance onctueuse est le *zinkal*, même, dont le borax brut est mélangé, & qui étoit inconnu aux chimistes & aux naturalistes. Cependant, en 1741, M. Knoch, qui étoit à Tancoubar, envoya à M. Lavoisier, professeur à Hall, de la mine de borax & de sel qui en avoit été tiré, avec du savon & du verre où on avoit été fait. M. Post, chimiste de Berlin, fit par la suite, des recherches sur la terre sablonneuse & irrégulière du borax, & découvrit qu'elle contenoit en effet le sel alcali terrestre. Voyez *Port de borax*, page 15 mais on ignore toujours la manière dont le tout se fait avec un alcali terrestre, & peut-être M. Knoch aura-t-il donné de plus grands éclaircissements sur cette importante matière.

prendre jusqu'à 8 & quelquefois 12 reprises, & verser à chaque fois le double du poids d'eau chaude, pour en extraire & séparer toute la matière purement saline.

4°. Que par ce moyen on pouvoit obtenir 8 & 12 cristallisations de borax, différentes entr'elles par la couleur, la figure, la transparence, la pesanteur & l'excès des propriétés.

5°. Qu'avant de procéder à la dissolution du borax brut, on en retiroit tout ce qui paroïssoit trop hétérogène, purement terreux & absolument pierreux.

6°. Que pour disposer la substance saline à se dissoudre plus facilement, il étoit important de la faire macérer pendant 8 jours avec un poids égal d'eau chaude.

7°. Qu'on versoit chaque dissolution toute bouillante sur un tamis à fils de laiton, lequel tamis étoit adapté à l'ouverture d'un filtre de laine taillé comme la chausse d'Hypocras.

8°. Que les premières lessives se faisoient avec lenteur, & étoient troussées. Les dernières étoient au contraire peu colorées, & exigeoient peu de temps.

9°. Que les instrumens, tels que jattes, bassines & chaudières, étoient de plomb.

10°. Que l'aliment du feu qu'ils employoient pour ces opérations, étoit de la tourbe du pays de Gouda.

11°. Qu'on versoit la liqueur très-chaude & évaporée à petit feu dans un vase de plomb, fait comme un très-grand creuset, lequel vase étoit à l'abri & entouré de beaucoup de paille hachée fort menue, & couvert d'un rond de bois plat en sa partie inférieure, & garni de nattes de roseau & de toile en sa partie supérieure. Ces précautions, me dit-on, sont des moyens sûrs. Que la liqueur restant long-temps chaude & très-fluide, les corps hétérogènes s'y précipitent plus facilement, & la cristallisation se fait lentement & plus régulièrement : cette dernière opération me parut, suivant les principes de l'art, exiger 20 jours de temps. Voilà tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai appris en Hollande sur cette matière.

On m'avertit aussi qu'il y avoit une douzième condition requise, absolument nécessaire pour le raffinage du borax. Cette condition devoit être la buse du secret. Etoit-ce l'addition d'une eau de chaux vive ? On a prétendu en Europe que ce pouvoit être la buse du mystère. Nous verrons dans un moment que si l'on n'avoit pas été si long-temps dans une sorte d'indifférence sur ce sel, il étoit facile de dévoiler tout le secret que les Hollandais affectent de cacher, & acquérir par-là une connoissance de plus sur la substance saline que nous traitons.

De retour à Paris, j'ai tenté quelques expériences sur le raffinage & la nature du borax. J'ai lu d'abord toutes les analyses que d'habiles chimistes François ont fait de ce sel. J'ai reconnu que

M. Homberg est le premier qui a retiré le sel sédatif sublimé du borax, en distillant ce sel avec l'acide vitriolique ; que M. Lemery le fils a découvert qu'on pouvoit aussi retirer le sel sédatif de borax par les acides nitreux & marins ; que M. Geoffroy a trouvé le moyen de l'obtenir par l'évaporation & la cristallisation. Il a aussi démontré le premier que le borax contient la base du sel marin ; que le célèbre M. Baron est, à ce qu'il paroît, le premier qui ait bien connu la nature du borax. Non-seulement il a prouvé qu'il étoit possible d'obtenir le sel sédatif du borax, en se servant des acides minéraux, mais encore à l'aide des acides végétaux ; il a même démontré que ce sel existoit tout formé dans le borax, & que le borax n'est autre chose qu'un composé de sel sédatif & d'alcali du sel marin, & qu'en combinant du sel sédatif avec l'alcali du sel marin, on refaisoit du borax ; que l'illustre M. Bourdelin a fait un très-grand travail pour décomposer le sel sédatif. Enfin que M. Cadet est le premier qui ait cru reconnaître dans le borax l'existence du cuivre déguisé par un principe arsénical & une terre vitrifiable, terre qui avoit déjà été analysée par M. Pott, chimiste de Berlin, & dont les procédés sur cette matière étant différents de ceux de M. Cadet, ont dû nécessairement amener à des résultats différents.

D'après tant de travaux faits sur la même matière par d'aussi grands maîtres, je ne devois tenter aucune opération, ni répéter aucune des expériences déjà décrites. Qu'il me soit permis d'avouer qu'él existence du cuivre reconnue par M. Cadet, comme partie constituante & essentielle à la nature du borax, me paroît si singulière, que j'ai désiré voir par mes yeux un tel phénomène.

On doit bien présumer que pour cette opération, je devois être sûr du borax que j'emploierois, & il me falloit donc en purifier moi-même, & en même-temps essayer & découvrir, ou plutôt m'assurer du raffinage du borax. Voici mon travail.

J'ai pris 6 livres de borax brut de Bengale ; j'en ai retiré quelques graviers de granite qui s'y trouvoient, & tous les corps durs absolument pierreux, il y en avoit six onces. J'ai versé sur la borax, trié & mis dans une terrine de grès, deux livres d'eau bouillante. Le mélange étoit bien remué avec une spatule de bois dur, je l'ai laissé macérer pendant huit jours. Au bout de ce temps, j'ai versé 30 livres d'eau bouillante sur la même masse saline que je remuai long-temps avec la spatule ; je l'ai laissée un peu reposer, & je filtrai la lessive encore chaude au travers d'un blanchet. Je versai sur le dépôt salin qui y restoit 15 livres de nouvelle eau bouillante ; enfin six autres livres sur le deuxième dépôt, & quatre livres sur le troisième. Alors la terre qui resta me parut insipide ; je la mis à part ; j'en parlerai dans un instant.

Je mêlai les différentes dissolutions dans une terrine de grès placée dans un bain de sable, & j'évaporai

j'évaporaï jusqu'à l'instant où des flocons salins parloient en abondance du fond de la terrine vers la superficie de la liqueur. Je portai ainsi la terrine avec son bain de sable dans un endroit bien clos ; je la couvris d'une autre terrine chaude, gueule contre gueule ; j'enourai promptement & avec soin cet appareil, de gros linges que j'avois fortement chauffés ; par ce moyen, j'ai obtenu au bout de 20 jours (8 m'eussent suffi), des cristaux transparents, sans couleur, à 6 pans, tronqués par les deux bouts, & d'une grosseur proportionnée à la quantité de borax brut que j'avois employée.

Il est peut-être important de dire qu'avant de retirer l'excédent de la liqueur qui ne s'étoit pas cristallisée, j'observai avec surprise un rhombe de rayons qui divergeoient très-régulièrement du centre à la circonférence. Ces rayons étoient les rudimens & la route de la matière déjà cristallisée & de celle à cristalliser ; ils étoient aussi plus gros, plus multipliés du côté où la terrine avoit été le moins couverte, par conséquent plutôt refroidie ; c'est aussi de ce même côté où il y avoit le plus de cristaux, mais en même temps moins réguliers. Cette observation justifia les Hollandais du soin qu'ils ont de faire refroidir la liqueur par degrés insensibles, & de ne pas la porter subitement au frais, comme il est d'usage chez la plupart des chimistes, à dessein d'accélérer la cristallisation de leurs sels.

Craignant que mon borax raffiné n'eût souffert quelque décomposition, quelque altération, en un mot qu'il ne contint pas essentiellement autant de cuivre que M. Cadet en a reconnu dans celui que les Hollandais nous envoient sous le nom de *borax raffiné* ; d'ailleurs, instruit par état que des artisans de Paris faisoient moins de cas d'un borax raffiné par des particuliers de cette capitale, sous prétexte qu'il pécille trop dans le feu, qu'il a une couleur aussi verdâtre que celui de Hollande est blanc, & qu'il ne brase pas aussi-bien, ni ne vitrifie pas si facilement, je craignois que le principe de cette couleur verte, visible dans le borax raffiné à Paris, invisible, mais reconnu par M. Cadet dans celui d'Hollande, je craignois, dis-je, que mon borax n'eût pas les mêmes propriétés qu'on desire en médecine, en chimie, pour la teinture, & dans la métallurgie. Voici ce que j'ai fait à cet égard : mon borax raffiné réduit en poudre, s'est assez bien dissous dans l'esprit-de-vin ; arrosé de vinaigre, il n'a point fermenté, il m'a paru avoir constamment toutes les propriétés d'un sel neutre ; il n'a produit d'effervescence qu'étant dissous dans l'eau, & en lui associant peu-à-peu les acides nitreux, ou marins, ou vitrioliques. Ces combinaisons m'ont donné des liqueurs d'un jaune laiteux, & assez analogues à celles qui résultent de l'alcali du sel marin, saturé séparément par chacun des trois acides minéraux. J'ai tiré de celui qui étoit combiné avec l'acide vitriolique, la substance saline, connue sous le nom de *sel fédatif* ou

Chimie, Tome II,

sel narcotique de vitriol. Mon borax exposé sur des charbons enflammés, s'y est liquéfié & a bouillonné ; l'odeur me parut d'abord suave, & ensuite alcaline, urineuse. Le borax mis dans un creuset, s'y est converti en une masse vitriforme. Ce verre salin & tendre, dissous dans de l'eau, mis ensuite à évaporer jusqu'à pellicule, le borax a repris sa première forme cristalline. Ces cristaux avoient la même propriété qu'avant de subir l'action du feu, la même qualité fondante & vitrifiante ; dissous de nouveau, & arrosés d'alcali très-volatil, ils n'ont donné aucune teinte bleue. Cette expérience est la pierre-de-touche ordinaire, pour reconnoître si une substance contient ou non du cuivre.

Mais comme la lecture des mémoires de M. Cadet sur le borax, annonçoit que le cuivre étoit non-seulement déguisé, mais encore qu'il y entroit, comme partie essentielle à sa manière d'être, & n'osant, pour les raisons que j'ai exposées, me rendre à une telle assertion ; ayant d'ailleurs exécuté mes opérations avec le borax le moins vert, & ayant banni tous instrumens cuivreux, tout m'engageoit à répéter les expériences décrites par l'académicien, d'autant plus que M. Modet, chimiste renommé à Pétersbourg, n'a jamais pu découvrir quel étoit le principe de la couleur verte du borax brut. Indépendamment des expériences faites par M. Cadet, & que j'ai répétées, j'en ai tenté un grand nombre d'autres que je ne rougirai pas de rapporter. Elles pourroient paroître singulières, si je n'exposois ici celles ont été mes réflexions sur le borax, telles que les différences entre la cristallisation & la couleur du borax brut & du borax purifié ; je me suis fait cette objection. Le borax seul ne donne point à la flamme de l'esprit-de-vin une teinte verte, tandis que le sel fédatif, tiré par la combinaison du borax & de l'acide vitriolique, donne avec l'esprit-de-vin une flamme d'un vert de cuivre rouillé. Ce phénomène ne dépendroit-il point d'une portion de cuivre qui se trouveroit unie à l'huile de vitriol, acide minéral que l'on retire souvent des pyrites sulfureuses, un peu martiales, mais qui contiennent quelquefois aussi du cuivre ?

1°. J'ai pris du même acide vitriolique, dont je m'étois servi pour extraire le sel fédatif ; j'ai versé dessus de l'alcali volatil, & il n'a point paru de teinte bleue.

2°. L'un d'un acide paroît être vitriolique, uni au borax, l'un & l'autre réduits en poudre, & enveloppés dans un papier blanc, que j'ai trempé ensuite & en cet état dans de l'esprit-de-vin, puis présenté à une bougie allumée, la flamme n'a point paru verte.

3°. Le sel de glauber est composé de l'acide vitriolique & de la base alcaline du sel marin, telle qu'on la démontre dans le borax. J'ai fait un mélange du sel de glauber avec le borax ; j'ai procédé

M m m

comme ci-dessus : la flamme n'a point changé de couleur.

4°. D'après les mêmes considérations, j'ai essayé le borax avec le tartre vitriolé, avec le sel de cuisine, avec le gypse de Montmartre, la flamme a toujours été constante, c'est-à-dire, sans couleur cuivrée.

5°. Les vitriols naturels, blancs & verts, mais très-purs, pulvérisés séparément avec le borax ou sans borax, & jetés dans l'esprit-de-vin enflammé, n'ont point altéré la couleur de sa flamme.

6°. Les vitriols du commerce contiennent plus ou moins de parties cuivrées. Aussi ont-ils donné, étant unis au borax, une couleur verte à la flamme de l'esprit-de-vin. Le vitriol blanc factice, & non mêlé avec le borax, n'a cependant point altéré la flamme. Le vitriol vert factice non uni au borax, en a fait autant ; le vitriol bleu factice non pulvérisé avec le borax, a seul donné à la flamme de l'esprit-de-vin une teinte légère de vert.

7°. J'ai traité ces mêmes substances solides, tantôt avec le borax d'Hollande, tantôt avec celui que j'avois raffiné ; enfin je me suis servi, au lieu d'esprit-de-vin ordinaire, tantôt d'ether vitriolique, & tantôt de la liqueur vitriolique d'Hoffman. Toutes mes expériences n'ont rien offert de plus. Je conviendrai cependant qu'en jetant dans de l'ether enflammé, le sel fédatif préparé avec non borax, la couleur verte paraît infiniment plus belle qu'avec de l'esprit-de-vin.

D'autres expériences faites, tant chez moi que chez divers artisans, m'ont assuré que le borax que j'avois raffiné, vitrifioit très-promptement les pierres, facilitoit singulièrement la fusion de l'or, de l'argent & du cuivre. (Comme le borax a la propriété de pâlir l'or dans sa fusion, les raffineurs ont soin de joindre à ce flux ou fondant, du nitre ou du sel ammoniac qui maintient l'or dans sa couleur naturelle.) On l'a aussi employé avec succès, pour braser & souder ces métaux les uns avec les autres, même avec le fer. Un teinturier très-habile dans son art, m'a assuré qu'il donnoit éminemment de l'éclat aux étoffes de soie, & qu'il lui paroissoit avoir au moins toutes les qualités du plus beau borax d'Hollande. On s'en est servi avec succès pour blanchir les dentelles.

Je reviens à la liqueur restante de la première cristallisation : je l'ai fait évaporer assez rapidement au degré d'ébullition & au bain de sable. J'ai transféré la liqueur dans une tertine que j'ai couverte d'un simple papier gris ; je l'ai portée au frais, & j'ai obtenu au bout de trois jours des cristaux moins transparents, tumultueusement groupés, en un mot semblables au borax de la Chine, que les Hollandais nous vendent sous le nom de *borax demi-raffiné*. Non content de ces imitations des différentes sortes de borax plus ou moins raffiné, j'ai dissous de nouveau du *borax gras brut*. Je n'ai passé la dissolution que par un tamis de crotin, & je n'ai obtenu que des cristaux confus, colorés &

assez obscurs. Ainsi l'on peut dire que le borax demi-raffiné des Chinois, travaille en Chine ou dans le Bengale, est imparfait, moins pur que les corps étrangers qu'on seroit en droit d'y soupçonner, vu son opacité & sa difficulté de recristallisation, que parce que ces espèces de cristaux ne contiennent pas essentiellement tout ce qui entre dans la composition d'un borax bien clair, & fait suivant les principes de l'art ; mais ceci demande une explication plus détaillée & des exemples.

Nous avons vu que le borax brut terreux contient des cristaux de ce même sel, & qu'ils sont d'un vert de poireau, presque opaques & thomboidaux ; nous avons vu aussi que le borax raffiné est au contraire en cristaux assez transparents, & d'une figure communément octogone. J'ai pris des cristaux de borax verdâtres & opaques ; je les ai dissous, & j'en ai obtenu par l'évaporation des cristaux d'un vert plus clair, plus purs, mais thomboidaux.

J'ai dissous une partie de ces mêmes cristaux verdâtres, & sans en séparer la terre visqueuse & saline, qui leur sert comme de matrice, & j'en ai obtenu des cristaux octogones ; donc la terre saline du borax est essentielle à la nature & à la configuration de ce sel, indépendamment des autres préparations requises, lorsqu'on veut avoir des cristaux bien réguliers, précautions qui dépendent de la quantité du dissolvant, de la force du feu, du degré d'évaporation, de l'équilibre que la liqueur éprouve en se refroidissant, de son refroidissement même, & de plusieurs autres circonstances que les gens de l'art sentent de reste, mais que les Chinois, ou plutôt les Péngalois, & d'autres nations, méprisent & ignorent.

Des chimistes, disons plutôt les ouvriers du laboratoire Hollandois dont j'ai parlé, m'ont dit aussi que les dernières cristallisations de leur borax raffiné étoient opaques ou rousses, parce qu'ils n'y portoient pas autant d'attention que pour la première cristallisation, & qu'ils vendoient ce borax pour du borax demi-raffiné de Chine, mais qu'il falloit le bien donner de garde de le confondre avec le véritable *tinkal*, cette drogue si recherchée dans l'Inde orientale, & dont les auteurs ont parlé avec beaucoup d'obscurité. Le *tinkal* est le *rynaxar* des arabes ; le borax raffiné est le *nitron* des anciens grecs, le *borité* des hébreux. (Car le *nitron* ou *nather* des hébreux est le *natron*, & quand les anciens grecs se servoient du *natron*, ils disoient seulement *nitron* ; le *χρυσωχάλα* ou le *χρυσωχάλα* des grecs modernes ; le *baurach* ou *bora* des Arabes, le *borick* des Persans, le *borax* des latins & le *burach* des Turcs. Enfin le *tinkal* n'est, à proprement parler, que la terre visqueuse & saline du borax, celle qui sert de matrice aux cristaux de ce sel encore brut. On m'a assuré que le *tinkal* est infiniment plus efficace pour la fonte des pierres, & pour braser & souder les métaux, j'en ai proposé l'expérience à un chaudronnier ;

elle lui a très-bien réussi. On m'a dit encore que le *tinkal* est plus efficace en médecine que le borax. Je fais aussi que les apothicaires d'Allemagne achètent beaucoup de borax brut, & l'emploient ainsi pour les maladies des femmes. (1)

J'ai examiné la terre que j'ai ramassée sur les filtres de laine & de papier; elle est légère, d'un gris blanchâtre, tenace, d'un goût visqueux, comme infipide. Je l'ai exposée à l'air libre pendant un mois; elle a augmenté sensiblement de poids, & la saveur propre au borax s'y est décelée de nouveau; phénomène qui me confirme de plus en plus que la matrice terreuse des sels, celle qui est connue partie intégrante du sel même, se convertit peu-à-peu en substance saline. Il en faut seulement excepter la terre absolument pure, & qui n'a point été attaquée ou combinée; elle reste élémentaire.

Maintenant nous favons d'où se tire le borax, & comment on s'y prend pour l'extraire & le purifier. Nous pouvons désormais le raffiner nous-mêmes; nous avons intérêt de partager avec les Hollandais le commerce lucratif de ce sel.

Peut être que si l'on faisoit beaucoup d'expériences sur les terres glauqueuses de la nature de celle de l'alun, ou de la marne combinée avec des sels alcalins, &c. parviendrait-on à découvrir en Europe des matériaux propres à faire en grand le borax.

Si j'avois plus de temps à moi, je continuerois mon travail sur cet objet. Trop heureux si je pouvois parvenir à une découverte si importante pour les progrès de la chimie, & si utile pour le commerce de la patrie.

Nous avons déjà l'exemple d'un particulier de Dresde, qui découvrit en 1755, dans l'électorat de Saxe, une terre minérale dont il composa un borax propre à la fondure & à fondre l'or & l'argent. Les commissaires chargés par le gouverneur d'en faire l'examen, ont jugé que ce borax avoit toutes les propriétés de celui qu'on raffinoit autrefois à Venise. (2)

Tout ce que j'ai rapporté dans cet article, tend à confirmer de plus en plus les connoissances que nous avons déjà sur le borax; savoir:

1°. Que la matière première du borax est fossile, & se trouve en Perse & dans le Mogol.

2°. Que la terre grasse & visqueuse qui englobe le borax, entre essentiellement dans la composition de ce sel.

3°. Qu'on peut purifier ce sel à l'aide de l'eau pure, & que l'eau de chaux vive y paroit inutile, d'autant plus que si l'on verse de l'eau de chaux dans la lessive filtrée du borax, il se fait aussitôt un dépôt grisâtre qui annonce une sorte de décomposition, laquelle me paroit être de la nature de la terre du *tinkal*. Le point nécessaire à la cristallisation s'annonce par des flocons salins semblables à ceux du sel sédatif sublimé.

4°. Que le borax est un véritable sel neutre; il ne tombe point en déliquescence, mais en efflorescence.

5°. Qu'il se fond, se calcine & se vitrifie, sans se décomposer.

6°. Qu'en raison de sa terre, ce sel exige beaucoup plus d'eau pour entrer en dissolution, qu'il n'en tient dans l'état de cristallisation. J'ajoute qu'il semble que par des dissolutions répétées, on réduit presque toute la base de ce sel onctueux, à un état comme terreux.

7°. Que la base du borax est alcaline, terreuse & minérale, & qu'elle a beaucoup de rapport avec l'alcali du sel marin, & notamment avec le natron d'Egypte.

8°. Que la portion de principe cuivreux qui se trouve cachée dans toutes les espèces de borax, n'est point un être de raison, & qu'il y existe, & que s'il n'y est point essentiel, au moins il ne nuit point à ses propriétés; en un mot, que son origine est due autant & même plus à une espèce d'intervention locale, qu'au produit des usines dont on s'est servi pour la purification ordinaire de ce sel, & dont nous avons fait mention.

9°. Que la différence des cristaux de borax raffiné, comparés à ceux du borax brut, dépend de la terre *tinkal* qui se trouve combinée dans le borax purifié, tandis qu'elle sert presque uniquement d'enveloppe aux cristaux de borax brut.

10°. Enfin, que la matière grasse, saline, terreuse & vitrescible du borax brut, est le *tinkal* si célèbre des Chinois, & jusqu'à ce jour si peu connu en Europe.

Aux détails précédents donnés par M. Bomare, j'ajouterai une note tirée des annales de chimie, tom. 2. pag. 299.

M. Saunders qui a accompagné M. Hastings dans le Thibet en qualité de chirurgien, a fait une foule d'observations intéressantes sur les productions naturelles de ce pays. Parmi ces observa-

(1) Le borax est estimé comme un excellent apéritif, propre à dissiper les humeurs épaisses & visqueuses; on en fait un usage fréquent dans la suppression des règles de femmes, & des lochies; on le regarde aussi comme un cosmétique propre à blanchir le teint, & à faire passer les taches de rousseurs. Nous avons dit que c'est avec le borax & l'acide sulfurique qu'on obtient le sel fédéral d'Homburg, qui est fort estimé pour calmer les effervescences & les réveries, dit M. Bourgeois.

(2) M. Baumé a donné en 1767, un procédé pour fabriquer du borax, lequel consiste à faire digérer séparément de la graisse avec des matières vénéneuses très-amoussées, telles que du sable, de la terre, de l'alun, de l'argile & du quartz, & un peu d'eau. Voyez ce procédé qui a occasionné quelques discussions chimico-polémiques, dans l'*avant-courier*, avril 1767, mois de décembre, & suivant Lemerre, traité des drogues, dit que l'on fait du borax artificiel avec du nitre brûlé par les charbons, de l'alun &c. de l'urine. On fait cuire le tout en/cuivre jusqu'à sécher, & l'on y ajoute, dit-il, d'autres matières, sans qu'il y ait d'indication de ce travail.

ions, on en trouve sur l'origine du tinkal que nous croyons devoir faire connoître.

On n'avoit pu jusqu'à présent que former des conjectures sur la nature & l'origine du tinkal, mais aujourd'hui cette substance est bien connue; elle se trouve dans le Thibet, d'où elle nous vient, & les sources qui la fournissent sont si abondantes, qu'on ne doit pas craindre de les tarir.

Le tinkal est un *sulfate* qui se vend dans les marchés du Thibet tel qu'on le retire du lac où on le trouve, nous le raffinons ensuite, & il prend alors le nom de borax. Le *rock-salt* se présente aussi très-abondamment dans le Thibet. Le lac où on va chercher le tinkal & *rock-salt*, est à 15 journées de chemin &c au nord-ouest de Tiffolemba; des rochers & des collines l'entourent de toutes parts. On ne voit aucune rivière ni aucun vaisseau dans son voisinage; mais plusieurs sources salées lui donnent leurs eaux, dont les habitants du pays ne font aucun usage à cause de leur saveur. Le tinkal se dépose ou se forme sur le fond du lac; ceux qui vont le recueillir, l'en enlèvent en masses considérables; on le brise ensuite pour pouvoir le transporter avec plus de facilité, & on fait sécher le tinkal en l'exposant à l'air.

Quoique ce lac produise depuis très-long-temps du tinkal, la quantité de ce sel ne paroît pas cependant diminuer. Comme les trons que l'on fait en le retirant du lac le trouvent bientôt remplis, le peuple croit que le tinkal se régénère continuellement. On n'en a pas encore rencontré ni dans des terrains secs, ni dans des lieux élevés; mais il se trouve dans les plus petits ruisseaux & sur les bords des lacs dont les eaux reposent sur un terrain dont la pente augmentant graduellement depuis leur bord jusqu'à leur centre, leur donne trop de profondeur pour qu'on puisse en retirer facilement le tinkal.

Le *rock-salt* ne se présente pas dans les endroits où il y a peu d'eau; ce sont les parries les plus profondes du lac qui le fournissent. L'augmentation des eaux du lac est peu considérable; les sources qui le forment lui donnent un volume d'eau qui est le même en tout temps, & ses eaux n'ont aucune issue pour s'échapper. Ce lac a 20 milles de circonférence; il est gelé une grande partie de l'année & les glaçons qui le couvrent dès le mois d'octobre forcent les ouvriers d'abandonner leurs travaux à cette époque.

BORATE DE SOUDE. (Pharmacie.) Autrefois on employoit le borate de soude ou borax en médecine, on le rangeoit parmi les sondans, les diurétiques, les emménagogues, les spermatopées; bientôt les plus célèbres auteurs de matière médicale, d'accord avec les praticiens les plus expérimentés, ont fait voir que la plupart de ces vertus étoient imaginaires, ou au moins que le borax ne les possédoit que dans un degré très-foible. Alors on s'est contenté de le proposer & de l'employer

même dans les maladies externes; on l'a cru propre à dessécher les dartres, les boutons de la gale, à déterger les vieux ulcères & à rassermir les chairs; enfin sous le prétexte qu'il faisoit disparaître les taches de la peau, on a borné son usage à quelques préparations cosmétiques; & Charas le faisoit entrer dans son *eau de columbes cosmétique*, *agua columbarum cosmetica*. Aujourd'hui le borate avec excès de soude, ou le borax, n'est plus employé dans les pharmacies que pour en extraire l'acide boracique, qui, lui-même, ne sert que très-rarement.

BORATE DE TUNGSTÈNE. On ne connoît point du tout la combinaison de l'acide boracique avec l'oxide de tungstène; aucun chimiste n'a encore employé ce sel.

BORATE DE ZINC. On n'a que peu de connoissances sur le borate de zinc; l'acide boracique n'a pas par lui-même d'action sur le zinc; mais il paroît qu'il s'unit à son oxide. Bergman fait remarquer, dans sa dissolution sur les attractions électives, que la dissolution de borate de soude neutre précipite celle du zinc, que le précipité est presque insoluble. Voilà le seul fait que l'on sache sur le borate de zinc.

BORAX. C'est le nom usuel & primitif du borate de soude avec excès. Voyez l'article **BORATE DE SOUDE**.

BOTANICON. (Pharmacie.) Surnom donné à une espèce d'emplâtre composée de différentes plantes, & dont Paul donna la description.

BOTANIQUE. (Pharmacie.) On n'insère dans ce dictionnaire le mot botanique par rapport à la pharmacie, que pour faire connoître à quel point cette science doit concourir au perfectionnement de l'art du pharmacien. Il est impossible d'exiger de celui qui se livre à la préparation des médicaments, qu'il soit botaniste, puisqu'on ne peut le devenir dans le vrai sens qu'on attache aujourd'hui à ce mot, que par une étude très-longue & très-approfondie de cette science; par une étude opiniâtre qui demande un homme tout entier; mais il est nécessaire que le pharmacien connoisse assez les principes de la botanique, son langage & sa marche, pour lire les ouvrages qui traitent des plantes, pour bien entendre leur description, pour aller même jusqu'à concevoir au besoin la synonymie, enfin pour se faire entendre lui-même de ceux qui s'occupent de la science des végétaux. Un des principaux avantages de la connoissance de la botanique, & spécialement de la méthode descriptive & des systèmes, c'est de guider le pharmacien dans la distinction des plantes médicinales, c'est de lui apprendre à les recueillir lui-même, c'est de lui faire éviter les qui-proquos qui peuvent

être dangereux. A ce dernier égard même le pharmacien doit étudier les différences des racines, des écorces, des feuilles & de toutes les parties des végétaux sèches & isolées, avec plus de soin encore qu'on ne le fait en botanique, afin de les bien reconnoître, de savoir distinguer leurs différens états, d'apprécier leurs alterations, de les choisir en un mot ou de les rejeter, & de les employer dans l'état convenable. Voilà ce qui doit être la portion de botanique nécessaire au pharmacien, & sans laquelle il ne peut exercer son art avec assurance. Il faut qu'il y joigne la connoissance des plantes usuelles qui croissent dans le canton qu'il habite, afin de se les procurer au besoin & de ne pas s'exposer soit à promettre ce qu'il ne peut pas facilement le procurer, soit à refuser ce qu'il possède. Sous ce point de vue les élémens de la botanique doivent donc faire une partie essentielle des études du pharmacien, & l'on a beaucoup trop négligé cette science dans les livres destinés à développer les principes de cet art.

BOTRIS VULGAIRE ou PIMENT. (Ph.) *Chenopodium botris*, *Botris*, Dod. *Pempt.* 34. Cette plante est odorante, annuelle, croît spontanément dans les lieux secs, incultes & sablonneux de l'Europe australe, & des provinces méridionales de la France. Nous la cultivons dans notre jardin botanique.

Elle estpectorale, incisive, emménagogue, diurétique, sudorifique, carminative, stomacique, antispasmodique, laxative; contre la toux convulsive, la cardialgie, le gonflement des hypochondres, l'affection hystérique. Lemerit dit que l'infusion de ses feuilles est bonne pour le crachement de sang, pour les maladies des femmes en couches & contre l'asthme. Matthioli rapporte qu'elle est singulièrement utile dans l'empyème purulent. Elle est, dit-on, l'antidote de l'aconit. L'herbe bouillie dans de la lessive tue la vermine; son odeur préserve les habits des teignes. Bartholin rapporte que cette plante ensemencée avec le froment & autres grains, les préserve des insectes. Cartheuser a donné un petit traité particulier sur cette plante; elle est officinale en Autriche & à Paris. M. Hermans conseille son eau distillée aux enfans qui ont le ventre enflé; on leur fait prendre à la cuillerée: elle est aussi carminative.

(M. WILLEMET.)

BOTRYTES ou BOTRYTIS. (Pharmac.) Ce mot qui est dérivé du grec & qui signifie, semblable à une grappe de raisin, se trouve souvent dans les anciens pharmacographes pour distinguer une espèce de cadmie. Voyez ce mot

BOUCAGE, BOUQUETINE, ou PERSIL de BOUC. (Pharmac.) *Pimpinella saxifraga*.

Tragopetium minus T. 309. Cette plante est indigène dans toute l'Europe, ombellifère, perennelle; on la trouve sur les pelouses, dans les friches sèches & arides.

Elle est apéritive, détersive, sudorifique, vulnérinaire, résolutive, favoneuse, cosmétique, salivatoire, contre les maladies vénériennes, le scorbut, la colique, les tranchées, les fièvres intermittentes, la toux, l'asthme, la jaunisse, le cancer, les ulcères, les écorceuses; propre à briser la pierre du rein & de la vessie, à résister au venin, à la malignité des humeurs, à lever les obstructions, à exciter les urines & les règles; étant prise en poudre & en décoction, son usage est tant interne qu'externe, on emploie la racine, les feuilles & la semence. Rai présente pour l'usage intérieur la poudre de la racine à notre poivre ordinaire; il la regarde comme plus tempérée & moins échauffante; il conseille aussi les pastilles faites avec cette même racine & le sucre, pour l'estomac froid & paresseux. Les Allemands en font grand usage. C'est l'antidote du mercure. On peut s'en servir encore contre les maux de dents, d'oreilles, de narines & de gorge, la luette relâchée. Il faut choisir cette racine un peu aromatique, entière, blanche en dehors, plus blanche à l'intérieur, d'une saveur un peu piquante: il faut la dessécher avec précaution. Cette racine entre dans la poudre stomacique de Birekmann. L'herbe dans l'eau vulnérinaire d'Autriche faite au vinaigre. Gessner dit que son eau distillée fait tourner le lait; c'est ce que je ne crois pas, c'estoit la plante favorite de Sthal: elle passe pour un si bon vulnérinaire, qu'on assure que quinze mille Hongrois lui dûrent leur guérison après une bataille. La pharmacopée de Wirtemberg donne la préparation de l'extrait & de l'essence de cette pimprenelle. Linnéus recommande l'usage de sa confiture & de son eau distillée, contre le coryza: elle est un excellent foie. Jean Casimir Hert, professeur de médecine en l'université de Gießen, a fait soutenir une thèse sur l'utilité de cette plante.

(M. WILLEMET.)

BOUCAGE (grand) ou PIMPRENELLE BLANCHE. (Pharmac.) *Pimpinella magna*, *Tragopetium majus* T. 309. Cette espèce présente un port supérieur à la précédente, elle croît également dans les lieux incultes, montagneux, & sur le bord des bois. On trouve sur cette pimprenelle une sorte de cochenille, ou kermès sauvage, propre à la teinture: cette plante possède les mêmes propriétés que la précédente. Elle entre dans l'eau générale, la poudre d'acier, le sirop de grande consoude, & dans celui de guimauve. Le dispensaire de Brandebourg donne la préparation d'une essence & d'un extrait de pimprenelle blanche. L'on peut substituer sa semence à celle du persil de Macédoine.

Ernest-Frédéric-Justin Heimrich a fait une dissertation en faveur de cette plante.

Elle est un bon fourrage pour le bétail.

On peut rapporter ici ce qui regarde la pimprenelle noire, attendu que c'est une variété de la *pimpinella magna*.

Louis-Jean-André Harnisch, médecin praticien à Gérain en Allemagne, a publié l'ouvrage suivant sur les éminentes propriétés de la pimprenelle noire : *Meditationes botanico medicæ de planta quadam marchia propria pimpinella nigra, quibus demonstratur, illam in multis morbis insignem possidere virtutem & efficaciam*. C'est de cet auteur que nous allons parler. Indépendamment de la description de cette plante, Harnisch traite de ses vertus alexipharmiques & diurétiques, contre tous les érysipèles les plus invétérés. Il donne des observations qui contiennent les guérisons qu'il a opérées avec ce végétal, contre les maladies hystériques, les gouttes vagues, les petites vérolés malignes, les fièvres pétéchiales, les catarrhes fusoïens, les ulcères malins & autres maladies : c'est, suivant Harnisch, le plus grand dépuratif du sang qu'il soit possible d'employer.

(M. WILLEMET.)

BOUCHONS. Quoique les bouchons paroissent ne mériter aucune attention, tant ils sont connus de tout le monde, cependant il est certaines considérations importantes à faire sur les bouchons ; nous ne parlerons ici que des bouchons de liège parce que nous revenons sur ceux de cristal au mot **FLACON**.

Les bouchons de liège sont d'un grand usage aujourd'hui dans les opérations de la chimie, ils servent à fixer dans le col des bouteilles de Woulf les tubes de communication. On les perce dans leur milieu d'un trou avec une lime ronde nommée queue de rat, ou bien avec une broche de fer rouge. Ce trou doit être fait de telle grandeur que le tube y entre avec peine. Il faut avoir attention de graisser avec un peu de suif ou de savon la surface du tube, afin qu'il glisse avec moins d'efforts.

Les bouchons qui doivent servir aux opérations dans lesquelles il y a des fluides élastiques très-subtils à retenir, seront choisis d'un liège bien ferré, & le moins cavernueux possible. Il est bon & même essentiel de les plonger avant de s'en servir dans du suif, de la cire, de la résine ou un mélange de ces différentes matières, par-là on bouche les pores du bouchon, & l'on est dispensé de lutter avec du lut gras, comme on le ferait sans cela.

Il faut pour cela que le bouchon entre avec force dans le goulot du flacon, & que le tube entre de même dans l'intérieur du bouchon.

On voit un des bouchons percé dans son milieu, fig. 52. *cl. 6*.

On se sert dans les arts, faite de bouchons de cristal, de bouchons de cire, pour boucher des

bouteilles qui contiennent d.s liqueurs brûlantes, comme des acides concentrés, &c. Souvent les grandes bouteilles où l'on renferme les acides dans le commerce n'ont pas l'ouverture disposée convenablement pour admettre un bouchon de liège.

BOUES ARTIFICIELLES. (*Pharmacie.*)

On fait que beaucoup d'eaux minérales contiennent au fond de leurs bassins une grande quantité de dépôts onctueux, noirâtres, plus ou moins odorans ou fétides, composés de terre argilleuse, de matière calcaire, de soufre, d'oxide de fer, & qui laissent dégager beaucoup de gaz hydrogène sulfuré. Ces boues sont employées avec succès dans la plupart des maladies des articulations, de la peau, & sur-tout dans celles de ces maladies qui ont résisté à de longs traitemens. Il n'est donc pas étonnant qu'on ait cherché à les imiter artificiellement, en mêlant ensemble des terres, du soufre, de la chaux, de l'oxide de fer, & en arrosant ces mélanges d'une certaine quantité d'eau. On peut même dire que les boues artificielles doivent l'emporter par leurs vertus sur les boues naturelles, puisqu'on est le maître en les composant d'en varier les principes de telle sorte, qu'elles soient plus ou moins actives suivant les indications qu'on se propose de remplir. On parlera plus au long de ces compositions artificielles au mot **Eaux minérales**.

BOUGIES. (*Pharmacie.*) C'est la forme allongée & conique qui a déterminé la dénomination de bougies pour ces médicaments. Les idées fausses qu'on s'est formées sur de prétendus ulcères, & sur-tout sur les prétendues carnosités dont on croit l'urètre garnie dans la plupart des affections de ce canal qui succèdent aux maladies vénériennes, ont conduit à varier les préparations des bougies & à y employer autant de remèdes différens qu'on l'a fait dans les médicaments qu'on applique sur les maladies externes, mais il est infiniment vraisemblable que la seule forme mécanique, la présence, la pression & le resserrement successifs des bougies en font, sinon toute, au moins la principale vertu. Cependant comme beaucoup d'hommes de l'art croient encore que la matière dont on enduit les fils ou les toiles qui forment la base des bougies, doit être variée suivant l'état du canal de l'urètre, nous donnerons ici la composition ou la manière de préparer les bougies, confectionnée dans la pharmacie de M. Baume.

Les bougies, dit-il, sont de petites bandes de toile, ou bien des brins de coton ou de fil, enduits & parfaitement recouverts d'emplâtre ; elles sont un peu plus grosses par un bout que par l'autre & roulées en forme de petites cylindres un peu coniques de 8 à 10 pouces de long, & à-peu-près grosses comme des tubes de pipes, quelquefois plus grosses & quelquefois plus petites. Elles

servent à introduire dans le canal de l'urètre pour guérir les ulcères & les carnosités.

On entend assez ordinairement par bougies un remède particulier, comme si cette espèce de médicament devoit être composé toujours avec les mêmes matières; mais on peut comparer les plaies de l'urètre à celles qui sont à l'extérieur, & sur lesquelles il convient d'appliquer des médicaments relatifs à l'état actuel de ces mêmes plaies; & l'on peut composer des bougies avec autant d'espèces d'emplâtres & d'ingrédients qu'on juge à propos. Celui qui les emploie doit assortir leur composition aux indications qu'il se propose de remplir, & l'apothicaire qui les prépare doit leur donner la forme & la consistance convenable. Les bougies doivent être très-flexibles sans être molles, point cassantes, & formées de manière que la matière empyastique ne puisse ni se fondre ni se détacher du linge qui se trouve dans l'intérieur, & la bougie ne doit point se déformer pendant le temps qu'elle reste dans l'intérieur de l'urètre. Nous prendrons pour exemple de la préparation des bougies, celle qu'on prépare avec l'emplâtre de vigo & le mercure.

On prend un petit faiseau de fil de coton, de 8 pouces de long, on en coupe quelques brins de différente longueur afin de les étager; on attache le gros bout avec du fil; on plonge cette mèche dans l'emplâtre de vigo avec le mercure qu'on a fait liquéifier, & lorsqu'elle en est bien imbibée, on la retire de l'emplâtre, on la suspend en l'air afin de la faire refroidir; on en prépare de cette manière une aussi grande quantité que l'on veut. Ensuite on prend ces mèches refroidies; on les pose sur une table de marbre bien unie & imprégnée d'une très-petite quantité d'huile; on les roule avec la paume de la main ou encore mieux avec une planche bien unie, semblable à celles dont se servent les ciriers pour rouler leurs cierges. On roule ces mèches jusqu'à ce qu'elles soient bien unies & qu'elles prennent l'apparence d'un petit cierge, mais point creux par un bout comme les cierges; on coupe les deux extrémités qui ne se trouvent point garnies de coton, parce que l'emplâtre s'est étendu; on serre ces bougies dans des boîtes afin de les garantir de la poussière.

Les matières qu'on emploie pour soutenir l'emplâtre ne contribuent point à l'efficacité des bougies; il est assez indifférent d'employer du coton, du fil ou des bandes de toile; mais j'ai remarqué qu'elles se préparent mieux avec le coton qu'avec toute autre matière. Lorsqu'on se sert de bandes de toile, il faut les couper en languettes de la même longueur que les mèches précédentes, & les tenir un peu plus étroites par un bout que par l'autre; on les plonge également dans de l'emplâtre liquéfié & on ploie ces bandes sur elles-mêmes, sans les rouler en cornets; on achève de les rouler comme les précédentes.

Lorsqu'on roule ces bandes de toile en cornets, les bougies se forment très-bien; mais lorsqu'elles ont séjourné quelque temps dans le canal de l'urètre, & qu'on vient à les retirer, elles se déroulent & occasionnent beaucoup de douleur; ainsi il vaut mieux plier les bandes de toile comme nous avons dit.

BOUILLONS. (*Pharmacie.*) Les bouillons médicaux sont des médicaments qui ne diffèrent des infusions & des décoctions ordinaires, (*Voyez ces mots,*) que parce que l'on fait entrer des chairs animales dans leur composition, comme du veau, des vipères, des tortues, des écrevisses, &c. ils se font d'ailleurs comme les décoctions. Le veau, les vipères & les tortues ne contiennent rien de volatil. On commence par faire cuire ces viandes, & l'on ajoute sur la fin les matières végétales dans l'ordre qui est indiqué à l'article des décoctions, afin de ne pas perdre les principes volatils des substances qui en contiennent. Lorsqu'on fait entrer des écrevisses dans les bouillons, on les pile grossièrement dans un mortier de marbre avec un pilon de bois, & on ne les met dans la liqueur bouillante qu'avec des plantes dont on veut conserver les aromates; on couvre le vaisseau, & on laisse le tout infuser jusqu'à ce que le mélange soit entièrement refroidi, parce que les écrevisses contiennent un principe volatilagréable, & qui vraisemblablement n'est pas sans vertu.

Les bouillons doivent être passés froids, afin de pouvoir séparer plus commodément la graisse qui reste sur l'étamine lorsqu'elle est figée. La dose des bouillons est depuis un poillon jusqu'à une chopine pour chaque prise.

Telle est la manière dont M. Baumé parle des bouillons dans son traité de pharmacie. Nous ajouterons ici qu'on peut varier singulièrement ces préparations suivant les indications qu'on se propose de remplir; en général les viandes blanches de jeunes animaux quadrupèdes ou des oiseaux, la chair des quadrupèdes ovipares, des tortues & des grenouilles, de la vipère, de quelques poissons, des cloportes & des écrevisses, parmi les insectes, sont la base de ces compositions; on y ajoute des plantes apéritives, acides, antiscorbutiques, aromatiques; on pêche même souvent dans les formules des bouillons par trop de mélange. Les praticiens entassent trop souvent une foule de plantes de différente nature dans les compositions; ils doivent se borner à deux ou trois plantes différentes & à une ou deux viandes tout au plus. Il faut aussi que les bouillons soient faits à petit feu & dans des vases clos; enfin que les plantes n'y soient qu'infusées après la décoction des chairs.

BOUILLONS SECS, ou TABLETTES DE BOUILLON. (*Pharmacie.*)

27 Picots de veau.....	4
Cuiffe de bœuf.....	12 livres.
Rouelle de veau.....	3 livres.
Gigot de mouton.....	10 livres.

On fait cuire ces viandes à petit feu dans une suffisante quantité d'eau, & on les écume comme à l'ordinaire ; on passe le bouillon avec expression : on fait bouillir la viande une seconde fois dans de nouvelle eau, on passe de nouveau, on réunit les liqueurs ; on les laisse refroidir pour en séparer exactement la graisse : on clarifie le bouillon avec 5 ou 6 blancs d'œufs, on ajoute une suffisante quantité de sel marin ; on passe la liqueur au travers d'un blanchet, & on la fait évaporer au bain-marie, jusqu'en consistance de pâte très-épaisse. Alors on l'ôte du vaisseau, on l'étend un peu mince sur une pierre unie. On la coupe par tablettes de la grandeur qu'on juge à propos : on met ces tablettes dans une étuve, jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement sèches & cassantes ; alors on les enferme dans des bouteilles de verre qu'on bouche exactement avec du liège.

Ces tablettes peuvent se conserver 4 ou 5 années en bon état, pourvu qu'elles soient enfermées bien sèchement, comme nous venons de le dire. On peut si l'on veut faire entrer dans leur composition, des volaillies, des racines légumineuses & des aromates, comme quelques clous de giroflées ou de la camelle. La plupart des tablettes de viandes que l'on débite, sont faites avec de la gelée de corne de cerf préparée sans sucre ; elles peuvent être aussi nourrissantes que celles de viande, mais elles sont moins agréables au goût.

Lorsqu'on veut se servir de ces tablettes, on en met la quantité que l'on veut, comme une demi-once, dans un grand verre d'eau bouillants, on couvre le vaisseau & on le tient sur les cendres chaudes pendant un quart-d'heure, ou jusqu'à ce que ces tablettes soient entièrement dissoutes, ce qui forme un excellent bouillon : on lui ajoute un peu de sel, s'il ne se trouve pas suffisamment salé.

Les tablettes de hockai, qu'on prépare à la Chine, & que l'on connoît en France sous le nom de *colle de peau d'âne*, sont des tablettes faites avec des substances animales. On leur attribue la vertu de consolider les vaisseaux de la poitrine. On fait prendre ce remède dans les pulmonies, les crachemens de sang, &c. La dose est depuis un demi-gros jusqu'à 2 gros. On la fait dissoudre dans quelques cuillerées de bouillon ou de thé : on peut encore la laisser dissoudre dans la bouche, comme on fait à l'égard du suc de réglisse. On prend deux prises de ce remède par jour, une le matin à jeun, & l'autre le soir en se couchant.

Le procédé qu'on vient de donner & les remarques qui l'accompagnent, sont extraits de M. Baumé. Ce procédé fournit des tablettes de bouillon très-bonnes & très-saines ; mais on peut les ren-

dre plus succulentes, plus sapides, en ajoutant aux viandes des racines, telles que les carottes, les panais, les navets, les oignons, les porreaux ; on y fait même infuser quelques aromates, le girofle, la muscade, la cannelle. Il en est qui y font entrer des volaillies. Alors ces tablettes de bouillon sont plus fines, plus délicates, plus agréables ; mais elles ne se conservent pas si long-temps ; elles attirent l'humidité, elles sont sujettes à se moisir, à s'altérer, à se ramollir. C'est sans doute ce qui a engagé M. Baumé à simplifier, comme on l'a vu, le procédé des tablettes de bouillon ; les siennes peuvent être embarquées sans crainte dans les voyages de long cours, puisqu'elles se conservent 5 années dans des endroits fecs.

BOUILLON BLANC, ou MOLENE. (Pt.)
Verbascum thapsus, Thapsus barbatus, Gerard. Hist. 283. Plante Européenne, bisannuelle, officinale, commune dans les friches & les bois taillis. On la rencontre à Rhode-Island & dans la Virginie.

Les feuilles & les fleurs de bouillon blanc sont pectorales, anodines, vulnéraires, savonneuses, tempérantes, toniques ; contre le cours de ventre, la dysenterie, le ténisme, les superpurgations, les tranchées, les coliques, les douleurs, le flux des hémorroïdes, la phtisie, la néphrétique, l'angine, le crachement de sang, les hémorrhagies. Elles sont ordonnées à l'extérieur contre les rumeurs, la chute de l'anus & celle de la matrice, les taches du visage, la brûlure, la goutte, l'éczéma, les inflammations en général, &c. Elles des yeux & de la gorge en particulier, les douleurs de dents. Elles sont employées dans la médecine vétérinaire contre la pulmonie, les enclouures des chevaux.

La fleur peut servir à attraper le poisson, ayant la faculté de l'enivrer, au point qu'il est facile de le prendre à la main. Elle peut encore teindre les cheveux en fauve, & nourrir les abeilles. Cette fleur doit être desséchée par une certaine chaleur, même au soleil, attendu que la moindre humidité qu'elle reçoit en séchant, la noircit. C'est une des fleurs pectorales. Elle se prend en infusion, en guise de thé. On peut en retirer une huile par la coction, & une autre par l'infolation, en préparer un onguent. Plusieurs auteurs anciens vantent son eau distillée. Elle entre dans les espèces pour la décoction pectorale.

La feuille entre dans la décoction émolliente de la pharmacopée de Paris, la décoction pectorale, les espèces pour gargarisme émollient, & l'onguent populeum.

Pierre Borel nous assure qu'un paysan ayant été mordu par un serpent à la région de l'estomac, sur soulagé incontinent par l'application des feuilles pilées de cette plante : ce qui confirme le sentiment des anciens à l'occasion de la belette, qui a recours à cette plante comme à sa véritable guérison, lorsqu'elle est mordu d'un serpent.

La racine de bouillon blanc est, dit-on, fébrifuge, antihumatique, vermifuge, bœchique; contre les fluxus, l'apoplexie, les convulsions, les ruptures, les luxations, les contusions. Cette racine récente, & desséchée est un aliment agréable aux poulets, qui les engraisse très-bien. Elle offre encore un excellent remède contre les maladies pulmonaires des bœufs.

Les anciens sermoient des mèches à lampes avec la tige de bouillon blanc.

Jacques Kistler a publié en 1754, à Strasbourg, une dissertation latine sur cette plante.

(M. WILLET.)

BOUILLON BLANC (Petit) ou MOLENE LICNITE. (*Pharm.*) *Verbascum lychnitis*. Cette espèce se trouve dans les endroits montagneux, arides, incultes, & offre des ressources nouvelles à nos maux, que nous devons aux recherches de M. Durande, habile médecin praticien, professeur de botanique à Dijon, & membre de plusieurs académies. Voici ce dont il s'agit. Ce savant médecin lut en 1776 un mémoire, dans lequel il expose les facilités que donne la chimie pour perfectionner la connoissance du règne végétal; il y rapporte l'histoire des expériences qu'il a faites sur le bouillon blanc à petites fleurs, ou molène licnrite. On voit par les détails de son analyse, que les vertus de cette plante dépendent de la proportion dans laquelle se trouvent les parties résineuses & gommeuses; que la fleur donne les mêmes produits que la racine, mais que l'extrait qu'on en fait est moins amer, de sorte qu'en réunissant les fleurs à la racine de cette plante, on est assuré de donner un remède moins échauffant que si l'on n'employoit que la racine, & plus astringent que si l'on se bornoit à prescrire les fleurs. M. Durande a appuyé par plusieurs observations, les conséquences qu'il a tirées de l'analyse qu'il a décrite; elles prouvent que le bouillon blanc à petites fleurs est celui que l'on peut employer avec succès contre la jaunisse. Cette plante n'étoit connue jusqu'ici des pharmacologistes, que relativement à ses propriétés émollientes & résolutes. En conséquence, elle étoit prescrite contre la colique, les tranchées, les écouvelles & les fièvres quatuor.

BOUILLON NOIR ou MOLENE NOIRE. (*Pharm.*) *Verbascum nigrum*. Cette espèce aime également les terres légères, le bord des chemins, elle est pérennelle & assez rare.

Les feuilles & les fleurs peuvent être employées aux mêmes usages que ceux du bouillon blanc vulgaire.

La fleur fournit une substance nutritive aux abeilles. La racine étoit estimée des anciens contre la fièvre. Linné la recommande contre les parais. Il assure de plus qu'elle est stupéfiante. Haller dit qu'on la donne avec succès dans la pituite pulmonaire & aux personnes sujettes à la toux. Scopoli

Chimie. Tome II.

assure qu'elle est employée comme un remède souverain contre l'inflammation des poumons dans les bœufs.

La sémence a été quelquefois mise en usage anciennement dans les luxations. Wallis dit qu'elle enivre les poissons.

(M. WILLET.)

BOULEAU. (*Pharmacie.*) *Betula alba, Betula*. C. B. 427. C'est l'arbre de la sagesse ou le sceptre des maîtres d'école, parce que ses petites branches fournissent non-seulement des balais, mais bien encore l'instrument propre à corriger les écarts des enfans.

Le bouleau est indigène aux forêts de l'Europe. M. Thunberg a observé dans la ville de Nagasaki, un herbier dans lequel on lui a montré un échantillon de cet arbre qui avoit été cueilli dans le Japon.

Indépendamment d'une foule de qualités rurales & économiques reconnues à cet arbre, il présente dans ses feuilles, son écorce & sa sève, des médicaments apéritifs, détectifs, résoluts, diurétiques, antispasmodiques, fondans, expectorans, diaphorétiques, odontalgiques, cosmétiques; contre l'hydropisie, la jaunisse, le scorbut, la cachexie, la dysurie, la strangurie, le pissement de sang, la petite-vérole, la goutte, la mélancolie hypochondriaque, les ulcères de la tête, les maladies cutanées.

La liqueur du bouleau que l'on retire par la réfraction faite au tronc de cet arbre au commencement du printemps, est agréable à boire; mêlée avec le vin, elle le fait mousser. L'on peut préparer avec cette liqueur diverses boissons vineuses; elle contient du sucre.

On retire des chatons du bouleau une cire semblable à celle des abeilles.

L'écorce est employée par les tanneurs. Les Lapons préparent un onguent avec son épiderme & la résine. Cette épidémie est comme bitumineuse; mise dans les chaussons, elle excite la sueur des pieds. Elle entre dans l'huile moscovite.

Les feuilles sèches fournissent une excellente nourriture aux bœufs, chèvres, moutons & chevaux. Linder donne une manière de faire avec les feuilles de bouleau une couleur jaune propre à la teinture.

Le bois sert aux tourneurs, à faire des sabots & des cercles. C'est le bois néphrétique d'Europe, à cause de ses propriétés diurétiques. Il vaut infiniment mieux que le bois néphrétique exotique.

Cet arbre fournit encore le moxa des Lapons. Son agatir sert au même peuple à fabriquer de l'amadou.

La sève de bouleau forme un très-bon noir pour les imprimeurs.

Le bouleau mérite une place dans les collines escarpées, & pour cacher les parties d'ormes.

N n n n.

Ses bourgeons entrent dans l'onguent des mendians. Le dispensaire de Brandebourg donne la manière de retirer l'huile chimique de bouleau, que les Italiens nomment *baume de Lithuanie*. Le bouleau fait partie de la nomenclature des médicaments simples de la pharmacopée de Paris.

Elie Camérarius a composé un ouvrage sur cet arbre. M. Linné a fait soutenir une thèse à son occasion, ainsi que son disciple M. Kalm.

(M. WILLET.)

BOULEAU NOIR. (*Pharm.*) *Betula nigra*. *Betula nigra Virginiana*. Pluk. *Alm.* 67. Cette espèce est originaire & commune dans la nouvelle Angleterre & la Virginie.

Les Américains se servent en médecine de son écorce & de son suc épais qui est sucré.

(M. WILLET.)

BOULES. *Globuli* (*Pharm.*) On connoît vulgairement sous ce nom quelques préparations médicamenteuses, auxquelles on donne ordinairement une forme arrondie, plus ou moins grosse, soit pour la commodité dans l'usage, soit pour la facilité de la conservation, le plus souvent encore par habitude, & uniquement pour distinguer cette préparation.

On trouve dans quelques pharmacopées sous le nom de boules, *globuli*, plusieurs préparations très-différentes. Ainsi Plenck, dans la pharmacie chirurgicale, donne la formule suivante qu'il nomme *boule contre l'érysipèle*.

Prenez terrefigillée
blanche... deux onces.
céruse }
craie.. }... de chacun une once.

Réduisez ces substances en poudre très-fine, en les broyant sur un porphyre, & y ajoutant peu-à-peu suffisante quantité d'alcool camphré, pour former une masse à laquelle on donne la forme d'une boule. On attribue à cette composition une vertu résolutive, discutive; & quelques praticiens d'Allemagne en recommandent l'usage dans le traitement de l'érysipèle. Ils conseillent pour cela de frotter un papier bleu avec cette boule, & de l'appliquer sur l'affection cutanée.

Le dispensaire de Bruxelles donne la formule suivante sous le titre de *boule carminative*.

Prenez aloës jaune... }
semence de co- } de chacun trois onces.
loquinte..... }
semences de car-
vi..... une once & demie.
de cumin, de se-
nouil..... de chacun une once.
feuilles de fenê.... deux onces.
sucre..... huit onces.

Après avoir pulvérisé & mélangé toutes ces substances, incorporez-les avec parties égales de sirop de bœuf & de miel, pour en former une masse que l'on partagera en boules plus ou moins grosses.

Mais cette préparation, & quelques autres analogues, que l'on trouve dans des dispensaires étrangers, sont entièrement abandonnées de nos jours.

On a aussi donné le nom de *boules* à différents corps arrondis que l'on emploie pour le pansement des fonticules ou cautères. Ces boules font faites de différentes substances, suivant l'objet qu'on se propose de remplir. Ainsi on emploie des boules creuses, faites avec l'or, l'argent, & du volume d'un gros pois, lorsqu'il s'agit uniquement d'entretenir l'ouverture des fonticules. Le plus souvent on se borne à introduire dans l'ouverture du fonticule un pois; mais lorsqu'il s'agit d'exciter la suppuration, on forme des boules de la grosseur d'un pois avec l'emplâtre de cantharides; ou bien, comme l'ont indiqué quelques médecins, on prend parties égales de cantharides, de verdet ou acétite de cuivre, & d'orpiment ou oxide d'arsenic sulfuré jaune; lorsque le tout est en poudre très-fine, on l'incorpore en le malaxant avec suffisante quantité de cire jaune, & on en forme des boules d'une grosseur convenable.

Lorsqu'au contraire le fonticule est dans un état d'irritation & de douleur, on prépare des boules calmantes, en incorporant avec la cire quelques grains d'opium réduit en poudre.

Des anciens écrivains ont aussi donné le nom de *boules* à différentes espèces de pessaires arrondis.

Il est quelques préparations plus familièrement connues sous le nom de *boules*, que nous allons indiquer dans les articles suivans.

BOULE D'ACIER. (*Pharm.*) Cette préparation, très-fréquemment employée dans le public, est connue sous les noms de *boule vulnérinaire*, *boule ou pierre martiale*, *boule de Nancy*. Les médecins Suédois la désignent dans leur dernière pharmacopée sous le nom de *tartrate martial*. Cette boule est une combinaison du *tartrate de potasse* avec le *fer*, & d'après les principes de la nomenclature méthodique, nous la nommons *tartrate de potasse surchargé de fer*. Cette préparation ne diffère essentiellement du sel que l'on nomme *tartrate de potasse ferrugineux*, & communément *tartrate martial*, que par la forme que l'on donne à la masse & les proportions de fer. Dans l'une le *tartrate de potasse* est en moindre quantité que dans l'autre, & il y reste une certaine quantité de fer en état d'oxide, ou incomplètement combiné. Dans l'autre au contraire, le *tartrate de potasse* n'est chargé que d'une moindre quantité de fer, & il est susceptible de cristallisation.

Quoi qu'il en soit, on prépare de la manière suivante le *tartrate de potasse surchargé de fer* ou *boule d'acier*.

On prend parties égales de limaille de fer & de tartrite de potasse, ou crème de tartre, l'une & l'autre en poudre très-fine. Après avoir bien mélangé ces deux substances, on les met dans un vase étroit, & on y verse de l'alcool de première distillation, jusqu'à ce que la liqueur recouvre le mélange de deux ou trois doigts; on agite de temps en temps le mélange; & après trois ou quatre mois, si l'évaporation ne s'est pas faite spontanément, on l'achève au bain-marie presque jusqu'à siccité, & lorsque la masse est refroidie, on la retire du vase, on la bat dans un mortier de fer, jusqu'à ce qu'elle prenne une consistance tenace. Alors après avoir huilé ses mains, on partage cette masse en portions d'une once ou deux; on les arrondit, on les laisse sécher sur une table, en les remaniant tous les jours avec les mains huilées, jusqu'à ce qu'elles ne tachent plus la table.

Cette préparation est longue; mais on l'abrége beaucoup, si on expose la cucurbite dans laquelle est le mélange à la chaleur du soleil ou d'un bain-marie. Plusieurs dispensaires prescrivent, lorsque la masse commence à se dessécher, d'y ajouter de nouvel alcool, & de répéter cette addition, jusqu'à ce que la masse paroisse tenace & résineuse. Curre cite des différences dans le procédé opératoire, les uns prescrivent pour cette préparation le tartrite de potasse huileux & coloré, tel qu'on le trouve adhérent aux parois des tonneaux. D'autres, au lieu de la limaille de fer, recommandent de choisir les battitures de fer. Plusieurs regardent l'alcool comme peu utile dans cette préparation, & Spielmann prescrit simplement de prendre six onces de limaille de fer très-fine, douze onces de tartrite de potasse, & de faire bouillir le tout dans quatre-vingt onces d'eau commune, jusqu'à siccité: on humecte ensuite cette masse pulvérulente avec suffisante quantité d'alcool, & on en forme des boules de la grosseur d'un œuf de pigeon.

Lorsque ces boules sont encore molles, leur surface se gerce & se fendille, si on les expose dans un endroit sec, & à une prompte dessiccation. Lorsqu'elles sont ainsi gerçées, on les met dans un endroit humide, ou on humecte leur surface; on les roule dans les mains graissées avec un peu d'huile, & on les laisse sécher lentement.

Ces boules qui sont un des remèdes du public, sont principalement employées à l'extérieur comme vulnéraire, résolutif & astringent léger. On s'en sert sur-tout dans les plaies récentes, les contusions, les luxations, les hémorrhagies légères. Pour cela on fait tremper cette boule dans de l'alcool foible, dans de l'alcool des plantes aromatiques, souvent même dans de l'eau pure, quelquefois dans de l'eau acidulée avec un peu de vinaigre, ou dans du vin blanc, & lorsque la liqueur est suffisamment chargée de la dissolution saline du fer, ce que l'on reconnoît facilement par la faveur, la couleur, on l'emploie pour faire des lotions, des fomentations sur la

partie tantôt chaude, tantôt froide, suivant le besoin.

La dissolution de cette boule dans une eau légèrement aiguësée par l'acide acétique, est bien prêtée pour les contusions & quelques espèces de plaie, à l'usage de la solution acétique de plomb, que l'on nomme communément *eau de Sature*, *eau de Goulard*.

La dissolution saline de fer faite dans l'eau commune, peut être employée utilement pour des bains, des douches; on peut aussi la faire prendre par verrees, comme une eau minérale artificielle, convenable dans tous les cas où l'usage du fer est indiqué.

BOULE DE CHAMOIS. (*Pharmacie.*) On a donné ce nom dans quelques matières médicales à un éragropile ou à un calcul que l'on trouve dans l'estomac du chamois, & auquel on attribuoit autrefois de merveilleuses propriétés. On le nommoit aussi *bezoard d'Allemagne*. Voyez le mot **BEZOARD**. On n'emploie plus du tout aujourd'hui cette substance parmi les médicaments.

BOULE DE MARS. (*Pharmacie.*) Les boules de Mars qu'on nomme aussi *boules de Nancy*, *boules de Molsheim*, sont une espèce de tartrite de fer & de potasse, préparé avec de la limaille de fer, de l'acide tartareux & de l'alcool qu'on fait épaissir, & auquel on donne la forme globuleuse. Cette matière est un mélange avec excès de principes, plutôt qu'une combinaison complète & saturée. On la fait dissoudre dans de l'eau-de-vie ou de l'alcool plus sec, & l'on a alors de l'eau de boule, qu'on emploie avec succès dans les coupures, les blessures, &c. Voyez l'article **FER**, & celui des **BOULLES D'ACIER**.

BOULE D'ÉTAÏN. (*Pharmacie.*) On connoît vulgairement sous ce nom une espèce d'amalgame solide d'étain & de mercure, que l'on prépare, en fondant dans une marmite de fer douze onces d'étain de mélague, auquel on ajoute, lorsque la fusion est parfaite, trois onces de mercure; on agite ensuite avec une baguette de fer les deux métaux, & tandis que le mélange est fluide, on le coule dans un moule de la grosseur d'un œuf de pigeon. Cette amalgame en se refroidissant, prend de la consistance & de la solidité, parce qu'il n'y a qu'un quart de mercure; une plus grande quantité se tendroit friable & pulvérulent.

Cette amalgame d'étain a été vantée comme un moyen pour purifier l'eau que l'on emploie à la boisson, & sur-tout pour détruire les insectes qui pourroient y être. Pour cela on recommandoit d'enfermer cette boule d'étain dans un nouet de linge, de la suspendre dans une cafetière pleine d'eau, & de la faire bouillir une minute; l'ébullition de l'eau est assurément un moyen efficace pour faire périr les insectes qui pourroient s'y trouver accidentellement; mais cette amalgame d'étain

NON 2

& de mercure communique-t-elle à l'eau quelque propriété utile ? Nous en doutons. Il est d'ailleurs démontré que l'ébullition, quoique de courte durée, enlève toujours à l'eau une partie de l'air vital qui s'y trouve naturellement, & l'eau bouillie n'est point salubre, ou du moins son usage ne convient pas dans tous les cas.

BOULES DES ÉVÊQUES. (*Pharm.*) Malouin rapporte dans le tome second de sa chimie, que sur la fin du siècle dernier on introduisit à la cour un homme qui, disoit-on, faisoit des cures merveilleuses avec une boule de sa composition ; le remède fut acheté, & on envoya de ces boules aux évêques, pour en faire usage dans leurs diocèses. C'est pourquoi on lui donna le nom de *boule des évêques*.

Quoi qu'il en soit, ce remède d'abord si vané, étoit de l'antimoine fondu & coulé dans un moule en forme de boule. L'usage consistoit à la faire tremper pendant vingt-quatre heures dans du vin blanc, & les malades en prenoient le matin à jeun neuf cuillerées pour purger, & ensuite tous les jours trois ou quatre cuillerées pour purifier le sang ; mais cette solution antimoniale administrée imprudemment & indistinctement fut bientôt abandonnée, parce qu'elle causa des accidens en différens endroits. Cette boule ne différoit que par la forme, des taffes faites avec l'antimoine, qui ont été si fort en vogue pendant quelque temps ; & toutes ces préparations prônées par le charlatanisme, adoptées par l'ignorance, n'ont jamais été approuvées par les médecins, parce que la quantité d'antimoine dissous est toujours incertaine & relative à la qualité du vin qui a été employé pour faire l'infusion.

BOULES SAVONEUSES, BOULES DE STEPHENS. (*Pharmacie.*) On a donné ce nom à un mélange de savon de soude & de miel auquel on ajoutoit une certaine quantité de poudre charbonneuse, de cresson sauvage, & dont on formoit des boules du poids de quatre onces & demie ; ces boules savonneuses étoient la base d'un remède qui avoit été vanté comme lithontriptique assuré.

BOULE DE THÉ. (*Pharmacie.*) Espèce de pelote ou de boule que les Chinois préparent par le mélange de différentes espèces de thé, & à laquelle ils attribuent une vertu particulière pour dissiper les maux de poitrine, & faciliter la digestion. Ce thé en boule, que les Chinois nomment *poncul-thea*, se trouve quelquefois dans le commerce. Pour en faire usage on en coupe une certaine quantité qu'on fait infuser un peu plus long-temps que le thé ordinaire. Plus ces boules sont anciennes, plus elles sont recherchées ; on estime sur-tout celles qui sont légères & po-

BOUQUETIN. (*Pharmacie.*) Quadrupède du genre de la chèvre ou du bouc, qui fournissoit autrefois à la pharmacie un médicament connu sous le nom de sang de bouquetin. Les habitants de la Suisse font sécher le sang de cet animal dans des vessies & le vendent fort cher, parce qu'on l'a regardé comme un excellent sudorifique, comme un spécifique dans les pleurésies. On conçoit à combien de fraudes cette opinion a donné lieu ; le sang du bouc ordinaire, celui du bœuf, &c. ont souvent été donnés pour le sang de bouquetin, & cette fraude n'est pas importante, puisque cette substance animale ne paroit pas différer beaucoup dans ces divers animaux. Au reste il y a long-temps que les hommes instruits n'employent plus le prétendu sang de bouquetin.

BOURACHE. (*Pharmacie.*) *Borago officinalis*, *Borago floribus caeruleis*, T. 133. C'est une plante nitreuse annuelle, qui croit facilement dans les potagers & les endroits cultivés. Les feuilles & les fleurs sont d'usage en médecine. Elles sont humectantes, rafraichissantes, incisives, pectorales, cordiales ; dépuratives, favoneuses, résolutives ; contre la mélancolie, l'hypocondriac, la pleurésie, la péripneumonie, les fièvres inflammatoires, les palpitations de cœur, le crachement de sang, pour augmenter le lait, exciter la joie. Elles entrent dans les bouillons, infusions, apozèmes & tisanes.

Le suc de bourache, selon Vogel, apaise l'effervescence des humeurs & convient dans les fièvres ardentes ; il favorise l'expectoration. Lazzoni rapporte qu'il apaise l'irritable & qu'il dissipe la tristesse des mélancoliques, qui s'imaginent voir des spectres & des phantômes, dissipe les humeurs épaisses & grossières, rend le sang plus fluide, rétablit les sécrétions. Il est utile dans toutes les maladies où il faut éviter les remèdes chauds. La dose est depuis deux onces jusqu'à trois. Il entre dans le syrop de pommes composé, du Roi sapar, dans ceux de longue-vie & de fumeterre composé, de Mésué, l'éclouaire d'herbe aux puces & les pilules angéliques. La fleur de bourache est mise au nombre des fleurs cordiales, elle sert d'ornement aux salades, fait le délice des abeilles pendant l'automne ; l'on en prépare une excellente confiture : la racine récente de bourache, étoit, il y a quelques années, en vogue à Paris dans les tisanes adoucissantes. Les anciens s'en servoient en liniment contre la galle & le siphacèle ; ils faisoient prendre la semence infusée dans du vin, dans l'intention de procurer une prompte issue au lait des femmes. L'on prépare avec la bourache une eau distillée qui fait partie des quatre eaux cordiales, & un syrop. L'herbe & la fleur entrent dans le syrop de Velar, composé. Les feuilles entrent dans la décoction rouge. L'on s'en sert souvent lorsqu'elles sont jeunes dans la cuisine. L'extrait de bourache a été donné depuis peu avec sucres

contre les gonorrhées. La bouchache est, comme l'on voit, une plante officinale : elle peut suppléer la buglosse, comme celle-ci peut l'être par la bouchache.

(M. WILLEMET.)

BOURDENE BLANCHE. (*Pharm.*) Voyez VIOIRME.

BOURG-ÉPINE. (*Pharmacie.*) Voyez NERPRUN.

BOURSE A PASTEUR. (*Pharmacie.*) **TABOURET** ou **MALLIET** à **BERGER.** *Thlaspi bursa pastoris*, *bursa pastoris*. Fuchs. hist. 611. C'est une plante très-commune en France, au Japon, à la nouvelle Angleterre & la Virginie.

Elle est vulnérable, astringente, fébrifuge; contre le cours de ventre, les hémorrhagies, les pertes, les fleurs blanches, le flux hémorrhoidal, le crachement & le pissement de sang, les pollutions nocturnes, la gonorrhée, la dysenterie, les maux de gorge, d'oreilles & de dents. Les feuilles sèches & pulvérisées se donnent à la dose d'un gros. Son suc clarifié se prend à la dose de deux ou trois onces. La bourse à pasteur est encore bonne pour nourrir les chevaux, chèvres, moutons & cochons. Si on la fait pourrir, elle a alors la faculté de chasser les charançons de l'orge & du blé. Nous croyons que c'est une expérience qu'il faut réitérer. L'on retire une eau distillée de cette plante qui sert à la préparation de l'*album graecum*, suivant la pharmacopée de Paris. Les feuilles de bourse à pasteur, entrent dans la décoction astringente. On trouve cette plante dans les officines de l'Amérique septentrionale.

(M. WILLEMET.)

BOURSOUFFLEMENT. Le boursoufflement est un phénomène qu'on observe très-souvent en chimie, & qui a lieu soit lorsqu'une matière liquide ou fondue augmente tout-à-coup de volume dans toute sa masse, comme le font le lait, la bile & les sucs albumineux, gélatineux en général, ou lorsqu'il se dégage de ces matières fluides ou en fusion des gaz qui en soulèvent la masse. Voyez les mots FUSION, EVAPORATION, VITRIFICATION.

BOUTEILLES. Les bouteilles de verre noir à cause de leur force sont souvent très utiles aux chimistes pour certaines opérations où il faut opposer de la résistance aux matières qui tendent à se volatiliser; c'est avec ces vases que M. Navier est parvenu à contenir l'éther à mesure qu'il se formoit. Les bouteilles de Sèvres, de Rouen, de Bourgogne, &c. peuvent servir à ces opérations. Nous reviendrons sur les flacons, les phioles à médecine, &c. à leurs noms particuliers.

(M. VAUQUELIN.)

BOUTON. C'est le nom qu'on donne aux globules métalliques que l'on trouve au fond des creusets dans les expériences en petit sur les métaux, ou à celui qui reste dans les coupelles après la coupellation : on nomme souvent celui-ci bouton de retour.

BRABLA. (*Pharmacie.*) Expression que l'on trouve dans Aretée & quelques anciens pharmacographes, pour désigner la prune de damas.

BRANC-URSINE ou **ACANTHE.** (*Pharmacie.*) *Acanthus mollis*, *Acanthus foliatus*. T. 176. L'harmonie qui existe dans la chaîne de concaténation des êtres naturels, paroît également régner dans les arts, il ne s'agit que du degré d'approximation. L'histoire de l'acanthé nous en offre l'exemple. Les anciens ayant souvent imité ses feuilles dans les chapiteaux qui ornoient les colonnes de l'ordre corinthien, ils en enrichissoient également leur broderie. L'assions de cette épidote aux vertus médicinales de cette plante perennelle, qui croît spontanément en Italie & en Sicile, se naturalise assez facilement dans nos jardins. On se sert ordinairement des feuilles en décoction, soit pour des fomentations ou des lavemens. Elles sont adoucissantes, émollientes, résolutives, rafraichissantes, humectantes : appliquées en cataplasme sur les tumeurs, les brûlures, même sur foulures & luxations des os, elles ont été souvent employées avec succès contre ces maux. L'acanthé est une des cinq plantes émollientes, mais une vertu qui lui est spécifique contre une maladie endémique à la Pologne, qui se nomme plique, la fait remarquer avec une sorte de vénération particulière. Dans cette maladie singulière, le sang sort par la pointe des cheveux. Une autre qualité des feuilles d'acanthé, c'est qu'étant mise en infusion dans de l'eau de-vie elles la colore en un beau verd permanent, effet que nous croyons exclusif à ce végétal. Ce pourroit fort bien être le secret que possède un Juif de Metz, de fabriquer une eau-de-vie verte qui est en grande réputation dans les trois évêchés & dans plusieurs villes de France. Rembert Dodonée rapporte que sa racine approche par son mucilage de celle de grande consoude, & qu'on peut également s'en servir dans l'hémoptysie, la pulmonie, les blessures internes causées par quelques chûtes ou par des coups violents : nous avons vu chercher avec empressement cette plante par des médecins vétérinaires. Ses feuilles entrent dans la décoction émolliente du dispensaire de Paris. La branc-ursine ou acanthé épineuse possède les mêmes propriétés.

(M. WILLEMET.)

BRASQUE. On nomme brasque en chimie & en métallurgie un enduit ou une couche de charbon en poudre, le plus souvent seul, quelquefois mêlé de craie ou d'argile, qu'on applique dans

l'intérieur des creusets ou des fosses des cales à fondre, pour recevoir les métaux fondus, en opérer la réduction complète, en empêcher l'oxydation, &c. On distingue la *brasque légère* & la *brasque pesante*; la première n'est souvent que du charbon; la seconde contient une plus ou moins grande quantité d'argile. Il y a des brasques seulement formées de terre argilleuse & silicee.

BRASSE. (*Pharmacie.*) Ce que l'on peut contraindre avec le bras plié. Ce mot est employé pour désigner une sorte de mesure, & ne peut guère avoir lieu que pour des plantes; mais on sent combien ces sortes de mesures sont équivoques & variables; & dans toutes les opérations, même la plus simple, il vaut mieux désigner la quantité que l'on emploie, en exprimant leur poids.

On se sert plus ordinairement du mot *fascicule* pour désigner la quantité que le bras plié peut contenir.

BRATHY. (*Pharmacie.*) Expression employée par Cribase, & répétée par quelques anciens pharmaciographes, pour désigner la plante que nous nommons ordinairement *fabine*.

BRAI SEC. (*Pharmacie.*) Le brai sec ou arcançon est la résine du pin ou le galipot, épaissi par le feu & coulé dans des moules de sable ou en pains. Voyez *TÉRÉBENTHINE* & *GALIPOT*.

BRECHE. La brèche en histoire naturelle minéralogique est une pierre mélangée, le plus ordinairement calcaire, analogue à du marbre, dont le fond ou la pâte contient des fragmens ou des morceaux de serpentine, de stéatite, &c. On a même étendu cette dénomination à des pierres mélangées quartzéuses ou scintillantes (Voyez le dictionnaire de minéralogie.)

La nature chimique des différentes espèces de brèches ne peut être déterminée qu'après avoir séparé de ces pierres les divers matériaux qui entrent dans leur composition, & après en avoir fait d'abord une analyse mécanique.

BREUVAGE. (*Pharmacie.*) On a quelquefois donné le nom de breuvage en pharmacie à plusieurs liqueurs préparées, composées, qu'on faisoit prendre en une ou plusieurs fois; mais cette dénomination n'est plus employée que pour la médecine vétérinaire.

BRICUMUM. (*Pharmacie.*) Suivant Marcelus l'empirique, dans les Gaules on donnoit ce nom à l'arniole.

BRIONE ou **COULEUVRÉE.** (*Pharmacie.*) *Brionia alba. Brionia eucumenis folio.* Tab. 893. Plante perennelle, de la famille des cucurbitacées, commune dans les haies.

On se sert en médecine spécialement de sa racine qui, lorsqu'elle est fraîche, est un violent purgatif. L'on en met demi-once, ou une once, infusée dans un demi-septier de vin blanc; ce fort purgatif ne convient que lorsqu'il faut secourir vivement, comme dans l'hydropisie, l'anasarque, la leucophlegmatie & autres maladies chroniques. Son suc renferme la même propriété. Comme alterant, nous avons nombre d'exemples d'épilepsies, de manies, de vapeurs hystériques, & hypocondriaques, guéries avec la décoction de la racine de brione. Elle convient encore contre la goutte, les sciatiques &umatismes invétérés, l'asthme, l'œdème, les tumeurs, les suppurations, le sang coagulé. A l'extérieur, c'est un très-bon résolutif & fondant dans les congestions, les tumeurs lymphatiques & autres, dans les écrouelles. Allston rapporte avoir vu un très-bon effet de l'application de cette racine dans les cas d'entorse, & pour les tumeurs des articulations accompagnées de roideur. Récente, elle est épispastique; elle est d'ailleurs vermifuge, incisive, emménagogue, diurétique. On la vend quelquefois chez les droguistes pour le mecoacan.

M. Harmand de Montarny, médecin à Verdun, a publié un nouveau traitement des maladies dysentériques à l'usage du peuple indigent. La racine sèche de brione en poudre, qu'il nomme *Specacanthina indigine*, fait la base de son traitement; la simplicité du médicament, la facilité de l'administrer, & la modicité de son prix, l'ont déterminé à indiquer ce secours qu'il a employé en faveur des pauvres des villes & aux habitants des campagnes. La dose est depuis demi-scrupule jusqu'à trente grains: cette racine doit être coupée par tranches pour la faire sécher avec précaution; ne pas s'en servir lorsqu'elle est cariée. Il faut la recueillir au printemps.

C'est aux médecins à profiter des découvertes modernes relatives à nos productions naturelles nationales, qu'il faut préférer à celles des étrangers, qui, souvent sont sophistiquées.

Les anciens mangeoient les jeunes pousses de la brione pour se relâcher & exciter à uriner. Bartholin a observé que ces jeunes pousses & les semences, ruoient les vers & les autres insectes de l'estomac.

Handwig a fait une dissertation sur la brione.

On prépare avec la racine de brione un extrait qui a été en vogue à Augsbourg, un électuaire qui étoit mis en usage par Démocrite, qu'Angelus Sala préconisoit, & dont Mésué a donné la formule; une conserve, que le baron de Hallerettisme pour l'asthme & la toux; un syrop suivant le dispensaire de Brandebourg, & des séculs qui étoient autrefois employées dans les pilules hystériques de Charas. La racine de brione entre encore dans l'eau hystérique, l'eau générale, le syrop apéritif cachectique de Charas, l'onguent d'Agrippa, celui d'Arragon, de Nicolas de Salerne & dans celui

contre la pleurésie, dans le cataplasme & les gargarismes résolutifs.

(M. WILLET.)

BROME-AVERON. (*Pharmacie.*) *Bromus sterilis*. Les anciens se servoient de cette plante en fomentation & en injection, contre les ulcères du nez & des autres parties.

(M. WILLET.)

BROME CATHARTIQUE. (*Pharmacie.*) *Bromus purgans*, *Græmen bromoides catharticum*, Few. Peruv. 305. T. 1. Plante graminée du Canada & du Chili: sa racine est purgative. Les habitants de Chili en font usage; ils en boivent l'infusion ou la décoction lorsqu'ils veulent se purger.

(M. WILLET.)

BROMION. (*Pharmacie.*) Aëce & Paul d'Égine décrivent sous ce nom une espèce d'emplâtre.

BROMOS. (*Pharmacie.*) Dénomination employée par les anciens écrivains pour désigner l'avoine, ou une espèce d'avoine.

BRONZE. Le bronze ou airain est un alliage métallique de cuivre & d'étain, auxquels on ajoute souvent quelques autres métaux & sur-tout du zinc, en proportions différentes, suivant les usages auxquels on le destine. Presque tout ce qui concerne cet alliage a été exposé en détail à l'article **ALLIAGE DE CLOCHES**, dans le second volume de ce dictionnaire, page 159 & suivantes. Nous n'ajouterons donc que quelques notes à ce qui a déjà été dit sur cet objet dans l'article cité.

M. l'œrner, dans une note du dictionnaire de chimie de Macquer, dit qu'ayant fait des alliages de cuivre & d'étain dans différentes proportions, il a observé que lorsque le cuivre domine, le son est bien plus fort, & qu'il diminue au contraire quand c'est l'étain qui est en plus grande proportion; que beaucoup de cuivre & peu d'étain donnent un métal malléable, de même que beaucoup d'étain & peu de cuivre; mais que lorsqu'on allie depuis parties égales des deux métaux, jusqu'à 8 ou 9 de cuivre contre 1 d'étain, on obtient des métaux aigres, cette aigreur diminuant au-dessus & au-dessous de ces proportions.

L'opération par laquelle on fond en grand le bronze pour en conler de grandes pièces, est assez simple: on se sert pour cela d'un fourneau de maçonnerie en briques, lequel a à-peu-près la forme d'un four à cuire du pain; l'aire de ce fourneau est concave, & forme une bafe composée de braise pesante, c'est-à-dire, d'argile & de sable; c'est dans cette case qu'on place les métaux qu'on doit fondre. Le fourneau a trois ouvertures: la première, est une bouche latérale, par laquelle s'introduit la flamme du bois placé dans une pièce de second fourneau placé à côté du

premier; la seconde est une cheminée placée au côté opposé à la bouche, & qui sert à faire tirer & à déterminer l'entrée de la flamme dans le four où est le métal; & la troisième est un trou qu'on ouvre & qu'on ferme à volonté, & par lequel on peut avoir inspection dans l'intérieur du fourneau, pour juger de l'état de la fonte. Quand elle est au point où le fondeur la desire, il débouche une quatrième ouverture qui répond à la case, & par laquelle le métal fondu coule par des canaux dans le moule destiné à le recevoir.

BROSSES. On emploie souvent des broffes pour le nettoyage de certains vases & instrumens de chimie, lorsque des vaisseaux ou des matières ont des inégalités à leur surface dans lesquelles il y a des matières étrangères que l'on ne peut enlever avec la main, cet instrument est quelquefois très-utile. Les tiffus de soie, de crin &c. qui servent à pulvériser ou à passer quelques matières sèches ou liquides, sont souvent obtusés par ces mêmes matières, & lorsqu'elles ne sont pas dissolubles dans l'eau, on ne peut les en détacher; le secours de la brosse est alors très-nécessaire. Les crins dont elle est formée entrent dans chaque maille du tissu en détachent les corps étrangers par le moyen du frottement; on sent qu'il faut établir un rapport entre la grosseur du tissu & les brins de crin de la brosse.

Il y a de ces broffes d'une forme cylindrique montées sur des fils de fer; d'autres sur du bois, qui sont indispensables pour nettoyer l'intérieur des cloches allongées & étroites, où la main ne peut entrer; leur usage est encore fort utile pour dégraisser l'intérieur des flacons qui n'ont pas la force de soutenir le choc du plomb, qui souvent les dépoli lorsqu'il n'est pas parfaitement lisse. Celles qui sont parfaitement cylindriques sont appelées queues de renard; mais celles qui vont en diminuant vers la pointe, & qui servent à nettoyer les becs allongés d'entonnoirs sont nommées queues de rat. On en voit une, figure 45. cl. 1. Il n'étoit pas nécessaire de donner de figures des autres espèces, tout le monde fait assez ce que c'est.

Parmi celles qui sont destinées à entrer dans des flacons & bouteilles, il faut choisir les montures en fil de fer, parce qu'elles peuvent se plier dans tous les sens & aller sur tous les points de l'intérieur des bouteilles.

BROUET. *Brodium* (*Pharmacie.*) Ce mot qui paroît venir de la basse latinité, & qui répond à l'italien *brodo*, se trouve dans quelques pharmacographes anciens, & il est employé pour désigner une liqueur dans laquelle on a dissous ou délayé une substance médicamenteuse ou saline; ainsi l'enor dans son traité, de vera præparatio & usu medicamentorum chymicorum, fait mention d'une dissolution de muriate de soude, de muriate d'ammoniaque, qu'il nomme, *Brodium salis communis*,

brodium, falsis ammoniaci. Mais le plus souvent on entend par ce mot, un bouillon ou décoction plus ou moins chargée de la gélatine ou fucs gélatineux des animaux; tels sont les bouillons ou gelées de volaille, de vipère, &c. Venel dans sa *matière médicale*, comprend sous le nom de BROUETS, *brodia*, la décoction de veau, de poulet que l'on fait dans une grande quantité d'eau, &c. que l'on nomme ordinairement *eau de veau*, *eau de poulet*.

BROYEMENT. (*Pharmacie.*) Nous ne faisons un article de ce mot que pour indiquer combien il est nécessaire que le broyement soit fait avec exactitude dans les opérations de pharmacie, &c. pour rappeler que souvent toute l'énergie, &c. conséquemment toute l'utilité d'un remède composé, ne consistent que dans le soin & l'exactitude que l'on a mis à broyer les diverses substances qui entrent dans sa composition. Cela est sur-tout relatif à toutes les matières qu'on prend en poudre, en bols, en pilules, en opiates, &c. en général pour toutes les compositions qui ne sont point des dissolutions; il faut qu'un mélange, &c. conséquemment qu'un broyement très-exact, mette toutes ces matières dans une disposition &c. une égalité qui tiennent presque lieu de la dissolution. Le temps du broyement &c. la patience de celui qui en est chargé, suffisent pour remplir ces conditions, sur lesquelles il faut que le médecin puisse compter.

BRULER. Le mot brûler exprime, pour tous les hommes, l'ensemble des phénomènes que présentent les corps combustibles pendant leur combustion, c'est-à-dire, la lumière, la chaleur, le mouvement, la raréfaction &c. la destruction apparente du corps combustible. Mais pour les chimistes, il offre une autre suite d'idées; il leur représente la fixation de l'air vital, la précipitation de l'oxygène atmosphérique dans les corps qui brûlent, ou son passage d'un corps dans un autre; car souvent la combustion n'est pas due à l'air atmosphérique, mais elle s'opère au milieu d'un liquide par la décomposition d'un corps dans un autre qui a plus d'affinité que lui pour l'oxygène. Ainsi le mot brûler rappelle les attractions de l'oxygène, les phénomènes qu'il présente en entrant dans les corps combustibles, &c. en quittant les corps brûlés, l'état de densité dont il jouit dans les matières qui le contiennent, &c. en général, tout ce qui tient à la combustion; il énonce à l'imagination d'un homme instruit, la différence des corps combustibles &c. des corps déjà brûlés dans la nature; en un mot, c'est un des termes qui fait naître le plus d'idées, &c. qui retrace le plus d'images relatives aux phénomènes de la nature &c. de l'art. Voyez le mot COMBUSTION.

BRUNELLE. (*Pharmacie.*) *Brunella vulgaris.*

ris. Brunella, Dod. pempt. 136. *Consolida minor*; Manth. 684. Plante vivace, commune dans les lieux incultes, humides, les prairies; elle se trouve également au Japon, dans la Nouvelle-Ecosse &c. en Virginie.

La brunelle est vulnérable, astringente, dit Vogel, c'est pourquoi on fait usage de ses feuilles écrasées pour arrêter les hémorrhagies des blessures. Guillaume vante cette plante pour le traitement des plaies d'armes à feu. On s'en sert intérieurement en décoction contre le flux de sang &c. autres excréments sanguins. Elle est utile en gargarisme contre l'angine &c. les aphtes. Césalpin & Gui de la Brosse, assurent avoir guéri avec la brunelle, des charbons. On dit qu'elle hâte la suppuration des abcès, &c. qu'elle convient pour baigner les ulcères &c. les taches scorbutiques. Si on en croit Blouchin, elle est utile contre la morsure des bêtes venimeuses; elle a aussi la propriété de raffermir les dents vacillantes par la salivation mercurielle. La brunelle est tempérante, anti-septique, febrifuge, anti-scorbutique, favoneuse, attractive, émolliente, contre les fleurs blanches. On peut la substituer à la bugle; c'est un bon pâturage pour les bœufs, chèvres, moutons &c. chevaux. La fleur plait aux abeilles.

La brunelle entre dans l'eau vulnérable, le baume vulnérable, le baume poliacriste de Landeron, le sirop de grande consoude, le sirop de Nicotiane, de Neander, l'onguent mondificatif d'ache, l'emplâtre de Jean de Vigo, contre les fractures, celui contre les hernies, de Nicolas Trevot, &c. dans les espèces pour le gargarisme astringent. Autrefois on tenoit officinalement l'eau distillée de brunelle. Valérius Cordus l'estimoit. La pharmacopée de Wirtemberg donne la formule & la préparation d'un sirop de la même plante. La brunelle lacinée, (*Brunella laciniata*) a les mêmes propriétés.

(M. WILLEMET.)

BRUXELLES, *instrument de chimie.* C'est une pince de cuivre formée de deux branches liées par l'une de leurs extrémités sur une base de cuivre, à une distance assez éloignée l'une de l'autre. Ces branches ont environ six à sept pouces de long; elles sont terminées par leur extrémité libre en une pointe d'acier louchée dans le cuivre, bien polie &c. bien acérée.

Elles ont à leur base, environ huit à neuf lignes de large; leur épaisseur est peu considérable, à cause du mouvement qu'elles doivent exécuter.

Ces pinces sont destinées à saisir différents petits corps légers qu'on ne pourroit prendre qu'avec peine avec les doigts; c'est particulièrement dans les opérations chimiques d'or &c. d'argent qu'elles sont employées, pour prendre &c. diriger les poids ainsi que les matières &c. les bassins des balances qui les reçoivent.

Pour se servir de cet instrument, il faut

le prendre vers le milieu de sa longueur avec le ponce d'un côté, l'index & le médius de l'autre, & placer la bête entre la première phalange du ponce, & le premier os du métacarpe. En passant alors avec les doigts, on amène les deux extrémités pointues vers la ligne moyenne, & l'on fait ainsi les corps les plus fins, *et. 1.*

BRUYERE. (*Pharmacie.*) *Erica vulgaris.* *Erica* 1. *Marth.* *Diosc.* 1. 6. C'est un arbrisseau assez commun dans les landes, les bois & les endroits secs & stériles.

La décoction de ses feuilles, dit *Marthiole*, dont on continue long-temps l'usage, brise la pierre de la vessie, & expulsi les fragmens avec les urines. Suivant *Tragus*, la bruyère guérit la colique. *l'Amovius* assure qu'elle augmente le lait des nourrices. *Rai* rapporte que le suc exprimé des feuilles ou l'eau distillée des fleurs, dissipe les douleurs des yeux, si on y en fait entrer. *Clusius* dit que *Rondelet* se servoit avec beaucoup de succès de l'huile des fleurs de bruyère, pour les dartres du visage. *Tabernamontanus* prétend même que c'est un spécifique à ces maux, & que la fomentation des mêmes fleurs apaise les douleurs de la goutte. *Tournefort* conseille contre la même maladie, un bain de vapeur avec les feuilles & les fleurs de cette plante. *Noecler* offre la conserve de fleurs de bruyère comme un excellent médicament contre la fièvre quarte, l'hydroisie & les maladies de reins. Les feuilles & les fleurs sont anti-septiques, diaphorétiques, diurétiques, apéritives, febrifuges, contre les fleurs blanches, pour augmenter le lait des nourrices.

La bruyère à fleurs blanches est la plus estimée; les maréchaux la recherchant contre les maladies des chevaux. Elle sert à divers usages économiques: elle peut suppléer le houblon dans la brasserie. Brûlée dans les appartemens, elle chasse, dit-on, les souris. La bruyère offre pendant l'hiver une ample nourriture aux moutons, & les fleurs sont aimées des abeilles.

Cette plante fait partie de l'énumération des médicaments simples du dispensaire de Paris.

Il nous reste à donner la formule d'un vin de bruyère, employé par les médecins de Nancy, avec succès, & qui se trouve dans la pharmacopée des pauvres, par *M. Jadelot*.

Prenez une poignée de rue, une poignée d'absynthe, une poignée de morelle, une poignée de bruyère blanche, tiges, feuilles & fleurs; faites infuser le tout dans deux bouteilles de bon vin blanc, pendant trois jours, ou bouillir à la réduction du quart; passez ensuite la liqueur par un linge.

Ce vin est un puissant dépuratif que l'on donne avec succès dans les maladies chroniques ou des humeurs vicieuses infectent le sang, & occasionnent des dépôts qui se renouvellent conti-

Chimie, Tome II.

nuellement. On le recommande aussi dans les maladies chroniques qui viennent du lait épanché, dans les suppressions des règles, &c. La dose est un gobelet par jour, & le malade se tient chaudement, parce que ce remède doit produire son effet par les sueurs.

(*M. WILLETET.*)

FRYON. (*Pharmacie.*) Ce mot que l'on trouve dans les médecins Grecs & les anciens pharmacographes & botanistes, a été employé pour désigner différentes espèces de plantes. *Oribase*, *Paul d'Egine* s'en servoient pour désigner la mouffe; ils recommandoient principalement celle qui croît sur le cèdre: quelques-uns l'ont aussi désigné sous les noms de *splanchnon* ou *hypnon*, d'autres ont désigné sous le nom de *frayon thalassion*, l'algue ou mouffe marine, qui croît à la surface des rochers & des pierres; d'autres se sont servi de ce mot pour désigner le caucalis; d'autres enfin ont indiqué sous cette dénomination le houblon.

BUCELLA. (*Pharmacie.*) Expression de la basse latinité, & que l'on trouve dans quelques anciens pharmacographes, pour désigner les médicaments solides qui s'avalent dans une bouchée, & que l'on connoît plus ordinairement sous le nom de bols. Cette dénomination a vraisemblablement donné naissance au mot *bucelston*, que l'on trouve dans les écrits des derniers médecins Grecs, & par lequel ils désignent un remède purgatif auquel on donnoit la forme & la consistance de pain. *Paul d'Egine* en prescrit la préparation avec une once de scammonée torréfiée, un scrupule de poivre, des semences d'ache, une once de fenouil & d'anis, & une livre de miel, on fait, dit-il, cuire médiocrement ces substances, & on donne une once pour une doise, *Aëtius* recommande de mêler la scammonée avec de la pâte, & différentes substances propres à corriger son activité, & après l'avoir laissé fermenter, il en forme des petits pains qu'il fait cuire au four, & qu'il conseille comme un purgatif efficace; cette préparation se rapproche beaucoup de ces espèces de biscuits ou pains d'épices purgatifs & vermifuges, que l'on fait quelquefois pour les enfans.

BU-CÉRAS. (*Pharmacie.*) Dénomination dérivée du grec, & employée par quelques pharmacographes pour désigner le fenu grec.

BU-CRANION. (*Pharmacie.*) Dénomination dérivée du grec, & employée par quelques écrivains pour désigner la plante que l'on nomme vulgairement muse de veau, ou *anthriscum*.

BUGLE ou **PETITE CONSOUDE.** (*Pharmacie.*) *Ajuga reptans.* *Bugla* *Riv.* T. 75. Cette plante est perennelle, médicinale, commune dans les prairies de toute l'Europe; c'est un vulnéraria

0000

astringent qui arrête le sang des plaies ; on fait entrer la bugle dans les gargarismes pour les maux de gorge, & pour supprimer la trop grande salivation. Suivant Ettmüller, elle est bonne contre les ulcères, & sur-tout ceux du poignon ; elle a de plus la propriété de dissoudre le sang grumelé, c'est pourquoi on en fait boire la décoction aux personnes qui ont fait de grandes chûtes, contre les fleurs blanches, les hernies, la retention d'urine. Les Italiens mangent au printemps, en salade, les jeunes pousses & les racines de la bugle. Elle est mangée des chèvres & des moutons. On fait avec cette plante, dit Geoffroi, un extrait qui est estimé.

La bugle entre dans la composition de l'eau vulnéraire, dans celles du baume polycreste de Bauderon, du baume vulnéraire, de l'onguent mondificatif d'ache & de l'emp'âtre oppodeltoch de la pharmacopée de Paris.

La bugle pyramidale (*ajuga pyramidalis*) & celle de Genève (*ajuga Genevensis*) possèdent les mêmes vertus.

(M. WILLEMET.)

EUGLOSE. (*Pharmacie.*) *Anchusa officinalis*. *Bagiosum*. Miller, dict. N°. 1. C'est une plante poragère vivace, qui est humectante, rafraîchissante, savonneuse, nirreuse, béchique, apéritive, résolutive. Boerhaave la recommande contre la pleurésie. Chomel dit l'avoir employée avec succès dans la dysenterie ; d'autres médecins la conseillent contre la mélancolie, les obstructions, l'hypocondrie, le crachement de sang, les hémorrhagies, les chaleurs d'entrailles, pour augmenter le lait des nourrices, exciter la joie. Au reste la buglose offre les mêmes propriétés que la bourache. Les feuilles bouillies dans de l'eau avec de l'alun, donnent une belle couleur verte.

La fleur de buglose est mise au nombre des fleurs cordiales ; elle entre dans le sirop d'*erythrum*, dans le sirop hellebotine de Quercetan ; l'on prépare une conserve avec cette fleur : la fleur de buglose peut servir aussi à la peinture.

Nous avons vu faire usage de la racine de buglose confire au sucre avec sucçès aux poitrinaires, sur-tout après de violentes péripneumonies.

Fabri faisoit beaucoup de cas du sirop & de l'eau distillée de buglose ; elle est une des quatre eaux cordiales. Il y a peu d'années que l'extrait de cette plante a été donné avec succès contre la gonorrhée & les maladies vénériennes.

C'est une des plantes propres à la médecine vétérinaire. On peut en nourrir le bétail.

La buglose sert dans la composition du sirop de longue vie, dans ceux de scolopendre, de fumeterre, de Melusé, d'Epithème & d'Eupatoire, de pommis composé du roi Sapor. Le sirop bissantin, simple & composé, l'électuaire de *pyllio*, de Melusé, l'opiat de Salomon, la décoction rouge

du dispensaire de Paris, l'électuaire purgatif de citron, & les pilules angeliques. Le suc de buglose se prend à la dose de deux ou trois onces.

La buglose à feuilles étroites, (*anchusa angustifolia*) ; celle à feuilles larges, (*anchusa sempervirens*), & celle de Virginie, (*anchusa Virginiana*) possèdent les mêmes propriétés.

M. Ladillas Bruz, médecin Hongrois, a donné en 1775 des observations sur l'efficacité de la teinture spirituelle des fleurs de buglose contre l'épilepsie ; voici ce qu'il dit de plus essentiel à cette occasion. « Je ne trouve nulle part, dit-il, que personne ait remarqué la vertu anti-épileptique des fleurs de buglose. Je me souviens néanmoins, qu'elles ont été louées par un savant médecin Allemand v. Si M. Bruz avoit consulté le célèbre Jean Rai, botaniste Anglois, il auroit trouvé que la fleur de buglose lui étoit connue comme anti-épileptique. Nous allons rapporter, d'après l'ouvrage latin de M. Bruz, deux exemples qui constatent les propriétés de ces fleurs ; ils pourront servir de motif pour engager les médecins à répéter ces expériences.

On peut prendre ces fleurs infusées à l'eau, au vin & à l'esprit-de-vin. Voici la recette de M. Bruz, de l'infusion spirituelle telle que je l'ai employée.

« Prenez fleurs de buglose récemment cueillies, trois poignées, faites infuser dans un litre d'esprit préparé avec la lie de vin. Laissez le tout en macération pendant trois jours dans un vaisseau de verre exactement bouché, exprimez & passez au filtre. On en fait prendre une cuillerée tous les matins ».

PREMIERE OBSERVATION.

Un homme âgé de trente-cinq ans, adonné aux lettres, d'une taille moyenne, d'un tempérament sanguin & bilieux, n'avoit jamais eu d'autres maladies que l'épilepsie, dont il éprouvoit ordinairement deux paroxysmes tous les ans, & cela depuis sa plus tendre jeunesse, à l'exception d'une année pendant laquelle il n'en ressentit aucun accès. M'ayant fait appeler en 1760, je lui fis prendre tous les matins, pendant deux mois consécutifs, une cuillerée ordinaire du remède spiritueux, suivant la formule précédente, & depuis ce temps les paroxysmes ne sont plus revenus.

DEUXIEME OBSERVATION.

Un jeune homme âgé de 17 ans, d'un tempérament sanguin, étant au service d'un homme de distinction, devint épileptique à la suite d'une peur qu'il éprouva le gars ce mal plusieurs années ; je lui fis prendre, au mois d'avril 1769, une cuillerée de l'infusion spirituelle, qu'il continua

tous les matins, depuis ce temps les accès ne en font pas revenus.

(M. WILLEMET.)

BUGLOSSE ROUGE. (*Pharmacie.*) Dénomination dérivée du grec, & donnée par quelques écrivains à l'occanette.

BUGRANDE ou **BUGRANE.** (*Pharmacie.*) Voyez **ARRETIÈRE.**

BUIS. (*Pharmacie.*) *Buxus sempervirens, Buxus.* *Nod. Pempt. 182.* C'est un arbrisseau originaire du Levant, de Perse. On le trouve aussi au Japon & dans les jardins de l'Amérique. L'on s'en sert souvent pour les bordures les plattes-bandes qui ornent les jardins d'agrément; ses rameaux sont quelquefois employés aux cérémonies du culte divin.

Les feuilles pulvérisées du buis, données à la dose d'un gros, purgent fortement le ventre; leur effet est si considérable, qu'elles expriment le sang par fois, ce qui en fait abandonner l'usage. L'entaillement de la décoction des feuilles, dont on se fait la tête, fait revenir les cheveux. Les mêmes feuilles sont sudorifiques, fébrifuges, contre la descente de la matrice, la jaunisse, & propres à purifier le sang. Le suc des feuilles de buis récemment exprimé par le moyen d'un véhicule approprié, est un souverain remède dans la pleurésie, qui a été recommandé & communiqué à Schroeder, comme un beau secret.

Le bois de buis est le *gaïac des François*; on lui croit autant de vertu qu'au gaïac; sa décoction est sudorifique, atténuante, apéritive, contre les maladies chroniques, les rhumatismes anciens, la goutte, l'hydropisie, la vérole, les vers, la manie, l'hygiène, la brûlure, & pour colorer les cheveux. Ce bois sert aux tabletiers, aux tourneurs, graveurs en taille-douce, faiseurs de peignes & autres. Il est le seul bois de l'Europe, au rapport de M. Haller, qui aille au fond de l'eau.

L'huile fétide & empyreumatique, extraite de ce bois, passe pour être bonne contre l'épilepsie & les maux de dents: l'on en rectifie un esprit.

Les sommités vertes de buis, sont une nourriture délétère aux chameaux.

(M. WILLEMET.)

BUISSEON ARDENT. (*Pharmacie.*) *Mespilus pyracantha, Pyracantha.* *Lob. adv. 438.* Le buisson ardent est un arbrisseau, qui, par la beauté de la couleur de son fruit, se fait rechercher des curieux, pour le placer dans les jardins d'hiver. On le nomme arbre de Moïse, parce qu'on a cru que c'étoit le buisson dans lequel Dieu apparut à son prophète.

Son fruit est astringent; il arrête le cours de

Ventre. On peut le substituer à celui de l'aubépine.

(M. WILLEMET.)

BU-LAPATHUM. (*Pharmacie.*) Dénomination dérivée du grec, & employée par quelques écrivains, pour désigner une espèce de patience ou *lapathum*.

BULBE. (*Pharmacie.*) Les botanistes donnent ce nom à un corps oblong, qui se trouve sur le collet de la racine de quelques espèces de plantes, & semble même faire partie de leurs racines, puisqu'il lui est uni, & qu'il persiste avec elles; ce corps, que l'on nomme vulgairement *oignon*, n'a pas la même structure dans toutes les plantes où on le rencontre; tantôt il paroît charnu & solide, tantôt il est composé de plusieurs lames ou couches concentriques, disposées les unes sur les autres; mais dans quelques bulbes, ces couches sont circulaires & sans interruption; dans d'autres, les couches sont partagées en segments écailleux qui se recouvrent, & sont distincts les uns des autres; on fait usage en pharmacie, de plusieurs espèces de bulbes ou oignons, tels sont ceux de *lys*, de *seille*, de *colchique*. La conservation, la dessiccation de ces substances exige des attentions particulières qui seront exposées aux mots **CONSERVATION** & **DESSICCATION**.

BU-PHAGOS. (*Pharmacie.*) Sumon donné à un antidote, ou espèce d'électuaire que Marcellus décrit, & dont il vante l'efficacité contre la distension du colon, & pour faciliter la digestion; on nommoit aussi cette composition, *oxyporium*.

BUPLEVRUM ou **BUPLEVRE.** (*Pharmacie.*) Genre de plantes ombellifères, qui contient deux espèces médicamenteuses, employées quelquefois en pharmacie. L'une est le buplevre perçeuille, *buplevrum rotundifolium*; elle est rangée parmi les vulnéraires & les astringents; on l'applique sur les hernies; on la connoît sous le nom de perçeuille. L'autre est le buplevre à feuilles entaux, *buplevrum falcatum*; celle-ci est regardée comme vulnéraire & fébrifuge. On n'emploie que très-rarement ces plantes, & elles n'entrent dans aucune préparation pharmaceutique.

BUPHTALMUM ou **BUPHTALME.** (*Pharmacie.*) Le nom de buphtalme ou œil de bœuf, a été donné à plusieurs plantes composées & tadiées; 1°. à la camomille fétide ou marroite, qu'on nommoit petit buphtalme; 2°. à la piquetette ou marguerite, qu'on nommoit grand buphtalme; 3°. à la plante vulgairement nommée œil de bœuf, *Buphtalmum tanacet minoris foliis*, de G. B., 134. Cette dernière plante est em-

ployée dans l'eau vulnérable, & substituée à la grande paquerette. Suivant Tragus, cette plante est carminative, anthelminthique & hépatique.

BURDUNCULUS. (*Pharmacie.*) Dénomination employée suivant Marcellus, par quelques écrivains, pour désigner la plante que d'autres ont nommé langue de bœuf.

BURUNGI, ou, comme l'écrivit Avicennes, **BERUNGI.** (*Pharmacie.*) Ce mot que l'on trouve dans plusieurs formules médicamenteuses de Méfue & des pharmacographes arabistes, est employé pour désigner la graine d'une plante aromatique; mais les interprètes ne sont pas d'accord sur l'espèce de la plante désignée; les uns croient que ce sont les cubebes ou la roquette; d'autres pensent que par ce mot, on a voulu désigner la semence de mélisse, &c.; & l'auteur, en rapportant, d'après Méfue, la formule de la *consolida anacardine*, ajoute qu'il importe peu lequel de ces ingrédients on prenne, puisqu'ils ont à peu près les mêmes propriétés, & sont également stimulants.

BUSSEOLE ou **RAISIN D'OURS.** (*Pharmacie.*) *Arbutus uva ursi.* *Uva ursi.* Chuf. *Hist.* 63. C'est un sous-arbrisseau, qui aime les hautes montagnes. Il se trouve aussi dans le Canada & à la Nouvelle-Ecosse.

Joseph Quer, chirurgien du roi d'Espagne, professeur de botanique au jardin royal des plantes de Madrid, a publié une dissertation physique & botanique sur la maladie néphrétique, & sur son véritable spécifique; le raisin d'ours. Cet écrit espagnol a été traduit en français à Strasbourg, en 1768. M. Quer, après avoir donné la définition générale & spécifique de cette plante, en fait la description, & apprend à s'en servir. Il cite ensuite quelques exemples étonnans de ses effets merveilleux contre la gravelle, la pierre & les maladies néphrétiques. La dose est un gros en poudre, à prendre tous les matins dans un gobelet de tisane péctorale pendant un mois ou six semaines. Il faut accélérer la dessication des feuilles de raisin d'ours, afin qu'elles ne noircissent pas, ce qui détruirait leurs principales propriétés; ainsi les plus vertes sont les meilleures. Elles entrent dans la poudre contre les calculs, qui est en usage en Allemagne.

La busseole est aussi très-bonne contre le scorbut & les hémorroïdes; elle est diurétique, vulnérable, tonique; mêlée avec le tabac, elle est bonne à fumer: elle sert aussi aux tanneurs & à la teinture.

L'on prépare un sirop en Suède avec ses baies; elles sont comestibles. Les racines sont astringentes.

Les monographes de cette plante, sont Girardi de Padoue, & le célèbre Jean-André Murray de Göttingue.

(M. WILLEMET.)

BUTOME ou **JONC FLEURI.** (*Pharmacie.*) *Butomus ombellatus*, *juncus floridus*, Matth. 1037. C'est une plante aquatique d'un très-bel aspect, qui mérite d'être cultivée pour l'ornement.

On prétend qu'elle convient contre la morsure des bêtes venimeuses; elle est apéritive, détersive, alexitére, émolliente.

Les bœufs & les vaches en font fort friands.

(M. WILLEMET.)

BUTUA, **BRUTUA**, ou **AMBTUTUA.** (*Pharmacie.*) Mot indien, adopté par un grand nombre de pharmacographes, pour désigner une plante dont les Portugais ont introduit l'usage en médecine, & qui est plus généralement connue d'après eux sous le nom de *pareira brava* ou *sissampelos parira*. LINNEUS.

C.

C. (*Pharmacie.*) Cette lettre, la troisième de notre alphabet, est la première d'un grand nombre de mots, & dans les ouvrages des anciens chimistes, des pharmacographes, & dans quelques formules médicinales, on la trouve souvent seule & suivie d'un point ou d'un autre signe; elle indique alors l'abréviation d'un mot dont elle est l'initiale, ainsi que dans les ouvrages des anciens chimistes. C. désigne la chaux, la calcination, les chaux ou oxides des métaux, & dans ce dernier cas, elle est tantôt précédée, tantôt suivie du nom ou du signe du métal. Par exemple, **C. MARTIS**, **VENERIS**, &c.: signifie *crocus martis*, *calx veneta*, safran ou oxide fer., de cuivre, &c. Quelquefois cette lettre est combinée avec d'autres signes de terres, de métaux, & est disposée tantôt à droite; tantôt à gauche, & dans tous ces cas, elle exprime toujours une calcination ou oxidation.

C. C. *cornu cervi*, de corne cerv.

C. C. C. *cornu cervi calcinatum*, corne de cerf calcinée.

P. C. Pierre calaminale.

Le C. dont la branche inférieure est traversée par une petite ligne oblique, désigne dans les anciens chimistes le cristal.

Le plus souvent, on trouve cette lettre dans les formules médicinales, comme signe de numération, alors elle est l'abréviation du mot *centum*. Ainsi.

GRANA. C. signifie *cent grains*.

On la trouve aussi quelquefois employée pour désigner le **CYATHUS** des Romains, ou la **VIERRE**: enfin quelques médecins l'ont encore employée

comme abréviation de la proposition latine *cum*. Ainsi on lit dans quelques formules, *misc. C. suff. quant.* Ce qui signifie mêlez avec suffisante quantité ; mais cette dernière abréviation est très-vicieuse. On doit toujours éviter ces formules mystérieuses, ces forces d'abréviations équivoques qui peuvent si facilement induire en erreur ; aussi de nos jours ces abréviations sont très-rarement employées. Voyez CARACTERES PHARMACEUTIQUES.

CABARET ou OREILLE D'HOMME. (*Pharmacie.*) *Afarum Europæum, Nardus sive stris rustica.* Trill. ph. 48. 45. C'est une petite plante vivace qui croît dans les forêts ombragées de toute l'Europe, où elle est assez commune, surtout en France, en Allemagne, & aux environs de Nancy ; nous l'avons placée dans notre matière médicale indigène, comme un excellent suppléant de l'ipécacuanha. L'emploi que nous en avons fait, a toujours été couronné par des succès. Avant d'en faire usage, nous avons mis en pratique le sage précepte de Frédéric Hoffmann, qui conseille de laisser cette plante à l'air libre pendant un certain temps avant de s'en servir ; il regarda ce moyen comme un des plus propres à la débarrasser de sa virulence. En effet, ce facile procédé nous a toujours réussi. La racine de cabaret réduite en poudre fine depuis vingt-quatre grains jusqu'à quarante, délayée dans une tasse de thé, ou dans un bouillon de veau, a coutume de faire vomir trois à quatre fois sans violence. Les feuilles & les racines sont non seulement purgatives & émétiques, on leur attribue encore les propriétés desopatives, apéritives, résolutes, diurétiques, propres à combattre la plupart des maladies chroniques. On peut les prendre en infusion & en décoction. Le cabaret doit être regardé comme un excellent médicament pour guérir le farcin des chevaux. Il est certain que cette plante doit entrer dans les officines vétérinaires. Sa décoction nourrit les cheveux.

On prépare avec le cabaret une teinture à l'esprit-de-vin ; un extrait, selon le dispensaire de Wirttemberg ; les feuilles entrent dans la poudre sternutatoire, la racine dans l'eau générale, les gouttes anodines d'Angleterre, l'ortie, l'électuaire de *psyllio*, l'*hierapiera*, les trochisques hystrériques, celles d'*H. dieroi*, l'emplâtre *diabotani*, le sirop hydragogue de Charas, & le *disfarum* de Fernel.

Il faut recueillir cette plante pendant le mois de mai & de juin. Nous devons dire un mot des deux espèces exotiques suivantes.

Le sel alcali de notre cabaret, avec partie égale de tarre stibiée mêlés, pris à la dose de huit à dix grains dans de l'eau distillée de chardon béni, est un remède souverain au commencement des fièvres intermittentes.

(M. WILLEMET.)

CABARET DE CANADA. (*Pharmacie.*) *Afarum Canadense.* Cette espèce est bisannuelle, elle se trouve dans les bois de la Virginie & du Canada. Les Américains se servent particulièrement de cette plante contre les maux de cœur. Comme la racine a une très-bonne odeur, ils en mettent un peu dans le vin nouveau, ce qui le rend fort agréable.

(M. WILLEMET.)

CABARET DE VIRGINIE. (*Pharmacie.*) *Afarum Virginicum.* Cette espèce est également bisannuelle ; elle se trouve dans la Caroline & les îles Mariannes. Les Américains prennent la racine à la dose d'un gros, son extrait à celle d'un scrupule, & les feuilles au nombre de six. Ils nomment gingembre sauvage, la racine de ce cabaret, parce qu'il a la même saveur que le gingembre commun. L'on a souvent vendu en Angleterre la racine de cabaret de Virginie pour la serpentinaire : la racine de ce cabaret infusée dans du vinaigre, perd son énéctique. Son infusion spiritueuse, ou faite au vin est excellente contre le relâchement cachectique, qui arrive après les fièvres intermittentes ; l'infusion de quatre à douze des feuilles avec un petit morceau de cannelle, digérées pendant une nuit dans un gobelet d'eau, produit le même effet. La racine est employée avec succès dans la Caroline, contre les cardialgies. La même racine préparée en onguent avec l'axonge de porc est un bon médicament contre la gangrène. Les feuilles cuites légèrement dans la même graisse, forment un remède efficace contre les brûlures.

(M. WILLEMET.)

CACAO. *Theobroma cacao.* Clus. exot. 85. C'est un arbre qui croît spontanément dans l'Amérique méridionale, particulièrement au Mexique, dans les provinces de Guatimala, sur la côte de Caraque, aux Antilles, dans la Guiane, à Bakama. Il produit les noix ou amandes de cacao, qui se vendent chez les épiciers, avec lesquelles on fabrique le chocolat. Le cacao est nourrissant, tempérant, fortifie l'estomac & la poitrine, répare promptement les forces épuisées ; il est salutaire aux vieillards. Il convient dans la consommation & la phthisie pulmonaire, adoucit l'acrimonie des humeurs ; il entre dans le sirop de torreo.

On retire de ce fruit une huile qu'on appelle beurre de cacao, c'est un anodin bœnique contre les hémorroïdes ; il est aussi cosmétique, & entre dans la poudre pectorale ou looch sec de la pharmacopée de Paris.

(M. WILLEMET.)

CACAO. (*Pharmacie.*) Nous joindrons à ce court article de M. Willemet, les détails donnés par M. Baume dans son ouvrage de pharmacie.

Le cacao est le fruit d'un arbre qu'on nous apporte de plusieurs endroits. On trouve aujourd'hui beaucoup d'espèces de cacao dans le commerce; il en vient de Surinam de deux sortes, des îles de Berbiche, &c. mais les meilleures espèces nous viennent de caraque; il y en a de deux sortes, l'un est gros & l'autre est petit: ils sont tous les deux d'excellente qualité. Depuis mie huitaine d'années, on nous en apporte des îles de Sainte-Magdeleine, une espèce que l'on nomme *cacao de Sainte-Magdeleine*; celui-ci est fort gros. Les îles de Cayenne & de Saint-Domingue nous fournissent aussi du cacao: il est connu sous le nom de *cacao des îles*. Tous ces cacaos diffèrent entre eux par la grosseur des amandes, par leur saveur plus ou moins agréable, & par le pays d'où ils viennent. Les meilleurs & les plus estimés sont les caragues; il paroît cependant que celui de Sainte-Magdeleine mérite la préférence, en ce qu'il est plus gros & mieux nourri. Les moins bons sont les cacaos des îles; ils sont un peu acres, ils contiennent plus de beurre, c'est pour cette raison que nous en faisons entrer dans la recette du chocolat, afin de le rendre un peu plus gras: le chocolat fait de pur caraque est trop sec; celui qui est fait avec du pur cacao des îles est trop gras & trop acre.

On doit choisir le cacao caraque le plus récent, point vermulou à la surface, bien nourri dans l'intérieur & point moisi, ce à quoi il est fort sujet. Les droguistes prétendent qu'on renferme dans la terre les cacaos caragues, après qu'on les a cueillis, & qu'on les y laisse pendant un mois ou six semaines, afin qu'ils perdent leur acreté; ils ajoutent que l'on nomme cette opération *terrer le cacao*; ils disent qu'elle ne le fait que sur le cacao caraque, & que c'est pour cette raison que le cacao des îles, à qui on ne fait pas la même chose, est acre. Cette assertion peut être vraie, les meilleurs naturalistes modernes que j'ai consultés n'en font aucune mention. Quoi qu'il en soit, ce sentiment, s'il n'est pas vrai, paroît au moins avoir quelque vraisemblance; car on ne trouve point dans le commerce, de cacao caraque qui n'ait un peu de moisissure dans l'intérieur, & une certaine quantité de terre à la surface, au lieu qu'on trouve ordinairement le cacao des îles bien sain, & sans moisissure. Au reste, on doit choisir le cacao caraque le moins moisi qu'il est possible; & quoiqu'il le soit un peu, on ne laisse pas d'en faire d'excellent chocolat.

Le chocolat est un aliment agréable, il devient médicament lorsqu'il est question de fortifier la poitrine, & de restaurer. Il convient à ceux qui sont atteints de maladies de consomption; mais il y a des tempéramens à qui il produit de mauvais effets, à raison de la grande quantité de matière huileuse qu'il contient: c'est aux médecins qui le font prendre comme mé-

dicament, d'examiner les indications. C'est un composé d'amande de cacao & de sucre; lorsqu'il ne contient que cela, on le nomme *chocolat de santé*, & *chocolat à la vanille*, lorsqu'on en fait entrer dans sa composition. On croit communément que le chocolat à la vanille est trop chaud, & qu'il est moins bon pour la santé que celui qui n'en contient pas; mais comme il paroît certain que la vertu stomachique & cordiale de la vanille facilite la digestion du chocolat, ce dernier est meilleur par cette raison, sur-tout, lorsqu'il ne contient qu'une petite quantité de vanille.

Préparation de la pâte de cacao pour le chocolat.

On prend la quantité que l'on veut de cacao caraque, on en met environ deux ou trois pouces d'épais dans une poêle de fer très-large & très-élevée; on la place sur le feu, pour le torrifier ou pour brûler très-légèrement l'écorce ligneuse du cacao, on le remue avec une grande spatule de bois large. Lorsque l'écorce est suffisamment brûlée, on verse le cacao sur du gros papier à sucre, qu'on a étendu sur une table, où on le laisse un peu refroidir; on l'écrase légèrement avec un rouleau de bois, pour cailler seulement les écottes; on passe ce cacao à travers d'un crible très-large, pas assez cependant pour que les amandes entières puissent passer au travers. Lorsque tout le cacao est ainsi disposé, on le met par portions dans un van semblable à ceux qu'on se sert pour vanner le bled, & on l'y remue de la même manière, afin de séparer les écottes qui sortent du van. Lorsqu'il est netoyé autant qu'il peut l'être par cette méthode, on l'épluche grain à grain sur une table, pour séparer exactement toutes les portions d'écottes qui ont pu échapper au vanage, & toutes celles qui sont restées attachées aux amandes.

Lorsque le cacao est bien netoyé, on le met dans une marmite de fer, & on le fait torrifier de nouveau, en ayant soin de le remuer sans discontinuer avec une spatule de bois: on ne doit le torrifier que pour le chauffer jusqu'au centre, & non pour le torréfier. Alors on le passe un instant dans le van, pour séparer quelques légères portions brûlées, & quelques écottes qui ont échappées dans la préparation antérieure; on le met promptement dans un mortier de fer, qu'on a bien fait chauffer en l'emplissant de charbons ardens, & qu'on a bien effusé; le mortier doit être plein environ aux deux tiers. On pile promptement ce cacao avec un pilon de fer, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment réduit en pâte, ce que l'on reconnoît facilement, lorsqu'en passant le pilon à la surface de la masse, il s'enfoncé au fond du mortier par son poids seulement. Alors on enlève cette pâte hors du mortier; on la met sur une feuille de papier blanc, on

l'étend environ à un pouce ou un pouce & demi d'épaisseur, & on la laisse refroidir. On continue ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le cacao soit réduit en pâte semblable, & qu'on en ait environ une dizaine de livres.

On prépare de la même manière environ deux livres de pâte semblable, avec du gros cacao des îles Cayennes. Alors on fait avec ces pâtes de cacao le chocolat de la manière suivante.

Chocolat à la vanille.

2/ Pâte de cacao caraque		10 liv.
cacao des îles		2
Sucre en poudre grossière	..	10
cannelle	} aa.....	" 3 onc.
vanille		
gérofles.....		" " 24 gr.

On met le foir les pâtes de cacao sur une pierre à broyer le chocolat; on met sous cette pierre une poêle de braise bien allumée, & suffisamment couverte de cendre pour que la chaleur soit douce, & qu'elle puisse durer long-temps, afin d'échauffer la pierre & de ramollir les pâtes de cacao dans l'espace d'environ six à huit heures.

Le lendemain on enlève la pâte ramollie, on la met dans une bassine que l'on pose sur un fourneau rempli de cendre chaude, on conserve sur la pierre environ une livre de cette pâte, on la broie avec un tonneau de fer tourné & poli; lorsqu'elle est suffisamment broyée, on l'enlève de dessus la pierre, & on la met dans une autre bassine qu'on place sur un feu doux, afin d'en tinter la pâte liquide, on remet de nouvelle pâte sur la pierre pour la broyer. On continue ainsi de suite, jusqu'à ce que le cacao soit broyé, & l'on a soin pendant qu'on broie, d'entretenir la chaleur de la pierre par le feu de dessous, qu'on renouvelle à mesure qu'il est nécessaire; il suffit que le côté de la pierre sur lequel on broie soit chaud à ne pouvoir tenir le dos de la main qu'un instant sans être incommodé de la chaleur. Lorsque tout le cacao est broyé, on le mêle dans la bassine avec huit livres de sucre; on remue ce mélange avec une spatule de bois; on le passe de nouveau sur la pierre, pour le broyer par portions, afin d'incorporer le sucre avec le cacao; alors on ajoute à ce mélange, lorsqu'il est suffisamment broyé, la cannelle, la vanille & le gérofles qu'on a pulvérisés & passés au tamis de soie, avec deux livres de sucre; on repasse ce nouveau mélange sur la pierre, afin de mêler les aromates le plus exactement qu'il est possible. Alors on partage la pâte, tandis qu'elle est chaude, par masses de demi-livres; on les met à mesure dans des moules de fer blanc, semblables à ceux dans lesquels on fait cuire les biscuits; on étend d'abord la masse avec les doigts, & ensuite, en frappant sur les côtes du moule,

on achève de l'étendre uniformément, ce mouvement fait siffler la surface du chocolat; on le laisse refroidir dans les moules; il y durcit, & il acquiert une consistance ferme & solide. Il se sépare des moules facilement, il suffit de les tapoter ou de les presser légèrement par les deux bouts en sens contraire, comme si l'on vouloit les tordre; au moyen de ce mouvement, les tablettes qui sont adhérentes par quelques côtés, se détachent facilement, sans courir le risque de briser le moule ou le chocolat. On enveloppe les tablettes de chocolat dans du papier, & on le conserve dans un endroit bien sec, parce qu'il moisit à la surface, lorsqu'on le renferme dans un endroit humide.

Il est essentiel que le cacao soit bien mondé de son écorce avant de le soumettre à la torréfaction pour le réduire en pâte, parce que cette substance est ligneuse: elle ne peut se broyer sur la pierre, elle empêche même le cacao de se broyer. Lorsqu'on veut que le chocolat soit bien agréable, il convient, après qu'il est vanné, de le passer sur un crible moyen, afin de séparer les germes qui sont ligneux, & les parties trop menues du cacao qui se brûleraient pendant la torréfaction, avant même que les amandes fussent échauffées.

La torréfaction du cacao doit se faire avec beaucoup de ménagement, il suffit qu'il puisse s'échauffer à fond sans se rôtir; il peut, par la torréfaction toute son odeur de moisi. Les fabricants de chocolat le torréfient d'autant plus fort, que le cacao qu'ils choisissent est moisi davantage; mais alors l'huile de cacao souffre un commencement de décomposition, & l'on obtient qu'un chocolat brun & noir qui doit avoir des vertus différentes; il doit être plus âcre que lorsqu'il a été torréfié convenablement.

On sépare le papier qui adhère à la pâte du cacao en présentant les pains devant le feu, seulement un instant, ce qui liquéfie l'huile imprégnée dans le papier, & fait qu'on peut l'enlever facilement. Les doses que nous prescrivons dans la recette, forment environ vingt-deux livres de chocolat, c'est la quantité qu'un ouvrier broie ordinairement dans la journée; il pourroit, à la rigueur, faire une plus grande quantité de chocolat dans le même temps; mais il seroit moins bien façonné. On peut augmenter ou diminuer le sucre suivant son goût, il en est de même des aromates qu'on peut retoucher en entier si l'on veut, cela sera alors ce que l'on nomme *chocolat de fantaisie*.

Nous avons recommandé de piler la vanille avec une partie de sucre, parce que cette substance ne pourroit se réduire en poudre si elle étoit seule, à cause de la matière résineuse & balsamique qu'elle contient abondamment, & qui est dans un état de mollesse. Cette pulvérisation doit même se faire dans un temps sec, parce

que le suc passe difficilement au travers des tamis dans les temps humides.

On trouve dans le commerce deux espèces de vanille, l'une en petites gouffes liées ensemble, ce qui forme de petits paquets qui pèsent environ six à sept onces; la seconde espèce est en grosse gouffes larges de plus d'un pouce, de huit à dix de long, & un peu courbées; il y a de ces gouffes qui pèsent jusqu'à deux onces: cette dernière vanille est à beaucoup meilleur marché que la précédente; elle est infiniment moins estimée, parce qu'elle est de moindre qualité. Les bons fabricans de chocolat n'emploient ordinairement que la petite vanille.

Les falsificateurs de chocolat en font avec du petit cacao commun, duquel ils ont tiré une grande partie du beurre; ils mêlent ensuite à la pâte restante, une grande quantité d'amandes douces, pelées & grillées; ils emploient de la cassonade en place de suc, & du thyraz commun en place de vanille. Ce chocolat défectueux est cependant trouvé bon par ceux qui n'ont fait que peu ou point d'usage de celui qui est bien fait & préparé fidèlement; il est d'ailleurs à meilleur marché que chacune des drogues qui composent le bon chocolat.

Lorsqu'on veut préparer la boisson de chocolat à l'eau, on prend une once de chocolat coupé grossièrement, on le met dans une cafetière avec environ six onces d'eau bouillante; on agite le mélange avec un mouffoir, lorsque le chocolat est dissout, on fait agir le mouffoir en le faisant tourner rapidement entre les mains en sens contraires, & on le verse dans une tasse lorsqu'il est bien mouffé. Le chocolat qui a été préparé avec le cacao des îles, ne mouffe pas à beaucoup près autant que celui qui a été préparé avec du cacao cataque; c'est même un moyen de reconnoître sur-le-champ la fraude qu'on peut avoir faite au bon chocolat. On prépare de la même manière le chocolat avec du lait ou de la crème, avec cette différence seulement qu'on ne fait point mouffier ce dernier.

CACALIE DES ALPES, CACALIA ALPINA. (Pharmac.) *Tussilago cacalia*, Scop. carn. 2, 116. Cette cacalie croit le long des montagnes & le long des torrents, elle se trouve dans les Voges, elle est émolliente, incassante, anodine, cicatrisante, contre la toux & les catarrhes; on s'en sert ordinairement en décoction, son fruit est, dit-on, cosmétique.

(M. WILLEMET.)

CACALIE A FEUILLES DE LAITRON. (Pharmac.) *Cacalia fanchifolia* & *sonchus amboinicus*, Rumph. amb. 5, p. 297. Cette plante naît dans les Indes orientales, à l'aspect du laitron,

sa décoction passe pour fébrifuge & anti-asthmatique: son suc convient dans les diarrhées. (M. WILLEMET.)

CACALIE ODORANTE. (Pharmac.) *Cacalia odora*. Cette plante est commune dans les montagnes en Arabie. C'est M. Forskal qui l'a découverte; les tiges desséchées servent à faire des fumigations qui ont une odeur agréable, on en fait usage particulièrement dans la variole.

(M. WILLEMET.)

CACALIE PENDANTE. *Cacalia pendula*. C'est également à M. Forskal à qui nous devons la connoissance de cette plante, qui est pendante aux rochers de l'Arabie, son suc exprimé convient contre les douleurs d'otites.

(M. WILLEMET.)

CACAOYER. (Pharmac.) C'est le nom qu'on donne à l'arbre qui porte le cacao, & que Linnéus a nommé *theobroma cacao*. Voyez CACAO.

CACHOLONG. On nomme cacholong, des pierres silicees, usées, at rondies & polies, d'un blanc gris, laiteux, jaunâtre ou blenâtre, plus ou moins demi-transparentes, de la nature de l'agate ou de la calcédoine, & qui paroissent avoir pris leur forme par leur frottement dans l'eau.

On les employoit autrefois à quelques ornemens; elles n'ont pas encore été analysées en particulier, on les confond par leur nature intime avec la calcédoine. On peut ranger le cacholong parmi les combinaisons naturelles de silice & d'alumine en grande quantité. Voyez CALCÉDOINE.

CACHOU. (Pharmac.) *Mimosa catechu*. C'est un extrait sic qui se retire d'un arbre des Indes; il y a plus de 300 ans que le cachou est employé en médecine, malgré cela, on ignore la véritable origine. Les anciens ont regardé pendant très-long-temps le cachou comme une espèce de terre, tandis que les modernes pensoient que c'étoit un suc végétal. Les expériences chimiques ont démontré que les sentimens des derniers étoient incontestables; mais jusques-là, on ignore le nom du végétal d'où on le retire, lorsqu'enfin Linnéus l'attribua, sans contredit, d'après des enseignemens peu certains, à une sorte de palmier, qu'il nomma *arcea catechu*. Les écrivains de matière médicale qui vinrent après, copierent exactement cette fausse attribution. C'est à Kett, chirurgien Anglois, qui a vécu pendant long-temps dans le Bengale, que nous sommes redevables des connoissances botaniques de l'arbre indien auquel on doit le cachou. Il a consigné à cet effet, dans un recueil anglois d'observations &

de

de recherches de médecine, non-seulement la description exacte de cet arbre, mais bien encore une gravure qui en représente la figure d'après nature. Avec ces excellentes indications, l'illustre & célèbre professeur, M. Murray, protecteur de l'université royale de Göttingue, l'a reconnue pour appartenir au genre des *mimosa*, & la spécifie sous le nom de *mimosa catechu*, dans son *apparat des médicaments*, tome II, page 415. La nouvelle pharmacopée Suédoise, a adopté cette découverte phytologique sous cette même dénomination individuelle.

Le cachou est un extrait sec, résineux, brun foncé, noirâtre, compact, brillant, amer. On le mêle avec les apéritifs, de peur que ceux-ci ne dérangent l'estomac. Comme stomachique, on le prescrit à la dose de dix grains jusqu'à trente, même plus, à ceux qui digèrent difficilement, & qui ont l'estomac foible. En décoction, la dose est depuis demi-gros jusqu'à un gros. Comme astringent, il convient dans les pertes des femmes; dans les excréments augmentés, dans les fleurs blanches, dans les vieilles gonorrhées, les hémorroïdes trop abondantes, le vomissement ou le crachement de sang. Dans le traitement du scorbut, sur-tout de nature alcaline, on le donne avec avantage; il empêche que les anti-scorbutiques ne dérangent l'estomac; on l'ajoute aux gargarismes avec avantage. Mâché, il corrige la puanteur de l'haleine. Il est bon aussi pour arrêter le pyralisme ou salivation dans le traitement de la vérole. On l'emploie aussi avec succès dans l'incontinence d'urine & dans le diabète. Deidier en a fait usage pour consolider un ulcère à l'estomac: c'est un si puissant antiseptique, qu'il empêche la corruption des chairs.

Le cachou se purifie à l'eau. La pharmacopée de Wirtemberg offre la manière de préparer l'essence de terre de cachou avec l'esprit de coings ainsi que celle des trochisques. La pharmacopée de Londres donne la formule d'une teinture Japonaise, qui est composée avec le cachou, la cannelle & l'alcool. Le cachou entre dans la teinture balsamique pour les genives, la poudre & les pilules astringentes, les tablettes absorbantes & fortifiantes, la poudre pectorale ou le looch sec; la confection japonique, les tablettes de terre du Japon, les trochisques contre le crachement de sang, la poudre de fuccin composée suivant le dispensaire de Londres.

(M. WILLETET.)

CACHOU. (*Pharmacie.*) Le cachou est l'extrait du suc des semences d'un fruit gros comme un œuf de poule, que l'on nomme *areca*. Ce fruit croît sur une espèce de palmier sur les côtes maritimes des Indes orientales: c'est à M. de Jussieu, de l'académie des sciences, que nous sommes redevables de l'histoire naturelle du cachou, & de la manière dont on le prépare dans le pays.

Chimie, Tome II.

On coupe par tranches les semences du fruit de l'*areca* lorsqu'elles sont vertes: on les fait macérer long-temps dans une suffisante quantité d'eau à une chaleur toujours égale. Lorsque la macération est finie, on passe la liqueur, & on fait évaporer toute l'humidité; il reste un extrait qui durcit quelque temps après qu'il est refroidi: on le concasse par morceaux, & on nous l'envoie.

Le cachou est de différentes couleurs & de différentes saveurs, ce qui avoit donné lieu de penser à ceux qui en avoient parlé avant M. Jussieu, que ce pouvoit être un mélange de différents extraits tirés de plusieurs végétaux séparément. Mais ces variétés du cachou viennent de différents degrés de maturité des fruits, & de la chaleur plus ou moins forte qu'on lui a faite éprouver sur la fin de sa cuite, qui varie suivant l'intelligence de l'ouvrier.

On doit choisir le cachou en morceaux bruns, couleurs de marron un peu foncée, d'une légère amertume, mêlée d'un peu d'astringition, se fondant entièrement dans la bouche, & laissant un instant après une saveur agréable, tirant sur le sucré: celui qui est le plus coloré, est soupçonné d'avoir été un peu brûlé pendant sa fabrication.

Le cachou ayant été préparé par des mains étrangères, a besoin d'être purifié avant d'être pris & employé dans les préparations dont nous parlerons à l'article des trochisques. On purifie le cachou comme nous le dirons tout-à-l'heure, & c'est ce que l'on nomme *extrait de cachou*.

Le cachou est un fort bon stomachique amer, propre à donner du ton aux fibres de l'estomac; il est astringent, il convient dans les dysenteries; il corrige la mauvaise odeur de l'haleine.

La dose est depuis vingt-quatre grains jusqu'à un gros en poudre, ou infusé dans un verre d'eau bouillante comme du rhé.

Extrait de cachou.

On prend la quantité que l'on veut de cachou: concassé, on le fait bouillir dans une suffisante quantité d'eau; lorsqu'il est entièrement dissous, on passe la liqueur au travers d'un blanchet, on la fait évaporer au bain-marie jusqu'en consistance très-solide, afin qu'on puisse la réduire en poudre.

L'extrait de cachou a les mêmes vertus que le cachou en substance, & se donne à la même dose.

Les matières étrangères qui restent sur le blanchet après que la décoction de cachou est passée, sont en petite quantité, & sont de la féculé & de la terre; la liqueur filtrée est claire, limpide, & d'une couleur rouge, tirant sur le brun tant qu'elle est chaude; mais lorsqu'elle tient beaucoup de cachou en dissolution, & qu'elle vient à se refroidir, elle se trouble, & elle se ré-

Pppp

duit toute en un *magma*, de couleur de rouille de fer, à-peu-près semblable à ceux qu'on trouve dans les mares d'eaux minérales ferrugineuses. Ce *magma* se dissout complètement en réchauffant la liqueur. On peut attribuer ce phénomène à la substance résineuse du cachou, qui est prodigieusement divisée, & qui se sépare en quelque manière d'avec la partie gommeuse, par le refroidissement de la liqueur; mais que la chaleur combine parfaitement avec la substance gommeuse pendant l'évaporation. Cet extrait est un peu plus noir que le cachou, sa saveur est un peu plus amère, il n'attire point l'humidité de l'air comme la plupart des autres extraits, parce qu'il est peu salin.

CACHOU A LA CANNELLE. (Pharmacie.)

℥ Cachou.....	℥ iij.
sucre.....	℥ xiv.
camelle.....	G. xxxvj.
huile essentielle de camelle.	Gutt. v.

On forme des trochisques comme les précédents, avec une suffisante quantité de mucilage de gomme adragant, préparé avec de l'eau de cannelle.

Toutes les différentes préparations de cachou dont nous allons parler, ont toutes à-peu-près les mêmes vertus. Elles sont stomachiques & astringentes; elles corrigent la mauvaise haleine; on en laisse fondre quelques grains dans la bouche; elles sont plus d'usage pour l'agrément que pour la médecine.

CACHOU A LA FLEUR D'ORANGE. (Pharmacie.)

℥ Cachou.....	℥ iij.
sucre.....	℥ xiv.
huile essentielle de fleur d'orange.....	Gutt. vj.

Avec une suffisante quantité de mucilage de gomme adragant, préparé avec de l'eau de fleurs d'orange, on forme ces trochisques.

CACHOU A L'AMBRE GRIS. (Pharmacie.)

Cachou.....	℥ ij. ℥ iv.
sucre.....	℥ xij.
ambre gris.....	gr. viij.

On forme du tout des trochisques avec une suffisante quantité de mucilage de gomme adragant.

Quelques personnes ajoutent un ou deux grains de musc pour leur donner plus d'odeur, & communément on prend cette dernière odeur pour celle

de l'ambre; cependant l'ambre gris n'a qu'une odeur douce & agréable, & absolument différente de celle du musc.

CACHOU A LA RÉGLISSE. (Pharmacie.)

℥ Cachou.....	℥ ij.
extrait de réglisse (1).....	℥ j.
sucre.....	℥ x.

Avec une suffisante quantité de mucilage de gomme adragant préparé à l'eau, on forme une pâte solide.

On fait chauffer légèrement un mortier de marbre, & on y ramollit l'extrait de réglisse par le moyen d'un pilon de bois: on le délaie avec un peu de mucilage, on ajoute le sucre & le cachou, l'un & l'autre en poudre fine; on forme une pâte ferme avec une suffisante quantité de mucilage, & on la pile jusqu'à ce que le mélange soit exact, alors on divise cette masse en trochisques comme des grains d'avoine, on les fait sécher, & on les conserve dans une bouteille qui bouche bien.

Quelques artistes font dans l'usage de rouler ces trochisques en se graissant les mains avec de l'huile de bœuf ou d'amandes douces, afin de les empêcher de s'attacher; mais c'est une très-mauvaise méthode, parce qu'il reste sur les grains une petite pellicule d'huile qui rancit quelque temps après que ces trochisques sont formés, ce qui leur communique une odeur & une saveur très-désagréables, qu'il est bon d'éviter, parce que ces trochisques sont faits pour être agréables; il faut plutôt employer un peu d'eau qui n'entraîne avec elle aucun inconvénient, & qui est tout aussi commode que l'huile.

CACHOU A LA VIOLETTE. (Pharmacie.)

℥ Cachou.....	℥ ij.
extrait de réglisse. } a a . . .	℥ j. 6
iris de Provence. }	
sucre.....	℥ xij.

On forme du tout une masse, avec une suffisante quantité de mucilage de gomme adragant préparé à l'eau, & on la divise par petits trochisques comme les précédents.

L'iris de Provence donne à ces trochisques l'odeur de violette.

CACHOU SANS ODEUR. (Pharmacie.)

Cachou.....	℥ iij.
sucre.....	℥ xij.

Avec une suffisante quantité de mucilage de gomme adragant préparé à l'eau, on forme des trochisques comme les précédents.

(1) De celui qu'on tire de la première infusion de cette racine.

CADE. (Pharmacie.) *Juniperus oxycedrus*. C. *Oxycedrus*. Luf. hist. t. 319. C'est un grand genévrier qui se trouve dans le Languedoc, la Provence, l'Espagne, sur la côte de Barbarie. On distille son bois à la cornue pour en tirer une huile fetide, que les maréchaux & les vétérinaires emploient pour la galle & les ulcères des chevaux, des brebis & des moutons, & qui est connue sous le nom d'huile de cade. Elle entre dans l'emplâtre gris, vulgairement appelé baume verd du dispensaire de Paris. — L'on retire aussi de ce même bois un esprit.

La sandarac découle de cet arbre.

(M. WILLEMET.)

CADELARI. (Pharmacie.) *Achyranthes aspera*. Plante bisannuelle du Malabar, qui croît dans les terrains pierreux. Sa racine est purgative; sa décoction fortifie l'estomac, dissipe les vents, brise les calculs de la vessie.

(M. WILLEMET.)

CADMIE. Trois substances très-différentes portent en minéralogie & en métallurgie, le nom de cadmie.

L'une est la cadmie des fourneaux; c'est un oxyde de zinc qui, en se formant dans les fourneaux où l'on traite les mines de ce métal à Ramelsberg, se sublime & s'attache aux parois de ces fourneaux; cet oxyde, en y recevant une chaleur considérable, éprouve une demi-fusion qui lui donne une consistance; il forme, en peu de temps, des incrustations épaisses, qu'on est obligé d'enlever assez souvent. Dans les fonderies des mines, on adopte ce nom de cadmie pour toutes les suies ou fumées métalliques qui se condensent ainsi aux cheminées, aux voûtes, aux parois des fourneaux, & qui sont de nature très-différente, suivant les mines qu'on y traite. On voit qu'en général le mot cadmie n'est donné qu'à des matières impures, & que, lorsqu'on désigne en particulier par ce mot, un oxyde de zinc sublimé, c'est de celui qui est préparé dans les laboratoires de chimie ou de pharmacie qu'on doit se servir pour être sûr de sa nature & de ses effets, au lieu d'employer la cadmie des fourneaux, dont on ne connoissoit pas autrefois exactement la nature.

On trouve dans beaucoup d'auteurs le nom de cadmie naturelle ou cadmie fossile, employé pour désigner la calamine, espèce de mine de zinc, ou carbonate de zinc natif, qu'on emploie pour faire le cuivre jaune ou laiton, & dont on exposera l'histoire & les propriétés à l'article du ZINC.

Enfin, le mot cadmie fossile a encore été employé par quelques minéralogistes, pour désigner un minéral contenant du bismuth, de l'argent & du cobalt, dont l'oxyde colore le verre en bleu. Ce minéral est une espèce de mine de cobalt,

puisque ce métal y est plus abondant que les autres.

CAFFAYER ou CAFFEYER. (Pharmacie.) *Coffea Arabica*. Ce petit arbre précieux croît naturellement dans l'Arabie heureuse, dans l'Éthiopie, & on l'a naturalisé dans divers endroits de la France & de la Hollande. La décoction de son fruit torréfié & pulvérisé, fait les délices de toute l'Europe depuis 1650; mais ses excellentes qualités lui doivent mériter une place distinguée dans la classe des médicaments. La décoction de café prise sans sucre, dit Lauthon, a arrêté un flux de ventre excessif; elle a guéri suivant Nébelius une céphalalgie périodique; & Baglivi s'est délivré, lui & plusieurs personnes, d'une céphalalgie sympathique, qui prenoit quelques heures après le dîner, & qui étoit causée par un vice de l'estomac, qui empêchoit ce viscère de remplir ses fonctions; le même auteur l'a recommandé dans les douleurs de la pierre & de la goutte. Il est certain que les femmes Égyptiennes la mettent fréquemment en usage à l'approche de leurs règles, afin de rappeler le cours irrégulier de cette évacuation. Lauthon a encore donné avec soulagement la décoction de café faite avec le lait pur, soit d'ânesse ou de chèvre, dans l'asthme, la leucophlegmatie, la goutte, le rhumatisme, la passion hystérique, la toux sèche. Enfin, on lit dans les mémoires de l'académie des sciences, que cette décoction est utile dans les affections vaporeuses, & dans l'apoplexie sous la forme de clystère.

Le café entre dans l'énumération des médicaments simples du dispensaire de Paris.

(M. WILLEMET.)

CAILLE-LAIT BLANC. (Pharmacie.) *Galium mollugo*, *mollugo*. Dod. pempt. 354. Cette plante est commune dans toute l'Europe, le long des haies, sur les bords des chemins humides, dans les prairies, les friches. Elle est vivace, sa tige est, dit-on, dessicative, astringente, teinte en rouge comme la garance. Les sommets fleuris sont anti-épileptiques & contre la goutte; elles peuvent remplacer celles du caille-lait jaune. Nous allons rapporter ce que plusieurs feuilles périodiques ont publié concernant le caille-lait blanc. M. Jourdan, lecteur de l'hôpital de Tain en Dauphiné, est possesseur d'un remède contre l'épilepsie, qu'il fait administrer gratuitement depuis plusieurs années avec le plus grand succès. En voici la recette :

« Prenez suffisante quantité de la plante appelée caille-lait à fleurs blanches, pilez-la dans un mortier, & versez dessus, en la pilant, le poids d'une once de bon vin blanc. Lorsqu'elle sera bien pilée, vous l'exprimerez pour en tirer cinq à six onces du suc que vous donnerez au malade.

Pppp2

Cette plante est celle que Linnéus appelle *galium mollugo*. On la cueille du 20 au 30 mai, ou du 20 au 30 septembre, parce qu'il importe qu'elle soit bien en fleurs, & que c'est-là le moment de sa floraison. Avant d'en administrer le suc, on prépare le malade en le faisant dîner à dix heures du matin, la veille du jour qu'il doit en faire usage. On le laisse après ce repas, sans boire ni manger jusqu'au lendemain à huit heures du matin. Alors on lui fait avaler le suc de cette plante, qui doit n'être exprimé que demi-heure auparavant. Le malade se promène ensuite pendant une heure, au bout de laquelle il prend un bouillon fait avec le veau & le mouton, & continue de se promener encore une heure ou deux. Il reprend ensuite ses repas aux heures accoutumées.

M. Jourdan donne le suc, & non la décoction de la plante, ce suc doit être récemment extrait; il y prépare l'estomac par la diète rigoureuse. Ainsi le remède ne perd rien de son énergie, & le viscère qui le reçoit, débarrassé de tout aliment, en ressent entièrement les effets. De-là viennent, sans doute, les cures merveilleuses qu'il a opérées.

(M. WILLET.)

CAILLE-LAIT JAUNE. (*Pharmacie.*) *Galium verum. Galium luteum.* Ray, hist. 1, 482. C'est une des plantes les plus communes de toute l'Europe. Elle aime les prés, le bord des chemins, spécialement les terres sèches & sablonneuses. Elle est vivace, ses sommités fleuries sont officinales. Les médecins les emploient contre les maladies convulsives; elles sont d'ailleurs apéritives & emménagogues. Cette plante réduite en poudre, à la dose d'un gros, ou en décoction, une poignée sur une pinte d'eau, offre un excellent médicament contre l'épilepsie. La chirurgie & la médecine vétérinaire peuvent également en retirer de grands secours.

M. Bonafos le jeune, médecin de Colioure, a fait insérer dans le second volume du recueil d'observations de médecine des hôpitaux militaires, fait & rédigé par M. Richard de Haute-Sierck, page 449, une observation qui constate la guérison d'une épilepsie traitée par l'usage du caille-lait jaune.

Ses sommités fleuries sont encore employées avec succés à faire d'excellents fromages, à teindre les étoffes de laine en jaune; elles sont aimées des chèvres, des brebis, &c. Cette plante figure très-bien dans les gazons champêtres. Sa racine a la propriété de colorer en rouge les draps & les laines. Les animaux qui s'en nourrissent quelque temps, ont leurs os purpurins. Les Italiens mangent cette racine pour s'exciter à l'amour.

Les herboristes vendent souvent le caille-lait des bois, (*galium sylvaticum*) en place de l'hé-

patique étoilée. (*Asperula odorata*.) Les caille-lait font partie de notre monographie sur les plantes étoilées, couronnée par l'académie des sciences de Lyon en 1790.

(M. WILLET.)

CAILLOU. Le caillou est, pour les minéralogistes, une pierre scintillante, silicee, opaque, composée de couches concentriques, dont la forme extérieure est la plus ordinairement arrondie, plus ou moins elliptique, ovoïde, comprimée; la surface plus ou moins lisse ou polie, la cassure vitreuse & souvent écaillée, le grain fin & serré. On le trouve en couches ou lits considérables, au milieu de la craie, ou dans des argiles & des marnes; il ne faut pas le confondre avec le silex, qui se rapproche des agates ou des calcédoines par la demi-transparence, & qui n'est pas formé par couches.

Le caillou est de toute couleur, depuis le gris jusqu'au rouge & au brun foncé; on y trouve des raches, des veines & des nuances de diverse teinte; souvent même les nuances y font naître des formes diverses, des veines, des herborisations, des accidens quelconques, en raison desquels les cailloux sont plus ou moins priés par les amateurs. On distingue sur-tout parmi les pierres, les cailloux d'Egypte, qui, sur un fond brun, ou verd sale, foncé, offrent des herborisations grises, jaunes, fauves ou noires, dont les dessins sont très-variés. La description & le dénombrement des variétés de caillou, appartient au dictionnaire de minéralogie. On ne doit considérer ici cette pierre que par rapport à sa nature intime, ou à sa composition naturelle, & aux propriétés chimiques qu'elle présente.

La pesanteur spécifique du caillou va, suivant Kirwan, entre 2,65 & 2,700. Il est insubmersible au feu le plus violent; il se délite & s'éclate en le plongeant subitement dans l'eau froide, après l'avoir fait rougir. Les acides ne l'attaquent point; les alcalis fixes l'entraînent dans leur fusion, c'est par leur moyen qu'on en a fait l'analyse. On y a trouvé 0,80 de silice, 0,18 l'alumine & 00,2 de chaux. Les cailloux très-colorés contiennent, en outre, une portion d'oxide de fer.

CALAGUALA. (*Pharmacie.*) C'est la racine d'une plante qui croît spontanément à Quito & à Popoyant, dans le Pérou. M. Dominique-Louis Gelmenti, médecin Italien, a publié en 1788, une dissertation Italienne, sur les excellents effets qu'a produits cette racine dans diverses maladies que nous avons fait connaître dans le journal de médecine, tome 86, page 196: l'on y trouve la description de cette racine & des observations médicales qu'il a eu occasion de faire dans les maladies qu'il a guéries par son usage. Il ne donne point le nom de la plante, que les

botanistes ne connoissent pas. On le trouve seulement dans la seconde édition de la pharmacopée de Madrid, & dans le dictionnaire d'histoire naturelle, que le calaguala est beaucoup plus usité en Espagne & en Portugal qu'en France. En effet, l'on connoit peu ce médicament en France. On estime la racine de *calaguala* apéritive & très-sudorifique; on en fait usage en poudre, à la dose d'un demi-gros, & quelquefois d'un gros. (M. WILLEMET.)

1. CALAMENT ORDINAIRE. (Pharmacie.) *Melissa calamintha*. *Calamintha*, Cam. sp. 481.

2. CALAMENT DES MONTAGNES. (Pharmacie.) *Melissa grandiflora*. *Calamenta magno flore*. C. B. 43.

3. CALAMENT DES CHÂMPES. (Pharmacie.) *Mentha arvensis*. *Calamenta arvensis verticillata*. C. B. 219.

4. CALAMENT A ODEUR DE POULIOT. (Pharmacie.) *Melissa nepeta*. *Calamenta altera*. Dod. pempt. 98.

5. CALAMENT DE CRÈTE. (Pharmacie.) *Melissa cretica*. *Calamenta incana, ocyimi foliis*. C. B. 219.

Tous les calaments ont une odeur balsamique, & se trouvent dans presque toutes les contrées de l'Europe. On le prescrit en infusion comme le thé. Ils excitent la sueur, redonnent le ton aux intestins & à l'estomac, lèvent les obstructions & les engorgemens, excitent les règles, rétablissent la suppression des lochies, détergent les ulcères des reins, sont céphaliques, anti-histériques, contre l'asthme.

La fleur plaît aux abeilles, entre dans le sirop de Stéchas composé.

Les feuilles sont aimées des chèvres & des bœufs, entrent dans le sirop d'armoïse, la thériaque & l'huile de scorpion, composé. Les sommités entrent dans la poudre d'acier, les espèces céphaliques, résolutives, le sirop de marshée de Rhafis, & dans celui d'Epithime. Le même auteur se servoit du calament dans le looch saïg, & expérimenté, dans l'électuaire d'avis, & dans celui de *gualanga*. Les sommités de cette plante entrent encore dans l'eau vulnéraire & l'onguent martial.

Haller dit que l'on en prépare une eau par la distillation, qui est odorante & bonne dans la faiblesse d'estomac, & pour exciter les mois. Mésuë recommande le sirop de calament contre l'asthme & le hoquet. On donnoit autrefois le *diacalamentum* de Nicolai, dans la toux provenant de cause froide. On trouve dans

la pharmacopée de Lemni, la formule de la poudre de calament composée de Nicolai d'Alexandrie.

Il paroît que les calaments étoient d'un usage fréquent chez les anciens, & qu'ils y étoient en vénération.

(M. WILLEMET.)

CALAMUS ou ROSEAU AROMATIQUE. (Pharmacie.) *Acorus, Calamus aromaticus*. Gata. 218.

C'est une plante arundinacée, vivace, par-lustré, qui se trouve également aux Indes, en Amérique, au Japon & en Europe, dans les fossés marécageux. La racine est employée en médecine, elle est odorante; il faut la faire sécher assez vite; la choisir blanche en dedans, légère, jaunâtre à l'extérieur, genouillée. Elle est très-propre pour fortifier la mémoire & surtout l'estomac; elle passe pour être nervine, emménagogue, cordiale, alexitere, contre les fièvres malignes, exanthématiques & autres, pour provoquer les menstrues, contre les maux de dents.

Une lettre de M^r Lebeau, médecin au Pont-de-Beauvoisin, sur les effets salutaires de la racine de roseau aromatique, dans les hémorragies, insérée dans le journal de médecine, tome 10, page 373, mérite d'être placée ici.

« Quoique j'eusse vu réussir plusieurs fois, dit M. Lebeau, dans les mains de mon père, qui avoit soixante ans de pratique, la racine de *calamus aromaticus officinarum*, dans les hémorragies, j'en rapportois l'effet au hasard ou à la nature. La pratique m'a depuis appris que les astringens terreaux, & que tous ceux que les auteurs ont tant vantés, faisoient peu d'effets dans les hémorragies internes; que cette maladie demandoit des réflexions & de la variété dans l'application des remèdes; que souvent elle dépendoit d'une certaine qualité visqueuse dans la lymphé, qui, s'embarassant dans toutes les tuyaux, gênoit les vaisseaux sanguins; que dans des vomissemens même de sang, avec étourdissemens, bouffissures, relâchement dans tous les solides, exanthèmes sur la peau, l'émétique avoit été le meilleur remède, comme tout praticien l'a dû observer dans les pertes utérines où l'estomac est dérangé.

Je crois donc devoir inviter tous les praticiens à se servir avec confiance de la poudre de cette racine, depuis demi-drachme jusqu'à une drachme, dans un véhicule ou en bol; rarement j'ai été obligé de réitérer la dose demi-heure ou une heure après.

Jamais ce remède ne m'a manqué dans les hémorragies du nez, même dans les fièvres où l'on soupçonne la dissolution putride du sang; il est vrai que, dans tous les cas où je l'ai employé, j'ai donné le temps aux vaisseaux de se dégorger, & à la pléthore de se dissiper, quand j'en

à juger par la couleur du vilage, par le poids & les autres caractères, *monstruosa* ou *ultra*.

Quels miracles cette poudre ne fait-elle pas dans les fausses couches, dans les avortemens, où la periculis des puits, la prolifération des forces paroissent exiger des cordiaux, les pertes considérables, des émétiques, des stupéfiants, qui, souvent ne font qu'opprimer la nature? J'ose avancer qu'elle facilite, comme par enchantement, l'expulsion des lambeaux des arrières fuit, & qu'elle aide l'accouchement, en prévenant & arrêtant les pertes immodérées.

La racine de roseau aromatique est employée par les parfumeurs. Elle peut suppléer comme épice.

Turquet faisoit l'usage d'un vin préparé avec cette racine, comme spécifique dans les vertiges. Valérius Cordus faisoit cas de l'huile distillée de la même racine, & il prescrivait souvent à ses malades cette racine confite au sucre. Le dispensaire de Paris indique l'eau distillée avec les racines sèches. Schröder donne la préparation d'une confection & d'un électuaire avec le calamus. L'on trouve dans les pharmacies de la Virginie & de la Nouvelle Angleterre, l'extract & l'esprit de cette racine. Linneus fait mention de trochisques d'*Acorus* dans la matière médicale.

Le calamus aromatique entre dans, Porvietin, la thurique, le Mithridate, l'electuaire de baies de hurier, l'opie de Salomon, l'essence d'absynthe composée, l'elixir de vie de Matthioli, le vinaigre anti-septique, l'eau impériale, l'eau générale, la poudre stomaquique de Bircman; l'elixir de vitriol, l'essence carminative de Wedel, la pomade blanche, le sirop de Stechas composé, l'huile de safran, les trochisques *pyphos*, dans celles de capres, la decoction & la poudre céphalique.

L'on a tenté en Suède avec succès l'usage de cette racine contre l'algale scorbutique.

Jean-Adolphe Wedel a composé une dissertation sur le roseau aromatique.

(M. WILLEMET.)

CALCÉDOINE. La calcédoine est une pierre dure, scintillante, siliceuse ou quartzuse, qu'on a confondu avec les quartz, les agates & les cailloux, & qui, cependant, n'appartient véritablement à aucun de ces genres, & doit former un genre particulier, en raison de ses caractères distinctifs bien tranchés. M. Daubenton qui le premier, l'a bien séparée & distinguée des quartz & des agates, lui a donné pour caractère une transparence laiteuse. Cette pierre est d'un grain très-fin, susceptible d'un beau poli, semblable à l'agate par sa dureté. M. Daubenton en distingue dix variétés par la couleur & la forme; telles sont les calcédoines rougeâtres,

bleuâtres, verdâtres, onix, les irisées qu'on nomme *opales*, les améthystes & solides ou les *gribois*; les arrondies & irrégulières, souvent remplies d'eau; & qu'on connoît à cause de cela sous le nom d'*enhydryx*; les calcédoines en filacités; celles en sédiment; & les *hydrophanes*, dont le caractère est de devenir transparentes, lorsqu'on les tient plongées dans l'eau.

La calcédoine se comporte au feu absolument comme le silex ou l'agate; les flux alcalins l'entraînent de même en fusion; elle résiste aux acides. L'après Bergmann; une calcédoine de ferroc, contient 0,84 de silice, & 0,16 d'alumine. M. Bindeheind a trouvé dans une autre variété de calcédoine, un peu de terre calcaire & d'oxide de fer.

La calcédoine doit son origine ou sa formation à l'eau, aussi la trouve-t-on composée de couches, ou déposée à la manière des filacités. Il est plusieurs calcédoines creuses qui contiennent de l'eau; on rencontre beaucoup de ces espèces d'enhydryx aux environs de Vienna.

La calcédoine étoit fort estimée des anciens, qui en faisoient des bijoux où l'on a trouvé les traces des grands talens de leurs graveurs. Les cabinets précieux contiennent un grand nombre de ces pierres antiques. Les Grecs & les Romains choisissent sur-tout deux couches très-contrastantes en couleur pour les graver & former des camées. On en fait encore aujourd'hui le même usage. Les plus gros morceaux de calcédoine font quelquefois employés dans les laboratoires de chimie, pour faire des mortiers, des capsules, des tables pôt recevoir des matières fondues, pour broyer des substances en poudre, &c. &c.

CALCINATION. Il n'est pas douteux que le mot calcination, n'ait pour origine le mot latin *calx*, & que ce ne soit de l'opération par laquelle on convertit les matières calcaires en chaux, que ce mot n'ait été tiré. Comme dans les temps déjà reculés, où les mots latins *calcinatio*, *calcinaré*, ont donné naissance au mot français calcination, ont été employés, on étoit fort éloigné de savoir ce qui se passoit dans l'opération par laquelle on convertissoit les matières calcaires en chaux, comme pendant une longue suite de siècles, on n'a imaginé que des hypothèses pour expliquer cette opération, & qu'il n'y a qu'une vingtaine d'années qu'on a pu apprécier avec exactitude ce qui arrive dans la fabrication de la chaux; le mot calcination a été appliqué à plusieurs phénomènes comparés les uns aux autres par une analogie trompeuse; c'est ainsi qu'on a dit calciner des métaux. Quand on recherche la raison de cette dénomination générale donnée à différentes opérations, on n'en trouve d'autre qu'une apparence uniforme dans les produits; il semble que ce soit tout simplement la conversion par le feu d'une substance solide en une matière

pulvérulente, qui ait fait adopter ce nom pour toutes les opérations où cette conversion a lieu. Ainsi, la pierre à chaux perdant sa dureté & sa cohérence, & devenant plus ou moins friable par sa calcination, on a cru que la même chose arrivoit aux métaux chauffés avec le contact de l'air, en les voyant perdre leur ténacité, leur solidité, leur ductilité, & prendre la forme de poussières, ou de plaques & de lamelles cassantes, colorées, privées de brillans métalliques. Avant qu'on eût trouvé ce qui arrive aux métaux dans cette opération, il étoit bien naturel de croire qu'ils perdoient comme les matières calcaires, un ou plusieurs principes auxquels étoit dues leur cohérence, leur éclat & leur ductilité. Les expériences modernes ayant prouvé que c'est au contraire en absorbant un principe de l'atmosphère, que les substances métalliques changent de forme & de nature, & que c'est pour cela qu'elles ne peuvent éprouver ce changement, sans avoir le contact de l'air, on fait aujourd'hui qu'il n'y a nulle analogie réelle entre la calcination des matières calcaires & la prétendue calcination des substances métalliques. Cette dernière opération est une véritable combustion ou une oxidation. Voyez ces mots.

Il résulte des observations précédentes, que la calcination consiste dans la séparation d'un ou de plusieurs principes volatils, fusibles en gaz dans le calorique, & que les composés qui l'éprouvent sont décomposés plus ou moins complètement par son effet. Ainsi les matières crétacées, perdent de l'eau & de l'acide carbonique, pendant qu'on les calcine & qu'elles passent à l'état de chaux. Les sels calcinables ne perdent le plus ordinairement que l'eau de leur cristallisation. Tels sont la plupart des sulfates alcalins & terreux, les borates, les muriates, &c.

Les matières animales solides, que l'on calcine comme les os, perdent tous les principes volatils qu'ils contenoient, en huile, en ammoniacque, en eau, en gaz hydrogène carboné, en acide carbonique, & en gaz azoté, &c.

La plupart des pierres, & même les plus solides, exposées au feu de calcination, perdent leur consistance, semblent perdre en même-temps leur gluten; c'est où de l'eau volatilisée, ou à un simple écartement de leurs parties & à une dissolution des molécules terreuses, que cet effet est dû; en même-temps leur transparence disparoit, elles deviennent blanches; mottes, cassantes, quelquefois même friables.

Voilà ce qu'il est essentiel de savoir pour l'intelligence des phénomènes de la calcination, & sur tout pour déterminer les limites de cette opération avec exactitude, ainsi que pour connoître les différences qu'elle offre d'avec plusieurs autres opérations, dans lesquelles on l'avoit autrefois confondue.

Comme la calcination est toujours employée pour séparer quelque matière volatile d'avec les fixes, & pour obtenir les dernières isolées & débarrassées des autres, on a coutume de la pratiquer dans des appareils ouverts, comme des creusets, des pots, des capsules de terre ou de métal, & même quelquefois dans des fours, en sorte que les produits volatils & gazeux s'échappent & se dissolvent dans l'atmosphère. Cependant, si ces appareils simples fussient aux procédés des arts chimiques, ils sont insuffisants pour la philosophie de la science, & pour assurer la théorie des phénomènes qui constituent la calcination. C'est ainsi que dans les expériences destinées à la démonstration de la chimie, on opère les calcinations des pierres à chaux dans des vaisseaux fermés, une cornue de grès, un canon de fusil, en un mot, un appareil distillatoire, propre à résister à un grand feu, & dont l'extrémité est disposée pour recueillir le gaz acide carbonique & l'eau qui se dégagent pendant cette calcination, & à prouver que la chaux qui reste après l'opération, est de la craie; moins l'acide carbonique & l'eau. C'est ainsi qu'on prouve encore qu'en calcinant les sels neutres non décomposables, on n'en sépare que de l'eau, tandis que le même procédé employé sur les sulfates d'alumine, de fer, de zinc, de cuivre, &c. prouve que les sels après avoir perdu l'eau de leur cristallisation, perdent encore une portion de leur acide, d'autant plus abondante qu'on les chauffe plus fortement & plus long-temps.

D'après ce tableau rapide de la calcination, on voit combien d'erreurs les chimistes commettoient autrefois en rangeant sous cette opération, la combustion ou l'oxidation des métaux. On reconnoitra spécialement ces erreurs dans l'article CALCINATION, du Dictionnaire de chimie de Macquer. On y verra quelle latitude cet homme célèbre avoit été obligé de donner à sa définition de la calcination, & qu'elles idées vagues & incertaines devoient résulter de cette définition indéterminée. Les mots CHAUX, CARBONATE DE CHAUX, COMBUSTION, OXIDATION, MITAUX, SELS NEUTRES, PLÂTRE & SULFATE DE CHAUX.

CALCULS. Une des parties les plus curieuses de l'analyse animale, une de celles qui deviendra par la suite de la plus grande utilité, est celle qui a pour objet les calculs ou les concrétions solides qui se forment dans les différentes parties des animaux. Il en a déjà été question dans plusieurs articles de cet ouvrage, & spécialement dans celui des acides animaux. On ne doit au mot acide lithiaïque, les découvertes faites par Schéele, sur la nature du calcul vésical ou urinaire de l'homme. Il a été ajouté quelques détails sur plusieurs autres calculs animaux, à l'article URZARD. La lecture de ces

différents articles suffit pour faire connoître l'état des connoissances chimiques acquises jusqu'à ce jour sur cet objet; mais elle doit aussi faire sentir combien il manque encore de détails, & quelles découvertes restent à faire, & quels suites de travaux elles exigent.

Les analyses comparées de toutes les concrétions animales, promettent deux grands avantages; le premier, c'est d'éclairer la physique animale, en faisant connoître les principes qui les forment & qui leur donnent naissance; le second, c'est de favoriser les recherches nécessaires pour parvenir à la guérison de ces maladies toujours dangereuses. A la vérité, la carrière qu'il faut parcourir à cet égard, est immense; si l'on en excepte le travail de Scheele sur la pierre urinaire humaine, il n'y a presque rien de fait. Je crois être le seul qui aye repris depuis quelques années des recherches sur ces matières singulières, & je fais par les difficultés de toute sorte que j'ai rencontrées dans ces recherches, combien il faudra de temps & de peine pour les rendre aussi complètes qu'il est à désirer qu'elles le soient. Une des premières difficultés que j'ai trouvées dans ce genre de travaux, c'est la réunion des calculs des différentes cavités du corps humain; malgré la correspondance assez étendue que j'entretiens, & même malgré celle de la société de Médecine, je n'ai encore pu me procurer que peu de concrétions relativement à leurs différents lieux & conséquemment à leur nature différente. Que sera-ce si l'on étend cette analyse, comme cela doit être jusqu'aux calculs qui existent dans les différents genres d'animaux. Pour donner une idée de l'état peu avancé de la science à cet égard & de l'importance des travaux qui sont nécessaires, je passerai rapidement en revue dans autant d'articles séparés, déterminés par l'ordre alphabétique, les principales espèces de calculs connues jusqu'ici. On trouvera quelques faits & même quelques analyses qui me sont particulières; mais le plus grand nombre de ces articles n'offrira que l'indication de ce qui reste à faire.

CALCULS BILIAIRES. J'ai réuni dans un article additionnel du mot bile, ce qu'on fait aujourd'hui sur les calculs biliaires qui se forment dans la vésicule du fiel de l'homme. On a vu que ces calculs sont de deux natures par rapport à la proportion des matières qui les forment. Les uns sont uniquement composés d'une substance cristalline feuilletée, brillante; analogue au blanc de baleine; les autres avec une quantité plus ou moins grande de cette substance qui en constitue la base ou le noyau, contient de la bile épaisse ou de l'extrait de bile au milieu duquel la première substance semble avoir cristallisé confusément. Les détails relatifs à cette analyse, ont été exposés à l'article cité, & ils appartiennent à la suite des recherches nouvelles

que j'ai entreprises depuis douze ans sur les matières animales; sans doute, il m'est permis de croire que les découvertes qui me sont propres sur cet objet, jetteront quelque jour sur la formation des calculs bilieux, sur leur rapport avec la nature du foie & de la bile, sur le caractère des maladies qui les occasionnent, & peut-être même sur leur guérison; mais je dois dire qu'il reste un grand nombre de faits à ajouter aux précédents. Comment la graisse abdominale se convertit-elle en une substance analogue au blanc de baleine? Qu'elle est la cause, quel est le mode de cette conversion chimique? Comment peut-on en reconnoître l'existence dans les hommes? A quels signes pourra-t-on déterminer cette disposition dans les canaux biliaires, & sur-tout par quels moyens pourra-t-on la combattre? Quelle différence y a-t-il entre les calculs biliaires humains & ceux des autres animaux? On sait que les bœufs & les moutons sont sujets à cette maladie; les bouchers trouvent des pierres biliaires dans les intestins & dans la vésicule du fiel des bœufs, sur-tout vers la fin de l'automne & dans l'hiver; on les emploie, dit-on, pour la peinture; on n'a point encore comparé l'analyse de ces concrétions à celles des calculs biliaires humains.

CALCULS HÉPATIQUES. Le foie est souvent rempli de concrétions dures & solides qu'on a dit occuper les pores biliaires c'est à la suite des obstructions que ce viscère est attaqué de cette maladie calculieuse. Aucun chimiste n'a jamais examiné les calculs hépatiques, & cependant cette analyse est le seul moyen capable de connoître la nature & la cause de cette affection; peut-être les calculs hépatiques sont-ils d'une nature semblable à celle des calculs de la vésicule, mais peut-être aussi sont-ils réellement différents; il n'y a que des expériences exactes qui puissent éclairer cette importante question.

CALCULS INTESTINAUX. On nomme calculs intestinaux ceux que l'on trouve dans les intestins de l'homme & des animaux. Cette expression ne veut donc pas toujours dire des calculs formés dans les intestins; mais elle renferme toutes les concrétions que l'on trouve dans les cavités de ces viscères. Il est évident, d'après cette définition exacte, que l'on doit distinguer deux genres de calculs intestinaux; savoir, ceux qui ont été formés dans des organes ou viscères autres que les intestins, & qui y sont descendus par les canaux ou conduits communicatifs de ces viscères, & ceux qui sont immédiatement formés dans les intestins; peut-être même est-il nécessaire d'admettre un troisième genre de calculs intestinaux; savoir, ceux qui après avoir été formés dans des viscères adjacents, ont été déposés dans les intestins & s'y sont recouverts

par

par leur séjour dans les canaux de couches de matière concrète, véritablement due aux liquides contenus dans les intestins.

Les premiers, sont presque les seuls qu'on trouve dans l'homme; ce sont presque toujours des calculs biliaires, qui, après avoir été formés dans la vésicule du fiel, descendent par le canal chéloque, & séjournent plus ou moins long-temps dans les intestins, ordinairement même ces calculs forcent par l'anus & ne restent point dans le canal intestinal. Les calculs formés par l'induration ou la cristallisation des sucs contenus dans les intestins même, sont rares chez l'homme & bien plus communs chez les animaux; les chevaux y sont assez sujets. J'ai eu occasion d'examiner un de ces calculs intestinaux du cheval, dont l'analyse m'a présenté des faits très-singuliers; je crois devoir consigner sur ce sujet les détails qui ont déjà été insérés dans les annales de chimie.

EXAMEN D'UN CALCUL

Trouvé dans le colon d'un petit cheval gris, mort de tranchées en 1785, à l'école vétérinaire.

Ce calcul a une couleur grise; il paroît à l'extérieur formé de rayons divergens du centre à la circonférence; sa forme est assez régulièrement arrondie, son diamètre est de six pouces, & son poids de cinq livres; scé par la moitié, on a vu que les parties qui le forment, naissent toutes en effet d'un point commun, qui est le centre, & divergent dans tous les sens, de manière à former une sphère de dix-huit pouces de circonférence. Le centre de cette sphère présentait quelques cavités dans lesquelles on a observé des fragmens de matières végétales, telles que de la paille, du foin &c. de l'avoine, qui exhalaient l'odeur de ces matières déjà altérées.

EXPÉRIENCE PREMIÈRE.

Traitement par l'eau distillée froide.

Douze grains de cette substance réduite en poudre fine, ont été mis avec deux onces d'eau distillée à quinze degrés du thermomètre de Réaumur; elles ont demeuré deux heures ensemble. Après ce temps, on a filtré & on a fait quelques essais avec les réactifs sur cette liqueur; la matière non dissoute sèches, pesait dix grains $\frac{1}{2}$; elle a donc diminué d'un grain $\frac{1}{2}$.

1°. Le muriate de baryte n'a produit aucun effet sur-le-champ dans l'eau qui avoit séjourné sur la poudre du calcul.

2°. L'acide oxalique dissous dans l'eau n'a pas non plus produit de changement dans la même eau.

3°. La dissolution du nitrate d'argent n'a point été changée.

Chimie. Tome II.

4°. L'alcali fixe (potasse) pas plus que les précédens.

Ces quatre expériences semblent indiquer que la matière du calcul, même réduite en poudre fine, n'est pas dissoluble dans l'eau froide; celles qui suivent éclaircissent cette question.

EXPÉRIENCE II.

Traitement par l'eau chaude à quatre-vingt degrés.

On a mis douze grains de la même poussière que ci-dessus avec deux onces d'eau distillée qu'on a fait bouillir avec pendant cinq minutes; on a filtré la liqueur, & l'on a fait avec elle quelques mélanges; le résidu sèches & pesé, avoit diminué de six grains, c'est-à-dire, qu'il ne restoit plus que six grains.

1°. Le muriate de baryte a formé avec une portion de cette liqueur un dépôt dissoluble dans l'acide muriatique.

2°. L'acide oxalique n'y a rien produit sur-le-champ, ni à la langue non plus.

3°. La dissolution du nitrate d'argent n'a formé qu'un nuage extrêmement léger.

4°. La potasse combinée à l'acide carbonique n'a rien produit de remarquable.

Les essais I & III prouvent que la poussière du calcul de cheval est légèrement dissoluble dans l'eau bouillante, mais la dissolution du précipité obtenu dans l'expérience I; par l'acide muriatique, démontre qu'il n'a pas pour principe l'acide sulfurique, & celui formé par le nitrate d'argent, démontre, par sa légèreté, que ce n'est point à l'acide muriatique qu'il doit son existence; nous tirons de l'expérience I & II la conclusion que l'eau chaude agit autrement que l'eau froide, sur le calcul du colon du cheval, c'est-à-dire, que ce calcul est plus dissoluble dans l'eau chaude que dans l'eau froide.

EXPÉRIENCE III.

Par la soude purifiée par l'alcool.

On a pris trente-six grains de poudre de calcul, & on les a traités à chaud avec une dissolution de soude dans l'alcool, étendue de sept à huit fois son poids d'eau distillée. Le mélange élevé à la température de l'eau bouillante a exhalé beaucoup d'ammoniac, mêlée d'un peu d'alcool; on s'apperoit même à l'œil, que la masse de la matière calcinée avoit diminué. On a filtré la liqueur, elle avoit une couleur jaune brune; on a fait sécher le résidu, son poids étoit alors de dix-neuf grains foibles; il avoit donc diminué de dix-sept grains.

1°. La liqueur filtrée & froide sentoit encore beaucoup l'ammoniac, aussi le gaz acide muriatique oxygéné a formé à sa surface une fumée

Qqqq

blanche très-épaisse, comme cela a lieu toutes les fois qu'il rencontre cette substance, (l'ammoniaque.)

2°. Malgré que la liqueur, comme l'acide muriatique oxigéné & l'odorat nous l'ont démontré, contiennent de l'ammoniaque, elle n'avait presque plus de causticité. Ce changement annonce, en quelque sorte, que la soude a trouvé dans la substance du calcul, un corps qui fait fonction d'acide. Ceci s'expliquera par la suite.

3°. L'acide muriatique mis par petites portions sur la dissolution du calcul par la soude, n'en a rien précipité.

4°. L'acide acétique n'en a rien précipité non plus.

5°. La dissolution de muriate de baryte y a formé un précipité dissoluble dans l'acide muriatique sans effervescence, comme on le verra plus bas. Ce précipité est formé par l'acide phosphorique.

6°. La dissolution du nitrate d'argent y a formé un précipité qui ne s'est point dissous dans l'acide nitrique, ce précipité étoit jaunâtre.

L'essai V prouve : de deux choses l'une, ou que la soude s'est unie à un acide tout formé dans le calcul de cheval, ou bien que par son action les principes de ce calcul se sont unis dans un autre ordre ; qu'une portion d'hydrogène & une d'azote se sont réunies pour former de l'ammoniaque, & que l'oxygène alors plus abondant a donné un caractère acide au reste de la matière calculeuse, ou bien que le carbone & l'oxygène se sont isolés pour donner naissance à de l'acide carbonique. Une expérience de cette nature répétée plus en grand, décidera sur ces conjectures.

Les dix-neuf grains de matière calculeuse restée après le traitement de trente-six grains, se sont dissous avec effervescence dans l'acide muriatique à la manière d'un carbonate. Il est resté quelques grains de sable blanc & transparent, & quelques atomes de matière colorante ; mais il est à présumer que celle-ci venoit de la soude préparée par l'alcool. Cette expérience indiqueroit que le calcul est un sel décomposable par la soude, & dont il a laissé la base combinée à l'acide carbonique, qu'elle a sans doute pris dans l'atmosphère en se desséchant. On a fait évaporer cette dissolution muriatique, elle a laissé une masse grise, dont une grande partie s'est fondue à l'air en quelques jours. On l'a décantré, & on a fait quelques essais sur elle : 1°. Sa saveur étoit piquante d'abord, mais fade au bout de quelques jours ; 2°. La dissolution étendue & mise avec une dissolution de carbonate de potasse bien neutre, n'a point donné de précipité ; mais en la chauffant, il s'est fait une effervescence forte, & la liqueur a déposé une grande quantité de poudre blanche ; 3°. Dans une autre portion de la même dissolution, on a mis de l'ammoniaque,

il s'est fait aussi un précipité blanc, & ce réactif étant en excès, la potasse caustique y a encore fait naître un précipité. La portion qui ne s'est point humectée à l'air, étoit griseâtre, cristallisée, & avoit une saveur un peu analogue à celle de la pierre, & elle croquoit de même sous les dents.

Cette expérience ne laisse pas de doute sur la présence de la magnésie dans le calcul de cheval ; la portion qui restoit avoit échappé à l'action de la soude, & quoique décomposée peut-être par l'acide muriatique, elle s'est reformée vers la fin de l'opération.

EXPERIENCE IV.

Par l'action de la chaleur avec le contact de l'air.

On a pris soixante-dix grains de la même matière, on les a exposés au feu dans un creuset de porcelaine l'espace d'une demi-heure ; la matière est devenue très-blanche, & a perdu trente-neuf grains de son poids ; c'est-à-dire, un peu plus de la moitié. Cette matière ainsi calcinée se dissout très-facilement dans l'acide muriatique sans effervescence ; il s'en est séparé ici une portion de charbon qui n'avoit point été brûlée pendant son exposition au feu ; la dissolution muriatique de cette matière n'est pas troublée par l'acide oxalique, ni par le muriate de baryte. L'ammoniaque y fait naître un précipité blanc très-beau & très-abondant ; les alcalis fixes sont la même chose. Ces expériences paroissent indiquer que la base du calcul de cheval est une matière terreuse, mais ce ne peut être que la magnésie ou l'alumine, puisque la baryte & la chaux ne sont point précipités par l'ammoniaque, & que l'acide sulfurique & oxalique ne sont point de précipité dans cette dissolution muriatique. L'eau de chaux a fait dans la même dissolution un précipité floconneux fort abondant ; l'acétate de plomb en est décomposé, & il se forme un dépôt fort abondant. On avoit soupçonné que cette matière étoit du phosphate de chaux ; mais ce soupçon a été détruit par l'expérience suivante : l'acide oxalique mis dans une dissolution de ce sel par l'acide muriatique, a donné un précipité, & celle-ci n'en a point donné avec le même réactif.

On en a mis vingt-quatre grains avec de l'acide sulfurique concentré, il n'y a point eu d'effervescence ; il s'est dégagé du calorique, & au bout d'un quart d'heure le mélange s'est pris en une masse solide, dont la surface étoit luisante comme celle d'une gelée ; au bout de vingt-quatre heures, le mélange étoit aussi solide qu'une pierre ; quelques jours après, il s'est liquéfié & a donné des cristaux sur les parois du verre où le mélange étoit contenu. On en a dissous quatre-vingt seize grains dans de l'acide muriatique, & il y a eu les mêmes phénomènes que dans l'expérience ci-del-

sus; cependant, dans une portion où l'on avoit mis de l'acide sulfurique, il s'est formé quelques petits cristaux, ce qui n'étoit point arrivé dans l'autre.

On en a dissous dix-huit grains dans l'acide nitrique, cela s'est opéré avec beaucoup de facilité, quoique l'acide fût foible; il n'est resté comme dans les autres dissolutions; par l'acide muriatique, qu'un peu de sable & de charbon.

L'acide sulfurique mis dans cette dissolution, n'y a rien opéré, le carbonate d'ammoniaque y a produit en faisant effervescence un précipité blanc abondant; l'acétite de plomb y en a formé aussi un très-abondant. Ces expériences nous démontrent que le calcul de cheval ne contient point de chaux, & nous faisant soupçonner que l'acide phosphorique est un de ses principes, nous avons cherché avec quelle base il pourroit y être combiné; nous balancions entre la magnésie & l'alumine; pour nous en assurer plus promptement, nous avons fait des essais par la voie de la synthèse. Nous avons d'abord mêlé une dissolution de sulfate de magnésie avec une autre de phosphate de soude pur; mais nous n'avons eu que des flocons blancs peu abondants, & qui ne ressembloient guère au calcul de cheval (1).

En second lieu, nous avons mêlé une dissolution de sel fusible d'urine non purifiés; c'est-à-dire, une combinaison de phosphate de soude & d'ammoniaque, & nous avons eu sur le champ un précipité blanc très-abondant, disposé en petits cristaux qui avoient toute l'apparence, la saveur, & le même tact sous les dents que le calcul de cheval; nous pensons donc jusqu'à nouvel ordre, que le calcul de cheval est un sel triple, composé d'acide phosphorique de magnésie & d'ammoniaque.

EXPÉRIENCE V.

L'acide muriatique dissout une grande quantité de calcul & perd en grande partie son acidité, & la saveur qu'acquiert la nouvelle combinaison est assez douce; la dissolution de cette matière cristallise quelques minutes après qu'elle est filtrée; on n'a point déterminé la forme des solides qu'elle fournit, l'eau de chaux forme un précipité blanc dans cette dissolution muriatique; l'ammoniaque y donne aussi un précipité très-abondant; le carbonate d'ammoniaque forme aussi un précipité sans produire d'effervescence, & le préci-

pité ne se redissout point dans un excès d'acide carbonique; le muriate de baryte y donne aussi beaucoup de précipité. C'est du phosphate d'ammoniaque & de magnésie qui se forme de nouveau dans ces expériences. L'acide sulfurique mis sur de la poudre du calcul s'épaissit & se prend en masse transparente qui se dissout dans l'eau, & l'acide sulfurique perd aussi un peu de son acidité.

EXPÉRIENCE VI.

Par l'acide muriatique oxygéné.

On a pris cent grains de poussière de calcul avec quatre onces d'acide muriatique oxygéné; immédiatement après que ces deux corps ont été en contact, il s'est fait une effervescence de bulles extrêmement fines, l'acide muriatique a perdu son odeur dans cette opération. La matière nous a paru à la vue, avoir diminué beaucoup de son volume. Cette matière lavée & séchée ne pesait plus que quarante grains, c'est donc soixante qu'il a perdu; on a fait évaporer la dissolution muriatique pour savoir s'il contenoit les soixante grains manquant; mais avant, on a fait sur le quart de cette dissolution quelques essais par les réactifs; l'eau de chaux y faisoit un précipité blanc très-abondant, & qui ressembloit beaucoup à la vue à un phosphate de chaux; l'eau de soude y faisoit naître un précipité qui étoit formé par beaucoup de cristaux. Avant de faire évaporer la dissolution muriatique de calcul, on l'a laissée pendant quelques jours exposée à l'air; dans cet intervalle il s'y est formé de très-beaux cristaux, qui sont pour la plupart rhomboïdaux; il y en avoit beaucoup de joints entr'eux, de manière à former des rayons. Ce phénomène nous a engagé à laisser plus long-temps cette liqueur exposée à l'air, pour voir s'il se formeroit beaucoup de cristaux; il ne s'est ensuite déposé qu'une poussière blanche; qui ne paroît pas différer beaucoup de la matière du calcul.

EXPÉRIENCE VII.

Par la soude, deuxième expérience.

On a pris une once de calcul porphyrisé finement, & on a jeté par-dessus une dissolution de soude dans l'alcool, dussitôt il s'est dégagé une forte odeur d'ammoniaque; on a chauffé,

(1) Le phosphate de magnésie pur est presque insoluble dans l'eau, au moins auteur n'en a encore décrit les propriétés, Bergmann est le seul qui en ait dit un mot dans l'histoire des attractions de l'acide phosphorique, mais de nos jours il qu'on doute sur l'attraction de la magnésie comparée à celle des alcalis pour cet acide phosphorique.

Il venoit donc, d'après les expériences rapportées plus haut, que les alcalis ont une attraction plus forte pour l'acide phosphorique que n'en ont l'ammoniaque & la magnésie, soit ensemble ou séparément, puisque traité par la soude pure, il a diminué de plus de la moitié de son poids, qu'il s'en est dégagé une grande quantité d'azote & que la soude a perdu sa causticité, & a acquis la propriété de précipiter l'eau de chaux, & que le résidu du calcul se dissout ensuite dans l'eau, laquelle avec effervescence.

sans ajouter d'eau, jusqu'à ce que la pâte que cela formoit ait été desséchée, ensuite on a mis cinq à six onces d'eau, & on a fait bouillir; il s'est encore dégagé de l'ammoniaque, l'ébullition ayant duré un quart-d'heure, on a filtré le liquide, & on a retenu la poudre sur le filtre; nous observerons que le mélange a pris une consistance de bouillie, quelques moments après son ébullition avec l'eau. La liqueur a été évaporée doucement, elle a donné au bout de quelques jours une grande quantité de cristaux de deux formes, l'une en aiguilles, & l'autre en solides rhomboïdaux & en prismes à six faces. L'examen de chacun de ces sels nous a fait connoître qu'ils sont composés de soude & d'acide phosphorique, & que le premier contenoit une certaine quantité de carbonate de soude qui, sans doute, lui avoit fait prendre une forme particulière; l'autre en contenoit aussi, mais beaucoup moins. La poussière bien lavée époutée entre des papiers gris, mise ensuite avec de l'acide sulfurique affoibli, a été dissoute avec effervescence, à l'exception d'une très-petite quantité. Cette dissolution évaporée au soleil, a fourni des cristaux qui avoient la forme, la saveur & toutes les autres propriétés du sulfate de magnésie. La portion de matière calculeuse qui ne s'est point dissoute dans l'acide sulfurique; étoit du phosphate de magnésie, qui n'avoit point été décomposé par la soude; mais en la pulvérisant, & le traitant de nouveau avec cet alcali, on est parvenu à le dissoudre dans l'acide sulfurique (1).

EXPÉRIENCE VIII.

Cent parties de calcul dissillées ont perdu $\frac{1}{12}$, les $\frac{11}{12}$ restans avoient la couleur de l'ardoise; tenues rouges pendant long-temps à l'air libre elles sont devenues blanches, & ont encore perdu $\frac{1}{12}$ de leur poids, & il n'en restoit par conséquent que $\frac{10}{12}$. On a mis $\frac{1}{12}$ de cette matière ainsi calcinée avec une once d'acide muriatique pesant sept degrés à l'aréomètre de Beaumé, & par le moyen de la chaleur, tout, à l'exception d'un atome de charbon & de sable, s'est dissout dans cet acide.

On a fait évaporer cette dissolution dans une capsule de porcelaine à une chaleur douce; on remarquoit qu'à mesure que l'évaporation avançoit, il se formoit des aiguilles sur le bord de la capsule; la liqueur évaporée jusqu'à siccité, a donné un sel blanc; on a mis fur cette matière salinée deux onces d'alcool, & on a fait bouillir une minute, la matière n'a pas paru se dissoudre. Cependant, après avoir séparé l'alcool, la ma-

tière séchée à l'air libre ne pesoit plus que trente-deux grains; l'alcool évaporé a laissé une matière semblable à celle qui ne s'étoit pas dissoute. La matière du calcul séparée de l'acide muriatique ne paroît pas, par les propriétés extérieures, différer beaucoup du calcul lui-même; elle est blanche comme lui, elle n'a presque pas de saveur, elle ne se dissout que très-peu dans l'eau. Cependant, elle se dissout assez pour que j'aie pu en déterminer les rapports, comme on le verra plus bas. Cette dissolution ne précipite point le muriate de baryte, mais elle se trouble; l'acide oxalique, n'y produit aucun effet; la potasse pure & sans aucune espèce de corps étranger, y fait un précipité floconneux, ainsi que le sulfure de baryte; on voit que cette combinaison de calcul avec l'acide muriatique, si elle existe, comme je le crois, mais sans décomposition, est infiniment plus dissoluble dans un excès d'acide, que lorsqu'elle est privée de cet acide par l'évaporation, puisque la matière, une fois desséchée, n'est pas dissoluble dans cinq cents fois son poids d'eau, tandis que de l'acide muriatique à sept degrés de l'aréomètre de Beaumé, en dissout un poids égal au sien; ainsi la combinaison de cet acide & de la matière du calcul dissous l'un par l'autre, ou près de l'être, est très-dissoluble dans l'acide muriatique & dans l'acide nitrique; l'acide sulfurique ne la dissout point; mais il en dégage l'acide muriatique avec effervescence, & il forme avec la matière restante une masse blanche, qui ressemble à une gelée. La soude ni la potasse ne dissolvent point ce muriate calculeux.

Les $\frac{1}{12}$ de lieuvre qui ont passé dans le récipient, n'avoient point de couleur; elle répandoit une forte odeur d'ammoniaque, verdissoit les papiers de mauve, & ne précipitoit point l'eau de chaux; c'étoit de l'ammoniaque pure; il a fallu 1. gros d'acide muriatique, donnant sept degrés à l'aréomètre de Beaumé, pour la saturer.

Cette substance ne contient donc presque rien d'animal, puisqu'elle n'a fourni ni huile ni acide carbonique; il est très-vraisemblable que l'ammoniaque, son seul produit, étoit toute formée dans cette substance; car elle ne pourroit provenir ici d'une matière animale ou végétale, sans qu'il se fût produit en même temps, & de l'huile & de l'acide carbonique, sur-tout.

EXPÉRIENCE IX.

Quatre onces de calcul exactement porphyrisé ont été mêlées avec une once de poussière de charbon, & exposées au feu dans une cornue;

(1) Bergmann dit (de *traditionibus electricis*, page 80) que la chaux enlève l'acide phosphorique aux alcalis; cela est aujourd'hui bien connu de tous les chimistes, & il annonce qu'on n'a pas la même certitude à l'égard de la terre pesante & de la magnésie, c'est-à-dire, qu'il n'est pas sûr que ces deux terres jouissent, comme la chaux, de la prérogative d'enlever l'acide phosphorique aux alcalis; cette préférence démontre que c'est le contraire qui arrive.

de grès. On a obtenu ; 1°. de l'acide carbonique ; 2°. du carbonate ammoniacal ; 3°. un mélange de gaz hydrogène & d'acide carbonique ; 4°. avec ceux-ci une dissolution de phosphore qui, encore chaud, s'enflammait au contact de l'air ; 5°. enfin, une grande quantité de phosphore que l'on n'a pu déterminer, parce que la cornue se cassé à l'instant où l'opération étoit dans sa plus grande activité, on ne l'a point recommencée ; notre but n'étoit point de connaître par-là la quantité d'acide phosphorique contenu dans le calcul. Ce qui restoit dans la cornue, étoit un mélange de charbon, de carbonate, de magnésie & de phosphate de magnésie, non encore décomposé ; il sortit par la fente de la cornue une flamme jaunâtre très-vive, & qui répandit dans le laboratoire une fumée très-épaisse & très-âcre ; c'étoit de l'acide phosphorique.

CONCLUSION.

Cette expérience démontrant incontestablement l'acide phosphorique, l'expérience VII ayant démontré la magnésie & l'ammoniaque, nous concluons en disant que le calcul du cheval est un sel triple composé d'environ deux parties de phosphate de magnésie, d'une partie de phosphate d'ammoniaque, & d'une partie d'eau. On ne fait point état de quelques traces de matières végétales & animales qui y sont mêlées.

Conjectures sur la formation du calcul.

La logique ordonnée des sciences physiques exigeroit de nous maintenant, de dire comment cette concrétion considérable s'est formée dans les intestins de l'animal qui la portoit. Cette question nous paroit indissoluble, si la maladie, le traitement & l'ouverture du cheval ne fournissent aucune observation qui puissent nous servir de base pour affermir le raisonnement.

Les principes qui composent le calcul ont-ils été formés dans les viscères du cheval ? & , en le supposant, où ont-ils pris leurs aliments ? car ils sont eux-mêmes déjà composés ? Comment la magnésie, sur-tout, se trouve-t-elle dans cette combinaison, elle qui est si rarement dans les matières animales ? A-t-elle pris naissance dans les entrailles de l'animal, & avec quoi ? Serait-ce par une modification de la chaux qui est si fréquente dans les humeurs animales ? C'est bien hypothétique. Quant à l'acide phosphorique, quoique son abondance dans l'économie animale n'ait pas encore été bien appréciée, cependant, il est aisé d'entendre comment, avec le temps, il a pu s'amasser dans les intestins, & se joindre avec la magnésie & l'ammoniaque. Celle-ci, (la magnésie) n'auroit-elle pas été administrée à l'animal pour quelques coliques intestinales, & en rencontrant de l'acide phosphorique & du

phosphate ammoniacal, n'auroit-elle pas donné naissance à ce sel triple, insoluble, qui forme le calcul que nous avons examiné ? Ce soupçon me paroit le plus vraisemblable, cependant il auroit fallu, pour cela, que la magnésie eût séjourné pendant long-temps, & que l'animal eût été très-long-temps dans rendre d'excréments.

CALCUL MUSCULAIRE. Il ne faut pas oublier qu'en anatomie & en médecine, on a nommé presque indistinctement calculs toutes les concrétions qui se forment dans les différentes parties du corps des animaux. Sous ce point de vue, il y a deux sortes de calculs musculaires, ou de concrétions nées au milieu des fibres charnues ; les uns ne sont que des concrétions osseuses qui prennent la place de quelques fibres tendineuses ou aponeurotiques, comme cela a lieu souvent chez les vieux animaux, lorsque les extrémités des tendons & les parois vasculaires elles-mêmes s'ossifient ; c'est cependant abuser des mots, que de nommer ces ossifications des calculs. L'autre espèce de calculs musculaires, qui se rapprochent bien plus des véritables calculs, comprend les concrétions graveleuses, angulaires, irrégulières dans leur forme, que l'on rencontre rarement à la vérité dans l'intérieur des muscles même, entre les faisceaux charnus, & qui paroissent exister, sur-tout à la suite des maladies arthritiques qui durent depuis long-temps. On n'a point fait l'analyse de ces concrétions, ou espèces de calculs musculaires. Il est vraisemblable qu'elles sont de la même nature que celles que l'on trouve dans les articulations des gourteux, que comme celles-ci, elles semblent avoir des analogies avec la matière solide des os. Voyez le premier vol. de ce Dictionnaire, pag. 409 ; mais c'est par l'analyse qu'on pourra confirmer ou infirmer cette analogie. Je n'ai pas pu me procurer depuis douze ans un seul calcul musculaire.

CALCUL PANCRÉATIQUE. Les anatomistes ont plusieurs fois trouvés des concrétions calculeuses dans le pancréas humain, mais aucun ne s'est inquiété de sa nature. Il faut oublier aujourd'hui la comparaison que plusieurs en ont faite avec le tartre ; ces analogies apparentes de forme n'en imposent plus depuis long-temps aux chimistes. Une prétendue analogie avec les calculs salivaires, présente peut-être plus de vraisemblance ; mais comme on ne connoit pas la nature de ces derniers, tout est incertain & même inconnu sur cet objet. Ceux qui, dans les hôpitaux, ou environnés d'une pratique nombreuse, ont des occasions de voir des maladies du pancréas, peuvent être plus communes qu'on ne le croit, & conséquemment de trouver à l'ouverture des corps des calculs pancréatiques ; ne doivent pas négliger de les recueillir & d'en faire une analyse qui doit répandre quelques jour sur la nature d'une

humeur, & par suite sur les fonctions d'un viscère presque entièrement ignorées jusqu'ici.

CALCUL PINÉAL. Rien n'est plus fréquent que de trouver plusieurs petites pierres dans la glande pinéale du cerveau humain ; ce fait est généralement connu des anatomistes, & il n'en est aucun qui n'ait eu occasion de faire plusieurs fois cette observation ; mais soit en raison de la petitesse de ses concrétions & de la difficulté de s'en procurer une quantité suffisante, soit par rapport au peu de cas que l'on a fait jusqu'à ces derniers temps de l'utilité de la chimie pour la physique animale, on n'a rien tenté sur l'analyse du calcul de la glande pinéale. Qui sait cependant si cette analyse ne pourroit pas contribuer à diminuer la profonde obscurité où l'on a été jusqu'ici sur les fonctions de cette glande, & même de la masse entière du cerveau ? Au moins la curiosité si piquante & même si pressante sur un sujet pareil, doit-elle engager à faire des essais sur ses concrétions, & porter les anatomistes à aider les chimistes ; car sans le concours des uns & des autres, cette analyse, ainsi que celle de beaucoup d'autres substances animales, ne pourra jamais être faite dans l'exactitude & les soins qu'elle demande.

CALCULS PULMONAIRES. Il est assez fréquent de voir des malades expectorer des concrétions de petits calculs irréguliers qui sortent après une toux plus ou moins longue & fatigante. Ce sont, sur-tout, les vieillards sujets depuis longtemps aux affections arthritiques qui rendent ces concrétions que je désigne sous le nom de calculs pulmonaires. Je ne connois encore qu'une observation consignée dans les mémoires de l'académie de Stockholm, pour 1781, sur la nature de ces calculs. M. Kœring assure que des concrétions expectorées par un vieillard sujet à des accidens arthritiques, étoient de la même nature que la bave des os, c'est-à-dire, du sel phosphorique calcaire. On pourra facilement répéter cette observation ; car il n'est pas rare de trouver les poumons des personnes mortes à la suite de maladies scrophuleuses, d'anciennes affections de poitrine, de difficulté de respirer, &c. remplis de concrétions dures, en sorte qu'en les coupant avec le scalpel, leur parenchyme crie sous l'instrument. Si la découverte de Kœring est confirmée par l'expérience, on pourroit en la comparant à l'analyse des concrétions tophacées des goutteux, déterminer si les affections arthritiques consistent, soit dans une surabondance du suc osseux, qui se dépose dans les articulations ou dans différentes parties, soit dans la dissolution du phosphate calcaire des os enlevés à ces organes par un virus dissolvant, qui se charnie ensuite dans différents organes. Mais c'est à des expériences ultérieures à confirmer ou à infirmer

ce premier résultat. Il fût étonné d'en avoir fait pressentir ici l'importance.

CALCUL RÉNAL. C'est dans le rein que se forment le plus communément les calculs ou des concrétions dures, qu'on a mal-à-propos nommées pierres des reins, pierres rénales. Ce viscère est celui de tous qui est le plus exposé à cette affection morbifique, parce qu'il est le filtre naturel de l'urine, qui contient, comme on le fait, très-abondamment les éléments du calcul. (Voyez URINE). L'homme est très-sujet à cette maladie ; quand les calculs rénaux sont petits, ils sont entraînés avec l'urine, descendent par les uretères, & sont sentus sous le nom de gravier ; s'ils ont encore un volume un peu plus considérable, ils pressent & blessent plus ou moins les canaux & donnent naissance aux coliques néphrétiques, au pissement de sang, &c. Souvent après avoir été entraînés dans la vessie, leur volume les empêche de sortir par l'urètre, & ils deviennent le noyau du calcul vésical ou de la pierre proprement dite, qu'on est obligé d'extraire par la lithotomie ; quelquefois ils ne forment point des reins, ils y croissent peu-à-peu, y augmentent de volume par l'addition successive de plusieurs couches & deviennent si volumineux, qu'ils occupent tous les canaux par où l'urine s'écoule de ces viscères glanduleux. Alors, ils ont la forme du bassin, & offrent souvent des ramifications. Ils produisent des maux très-longes & absolument sans remède, des douleurs vives & répétées, des ichtries, des dysuries, des pissements de sang & de pus. Peu-à-peu ils entrent, ils corrodent, ils détruisent même par leur pression & leur irritation continuelle, la propre substance du rein ; en sorte qu'il ne reste plus ensuite qu'une membrane, une espèce de capsule pleine de pus, & renfermant le calcul rénal. Cette maladie affreuse, & qu'on n'est pas très-rare, dure quelquefois un grand nombre d'années ; il est même quelques cas où elle existe sans s'annoncer par des symptômes qui puissent en caractériser l'existence. Les ouvrages des anatomistes, & sur-tout ceux de Morgagni, présentent l'histoire de plusieurs corps dont l'ouverture a montré la destruction d'un rein par la présence d'un calcul, sans que des symptômes préliminaires assez graves en aient assuré l'existence.

Le calcul rénal de l'homme est de la même nature que celui de la vessie ; il est formé par le dépôt & la cristallisation d'un acide particulier que nous connoissons sous le nom d'acide lithique ; l'examen de plusieurs calculs rénaux humains, m'a prouvé cette assertion. On trouve souvent à leur surface & dans leurs cavités, car ils sont presque toujours comme perforés & caverneux, des cristaux brillants réguliers de phosphate ammoniacal & de phosphate de soude ; il

suffit de les laisser tremper quelques heures dans l'eau pour faire disparaître ces effluves & pour en reconnaître la nature , en examinant la dissolution qui s'en est opérée.

Les animaux sont sujets aux calculs des reins comme l'homme. Morand le fils, a découvert que les rats offrent très-fréquemment des pierres nombreuses dans leurs reins ; mais il n'a rien dit de leur nature, & ne parait pas les avoir examinées. Cet objet mérite cependant l'attention des chimistes & des médecins ; car la nature des calculs rénaux tient à celle des urines, & cette dernière est manifestement différente dans les diverses classes d'animaux.

On connoît les singulières propriétés de l'urine de cheval. On sait que cette urine beaucoup plus chargée de principes que celle de l'homme, se trouble dans l'instant même où elle est rendue, & que c'est d'après cela que les médecins nomment *urine jumentale*, l'urine très-chargée & trouble des malades. La matière en poudre qui se précipite de l'urine des chevaux est en grande partie de la craie, tandis que celle qui se précipite de l'urine des hommes, sur-tout à la fin des maladies, est de l'acide lithique. On va voir que la nature du calcul renal du cheval répond à celle de l'urine de cet animal.

Examen d'un calcul renal du cheval.

Sa forme étoit très-exactement celle du rein dont il occupoit la place ; à chacune de ses extrémités, il portoit des végétations en forme de chou-fleurs. Sa surface avoit une couleur brune, & offroit une infinité de petites lames brillantes, comme des fragmens de sabbie qui réfléchissent les rayons du soleil. Il y avoit, dans la partie moyenne, un étranglement, comme s'il avoit été lié avec une bande dans un état de mollesse. Sur ses bords, on appercevoit plusieurs cavités inégales & cavernueuses. Presque toute sa surface étoit mamelonnée, & contenoit, en quelques endroits, des portions de membranes. En les sciant, on a d'abord éprouvé beaucoup de difficulté à cause de sa dureté ; mais lorsque la scie a été parvenue à trois ou quatre lignes, elle a passé très-facilement. En effet, l'extérieur étoit très-tendu, mais le milieu étoit formé de couches très-poreuses & très-tendres ; le couteau les coupoit aisément ; il pesoit quinze onces cinq gros trente-six grains.

Cent parties de ce calcul réduit en poudre, & mises avec de l'acide muriatique, s'y sont dissous en produisant une effervescence vive & écumeuse. Le produit de cette effervescence étoit de l'acide carbonique ; l'eau de chaux versée dans cette dissolution de calcul par l'acide muriatique, a produit un dépôt floconneux de la nature des os, qui pesoit vingt-deux parties ; l'acide oxalique a produit aussi dans cette dis-

solution, un précipité abondant qui étoit de l'oxalate chaux.

Ces deux ou trois expériences suffisent pour nous apprendre que la matière du calcul de cheval est composée de carbonate & de phosphate de chaux ; & que ces sels terreux insolubles sont dans le rapport de soixante-huit pour le premier, à vingt-deux pour le second, dans un quintal.

Cette différence entre la nature du calcul de cheval & celle de l'homme, ne doit pas étonner, d'après l'existence du carbonate de chaux dans les urines de cet animal. Sa formation est même peut-être plus fréquente qu'on ne pense chez ces animaux, vu la facilité avec laquelle ces matières se déposent de leurs urines. Qui n'a pas vu qu'à mesure qu'ils rendent leurs urines, elles deviennent blanches & laiteuses ; qu'elles sortent même quelquefois toutes troubles de leur vessie ? Voyez l'article URINE.

Dans un chat adulte, qui avoit été coupé dans sa jeunesse, & qu'on ouvroit pour des recherches particulières, on a trouvé les capsules surrénales entièrement durcies, & , comme on le dit, pétrifiées ; elles étoient dures sous les doigts comme des morceaux de pierres ; elles faisoient entendre un bruit aigu, lorsqu'on essayoit de les couper avec un couteau, qui en étoient fortement émoussés. Leur couleur étoit blancheâtre ; on y distinguoit manifestement des grains arrondis, liés ensemble par un tissu cellulaire fort mince. Il y avoit entre les grains les plus gros & les plus écartés, des cavités remplies d'une humeur rousse assez épaisse. Les artères & les veines qui se distribuent, dans ces viscères & le tissu cellulaire qui les fixe dans le lieu qu'elles occupent, ne nous ont pas paru avoir souffert d'altération.

Pour connoître la nature de ces concrétions, on a détaché les glandes surrénales ; on les a fait bouillir dans une dissolution de potasse pour en séparer le tissu cellulaire : après quelques secondes d'ébullition, il n'est resté en effet qu'une multitude de petits grains durs, détachés les uns des autres & d'une grosseur différente ; quelques-uns d'eux, mis sur les charbons allumés, n'ont point noirci, preuve qu'ils ne contiennent plus de matière animale combustible ; l'acide muriatique les a dissous avec effervescence ; l'acide oxalique faisoit dans cette dissolution muriatique, un précipité d'oxalate de chaux ; le carbonate de potasse en précipitoit de véritable carbonate calcaire, & l'eau de chaux, un dépôt de phosphate calcaire ou de terre des os.

D'après ces essais, les reins succenturiens de ce chat étoient convertis en deux sels calcaires insipides & indissolubles, l'un étoit du carbonate de chaux, qui faisoit environ les trois-quarts de la masse totale, & l'autre du phosphate de chaux, qui en formoit à-peu-près l'autre quart.

Nous ne tirons aucune induction de ce fait

anatomique isolé ; nous remarquons seulement, qu'il confirme l'opinion des physiciens, que les capsules surrénales ne sont nécessaires que dans les premiers temps de la vie des animaux, & qu'elles deviennent ensuite presque indifférentes à l'économie animale, dans laquelle elle forment comme un corps étranger, lorsqu'elles restent dans les animaux adultes, comme dans le chat qui fait le sujet de cette observation.

CALCUL SALIVAIRE. Il n'est pas rare que les glandes salivaires, & sur-tout les parotides & les sublinguales, soient occupées par des concrétions dures, comme pierreuses, qu'on a nommées pierres salivaires ; les observateurs citent un grand nombre d'exemples de ces maladies ; on a vu les calculs formés dans la parotide, descendre jusque dans le canal de Stenon, & produire un engorgement, un abcès, & par suite une fistule salivaire ; on a également vu des concrétions nées dans les glandes sublinguales, sortir par l'ouverture d'un abcès qu'elles avoient fait naître. Les auteurs qui ont décrit ces maladies, ont attribué presque généralement leur naissance à l'épaississement de la salive, ou à la coagulation de ce suc animal ; car plusieurs se sont servis de cette expression. Haller, en traitant de la nature de la salive, admet avec Fauchard, que le sédiment terreux qu'elle contient, est la source de la croûte des dents, qu'on nomme tartre ; il ajoute que les calculs salivaires qu'il attribue à la même matière, sont si fréquents dans le canal de Warthon ; c'est-à-dire, dans le conduit excrétoire de la glande sous-mandibulaire, qu'il seroit difficile de trouver dans l'homme une paroi plus sujette aux calculs ; il appuie cette assertion sur le témoignage de Severinus, Meibomius, Hagedorn, Eller, Krantz, Slevogt, Walcher, Vanwieten, Eschevier ; ce dernier a même fait une dissertation particulière sur cet objet. Haller a vu la grenouillette, *ranula*, maladie qui consiste dans la douleur, l'inflammation & l'abcès du voisinage du frein de la langue & des veines ramées, produites par un calcul salivaire, situé dans le canal de Warthon, & guérie par l'extraction de ce calcul ; plusieurs observateurs ont vu une angine occasionnée par la même concrétion. Hippocrate, dans le second livre des épidémies, avoit fait déjà mention des petites pierres situées sous la langue ; il connoissoit donc les calculs salivaires. Parmi tous les auteurs cités par Haller, aucun ne s'est occupé de la nature de ces calculs, aucun n'a même essayé le plus léger examen chimique de ces concrétions. Haller même n'en a pas dit un seul mot ; car les indiquer comme le produit du sédiment terreux de la salive, c'est ne rien dire, lorsqu'on ne détermine pas la nature du sédiment. Cette recherche eut été cependant d'autant plus facile,

que Fauchard, en assurant que le tartre des dents provenoit du sédiment terreux de la salive, avoit dans ce tartre une matière assez abondante pour en faire une analyse. Si cette identité entre le tartre des dents & le calcul salivaire étoit constatée, je pourrois dire que j'en ai reconnu la nature, puisqu'en analysant d'assez gros fragments de tartre dentaire, pour m'éclairer, j'en y a quelques années sur l'opinion, de Magellan, qui regardoit ce tartre comme une habington & un travail de polypes ou de vers particuliers à la bouche humaine, je trouvais que ce dépôt solide étoit de la même nature que la bave des os. Mais je ne me laisais point aller à cette analogie, parce qu'il n'est pas assez bien prouvé que le tartre des dents soit formé par le dépôt de la salive, & ne regardant point les calculs salivaires comme connus, j'engage les physiciens qui auroient l'occasion d'en recueillir chez des malades, à en faire l'analyse. Je n'ai point encore pu m'en procurer. Il est presque inutile d'ajouter ici que ce travail chimique doit être étendu jusqu'aux calculs salivaires des animaux, car on en trouve dans le cheval, le bœuf, le mouton, &c. Il faut joindre encore à cette analyse celle des concrétions calculeuses qui se forment quelquefois dans les amygdales. Ces analyses contribueroient à faire connoître la nature de la salive, que je regarde comme presque entièrement ignorée jusqu'à présent, & conséquemment à répandre quelque jour sur les véritables usages, ainsi que sur la comparaison dans les animaux, sur-tout par rapport à la différence de la mastication, de la rumination & de la digestion en générale, considérée dans les différentes classes d'animaux, sous le point de vue de leurs caractères anatomiques.

CALCUL STOMACHAL. On a trouvé dans l'estomac de l'homme différentes espèces de calculs, & particulièrement des concrétions biliaires, des calculs pierreux & par couches, & des éagropiles, ou poils, cheveux agglutinés par un suc lymphatique, nombre de ces observateurs présentent un grand nombre de faits de cette nature ; mais aucun d'eux n'a offert de recherches ou des travaux propres à faire connoître ni même soupçonner la nature intime de ces concrétions. Il est vraisemblable que les calculs biliaires qu'on a trouvés dans l'estomac humain, sont semblables à ceux qui se forment dans la vésicule, puisque c'est vraisemblablement de cet organe qu'ils tirent leur nourriture ; mais on ne peut pas assimiler aux calculs de la vésicule, ceux qu'on rencontre quelquefois dans l'estomac, & qui ressemblent aux pierres vésicales par leur solidité & leur formation en couches. Ceux-ci sont à la vérité très-rare, & l'occasion d'en rechercher la nature est par conséquent très-peu à la portée des chimistes ; aussi, n'y a-t-il aucune analyse de ces concrétions. Les animaux

en

en offrent quelquefois dans leurs estomacs ; mais quoique cela permette aux médecins vétérinaires & aux chimistes de s'assurer plus facilement de leur nature, on n'a encore rien dit sur cet objet.

CALCULS VÉGÉTAUX. La propriété de former des calculs se trouve jusque dans les végétaux. Plusieurs botanistes ont décrit des concrétions végétales, sur-tout dans les cocos, les palmiers, &c. Il en existe plusieurs dans la collection de Jussieu ; j'en ai vu quelques uns arrondis, blancs, polis comme de l'ivoire, & qui paroissent avoir une grande dureté. Il ne m'a pas été permis d'en reconnoître la nature, à cause de la rareté & de la cherté de ces concrétions. On les a nommés *bezards végétaux*, & l'existence qu'accompagnent tous les préjugés en médecine, les a même vus comme des remèdes héroïques.

On fait que plusieurs fruits, & sur-tout les poires, sont très-sujets à contenir une quantité considérable de concrétions grenues, irrégulières, dures, qu'on connoît sous le nom de pierres. M. Vauquelin en a fait une analyse chimique, qui prouve que ces concrétions sont de la nature de la substance ligneuse. Voici le travail intéressant qu'il a publié sur cet objet.

Les concrétions dures & comme pierreuses, qui se trouvent dans les poires, & qu'on a nommées tort improprement des pierres, ont été, & sont vulgairement regardées dans beaucoup de pays, comme propres à faire naître dans nos humeurs une disposition très-prochaine au calcul, & à former directement la pierre de la vessie. Quoique cette opinion ne fut déjà plus qu'un préjugé pour les médecins, elle étoit cependant de nature à solliciter l'attention, & à exiger une analyse plus exacte des concrétions des poires, que celles qu'on a faites jusqu'ici.

Grow, Leeuwenhoek & Anish, ont, les premiers, fait des recherches sur la structure & la nature des pierres. Duhamel a donné plusieurs mémoires intéressans, dans lesquels il a examiné, très en détail, l'épiderme des poires, leur corps muqueux, le tissu fibreux, & spécialement les concrétions pierreuses qui entrent dans leur composition. Il a observé que, lorsqu'on avoit enlevé l'épiderme & une portion du corps muqueux, on trouvoit sur la surface des poires, de petits grains solides tellement arrangés, qu'ils y forment une sorte de troisième enveloppe, qu'il nomme enveloppe pierreuse, & que Malpighi a désigné par le nom de corps aciniforme, & que ces corps pierreux font encore épars dans toute la substance pulpeuse.

Si on les soumet aux recherches microscopiques, elles ne paroissent pas formées par couches concentriques, ou par la superposition de lames qui s'appliquent les unes sur les autres ; mais seu-

lement par l'assemblage de particules dures qui se réunissent & communiquent ensemble par des vaisseaux intermédiaires. Quelquefois, dans les plus grosses pierres, on aperçoit des espèces de tissus endurcis, & qui imitent assez bien les cellules de la moelle des os. Ils ont pris leur accroissement par les sucs que leur ont charriés un nombre prodigieux de vaisseaux qui y aboutissent, avant qu'ils fussent entièrement durs.

Duhamel les regarde comme des pelotons de vaisseaux de glandes destinés à élaborer certains sucs de la poire ; il pense qu'ils s'engorgent petit à petit, & perdent tout-à-fait leur cavité lorsque la maturité du fruit ne permet plus à la liquer qui les abreuvoit de pénétrer à travers leur substance.

Ce qu'on a bien connu d'abord, relativement à la nature des pierres, qu'on trouve dans les poires, c'est qu'elles brûlent au feu, en exhalant une odeur pénétrante assez semblable à celle du pain brûlé ; que beaucoup, par une forte ébullition, se dissolvent entièrement dans l'eau commune, & encore plus aisément dans les liqueurs spiritueuses.

Nous avons fait macérer dans l'eau une quantité suffisante de la substance lapidiforme des poires qu'on nomme de *saint-Germain*, & que Duhamel a désignées par le nom latin de *pyras scdula magno pyramidalis viridis, fusis punctis distinctis, brumali*. Cette poire d'hiver, dont la forme, la couleur & la saveur sont assez connues, fournit abondamment des concrétions irrégulières & de grosseurs différentes.

Leur couleur est jaunâtre, sur-tout quand elles ont resté quelque temps à l'air & à la lumière ; elles n'ont point de saveur sensible. Elles sont comme ductiles, & s'applatissent sous l'instrument qui les comprime, aussi sont-elles très-difficiles à pulvériser.

EXPÉRIENCE PREMIÈRE.

Exposées sur les charbons allumés, elles s'enflamment, répandent une fumée blanche très-pénétante, ensuite elles noircissent, & enfin se réduisent très-prompement en cendres.

EXPÉRIENCE II.

Réduites en poudre fine, elles ne produisent point d'effervescence avec les acides, & notamment avec l'acide muriatique : les alcalis ne précipitent rien des acides qui ont séjourné pendant plusieurs jours sur cette poudre.

EXPÉRIENCE III.

Vingtcinq grains des mêmes pierres réduites en poudre, & traitées avec une dissolution de potasse, n'ont rien produit de remarquable à froid, à chaud ; la matière & la dissolution ont

Ritt

pris une couleur jaune. Après quelques minutes d'ébullition, on a cessé de chauffer. La matière avoit diminué de cinq grains, & l'acide muriatique a séparé en effet de la potasse quatre à cinq grains d'une substance dont l'aspect étoit assez analogue à celui de l'acide lithique que l'on précipite ainsi, mais dont la nature étoit semblable à celle de l'amidon.

EXPÉRIENCE IV.

L'acide nitrique dissout cette substance avec effervescence; il prend dans cette opération, ainsi que la matière, une couleur jaune orangée; il se dégage du gaz nitreux, du gaz azote & de l'acide carbonique. Il reste dans la corne plusieurs acides végétaux, tels que l'acide oxalique, citrique, malique, dont on n'a point déterminé les rapports entr'eux, ni avec les concrétions qui en sont les radicaux. L'acide nitrique retient en dissolution, pendant long-temps une portion de cette matière, même peu altérée dans les principes, & qu'on en peut séparer par le moyen d'un alcali.

EXPÉRIENCE V.

Cinquante grains de concrétions ont été distillés dans une corne de verre: On en a obtenu, 1°. Quatre poudres cubées d'un fluide élastique, composé d'environ $\frac{1}{2}$ d'acide carbonique & de $\frac{1}{2}$ de gaz hydrogène carboné; 2°. Trente grains d'un liquide jaune très-acide, d'une odeur piquante & dont les propriétés étoient semblables à celles de l'acide pyro-ligneux; 3°. Cinq grains d'huile jaune épaisse, très-acre, & qui contenoit quelques traces de carbonate d'ammoniaque; 4°. Douze grains de charbon. Par le poids comparé de ces différens produits, celui des quatre poudres de gaz obtenu dans cette distillation, se trouve être de trois grains.

EXPÉRIENCE VI.

Les douze grains de charbon obtenus dans l'expérience précédente de cinquante grains de concrétions des poires, brûlés avec le contact de l'air, ont laissé douze grains de cendre blanche, qui étoit du carbonate de chaux pur ou presque pur.

Ces expériences suffisent pour faire voir que les concrétions pierreuses des poires, ne sont ni du carbonate de chaux, ni du phosphate calcaire, ni enfin de l'acide lithique, comme on l'avoit soupçonné, mais seulement une matière ligneuse consensuellement cristallisée dans la poire, & semblable à celle qui a fourni le fruit; elle est seulement mélangée d'une petite quantité de fécula amylicée.

Ainsi les pierres des poires ne sont, en aucune

manière capable, de produire la pierre de la vessie, avec laquelle elles n'ont aucune analogie: elles ne peuvent pas plus incommoder les personnes qui en font un grand usage, sur-tout lorsqu'elles appartiennent à des fruits bien mûrs, que ne le feroient des petits fragmens de matière ligneuse. On peut les comparer à la secule fibreuse & grossière qui reste dans les fucs: elles ne pourroient donc être tout au plus qu'un peu pesantes & indigestes pour les estomacs faibles & délicats; mais le plus grand nombre les digère facilement.

CALCUL VÉSICAL. C'est dans la vessie humaine que se trouvent le plus fréquemment & le plus abondamment des concrétions calculeuses, fausement nommées pierres de la vessie. Quoiqu'il ait déjà été question de leur nature dans le premier volume de cet ouvrage, à l'article LITHIASIQUE, & quoique M. Morveau y ait donné l'état exact des connoissances acquises par les modernes, sur la nature de l'acide lithique; l'importance de cet objet, pour la physique animale, nous fait un devoir d'en reparler encore ici avec quelques détails.

Les calculs de la vessie diffèrent plus par leur volume, leur poids, leur forme, leur couleur, que par leur nature intime; c'est une vérité très-remarquable, qui résulte de toutes les expériences entreprises sur ce point, par les chimistes modernes. On trouve dans un grand nombre d'auteurs de médecine, & nous avons recueilli nous-mêmes dans le dictionnaire encyclopédique destiné à cette science, les descriptions de toutes les variétés que présentent les calculs de la vessie, par rapport à ces propriétés extérieures. Nous renverrons à ces ouvrages pour connoître toutes ces variétés; il ne fera question ici que de leur nature. Avant Schæle, les médecins n'avoient que de fausses idées sur la nature du calcul de la vessie; ils savoient bien que la matière qui le forme, existoit plus ou moins abondamment dans l'urine de tous les hommes; mais ils regardoient cette matière, les uns comme de la craie, les autres, comme une espèce de tartre animal; il y en avoit même, qui avoient imaginé des explications particulières, pour caractériser cette concrétion; tel étoit le *Duclach* de Vanhelmont. Quelques modernes fondés sur des analogies tirées de la simple observation chimique, avoient pensé que la base des calculs de la vessie, étoit formée de la même matière que les os; mais les expériences de Marryat, suffisoient déjà pour faire voir qu'on ne devoit pas comparer les deux substances. Schæle a fait voir que le calcul vésical étoit formé par un acide particulier, dont nous retrouvons ici les principaux caractères. Cet acide nommé aujourd'hui acide lithique, est sec, solide, cristallisé en petites lames ou en prismes plats; il n'a presque point de saveur,

& ne rougit que foiblement les couleurs bleues végétales ; chauffé , il fe volatilise en partie , & se décompose en laissant peu de charbon ; il se convertit en partie en acide carbonique & en huile ; les alcalis caustiques le dissolvent ; l'acide sulfurique concentré le brûle & le décompose ; l'acide nitrique le dissout , & cette dissolution d'un beau rouge , teint une foule de substances de la même couleur ; c'est le plus foible de tous les acides , & il paroît même pouvoit être séparé de ses bases par l'acide carbonique.

Tels sont les caractères spécifiques de l'acide lithique , qu'on peut tirer de toutes les expériences de Schéele. La chaux , qu'on ne trouve qu'en très-petite quantité dans le calcul vésical , n'y est qu'accidentelle , comme le phosphate d'ammoniaque & le phosphate de soude qu'on y rencontre aussi , & qui le présentent même quelquefois cristallisés entre les couches des calculs vésicaux. J'ajoute à ces caractères les propriétés suivantes , que j'ai reconnues dans le calcul vésical , après avoir fournis à l'analyse un grand nombre de variétés de ces concrétions.

I. La dissolution de quelques calculs dans l'eau rougit assez fortement le papier de tournesol.

II. Les calculs donnent de l'acide prussique , par la simple distillation à feu nud & par l'action de l'acide nitrique , & la distillation du calcul urinaire donne d'abord un produit liquide sans couleur , consisté des siliques élastiques composés d'acide carbonique , de gaz hydrogène & d'un peu d'azote. Il s'attache bientôt dans le col de la cornue des cristaux lamelleux , brillans & plus ou moins jaunâtres , d'acide lithique pur , & du carbonate d'ammoniaque en petite quantité : il reste dans la cornue une grande quantité de charbon ; on n'obtient pas sensiblement d'huile. En examinant le produit liquide , on y reconnoît l'odeur de l'acide prussique libre ; on trouve dans l'eau une petite quantité de carbonate ammoniacal & de prussiate d'ammoniaque ; on a facilement distingué la présence de l'acide prussique , par l'oxide de fer nouvellement précipité , qui a été change en bleu de Prusse en le jetant dans cette liqueur.

III. Il paroît , d'après ces faits , que le calcul de la vessie ne contient que très-peu d'hydrogène , puisqu'il nefe forme que peu d'ammoniaque , qu'il se dégage une grande quantité d'azote , & qu'il ne se forme point d'huile ; que l'acide lithique ne contient que très-peu d'oxygène , puisqu'il n'y a qu'une très-petite quantité d'acide prussique & carbonique formés , puisque d'ailleurs , il reste une très-grande quantité de charbon à nud dans la cornue.

IV. On peut encore inférer de ces observa-

tions , que l'acide prussique contient plus d'oxygène que l'acide lithique , puisqu'il n'y a que très-peu d'acide prussique formé par une grande quantité d'acide lithique décomposé ; qu'il est vraisemblable qu'il se forme en même-temps de l'acide carbonique , mais que la quantité en est très-petite , en comparaison de la masse de charbon qui reste dans la cornue. Il semble que l'acide lithique est un composé de beaucoup de carbone & d'azote , & de très-peu d'oxygène & d'hydrogène.

Les considérations générales ne suffisent point pour faire connoître les phénomènes chimiques que les calculs vésicaux présentent à l'analyse. J'y joindrai le détail des expériences que j'ai faites des 1787 sur ces concrétions , afin de faire connoître l'accord qui regne entre les résultats que j'ai obtenus , & ceux que Schéele avoit publiés plusieurs années auparavant , & sur-tout la marche que j'avois prise dans le travail que j'avois projeté sur cet objet. Quoique ce travail soit bien loin d'être complet , il pourra être utile à ceux qui voudront le reprendre , ou plutôt le suivre , depuis le point où je l'ai laissé ; je décrirai les expériences telles qu'elles se trouvent dans mon journal de 1787.

Expériences sur le calcul de la vessie , faites en 1787.

P I E R R E N^o. I

On a pris une pierre de la vessie , provenant de la charité , conservé dans un bocal depuis plusieurs années , ayant une forme ovale un peu comprimée , dix-huit lignes de long , quinze lignes de large , quatre poences dans son grand diamètre , trois poences & demi dans son petit , irrégulière à sa surface , d'une consistance semblable à de la craie durcie , les couches extérieures étoient grises , légèrement inégales & comme cariées dans différens points ; elle s'osoit en partie sous le doigt , & une portion s'étoit réduite en poudre dans le bocal où elle étoit contenue avec deux ou trois autres plus dures. Elle pesoit six gros quarante-deux grains , ou quatre cens soixante-quatorze grains ; on l'a cassée en deux sur son grand diamètre , on a trouvé , en examinant avec soin , la tranche , formée 1^o. D'un noyau ovale de trois lignes de large sur six de long , d'une couleur grise , d'un tissu comme grenu , recouvert de petits grains jaunes verdâtres en dehors : le milieu est plus poreux & plus grenu ; 2^o. D'une autre matière en couches multipliées , mais denses , d'une couleur grise moins foncée que celle du noyau , plus épaisse vers les deux bouts de la pierre , & d'environ trois lignes & de deux cotés , plus minces du côté du plat & de deux lignes ; 3^o. D'un troisième ordre de couches plus blanches , cristallines , comme spatiques , & d'un aspect gris , de deux lignes d'épaisseur vers les bouts & un peu moins sur le

Rrrr 2

plat de la pierre; 4°. Des couches externes plus sales à mesure qu'elles s'approchoient du déhors, analogues pour la forme & le tissu à la troisième couche, & plus grise, comme feuilletées en dehors, on en a conservé les fragmens entiers avec ses couches dans un bocal.

On a réduit la moitié de cette pierre en poudre dans un mortier de verre; elle étoit douce sous le pilon, & se lioit un peu comme l'argile; elle étoit rude au touché. On a observé que le noyau se détachoit facilement de la troisième couche, & que celle-ci restoit adhérente à la deuxième couche.

EXPÉRIENCE PREMIÈRE. Le 15 mars 1787.

On a pris un fragment du noyau de la deuxième couche qui y étoit fort adhérente, dans une bouteille longue, avec trois onces d'eau distillée. L'air contenu dans la portion poreuse du noyau s'est dégagé en petites bulles; ce dégagement étoit très-lent.

Le 18, la pierre avoit la même forme, elle étoit couverte de très-petites bulles, qui s'en détachent par l'agitation: il y avoit quelques petits fragmens détachés.

Le 22, il n'y avoit ni bulles ni changement sensible.

Le 26, rien de nouveau.

On a brisé la pierre & les fragmens, on les a fait sécher à l'étuve.

L'eau ne présentait rien par les réactifs, on a abandonné cette expérience. La pierre pesoit quelques grains de plus, dûs à l'eau qui avoit remplacé l'air.

EXPÉRIENCE II. Le 22 mars 1787.

On a mis vingt-quatre grains de cette pierre, N°. I, en poudre, avec un gros d'eau distillée, pour en faire une espèce de pâte; elle s'est bien délayée avec l'odeur de marme. On a laissé cette pâte à l'air, dans un petit vase couvert de papier, pour voir si elle ne se pourroit pas, & si l'on pourroit démontrer ainsi la présence d'une gelée dans le calcul. Le 26, la pierre étoit sèche, déposée au fond du vase, elle étoit très-blanche, sans odeur; on y a remis un gros d'eau; elle s'est très-bien délayée sans odeur; on y a encore remis de l'eau le 27. Le 29, la poudre étoit précipitée au fond, l'eau étoit claire, & avoit une odeur légèrement pourrie, ou d'eau croupie. Cette odeur a duré quelques jours, mais sans prendre l'accroissement & les véritables caractères d'une matière en putréfaction. Ainsi le calcul de la vessie ne contient pas sensiblement de substances putrescibles.

EXPÉRIENCE III. Le 15 mars 1787.

On a mis vingt-quatre grains du calcul pulvérisé dans un matras, & on a versé dessus huit onces d'eau distillée; on a laissé séjourner à froid. Le 18, l'eau étoit claire sur la pierre déposée au fond; on a filtré, la liqueur a passé claire, on l'a mise à évaporer à un bain de sable doux. Le 22, la matière restée sur le filtre, pesoit 18 grains forts; il y avoit donc en six grains foibles dissous par l'eau froide en trois jours.

La liqueur mise en évaporation étoit presque toute évaporée; elle avoit laissé un enduit jaunâtre, & elle étoit recouverte d'une pellicule demi-transparente, irisée sur les bords. Le 26, il ne restoit qu'une pellicule très-mince sur le fond de la capsule. Cette légère couche étoit comme de la nacre de perle, on l'a détachée avec peine; elle pesoit deux grains $\frac{1}{2}$; il y a donc eu trois grains $\frac{1}{2}$ de perdus vraisemblablement par l'évaporation.

Le même jour 22, on a mis les dix-huit grains de matière calculeuse restant de la première lessive avec une livre d'eau distillée froide, & on les a laissés en macération dans un matras après l'avoir fortement agitée. On a remarqué, qu'après une grande agitation, la matière se déposoit promptement sous la forme de flocons cohérens, de sorte qu'on auroit dit qu'elle étoit agglutinée par une matière collante. Le 26, on a mis la liqueur à évaporer à l'étuve, après l'avoir filtrée. Le 29, cette liqueur mise à évaporer, étoit un peu louche; il y avoit une légère pellicule à sa surface. Le premier avril, cette seconde lessive étoit évaporée complètement. On a enlevé les écailles grises un peu brillantes, qui se sont trouvées peser deux grains $\frac{1}{2}$; il y a eu deux grains de perte, puisque les dix-huit grains avoient perdu quatre grains $\frac{1}{2}$. Le 29 mars, la matière calculeuse traitée par la livre d'eau dans la deuxième lessive, & séchée, pesoit treize grains $\frac{1}{2}$; il y avoit donc quatre grains $\frac{1}{2}$ de dissous dans cette seconde lessive. On a mis ces treize $\frac{1}{2}$ grains dans un matras, avec deux livres d'eau distillée, & on a laissé en macération. Le premier avril, on a filtré la liqueur qui a passé claire; on l'a fait évaporer au bain de sable, elle s'est troublée en chauffant. Lorsqu'elle a été évaporée à moitié, elle a offert une pellicule & des flocons blancs très-abondans sur ses bords, la portion de la capsule découverte par l'eau, offroit un enduit blanc; soumis au refroidissement, elle n'a point donné de cristaux; évaporée à siccité, & examinée le 15 avril, elle a présenté un enduit blanc un peu nacré, très-mince, qui, recueilli avec soin, pesoit trois grains.

Le 15 avril, la matière calculeuse, résidue de trois lessives, pesoit sept grains; il y avoit donc eu trois grains de perdu. On a mis une

livre d'eau distillée avec ces sept grains. Le 26, on a filtré & on a fait évaporer au bain de sable jusques à siccité; on a eu un enduit brillant & comme argenté en plaques un peu soulevées, qui a été très-difficile à détacher; on a recueilli un grain faible, peut-être en restoit-il $\frac{1}{2}$ de grain sur la capsule. Il restoit quatre grains $\frac{1}{2}$ non dissous sur le filtre, cette matière étoit un peu plus jaune que la pierre entière.

Il résulte de ces expériences, que de vingt-quatre grains de calcul, N°. 1, traités avec quatre livres $\frac{1}{2}$ d'eau froide, il y a eu dix-neuf grains $\frac{1}{2}$ dissous. Il faut donc 41,472 grains d'eau froide pour dissoudre vingt grains de calcul de la vessie.

EXPERIENCE IV. Le 15 mars 1787.

Pierre en poudre traitée par l'eau bouillante.

On a versé sur vingt-quatre grains de cette pierre, N°. 1, pulvérisée & mise dans une capsule de porcelaine, une livre d'eau distillée bouillante, la matière calculeuse s'est divisée dans l'eau, & a paru prendre une couleur un peu plus jaune; une partie se précipitoit & formoit un cercle plus coloré sur le fond de la capsule, on l'a bien délayée dans l'eau qu'on a filtrée toute chaude par le papier, la liqueur a passé un peu louche, cette liqueur ne coloroit point un papier teint en bleu par le tournesol, & qui rougissoit fortement par le vinaigre. Il n'y a pas eu d'effet sur le papier de mauve. Le 18 à dix heures, on a examiné la liqueur qui étoit très-claire; elle avoit déposé une grande quantité de petits cristaux aiguillés d'une ligne de long, tant sur le fond que sur les parois.

La portion non dissoute restée sur le filtre, étoit un peu plus jaune que la poudre entière de la pierre; elle pesoit onze grains, il y avoit donc eu treize grains dissous, & cette matière dissoute paroissoit s'être précipitée en partie. On a agité la liqueur pour séparer les aiguilles qui étoient assez adhérentes au verre; on est parvenu à les détacher à l'aide d'une barbe de plume; on a décanté l'eau éclaircie de dessus ces aiguilles déposées dans un vase conique. Ce sel aiguillé a été séché dans un petit vase de verre sur un bain de sable; il a perdu l'eau de sa cristallisation, est devenu blanc opaque; on l'a ramassé avec soin, il pesoit quatre grains.

La très-petite portion qui restoit sur le verre, a été dissoute sans effervescence tout de suite par l'acide nitrique blanc, on a desséché le vase lavé avec l'acide; il n'est rien resté du tout après le dégagement de l'acide; cette matière paroît donc se volatiliser par l'acide nitrique. Mis sur le charbon ardent, ce sel a pris un peu de couleur cendrée sans se volatiliser, fumer, ni brûler. Frotté avec un peu d'eau sur le papier bleu, il l'a rougi très-sensiblement. Il n'a pas paru faire le même effet sur le papier coloré avec la mauve, il a sem-

blé le verdir dans la portion frottée, & le rougir sur le bord; agité avec du sirop de violettes & de l'eau, il l'a verdi assez sensiblement. Délayé dans la teinture de tournesol fort étendue, il ne l'a point altérée sensiblement. On en a fait bouillir un peu dans de l'eau distillée, on y a plongé un papier bleu qui a été rougi moins fortement que par la même matière fincée d'elle avec de l'eau distillée froide. Cette réaction a aussi verdi le sirop de violette. Cette liqueur a été évaporée au bain de sable dans une étuve chaude à vingt-un degrés.

La liqueur d'où s'étoit précipité ce sel en cristaux mise à évaporer à l'étuve pendant quatre jours, s'est réduite à un tiers, elle étoit légèrement jaunâtre; on y voyoit six à huit flocons blancs formes d'une grande quantité d'aiguilles molles pliantes, partant d'un centre & divergentes, de manière qu'elles représentoient une espèce de boule, & ressembloient parfaitement aux pappus des dents de lion ou pissenit, &c. Il y avoit quelques grains qui nous ont paru être du sable, & sept à huit flocons blancs qui n'étoient que des corps étrangers. Le 25, l'évaporation étoit finie, le fond de la capsule présentoit des lames brillantes comme vernissées, soulevées au scalpel. Cette matière sembloit un peu ramollie sur les bords & déliquescence; elle pesoit huit grains, qui, avec les quatre grains des premiers cristaux déposés en aiguilles par le refroidissement, font douze grains de matière, sans un peu de sable qu'on a cru voir dans la liqueur à moitié évaporée; mais qui ne paroissoit plus au milieu de la croûte adhérente au verre. Il faut qu'un peu de cette matière dissoute se soit dissipée pendant l'évaporation, puisqu'on devoit en trouver treize grains. Cette matière, produit de l'évaporation, rougit fortement le papier bleu ordinaire ainsi que celui de mauve, en le frottant avec un peu d'eau, sensiblement la teinture de tournesol, & point du tout le sirop de violettes; elle ne le verdit pas non plus.

On a trituré les onze grains de calcul échappé à cette première lessive d'eau bouillante, dans une livre d'eau distillée, & on a fait bouillir cette eau pendant huit ou dix minutes. On a filtré, la liqueur a passé très-claire; après cette seconde lessive, la matière calculeuse, restée de cette seconde lessive, pesoit cinq grains. On a évaporé la seconde lessive à siccité à un bain de sable; il n'y avoit qu'une couche très-mince & brillante, moins abondante que dans la première lessive. On a déraché cette couche, elle pesoit quatre grains; il s'en est perdu deux grains.

On a fait bouillir pendant un quart-d'heure vingt-quatre onces d'eau distillée avec les cinq grains restant de la seconde lessive; on a filtré cette troisième lessive toute chaude, on l'a mise à évaporer; la capsule ayant été calée sur le bain de sable, on a perdu la liqueur.

Le résidu de cette troisième lessive séché à l'air pendant trois jours, pesoit un grain fort, & le papier étoit teint en jaune par place; il faut ôter à l'air un demi-grain ce qui restoit sur le papier; en passant le doigt sur ce papier, on l'a trouvé comme gras.

Il résulte donc de cette expérience, que de vingt-quatre grains de calcul, traités en tout avec trois livres $\frac{1}{2}$ d'eau bouillante, il y en a eu au moins vingt-deux grains de dissous; on peut donc dire que la base de ce calcul est dissoluble presque en entier dans l'eau bouillante; ce qui est à-peu-près, &c en supposant dissolution complète, dans le rapport de mil trois cens quarante-quatre pour l'eau, à un pour le sel.

EXPÉRIENCE V.

On craignoit que l'eau qui n'avoit que peu bouilli avec le calcul, n'en eût pas pu dissoudre assez, & Schéele ne s'étant pas bien expliqué, on rostit un essai de la manière suivante. On prit quatre grains de cette pierre (N^o. 1.), en poudre fine, on les fit bouillir six minutes avec quatre onces d'eau distillée dans une fiole à médecine; on filtra la liqueur bouillante; on en versa sur la teinture de tournesol qu'elle ne changea point, elle n'eut pas plus d'effet sur le papier de mauve. Le résidu séché sur le filtre, ne pesoit plus qu'un grain, il avoit perdu trois grains par la décoction; la liqueur filtrée étoit très-claire, il y avoit sur le fond de la bouteille une assez grande quantité de petits cristaux aiguillés, semblables à ceux de la première expérience, mais beaucoup moins abondans. Ces cristaux n'étoient que sur le fond & non sur les parois, comme dans la précédente, ce qui tient sans doute, à ce qu'ils se sont déposés plutôt. On a essayé la liqueur de cette expérience par différens réactifs. 1^o. La potasse caustique n'y a point produit de précipité sensible; 2^o. Il en a été de même avec le carbonate de potasse. En examinant les verres deux heures après l'expérience, on a vu dans le premier, des espèces d'aiguilles cristallines au rond, & des flocons mucilagineux très-légers, nageant au-dessus des aiguilles; on ne voyoit rien de semblable dans le second verre. Ce phénomène paroît être dû à l'union de l'acide lithique avec la potasse dans le premier verre; à ce que ce sel n'auroit pas pu se former avec le même alcali saturé d'acide carbonique, dans le second verre, en raison de l'affinité plus forte de ce dernier acide avec l'alcali, que n'en a l'acide lithique; 3^o. Une troisième portion de la liqueur a été mêlée avec l'acide oxalique qui n'y a rien produit; 4^o. Une quatrième n'a pas éprouvé d'altération de la part du muriate de baryte. Ces deux verres n'ont rien présenté après plusieurs jours, seulement le second mélange avec le muriate barytique étoit un peu précipité sur ses

bords, & en le lavant avec de l'acide nitrique, on s'est aperçu d'une effervescence sensible.

EXPÉRIENCE VI. Du 15 mars 1787.

Pierre en poudre, (N^o. 1.) traitée par l'eau de chaux.

On a mis vingt-quatre grains de cette pierre pulvérisée dans un matras, & on y a versé huit onces d'eau de chaux; ce mélange a été mis en digestion dans un bain de sable, à la chaleur de l'ébullition. Le 18, la matière calculeuse étoit au fond, elle étoit en grande partie pulvérulente, une portion étoit adhérente au fond du matras; on a filtré, la liqueur a passé claire; on a fait sécher la poudre calculeuse restée sur le filtre. Le 22, celle-ci pesoit seize grains foibles, il y avoit eu huit grains dissous; le résidu ne rougissoit point le papier bleu comme la pierre, il faisoit effervescence avec les acides; on en a traité douze grains avec du vinaigre distillé pour en séparer la craie, & avoir l'acide lithique seul; il est resté six grains de matière, il y a donc eu six grains de craie dissoute; on a précipité la lessive acétée par le carbonate de potasse, on a eu quatre grains de craie. Les six grains de matière non dissoute par le vinaigre ont rougi le papier bleu, & paroissent être la substance calculeuse séparée de la craie dissoute par le vinaigre.

La liqueur conservée dans une bouteille, refroidie sur le fond de ce vase des aiguilles semblables à celles de la lessive dans l'eau bouillante; & des cristaux grenus sur ses parois. A la vue, on auroit dit que cette expérience ressembloit parfaitement à celle faite par l'eau bouillante; cependant la lessive étoit encore calcareuse & verdissoit le papier de mauve.

Du 22 mars au 6 mai, la liqueur conservée dans une bouteille, avoit déposée une très-grande quantité de petites aiguilles sur les parois de la bouteille. On a décanté l'eau de dessus ces cristaux très-nombreux, on les a fait dessécher à l'étuve, ils ressembloient à de la neige ils pesoient sept grains.

Le 10 juin, on a examiné ces sept grains de matière déposée de la lessive filtrée. Cette matière ne rougit point le papier bleu, elle ne se dissout point sensiblement dans l'eau froide, mais elle s'y divisa en petites aiguilles; elle fait effervescence avec l'acide sulfurique étendu d'eau, il paroît donc que ce dépôt est, comme la portion non dissoute d'abord, un mélange d'acide lithique & de craie, ce qui paroît provenir de ce que la lessive de lithique calcareuse a été décomposée par l'acide carbonique de l'atmosphère. Il paroît que cet acide a plus d'affinité avec la chaux que n'en a l'acide lithique; il s'est reformé de la craie, & il s'est déposé en même-temps de l'acide lithique.

Pour confirmer encore cette idée, on a versé sur six grains de la matière déposée de la lessive calcaire, de l'acide acétique qui a fait effervescence. On a fait chauffer & filtré après la cessation de l'effervescence, la portion non dissoute pesoit deux grains; la lessive acétique précipitée par le carbonate de potasse, a donné deux grains $\frac{1}{2}$ de craie, un grain $\frac{1}{2}$ de terre, plus de fécule. La partie non dissoute, ne rougissoit point le papier bleu aussi sensiblement que la pierre seule; on l'a fait bouillir dans deux cucces d'eau, qui l'ont dissoute, & il s'est précipité des cristaux par le refroidissement.

La lessive acétique, précipitée par l'alcali fixe, & chauffée pour en séparer une portion de craie qui pouvoit y être dissoute à la faveur de l'acide carbonique, a donné en bouillant quelques paillettes micacées, sans se troubler.

EXPÉRIENCE VII. Le 21 mars 1787.

Pierre en poudre & alcali fixe caustique.

On a versé sur vingt-quatre grains du même calcul en poudre très-fine, trois onces d'une dil solution de potasse caustique, faite avec une once de lessive, pesant deux gros vingt-trois grains, sous le volume de deux gros dix grains d'eau & deux onces d'eau distillée. On a laissé agir à froid. Il n'y a eu ni chaleur sensible, ni mouvement, ni bulles. La couleur de la liqueur a seulement paru se foncer un peu plus qu'elle ne l'étoit, ainsi que la poudre calculeuse. Il s'est dégagé en même-tems une odeur légère non désagréable, qui avoit quelque chose d'alcalin, mais non décidée.

Huit jours après, la liqueur étoit toujours jaune, on l'a filtrée; on a senti pendant la filtration une odeur vive d'ammoniacque. Cela nous a engagés à triturer quatre grains de la même pierre en poudre, avec de la chaux vive & un peu d'eau, il s'est dégagé de l'alcali volatil très-sensible; en la triturant avec un peu de lessive caustique, il s'est dégagé également de l'alcali volatil.

Le premier avril, la portion de calcul non dissoute dans l'alcali, étoit blanche, & pesoit deux grains soibles; il y a donc eu vingt-deux grains de dissous, quoiqu'avant la filtration ces deux grains parussent occuper un grand volume. Trois semaines après, ayant examiné la dissolution, elle parut toujours jaune, mais elle contenoit une grande quantité de petites aiguilles & de lames brillantes, il y avoit aussi un flocon allongé, sensible à un glaïre d'œuf, qui s'est divisé, & a disparu tout-à-fait par agitation. Cette agitation a bientôt fait disparaître aussi les aiguilles & les lames, il ne restoit plus dans la liqueur que des espèces de filamens comme glaireux. Comme la décomposition spontanée po-

roissoit avoir lieu, nous avons fait passer de l'acide carbonique dans la liqueur à l'aide d'un appareil pneumatique-chimique, dans l'intention de dégager l'acide lithique en saturant la potasse; il ne s'est pas troublé sur-le-champ, on a laissé ce dégagement avoir lieu lentement; quatre ou cinq jours après, la potasse paroïssoit adoucie & saturée d'acide carbonique, il n'y avoit eu quelques flocons très-légers & comme mucilagineux au fond du vase; l'alcali avoit perdu sa couleur jaune. On a fait évaporer cette liqueur, elle a donné un sel cristallin, informe, non déliquescant, pesant une once trente-six grains. On a dissous ce sel dans deux onces d'eau distillée; il s'est dissout complètement, & n'a laissé que quelques flocons d'apparence muqueuse. On l'a filtré, la liqueur étoit très-claire & un peu jaune; on l'a mêlée avec du vinaigre distillé; il s'est excité une vive effervescence due au dégagement de l'acide carbonique, la liqueur a rougi le papier bleu & la teinture de tournesol, & verdi le sirop de violette. On a commencé à appercevoir, à l'aide d'une surabondance de vinaigre, du louche dans la liqueur; mais ce louche n'ayant pas donné de précipité le 17 mai, on a abandonné cette expérience, qu'on a répétée ensuite sur un autre calcul, comme on le verra plus bas.

EXPÉRIENCE VIII. Du 25 mars 1787.

On a mis cent grains de calcul, N°. I, en poudre, dans une cornue de verre tubulée, à laquelle étoit adapté un ballon, & l'appareil de Woulfe bien jugé avec de l'eau de chaux. On a versé par-dessus deux gros & demi d'acide nitrique blanc pesant 15 grains & $\frac{1}{2}$ plus que l'eau sous le volume d'une once, mêlé avec deux gros d'eau distillée. Il y a eu tout de suite, & à froid, un peu de vapeurs rouges, & une effervescence écumeuse. On a laissé passer six à huit grosses bulles, & on a recueilli alors le fluide élastique. L'écume subsistait un quart-d'heure après sans dégagement sensible, on a ajouté d'abord deux gros d'acide mêlé à deux gros d'eau, & ensuite une demi-once d'eau distillée pour délayer tout le mélange. Des bulles très-grosses se sont dégagées; elles se succédoient lentement sans troubler l'eau de chaux, au-dessus de laquelle elles se rassembloient. Au bout d'une demi-heure, les bulles ont augmenté & ont troublé fortement l'eau de chaux. Ce gaz a continué à se dégager pendant près d'une heure, & troublant toujours l'eau de chaux. On a recueilli; 1°. un volume égal à celui de onze onces d'air, c'étoit de l'air atmosphérique; 2°. à vingt-trois onces d'air, c'étoit du gaz azote; 3°. à seize onces d'eau, c'étoit un mélange de gaz nitreux & de gaz acide carbonique.

Trois quarts-d'heure après le commencement de l'expérience, l'écume a cessé, la matière

était toute dissoute dans l'acide, & cette dissolution étoit d'un jaune d'or; elle est restée très-claire, est un peu foncée en couleur jusqu'à la fin de l'expérience, qui a duré deux heures en tout. A cette époque, la liqueur étant épaisse, & se boursoufflant fortement, le gaz n'étant plus abondant, & l'eau remontant dans le tube, on a cessé l'opération & diminué le feu; il a passé par absorption un peu d'eau de chaux du tube dans le ballon, & ce fluide s'est mêlé avec le produit liquide; la portion de craie ou carbonate de chaux entraînée avec l'eau, ne s'est pas dissoute dans le produit. On a déluté; il y avoit en produit blanc au fond du récipient, mêlé d'eau de chaux 1 3/4 gros 1/2 ou 1116 grains. La liqueur restée dans la cornue étoit jaune, dorée, épaisse comme une huile, & remplie de petites bulles ou de mousse qui en troublaient la transparence. Cette liqueur ou dissolution du calcul dans l'acide nitrique pesoit quatre gros cinquante grains. La mousse aërienne ou les petites bulles, adhéroient au verre.

Le 29 mars, cette dissolution contenoit une grande quantité de petits flocons jaunâtres très-légers, comme en forme la chair dissoute dans l'acide nitrique; elle avoit une faible odeur d'eau-forte. On en a pris la moitié ou cent soixante-neuf grains qu'on a étendus dans deux onces d'eau distillée, les flocons se sont divisés sans se dissoudre; comme ils ne se rassemblent pas facilement, on a filtré ce mélange.

1°. On a mis dans une portion un peu d'acide sulfurique qu'il n'y a rien fait sur-le-champ; dans un autre de l'acide oxalique, il n'y a point eu de précipité.

2°. On a versé dans une autre portion de l'eau de chaux, qui y a fait un précipité abondant en flocons blancs; ces flocons se sont rassemblés promptement.

3°. On a versé quelques gouttes de la dissolution épaisse sur de la chaux vive en poudre, il s'est dégagé une vapeur blanche nitreuse, & ensuite de l'alcali volatil très-sensiblement, sur-tout en y ajoutant un peu d'eau.

4°. Le muriate de baryte n'a point donné de précipité.

5°. On a pris dix gros seize grains de cette dissolution épaisse, qui restoit des expériences précédentes; on l'a mêlée avec une once d'eau; on l'a filtrée, on y a versé un gros dix grains d'alcali volatil caustique, quantité nécessaire pour le saturer; il s'est formé un précipité un peu moins blanc que par la chaux.

6°. On a fait évaporer à-peu-près un demi-gros de cette dissolution épaisse au bain de sable; elle n'a pas pris de couleur rouge, vers la fin elle étoit pleine de lames blanches, jaunâtres; la matière se boursouffloit; elle a été desséchée; du 29 au premier avril, elle a attiré l'humidité de l'air: on l'a délayée dans six onces d'eau dis-

stillée. La matière blanche & cristalline ne s'est pas dissoute; on a versé dans une portion de cette dissolution, de la potasse caustique dissoute dans l'eau; il s'est formé un précipité blanc assez pesant. Dans une autre portion, le carbonate de potasse a formé aussi un précipité semblable au précédent. Une autre petite portion dans cette dissolution a été précipitée sensiblement par l'acide oxalique. Il y a donc de la chaux dans cette dissolution; mais elle n'y devient sensible qu'après l'évaporation de la liqueur nitrique.

EXPÉRIENCE IX.

Autre expérience comparée, le 25 mars 1787.

On a versé sur soixante grains de pierre en poudre du même acide nitrique pur dans un vaisseau de verre ouvert; il y a eu à l'instant une grande effervescence, formation d'écumes & dégagement de gaz nitreux très-rouge; cette grande effervescence s'est bientôt apaisée, on a ajouté trois gros d'eau distillée pour délayer le mélange, il est resté pendant quelque temps de l'écume très-fine à la surface, comme celle de la bière qui fermente; la liqueur étoit jaune, presque toute la pierre passoit dissoute; cependant cette dissolution étoit un peu louche. On l'a laissée dans le vase converti d'un papier. Le premier avril, on a trouvé cette dissolution un peu trouble, & contenant beaucoup de petits flocons d'un jaune légèrement-brun ou fauve. On l'a étendu avec quatre onces d'eau distillée, & on en a décanté la plus grande partie à l'aide d'un siphon. Ces petits flocons conservés dans un verre, se sont desséchés; ils ont formé le 26 avril, 1°. Un enduit rougeâtre comme grenu sur les parois; 2°. Un peu de matière jaune, brune au fond du vase, elle avoit l'aspect d'une gemme humide, il y en avoit peut-être un grain; cette matière étoit fort acide, elle s'est délayée dans l'eau froide, sans se dissoudre véritablement; elle lui a donné une couleur rougeâtre, flegme de pêcheur, l'acide nitrique lui a enlevé sa couleur, ce qui prouve qu'elle n'en contenoit pas. Elle a rougi la teinture de tournesol très-affoiblie.

EXPÉRIENCE X.

On a mis cent grains de calcul, N°. I, en poudre fine dans une petite cornue de verre lutée, à laquelle on avoit adapté un ballon terminé par l'appareil de Woulf, garni d'eau de chaux. Le ballon étoit entouré de glace; le feu ayant été donné avec ménagement, on a obtenu;

- 1°. Quelques bulles de l'air des vaisseaux.
- 2°. Un phlegme blanc comme de l'eau.
- 3°. Une sublimation cristallisée en aiguilles, croisées comme le carbonate ammoniacal.
- 4°. Un autre sel concret, plus près de la cor-

onne

nue & différent du premier par la forme, il paroît en dehors comme des points brillans, comme des houpes cristallines ;

5°. Entre ces deux sels, il s'est formé un cercle brun ;

6°. La portion de sel plus près de la corne, s'est fondue & salie par une matière brune.

7°. On a vu des gouttes d'huile brune & épaisse sur la voûte de la corne, & à la portion de son col au-dessus, du sel brun en houpes ;

8°. Pendant tous ces produits, il ne passoit que quelques bulles de fluide élastique, rares, & qui ne troublent point l'eau de chaux. Malgré le très-grand feu, il ne s'est pas dégagé de gaz ; après deux heures d'une forte chaleur, la corne étoit fondue, il ne se dégageoit plus rien, & on l'a laissée refroidir.

En défilant le ballon, on a senti une odeur vive d'ammoniaque, mêlée de l'odeur empyreumatique animale. Ce vaisseau contenoit un phlegme un peu jaune, pesant quarante grains, d'une odeur alcaline, verdissant fortement le papier bleu de mauves. La corne étoit fondue & trouée, de sorte qu'il a pu se perdre un peu de charbon. Elle contenoit dans son bec deux espèces de sels volatilisés déjà aperçus au-dehors ; 1°. L'un situé au bout vers le ballon, & en partie en haut, près de la voûte, sous la forme aiguillée & ramifiée, d'une odeur forte, & une saveur alcaline très-vive : c'étoit du carbonate ammoniacal ; 2°. L'autre placé entre les deux couches du précédent, ayant une forme différente & lamelleuse, une saveur moins sensible que celle du premier ; 3°. Une huile brune, épaisse, très-fétide, très-peu abondante, concrète, & enduisant les cristaux précédens, sur-tout vers le haut de la corne. Ces trois produits pesoient ensemble huit grains. Le fond de ce vaisseau contenoit un charbon en partie pulvérulent.

Nota. On ne fait pas mention ici de l'acide prussique, observé depuis dans les produits du calcul vesical distillé.

EXPERIENCE X. Du 3 avril 1787.

Action de l'acide muriatique oxigéné.

Le 3 avril, on a mis vingt-quatre grains de la pierre N°. 1, en poudre dans un matras, & on y a versé 10 onces & demie d'acide muriatique oxigéné, préparé, à la vérité, depuis un an & demi, & qui contenoit, conséquemment, une certaine quantité d'acide muriatique ordinaire. On a bouché le matras avec un parchemin mouillé & ficelé ; au bout de quelques heures, on a vu la poudre diminuer de volume & se dissoudre ; il s'est fait du vide, & le parchemin s'est enfoncé. L'acide a perdu son odeur & sa couleur

Chimie. Tome II.

au bout de deux jours. Quinze jours après, il ne restoit presque plus rien. On a filtré le 15 avril, on n'a eu que trois quarts de grain de résidu non dissous.

Le 26 avril, on a mis cette liqueur en évaporation, & on l'a continué le 29 ; elle a exhalé l'odeur & la vapeur d'acide muriatique ordinaire, quand elle a été en consistance presque syrupeuse, elle avoit une pellicule, & en refroidissant, elle s'est prise en petits cristaux grenus ; on a versé sur ces cristaux, comme muqueux, deux onces d'eau distillée qui n'a pas tout dissous sur-le-champ. Cette dissolution étoit fort acide ; elle a été évaporée à siccaté. Le 6 mars elle étoit desséchée, jaune, deliquescente, d'une odeur d'acide muriatique, & analogue en même-temps à celle d'un extrait brûlé ; elle pesoit dix-huit grains. La portion séparée dans la première évaporation pesoit deux grains ; elle étoit blanche & matte, presque comme de la farine.

Le 3 avril, on a mis vingt-quatre grains de pierre, N°. 1, bien pulvérisée dans un matras, & nous y avons ajouté 10 onces & demie d'acide muriatique oxigéné préparé depuis un an & demi, & qui contenoit une portion d'acide muriatique ordinaire ; cet acide ne nous a pas paru d'abord agir sur la pierre ; mais nous avons vu au bout de quelques heures, que la quantité de cette matière avoit sensiblement diminuée, & en la visitant de temps en temps, nous nous apercevions qu'elle se dissolvait facilement comme un sel dans l'eau, & que l'acide perdoit beaucoup de son odeur & de sa couleur, puisqu'il devenoit blanc. Il n'en restoit, au bout de deux jours, qu'une très-petite quantité non dissoute au fond de la liqueur.

On a versé dans la dissolution de l'ammoniaque caustique qui y a formé un précipité, dont les premières portions se sont redissoutes ; peu-à-peu ce précipité s'est déposé en flocons très-abondans ; il s'est excité beaucoup de chaleur ; quoiqu'il y eût un excès d'alcali, la liqueur rougissoit encore le papier bleu. Depuis le premier avril jusqu'au 26, on a décanté avec soin la liqueur claire en ajoutant un peu d'eau distillée. Quatre mois après la liqueur décantée de dessus le précipité par l'ammoniaque, qui avoit d'abord rougi le papier bleu, & qui paroîtroit contenir alors de l'acide à nud, quoiqu'elle fût alcaline, ne présentoit plus qu'une odeur fade. Elle ne rougissoit ni la teinture de tournesol, ni le papier, mais elle verdissait le sirop de violette. Comme de soixante grains de calcul, N°. 1, dissous, on n'avoit eu que trente-trois grains de précipité par l'ammoniaque, il paroîtroit que vingt-sept grains devoient être restés en dissolution dans l'acide & mêlés avec le nitrate ammoniacal. Pour essayer de séparer cette substance, on a ajouté de l'alcool à une partie de la dissolution déjà précipitée, il ne s'est fait qu'un très-

Siff

léger précipité; on a fait évaporer la plus grande partie au bain de sable, mais la capsule ayant caillée, on a perdu presque toute la dissolution, & il n'est resté qu'un peu d'enduit jaune. On a observé que le précipité d'abord jaunâtre, est devenu plus blanc à mesure qu'il a été lavé. Ce même jour, on a filtré la liqueur, recueilli le précipité sur le filtre; séché, il étoit assez volumineux, jaunâtre, comme farineux, & il pesoit trente-trois grains.

1°. Le 29 août, on a mis six grains de ce précipité dans deux gros $\frac{1}{2}$ d'un acide nitrique fait avec un gros de cet acide, pesant 3 $\frac{1}{2}$ 15 gros $\frac{1}{2}$ plus que l'eau, sous le volume d'une once quatre gros d'eau. Il s'est dissous sur-le-champ, comme du sucre dans l'eau. On y a remis en trois fois seize grains, de la même matière, en tout vingt-deux grains pour saturer l'acide nitrique. La liqueur est restée un peu trouble, & l'acide nitrique en paroisoit saturé. Malgré cela, il étoit très-acide.

2°. On a mis un peu de ce précipité sur un papier bleu, & on l'a frotté avec de l'eau, il l'a rougi très-sensiblement.

3°. Goûté, il avoit, d'abord, une petite saveur acide, puis légèrement styptique.

4°. Trituré avec la chaux, il n'a point dégagé d'alcali volatil.

5°. On en a fait chauffer six grains avec deux onces d'eau distillée, la lessive n'a rien fait sur le tournesol. Le 6 mai, il y avoit quelques petits flocons aiguillés, déposés, mais moins sensiblement que dans la lessive bouillante du calcul seul. La portion non dissoute, pesoit deux grains, il y avoit quatre grains de dissous; on a fait évaporer la liqueur, il n'est resté qu'un léger enduit gris foncé d'environ $\frac{1}{4}$ de grain. Cette matière est donc volatile par l'eau.

6°. On en a mis cinq grains dans deux onces d'alcool, on a chauffé, il n'a pas paru y avoir de dissolution. Le 6 mai, il n'y en avoit pas d'avantage.

Les vingt-deux grains de matière ci-dessus N°. 1, n'ont pas été entièrement dissous par l'acide nitrique, il en est resté un grain en poudre rosée.

On a versé de l'alcool dans cette dissolution nitrique qui n'a rien précipité, seulement il s'est dégagé beaucoup de bulles de ce mélange. Le 6 mai, on a tiré du fond du verre, un demi-grain de précipité jaunâtre qui a brûlé sur le charbon avec une odeur animale, en laissant un petit charbon. On a fait évaporer la liqueur; elle n'a pas pu être desséchée, elle est restée jaunâtre comme un sirop, on l'a négligée & abandonnée.

EXPERIENCE XI. Du 15 avril 1787.

Calcul de la vessie & acide muriatique oxigéné.

D'après l'expérience précédente, on a voulu effayer une pierre entière. On a pris une pierre, N°. 11, de la nature de celles qui sont hérissées, & comme formées de petits fragmens agglutinés, ou petite pierre murale, comme un précipité globuleux, pleine de cavités entre les extrémités des tubercules extérieurs; elle pesoit dix-huit grains; elle étoit un peu jaune, un des points de sa surface étoit lisse & comme fracturé; il sembloit qu'on en avoit enlevé une portion des points saillans. On conservoit cette pierre depuis vingt-cinq ans avec beaucoup d'autres qui venoient du même sujet. Elle avoit environ cinq lignes de diamètre; elle s'égrenoit facilement par la friction contre un linge rude, & sur-tout un corps dur. On l'a jeté dans six onces d'acide muriatique oxigéné. On a bouché le matras avec une vessie mouillée. L'air a été d'abord chassé de la pierre.

Le 16, la pierre a blanchi.

Le 17, plus blanchi.

Le 18, semble diminuée, fragmens détachés en poussière.

Le soir, lame ronde détachée.

Le 19, lame tout-à-fait séparée.

Le 20, diminution de volume & des aspérités devenues très-sensibles.

Du 20 au 15, l'acide avoit perdu une grande partie de son odeur.

Depuis le 25 jusqu'au 28, la pierre ne parut pas perdre plus de son volume.

Le 29 avril, la pierre étoit blanche, plus égale & comme usée à sa surface, il y avoit toujours un fragment lamelleux, détaché & flottant dans la liqueur. On y voyoit aussi une poudre blanche qui nageoit dans l'acide. On a oté la vessie, parce qu'on ne voyoit pas d'action sur la pierre; on a senti encore une odeur très-sensible d'acide muriatique oxigéné, on a lavé dans l'eau la pierre tirée du matras; séchée, elle pesoit huit grains; elle étoit très-blanche, & avoit l'odeur d'acide muriatique oxigéné. Le fragment & les flocons détachés, desséchés, sont devenus d'une couleur citrine; ils pesoient un grain foible, ce qui fait neuf grains de dissous sur la pierre.

On l'a remise le 29 avec quatre onces d'acide muriatique oxigéné, il y a eu des bulles encore sensibles; la pierre a diminué plus sensiblement dans cette seconde expérience que dans la première; le 30 mai, elle étoit bien plus petite & plus ronde.

Le 10 mai, la pierre étoit bien diminuée encore, lisse & arrondie; on a décanté l'acide, & on l'a mêlé avec les six onces de la première

lèssive, la pierre séchée, pesoit quatre grains, un grain foible de précipité. — Cinq grains de dissous.

On l'a remis avec quatre onces d'acide muriatique oxigéné, mais on n'a plus aperçu d'action de la part de cet acide.

EXPÉRIENCE XII. Du 29 avril 1787.

Troisième essai de l'acide muriatique oxigéné.

On a mis dans un matras une petite pierre (N^o. III.) tétragone, usée sur trois de ses côtés & bombée sur l'autre, jaunâtre, formée par couches & lisse à sa surface; elle avoit été ronde, elle pesoit trente-trois grains; elle avoit cinq lignes, & trois lignes dans ses deux diamètres. On a versé dessus huit onces d'acide muriatique oxigéné. On a bouché le matras avec un parchemin mouillé, on a aperçu quelques bulles adhérentes à la surface de la pierre.

Le 3 mai, la pierre étoit blanchie, & ne paroissoit pas sensiblement diminuée.

Le 10 mai, la pierre étoit très-blanche, ne paroissoit que peu diminuée, il y avoit des petits fragmens lamelleux, détachés, & flottans dans la liqueur. Comme celle-ci étoit claire & presque sans odeur, on l'a décantée & mise à part.

La pierre retirée étoit lisse, blanche; il s'en détachoit sur une des faces une petite pellicule de couleur citrine; elle pesoit, après sa dessiccation, trente-un grains; elle n'a perdu que deux grains.

On l'a remis le 10 mai avec huit onces d'acide muriatique oxigéné, qui n'a plus eu d'action sensible.

Nota. Le 17 juin 1787, on a retiré les calculs, N^o. II & III de l'acide muriatique oxigéné, dans lequel ils étoient restés plongés depuis assez long-temps, le premier a été trouvé bien diminué de volume; il avoit, à sa surface, (chose digne de remarque) une couche molle ductile, & d'une couleur légèrement jaune, ce qui étoit au-dessous avoit conservé la solidité dont il jouissoit, avant d'avoir été soumis à l'action de l'acide muriatique oxigéné; il ne pesoit plus qu'un grain foible, l'acide muriatique oxigéné en avoit donc dissous dix sept grains, puisqu'il pesoit dix-huit grains avant d'avoir été soumis à l'expérience. Le N^o. III n'avoit presque pas diminué de volume; mais cette pierre avoit changé de couleur, elle étoit jaunâtre avant l'opération, & on l'a trouvée très-blanche après, elle ne présentoit aucune substance molle à sa surface comme celle du N^o. II, elle pesoit trente grains; elle avoit perdu trois grains, car elle pesoit trente-trois grains avant qu'elle eût été mise en contact avec l'acide muriatique oxigéné.

Analyse d'un ancien calcul de la vessie, N^o. IV.

M. Vicq-d'Azir nous avoit donné une pierre provenant de la collection de le Dru, de trois poüces de long, un peu aplatie, & de deux poüces de diamètre à l'un de ses bords, arrondi à l'autre, & d'un pouce & demi dans le sens de son aplatissement. Elle étoit irrégulièrement ovale & comprimée, lisse dans quelques points & comme tuberculeuse à ses deux bouts, d'une couleur jaune brune; on l'a cassée d'un coup de marteau, elle s'est brisée assez facilement & en beaucoup de fragmens. Elle contenoit une grande quantité de couches minces d'une même couleur jaune, plus pâle que la surface & beaucoup plus friable. Ces couches tenoient très-peu les unes aux autres, chaque couche étoit égale & sans plus d'épaisseur dans un point que dans un autre de leur diamètre. Les couches internes appuyant sur le noyau auxquelles elles étoient peu adhérentes, étoient aussi moins denses, comme grenues, & d'un jaune plus brun. Le noyau étoit comme une sève ou un filix arrondi, ovale, comprimé; il avoit déterminé manifestement la forme totale de la pierre, il avoit huit lignes de long, six lignes de large & trois d'épaisseur entre les faces comprimées. Ce noyau étoit encore formé de couches moins denses à leur extérieur, & moins fragile par le doigt; le milieu contenoit des graviers irrégulièrement adhérents & qui laissoient entr'eux des vides. Il est remarquable que les couches s'endurcissent à mesure qu'elles approchent de l'extérieur, & que celle-ci, ou l'écorce la plus dense de toutes, est demi-transparente comme si c'étoit un spath. Ce calcul pesoit trois onces deux gros quarante-huit gr.; il n'a point dégagé d'alcali volatil par la chaux, différent en cela de la première, (N^o. I.) qui a présenté ce phénomène d'une manière très-marquée.

EXPÉRIENCE PREMIÈRE. Le 10 mai 1787.

On a pris trente-six grains de cette pierre en poudre; on les a fait bouillir avec sept livres d'eau distillée pendant un quart d'heure; on a filtré la liqueur toute bouillante, comme on a fait dans les expériences précédentes, sur un papier Joseph, soutenu par une toile au-dessus d'un carrelor. La liqueur a passé très-claire. Il est resté sur la bassine de cuivre jaune où l'on avoit fait l'ébullition, un peu de poussière calculeuse qu'on a recueillie soigneusement avec une carre pour la jeter sur l'eau du filtre, de sorte qu'il ne restoit peut-être pas $\frac{1}{2}$ de grain de cette poussière sur la bassine.

Six heures après la portion non dissoute restée sur le filtre, pesoit quatre grains; il y a donc en trente-deux grains dissous. Le treize, on a traité

SSCI 1

ces quatre grains, qui contenoient encore des parcelles brillantes, un peu de sable & des flocons de papier, avec deux livres distillée qu'on a laissée bouillir une demi-heure, tout a été dissous.

Les sept livres de lessive aqueuse de ce calcul avoient déposé une grande quantité de matière cristalline, en aiguilles & en lames brillantes, dont quelques-unes réfléchissoient les couleurs de l'iris. Ce sel étoit fort abondant en volume, très bien cristallisé; il n'adhéroit point à la capsule du grès, & s'est rassemblé au fond par la plus légère agitation. On a filtré la liqueur, pour recueillir ce sel, il avoit une couleur un peu jaune, & l'apparence brillante du mica; il pèsait dix-neuf grains.

La liqueur décantée & évaporée à siccité, a donné des lames grises un peu brillantes, soulevées de dessus la bassine de cuivre pesant douze grains; il y a donc eu trois grains de perdus ou volatilisés par l'évaporation.

Cette expérience prouve que le calcul de la vessie est entièrement dissoluble dans l'eau.

La portion cristallisée par le refroidissement roussit le papier-bleu, se dissolvait dans l'alcali fixe, caustique, liquide, & présentait toutes les propriétés annoncées par Schéele; c'est de l'acide lithique pur.

EXPÉRIENCE II. Le 13 mai 1787.

On a versé sur trente-six grains de calcul, N^o. IV, en poudre très-fine & tamisée, de l'acide nitrique, fait avec une once d'eau & une demi-once d'acide, pesant trois gros quinze grains $\frac{1}{2}$ plus que l'eau sous le volume d'une once. Il y a eu lentement une effervescence avec bulles écumeuses & odeur d'acide nitrique, mais sans vapeur rouge. On a mis ce mélange dans un verre, & on l'a laissé agir spontanément.

Le 17, il y avoit une portion notable de calcul non dissous & jaune; on a remis du même acide nitrique, qui a fait un peu d'effervescence.

On a mis douze grains de calcul, N^o. IV, dans un verre, & on y a versé du même acide pur; il y a eu beaucoup de chaleur, une forte effervescence, & des vapeurs rouges foncées, comme cela a lieu pour les matières combustibles, traitées par l'acide nitrique; le calcul a été en grande partie dissous; la portion non dissoute étoit blanche; et en ajoutant de l'eau distillée après un quart-d'heure de la première action, la portion blanche s'est redissoute.

EXPÉRIENCE III. Le 13 mai 1787.

On a versé sur trente-six grains de calcul en poudre fine, quatre onces de lessive de potasse caustique, formée par l'union d'une once de la lessive concentrée, (cette lessive pèse cinquante-quatre grains plus que l'eau distillée, sous le volume

d'une once), avec trois onces d'eau. La poussière calculeuse s'est pelotonnée & a pris une couleur jaune, ainsi que la liqueur, pour favoriser la réaction entre ces deux corps, on a trituré le mélange dans un mortier. On a remarqué alors, que le calcul se dissolvait facilement dans cette lessive, & disparaissait sans mouvement, sans bulles, sans odeur. Pour saturer l'alcali, on l'a trituré avec trente-six autres grains du même calcul qui s'y sont dissous de même, on en a ajouté douze grains en une troisième fois, ils se sont encore dissous; enfin, douze autres grains ne se sont pas dissous entièrement, malgré plus de deux heures de contact, tandis que les premières portions se sont dissoutes en quelques minutes. On a observé que le mélange devenoit comme maqueux & épais en approchant de la saturation. On a filtré la liqueur, elle a passé claire, colorée en jaune doré; on l'a laissée évaporer à l'évapeur. La portion de calcul non dissoute pèsait six grains, il y en avoit donc quatre-vingt dix grains de dissous dans la liqueur alcaline.

Le 17, la capsule où la lessive avoit été mise en évaporation, contenoit un dépôt gris, adhérent à toute la surface. Le dépôt sec s'est détaché très-facilement du verre, il pèsait quatre-vingt six grains. Cette matière saïne n'avoit qu'une saveur fade & comme douceâtre, elle ne se dissolvait pas absolument dans l'eau froide, mais blanchissait & se précipitoit promptement, frottée sur le papier bleu avec un peu d'eau, elle ne l'a point rougi, tandis que la matière calculeuse précipitée de la dissolution de la pierre dans l'eau bouillante, & celle obtenue par l'évaporation à siccité de la même lessive aqueuse, rougissait très-fortement. Après avoir été lavée & blanchie par l'eau, elle n'altérait pas davantage le papier bleu. L'eau de lavage verdissait le sirop de violettes.

La lessive fortement évaporée, étoit toujours jaune & peu caustique. — On y a fait passer du gaz acide carbonique, qui n'a rien précipité, quoiqu'on en ait fait passer une très-grande quantité. La liqueur évaporée à siccité, a laissé une masse aiguillée jaunâtre, du poids d'un gros; ainsi, quatre-vingt-dix grains de calcul ont formé avec l'alcali, cent cinquante-huit grains de lithiate de potasse cristallisé.

Il paroît donc que la potasse unie ici à l'acide lithique, en masque les propriétés; le lithiate de potasse précipité cette fois par l'évaporation, n'étoit pas dissoluble comme celui de la pierre, N^o. I; il est vrai que ce dernier n'étoit pas saturé d'acide lithique, tandis que le sel formé avec le calcul, N^o. IV, étoit surchargé de cet acide.

Pour continuer à examiner ces différences, on a fait les expériences suivantes:

On a lavé six grains de lithiate de potasse obtenu dans celle-ci, avec une once d'eau distillée

bouillante; la portion non dissoute ne rougissoit pas davantage le papier bleu.

Six autres grains ont fait un peu d'effervescence avec l'acide acétique, mais sans se dissoudre.

On a jeté sur six autres grains de ce sel, trois onces d'eau distillée qu'on a fait bouillir; ils se sont dissous; ce sel est donc bien plus soluble que le cal cul ou l'acide lithique, puisque la proportion d'eau employée, peut-être même trop considérable, est à celle du lithiate de potasse, comme 288 : 1, tandis qu'il faut plus de 2000 parties pour une de calcul entier ou d'acide lithique. On a mis du vinaigre distillé dans cette dissolution, elle a été troublée & précipitée comme un sel sulfurique le fait par le muriate de baryte, en s'ries pesantes; ces s'ries se sont déposées en petites aiguilles cristallines.

Comme cette expérience paroît très-intéressante, on a pris les soixante-huit grains restans, on les a traités avec une livre d'eau bouillante, ils se sont tous dissous. On a mêlé avec cette liqueur, la première portion des six grains déjà dissous & précipités; ce qui faisoit quatre grains en tout. On a précipité le 17 mai cette dissolution avec l'acide du vinaigre distillé; la matière calculeuse en se précipitant, a formé des s'ries pesantes, blanches, laiteuses; en les mêlant par l'agitation, ces s'ries ont donné à la liqueur l'aspect d'une emulsion épaisse; en se rassemblant, cette matière a pris un peu de couleur jaune, on y a bientôt observé la forme d'aiguilles très-fines.

Le 23 mai, on a décanté la liqueur, & on a bien lavé le précipité à l'eau froide, ce qui a été recommencé plusieurs fois.

Le 3 juin, on a desséché ce précipité après avoir décanté l'eau de dessus; il étoit très-blanc, mar au premier coup d'œil, & léger comme l'amidon; mais en le regardant de près, il étoit en aiguilles très-fines & très-brillantes, il pesoit quarante-cinq grains. On y a reconnu toutes les propriétés de l'acide lithique pur. On peut donc dire que dans soixante-quatorze grains de lithiate de potasse, il y a quarante-cinq grains d'acide lithique cristallisé.

EXPÉRIENCE. IV. Du 13 mai 1787.

On a mis vingt-quatre grains de calcul, N°. IV, en poudre très-fine, dans un matras avec six onces d'acide muriatique oxygéné assésible & un peu décoloré par le temps. Il n'a pas paru y avoir d'action sensible. On a laissé ce mélange agir spontanément pendant plusieurs semaines; il n'y a eu que très-peu d'action.

EXPÉRIENCE V. Du 23 mai 1787.

On a mis deux cens grains de calcul, N°. IV, en poudre très-fine dans une cornue de verre

lutée avec de la terre à four; on a adapté à ce vase un balon & un tube plongeant sous une cloche pleine d'eau distillée.

On a donné le feu par degré. Il a passé d'abord deux ou trois gouttes de phlegme jaunâtre, & il s'est élevé un sublimé en lames blanches & brillantes dans le col de la cornue. Quand la chaleur a été augmentée, ces lames ont disparu & se sont fondues en une seule masse jaune plus brune; il ne passoit point de liquide dans le récipient, mais une assez grande quantité de fluide élastique. Le feu ayant été poussé plus vivement, le ballon s'est rempli d'une vapeur blanche épaisse, qui a laissé sur les parois les plus éloignées de la cornue, des aiguilles salines très-différentes du premier sublimé du col de la cornue. Le sublimé s'est entièrement soudé & a pris une couleur foncée.

A cette époque, la vapeur blanche qui remplissoit l'appareil, est devenue brune & a taché tous les produits de cette couleur. Le feu ayant tombé, une partie de l'eau de la cuve a passé dans le ballon & s'est confondue avec le produit qu'il contenoit.

Il restoit dans la cornue un charbon d'un très-beau noir, très-fin, pesant vingt-sept grains.

Le sel sublimé dans la cornue étoit fondu, mais grenu & comme de l'amidon un peu brulé; une portion étoit blanc-jaunâtre, & le reste gris brun. Il pesoit quarante deux grains.

Le fluide élastique occupoit le volume de six livres; l'eau en a dissous beaucoup en remuant dans les cloches.

Il a été impossible d'essimer une portion du sel concret ou carbonate ammoniacal, mêlé de charbon & d'un peu d'huile, qui a été mêlée avec l'eau & qui s'est sublimée dans le tube.

On a mêlé à l'eau du ballon, restant des sels en dissolution, & qui avoit été filtrée pour en séparer le charbon, (il y avoit six grains de charbon), de l'eau de chaux, pour décomposer le carbonate ammoniacal qui devoit s'y trouver. Il s'est formé tout-à-coup un précipité de carbonate de chaux; mais cette expérience n'ayant pas complètement réussi, on l'a recommencée avec plus d'exactitude.

EXPÉRIENCE VI. Du 28 mai 1787.

On a mis une once du calcul N°. IV, en poudre, dans une cornue de verre lutée; on y a adapté une allonge & un ballon, avec le siphon & la cloche pleine d'eau, afin de recueillir tous les produits. On a donné le feu avec la plus grande précaution. On a obtenu d'abord, deux ou trois gouttes de phlegme jaunâtre, des bulles de fluide élastique, & un sublimé en lames cristallines & brillantes dans le col de la cornue. Comme on vouloit examiner ce sel sublimé, on a déluté à cette époque, & on a re-

tiré environ quatre grains ; mis dans l'eau , ce sel s'est en partie dissous ; il a paru rougir la teinture de tournesol & le papier bleu ; il a verdi le sirop de violettes ; il a été dissous par la lessive caustique , & cette dissolution a précipité par le vinaigre ; c'étoit donc de l'acide lithique sublimé.

On a continué l'opération après avoir réuni & luté la cornue à l'allonge , le sublimé s'alina augmenté ; le bec de la cornue a bruni ; il a passé beaucoup de gaz ; bientôt la partie supérieure de l'allonge s'est garnie d'une grande quantité de cristaux allongés , semblables au carbonate ammoniacal. Il a passé un fluide brun comme huileux , qui s'est congelé dans l'allonge & dans le bout du bec de la cornue. Tout le produit du ballon s'est fortement noirci à la fin de l'opération. On a déluté l'appareil après huit heures de feu bien ménagé. On a trouvé un sublimé fondu dans le bec de la cornue , une partie étoit en lames cristallines comme dans la précédente expérience. Le sublimé recueilli pesoit un gros soixante grains.

Il y avoit dans l'allonge environ deux grains de sel en paillettes semblables au premier ci-dessus , qui s'est dissous avec rapidité dans l'eau , a rougi le papier bleu , la teinture de tournesol , sans altérer le sirop de violettes , & sans donner d'odor. d'ammoniacale par la chaux. Le reste des produits contenus dans l'allonge , soit carbonate ammoniacal , soit sel acide semblable au précédent , soit huile fluide , soit matière huileuse concrète , soit charbon , ne pouvant pas être détaché , on l'a lavé avec l'eau chaude. L'allonge a perdu un gros de son poids , d'où il suit qu'elle contenoit un gros de produit , sans compter quelques gouttes d'huile concrète & brune , & les deux grains de sel concret.

Il y avoit en fluide élastique , un volume de treize livres d'eau. Ce fluide , laissé sur l'eau jusqu'au 10 juin , avoit perdu $\frac{1}{2}$ de son volume par absorption ; (c'est-à-dire , 3 liv. 10 onces 6 gros en volume d'eau ; le volume de 4 livres 5 onces 2 gros restant , éteignoit les bougies , troublait encore l'eau de chaux ; il paroïssoit spécifiquement plus léger que le total ; il avoit une odeur d'empyreume & d'acide désagréable. Il paroît être un mélange de gaz azote , de gaz acide carbonique , & d'une huile empyreumatique en vapeur. Cette vapeur sembloit être le produit de la décomposition d'un acide huileux.

Le charbon étoit très-noir & pesoit deux gros dix-huit grains.

On a filtré l'eau brune & d'une odeur piquante qui avoit servi à laver le ballon ; pour en séparer le charbon sur un filtre pesant vingt-deux grains. Après l'essiccation , ce filtre pesoit trente-deux grains ; d'où il suit , qu'il y avoit dix grains de charbon.

On a versé dans cette liqueur deux livres &

demie d'eau de chaux ; il n'y a point eu de précipitation tout de suite ; l'odeur piquante a été détruite en grande partie ; ce qui prouve qu'elle étoit due à un acide qui a été absorbé par la chaux ; bientôt il a paru un précipité en flocons un peu colorés , qui se sont rassemblés assez promptement avec l'apparence de la craie. On avoit employé l'eau de chaux dans l'intention de décomposer le carbonate ammoniacal qui devoit se trouver dans cette lessive.

On a brûlé un gros neuf grains de charbon dans une capsule de porcelaine , dont on a fait rougir le fond. Il a bien brûlé & a laissé une cendre un peu rougeâtre , pesant un grain foible. Cette cendre a fait effervescence avec l'acide sulfurique foible ; une portion d'un isure rougeâtre ne s'est pas dissous ; la partie dissoute n'a pas été sensiblement précipitée par l'acide oxalique ; ainsi elle ne contenoit pas de chaux.

Telle étoit la suite des expériences les plus remarquables & les plus exactes que j'avois tentées il y a bientôt six ans , sur quatre espèces différentes de calculs vésicaux. On y reconnoît sans peine toutes les vérités découvertes par Schéele , dix ans auparavant , & qui étoient encore à cette époque beaucoup trop peu connues en France ; on y trouve de plus la présence de quelques atomes de chaux indiquée par Bergman ; celle de phosphate ammoniacal , assez constamment existant dans les calculs , & du phosphate de soude , qui est même souvent en cristaux reconnoissables entre les diverses couches des pierres. J'avois reconnu aussi à la même époque la volatilité de l'acide lithique ; sa plus grande dissolubilité dans l'eau chaude que dans l'eau froide , sa cristallifabilité par le refroidissement. J'avois sur-tout insisté ; 1°. sur un procédé propre à l'obtenir pur , en le précipitant du lithiate de potasse par l'acide du vinaigre ; 2°. sur sa décomposition par le feu , sur les gaz qu'il fournit , la production de l'ammoniaque. Depuis ce temps , beaucoup d'autres faits m'ayant instruit sur la formation de l'acide prussique , puisque dans les altérations diverses qu'on fait subir aux matières animales , j'ai vu , comme je l'ai exposé avant de donner les analyses faites en 1787 , que le calcul de la vessie humaine donne spontanément ce produit singulier par sa distillation , & que l'acide lithique le convertit facilement par le feu en acide prussique.

Il résulte de tous les travaux sur la pierre , qu'il n'y a quelque apparence de lithontriptique que dans l'usage des alcalis fixes caustiques ; cet objet a été traité avec toute l'étendue qu'il exige dans le dictionnaire de médecine auquel nous renverrons.

Il faudroit actuellement , après avoir fait connoître le calcul de la vessie humaine , donner les

mêmes connoissances sur les calculs de la vessie des animaux ; mais on n'a rien fait sur cet objet important : je n'ai eu occasion d'examiner même légèrement que deux calculs vésicaux des animaux, l'un de la vessie du cheval, & l'autre de la vessie d'un bœuf ; l'un & l'autre ne m'ont rien présenté d'analogue à l'acide lithique ; je n'y ai trouvé que des concrétions de carbonate & de phosphate de chaux, & jusqu'ici l'urine & la vessie humaine seules m'ont présentée l'acide particulier connu sous le nom d'acide lithique. Ce fait mérite toute l'attention des physiciens, & ce ne sera que par beaucoup de travaux & de recherches successives qu'on pourra résoudre les questions suivantes qui se présentent sur cet objet.

1°. Ne trouve-t-on réellement que dans l'homme l'acide lithique ? 2°. Est-ce uniquement dans l'urine humaine qu'existe cet acide qui n'a encore été trouvé que dans cette humeur ? 3°. N'est-il pas formé dans d'autres animaux, & est-ce seulement faute d'analyses suffisantes qu'on ne l'a pas trouvé jusqu'ici ? 4°. Quelle est la nature de ce singulier produit, est-il une modification d'un autre acide animal, comme quelques chimistes pensent ? 5°. Comment se forme-t-il ? ou prend-il naissance ? 6°. Pourquoi est-il plus abondant chez quelques hommes sujets à la pierre ? 7°. A-t-il quelque analogie avec l'acide benzoïque qu'on trouve dans l'urine des enfans, plus sujets aux concrétions calculeuses de la vessie que les jeunes gens & les adultes ? 8°. Enfin, y a-t-il quelque rapport entre l'acide lithique, l'acide phosphorique, l'ammoniaque, le phosphate de chaux, &c. ?

CALCUL UTERIN. On a quelquefois trouvé des concrétions, des espèces de pierres ou de calculs dans la matrice des femmes & dans celle des femelles de plusieurs animaux, mais on n'a rien dit de la nature de ces concrétions ; on ne connoit point leur composition & leur formation. Il ne faut pas confondre avec les calculs, les débris de fœtus, de mûles, les égratouilles, qu'on a plusieurs fois rencontrés dans l'utérus. Les véritables calculs n'ont aucun rapport avec ces amas irréguliers, provenant de fausses conceptions & de leurs suites.

CALEBASSE. (*Pharmacie.*) *Cucurbita lagenaria*, *cucurbita*. Matth. 392. C'est une plante annuelle, rampante, qu'on cultive dans les jardins potagers, par rapport au fruit, qui sert de bouteille aux voyageurs. La semence de ce fruit est rafraîchissante, aperitive, pectorale, propre contre les fièvres putrides, la strangurie, la néphrétique. C'est une des quatre semences froides majeures, dont on se sert utilement dans les émulsions. On tire par expression de cette semence une huile propre à adoucir la peau.

La semence de calebasse entre dans les espèces

diarrhagante, & dans celles pour la décoction de guimauve de Fernel.

(M. WILLEMET.)

CALEBASSIER. (*Pharmacie.*) *Crescentia cujete*, *Cujete foliis oblongis & angustis, magno fructu ovato*. Plinn. gen. 23. Le calebassier est un arbre qui existe aux Antilles, à la Nouvelle-Espagne, à la Guyane, à Saint-Domingue, qui intéresse infiniment par l'utilité de son fruit, avec lequel on fabrique divers ustensiles ; la pulpe qu'il renferme est regardée comme une excellente panacée, propre à combattre un grand nombre de maladies & d'accidens. Les habitants des contrées où il étoit l'emploi contre l'hydropisie, la diarrhée, les convulsions, les coups de soleil, les chûtes, les maux de tête, les brûlures. L'on en prépare le sirop de calebasse, si renommé dans les maladies de poitrine.

(M. WILLEMET.)

CALLITRIC. (*Pharmacie.*) *Callitriche verna*, *Asine pluvialis*. Tab. cion. 713. C'est une petite plante aquatique européenne ; il est vraisemblable, dit Magnol, dans son botanicon us Montpellier, que le callitric doit être utile dans les inflammations, vu sa qualité froide.

(M. WILLEMET.)

CALORIFIQUE. On a employé en physique le mot calorifique, pour nommer le fluide qui produit la chaleur ; on lioit souvent ces deux mots, on disoit le fluide calorifique s'insinue dans les corps, le fluide calorifique pénètre les corps, le fluide calorifique se dégage des corps. Il est vrai qu'on ne prétendoit expliquer ainsi que l'effet de la chaleur, & qu'on admettoit en même-temps un fluide frigorifique, pour expliquer l'effet du froid. Cette expression étoit donc celle d'un système, d'une simple opinion, aussi n'a-t-elle pas été long-temps employée par les physiciens. On y a substitué presque généralement le mot feu ou chaleur ; mais le premier étant très-vague, & le second n'appartenant qu'à l'effet sur l'économie animale, les chimistes modernes ont adopté le mot calorique. Voyez ce mot.

CALORIMÈTRE. (*Chimie.*) L'appareil qui porte ce nom, est dû à MM. Laplace & Lavoisier ; comme ils en ont été jusqu'à présent presque les seuls possesseurs, & comme ils le connoissent mieux que personne, nous avons cru ne pouvoir mieux faire que d'extraire ce qu'ils en ont dit.

Il est inutile de dire à quoi est destiné cet instrument, le nom qu'il porte l'indique assez ; il ne faut pas cependant le confondre avec les thermomètres & les pyromètres qui sont fréquemment en usage depuis long-temps. On en

connoître suffisamment la différence dans le courant de la description.

Si après avoir refroidi un corps quelconque à zéro du thermomètre, disent les auteurs, on l'expose dans une atmosphère, dont la température soit de vingt-cinq degrés au-dessus du terme de la congélation, il se chauffera insensiblement depuis sa surface jusqu'à son centre, & se rapprochera peu-à-peu de la température de vingt-cinq degrés, qui est celle du fluide environnant.

Il n'en fera pas de même d'une masse de glace qu'on auroit placée dans l'atmosphère; elle ne se rapprochera nullement de la température de l'air ambiant; mais elle restera toujours à zéro de température; c'est-à-dire, à la glace fondante, jusqu'à ce que le dernier atome de glace soit fondu.

La raison de ce phénomène est facile à concevoir; il faut, pour fondre la glace & la réduire en eau, qu'il s'y combine une certaine quantité de calorique.

En conséquence, tout le calorique des corps environnans s'arrête à la surface de la glace, où il est employé à la fondre. Cette première couche fondue, la nouvelle quantité de calorique qui survient en fond une seconde, & elle se combine également avec elle, pour la convertir en eau, & ainsi successivement de couche en couche jusqu'au dernier atome de glace, qui sera encore à zéro du thermomètre, parce que le calorique n'aura pas encore pu y pénétrer.

Cue l'on imagine, d'après cela, une sphère de glace creuse, à la température de zéro du thermomètre; que l'on place cette sphère de glace dans une atmosphère dont la température soit, par exemple, de dix degrés au-dessus de la congélation, & qu'on place, dans son intérieur, un corps échauffé d'un nombre de degrés quelconque; il suit de ce qu'on vient d'exposer deux conséquences; 1°. que la chaleur extérieure ne pénétrera pas dans l'intérieur de la sphère; 2°. que la chaleur d'un corps placé dans son intérieur ne se perdra pas non plus au-dehors, mais qu'elle s'arrêtera à la surface intérieure de la cavité, où elle sera continuellement employée à fondre de nouvelles couches de glace, jusqu'à ce que la température du corps soit parvenue à zéro du thermomètre.

Si on recueille avec soin l'eau qui se fera formée dans l'intérieur de la sphère de glace, lorsque la température du corps placé dans son intérieur, sera parvenue à zéro du thermomètre, son poids sera exactement proportionnel à la quantité de calorique que ce corps aura perdue, en passant de température primitive à celle de la glace fondante; car il est clair qu'une quantité double de calorique, doit fondre une quantité double de glace; en sorte que la quantité de

glace fondue est une mesure très-précise de la quantité de calorique employée à produire cet état.

M. Lavoisier & Laplace, n'ont considéré ce qui se passoit dans une sphère de glace, que pour mieux faire entendre la méthode qu'ils ont employée dans leur expérience sur la capacité des corps pour contenir le calorique.

La fig. 8, (classe 4), représente le calorimètre vu en perspective. La fig. 9, (classe 4) représente la coupe horizontale, & la fig. 10, (classe 4), une coupe verticale qui laisse voir son intérieur. Sa capacité est divisée en trois parties, qui, pour être plus facilement entendues, sont distinguées par les noms de capacité intérieure, capacité moyenne, & capacité extérieure; la capacité intérieure *ffff*, fig. 10, (classe 4), est formée d'un grillage de fer, soutenu par quelques montans du même métal; c'est dans cette capacité que l'on place les corps soumis à l'expérience; sa partie supérieure *LM*, se ferme au moyen d'un couvercle *GH*, représenté séparément, fig. 11, (classe 4); il est entièrement ouvert par-dessus, & le dessous est formé par un grillage de fil de fer. La capacité moyenne *bbbb*, fig. 10, (classe 4), est destinée à contenir la glace qui doit environner la capacité intérieure & qui doit fondre par le calorique mis en expérience; cette glace est supportée & retenue par une grille *m n*, sous laquelle est un tamis de soie *n n*; l'un & l'autre, sont représentés séparément, fig. 12 & 13, (classe 4); à mesure que la glace est fondue par le calorique, qui se dégage du corps placé dans la capacité intérieure, l'eau coule à travers la grille & le tamis; elle tombe ensuite le long du cône *c c d*, fig. 9, (classe 4) & du tuyau *x y*, & se rassemble dans le vase *F*, fig. 15, bis, (classe 4), placé au-dessous de la machine; & c'est un robinet, au moyen duquel on peut arrêter l'écoulement de l'eau intérieure. Enfin, la capacité extérieure, *aaaa*, fig. 9, 10, (classe 4), est destinée à recevoir la glace qui doit éprouver l'effet de la chaleur de l'air extérieur & des corps environnans; l'eau que produit la fonte de cette glace, coule le long du tuyau *S T*, que l'on peut ouvrir ou fermer au moyen du robinet *r*. Tout le la machine est recouverte par le couvercle *FF*, fig. 11, (classe 4), entièrement ouvert dans la partie supérieure, & fermé dans la partie inférieure; elle est composée de fer-blanc, peint à l'huile, pour le garantir de la rouille.

Pour mettre le calorimètre en expérience, on remplit de glace pilée la capacité moyenne *bbbb*, & le couvercle *GH* de la capacité intérieure, la capacité extérieure *aaaa*, & le couvercle *FF*, fig. 10, (classe 4), de toute la machine; on la presse fortement, afin qu'il ne reste point de parties vides, puis on laisse égoutter la glace intérieure; alors on ouvre la machine, pour y placer

cer le corps que l'on veut mettre en expérience, & on la renferme sur-le-champ. On attend que le corps soit entièrement refroidi, & que la glace qui a fondu soit successivement égouttée, ensuite on pèse l'eau qui s'est rassemblée dans le vase F, *figure 15 bis*, (classe 4.) Son poids est une mesure exacte de la quantité de calorique dégagée du corps pendant qu'il s'est refroidi; car il est visible que ce corps est dans la même position que celui qui a été supposé au centre d'une sphère de glace pure, puisque tout le calorique qui s'en dégage est arrêté par la glace intérieure, & que cette glace est garantie de l'impression de toute autre chaleur par la glace renfermée dans le couvercle & dans la capacité extérieure.

Les expériences de ce genre durent quinze à vingt heures; quelquefois pour accélérer, on place de la glace bien égouttée dans la capacité intérieure, & on en couvre les corps que l'on veut refroidir.

La *figure 15* (classe 4) représente un sceau de tôle, destiné à recevoir les corps sur lesquels on veut opérer; il est garni d'un couvercle traversé par le tube d'un petit thermomètre, dont la boule & une partie du tube plonge dans la liqueur. Il faut se servir de semblables matras toutes les fois que l'on opère sur des acides, & en général sur les substances qui peuvent avoir quelque action sur les métaux. R. S., *figure 16* (classe 4) est un petit cylindre creux, que l'on place au fond de la capacité intérieure pour soutenir le matras.

Il est essentiel que, dans cette machine, il n'y ait aucune communication entre la capacité moyenne & la capacité extérieure, ce que l'on éprouvera facilement en emplissant d'eau la capacité extérieure. S'il existoit une communication entre ces deux capacités, la glace fondue par l'atmosphère, dont la chaleur agit sur l'enveloppe de la capacité extérieure, pourroit passer dans la capacité moyenne, & alors l'eau qui s'écouleroit de cette dernière capacité, ne seroit plus la mesure du calorique perdu par le corps mis en expérience.

Lorsque la température de l'atmosphère n'est que de quelques degrés au-dessus de zéro, la chaleur ne peut que difficilement parvenir jusque dans la capacité moyenne, puisqu'elle est arrêtée par la glace du couvercle & de la capacité extérieure. Mais si la température extérieure étoit au-dessous de zéro, l'atmosphère pourroit refroidir la glace intérieure; il est donc essentiel d'opérer dans une atmosphère dont la température ne soit pas au-dessous de zéro. Ainsi dans un temps de gelée, il faudra renfermer la machine dans un appartement, dont on aura soin de chauffer l'intérieur; il est encore nécessaire que la glace dont on fait usage, ne soit pas au-dessous de zéro; si elle

Chimie, Tome II.

étoit dans ce cas, il faudroit la piler, l'étendre par couches fort minces, & la tenir encore pendant quelque temps dans un lieu où la température fût au-dessus de zéro.

La glace intérieure retient toujours une petite quantité d'eau qui adhère à sa surface, & l'on pourroit croire que cette eau doit entrer dans les expériences; mais il faut observer qu'au commencement de chaque expérience, la glace est déjà imbibée de toute la quantité qu'elle peut retenir, en sorte que si une petite partie de la glace fondue par le corps, reste adhérente à la surface de la glace intérieure, la même quantité, à très-peu près d'eau primitivement adhérente à la surface de la glace, doit s'en détacher & couler dans le vase; car la surface de la glace intérieure change extrêmement dans l'expérience.

Quelques précautions qu'ils aient pris, il leur a été impossible d'empêcher l'air extérieur d'entrer dans la capacité intérieure, lorsque la température étoit à neuf ou dix degrés au-dessus de la congélation. L'air renfermé dans cette capacité étoit alors spécifiquement plus lourd que l'air extérieur, il s'écoule par le tuyau xy, *figure 9*, (classe 4), & il est remplacé par l'air extérieur qui entre dans le calorimètre, & qui dépose une partie de son calorique sur la glace extérieure. Il s'établit ainsi dans la machine un courant d'air d'autant plus rapide, que la température extérieure est plus élevée, ce qui fond continuellement une portion de la glace extérieure. On peut arrêter en grande partie l'effet de ce courant, en fermant le robinet; mais il vaut beaucoup mieux n'opérer que lorsque la température extérieure ne surpasse pas trois ou quatre degrés; car ces messieurs ont observé, qu'alors la fonte de la glace extérieure occasionnée par l'atmosphère, est insensible, en sorte qu'ils peuvent répondre à cette température de l'exactitude de leurs expériences sur les chaleurs spécifiques des corps.

Ils ont fait construire deux machines pareilles à celles qui ont été décrites, l'une d'elles est destinée aux expériences dans lesquelles il n'est pas nécessaire de renouveler l'air; l'autre machine sert aux expériences dans lesquelles le renouvellement de l'air est indispensable, telles que celles de la combustion & de la respiration. Cette seconde machine ne diffère de la première qu'en ce que les deux couvercles sont percés de deux trous à travers lesquels passent deux petits tuyaux qui servent de communication entre l'air intérieur & l'air extérieur. On peut, par leur moyen, souffler de l'air atmosphérique dans l'intérieur du calorimètre, pour y entretenir les combustions.

Rien n'est plus simple, disent-ils, que de déterminer les phénomènes qui ont lieu dans les opé-

T t t

rations où il y a dégagement ou même absorption de calorique.

Vient on connoître ce qui se dégage de calorique d'un corps solide qui se refroidit d'un certain nombre de degrés ? On élève sa température à quatre-vingt degrés, par exemple ; puis on le place dans la capacité intérieure du *ffff* du calorimètre, figure 12, *et. 4.*, & on l'y laisse assez long-temps être pour assuré que la température est revenue à zéro du thermomètre : on recueille l'eau qui a été produite par la fonte de la glace pendant le refroidissement du corps ; cette quantité d'eau divisée par le produit de la masse du corps, & du nombre de degrés dont la température primitive étoit au-dessus de zéro, sera proportionnelle à ce que les physiciens appellent chaleur spécifique.

Quant aux fluides, on les renferme dans des vases de matières quelconques, dont on a préalablement déterminé la chaleur spécifique ou la capacité, pour contenir la calorique entre ses molécules ; on opère ensuite de la même manière que pour les solides, en observant seulement de déduire de la quantité totale d'eau qui a coulé, celle due au refroidissement du vase qui contenoit la liqueur.

Si l'on veut connoître la quantité de calorique qui se dégage de la combinaison de plusieurs substances, on les amène toutes à la température de zéro, en les tenant un temps suffisant dans la glace pilée, ensuite on en fera le mélange dans l'intérieur du calorimètre dans un vase également à zéro, & en aura soin de les y conserver jusqu'à ce qu'elles soient revenues à la température de zéro. La quantité d'eau recueillie sera la mesure du calorique dégagé pendant la combinaison.

La détermination des quantités de calorique qui se dégagent dans les combustions & dans la respiration des animaux, n'offre pas plus de difficulté. On brûle les corps combustibles dans la capacité intérieure du calorimètre ; on y laisse respirer les animaux, tels que des cochons d'Inde qui résistent assez bien au froid, & on recueille l'eau qui coule ; mais le renouvellement d'air est indispensable dans ce genre d'opérations ; il est nécessaire de faire arriver continuellement de nouvel air dans l'intérieur du calorimètre par un petit tuyau destiné à cet objet, & de le faire sortir par un autre tuyau ; mais pour que l'introduction de cet air ne cause aucune erreur dans les résultats, on fait passer le tuyau qui doit l'amener à travers de la glace pilée, afin qu'il arrive dans le calorimètre à la température de zéro.

Le tuyau de sortie de l'air doit aussi traverser la glace pilée ; mais cette dernière portion de glace fondue doit être comprise dans l'intérieur de la capacité *ffff* du calorimètre, & l'eau qui en découle doit faire partie de celle que l'on

recueille, parce que l'air, avant de sortir, fait partie du produit de l'expérience.

La recherche de la quantité de calorique spécifique contenue dans les différens gaz, est un peu plus difficile à cause de leur grande division ; car si on se contentoit de les renfermer dans des vases comme les autres fluides, la quantité de glace fondue seroit si peu considérable, que le résultat de l'expérience seroit au moins très-incertain.

MM. Lavoisier & Laplace ont employé pour ce genre d'expérience deux espèces de serpents, ou tuyaux métalliques, roulés en spirales. Le premier contenu dans un vase rempli d'eau bouillante, seroit à échauffer l'air avant qu'il parvint au calorimètre ; le second tuyau étoit renfermé dans la capacité intérieure *ffff* de cet instrument. Un thermomètre adapté à une des extrémités de ce dernier serpent, indiquoit la chaleur du gaz qui entroit dans la machine ; un thermomètre adapté à l'autre extrémité du même serpent, annonçoit la température de l'air qui en sortoit.

Ils ont pu ainsi déterminer ce qu'une masse quelconque de gaz feroit de glace en se refroidissant d'un certain nombre de degrés, & en déterminant la capacité pour le calorique, depuis tel degré jusqu'à tel autre. Le même procédé, avec quelques précautions particulières, peut être employé pour connoître la quantité de calorique qui se dégage pendant la condensation des vapeurs de différens liquides.

Les expériences que l'on fait avec le calorimètre ne donnent point de résultats absolus ; elles n'établissent que les relations qui existent entre les corps. Il étoit donc nécessaire de prendre une unité pour former le premier degré d'une échelle, avec laquelle on pût exprimer tous les autres résultats. La quantité de calorique nécessaire pour fondre une livre de glace, a fourni à MM. Lavoisier & Laplace cette unité. Or, disent ils, pour fondre une livre de glace, il faut une livre d'eau élevée à soixante degrés du thermomètre à mercure divisé en quatre-vingt parties de la glace à l'eau bouillante. La quantité de calorique qu'on exprime notre unité, est donc celle qui est nécessaire pour élever l'eau de zéro à soixante degrés.

Cette unité déterminée, il n'est plus question que d'exprimer en valeurs analogues, les quantités de calorique qui se dégagent des différens corps en se refroidissant d'un certain nombre de degrés, & voici le calcul simple que ces mesures ont fait point y parvenir.

Ils ont pris des morceaux de tôles coupés par bandes & toulus, qui pesoient ensemble sept livres onces onces deux gros trente-six grains, c'est-à-dire, en fraction, dixièmes de livres,

7 liv., 7070319. Ils ont échauffé cette masse dans un bain d'eau bouillante, dans laquelle elle a pris environ soixante-dix-huit degrés de chaleur, & l'ayant retirée de l'eau très-promptement, ils l'ont introduite dans la capacité intérieure du calorimètre. Au bout de onze heures, lorsque l'eau produite par la fonte de la glace intérieure a été suffisamment égouttée, la quantité en étoit d'une livre une once cinq gros quatre grains = 1,109795. Alors, ils disent si le calorique dégagé de la toile par un refroidissement de soixante-dix-huit degrés a fondu 1,109795 de glace, combien un refroidissement de soixante-degrees en auroit-il fondu? ce qui donne $78 : 1,109795 :: 60 : x = 0,85369$. Enfin, divisant cette quantité par le nombre de livres de toile employée, c'est-à-dire, par 7 liv., 7070319, on aura pour la quantité de glace fondue par une livre de toile en se refroidissant de soixante degrés à zéro, 0,10770. Le même calcul peut s'appliquer à tous les corps solides.

A l'égard des corps liquides, tels que l'acide sulfurique, l'acide nitrique, on les renferme dans un matras représenté figure 14, bis, (classe 4), il est bouché avec un bouchon de liège, traversé par un thermomètre, dont la boule plonge dans la liqueur. On place ce vaisseau dans un bain d'eau bouillante, & lorsque la liqueur est élevée au degré convenable, on retire le matras, & on le place dans le calorimètre. On fait le calcul comme ci-dessus, en ayant soin, cependant, de déduire de la quantité d'eau obtenue, celle que le verre auroit seule produite, & qu'il est nécessaire d'avoir déterminé par une expérience préalable.

Cet instrument de MM. Lavoisier & Laplace, est beaucoup plus simple & plus exact que le thermomètre dont le docteur Crawford s'est servi pour déterminer le calorique spécifique des corps. Il n'est pas sujet aux mêmes erreurs, & ne demande, par conséquent, pas autant de précautions. (M. VAUQUELIN.)

CALORIQUE. Depuis que les physiciens ont reconnu la nécessité de distinguer la chaleur qui n'est qu'une sensation d'avec le corps qui la produit ou qui la fait naître, ils ont senti la nécessité de donner à ce corps une dénomination particulière & distincte. C'est pour remplir cet objet que les chimistes qui ont travaillé à la nomenclature moderne, ont proposé en 1785, le mot *calorique*, qui a été depuis presque généralement adopté. En ne confondant plus ces deux noms l'un avec l'autre, on renverra au mot *chaleur* tout ce qui peut regarder la sensation, & l'on traitera ici ce qui appartient aux effets du corps qui la produit, & ce qui peut servir conséquemment à faire connoître les propriétés du calorique.

Il n'est plus douteux aujourd'hui que le calorique est un corps particulier, différent de tous

les autres, obéissant à des attractions particulières, faisant partie constituante d'un grand nombre de composés, leur donnant en général la liquidité, l'état gazeux, & produisant beaucoup de phénomènes remarquables par ses attractions. Sa présence, lorsqu'il est en liberté, s'annonce par le sentiment de la chaleur, & fait naître chez tous les hommes qui l'éprouvent, l'idée du feu. On ne peut démontrer la présence du calorique par sa pesanteur; aucun instrument humain n'a assez de délicatesse ou de sensibilité pour cela; mais de ce qu'on ne peut pas le peser, on ne faut pas en conclure qu'il est sans pesanteur, comme quelques physiciens l'ont dit; il semble au contraire, que les loix qu'il suit dans sa communication, & les phénomènes qu'il présente en obéissant à des attractions particulières, dérivent absolument de sa gravitation.

Les principales propriétés du calorique, sont de pénétrer tous les corps, de se répandre uniformément, & de tendre à l'équilibre ou dilater les diverses substances qu'il pénètre, de les faire passer de l'état solide à celui de liquides, & de celui-ci à l'état de fluides élastiques.

Le calorique se communique en général aux corps de trois manières, ou par le contact d'un corps chaud, ou par le mouvement, ou par l'acte de la combinaison. Il n'y a personne qui n'ait observé qu'en mêlant deux fluides d'une température différente, l'un sensiblement chaud & l'autre froid, le premier perd ce qu'il communique au second, & la température devient égale entre les deux; de même, on sait qu'en approchant un corps solide échauffé d'un autre corps solide froid, celui-ci enlève au premier une partie de son calorique, & tous les deux prennent une température uniforme. Quant au développement du calorique par le mouvement, la friction opérée entre deux corps solides, tels que des pierres dures, des morceaux de bois, d'ivoire, des matières métalliques, produit une chaleur qui va souvent jusqu'à l'inflammation, comme tout le monde le sait. Le développement du calorique par l'acte de la combinaison n'est pas plus équivoque; l'union des acides concentrés avec l'eau, la chaux-vive, les alcalis purs, les métaux, en produit une très-forte, & elle va jusqu'à l'inflammation entre certains fluides, tels que l'acide du nitre & les huiles, &c. &c.

Les loix que suit le calorique en se communiquant d'un corps à l'autre, étoient regardées en physique comme analogues à celles du mouvement, avant les travaux de MM. Walke à Stockholm, Irwine à Glasgow, Crawford & Kirwan à Londres, Lavoisier & Laplace à Paris. Ces savants ont fait voir, par leurs recherches, que rien n'étoit moins connu & plus difficile à connoître que la progression & la communication du calorique dans des systèmes de corps inégalement échauffés. Leurs expériences,

d'ailleurs très-ingénieuses, ne sont point encore assez multipliées, & ils comptent eux-mêmes encore trop peu sur leurs résultats généraux, pour qu'il soit possible de les regarder comme faisant une suite de principes applicables aux élémens de la science chimique. Il est cependant vraisemblable qu'elles conduiront à une théorie générale applicable à tous les phénomènes de la chimie, puisqu'il n'en est aucun dans lesquels elle ne joue un rôle, soit par son absorption, soit par son dégagement.

Les travaux les plus exacts & les plus délicats n'ont encore pu rien apprendre de positif sur la nature du calorique, & les chimistes sont partagés, ainsi que les physiciens, sur cet objet important. Les uns avec Bacon de Vérolam, pensent que la *chaleur* n'est qu'une modification dont tous les corps naturels sont susceptibles, qu'elle n'existe point par elle-même, & qu'elle ne consiste que dans l'oscillation des petites molécules qui composent le tissu de tous les êtres. Telle étoit l'opinion adoptée par Macquer. Ces savans appuyent leur théorie sur les faits suivans. La *chaleur* suit tous les phénomènes du mouvement, & paraît obéir aux mêmes loix; elle l'accompagne constamment, augmente avec lui, & diminue en même proportion. Si l'on en excepte les différences qu'elle présente dans sa communication, ou son passage de corps à corps, qui ne suit pas des loix semblables à celles du mouvement, elle offre une analogie frappante avec lui dans toutes ses autres propriétés; lorsque la cause qui la produit se ralentit ou cesse entièrement, la *chaleur* diminue & se dissipe bientôt. Pour faire concevoir cette hypothèse, les physiciens qui l'ont proposée, observent que les corps même les plus denses, sont remplis d'une grande quantité de petites cavités ou de pores, dont le volume peut être beaucoup plus grand que celui de la substance qu'ils environnent & qu'ils renferment. Ces vides permettent à leurs molécules de se mouvoir les unes sur les autres, d'osciller dans tous les sens. Si ces oscillations ne sont point aperçues, c'est qu'elles se font sur des parties extrêmement fines qui échappent à nos sens, comme les vides ou pores y échappent eux-mêmes. Enfin, les savans qui regardent la *chaleur* comme l'effet d'un mouvement intestin, font encore fondés sur ce qu'aucune expérience positive ne démontre son existence, sur ce qu'on n'a pu y reconnaître aucune pesanteur, &c.

Plusieurs autres physiciens & quelques chimistes modernes, croient au contraire que le calorique est un fluide particulier répandu dans tous les corps de la nature, & dont ils sont pénétrés avec plus ou moins d'énergie; ils distinguent ce fluide dans deux états, dans celui de combinaison & dans celui de liberté. Le premier, le calorique combiné, n'est pas sensible à nos organes, ni au thermomètre; il repose dans les

corps dont il constitue un des principes; il y est dans un état de compression plus ou moins considérable; il se dégage souvent dans la décomposition, & alors il passe à l'état de calorique libre ou de chaleur; il devient susceptible d'agir sur les corps placés dans son atmosphère; le thermomètre peut en mesurer jusqu'à un certain point l'intensité, & en indiquer les degrés. Comme tous les corps qui passent de l'état solide à l'état fluide, & de ce dernier à celui de vapeurs, excitent du froid dans l'atmosphère environnante, ils soupçonnent qu'il y a une grande quantité de calorique absorbé par ces corps, & que lorsqu'on contraire les substances qui de fluides deviennent concrètes, produisent de la chaleur, le calorique est dégagé de ces substances, & passe de l'état de combinaison à celui de liberté.

Schéele, persuadé, ainsi que Berzeman, que le calorique est un corps existant par lui-même, a examiné avec beaucoup de soin, les phénomènes qu'il présente comme agent chimique & comme susceptible de combinaison. Il a cru même pouvoir conclure de ses expériences, qu'il est un composé d'air vital, qu'il appelle *air du feu*, & de feu fixe ou *phlogistique*; qu'il ne diffère de la lumière que par la quantité relative de ce dernier principe: mais quelques ingénieuses & quelques vraies que soient en elles-mêmes les recherches auxquelles il s'est livré, les inductions qu'il en a tirées sur la nature & les principes du calorique ne nous ont point paru en découler naturellement, & nous ne pensons pas qu'on puisse regarder son analyse du calorique comme démontrée. Quelques physiciens croient que la lumière & le calorique sont un même corps, & ne diffèrent que par leur état. Ce corps est lumière, lorsque ses molécules rassemblées & jouissant de toute leur attraction, sont lancées avec beaucoup de force; il est *chaleur*, lorsque ces mêmes molécules divisées se meuvent lentement & tendent à l'équilibre. Ils croient que la *chaleur* peut devenir lumière, & la lumière *chaleur*; cependant on ne peut se dissimuler que la lumière ne produise souvent des effets très-différens de ceux du calorique, comme cela a lieu dans l'acide nitrique, l'acide muriatique oxygéné, les oxides métalliques, les feuilles des végétaux plongées dans l'eau; tous ces corps donnent de l'air vital ou du gaz oxygène, lorsqu'ils sont exposés aux rayons du soleil, & la plupart n'en donnent pas par la seule action du calorique. C'est ainsi que la lumière artificielle de nos feux venant à traverser les vaisseaux, change la nature des produits qui s'en dégagent.

Enfin, MM. Lavoisier & Laplace semblent soupçonner que les deux hypothèses sur le calorique, sont vraies & ont lieu en même temps; c'est-à-dire, que la *chaleur* est due à l'existence d'un corps particulier, & aux oscilla-

tions intestines des corps excitées par la présence du calorique.

Quelle que soit au reste la nature de ce corps, les phénomènes qu'il présente dans les combinaisons & les décompositions chimiques, n'en font pas moins certains, & ne doivent pas moins être observés avec soin. Un grand nombre de faits ont démontré que ce corps ou cette modification est inaltérable en elle-même, qu'elle ne se perd point, & c'est ce qui a porté MM. Lavoisier & Laplace à présenter un axiome ou un principe général sur son apparition ou sa disparition. Comme ce principe est de la plus grande importance pour la théorie chimique, nous croyons devoir le rapporter ici.

« Si dans une combinaison ou dans un changement d'état quelconque, il y a une diminution de *chaleur libre*, cette *chaleur* reparoîtra toute entière, lorsque les substances reviennent à leur premier état; & réciproquement, si dans la combinaison ou le changement d'état, il y a une augmentation de *chaleur libre*, cette nouvelle *chaleur* disparaîtra dans le retour des substances à leur état primitif ».

En généralisant encore plus ce principe, & en l'étendant à tous les phénomènes du calorique, ils l'ont exposé de la manière suivante. « Toutes les variations de *chaleur*, soit réelles, soit apparentes, qu'éprouvent un système de corps, en changeant d'état, se reproduisent dans un ordre inverse, lorsque le système revient à son premier état ».

Pour mesurer la quantité de calorique absorbée ou dégagée dans les différens phénomènes chimiques, mesure qui devient aujourd'hui de la plus grande importance d'après ce que nous avons exposé, les physiciens modernes ont cherché des moyens capables de suppléer aux thermomètres dont les échelles n'ont point l'étendue convenable, & dont la marche n'est pas aussi certaine qu'on l'avoit cru d'abord. M. Wilke avoit proposé d'employer la fonte de la neige par les corps dont il vouloit connoître la quantité de calorique; mais MM. Lavoisier & Laplace, ont trouvé une méthode plus sûre & plus facile à pratiquer. Elle consiste en général à exposer les corps qui dégagent du calorique pendant leur combinaison, après les avoir réduits, ainsi que le vase qui les renferme, à la température de 0, dans un vaisseau entouré de glace, dont la couche intérieure ne peut être fondue que par le calorique dégagé de ces corps pendant leur union, & à mesurer la quantité de ce calorique, par celle de l'eau fondue & recueillie avec soin. Ils sont aussi parvenus par ce procédé à connoître sûrement le calorique spécifique des corps, à mesurer celui qui

est absorbé dans certaines combinaisons, & enfin à déterminer jusqu'à celui qui se dégage dans la combustion & la respiration. La précision que nous nous sommes imposée, & les longs détails qu'il seroit nécessaire de donner ici pour faire connoître l'instrument ingénieux imaginé par ces deux savans, & la manière dont ils s'en servent pour déterminer le calorique spécifique des corps, ainsi que celui qui est absorbé ou dégagé dans les combinaisons chimiques, nous forcent de renvoyer à leur ouvrage même (1).

Arrêtons-nous encore ici sur le rapport qui paroît exister dans quelques cas entre la lumière & le calorique, & sur les différences que les caractérisent dans les procédés de la nature & de l'art. De ce que la lumière des rayons du soleil échauffe les corps qu'elle frappe, on ne doit pas en conclure que la lumière & le calorique soient une seule & même substance; comme il existe au contraire un grand nombre de cas dans lesquels il y a beaucoup de lumière sans calorique, ainsi que de ceux où l'on rencontre beaucoup de calorique sans lumière, plusieurs physiciens croyent que la lumière diffère beaucoup du calorique. En effet, les phosphores, le diamant, le bois pourri, les matières animales en putréfaction, les insectes & les lumineux, les rayons de la lune réfléchis & concentrés par les miroirs métalliques & les lentilles, offrent une lumière très-vive & très-éclatante, sans présenter de calorique sensible; & tous les corps naturels peuvent être fortement échauffés sans devenir lumineux.

Les rayons solaires ne paroissent produire du calorique libre, que par la percussion des corps sur lesquels ils sont reçus, & par le frottement qu'ils éprouvent de la part de ceux qui s'opposent à leur passage. Si les corps opaques colorés en rouge & particulièrement en noir, s'échauffent plus & sur-tout plus vite que les surfaces blanches & brillantes, c'est sans doute parce que les rayons éprouvent des réfractions plus fortes, & peut-être même parce qu'ils se combinent avec la substance même de ces corps très-colorés, tandis que les surfaces blanches les réfléchissent plutôt que de les absorber.

Quant à la production de la lumière par l'action du calorique forte & continuée, comme on l'observe dans la combustion des huiles, des bois, des graisses, dans l'incandescence des métaux, des pierres, elle tient encore à des causes qui ne supposent en aucune manière une identité entre la lumière & le calorique. Lorsqu'on chauffe fortement les corps combustibles, ils finissent par produire de la flamme qui supplée à l'absence des rayons du soleil, & donne naissance aux mêmes effets. Mais cette lumière, le pro-

(1) Voyez mémoire sur la *chaleur*, lu à l'académie des sciences, le 28 july 1783, par MM. Lavoisier & Laplace.

duit de l'inflammation, pouvoit être contenue, ou dans le corps combustible, ou dans l'air dont la présence est nécessaire à la production, & rien ne démontre que c'est le calorique qui se change en lumière. L'incandescence des corps incom bustibles, tels que les pierres dans lesquelles on ne peut point admettre la présence de la lumière combinée, au moins comme dans les corps combustibles, a été expliquée d'une manière très-ingénieuse par Macquer. Suivant ce chimiste, elle dépend des vibrations fortes, excitées dans les molécules de ces corps par le calorique; ces vibrations disposent les particules, de sorte que leurs facettes sans cesse agitées, sont comme autant de petits miroirs qui réfléchissent & lancent directement vers nos yeux les rayons de lumière qui existent dans l'air pendant la nuit autant que pendant le jour, & qui ne sont insensibles & ne produisent les ténèbres que parce que leur direction ne se fait pas sur les organes de la vue. Telles étoient les idées de Macquer & d'un assez grand nombre de physiciens; mais des faits mieux observés & plus nombreux, sur la différence du calorique contenu dans chaque corps, sur leur aptitude à l'absorber, sur les attractions élastiques auxquelles il paroît obéir, rendent l'opinion de l'existence du calorique comme corps particulier, beaucoup plus forte que jamais. On pense qu'il est souvent un des principes des corps composés; que c'est le plus léger de tous les corps naturels, & que c'est pour cela qu'on ne peut pas en reconnoître l'existence par la pesanteur. On distingue le calorique en deux états différens, dans toutes les substances naturelles; l'un qui est intimement combiné, & qu'on appelloit d'abord *chaleur latente*, parce qu'il n'y est pas sensible comme chaleur, l'autre qui est simplement dissimulé, c'est le calorique interposé; celui-ci peut en être chassé par la seule pression ou par des moyens mécaniques; c'est ainsi que lorsqu'on frappe une barre de fer, & qu'on rapproche les molécules par le choc, le calorique s'en échappe, comme l'eau sort d'une éponge humide que l'on presse. Le calorique vraiment combiné ne sort des corps que par de nouvelles combinaisons chimiques. Toutes les matières solides qui contiennent ces deux portions de calorique, peuvent prendre une plus grande quantité de l'une & de l'autre; celle qu'on y ajoute en écarte de plus en plus les molécules; son premier effet est le ramollissement du corps solide; son second, à mesure qu'elle s'accumule, est la fusion ou la liquéfaction; son troisième, toujours lorsque la quantité augmente, est la fluidité élastique; nous allons successivement traiter de ces phénomènes.

L'effet le plus frappant que les physiciens attribuent au feu, & qui est constamment produit par le calorique, est la raréfaction. Nous

avons déjà fait remarquer que la principale action du calorique étoit d'augmenter le volume de tous les corps, sans augmenter leur pesanteur absolue, de diminuer au contraire leur pesanteur spécifique. Cette raréfaction indique l'intermision d'une substance quelconque dans les petites cavités des corps raréfiés; cette substance qui est le calorique lui-même, agit comme des coins ou des ressorts qui séparent & éloignent les molécules de ces corps. Si ceux-ci, lorsqu'ils sont raréfiés, n'ont pas acquis plus de poids, & si leur pesanteur spécifique est moins considérable qu'auparavant, c'est que la raréfaction ne consiste que dans un simple écartement des parties du corps chaud, dont les pores sont alors agrandis, de manière qu'il contient plus de vide & moins de parties solides qu'auparavant dans une espace donné, cet écartement est dû à la matière du calorique, dont le poids est nul pour nous.

Si l'on considère que les corps raréfiés par le calorique, éprouvent dans leurs molécules un mouvement intellin qui tend à les déjoindre & à les séparer les unes des autres, & que le froid au contraire, les rapproche & les rassemble les unes contre les autres, on sera convaincu que l'échauffement ou la raréfaction est une force opposée à la gravitation des parties des corps les unes sur les autres, & qu'elle détruit leur attraction particulière; car il est nécessaire d'observer que l'attraction a trois modifications, pour ainsi dire, ou trois manières d'être, qui méritent d'être bien distinguées les unes des autres. Le premier état de l'attraction constitue celle qui, combinée avec une première impulsion préexistante, retient les planètes dans leurs orbites, & les empêche de s'écarter du soleil vers lequel elles se précipiteroient sans la force centrifuge imprimée par l'impulsion supposée: on pourroit appeler cette première *attraction planétaire*, pour la distinguer des deux autres. Le second état, ou la seconde modification de l'attraction, comprend celle qui fait tendre les corps plongés dans l'atmosphère de notre globe vers son centre; c'est la *gravitation terrestre*. Enfin, la troisième modification de cette force générale appartient à celle par laquelle les diverses parties d'un corps particulier, d'une pierre, ou de toute autre substance compacte, pressent sur leur centre; cette dernière donne naissance à l'aggrégation; les différens états ou degrés produisent la *pesanteur spécifique*; c'est celle-ci que le calorique diminue & tend à détruire, & c'est en la diminuant, qu'elle opère un grand nombre d'effets qui entretiennent les combinaisons, les décompositions, la végétation, l'animalisation, &c.

Boerhaave, qui a considéré les effets du feu plutôt en physicien qu'en chimiste, a établi sur la raréfaction prise en général, trois loix que nous allons examiner.

PREMIÈRE LOI.

Tous les corps sont dilates par le calorique.

Quoiqu'il soit vrai en général que presque tous les corps de la nature sont dilates & rarefies par le calorique, il est cependant nécessaire de faire quelques remarques sur ce phénomène. Premièrement, toutes les substances minérales sans exception éprouvent une dilatation & une rarefaction d'autant plus grandes, que le calorique qu'on y introduit est plus abondant.

Cette rarefaction va même jusqu'à détruire entièrement l'aggrégation d'un grand nombre d'entrailles; mais si l'on applique certe loi aux matières végétales & animales, elle paroît souffrir quelques exceptions. En effet, une petite quantité de calorique dilate à la vérité leurs fibres, les écarte & diminue la densité de leur tissu, mais par une chaleur brusque & forte, ou l'introduction prompte d'une grande quantité de calorique, le parchemin, les membranes, les tendons se retirent, se resserrent sur eux-mêmes; propriété qui paroît tenir à l'irritabilité, ou plutôt à la contractilité des fibres animales, pour lesquelles le calorique semble être un stimulus, tant que leur organisation n'est pas détruite.

SECONDE LOI.

Les corps rarefies par le calorique éprouvent une dilatation dans toutes leurs dimensions.

Une barre de fer chauffée augmente en longueur & en largeur. Les physiciens ont imaginé plusieurs instrumens pour connoître & pour mesurer même cet effet de la rarefaction. Le pyromètre, dont l'invention appartient à Muichenbroeck, annonce par le mouvement d'une aiguille sur un cadran, jusqu'à la mille quatre vingtième partie d'une ligne de dilatation dans les barres métalliques chauffées. Certe sensibilité est due à la réunion de plusieurs leviers plus longs les uns que les autres. Le dernier peut faire un assez grand chemin, pour mouvoir, à l'aide d'une roue ou d'un rateau, une aiguille dont la marche mesurée sur le cadran, indique les degrés les plus petits de l'allongement de la barre. Comme le pyromètre n'annonce que l'allongement des barres métalliques, les physiciens se servent d'un cylindre traversé par un anneau de métal quand l'un & l'autre sont froids; si l'on chauffe le cylindre, il ne peut plus passer à travers l'anneau, ce qui démontre que les corps sont dilates dans leur diamètre comme dans leur longueur.

C'est d'après ce phénomène très-connu des chimistes, qu'il est nécessaire de laisser du jeu aux grilles qui entrent dans les fourneaux, & de ne point trop serrer tous les vaisseaux qu'on lute ensemble; sans cette précaution, on ne

pourroit éviter les fissures ni les inconvéniens qui les accompagnent.

TROISIÈME LOI.

La dilatation a lieu en raison directe de la rareté ou inverse de la densité des corps.

Boerhaave, pour établir cette troisième loi, n'a comparé l'effet du calorique que sur trois corps solides très-différens les uns des autres, tels que du bois, une pierre & un métal; il avoit observé qu'en effet, le bois se dilatoit le plus, ensuite la pierre, puis le métal, & que la rarefaction ou l'écartement des molécules des corps suivoit leur densité; il en avoit conclu que plus le tissu des corps est rare, & plus ils se dilatent, & qu'au contraire, plus il est dense, moins ils se rarefient. Mais en répétant l'expérience de la rarefaction par le calorique sur un grand nombre de corps solides différens les uns des autres, l'usage a prouvé qu'ils sont dilates en raison de leur altérabilité par le calorique, c'est-à-dire, les pierres en raison de leur calcinabilité, & les métaux en raison de leur fusibilité. Boerhaave, qui avoit étendu cette loi jusqu'aux fluides, ne l'avoit établie que d'après la dilatation respective de l'air, de l'alcool & de l'eau. S'il avoit comparé la rarefaction du mercure à celle de ces premiers fluides, il n'auroit pas généralisé cette loi comme il l'a fait, puisqu'une certaine matière métallique, beaucoup plus dense que l'alcool & l'eau, se dilate spécifiquement plus que ces deux fluides. Cette expérience prouve que ce n'est ni l'inflammabilité, ni la fusibilité des fluides qui déterminent les degrés ou la vitesse de leur rarefaction par le calorique. MM. Lavoisier & Laplace, qui ont fait une longue suite d'expériences sur la dilatation des fluides, & sur la marche de leur rarefaction par le calorique, n'ont pas pu trouver la cause de la diversité singulière qu'ils y ont observée; ils se sont contentés de la décrire sans en tirer de résultat.

Entre les loix de la rarefaction que le calorique produit, & qui ne sont pas encore, à beaucoup près, connues, il est essentiel de savoir, 1. que les corps, en passant de l'état solide à celui de fluidité, produisent toujours du froid en absorbant le calorique libre comme les sels en se dissolvant dans l'eau, l'éther qui s'évapore, &c. 2. Que les fluides susceptibles de passer à l'état concret, s'échauffent en devenant solides, & perdent du calorique; c'est pour cela que l'eau qui se gèle lorsqu'on la tient plongée dans un bain de glace, ne donne jamais un aussi grand degré de froid que l'alcool plongé dans le même bain; c'est pour cela que tous les liquides très-évaporables produisent du froid sur la peau.

Un des principaux effets du calorique étant de rarefier les corps, d'en augmenter le volu-

me en écartant leurs molécules, & d'en diminuer la pesanteur en agrandissant leurs pores, on reconnoît, en considérant cette première action du calorique avec plus de soin, qu'elle est suivie du plusieurs autres effets très-importans à bien apprécier.

La première & la plus frappante considération chimique qui se présente sur les effets du calorique introduit dans les corps, c'est qu'en écartant les molécules des corps, il diminue leur aggrégation. Comme la force d'aggrégation & l'attraction de composition sont toujours en raison inverse l'une de l'autre, ainsi que nous l'avons exposé dans le troisième chapitre, il est aisé de concevoir que le calorique favorise singulièrement la combinaison, en détruisant l'aggrégation. Cette propriété a fait regarder le feu comme le principal agent des chimistes, & ils se sont eux-mêmes qualifiés du titre de philosophes par le feu. On verra cependant par la suite qu'on s'en sert aujourd'hui beaucoup moins qu'on ne le faisoit autrefois.

L'action du calorique, considérée sous ce point de vue, c'est-à-dire, comme tendante à détruire l'aggrégation & à favoriser la combinaison, paroît être modifiée de quatre manières, suivant les corps sur lesquels il exerce sa puissance.

1°. Il est des corps qu'il n'altère en aucune façon, & qu'il ne fait que dilater. Les sublimés de cette nature sont inaltérables & *aptes* ; c'est ainsi que le cristal de roche exposé au feu le plus fort & le plus long-temps soutenu, n'éprouve aucune altération, ne perd rien de sa dureté, de sa transparence, & de sort de cette épreuve aussi beau qu'il étoit auparavant. Il n'y a que très-peu de matières aussi peu altérables que celle-là.

2°. Le calorique détruit entièrement l'aggrégation de beaucoup de corps, & les fait passer de l'état solide à l'état fluide. Ce phénomène se nomme *fusion* ; les corps qui l'éprouvent sont appelés *fusibles*. Il y a des degrés de fusibilité, depuis celle du platine qui est extrêmement difficile à fondre, jusqu'à celle du mercure qui est fluide jusqu'à — 32 de l'échelle de Réaumur. Cette fusibilité poussée à l'extrême, est la volatilisation. Un corps se volatilise ou se répand dans l'atmosphère, lorsque de l'état de liquide il passe, par une grande raréfaction, à celui de fluide élastique. Alors enervé & soulevé par son calorique, il s'élève dans l'air atmosphérique, & il y reste suspendu ou dissous, jusqu'à ce qu'il acquière plus de densité & de pesanteur par le froid. On nomme *volatils* les corps susceptibles de cette propriété. Ceux qui n'en jouissent point sont appelés *fixes* par opposition. Il y a beaucoup de degrés entre la fixité & la volatilité : il paroît même qu'on ne peut supposer aucun corps absolument fixe, & que plusieurs ne le paroissent que parce que nous n'avons pas de masse de calorique assez forte en notre pouvoir, pour leur faire

éprouver ce changement d'état. La même réflexion doit être faite sur l'infusibilité ; il n'en est point d'absolue. Si l'on ne parvient point à fondre le cristal de roche, c'est parce que nous ne pouvons point lui appliquer une assez grande masse de calorique. Lors donc que nous parlons de l'infusibilité ou de la fixité de certains corps, cela ne doit s'entendre que des propriétés relatives, en les considérant dans l'ensemble des êtres que nous connoissons, & relativement au feu qu'il est en notre pouvoir de produire. Car à mesure que nos moyens se perfectionnent, la liste des corps fusibles & volatils s'accroît, & celle des réfractaires diminue.

Il faut bien distinguer cette volatilité essentielle de celle qui n'est qu'apparente & qui n'a lieu qu'en raison du mouvement communiqué par le courant de la flamme ou des vapeurs ; c'est ainsi, par exemple, que le zinc oxidé est enlevé par la rapidité de la flamme excitée pendant la combustion.

3°. Lorsque le calorique agit sur des corps composés de deux principes, dont l'un est volatil & l'autre fixe, elle les sépare souvent en volatilisant le premier ; ces corps sont décomposés, mais sans altération, de sorte que l'on peut les recomposer ou les faire reparoître avec toutes leurs propriétés, en unissant les deux principes séparés ; cette séparation de principes constitue une analyse vraie ou simple. Le calorique appliqué aux corps composés de deux substances dont les propriétés sont très-différentes relativement à la volatilité, réduit en vapeurs celle qui est volatile, & laisse intacte celle qui est fixe. Mais pour que cette analyse vraie ait lieu, il faut que la substance volatile & la substance fixe du composé soient l'une ou l'autre également inaltérables par le calorique qu'on leur applique, ou qu'on ne leur donne que le degré de feu convenable pour ne point en changer entièrement les propriétés. Alors la matière volatilisée n'ayant pas subi plus d'altération que la substance fixe, on pourra les unir ensemble & reproduire le corps composé tel qu'il étoit avant sa décomposition ; ce qui indique que l'on a fait une analyse simple ou vraie. Comme il est rare qu'un corps ne soit composé que de deux substances, l'une volatile & l'autre fixe ; comme il est souvent très-difficile, & quelquefois même impossible, de n'appliquer que la masse de calorique pour volatiliser l'une sans altération, & laisser l'autre intacte, on conçoit que le nombre d.s corps sur lesquels le calorique agit de cette manière est très-petit. Telle est la raison pour laquelle les chimistes font aujourd'hui beaucoup moins de cas qu'autrefois de l'action du feu. Les substances sur lesquelles le calorique produit l'effet qui nous occupe sont *altérables sans altération*. Beaucoup de matières minérales, tels que des sels cristallins, des dissolutions de sels neutres, des alliages &

de des mines métalliques appartiennent à cette classe.

4°. Si les corps que l'on expose à l'action du calorique sont composés de plusieurs principes volatils & fixes, les principes volatils s'unissent ensemble, les fixes se combinent également entr'eux, & il résulte de cette opération une décomposition telle, que les produits réunis de nouveau avec les résidus, ne peuvent plus reformer les premiers composés. C'est alors une analyse fautive ou compliquée. Les corps sur lesquels le calorique agit de cette manière, sont *décomposables avec altération*.

Le plus grand nombre des substances naturelles sont de cette classe; leur ordre de composition est trop multiplié, elles sont composées d'un trop grand nombre de principes, pour que le calorique puisse en opérer la séparation sans les altérer. Comme la force d'affinité de composition existe dans tous les corps, comme elle est même favorisée par le calorique, à mesure que quelques principes d'un composé de cette nature sont volatilisés par l'action du feu, ils réagissent les uns sur les autres, ils s'unissent & forment un autre ordre de combinaison que celui qui existoit auparavant; la même union a lieu entre les principes fixes qui se combinent autrem. ne qu'ils ne l'étoient auparavant. C'est ainsi que lorsqu'on chauffe un bois, une écorce ou une matière végétale quelconque, le carbone qui en est un des principes décomposé une partie de l'eau qui y est contenue, & forme par des composés nouveaux de carbone, d'hydrogène & d'oxygène un acide, des fluides élastiques, une huile brune qui n'existeroit pas tels dans le bois, &c. Tout est donc altéré dans cette action du calorique; les phénomènes qu'elle présente annoncent donc une analyse fautive, compliquée, dont les résultats induiroient les chimistes en erreur, s'ils n'étoient prévenus de leur incertitude & de leur inutilité. Il est certain que l'art ne peut point reproduire le bois ou l'écorce traitée de cette manière, en mêlant ensemble le phlegme, l'huile, l'acide, le charbon obtenus dans cette analyse, & que les principes qu'elle fournit, ont subi de grandes altérations. Malheureusement les corps susceptibles d'être ainsi altérés par le feu, sont les plus nombreux de tous. Toutes les matières animales & végétales, une grande quantité de substances minérales appartiennent à cette classe; mais les découvertes nouvelles pourront être déterminées la vraie nature des principes qui constituent ces matières, d'après ceux qui se dégagent.

Nous n'avons parlé jusqu'ici des effets d'une chaleur forte, & de ceux qu'on s'attribue communément dans les différentes opérations. Mais une chaleur douce & long-temps continuée, dans les opérations de la chimie, a des effets si singuliers, qu'elle a été l'objet de plusieurs observations.

Chimie. Tome II.

la chimie doit apprécier. Les vibrations & les oscillations excitées par la présence dans les molécules solides des corps, la raréfaction & l'agitation produites dans leurs parties fluides, y entretiennent un mouvement intestin & continu, qui change peu-à-peu la forme, la dimension, le tissu des premières, & qui altère sensiblement la consistance, la couleur, la saveur, en un mot, la nature intime des secondes. Telle est l'idée générale qu'il faut se former de l'existence, & du pouvoir des phénomènes chimiques qui ont lieu dans les corps naturels, de la décomposition & de la recombinaison spontanées des minéraux, de la cristallisation, de la dissolution, de la formation des sels, de la vitrification, de la métallisation, de la vitrification, & de la métallisation qui ont lieu dans l'intérieur du globe. C'est à cet agent puissant qu'il faut également avoir recours pour concevoir les altérations physiques dont les corps des végétaux & des animaux sont susceptibles, le mouvement de la sève, la fermentation douce qui produit la maturation des fruits, la formation des huiles, de l'arôme, des mucilages, du principe colorant, la composition des humeurs animales, leur décomposition, leurs changements réciproques, la putréfaction. Tous ces grands phénomènes tiennent plus ou moins aux opérations chimiques, & le calorique repaît sur le globe y préside.

Ces effets si variés du calorique, étant dus à l'écartement qu'il produit entre les molécules, considérons encore ce premier effet, & tâchons d'en apprécier toute l'influence.

L'eau en glace est ramollie par une certaine quantité de calorique, fondue, & réchue coule par une plus grande quantité, & enfin plus fondue pour ainsi dire, ou réduite en vapeurs ou en fluide élastique, par une quantité encore plus grande; de sorte qu'on pourroit dire que la vapeur d'eau contient trois principes sommes de calorique; celle qui la constitue glace de telle densité, celle qui la met dans l'état de liquide à telle rarefaction, & enfin celle qui la tient fondue en fluide élastique.

En appliquant cette théorie générale à tous les corps de la nature, il n'en est aucun qu'on ne puisse concevoir susceptible de passer par tous ces états, à l'aide d'une quantité suffisante de calorique; & ils ne paroissent différer les uns des autres, qu'à l'égard de cette propriété, qu'en raison de la quantité de calorique nécessaire pour les mettre chacun dans cet état; ainsi, c'est la haute de calorique suffisante, qu'on ne peut ni fondre ni réduire en vapeurs le cristal de roche, & il n'est pas plus difficile d'en concevoir la possibilité, que ne l'est de concevoir que le fluide la plus inflammable d'hydrogène, comme l'air, peut être réduit en grande fluidité, comme cela lui arrive dans plusieurs combinaisons.

Il faut donc, pour apprécier les principes,

Y V V

la formation des fluides élastiques, qui se dégagent dans un grand nombre d'opérations de la nature & de l'art. Elle a lieu toutes les fois qu'un corps reçoit & absorbe assez de calorique pour passer à cet état de divibilité qui continue la fluidité aëriiforme. Tous les fluides qui jouissent de cette propriété, la doivent donc au calorique; mais il faut aussi que la pression des corps ambiants, & sur-tout de l'air, ne s'oppose pas à cette extrême dilatation, ou que celle-ci soit arrivée au point de vaincre l'obstacle que lui oppose la pesanteur de l'air. De-là, un corps plus ou moins voisin de la fluidité élastique, pourra y arriver tout-à-coup, si le poids ou la pression de l'atmosphère est soustraite, comme cela a lieu dans le vide. De-là l'évaporation plus forte & plus rapide sur les hautes montagnes. De-là la nécessité d'indiquer exactement dans le détail des expériences, à quelle pression tel corps a pris la forme de fluide élastique, ou laquelle au moins peut l'y maintenir; car on doit encore observer que tous les corps susceptibles de prendre plus ou moins facilement cette espèce de fluidité vaporeuse ou élastique, ne la conservent pas également, & qu'il existe, à cet égard, des différences si grandes entr'eux, qu'on les a distingués en permanens & non permanens. Les premiers restent fluides élastiques pendant très-long-temps, & jusqu'à ce qu'une combinaison leur enlève le calorique qui les tient dans cet état; les seconds, qu'on peut désigner par le nom de vapeurs, perdent la fluidité élastique par une pression ou par un refroidissement facile à déterminer, & se laissent enlever par tous les corps environnans le calorique qui les constituoit fluides aëriiformes. Tels sont l'eau, l'alcool & l'éther; ces trois fluides se réduisent en vapeurs, & conservent leur état aëriiforme, le baromètre étant à vingt-huit pouces, l'eau à quatre-vingt degrés du thermomètre de Réaumur, l'alcool à soixante-six, & l'éther à trente-deux, &c. On voit donc, 1°. que l'état de fluide élastique est une manière d'être des corps, due au calorique combiné; 2°. que tout fluide élastique est un composé d'une base plus ou moins solide, & de calorique; 3°. que chacune de ces bases exige plus ou moins de calorique pour être fondue en état de vapeur ou de fluide élastique, & que c'est sans doute en raison de ces propriétés, que tous les fluides élastiques présentent des différences dans leur pesanteur, leur ressort, &c.

M. Lavoisier a exposé cette théorie d'une manière très-lumineuse dans un mémoire imprimé parmi ceux de l'académie en 1777.

Quoique nous ayons distingué les fluides élastiques en permanens & non permanens, il faut observer que cette distinction n'existe point réellement dans la nature; qu'elle n'est relative qu'à l'état de chaleur & de pression moyennes que

nous avons dans nos climats, & sur le plus grand nombre des points de notre globe; & que si le froid & la pression étoient considérables, les fluides reconnus actuellement pour les plus permanens, cesseroient bientôt de l'être; ainsi, par une raison inverse, l'éther & l'alcool seroient des fluides élastiques permanens à une certaine hauteur de l'atmosphère ou à la température élevée de quelques climats situés sous l'équateur, &c.

Les diverses altérations que le calorique fait éprouver aux corps, sont employées par les chimistes, pour parvenir, soit à décomposer, soit à combiner les différens produits naturels. La première attention qu'ils doivent avoir, c'est de mesurer exactement les degrés de chaleur ou les quantités de calorique nécessaires pour opérer les changemens dont les matières qu'ils traitent sont susceptibles. Comme ils se sont servis jusqu'ici du thermomètre, malgré ses inconvéniens, ils en reconnoissent en général deux classes; la première comprend les degrés de chaleur au-dessous de l'eau bouillante, & la seconde renferme ceux qui sont au-dessus. L'échelle de Réaumur ou de Fahrenheit sert à distinguer les uns; quant aux autres, on ne les détermine que d'après la fusibilité connue de différentes substances.

Degrés de chaleur inférieurs à l'eau bouillante.

Le premier degré s'étend de cinq à dix au-dessus de zéro du thermomètre de Réaumur; cette température favorise la putréfaction, la végétation, l'évaporation lente, &c. On ne s'en sert point communément dans les opérations de chimie, parce qu'elle n'est pas assez considérable; elle a lieu cependant dans quelques macérations que l'on fait l'hiver. Elle est aussi utile pour la cristallisation des dissolutions salines, que l'on porte après une évaporation convenable, dans des lieux dont la température est de dix degrés, tels que les caves.

Le second degré, fixé à quinze jusqu'à vingt, continue à entretenir la putréfaction. Il excite la fermentation vineuse dans les liquides sucrés. Il facilite l'évaporation, la cristallisation lente. C'est celui qui règne ordinairement dans les pays tempérés. On le met en usage pour les macérations, les dissolutions salines, les fermentations, &c.

Le troisième degré s'étend de vingt-cinq à trente; la fermentation acide ou acéteuse s'établit dans les végétaux, l'exsiccation des plantes s'y pratique avec succès. On s'en sert pour quelques dissolutions salines & pour des fermentations.

Le quatrième degré, porté à quarante-cinq,

est appelé degré moyen de l'eau bouillante, c'est celui que prennent les vaisseaux appelés *bain-marie*, il désorganise les matières animales, évapore la partie la plus tenue des huiles volatiles, & sur-tout l'arôme. On l'emploie pour la distillation des matières végétales & animales dont on veut retirer le principe odorant & le phlegme.

La température de l'eau bouillante ou le quatre-vingtième degré, sert dans les décoctions, l'extraction des huiles volatiles, &c.

Degrés de chaleur au-dessus de l'eau bouillante.

Le premier degré rougit le verre, brûle les matières organiques, fond le soufre.

Le second degré fond les métaux mous, tels que le plomb, l'étain, le bismuth & les verres fusibles.

Le troisième degré produit la fusion des métaux d'une moyenne dureté, comme le zinc, l'antimoine, l'argent & l'or.

Le quatrième degré cuit la porcelaine, fond les métaux réfractaires, le cobalt, le cuivre, le fer, &c.

Le dernier degré & le plus fort de tous, existe dans le foyer du verre ardent. Cette température extrême calcine, brûle & vitrifie en un instant tous les corps qui en sont susceptibles. On excite une *chaleur* semblable, en versant sur un charbon de l'air vital ou gaz oxygène, à l'aide d'un soufflet ou d'un chalumeau. M. Monge pense qu'en présentant aux corps combustibles enflammés dans les fourneaux, de l'air atmosphérique comprimé, on produira un effet semblable à celui qu'excite l'air vital. Ce procédé est déjà appliqué aux travaux en grand, par l'usage des soufflers; mais il est susceptible d'un grand perfectionnement.

Quoique ces degrés, supérieurs à celui de l'eau bouillante, soient déterminés par des phénomènes bien connus des chimistes, leur mesure n'a cependant pas toute la précision qu'on peut y désirer. Il étoit donc de la plus grande importance d'avoir un instrument capable d'indiquer avec exactitude les températures employées dans ces opérations. M. Wedgwood a construit en Angleterre un thermomètre de cette nature; il est formé de petits morceaux d'argile d'un demi-pouce de diamètre: Ces pièces contractées par le calorique, avancent plus ou moins entre deux règles de cuivre convergentes l'une vers l'autre, sur une plaque du même métal, & désignent ainsi par l'échelle tracée sur ces règles, le degré de contraction, & conséquemment de température qu'elles ont éprouvé. (*Journal de physique, année 1787.*)

Telles sont les notions élémentaires que j'ai présentées sur le calorique; mais ces notions simples ne suffisent point dans cet ouvrage; on doit y donner tous les détails des travaux faits par

les modernes sur le calorique. Pour remplir cette vue, j'ai choisi la dissertation sur le calorique que M. Séguin a fait insérer dans les annales de chimie; on y trouvera l'état comparé des travaux célèbres de Black, de Crawford, & de MM. Lavoisier & Laplace, en sorte qu'on aura tout ce que la science possède de plus avancé & de plus exact à cet égard.

MÉMOIRE SUR LE CALORIQUE;

PAR M. SÉGUIN.

PREMIERE PARTIE.

Faits généraux concernant le calorique & les effets qu'il peut produire.

CHAPITRE PREMIER.

Du calorique, de la chaleur, du froid, de la température, du calorique spécifique, & de la capacité des corps pour contenir le calorique.

1°. Jusqu'à l'époque où l'on a publié la nouvelle nomenclature, le mot *CHALEUR* a souvent eu une double signification; on ne voit indistinctement alors à désigner la sensation qu'on éprouve, & le principe inconnu qui l'a produit: c'est pour séparer la cause d'avec l'effet, qu'on a donné le nom de calorique à ce principe inconnu, soit qu'on le considère comme une qualité ou comme une substance, & qu'on a réservé les mots *CHALEUR* & *FROID*, pour exprimer les sensations différentes qu'il produit sur nos organes, en vertu de la propriété dont il jouit, de se mettre en équilibre dans tous les corps qui sont en contact.

A l'instant où le docteur Crawford a publié la seconde édition de son ouvrage sur la chaleur, la nouvelle nomenclature étoit à peine connue; les physiiciens qui desiroient alors présenter leurs idées d'une manière claire, ne distinguoient la sensation de la cause produite que par des épithètes. C'est par cette raison que le docteur Crawford, considérant le calorique, sans prendre garde aux effets qu'il peut produire, le nomme *chaleur absolue*, & que, considéré comme ayant du rapport avec ses effets, il le nomme *chaleur relative*: il se sert aussi de l'expression *chaleur sensible*, pour exprimer un de ces effets.

M. Lavoisier s'est pareillement servi de cette expression dans son abrégé de chimie; mais il s'est aperçu, depuis la publication de cet ouvrage, qu'en adoptant la nouvelle nomenclature, cette épithète est superflue, pour ne pas dire fautive, en ce qu'elle peut donner l'idée d'une *chaleur insensible*; contradiction frappante, puisque le mot *CHALEUR* exprime la sensation produite par le calorique, & qu'il ne peut exister

de sensation insensible. Il est encore bon d'observer que M. Lavoisier s'est quelquefois servi dans le même ouvrage de l'expression *chaleur latente*, synonyme de *chaleur insensible*; mais ce physicien a de même reconnu que cette expression étoit insignifiante, en adoptant la nouvelle nomenclature. Il se propose de corriger ces fautes inexactitudes, lorsqu'il publiera la seconde édition de son abrégé de chimie.

2°. La température d'un corps est la mesure des dilatations des liquides dont on se sert pour construire les thermomètres, lorsque après avoir obéi aux attractions plus ou moins fortes qui les maintiennnent, le calorique s'est enfin mis en équilibre.

3°. Lorsqu'on veut élever du même nombre de degrés, la température de deux corps hétérogènes égaux, soit en masse, soit en volume, il faut très-souvent leur communiquer d'inégales quantités de calorique. Nous expliquerons par la suite d'où proviennent ces différences; nous devons, quant à présent, nous contenter de les désigner, & pour y parvenir, nous nous servirons de l'expression *capacité des corps pour contenir le calorique entre leurs molécules*. Si, par exemple, deux corps égaux, soit en masse, soit en volume, ont une température de 10 degrés, & s'il faut pour les élever à une température de 40 degrés, (pourvu toutefois qu'à cette température, ces corps ne commencent point encore à se liquéfier ou se vaporiser), communiquer à l'un deux fois plus de calorique qu'à l'autre, nous dirons que la capacité du premier est à celle du second, depuis le dixième degré du thermomètre, jusqu'au quarantième, comme 1 est à 3. Le docteur Crawford nomme ces différences, *capacités des corps pour contenir la chaleur*; mais, suivant la nouvelle nomenclature, cette expression n'est point exacte: en effet, un corps ne contient point de chaleur, mais le principe qui par son action sur nos organes, produit cette sensation.

4°. Il est donc évident que deux corps égaux, soit en masse, soit en volume, & réduits à la même température, peuvent contenir d'inégales quantités de calorique. Nous verrons par la suite d'où dépendent ces différences; nous devons, quant à présent, nous contenter de les désigner, & pour y parvenir, nous nous servirons de l'expression *calorique spécifique*, ou *quantité spécifique de calorique*. Je dirai donc que le calorique spécifique d'un corps est à celui d'un autre corps égal, soit en masse, soit en volume, & réduit à la même température, comme tel nombre est à tel autre nombre.

Le docteur Crawford se sert de l'expression, *chaleur comparative*; mais il est aisé de voir qu'elle ne rend pas avec exactitude l'idée qu'on doit y attacher. En effet, un corps ne contient point de

chaleur, mais le principe, qui, par son action sur nos organes, produit cette sensation.

Comme on ne s'est point encore occupé en France de la détermination de *calorique spécifique*, on n'a pas choisi de dénomination pour représenter la quantité totale de calorique que contient un corps, comparativement à celle que contient tel autre corps; il étoit donc nécessaire pour faire connaître les travaux des étrangers sur cet objet, de donner une nouvelle dénomination; & j'ai cru que la dénomination de *calorique spécifique*, pouvoit rendre l'idée qu'on doit y attacher. Il m'a semblé nécessaire de donner pour synonyme à cette expression, une dénomination un peu plus longue, parce qu'étant souvent obligé de parler des quantités *caloriques* de calorique de différents corps, j'aurois cru blesser les oreilles de ceux qui ne sont point accoutumés à ce nouveau langage, en disant les *caloriques spécifiques*; pour éviter cette manière de s'exprimer sera-t-elle un jour adoptée, & alors le langage étant plus précis, les connaissances seront moins difficiles à acquérir.

MM. Lavoisier & de Laplace se sont servis dans le mémoire qu'ils ont publié en 1780 sur la chaleur, de l'expression *calorique spécifique*; mais il est bien essentiel d'observer que dans l'acceptation qu'ils lui donnent, elle n'est point synonyme du véritable *calorique spécifique*.

Nous avons vu ci-dessus que l'expression *chaleur spécifique*, n'est point synonyme de *calorique spécifique*, & il est bien aisé de le démontrer en rapportant l'acceptation de chacune de ces deux dénominations. Le *calorique spécifique*, désigne la quantité totale de calorique que contient un corps, comparativement à celle que contient un autre corps. La *chaleur spécifique* exprime le rapport existant entre les quantités de calorique nécessaires pour élever la température de deux corps hétérogènes du même nombre de degrés; dans ce sens, les rapports entre les *chaleurs spécifiques*, sont toujours proportionnels aux rapports qui existent entre les capacités, & conséquemment ces deux expressions présentent la même idée. Il est en effet indifférent de dire, que la capacité d'un corps est à celle d'un autre corps dans le même espace, comme 4 est à 1, ou que les *chaleurs spécifiques* sont entre elles dans le même espace comme 4 est à 1; d'autant plus que dans la courte échelle que l'on peut employer pour faire ces expériences, les différences entre les capacités, s'il en existe, sont très-peu sensibles; il pourroit donc être utile de ne se servir que du mot *capacité*, & d'abandonner l'expression *chaleur spécifique*, qui, strictement, n'est point exacte & qu'on peut confondre avec celle de *calorique spécifique*.

M. Lavoisier s'est servi, dans son abrégé de chimie, de l'expression *capacité pour contenir la chaleur*; mais il a depuis reconnu qu'elle n'étoit

point rigoureusement exacte, par des raisons ci-dessus énoncées, & qu'il valoit mieux y substituer celle de *capacité d'un corps pour admettre le calorique entre ses molécules*. Ce célèbre physicien avance dans le même ouvrage, que les *capacités* sont déterminées par les espaces qui existent entre les molécules d'un corps; mais il en résulteroit que les *capacités* suivent le même rapport que les dilatations, ce qui est contraire aux faits: il est bien vrai, ainsi que je tâcherai de le prouver, qu'à température égale, le *calorique interposé* est proportionnel aux espaces; mais on ne peut pas conclure que les *capacités* sont déterminées par les espaces.

Il faut encore observer, que M. Lavoisier, dans son abrégé de chimie, emploie quelquefois l'expression *calorique spécifique*, comme synonyme de *chaleur spécifique*, mais il croit maintenant préférable de donner à ces deux expressions deux acceptions différentes.

5°. Il résulte des trois énoncés précédens, que les expressions *température*, *capacité* & *calorique spécifique*, sont des dénominations particulièrement affectées à des nombres abstraits, qui peuvent servir à établir des rapports, & conséquemment à fixer des mesures comparatives. La *température d'un corps* est une mesure qui nous indique que son *calorique interposé* est plus ou moins comprimé que celui d'un autre corps.

La *capacité* est une mesure qui nous indique la quantité de *calorique* qu'il faut communiquer à un corps, pour élever sa température d'un certain nombre de degrés, comparativement à celle qu'il faut communiquer à un autre corps égal en masse ou en volume, pour élever sa température du même nombre de degrés; (pourvu cependant que ces corps ne changent pas d'état pendant cette augmentation de température; c'est-à-dire, que si ce sont des solides, ils ne le liquéfient pas, & si ce sont des liquides, qu'ils ne se vaporisent pas).

Le *calorique spécifique* est une mesure qui indique la quantité totale de *calorique* que contient un corps dont la température est déterminée comparativement à celle que contient un autre corps égal, soit en masse, soit en volume, & résuit à la même température.

6°. Lorsqu'un corps ne change point d'état, la quantité de son *calorique interposé* peut varier, suivant le docteur Crawford, sans que sa *capacité* soit altérée. Cette opinion est fondée sur une supposition; le docteur Crawford croit, d'après les expériences qui seront rapportées dans le troisième chapitre de cette troisième partie, que la *capacité* des corps est permanente depuis le terme de la congélation de l'eau, jusqu'à celui de sa vaporisation, pourvu cependant qu'ils ne changent point d'état. Quoique cette opinion ne soit appuyée que d'un certain nombre d'expériences, & qu'en les multipliant, on puisse peut-être trouver beaucoup d'exceptions, on ne peut pourtant pas s'em-

pêcher de l'admettre, non pas généralement, mais pour tous les corps sur lesquels le docteur Crawford a opéré, d'autant plus qu'elle est fondée sur des faits qui semblent d'autant plus exacts, que les différences, si toutefois il en existe, sont trop petites pour paroître sensibles; mais il conclut ensuite par induction, que les *capacités* des corps sont permanentes à toutes les températures, tant qu'ils ne changent point d'état. C'est cette supposition qu'on ne peut admettre sans preuve; d'autant plus qu'en regardant même comme prouvé, que les *capacités* sont permanentes, depuis le terme de la congélation de l'eau, jusqu'à celui de l'évaporation, les 80 degrés que renferment cette échelle, ne sont qu'une faible fraction de la température des solides calculée à partir du zéro, jusqu'aux degrés où ils peuvent individuellement se liquéfier. Quant aux liquides, ces 80 degrés sont une fraction assez considérable du nombre de degrés qu'il faut leur communiquer pour les faire changer d'état; mais pour les fluides, ces 80 degrés sont une fraction très-faible du nombre de degrés qu'il faut leur ajouter pour les porter à la plus haute température.

7°. On mesure la *chaleur* par l'intensité de la sensation qu'elle produit, & la *température* par la dilatation des liquides dont on se sert pour construire le thermomètre. Quant aux *capacités*, il existe deux moyens de les déterminer; le premier consiste à mêler ensemble des poids ou des volumes égaux de substances hétérogènes dont les températures sont différentes, & à observer la température du mélange; les *capacités* sont alors en raison inverse des changemens de température. Le second consiste à échauffer les corps, à les enfermer ensuite dans une enveloppe de glace, & à rassembler la quantité d'eau formée par la fonte de la glace; les *capacités* sont alors en raison directe des quantités de glace fondue. Nous verrons par la suite quelle est la meilleure de ces deux méthodes.

8°. Lorsqu'on veut déterminer les *capacités* de différens corps, on peut les considérer comme ayant des poids égaux & des températures égales, ou comme ayant des volumes égaux & la même température, & les résultats de ces comparaisons seront plus ou moins différens, suivant que la différence entre la pesanteur spécifique des substances composées sera plus ou moins grande. Le docteur Crawford, & MM. Lavoisier & Laplace, ont, dans le cours de leurs ouvrages, calculé les *capacités*, en les rapportant à des poids égaux des substances comparées.

9°. Les changemens produits dans la température de différens corps, par d'égaux quantités de *calorique*, sont en raison inverse de leur *capacité*; la température d'un corps peut varier, ou par un changement dans sa nature, ou par une augmentation ou diminution de son *calorique interposé*.

10°. Si la propriété dont jouit le *calorique*, de se répartir dans tous les corps, jusqu'à ce qu'ils aient acquis la même température, n'étoit pas troublée par des causes sans cesse agissantes, la température de tous les corps de la terre deviendrait enfin uniforme, & alors le *calorique* seroit dans un état de repos.

11°. Le docteur Pallas rapporte que, dans les déserts de la Sibérie, pendant une gelée très-forte, le mercure se gela dans un thermomètre exposé à l'atmosphère. Les expériences décisives qui ont été faites à la baie d'Hudson, par M. Hutchins, prouvent que, pour faire geler le mercure, il faut un froid de trente-deux degrés au-dessous de zéro. A l'instant où le docteur Pallas a fait ses observations, la température de l'atmosphère étoit donc dans la Sibérie de — 32 degrés. On peut en conclure qu'à la température ordinaire de l'atmosphère, les corps contiennent une grande quantité de *calorique*.

12°. La quantité de *calorique* que contient un corps, dont toutes les molécules ont la même température, est proportionnelle à sa masse; si deux livres d'eau, par exemple, contiennent une certaine quantité de *calorique*, une livre à la même température, n'en contiendra que la moitié.

13°. Les sensations de *chaleur* & de *froid* ne sont que relatives; elles dépendent de l'équilibre de température. Un corps quelconque peut, en même-temps, produire de la *chaleur* & du *froid* pour deux personnes mises dans des situations différentes.

14°. Beaucoup de corps dans la nature, peuvent subir trois modifications, la solidité, la liquidité & la fluidité. Ces modifications dépendent du pouvoir qui a le *calorique* de vaincre l'attraction qu'ont les molécules des corps les unes pour les autres; mais ce pouvoir est ensuite modéré par la pression plus ou moins forte de l'atmosphère.

CHAPITRE DEUXIEME.

Les dilatations & les condensations du mercure dans le thermomètre sont à-peu-près proportionnelles entre le terme de l'ébullition de l'eau & celui de sa congélation, aux quantités de calorique communiquées ou enlevées à un corps quelconque, pourvu qu'il ne change pas d'état.

Ce fut M. Deluc qui rechercha le premier le rapport existant entre les augmentations de *calorique*, & les dilatations des liquides dont on se sert pour construire les thermomètres. Il observa que en mêlant d'égales quantités d'eau froide & d'eau chaude, la quantité de *calorique* produisant les différences entre les températures, se divisoit également entre ces deux

portions; si les dilatations de mercure, dit-il, sont proportionnelles aux quantités de *calorique* communiquées, un thermomètre doit, après le mélange, indiquer la moyenne arithmétique. Il mêla de l'eau à six degrés, avec une égale quantité du même liquide à soixante-quinze, & il observa, qu'en plongeant un thermomètre dans le mélange, cet instrument indiquoit toujours quelque peu moins que la moyenne arithmétique; mais cette différence n'étoit pas de plus de $\frac{1}{100}$ de degré. Il répéta cette expérience à différentes températures, & obtint toujours le même résultat; il en conclut que le thermomètre est à très-peu près une mesure exacte de la *chaleur*.

Les expériences de M. Deluc ont été répétées par le docteur Crawford; les thermomètres dont il s'est servi, étoient gradués sur l'échelle de Fahrenheit, & chaque degré étoit divisé en dix parties égales; les résultats de ses différentes expériences qui ont été faites avec grand soin, prouvent, 1°. qu'en mêlant d'égales quantités d'eau froide & d'eau chaude, le thermomètre indique toujours à très-peu près la moyenne arithmétique; 2°. qu'en variant les proportions d'eau froide & d'eau chaude, les températures indiquées après le mélange par le thermomètre, correspondent pareillement, à très-peu près, avec celles qui sont indiquées par le calcul; 3°. qu'en mêlant de la même manière d'égales quantités d'huile de lin à différents degrés, la température du mélange surpasse toujours un peu la moyenne arithmétique; 4°. que les dilatations de l'air ne correspondent pas avec les quantités de *calorique* communiqué; 5°. enfin, que les dilatations du mercure étant à très-peu près proportionnelles aux quantités de *calorique* communiqué, le thermomètre à mercure est une mesure exacte de la *chaleur*.

Si l'on se sert du mot *CHALEUR* pour exprimer la sensation, on ne peut dire que le thermomètre est une mesure exacte de la *chaleur*; car un morceau de marbre nous paroît plus froid qu'un morceau de bois, quoique ces deux substances aient la même température; ces différences dépendent, ainsi que nous le verrons ci-après, des capacités. Si l'on se sert du mot *CHALEUR* comme synonyme du mot *CALORIQUE*, cet énoncé est également inadmissible; car le thermomètre ne peut indiquer ni le *calorique* combiné ni le *calorique* interposé, (il faudroit, pour cela que les capacités fussent permanentes, tant que les corps ne changent pas d'état) ni conséquemment le *calorique spécifique*. Nous pouvons donc avancer que le thermomètre ne peut nous servir à mesurer que les quantités comparatives de *calorique*, que des corps différens communiquent à une même substance prise pour unité, lorsqu'on la mêle séparément avec chacun de ces corps, en ayant soin que, dans chaque expérience, il y ait le même espace entre les degrés qui déterminent

la température de la substance qui sert de terme de comparaison, & celle du corps qu'on veut y mêler, pourvu toutefois que, pendant le mélange, les molécules ne communiquent point ou n'absorbent pas de *calorique*.

Cette dernière circonstance ne peut, d'ailleurs, être rigoureusement vraie, qu'autant, 1°. que les *capacités* des corps sont permanentes, tant qu'ils ne changent pas d'état; 2°. que les dilata-tions du mercure sont proportionnelles aux quantités de *calorique* qu'on lui communique.

Admettons, cependant, que le thermomètre jouisse de cet avantage, & voyons quelle utilité on en pourroit tirer par rapport aux *tempé-ratures*.

Si le mercure ne se geloit point, & si l'échelle du thermomètre commençoit au zéro réel, on ne pourroit pas déterminer la quantité de *calorique* que contient le mercure, lorsqu'il est dilaté jus-qu'à telle ou telle hauteur; mais il seroit pos-sible de représenter cette quantité par un nombre quelconque, ce nombre seroit déterminé par les divisions de l'échelle, on pourroit alors s'é-noncer clairement, en disant que la *température* d'un corps qui dilate le mercure de six degrés, par exemple, est double de celle d'un autre corps qui ne le dilate que de trois; ainsi même dans cette supposition, on n'auroit que des rapports de *température*, & non des déterminations exactes de quantités absolues de *calorique*; mais cette supposition est démentie par les faits, les divi-sions du thermomètre ne commencent qu'au terme de la congélation du mercure; les augmenta-tions de *température* sont donc des fractions in-connues de la *température* réelle, conséquemment dans l'état actuel de nos connoissances, on pré-sente une idée très-fausse, en disant que la *tem-pérature* d'un corps est double ou triple de celle d'un autre corps.

Ainsi en admettant le concours des circon-stances les plus favorables, le thermomètre à mer-cure ne peut, quant aux *températures*, que dé-terminer si celle d'un corps est plus haute que celle d'un autre corps, depuis le terme de la congélation du mercure jusqu'à celui de sa vapo-risation.

CHAPITRE TROISIÈME.

Les *capacités* des corps pour admettre le *calorique* entre leurs molécules, sont, suivant le docteur Crawford, à très-peu près permanentes, tant qu'ils ne changent pas d'état.

L'on dit que la *capacité* d'un corps est per-manente, lorsque la même quantité de *calorique* qui élève la *température* d'un certain nombre de degrés mesurés sur un thermomètre, dont les dilata-tions sont proportionnelles aux augmenta-

tions de *calorique*, l'élève du même nombre de degrés à toute autre *température*.

L'on dit, au contraire, que la *capacité* est aug-mentée ou diminuée, lorsqu'après ce changement il faut lui communiquer une plus ou moins grande quantité de *calorique*, pour qu'il dilate également le mercure du thermomètre.

Nous avons vu dans le chapitre précédent; 1°. Que les dilata-tions du mercure sont propor-tionnelles aux augmentations de *calorique*, depuis le terme de la congélation de l'eau, jusqu'à ce-lui de son ébullition; 2°. Qu'en plongeant un thermomètre à mercure dans un mélange d'eau froide & d'eau chaude, il indique à très-peu près la moyenne arithmétique.

Le docteur Crawford, tire de ces deux énon-cés les conclusions suivantes; 1°. Que les di-lata-tions du mercure sont proportionnelles aux aug-mentations de *calorique*, depuis le terme de sa congélation jusqu'à celui de sa vaporisation; 2°. Que la *capacité* de l'eau est permanente, tant qu'elle ne change pas d'état.

La première de ces conclusions est une suppo-sition, puisque les expériences du docteur Craw-ford, prouvent tout au plus que les dilata-tions du mercure sont proportionnelles aux augmen-tations de *calorique*, depuis le terme de la con-gélation de l'eau jusqu'à celui de son ébullition. Le second, est une conséquence juste, que l'on est obligé d'admettre; en effet, les divisions du thermomètre sont égales entr'elles; si donc les dilata-tions du mercure sont proportionnelles aux quantités de *calorique* qui lui sont communiquées, la *température* d'un mélange de parties égales d'eau froide & d'eau chaude étant égale à la moyenne arithmétique, la *capacité* de l'eau doit être permanente.

Il est bien remarquable que la permanence de *capacité* de l'eau, & la dilatibilité du mercure proportionnelle aux augmentations de *calorique*, servent mutuellement à se démontrer; si l'une de ces propriétés n'existoit pas, il ne seroit pas pos-sible de prononcer l'existence de l'autre.

Il est cependant très-possible que dans la courte échelle qu'emploie le docteur Crawford, les différences dans les *capacités* des corps & dans les dilata-tions du mercure se compensent ou dispa-raissent par les corrections multipliées que le grand nombre d'incertitudes dont cette méthode est susceptible, rend indispensables.

Les dilata-tions du mercure nous paroissent donc proportionnelles aux augmentations de *calorique*, depuis le terme de la congélation de l'eau jus-qu'à celui de sa vaporisation, & la *capacité* de ce dernier liquide, pouvant être regardée comme à très-peu près permanente, tant qu'elle ne change pas d'état, on peut en s'en servant pour terme de comparaison, déterminer si la *capacité* d'autres corps est permanente aux *températures* intermé-diaires aux termes de la congélation & de l'é-

bullition de l'eau. Supposons, par exemple, qu'on mêle une livre d'eau à 10 degrés avec une livre de fer à 30, & que dans cette circonstance, la température du mélange soit de 20 degrés; si, en répétant l'expérience, la température de l'eau étant à 10 degrés, & celle du fer étant de 60, la température du mélange se trouve de 35 degrés, on pourra conclure que la capacité du fer est permanente à tous les degrés intermédiaires, aux termes de la congélation & de l'ébullition de l'eau.

Le docteur Crawford a fait, d'après ce principe, beaucoup d'expériences sur les oxides métalliques & les métaux, & il croit, d'après ses résultats, que la capacité des corps, lorsqu'ils ne changent pas d'état, est permanente à tous les degrés intermédiaires aux termes de la congélation & de l'ébullition de l'eau; il conclut ensuite par induction, que la capacité des corps est permanente à toutes les températures, tant qu'ils ne changent point d'état.

Il est essentiel d'observer que le docteur Crawford n'a opéré que sur un certain nombre de substances. Si en continuant ce travail sur tous les corps de la nature, & d'après la même méthode, ils présentent tous le même résultat sans aucune exception, ce qui est peu vraisemblable, on en pourra tirer la conséquence, que les capacités des corps sont permanentes, tant qu'ils ne changent point d'état, à toutes les températures intermédiaires aux termes de l'ébullition de l'eau & de la glace fondante, pourvu toutefois que dans cette courte échelle, les petites différences, s'il en existe, ne soient point effacées par les corrections multipliées que l'on est obligé de faire. Mais pourroit-on de ces faits conclure que les capacités de tous les corps sont permanentes à toutes les températures, tant qu'ils ne changent pas d'état? Je le répète, ce n'est-là qu'une supposition qui, dénuée de preuves, peut n'être point admise par ceux qui se font un devoir de ne rien déduire au-delà de l'expérience.

CHAPITRE QUATRIÈME.

Les corps exposés à la chaleur absorbent, pendant leur liquéfaction ou leur vaporisation, une quantité de calorique qui n'augmente pas leur température, & qui se dégage lorsqu'ils se liquéfient ou se solidifient.

Ce fut le docteur Black qui découvrit ce fait important en 1756; ce célèbre physicien fit à-peu-près, dans le même-temps, beaucoup d'expériences décisives & ingénieuses pour établir cette vérité; M. Deluc les a depuis insérées dans son traité sur la météorologie.

1°. Si l'on mêle une livre d'eau liquide à zéro, avec une livre du même liquide à 62,22 degrés, la température du mélange est de 31

degrés à-peu-près; mais si l'on mêle une livre de glace à zéro, avec une livre d'eau à 62,22 degrés, la température du mélange est zéro.

D'après les expériences de MM. Lavoisier & Laplace, une livre d'eau à 60 degrés, peut fondre totalement une livre de glace, & la température du mélange est alors zéro; proposition qu'on peut énoncer de la manière suivante, indépendamment des divisions arbitraires des poids & du thermomètre. La quantité de calorique nécessaire pour fondre la glace, est égale aux trois quarts de celle qui peut élever le même poids d'eau de la température de la glace fondante à celle de l'eau bouillante.

Suivant les expériences de M. Wilke, il faut 57,73 degrés pour fondre la glace.

Nous avons donc trois nombres différens pour la détermination de la fusion de la glace :

Docteur Black.....	62,22 degrés.
MM. Lavoisier & Laplace...	60
M. Wilke.....	57,73

2°. Si l'on mêle une livre d'eau à zéro avec une livre de glace, à — 62,22 degrés, l'eau est solidifiée en entier, & la température du mélange est zéro.

Ces deux expériences prouvent que la quantité de calorique qui est dégagée d'une livre d'eau pendant sa congélation, est précisément égale à celle qui est absorbée par la liquéfaction d'une livre de glace.

Il est aisé d'après cela, d'expliquer le phénomène suivant, que le docteur Black observa, il y a cent ans.

3°. Si la température de l'air d'un lieu, étant à quelques degrés au-dessous de zéro, on expose à l'atmosphère de l'eau purgée d'air, elle s'abaisse de quelques degrés au-dessous du zéro sans perdre de sa liquidité; mais si-tôt qu'on l'agite, il y a une portion qui se gèle, & la température du mélange contenant de la glace & de l'eau, s'élève à zéro.

4°. Le docteur Black a aussi prouvé que l'eau en se vaporisant, absorbe une certaine quantité de calorique qui n'augmente pas sa température.

Ce célèbre physicien découvrit cette seconde vérité, en faisant sur l'eau, à une haute température, une expérience qui lui offrit un phénomène remarquable.

Ayant élevé dans une machine à Papin, la température d'une certaine quantité d'eau beaucoup au-dessus du 802 degré, il ouvrit un robinet adapté à cette machine; aussitôt une partie de l'eau se vaporisa, & la température de celle qui restait dans le vaisseau, se trouva de 80 degrés.

Il faut observer que la quantité de calorique dégagée

gagé d'un poids quelconque de vapeur aqueuse pendant sa condensation, & déterminée, d'après les expériences de M. Watt, est assez considérable pour élever la température d'un poids égal d'une substance non évaporable, ayant la même capacité que l'eau, de 405 degrés.

Je vais décrire l'appareil dont s'est servi M. Watt, parce qu'il peut être employé à déterminer la chaleur qui se dégage pendant la décomposition de quelques vapeurs, en prenant cependant quelques précautions nécessaires.

1°. Un vase couvert dans lequel doit bouillir l'eau.

2°. Un tube de métal de cinq à six pieds de long, partant du haut de ce vase, s'élevant obliquement, & se terminant en un tube recourbé vers le bas.

3°. Un second vase qui contient de l'eau à la température du lieu, & qui doit recevoir le bec du tube à un certain période de l'opération. Ce vase & son eau font exactement pesés, il est couvert pour que l'évaporation ne diminue pas la quantité de l'eau durant l'expérience.

4°. Un petit vase placé au-dessous & vers le bas du tube, en communication avec celui-ci, ce vase est destiné à recevoir l'eau que les vapeurs déposent dans le tube, & qui y coule en rétrogradant vers le premier vase.

Il faut de plus déterminer la capacité du second vase & la quantité de calorique qu'il communique à l'atmosphère, lorsque sa température est plus haute que celle du milieu environnant.

On fait bouillir l'eau du premier vase, & quand ses vapeurs s'échappent avec abondance par le bec du tube, on le plonge dans l'eau du second vase qui reçoit aussi l'eau & le calorique combiné des vapeurs; on a soin d'agiter, afin que toute la masse ait toujours un même degré de chaleur. L'expérience étant terminée, on pèse de nouveau le second vase, après quoi toute correction faite, on détermine la quantité de calorique nécessaire pour vaporiser l'eau.

On peut employer cette méthode pour beaucoup d'autres substances.

5°. L'eau perdant, pendant sa congélation, une partie de son calorique, il est aisé de concevoir pourquoi la température de ce liquide, qui, exposé à un degré de froid au-dessous de zéro, devient en partie solide lorsqu'il est agité par les vents, s'élève au même instant jusqu'à zéro, & reste alors stationnaire jusqu'à ce qu'il soit entièrement gelé.

Comme le dégagement du calorique dépend immédiatement, dans cette circonstance, de la congélation, il est évident que ce dégagement doit être proportionnel à la quantité d'eau gelée; mais comme la congélation de l'eau dépend du pouvoir refroidissant du milieu environnant,

Chimie, Tome II.

qui absorbe en même-temps, le calorique dégagé de la portion qui se gèle, cette communication étant égale à l'absorption, la température du mélange d'eau & de glace ne doit point varier.

C'est aussi pour cette raison, que la glace fondante, l'eau bouillante, & la vapeur aqueuse pendant sa condensation, ont une température stationnaire; dans toutes ces circonstances, la quantité de calorique absorbée ou dégagée, est précisément égale à celle qui est communiquée ou enlevée.

On peut conclure de ces faits, que quand des corps exposés à la chaleur ou au froid, ont pendant leur changement d'état, une température fixe, ils absorbent ou communiquent du calorique.

Le docteur Black a trouvé que le suif, le blanc de baleine, la cire & la poix-résine ont une température fixe, lorsqu'ils éprouvent un changement d'état par la liquéfaction ou par la congélation.

6°. Le docteur Crawford tire de ces diverses observations, la conclusion générale, que les corps exposés à la chaleur absorbent en se fondant ou se vaporisant, une quantité de calorique nécessaire à leur liquéfaction ou à leur vaporisation; mais qui n'augmente pas leur température, & que, pendant les changements opposés, ils perdent les quantités de calorique qu'ils avoient précédemment absorbées.

Dans les changements causés par la chaleur à l'état d'un système de corps, il y a toujours absorption de chaleur, en sorte que l'état qui succède immédiatement à un autre, par une addition suffisante de chaleur, absorbe cette chaleur sans que le degré de température du système augmente.

7°. A. Si les temps que deux portions du même liquide emploient à se geler sont égaux, les quantités de glace seront directement proportionnelles aux pouvoirs refroidissants.

B. Si les pouvoirs refroidissants sont égaux; les quantités de glace seront entr'elles comme les temps de la congélation.

C. Conséquemment, si les temps de la congélation & les pouvoirs refroidissants sont inégaux, les quantités de glace seront entr'elles comme les temps multipliés par les pouvoirs.

D. Les temps seront donc entr'eux, comme les quantités de glace divisées par les pouvoirs.

E. Et si les quantités de glace sont égales, les temps seront en raison inverse des pouvoirs.

Le docteur Crawford observe qu'on peut déterminer les rapports existants entre les quantités de calorique que des poids égaux de corps bé-

X x x x

terogènes perdent pendant leur congélation, d'après le temps qu'ils mettent à se geler lorsqu'ils sont exposés à des pouvoirs réfrigérans égaux.

Cet énoncé demande à être expliqué; tous les corps ne changent pas d'état à la même température; ces changemens font infiniment variés. Si, par exemple, on opère sur deux liquides, & si l'un se solidifie à l'instant où la température répond au deuxième degré du thermomètre, tandis que l'autre éprouve ce changement, lorsque la température répond à la division de l'échelle que l'on a nommée zéro, il faudra, que si le premier de ces liquides est exposé à un milieu, dont la température soit zéro, le second, pour être exposé à un pouvoir réfrigérant égal, soit placé dans un milieu où la température soit deux degrés. Ce n'est qu'en prenant ces précautions, qu'on peut tirer quelque utilité de l'énoncé ci-dessus. Ajoutons que, pour rendre cette méthode exacte, il faudroit encore pouvoir enlever les couches de glace à mesure qu'elles se forment, sans cela la glace formée empêcherait le liquide qui est au-dessous, de se geler si promptement.

8°. Le docteur Crawford pense que l'absorption du *calorique* pendant la fusion & la vaporisation provient seulement d'une augmentation de *capacité*; mais si l'absorption provient de ce changement, ce n'est qu'après qu'il est effectué, que le *calorique* peut être absorbé, la *capacité* change donc nécessairement avant qu'il y ait absorption; mais pour que cet effet ait lieu, il faut que le corps éprouve quelque autre changement ultérieur dont celui-ci n'est qu'une conséquence. Quelle est donc la cause qui augmente la *capacité* dans ces circonstances? Est-ce une combinaison du *calorique* avec les molécules? Dans ce cas, l'absorption de *calorique* proviendrait en partie d'une combinaison réelle, & en partie de l'augmentation de *capacité* produite par cette même combinaison. Il seroit donc nécessaire, pour appuyer l'hypothèse du docteur Crawford, d'examiner, 1°. quelle est la cause qui augmente la *capacité*; 2°. s'il y a entre l'eau & la glace, une différence de *capacité* à laquelle on puisse attribuer l'absorption totale du *calorique* pendant la liquéfaction ou la vaporisation.

On a trouvé, ou du moins on soupçonne, que la *capacité* de la glace est à celle de l'eau, comme neuf est à dix; mais comme les *capacités* ne sont pas proportionnelles au *calorique spécifique*, on ne peut pas prouver par ce rapport que l'absorption de *calorique* provient seulement d'un changement de *capacité*; il faudroit, pour réaliser cette hypothèse, connaître le *calorique spécifique* de la glace fondante, & démontrer que l'absorption du *calorique* pendant sa liquéfaction, en est une partie aliquote, égale au rapport des deux *capacités*. Mais au lieu de suivre cette marche, les partisans de cette hypothèse concluent le *calorique spécifique* de la glace

de cette absorption même de *calorique* qu'ils devroient expliquer. Cette supposition n'est donc appuyée sur aucune preuve concluante; d'ailleurs, le phénomène s'explique d'une manière bien plus simple, & bien moins forcée, par l'admission de la combinaison du *calorique*. Cette opinion est adoptée par le docteur Black, M. Deluc, Lavoisier, Laplace, Landriani, & beaucoup d'autres. Ces physiciens ne l'ont admise qu'après y avoir mûrement réfléchi.

CHAPITRE CINQUIÈME.

Il faut d'inégales quantités de calorique pour produire des changemens égaux de température dans des poids égaux de corps hétérogènes.

1°. Si l'on veut augmenter d'un degré la température d'une livre d'eau & celle d'une livre de mercure, il faudra employer d'inégales quantités de *calorique* pour l'une & l'autre de ces matières.

2°. Si l'on mêle quatre livres d'oxide d'antimoine blanc par le nitre (antimoine diaphorétique) à quatre degrés, avec une livre de glace à zéro, la température de mélange sera de deux degrés: si l'on mêle quatre livres du même oxide à zéro avec une livre de glace à quatre degrés, la température du mélange sera également de deux degrés.

En répétant ces expériences à différentes températures, on obtiendra toujours le même résultat. Il en résulte, suivant le docteur Crawford, qu'une livre de glace & quatre livres d'oxide d'antimoine blanc par le nitre, contiennent d'égaux quantités de *calorique*; mais quatre livres d'oxide contiennent quatre fois autant de *calorique* qu'une livre; conséquemment le *calorique spécifique* d'une livre de glace est à celui d'une livre d'oxide comme 4 : 13; mais si l'on mêle une livre de glace à zéro avec une livre d'oxide d'antimoine blanc par le nitre, à — 10, la température du mélange sera de — 2 degrés; la glace sera refroidie de deux degrés, & la température de l'oxide sera élevée de 8, le changement produit dans la température de la glace est donc au changement produit dans celle de l'eau, comme... 1 est à 4. mais nous venons de voir que le *calorique spécifique* d'une livre de glace, est à celui d'une livre d'oxide, comme..... 4 est à 1.

Conséquemment les quantités spécifiques de *calorique*, de poids égaux de glace & d'oxide d'antimoine blanc par le nitre, sont, suivant le docteur Crawford, en raison inverse des changemens produits dans leur température, lorsqu'on les mêle à différens degrés.

3°. Le docteur Crawford s'est servi de cette méthode pour déterminer les quantités spécifiques de *calorique* de différens corps, en les mêlant à

différens degrés, & observant les changemens qui sont produits dans leur température.

Cette manière de déterminer le *calorique spécifique* est fondée sur deux suppositions ; 1^{re}. que les *capacités* de tous les corps sont permanentes à toutes les températures tant qu'ils ne changent pas d'état ; 2^{re}. que le *calorique* qui est absorbé pendant la liquéfaction & la vaporisation ne se combine point, & que cet effet provient seulement d'un changement de *capacité*. Nous venons de voir dans les chapitres précédens, que rien n'appuyait ces deux énoncés, & qu'ils ne pouvoient être regardés dans l'état actuel de nos connoissances, que comme des hypothèses, d'autant plus que l'examen des faits porte à croire qu'elles sont opposées à la vérité. La méthode du docteur Crawford, quoique très-ingénieuse, ne peut donc, à la rigueur, remplir le but qu'il s'étoit proposé, à moins qu'on ne prouve, 1^{re}. la permanence des *capacités* à toutes les températures, tant que les corps ne changent pas d'état ; 2^{re}. l'absorption du *calorique* pendant la liquéfaction & la vaporisation produite seulement par un changement de *capacité*. Si l'on ne prouvoit que le premier de ces énoncés, on ne pourroit déterminer, d'après cette méthode, que le *calorique interposé*, celui qui influe sur la température.

CHAPITRE SIXIEME.

De la nature du *calorique*.

On n'a point encore déterminé d'une manière exacte la nature du *calorique*. Quelques personnes pensent que c'est un être simple, dépendant de lui seul, répandu par-tout en grande quantité, & dont quelques effets ont de l'analogie avec ceux que produit la lumière, tandis que d'autres en diffèrent essentiellement.

D'autres physiciens, mais en bien plus petit nombre, pensent qu'il n'existe point de substance à laquelle on puisse donner le nom de *calorique*, & que la *chaleur* n'est que le résultat des mouvemens insensibles des molécules de la matière.

MM. Lavoisier & Laplace, dans le mémoire qu'ils ont publié sur la *chaleur*, ne décident point entre ces deux hypothèses. « Plusieurs phénomènes, disent-ils, paroissent favorables à la seconde ; tel est, par exemple, celui de la *chaleur* que produit le frottement de deux corps solides ; mais il en est d'autres qui s'expliquent plus facilement dans la première : peut-être ont-elles lieu routes deux à la fois. Ils observent en outre, au sujet de la dernière supposition que dans tous les mouvemens, dans lesquels il n'y a point de changement brusque, il existe une loi générale que les géomètres ont désigné sous le nom de *principe de la conservation des forces vives* ; cette loi consiste en ce que,

dans un système de corps qui agissent les uns sur les autres d'une manière quelconque, la *force vive*, c'est-à-dire, la somme des produits de chaque masse par le carré de sa vitesse, est constante. Si les corps sont animés par des *forces accélératrices*, la *force vive* est égale à ce qu'elle étoit à l'origine du mouvement, plus à la somme des masses multipliées, par les carrés des vitesses dues à l'action des *forces accélératrices*. Dans la seconde hypothèse, la *chaleur* est la *force vive* qui résulte des mouvemens insensibles des molécules des corps ; elle est la somme des produits de la masse de chaque molécule par le carré de sa vitesse.

» Cette manière, d'envisager la *chaleur*, explique facilement pourquoi l'impulsion directe des rayons solaires est inappréciable, tandis qu'ils produisent une grande *chaleur* : leur impulsion est le produit de leur masse par leur simple vitesse ; or, quoique cette vitesse soit excessive, leur masse est si petite, que ce produit est presque nul, au lieu que leur *force vive* étant le produit de leur masse par le carré de leur vitesse, la *chaleur* qu'elle représente est d'un ordre très-supérieur à celui de leur impulsion directe. Cette impulsion, sur un corps blanc qui réfléchit abondamment la lumière, est plus grande que sur un corps noir, & cependant, les rayons solaires communiquent au premier une moindre *chaleur*, parce que les rayons, en se réfléchissant, emportent leur *force vive* qu'ils communiquent au corps noir qui les absorbe. »

Quelques personnes enfin, croient que le *calorique* n'est point un être simple. Suivant M. De Luc, c'est un composé de lumière & d'une base qui nous est inconnue dans son état de liberté, ou que du moins nous obtenons peut-être sans nous en douter.

On peut objecter à cette opinion, que le *calorique* n'ayant pas de poids sensible, la pesanteur de sa base doit conséquemment être nulle ; mais nos expériences ne prouvent pas véritablement que la lumière, le *calorique* & plusieurs autres substances ne sont pas pesantes ; elles indiquent tout au plus, que les instrumens dont on se sert ne sont pas assez délicats pour déterminer cette pesanteur. Il est donc très-probable que le *calorique*, & conséquemment sa base, (si toutefois il est composé), ont une pesanteur quelconque ; notre idée se refuse à l'existence d'un corps dont la pesanteur est absolument nulle.

Si l'on regarde le *calorique* comme un composé binaire, on ne peut pas reconnoître sa base par l'augmentation de poids des substances auxquelles elle pourroit s'unir, parce que sa pesanteur est pour nous insensible ; mais on devroit au moins la distinguer après cette combinaison par l'existence de quelque nouvelle propriété.

Il est vrai que les physiciens à qui l'on feroit cette objection, pourroient répondre que cette conséquence est extrêmement juste ; mais que

XXXX

pour l'appuyer, il faudrait qu'on connût tous les principes qui entrent dans la composition des corps, & qu'on fût au point d'attribuer à chacun les effets qu'il doit produire.

Les belles expériences de Schéelle & de MM. Berthollet, Chapal, Dorthès, Priestley & Ingen-Houtz, prouvent que la lumière a une influence directe sur les corps; mais de quelle manière agit-elle & se combine-t-elle dans quelques circonstances avec l'oxygène pour former un composé ternaire, qui est l'air vital, ou s'unit-elle à la base du *calorique*, qui peut être contenue dans les corps; & n'est ce point ce changement qui contribue aux changements ultérieurs? Quelle est son influence dans quelques autres circonstances? S'unit-elle seule aux molécules des corps? En dégage-t-elle quelques principes? Comme nous n'avons encore aucune expérience directe qui puisse entraîner notre décision à cet égard, ces différentes opinions ne sont pour nous qu'hypothétiques, & conséquemment on ne peut en admettre aucune exclusivement.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas permis, en bonne physique, de supposer un être quelconque, il ne faut admettre que ceux dont on peut démontrer l'existence; on peut le refuser, avec raison, aux applications mêmes la plus satisfaisantes, lorsque la base sur laquelle elles sont fondées, n'est appuyée sur aucun fait démontré. La base du *calorique* ne nous étant donc point connue, & aucune des expériences qui ont été faites jusqu'à ce moment, ne pouvant pas même nous la faire soupçonner, nous pouvons regarder l'opinion que le *calorique* est un composé, comme une véritable supposition; & telle est sa nature, qu'elle ne peut être appuyée d'aucune probabilité.

Je ne parle point ici de l'analogie qui peut exister entre les gaz, les vapeurs & le *calorique*, analogie qui, quoique très-frappante, ne peut cependant prouver la combinaison de cette dernière substance, puisqu'il faut des faits & non des analogies, pour appuyer une conséquence.

Il est possible aussi que la lumière n'agisse pas sur tous les corps de la même manière; qu'elle se combine quelquefois avec cette base supposée du *calorique*, & quelquefois avec d'autres principes. Il est de même possible qu'elle entre seule dans la composition de certains corps, & qu'elle soit essentielle à leur nature; mais il faut encore bien du temps pour distinguer les véritables causes, & peut-être sommes-nous bien éloignés d'une théorie complète sur cet objet.

Il est toujours certain que les trois opinions que nous venons d'énoncer, ne sont qu'hypothétiques, puisqu'il est impossible de les démontrer d'une manière rigoureuse, & que jamais peut-être nous n'arriverons à ce degré de connoissance. Les connoissances n'étant donc pas assez multipliées pour compléter un corps de science,

& conséquemment pour établir une bonne théorie, nous ne pouvons à la fois au moment actuel, admettre que telle ou telle explication est la meilleure, nous devons conséquemment nous restreindre, pour l'avancement de la science, & principalement pour en faciliter l'étude aux commençants, à présenter, en rapprochant les faits, les causes immédiates qui les produisent; je vois donc qu'il peut être nécessaire de rapporter toutes les explications d'un même phénomène, & de s'étendre sur-tout sur celle qui paroît la plus probable; cette méthode trouveroit peut-être alors moins de contradicteurs, & les opposans de la nouvelle doctrine n'objecteroient plus qu'on forme une théorie complète quand on n'a qu'un certain nombre de faits, qui peuvent tout au plus donner plus de probabilité à telle ou telle opinion.

Il me semble donc qu'il est essentiel pour l'intérêt de la science, de ne point admettre sur la nature du *calorique*, aucune opinion exclusive, jusqu'à ce que nos connoissances soient plus étendues. Je rapporterai les explications qu'on peut donner des différens faits, ayant grand soin d'observer qu'aucune explication ne peut-être générale, que quand, après avoir réuni tous les phénomènes, on ne voit pas d'anomalies.

Je ne rapporterai point ici ce qu'on a écrit pour prouver les deux premières hypothèses, je ne serois que répéter ce que chacun connoît; je me contenterai donc de présenter bien brièvement quelques réflexions de M. Deluc.

Ce physicien ne croit pas que les rayons solaires soit *calorifiques*: il fonde cette opinion sur ce qu'en un même lieu, dans la même saison, ou en différens lieux à la même latitude, il existe des différences très-frappantes dans la température. L'intensité de la chaleur dépendant suivant lui, de la base à laquelle la lumière doit se réunir, il est possible que la quantité de cette base soit variable dans un même lieu, & constamment différente en divers lieux à la même latitude, à cause des différences du sol.

C'est probablement, suivant lui, dans l'atmosphère que les rayons solaires forment le nouveau *calorique* qui doit remplacer celui qui se détruit sans cesse; or, comme l'état de l'atmosphère varie beaucoup dans les mêmes lieux, il est possible de concevoir que ces variations augmentent ou diminuent cette base du *calorique*, de sorte que les températures locales éprouvent des changemens considérables quelquefois d'une heure à l'autre, & que les températures comparatives des mêmes saisons en éprouvent de la même manière.

C'est, ajoute-t-il, dans les couches inférieures de l'atmosphère que se forme le nouveau *calorique*, ce qui explique le phénomène remarquable de la moindre chaleur des couches supé-

rières, quoiqu'elles soient traversées pour le moins autant que les inférieures par la somme des rayons solaires incidents & réfléchis.

Toutes ces opinions ne sont que des conjectures qui ne seront réalisées que quand elles seront appuyées par des expériences exactes.

CHAPITRE SEPTIÈME.

Réflexions sur les différences qui existent entre les capacités, & sur la dilatabilité, la chaleur, le froid, la température, la fusion, l'évaporation, la combinaison & les affinités.

Qu'il me soit permis d'expliquer comment je conçois qu'il peut exister des différences dans les capacités, & comment on peut les apprécier.

1°. Quelle que soit la cause qui produit les affinités, il est certain qu'elles existent & qu'elles sont infiniment variées, soit entre les molécules homogènes, soit entre celles qui ne le sont pas.

L'expérience nous indique que plus on écarte les molécules d'un corps & plus l'attraction qu'elles ont entr'elles diminue; mais on ne fait pas également si cette diminution d'attraction est proportionnelle à la dilatation, & si dans différents corps l'attraction plus ou moins forte des molécules homogènes dépend de leur écartement. Observons encore que le calorique est compressible, qu'il jouit du pouvoir d'écarter les molécules, & de vaincre conséquemment l'affinité qu'elles ont les unes avec les autres; que tous les corps de la nature ont des pores plus ou moins grands, & qu'ils absorbent ou communiquent en changeant d'état une quantité de calorique qui n'est point sensible au thermomètre; d'après ces vérités, nous pourrions donner une explication satisfaisante des capacités plus ou moins grandes des corps, de leur dilatabilité, de la chaleur, du froid, de la température, de la fusion, de la vaporisation, de la combustion & des affinités.

2°. Supposons, pour la facilité de l'explication, qu'il soit possible de retirer tout ce qui peut se trouver entre les pores d'un solide quelconque, & qu'on possède du calorique à un degré quelconque d'expansion, si vous en faites entrer dans les pores de ce corps, vous arrivez au point de les remplir parfaitement, & le calorique interposé entre les molécules, sera au même degré d'expansion que celui qui a servi à faire l'expérience. Si vous en ajoutez encore, le calorique sera de plus en plus comprimé, jusqu'à ce qu'en fin la compression soit proportionnelle à l'affinité des molécules les unes pour les autres. Jusqu'à ce moment, les molécules sont telles à la même distance, & le calorique n'a point satisfait la propriété dont il jouit de les écarter; l'équilibre est alors établi; mais il se produira une dilatation, si tôt que vous détruirez cet équilibre, en appliquant une nouvelle quantité de calorique;

que; ces molécules s'écarteront de manière que la compression de calorique interposé, soit proportionnelle à l'attraction des molécules. Si vous ajoutez une nouvelle quantité de calorique égale à la précédente, il est possible que la dilatation ne suive pas le même rapport, mais l'équilibre s'établira toujours entre la compression du calorique interposé, & l'attraction de molécule à molécule. Ainsi, plus vous diminuez l'affinité, & moins le calorique interposé sera comprimé. En répétant toujours la même opération, vous arriverez enfin au point où s'opérera la liquéfaction; ce changement aura lieu à l'instant où l'affinité des molécules les unes pour les autres sera moins forte que celle qu'elles ont pour s'unir avec le calorique; elles obéiront donc à cette nouvelle affinité en vertu de la supériorité, & il faudra communiquer du calorique jusqu'à ce que la liquéfaction soit totale.

3°. Observons ici qu'avant ce changement nous ne considérons qu'un espace plus ou moins grand, rempli par du calorique plus ou moins comprimé, mais non combiné; il est cependant possible, & même très-vraisemblable, qu'il entre dans la composition de chaque molécule des corps solides, une certaine quantité de calorique nécessaire à leur nature, & qui perd par cette combinaison toutes ses qualités distinctives.

Nous rapporterons ci-après des faits qu'il est impossible d'expliquer si cette combinaison n'a pas lieu, & nous reviendrons sur cet objet en parlant de la combustion & de la détonation.

4°. Jusqu'au moment de la liquéfaction, ce n'est donc qu'une simple interposition; mais pendant ce changement, c'est une nouvelle combinaison opérée en vertu d'une affinité supérieure. Les molécules du solide s'unissent avec une certaine quantité de calorique pour former un liquide; ce calorique est absolument nécessaire à la nature de ce nouveau corps: ce liquide a des pores qui seront remplis par le calorique qui étoit avant la liquéfaction interposé entre les molécules du solide, de telle manière que l'écartement entre les molécules du nouveau composé soit à très-peu près égal à celui qui existoit entre celles du solide qui la produit.

5°. Nous pouvons donc regarder dans tout liquide quelconque, deux portions de calorique bien distinctes; l'une qui, agissant sur le thermomètre, détermine la température; & l'autre qui n'y produit aucun effet. Il est nécessaire pour distinguer ces portions, de leur donner des expressions différentes; ce qui m'engage à considérer le calorique dans trois états, & d'employer des épithètes pour les distinguer; ainsi je me servirai des expressions,

*Calorique libre,
interposé,
combiné.*

6°. Si vous ajoutez de nouveau *calorique* au liquide que vous avez formé, vous le dilatarez & l'attraction diminuée des molécules, se mettra en équilibre avec la compression du *calorique*, jusqu'à ce qu'enfin, la vaporisation ait lieu; ce changement s'opérera à l'instant où l'affinité des molécules du liquide, les unes pour les autres, sera moindre que celles qu'elles ont pour le *calorique*; il faudra donc en ajouter jusqu'à ce que le changement soit total, & alors les molécules du nouveau composé seront à-peu-près à la même distance que celles du liquide qui la produit.

7°. Jusqu'ici nous avons vu que la compression du *calorique* *interposé* étoit toujours égale à l'attraction des molécules les unes pour les autres, c'est en vertu de cette propriété que le *calorique* tend à se mettre en équilibre; il parvient à cet état, quand il est également comprimé, & c'est pour satisfaire à cette égalité de compression qu'il réduit tous les corps à la même température. Les températures dépendent donc de la compression du *calorique*; mais comme les attractions sont proportionnelles aux compressions, les températures seront les mêmes quand les attractions sont égales, parce qu'alors le *calorique* étant également comprimé de part & d'autre, il sera dans un état d'équilibre; ainsi, les molécules homogènes de deux corps qui ont la même température ont entr'elles séparément le même degré d'attraction.

8°. Nous venons de voir que les liquides & les fluides contenoient deux portions de *calorique*, l'une n'est qu'interposée, tandis que l'autre est réellement combinée. Il y a tout lieu de présumer que les solides obéissent aux mêmes loix; quoi qu'il en soit, comme nous exprimons par l'expression *calorique spécifique*, la quantité de *calorique* que contient un corps comparativement à celle que contient un autre corps, il s'ensuit que pour déterminer le *calorique spécifique* des liquides, des fluides, & peut-être des solides, il faut connaître la quantité de ce *calorique* interposé & celle de *calorique combiné*; ces deux portions réunies, forment le *calorique spécifique*.

9°. Il est bien reconnu que pendant le changement d'état des corps, la température reste stationnaire; mais nous venons de démontrer que les températures de deux corps ne peuvent être égales qu'autant que leur molécules ont entr'elles séparément la même attraction, & conséquemment que la compression du *calorique* est égale de part & d'autre. Nous pouvons en conclure, que dans la fusion de la glace, par exemple, les molécules de l'eau ont entr'elles, à l'instant de leur formation, la même attraction que les molécules de la glace à l'instant de la liquéfaction. Il en est de même pendant l'ébullition de l'eau.

10°. Il ne suffit pas d'indiquer les causes de la liquéfaction & de la vaporisation; il faut en-

core expliquer les changements des fluides en liquides, & des liquides en solides; c'est ce dont je vais m'occuper. La vaporisation de l'eau n'a lieu que quand l'attraction de ses molécules les unes pour les autres, est moindre que celle qu'elles ont pour le *calorique*. Mais l'attraction des molécules diminue par la dilatation, & leur affinité supérieure pour le *calorique* a lieu à un degré d'affinité constant. Si l'on rapprochoit alors les molécules en diminuant le *calorique interposé*, la vaporisation ne s'opéreroit point; il y a donc entre les molécules de l'eau un maximum d'écartement qui détermine l'évaporation. Il faut donc que les molécules de la vapeur soient à la même distance à l'instant de sa formation, que les molécules de l'eau à l'instant de la vaporisation. Si vous diminuez cet écartement en enlevant un peu de *calorique*, les molécules de l'eau qui ne sont plus à leur maximum d'écartement, auront plus d'affinité entr'elles que pour le *calorique*; & alors s'opérera la liquéfaction des vapeurs: il en est de même pour le changement des liquides en solides. On peut me faire une objection qui, au premier coup d'œil, paroîtroit très-concluante, mais qu'il est aisé de renverser; on peut m'objecter que les molécules de l'eau devant être à l'instant de leur formation à la même distance que celles de la glace à l'instant de la liquéfaction, de même que les molécules des vapeurs devant être au moment de leur formation à la même distance que les molécules de l'eau prête à se vaporiser, il n'y a pas de raison pour que l'eau occupe plus ou moins d'espace que la glace, & pour que les vapeurs occupent beaucoup plus d'espace que l'eau. J'observerai d'abord qu'il n'est point encore bien prouvé que l'eau occupe moins d'espace que la glace, que ce n'est peut-être qu'une apparence opérée par des causes secondaires, & qu'il seroit possible de supprimer; d'ailleurs, cette différence est si peu considérable, qu'elle ne peut servir de preuve. Quant aux vapeurs, la différence est trop sensible pour qu'on s'y méprenne, & c'est pour cette raison que je vais chercher à l'expliquer. Les molécules des vapeurs aqueuses sont composées, 1°. des molécules de la glace; 2°. du *calorique* qui a fallu successivement leur communiquer pour les liquéfier & les vaporiser: cette quantité de *calorique* comprend le *calorique combiné* & le *calorique interposé*. Rien n'indique que dans cette circonstance le *calorique combiné* soit comprimé, & quand il le seroit, il est bien certain qu'il doit augmenter le volume de chaque molécule. Les molécules de l'eau doivent donc être plus grosses que celles de la glace, & les molécules des vapeurs, plus grosses que celles de l'eau; mais comme les molécules de la glace n'absorbent pendant leur liquéfaction que 60 degrés environ de chaleur, tandis que l'eau, en se vaporisant, en absorbe 409, la différence entre les molécules des vapeurs & de l'eau

doit être bien plus grande que celle qui existe entre les molécules de l'eau & de la glace, d'autant plus que les molécules des vapeurs contiennent, outre les 405 degrés qui sont nécessaires à leur formation, les 60 degrés environ qu'il a fallu communiquer à la glace pour la liquéfier; ainsi, par ce seul motif, les molécules des vapeurs doivent être beaucoup plus grosses que celles de l'eau, puisqu'elles contiennent sept fois à-peu-près autant de *calorique*; elles doivent donc occuper plus d'espace.

11°. Les changements d'état n'ont pas lieu dans tous les corps à la même *température*, ils dépendent de leur nature & des affinités plus ou moins fortes que les molécules ont entr'elles. L'affinité qu'elles ont pour le *calorique* détermine aussi plus ou moins promptement ces changements; mais ce qui est général, c'est l'augmentation d'affinité de molécule à molécule opérée par la pression de l'atmosphère; cette pression s'oppose à son écartement, & conséquemment retarde l'instant de leur changement d'état; si vous la supprimez, les changements s'opéreront plus promptement. C'est pour cette raison, que l'éther mis sous la machine pneumatique se vaporise lorsque le vuide est fait, les molécules sont alors plus écartées, & se trouvent à la distance où elles ont plus d'affinité pour le *calorique* qu'entre elles, & alors il se produit du *froid*, parce qu'il y a formation de vapeur.

12°. Nous sommes maintenant en état de fixer d'où dépendent les différences dans les *capacités*. Les *capacités* de deux corps sont égales lorsqu'ayant la même *température*, & leur communiquant la même quantité de *calorique*, la compression se trouve égale dans l'un & l'autre corps. La *capacité* d'un corps est d'autant plus grande, qu'il faut, à *température* égale, lui communiquer plus de *calorique* pour établir une égale compression; les *capacités* dépendent donc & de la dilatation, & du nombre des molécules, & de leur augmentation de volume. Il faut, pour que la *capacité* d'un corps soit permanente, que la même quantité de *calorique* qui diminue l'affinité des molécules d'un centième, par exemple, la diminue de la même fraction à toute autre *température*. La permanence des *capacités* ou les différences qui peuvent exister entr'elles dépendent donc des diminutions d'affinité & de l'espace compris entre les molécules. Ainsi, à moins que les *capacités* ne soient permanentes, elles ne peuvent représenter les quantités de *calorique interposé*, & à bien plus forte raison, le *calorique spécifique*. Quand la compression du *calorique* dans deux corps est en raison inverse de l'écartement, la quantité de *calorique interposé* est égale. Lorsque le *calorique* est également comprimé, c'est-à-dire, lorsque les *températures* sont égales, les quantités de *calorique interposé* sont comme les espaces. Il paroît constant que les liquides sont

plus dilatables que les solides, & les fluides plus que les liquides; mais il n'est point encore prouvé que les *capacités* suivent la même loi.

13°. Quand deux corps ont la même *température*, l'attraction respective qu'ont entr'elles les molécules homogènes est égale. Nous pouvons donc exprimer ces affinités par le nombre de degrés qui désigne la *température* réelle. Si, par exemple, le zéro réel est à 600 degrés au-dessous du terme de la congélation de l'eau, on pourra exprimer l'attraction des molécules d'un corps dont la *température* est de 10 degrés au-dessus du zéro du thermomètre par le nombre 610. Si deux corps hétérogènes forment un nouveau composé à une *température* de 50 degrés au-dessus du terme de la glace fondante, on exprimera l'affinité qu'ont ces deux corps entr'eux par le nombre de 650, en observant que plus le nombre qui désigne l'affinité est considérable, & moins l'attraction est forte. Si l'un des ingrédients d'un composé binaire est en contact avec un autre corps, se combine avec lui pour former un nouveau composé à la *température* de 30 degrés du thermomètre, on exprimera cette attraction par le nombre 630. S'il étoit possible d'isoler tous les corps que nous regardons comme simples, de les réunir deux à deux, & de remarquer les degrés où ces nouvelles combinaisons ont lieu, on auroit les nombres exprimant les affinités des corps deux à deux, & conséquemment on pourroit, d'après la méthode indiquée par M. Cavendish, Fourcroy & Bergman, déterminer avec exactitude les affinités simples & doubles. Quant aux affinités plus compliquées, on n'y parviendra qu'en séparant toutes les causes; demande presque impossible à remplir. Il faut seulement observer, qu'en suivant la méthode de M. Cavendish, Fourcroy & Bergman, ce seroit le nombre le moins considérable qui détermineroit la décomposition ou la non-décomposition. Commençons par les affinités

simples. Soit un composé binaire  & un

corps simple mis en contact, dont l'affinité avec a soit exprimée par le nombre 660; si la *température* réelle du composé binaire est de 650 degrés passés, le corps simple s'unira avec a, & formera un nouveau composé.

Quant aux affinités doubles, il faut peu plus

de réflexions. Soit deux sels 1  2,

soit leur *température* exprimée par le nombre 610, on aura, pour la somme de l'affinité de leurs molécules, le nombre 1240; soit l'affinité de a pour c exprimée par 610, & celle de b pour d par 615: ces deux nombres réunis for-

ment un total de 1215. Ce nombre étant plus petit que 1240, la décomposition doit s'opérer. Si l'affinité de *a* pour *c* étoit de 610, & celle de *b* pour *d* de 625, il y auroit encore décomposition, parce que cette réunion ne formeroit qu'un nombre de 1235.

Cette méthode est suffisante pour les sels; mais pour les autres composés binaires, il faut faire une double opération pour déterminer si la décomposition doit ou ne doit pas avoir lieu. Sup-

posons toujours deux composés



soit de même la somme des températures 1240, soit l'affinité de *a* pour *c* exprimée par 630, & celle de *b* pour *d* par 615; alors il ne doit point y avoir de décomposition; parce que 1245 est plus fort que 1240: mais en renversant l'ar-

rangement & mettant 1



2, soit

l'affinité de *a* pour *d* de 615, & celle de *b* pour *c* de 620; alors il doit y avoir décomposition, parce que nous avons dans ce cas 1235. Je pourrais m'étendre davantage sur cet objet; mais je crois que le lecteur intelligent pourra, d'après ces faibles idées, découvrir les conséquences qu'on en peut déduire; je me propose d'ailleurs de suivre ce travail, il est déjà commencé, mais je rencontre à chaque pas de grandes difficultés, & il me faudra bien du temps pour les surmonter.

Je dois cependant, avant de finir cet article, faire une observation qui peut détruire des objections mal fondées. Les molécules de deux corps ayant la même température, ont entr'elles séparément la même affinité. Si donc, peut-on m'objecter, un troisième corps en décompose un de deux à cette température, il doit également décomposer l'autre. J'observerai que cette conséquence n'est pas juste. En effet, supposant deux corps *a* & *b* dont la température soit de dix degrés au-dessus de zéro, leur affinité respective sera représentée par le nombre 610. Soit un troisième corps dont l'affinité de molécule à molécule soit pareillement exprimée par le numéro 610, & dont l'affinité pour *b* soit exprimée par le nombre 609, alors la décomposition aura lieu; mais si son affinité pour *a* est de 620, il faudra élever les deux derniers corps à la température de 20 degrés au-dessus de zéro pour produire la décomposition. Les décompositions dépendent donc des affinités des molécules hétérogènes; & conséquemment deux corps qui ont la même température, & conséquemment la même affinité respective, peuvent n'être point décomposés tous les

deux par un troisième à cette température; mais à des degrés très-éloignés.

14°. Nous avons vu ci-dessus que les différences dans les températures dépendoient des différences dans les compressions du *calorique*, & que les attractions entre les molécules homogènes devoient s'égaliser pour ramener les corps à la même température. C'est en vertu de cette propriété, qu'il se produit de la chaleur ou du froid dans quelques mélanges qui forment de nouvelles combinaisons.

Pendant un mélange quelconque, il peut se produire de la chaleur ou du froid, soit par diminution ou augmentation de volume, soit par augmentation ou diminution d'affinité des nouvelles molécules, comparativement à celle qu'avoient les molécules homogènes les unes pour les autres; soit par une addition ou diminution du *calorique*, combiné avec les molécules du nouveau composé, comparativement à celui qui contenoient les molécules avant leur union; soit enfin parla réunion de ces différentes causes. Il est impossible, dans l'état actuel de nos connoissances, de séparer ces diverses circonstances, & de déterminer la véritable raison de chaque phénomène; mais il n'en pas moins vrai que ce sont les causes ci-dessus énoncées qui produisent la chaleur & le froid que l'on observe dans la combinaison de l'alcool, de l'acide sulfurique & du muriate de soude avec l'eau, & dans un grand nombre d'autres mélanges.

15°. L'explication que je viens de donner des divers phénomènes ci-dessus énoncés, m'est personnelle; mon opinion pouvant être hypothétique, je ne la présente pas comme une vérité démontrée; j'observerai seulement que j'ai cela de commun avec toutes les opinions que l'on a eues jusqu'à ce moment sur cet objet, & qu'on aura peut-être par la suite; les faits sont bien observés; mais ils ne font pas encore assez nombreux pour établir une véritable théorie; le plus grand effort que l'on puisse faire est de réunir en faveur de l'opinion que l'on adopte, un plus grand nombre de probabilités; nous ne devons donc pas, dans ce moment, admettre d'opinion exclusive; mais on peut & on doit, pour l'intérêt de la science, rassembler sous un même point de vue, les diverses explications, & laisser à chacun la liberté de choisir celle qui lui semble préférable; c'est souvent du choc des opinions que naissent les lumières, & c'est là le seul bien que peuvent opérer réellement les systèmes, & principalement leur réunion; c'est d'après cette considération que je me suis permis de présenter une manière de voir, qui, comme toutes celles qui ont pour but d'expliquer les phénomènes ci-dessus énoncés, n'est qu'hypothétique.

Je vais de même présenter les différentes opinions que l'on a eues jusqu'à ce moment sur la combustion,

combustion, en observant toujours que je n'en admet aucune exclusivement, & que je ne les réunis que pour faire naître aux personnes intelligentes, des idées qui pourront compléter une théorie.

16°. Nous avons vu ci-dessus qu'en rapprochant les molécules de l'eau, elles arrivent enfin aux degrés de rapprochement où les molécules de la glace ont plus d'affinité entr'elles que pour le *calorique*; c'est par la même raison, suivant ceux qui regardent le *calorique* comme un composé, que s'opère sa décomposition. Si l'on rapproche les molécules de sa base, tellement qu'elles aient plus d'affinité entr'elles qu'avec la lumière, elles s'unissent alors, & la lumière se dégage librement.

17°. Quelle que soit l'opinion que l'on adopte sur la nature du *calorique*, il paraît certain que la lumière qui se dégage pendant la combustion, provient, sinon totalement, du moins en grande partie, de la décomposition de l'air vital. Cet air est donc composé de lumière, de *calorique* & d'oxygène. Si la lumière n'est point partie constituante du *calorique*, il faut qu'elle soit ou interposée entre les molécules de l'air vital, ou combinée avec elles; mais dans l'un & l'autre cas, comme il y a dans l'air vital du *calorique* interposé & du *calorique* combiné, il faut que la lumière soit seulement mêlée avec le *calorique*. Je ne connois aucune expérience qui prouve que la lumière est mêlée avec le *calorique* ou qu'elle en forme une des parties constituantes. La question reste donc indécidée.

Je dois cependant observer que l'explication des physiciens qui regardent le *calorique* comme un être simple, présente une difficulté de moins que celle qui admet sa composition, en ce qu'elle ne suppose aucun principe; elle décrit les faits & rend ensuite raison des phénomènes d'une manière à la vérité hypothétique; mais que l'on ne peut renverser directement, parce que, conformément à la manière de raisonner que nous avons adoptée, elle n'admet que les principes qui lui paraissent agir & rejette tous ceux qui nous sont inconnus, soit parce qu'ils sont insensibles à nos instrumens, soit parce qu'ils ne produisent sur nos sens aucun effet. La seconde, au contraire, suppose l'existence d'un corps purement arbitraire, aucune expérience ne peut même le faire soupçonner; c'est sur des analogies qu'il est fondé; mais des analogies peuvent tout au plus favoriser des explications, & non des suppositions purement gratuites. On observera, avec raison, que cette base du *calorique* supposée doit, après la décomposition de ce principe, ou produire quelque effet sur nos sens, ou changer la nature des corps; mais aucun fait ne peut même faire soupçonner cette sensation ou ce changement; cette supposition est donc dénuée de preuves. Elle n'est fondée sur aucune expérience, & conséquemment,

Chimie. Tome II.

d'après la marche que l'on suit actuellement dans les sciences, on peut la regarder comme une pure hypothèse: il faut cependant convenir qu'en l'admettant, les phénomènes de la combustion s'expliquent d'une manière très-vraisemblable. Cette réflexion nous conduit nécessairement à la conclusion générale que les présomptions & les seules probabilités, même les plus fortes, ne doivent point nous faire donner la préférence à un système quelconque. En ne s'appuyant que de seules probabilités, on risque à se laisser entraîner de supposition en supposition, & à marcher conséquemment dans la route des chimères; il vaudroit beaucoup mieux ne rien expliquer que d'admettre des explications fausses, ou qui, du moins, ne sont pas prouvées directement ou indirectement. Cependant la réunion des opinions ne peut produire, à mon avis, qu'un très-grand bien.

18°. Dans la supposition que le *calorique* est un composé binaire, on peut expliquer les effets de la combustion de la manière suivante. Il se dégage de la lumière pendant la combustion, parce que le *calorique* étant subitement très-comprimé, il y en a une partie qui se décompose. Cette grande & subite compression du *calorique* provient, pendant cet acte, de l'union des molécules hétérogènes; le plus ou le moins de clarté dépend de la plus ou moins forte compression du *calorique*, & des quantités d'air vital décomposées dans un temps donné; toutes choses égales d'ailleurs, il doit se dégager plus de lumière pendant la combustion du phosphore, que pendant celle du charbon; dans le premier exemple, il se forme un solide, & conséquemment le *calorique* est comprimé plus promptement que dans le second, où il se forme du gaz acide carbonique.

Dans la détonation du gaz hydrogène, de même que pendant sa combustion, la lumière n'est pas si vive que dans la combustion du phosphore, parce que le *calorique* est moins comprimé dans la vapeur aqueuse, & qu'il y en a conséquemment moins de décomposition.

Le plus ou moins de lumière qui se dégage pendant la combustion, dépend donc en grande partie, en admettant la composition du *calorique*, de la plus ou moins grande quantité de *calorique* décomposé dans un temps donné. Il peut se faire qu'il se dégage de la lumière par quelqu'autre cause; mais nous ne pouvons encore former que des systèmes à cet égard.

19°. Si l'on fait chauffer une baguette de fer sans la rougir, & si on la forge ensuite rapidement, elle luira bientôt par incandescence; cet effet provient, en supposant toujours la composition du *calorique*, de ce qu'on le comprime alors, & que les molécules de sa base pouvant se réunir, il y en a une partie qui se décompose en laissant dégager la lumière.

Yyyy

On peut expliquer de la même manière, la *lumière* & la *chaleur*, qui se dégagent de quelques corps durs en les frottant, & de la chaux qui l'ou éteint.

20°. On peut, en regardant le *calorique* comme un être simple & distinct de la *lumière*, expliquer le phénomène que l'on observe en frottant ensemble deux morceaux de bois, en disant, qu'alors le *calorique* étant comprimé, il se dégage en partie, & élève le bois à la température où les molécules ont plus d'affinité avec l'oxygène qu'il n'en a avec le *calorique* & la *lumière*, & qu'alors l'air vital se décomposant, il se dégage de la *chaleur* & de la *lumière*, parce que toute le *calorique* & toute la *lumière* qui entrent dans la composition de l'air vital, n'entrent point dans la composition du gaz acide carbonique qui se forme.

Mais on ne peut pas expliquer de la même manière, le phénomène que l'on observe en frottant deux pierres; il n'y a point alors d'affinité supérieure, & conséquemment point de décomposition de l'air vital; il faut donc avoir recours à la pression; si la *lumière* est seulement interposée, il s'en dégage une partie, parce qu'elle est trop comprimée; mais si elle est partie constituante du *calorique*, il s'en dégage, parce que le *calorique* trop comprimé se décompose en partie.

21°. Si l'on admet la composition du *calorique*, on peut dire que la *chaleur* est l'effet produit sur nos sens par le *calorique* non décomposé, & que, par sa décomposition, il laisse dégager la *lumière* qui en faisoit une partie constituante.

Si la *lumière* s'unit aux molécules des corps, sans être préalablement combinée avec la base du *calorique*, on éprouve, dans l'explication qui admet la composition du *calorique*, une très-grande difficulté pour le dégagement de cette *lumière* non combinée avec la base du *calorique*; il faut alors avoir recours à l'explication qui regarde le *calorique* & la *lumière*, comme deux êtres simples & distincts l'un de l'autre, & qui attribue la plus ou moins grande quantité de *lumière* dégagée à la moindre ou plus grande affinité des molécules du nouveau composé pour ce principe; mais si l'on admet cette explication pour le dégagement de la *lumière* non combinée avec la base du *calorique*, pourquoi ne pas l'admettre pareillement pour ce dégagement du *calorique* que l'on peut soupçonner dériver absolument de la même cause, & qu'on peut alors regarder comme un être simple? On éviteroit alors une très-grande supposition, celle d'une base qui est absolument inconnue, & dont il est impossible dans l'état actuel de nos connoissances, de nous former aucune idée.

La *chaleur* qui se dégage pendant la combustion d'un corps est d'autant plus vive, qu'il se consume en moins de temps; ce n'est pas qu'il se produise plus de *chaleur*, mais seulement parce

qu'elle a moins de temps pour se répandre uniformément.

22°. En admettant la composition du *calorique*, on pourroit demander ce que devient la base après sa décomposition; il est possible qu'elle reste unie au corps brûlé, ou qu'elle se répande dans l'atmosphère, c'est ce que je ne fais pas; il faudroit des expériences multiples & bien exactes, pour avoir des idées nettes sur cet objet. Cependant, en attendant cette décision, l'objection demeurant irrésolue, doit faire rejeter la composition du *calorique* par tous ceux qui n'admettent point de sylèmes.

23°. Si l'on regarde le *calorique* comme un être simple, on peut expliquer la plus ou moins grande quantité de *lumière* & de *calorique* qui se dégage pendant la combustion par la moindre ou plus grande quantité de *lumière* & de *calorique* qui entre dans la composition des molécules des corps brûlés; plus les molécules d'un corps brûlé doivent contenir de *lumière* & de *calorique* pour passer à cet état, & moins il se produit de *lumière* & de *chaleur* pendant la combustion.

24°. Il doit aussi se dégager plus de *chaleur*, toutes choses égales d'ailleurs, dans les combustions dont les produits sont solides, que dans celles où il se forme des liquides ou des fluides. Cependant, comme il paroît qu'il entre du *calorique* dans la composition des molécules de quelques solides, peut-être même de tous, & que plusieurs en contiennent une grande quantité dans un état de compression très-considérable, il est possible que cet énoncé souffre quelques exceptions.

C'est, je crois, en raison de cette grande compression du *calorique* combiné que l'oxide d'argent fulminant détone si-tôt qu'on le touche. Les molécules de cet oxide sont à la température où nous vivons presque à la distance où elles peuvent se réunir pour former de nouveaux composés: si-tôt qu'on les comprime, elles se réunissent; l'oxygène s'unit à l'hydrogène pour former de l'eau & l'azote, devenu libre, se dégage également. Cette première explication est la même en admettant l'une ou l'autre des hypothèses ci-dessus énoncées, c'est-à-dire, en regardant le *calorique* comme un être simple ou comme un composé binaire; mais le dégagement de *lumière* & de *chaleur* ne dérive pas de la même source dans les deux explications.

Si l'on admet la composition du *calorique*, on peut dire, qu'autantôt que l'eau se forme & que l'azote se trouve isolé, une partie du *calorique* s'unit aux molécules de l'eau & aux molécules de l'azote pour former de la vapeur aqueuse & du gaz azote; l'autre partie du *calorique* se trouve interposée entre les molécules de ces deux nouveaux composés; mais le ca-

lorique interposée n'écartant pas assez promptement ces mêmes molécules, il se trouve sur-le-champ comprimé au point de se décomposer en partie: une portion se dégage librement pour rétablir l'équilibre de température, tandis que l'autre se décomposant, laisse dégager la lumière qui entretient dans sa décomposition. En admettant cette explication, il faut supposer qu'il n'est point dans la composition des molécules de la lumière non combinée avec la base du calorique.

Quant à l'explosion, elle provient de ce que la vapeur aqueuse & le gaz azote sont considérablement dilatés; mais l'équilibre de température se rétablissant promptement, il se forme un vide qui est sur-le-champ rempli par l'air environnant.

Si, au contraire, on regarde le calorique comme un être simple, du moins dans l'état actuel de nos connoissances, on peut expliquer la détonation de l'argent fulminant de la manière suivante. L'expérience indique que l'oxide d'argent fulminant est composé d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, de lumière & de calorique; la moindre compression facilite la combinaison de l'oxygène & de l'hydrogène, parce qu'on rapproche par ce moyen leurs molécules. Aussitôt que ce nouveau composé est formé, l'azote se trouve libre; alors le calorique & la lumière qui sont nécessaires à la constitution des vapeurs aqueuses & du gaz azote, se combinent avec leurs molécules, & le calorique & la lumière qui ne se combinent point, se dégagent, soit pour établir l'équilibre, soit parce que ces substances sont trop comprimées.

Rapprochons maintenant ces deux explications pour voir en quoi elles diffèrent.

En admettant la composition du calorique, l'oxide d'argent fulminant est composé en dernière analyse, d'oxygène, d'hydrogène, d'azote & de calorique (c'est-à-dire, de sa base & de lumière); il peut se faire aussi qu'il entre dans chaque de la lumière non combinée à d'autres principes, ce qui même est très-probable, & alors cette première explication ne peut point servir à cette portion de lumière; il faut avoir recours à celle des physiciens qui regardent le calorique & la lumière comme des êtres simples, ainsi que je l'ai observé ci-dessus. Les substances qui proviennent de la décomposition de cet oxide sont le gaz azote & les vapeurs aqueuses. Ce gaz azote est composé d'azote & de calorique (c'est-à-dire, de sa base & de la lumière qui y est unie), & la vapeur aqueuse est composée d'hydrogène, d'oxygène & de calorique.

En regardant, au contraire, le calorique comme un être simple & distinct de la lumière, l'oxide d'argent fulminant est composé d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, de calorique & de lumière. Le gaz azote est composé d'azote & de calorique, & la vapeur aqueuse est composée d'hy-

drogène, d'oxygène & de lumière. Il est possible que ces deux derniers composés contiennent de la lumière, mais elle n'y a point encore été démontrée; d'après cette dernière opinion, la lumière & le calorique qui entrent en grande quantité dans la composition de l'oxide d'argent fulminant, doivent se dégager presque totalement, parce qu'il en entre beaucoup moins dans la composition du gaz azote & de la vapeur aqueuse. Je le répète, cette dernière explication jouit de l'avantage de ne rien supposer, & de n'employer que les substances qui sont ou palpables, ou sensibles à nos sens; tandis qu'en admettant la composition du calorique, on est obligé de supposer un corps dont on ne peut se former aucune idée.

Il est vrai qu'on peut demander d'où vient le calorique? s'il est envoyé avec la lumière par le soleil, ou si notre planète en contient une quantité indestructible qui se renouvelle sans cesse? Pourquoi la lumière, pouvant se combiner avec les molécules des corps, ne se fixe point dans celles de notre atmosphère, & parvient jusqu'à nous? effect qu'il provient sans doute de ce que ses molécules sont saturées, & ne peuvent plus en recevoir. Pourquoi les températures varient d'un instant à l'autre, & sont très-différentes dans les mêmes saisons? Mais il est des choses en'il n'est même pas permis de chercher à expliquer, lorsque les expériences ne sont pas assez multipliées pour appuyer l'explication.

15. Le nitrate & le muriate suroxygéné de potasse, & peut-être beaucoup d'autres corps solides, contiennent aussi de la lumière & du calorique combiné avec les molécules & constituant leur nature; mais ces quantités diffèrent dans presque tous les corps, & dépendent d'attractions qui nous sont connues. Il paroît, par exemple, qu'il entre plus de calorique & plus de lumière dans la composition des molécules du muriate suroxygéné de potasse, que dans celles du nitrate de potasse, & c'est de cette plus grande quantité que dépend la force supérieure de la poudre faite avec le muriate suroxygéné de potasse.

Outre ces quantités différentes de calorique & de lumière dans les corps, il paroît encore certain que ces substances ne font pas également comprimées dans toutes leurs combinaisons. Il paroît que dans l'argent fulminant, elles sont à un état de compression très-considérable; qu'il en est de même dans le nitrate de potasse, elle le sont encore. Dans l'oxide d'argent fulminant, le moindre effort facilite la réunion de l'hydrogène & de l'oxygène. Dans le muriate suroxygéné de potasse, il faut un effort un peu plus considérable, tel, par exemple, que le frottement entre deux pierres dures, ainsi que l'a observé M. Lavoisier; & dans le nitrate de potasse, cet effort ne peut, en le supposant même très-considérable, faciliter sa

décomposition : il seroit possible cependant qu'à une température excessivement basse cet effet eût lieu.

La décomposition d'un corps peut conséquemment provenir de deux causes différentes, ou de l'abaissement de température, ou du contact d'un autre corps à une température plus élevée.

26°. On peut encore expliquer de deux manières la fulmination du muriate furoxigéné de potasse par l'acide sulfurique, observée par MM. Fourcroy, Berthollet & Pelletier.

Suivant l'opinion que le *calorique* est un composé binaire, le muriate furoxigéné de potasse, d'oxygène, de lumière unie à la base du *calorique*, & peut-être de lumière qui n'est point préalablement unie avec cette base : la proportion du *calorique* est très-considérable dans ce composé. Si donc on y ajoute de l'acide sulfurique, il s'unira avec la potasse, en vertu d'une affinité supérieure; alors l'acide muriatique & l'oxygène devenus libres, se dégageront en se combinant avec le *calorique*, sous la forme de gaz muriatique oxygéné & d'air vital. Mais comme tout le *calorique* ne sera pas employé à ces nouvelles combinaisons, c'est-à-dire, à la formation du sulfate de potasse, du gaz muriatique oxygéné & de l'air vital, il y en aura une partie qui se trouvera interposée entre les molécules; cette portion doit les écarter, mais si ce pouvoir ne surpasse pas l'affinité des molécules, une certaine quantité de *calorique* se trouvant à son maximum de compression, se décomposera, & la lumière qui en formoit une partie constituante, produira sur nos sens l'effet que nous nommons *clarté*; une autre partie du *calorique* interposé se dégagera pour établir l'équilibre de température; mais n'étant point alors décomposée, elle produira sur nos sens l'effet que nous nommons *chaleur*. On peut, dans la même supposition, expliquer de la même manière la détonation de la poudre ordinaire, de celle faite avec le muriate furoxigéné de potasse, de la poudre fulminante, en observant seulement que pour produire les mêmes effets avec ces corps, il faut opérer à une température un peu plus élevée.

Mais il reste encore à expliquer pourquoi & comment la lumière qui peut être combinée avec les molécules sans être unie à la base du *calorique*, se dégage dans cette circonstance.

Si au contraire on regarde le *calorique* comme un être simple, on peut expliquer les phénomènes ci-dessus énoncés de la manière suivante. On peut admettre que l'oxygène se combine aux corps dans différents états; quelquefois il s'y unit après avoir perdu tout le *calorique* & toute la lumière qui le constituoient air vital; plus souvent il conserve une partie de ce *calorique* & de cette lumière; & d'autre fois enfin il conserve en se combinant presque tout le *calorique* & toute la lumière qui sont nécessaires à la constitution de

l'air vital. Le nitrate & le muriate furoxigéné de potasse, sont à peu-près dans ce dernier cas; il est bien certain que le *calorique* & la lumière qu'ils contiennent doivent être à un état de compression très-considérable. Si on leur ajoute un nouveau corps qui, à une température quelconque ait plus d'affinité avec leurs molécules qu'elles n'en ont entr'elles, il y aura décomposition, & les effets seront semblables dans cette circonstance à ceux que l'on observeroit si le corps combustible mis en contact se consumoit à l'air libre. Quant aux autres corps qui contiennent de l'oxygène uni à une moins grande quantité de *calorique* & de lumière, les effets pendant leur décomposition par un corps combustible mis en contact, sont d'autant moins sensibles, que cette quantité est plus petite.

Nous venons de dire ci-dessus que les effets produits par la détonation des corps qui contiennent de l'air vital très-comprimé, étoient semblables à ceux qu'on observeroit si le corps combustible mis en contact se consumoit à l'air libre; si y a cependant une différence, c'est que la combustion s'opérant bien plus rapidement, la *chaleur* est d'autant plus vive, qu'elle a moins de temps pour se répandre, & que la lumière dégagée étant alors rassemblée, doit paroître plus considérable.

27°. La compression du *calorique* combiné, dépend de la nature des corps, il paroît cependant que celui qui entre dans la composition des fluides est moins comprimé que celui qui entre dans la composition des liquides & des solides. Dans l'état actuel de nos connoissances, il est impossible de déterminer avec exactitude ces différentes compressions.

28°. Dans les combustions lentes, telles que l'oxidation du mercure à l'air libre, il ne se dégage point de lumière, ou du moins il s'en dégage en si petite quantité, qu'elle nous paroît insensible. Dans la supposition que le *calorique* est un composé binaire, cet effet provient de ce que le *calorique* se dégageant très-lentement n'est point subitement comprimé, & conséquemment point décomposé; il ne produit alors que de la *chaleur* qui cependant est peu sensible, parce qu'elle se dégage en très-petite quantité. Dans la supposition au contraire que le *calorique* est un être simple, cet effet provient de ce que la lumière & le *calorique* que perd l'air vital en se décomposant se dégagent si lentement, que nous n'obtenons point d'obscurité assez forte pour la rendre sensible.

Dans la première supposition, les lampes à la Quinquet donnent plus de *clarté*, parce qu'il y a plus de *calorique* dégagé dans un temps donné, conséquemment une compression & une décomposition plus considérable de ce principe. Dans la seconde, au contraire, cet effet provient de ce qu'il y a plus d'air vital décomposé dans un

temps donné, conséquemment plus de lumière & de calorique dégagés, parce que tout le calorique & toute la lumière qui entrent dans la composition de l'air vital ne se combinent point avec le gaz acide carbonique & la vapeur aqueuse qui se forment dans cette circonstance.

29°. Dans deux combustions où il se forme des gaz & où la quantité d'air vital décomposé dans un tems donné est égale, la quantité de lumière dégagée doit être, dans la supposition que le calorique est composé, en raison inverse de la dilatabilité des gaz formés; & dans la supposition que le calorique est un être simple, en raison inverse de l'affinité qu'ont les molécules des nouveaux gaz pour la lumière.

Pour vérifier cet énoncé, il faudroit connoître la dilatabilité des gaz & la quantité de lumière dégagée pendant la combustion des corps. Plusieurs physiciens distingués, & entr'autres M. Lefebvre, professeur au collège royal, ont fait des travaux considérables pour déterminer la dilatabilité des gaz. Les recherches de ce dernier physicien seront sous peu de temps présentées au public; quant à la quantité de lumière dégagée, j'ai jusqu'ici tenté vainement de la mesurer; je n'ai point encore pu imaginer d'appareil propre à ce genre d'expériences: je ne perdrai cependant pas cet objet de vue, & je commencerai ce travail le plutôt que je pourrai.

30°. Nous avons vu ci-dessus que les corps solides ne se liquéfient pas tous à la même température; il en est qui ne peuvent jamais subir ce changement, parce que l'affinité qu'ont leurs molécules pour l'oxygène est plus forte que celle qu'elles peuvent avoir pour le calorique. Les bois, les charbons & presque toutes les substances concrètes combustibles sont dans ce cas: il en est de même de beaucoup d'autres substances combustibles liquides qu'on ne peut obtenir dans l'état de vapeur.

31°. Il est encore une autre classe de corps qui, quoiqu'inc combustibles, ne changent cependant pas d'état; nous les nommons *apies*. Si l'on admet la composition du calorique, on peut dire qu'ils jouissent de cette propriété, parce que l'attraction de leurs molécules est supérieure au pouvoir qu'a le calorique de les écarter; à mesure que l'on en augmente la quantité, il se trouve de plus en plus comprimé: il arrive enfin un moment où la compression est telle, que les molécules de sa base ont plus d'affinité entr'elles qu'avec la lumière; & elles se réunissent donc, & la lumière se dégage en produisant sur nos sens l'effet que l'on nomme *éclair*: mais comme tout le calorique n'est point décomposé, il s'en dégage une partie qui produit de la chaleur.

Il ne faut pas cependant confondre les corps *apies* avec ceux qui rougissent avant de se fondre. Les molécules des premiers ont aux températures les plus élevées que nous pouvons obte-

nir, plus d'affinité entr'elles qu'avec le calorique; tandis que celles des seconds s'unissent à un certain degré d'écartement avec ce principe, & changent alors d'état. Ils rougissent avant de se fondre, parce que leurs molécules ayant beaucoup d'affinité entr'elles, il faut employer une grande quantité de calorique pour la vaincre; une partie de ce calorique trop comprimé se décompose, tandis que l'autre portion s'écarte de plus en plus les molécules.

En ne regardant pas le calorique comme un composé binaire, on peut expliquer la chaleur rouge en disant qu'à cet état les molécules des corps ayant toute la quantité de lumière qu'elles peuvent contenir, la rejettent si-tôt qu'on la leur communique; tandis que le calorique appliqué écarte les molécules des corps *apies* jusqu'à ce que l'affinité qu'elles ont les unes pour les autres surpasse le pouvoir qu'a le calorique de les écarter. Quant aux corps qui ne sont pas *apies*, mais qui rougissent avant de se fondre, le calorique appliqué écarte leurs molécules jusqu'à ce qu'elles aient plus d'affinité avec le calorique qu'elles n'en ont entr'elles.

CHAPITRE HUITIÈME.

Résultats rapprochés des considérations précédentes & conclusion de la première partie de la dissertation.

Il est aisé de voir, d'après ce que nous avons dit ci-dessus, que la théorie du docteur Crawford, est fondée sur ce qu'il croit, 1°. que les dilatations du mercure sont proportionnelles aux augmentations de calorique, depuis le terme de la congélation jusqu'à celui de sa vaporisation; 2°. que la capacité des corps est permanente à toutes les températures, tant qu'ils ne changent pas d'état; 3°. que le calorique ne se combine dans aucune circonstance avec les molécules d'un corps, & conséquemment que l'absorption ou la communication de calorique pendant les changements d'état, provient seulement d'un changement de capacité; 4°. & que par une conséquence qui dérive des précédentes énoncées, le calorique spécifique est proportionnel aux capacités. Reprenons ces énoncés.

1°. Les dilatations du mercure sont proportionnelles aux augmentations de calorique depuis le terme de sa congélation jusqu'à celui de sa vaporisation. En admettant cet énoncé qui n'est qu'une supposition déduite des expériences du docteur Crawford, qui prouvent seulement que les dilatations du mercure sont proportionnelles aux augmentations du calorique depuis le terme de la congélation de l'eau jusqu'à celui de sa vaporisation, le thermomètre ne peut nous servir, quant aux températures, qu'à déterminer si celles d'un corps est plus haute que celle d'un autre corps, depuis le terme de la congélation du mercure jus-

qu'à celui de sa vaporisation. Je me suis assez étendu sur cet objet dans le second chapitre pour ne pas y revenir.

2°. La *capacité d'un corps est permanente à toutes les températures*, tant qu'il ne change pas d'état, & le *calorique spécifique est en raison inverse des changements produits dans la température des corps, lorsqu'ils sont égaux en poids*, ou les mèle à différents degrés. Comme le docteur Crawford pense que les *capacités* sont proportionnelles au *calorique spécifique*, ces deux énoncés se réduisent véritablement à un, car si-tôt qu'on a déterminé les *capacités*, on doit connoître les rapports entre le *calorique spécifique*. Mais il est nécessaire, pour que les *capacités* soient proportionnelles aux *quantités spécifiques de calorique*, qu'elles soient permanentes à toutes les températures, tant que les corps ne changent pas d'état, & que l'absorption de *calorique* pendant ces changements, provienne seulement d'un changement de *capacité*. Nous avons fait voir ci-dessus que cette dernière proposition n'étoit appuyée sur aucune balle solide, & qu'en ne déduisant rien au-delà des faits, on devoit penser que le *calorique* absorbé pendant les changements d'état, se combinait avec les molécules des corps. Quant à la permanence de *capacité*, il s'en faut de beaucoup qu'elle soit démontrée. Comme le docteur Crawford emploie les mélanges pour déterminer les *capacités* & leur permanence, & qu'il se sert d'eau pour terme de comparaison, il ne peut opérer que sur une échelle de 80 degrés à-peu-près, & conséquemment il ne peut, d'après sa méthode, en supposant encore que les dilatations du mercure soient proportionnelles aux augmentations de *calorique*, & que la *capacité* de l'eau soit permanente tant qu'elle ne change pas d'état, que déterminer, 1°. si la *capacité* des solides qui ne se liquéfient qu'au degré de *chaleur* à-peu-près où l'eau se vaporise, est permanente, depuis le terme de la congélation de l'eau, jusqu'à celui de sa vaporisation; travail qui, en le supposant fini sans avoir aperçu aucune variation, ne prouveroit point, encore que la *capacité* des corps solides est permanente depuis le zéro réel jusqu'aux degrés où il faut respectivement les élever pour les liquéfier; 2°. si la *capacité* des liquides est permanente, tant qu'ils ne changent pas d'état; 3°. enfin si celle des fluides qui, ne se liquéfient qu'au degré où l'eau se solidifie, est permanente, depuis ce terme jusqu'à celui de l'eau bouillante, résultat qui, en le supposant exact, ne pourroit pas conduire à la conclusion générale que la *capacité* des fluides est permanente, depuis le degré où ils peuvent individuellement se former jusqu'au plus haut degré de *chaleur*.

Je ne parle point ici des solides & des fluides qui se liquéfient à des températures intermédiaires aux termes de la congélation de l'eau & de la vaporisation, parce que l'échelle sur laquelle on

peut opérer dans des circonstances, est d'autant plus courte, que les changements ont lieu plus près, pour les solides, de la congélation de l'eau, & pour les fluides, de sa vaporisation.

L'absorption de *calorique*, pendant les changements d'état, ne provenant donc pas seulement d'un changement de *capacité*, le *calorique spécifique* ne peut point être proportionnel aux *capacités*; & comme il n'est point prouvé que les *capacités* sont permanentes à toutes les températures, le *calorique interposé* ne peut pas non plus être proportionnel aux *capacités*; les *capacités* ne peuvent donc servir, dans l'état actuel de nos connoissances, à déterminer ni le *calorique spécifique*, ni le *calorique interposé*, & la méthode du docteur Crawford, en supposant qu'il n'existe point de différence dans les *capacités* des corps depuis le terme de la congélation de l'eau jusqu'à celui de son ébullition, ne peut guère servir qu'à déterminer leur rapport dans cette courte échelle.

Si cependant il existoit des différences dans les *capacités* des solides, liquides ou fluides, soit qu'elles augmentassent ou diminuaient, on ne pourroit pas, en se servant de cette méthode, déterminer le rapport de ces variations. Néanmoins comme il est probable que dans une si courte échelle les *capacités* ne varient pas très-sensiblement, on peut, à la rigueur, se servir des mélanges pour déterminer le rapport qui existe entre elles, depuis le terme de la congélation de l'eau, jusqu'à celui de son ébullition; mais on ne peut pas de même déterminer, d'après les *capacités*, le *calorique interposé*, & à plus forte raison, le *calorique spécifique*. Nous ne connoissons encore aucun moyen d'opérer cette détermination.

Il est encore nécessaire d'observer qu'en supposant même la permanence des *capacités*, elles seroient proportionnelles au *calorique interposé à température égale*; mais elles ne pourroient pas déterminer le *calorique spécifique*.

Ces réflexions prouvent que la méthode du docteur Crawford, abstraction faite des sources d'erreurs très-nombrées dont elle est susceptible, est d'une utilité bornée, & qu'elle ne peut, dans aucune circonstance, servir pour les corps qui ont de l'action les uns sur les autres.

La méthode qu'on employée MM. Lavoisier & Laplace, pour parvenir à-peu-près au même but, est d'un usage plus général, & donne des résultats bien moins incertains. Rapportons ses utilités, afin de mettre le lecteur à même de les comparer avec celles de la méthode du docteur Crawford.

Je ne décrierai point ici l'appareil imaginé par MM. Lavoisier & Laplace, & nommé *calorimètre* par le premier de ces physiciens. Les personnes qui désireront le connoître & savoir comment on doit s'en servir, doivent consulter

le mémoire fut la *chaleur*, publié dans le volume de l'académie pour 1790, & l'abrégé de chimie de M. Lavoisier. (Voyez le mot CALORIMÈTRE.)

Je dois cependant observer que M. Wilke avoit eu, avant les physiciens françois, l'idée d'employer la fonte de la neige, pour mesurer le *calorique* dégagé des corps pendant leur refroidissement d'un certain nombre de degrés; mais la difficulté de recueillir l'eau formée; le temps considérable que les corps emploient ainsi à perdre une partie de leur *calorique*; la *chaleur* que la neige reçoit, dans cet intervalle, de l'atmosphère & des autres corps environnans, toutes ces raisons l'ont forcé d'abandonner ce moyen, & de recourir à la méthode des mélanges. MM. Lavoisier & Laplace ne connoissoient point les travaux de M. Wilke à l'instant où ils ont publié leur mémoire. Le *calorimètre* est donc une nouvelle découverte qu'on peut & qu'on doit leur attribuer. Ils ont pourvu, en faisant construire cet instrument, aux inconvéniens qui avoient rebuté M. Wilke, & l'ont rendu conséquemment extrêmement précieux.

Dans l'état actuel de nos connoissances, en supposant que les dilatations du mercure sont proportionnelles aux augmentations du *calorique*, depuis le terme de la congélation de l'eau jusqu'à celui de la vaporisation du mercure, le *calorimètre* peut nous servir à déterminer, 1°. les rapports qui existent depuis le terme de la congélation de l'eau jusqu'à celui de la vaporisation du mercure entre les *capacités* des solides qui ne se liquéfient qu'au degré où le mercure se vaporise, de presque tous les liquides, & des fluides qui ne se liquéfient qu'au degré de la glace fondante. MM. Lavoisier & Laplace supposent que, dans ce court espace, ce rapport est constant, parce que l'expérience ne leur a point fait voir de différence; aussi ne déterminent-ils les *capacités* que pour cet intervalle. Quant aux solides & aux fluides qui se liquéfient aux degrés intermédiaires à la congélation de l'eau & à la vaporisation du mercure, on peut en faire une classe à part, parce que ces expériences sont d'autant moins exactes qu'on opère sur une échelle plus courte.

2°. On peut déterminer par le même moyen, si les *capacités* des solides, des liquides & des fluides, jouissent des propriétés ci-dessus énoncées, sont permanentes depuis le zéro du thermomètre jusqu'au degré où le mercure se vaporise; & dans le cas où cette loi n'existeroit pas, on peut trouver les rapports existans entre leur *capacité* à chaque degré intermédiaire à cet espace. D'après les expériences de MM. Lavoisier & Laplace, il paroît que si les *capacités* ne sont pas permanentes depuis le terme de la glace fondante jusqu'à celui de l'ébullition de l'eau, les différences qui peuvent exister entre elles sont à peine sensibles au *calorimètre*. Ils se proposent

d'examiner si les *capacités* sont permanentes dans une plus longue échelle, en observant si les quantités de glace fondue par les corps, en se refroidissant de trois ou quatre cents degrés, sont proportionnelles à celles que l'on obtient lorsqu'ils se refroidissent de 60 ou 80 degrés. Je ne connois point de thermomètre qui puisse servir à déterminer une si haute température; mais j'observerai seulement qu'il est nécessaire que, si ses divisions sont égales entre elles, les dilatations du corps avec lequel il sera fait, soient proportionnelles aux augmentations de *calorique*, ou, ce qui revient au même, qu'il soit divisé proportionnellement aux quantités de *calorique* contenues dans le corps qui le compose.

3°. On connoitra les quantités de *calorique* qui se dégagent des liquides qui se solidifient, & des fluides qui se liquéfient, aux températures intermédiaires au zéro du thermomètre, & au terme où le mercure se vaporise. Si l'on possédoit un thermomètre qui marcat un degré de *chaleur* supérieur, & qui possédât en même temps les qualités ci-dessus décrites, on pourroit étendre cet énoncé.

4°. On trouvera de même les quantités de *calorique* qui se dégagent pendant la combinaison de diverses substances.

5°. Celles qui sont absorbées pendant la combinaison d'autres substances.

6°. Enfin les quantités de *calorique* qui se dégagent pendant la respiration & la combustion.

En comparant ces deux méthodes, on remarque aisément que celle de MM. Lavoisier & Laplace peut résoudre différens problèmes, dont la solution est impossible, en se servant de la méthode du docteur Crawford; celle des physiciens françois n'est fondée sur aucune supposition; la quantité de glace fondue est toujours proportionnelle à la quantité de *calorique* dégagé; les conséquences dérivent immédiatement des expériences; les corrections sont inutiles; & conséquemment s'il existe des variations, elles doivent être sensibles, parce qu'elles ne sont pas susceptibles d'être éclipsées par les calculs qui seroient nécessaires pour corriger les causes d'inexactitude s'il en existoit.

Ainsi, si les *capacités* ne sont pas permanentes, la méthode du docteur Crawford ne peut guère, à la rigueur, donner aucun résultat exact, tandis que celle de MM. Lavoisier & Laplace peut résoudre plusieurs problèmes très-intéressans. Cette dernière est donc préférable à la première.

Cependant il faut convenir qu'elle ne peut pas servir à compléter une théorie sur la *chaleur*, parce qu'on ne peut pas par son moyen déterminer, 1°. les *capacités* de tous les corps qui ont une température plus basse que le zéro du thermomètre ou plus haute que le degré où le mercure se vaporise; 2°. le *calorique* combiné aux

molécules des corps solides, & conséquemment le *calorique combiné* des liquides & des fluides; 3°. le *calorique interposé*; 4°. le *calorique spécifique*; 5°. la permanence des *capacités* à toutes les températures. Il n'en est pas moins vrai que dans son genre le *calorimètre* est aussi parfait qu'il peut l'être, & qu'il est d'une très-grande utilité, & même sous certain rapports, d'une utilité presque générale.

Examinons maintenant les conditions qui sont nécessaires pour compléter une théorie sur la *chaleur*.

Il faudroit, 1°. déterminer les *capacités* de tous les corps de la nature, dans les trois modifications dont ils sont susceptibles; & si les *capacités* ne sont pas permanentes, ou si les variations qu'elles peuvent éprouver ne suivent point de progression constante, il faudroit les déterminer à tous les degrés, depuis le zéro réel jusqu'au plus haut degré de *chaleur*. Pour remplir cette première condition, il faudroit qu'on pût opérer à toutes les températures, depuis le zéro réel jusqu'au plus haut degré de *chaleur*, & qu'on possédât une méthode & des instrumens propres à remplir cet objet; 2°. construire un thermomètre avec un solide qui ne se liquéfie qu'au plus haut degré de *chaleur*, & dont les dilatations, si les divisions sont égales entr'elles, fussent considérables, proportionnelles aux augmentations de *calorique*, & commençassent au zéro réel, ou, ce qui revient au même, dont les divisions fussent proportionnelles aux quantités de *calorique* contenues dans le corps qui servirait à le construire, & commençassent au zéro réel; 3°. déterminer les quantités de *calorique* absorbées ou dégagées pendant les changemens d'état; 4°. déterminer les quantités de *calorique* nécessaire à la formation de tous les solides individuellement; 5°. remarquer les degrés où s'opèrent les divers changemens d'état; 6°. déterminer le *calorique interposé* de tous les corps dans les trois états de modifications & à toutes les températures; 7°. connaître pareillement le *calorique combiné* dans les trois états de modification; 8°. ces deux quantités réunies formeroient le *calorique spécifique* qu'on pourroit conséquemment déterminer à toutes les températures.

En remplissant toutes ces conditions, les calculs seroient exacts, les résultats satisfaisans, & on pourroit avoir une théorie complète de la *chaleur*. Mais qu'on envisage les difficultés que l'on doit éprouver, les demandes forcées qu'on est obligé de faire, l'imminence de la carrière qu'il faudroit parcourir pour donner des loix constantes & certaines sur les effets du *calorique*, l'utilité dont peuvent être ces recherches, les basses conséquences qu'on en peut tirer, le degré d'élévation où elles porteroient presque toutes les sciences; les utilités bornées que l'on peut tirer, dans quelques circonstances, des ins-

trumens & des méthodes que nous possédons, & l'on verra avec regret, combien le terme où nos connoissances seront exactes sur cet objet, est encore éloigné.

SECONDE PARTIE.

Observations sur les méthodes indiquées, & sur les expériences faites pour déterminer, 1°. le zéro réel; 2°. la capacité de différens corps, & particulièrement de la vapeur aqueuse; conséquence qu'on peut déduire de ces divers résultats.

CHAPITRE PREMIER.

Observations sur les méthodes employées pour déterminer les capacités des solides & des liquides, & sur les moyens de corriger & d'éviter en partie les erreurs dont celle du docteur Crawford est susceptible.

Nous avons vu dans la première partie qu'en se servant des mélanges pour la détermination des *capacités*, il est absolument nécessaire de corriger & d'éviter autant qu'il est possible les sources d'erreurs qui peuvent faire varier les résultats; je crois donc devoir présenter les précautions qu'il faut prendre & les corrections qu'il faut faire lorsqu'on se sert de cette méthode.

1°. Après avoir bien mêlé la substance dont on veut déterminer la *capacité* avec celle qui sert de terme de comparaison, il faut assez ordinairement une minute pour que la température du mélange devienne uniforme; il est donc nécessaire de calculer la quantité de *calorique* que le mélange communique pendant ce temps à l'atmosphère.

Lorsqu'un corps dont la température est beaucoup plus élevée que celle du milieu environnant se refroidit promptement, les quantités de *calorique* qu'il lui communique dans des momens successifs sont à-peu-près en progression géométrique. Lorsqu'au contraire la température n'est pas beaucoup plus élevée que celle du milieu environnant, & qu'il se refroidit lentement, les quantités de *calorique* communiqué dans des momens successifs sont si sensiblement égales, que les thermomètres les plus exacts ne peuvent indiquer les différences.

Dans le premier cas, il faut calculer la quantité de *calorique* perdue pendant la première minute, d'après la série des nombres déterminés par l'observation. On peut dans le second, regarder la quantité de *calorique* communiquée à l'atmosphère pendant la première minute, comme égale à celle qui lui est communiquée pendant la minute qui la suit immédiatement.

Dans quelques expériences la température du mélange ne devient uniforme qu'au bout de quel-

ques minutes ; c'est alors , à partir de ce moment , qu'on doit observer les différences pour constater la quantité de *calorique* perdu pendant les minutes subséquentes.

2°. Si l'on verse la substance chaude dans la froide , elle perd en passant au travers de l'air environnant une portion de son *calorique spécifique* ; pour éviter cette cause d'inexactitude , il faut que la substance froide ait la même *température* que l'air du lieu ; on peut alors la verser dans la substance chaude sans craindre qu'en traversant l'atmosphère , elle lui communique une partie du *calorique* qu'elle contient.

3°. En versant la substance chaude dans le vaisseau qui contient la froide , il reçoit une certaine quantité de *calorique*. Si l'on verse au contraire la substance froide dans le vaisseau qui contient la chaude , elle reçoit du *calorique* non-seulement de la substance chaude , mais encore du vaisseau.

Pour corriger cette sorte d'erreur , il faut déterminer le rapport existant entre la capacité du vase pour admettre le *calorique* entre ses molécules , & celle de la substance qui sert de terme de comparaison ; on peut employer à cet effet un des moyens dont se servoit le docteur Crawford ; je le choisis parce qu'il est extrêmement simple.

On introduit le vaisseau dans un autre vase dont le diamètre est un peu plus grand , & qui de tous côtés est environné d'eau très-chaude ; on a le soin de couvrir l'appareil avec un large couvercle , afin d'empêcher l'accès de l'air extérieur. Lorsque le vase intérieur a acquis la *température* désirée , on examine le thermomètre qui y est plongé : supposons qu'il s'arrête à 40 degrés ; on y verse alors une certaine quantité d'eau ; supposons-là de 12 liv. & supposons pareillement que la *température* soit de 12 degrés avant l'introduction ; on agite , & au bout de quelques instans on examine le thermomètre ; si la *température* de l'eau est alors de 14 degrés , on pourra conclure que la *température* de l'eau à été augmentée de 2 degrés , & que celle du vase a été diminuée de 17 , & conséquemment que la capacité du vaisseau est à celle de 12 liv. d'eau , comme 1 est à 27.

On s'enoncera donc clairement en disant que le vaisseau doit communiquer ou recevoir autant de *calorique* que 7,11 onces d'eau ; car 12 liv.

$$= 192 \text{ onces , } \& \frac{192}{27} = 7,11 \text{ onces.}$$

Lorsqu'on a ainsi déterminé la capacité d'un vase pour admettre le *calorique* entre ses molécules , on peut s'en servir pour répéter un grand nombre d'expériences. Si l'on trouve , par exemple , que la *température* du vase est diminuée de 40 de-

Chimie. Tome II.

grés , lorsqu'on y introduit 12 livres d'eau , on

$$\text{aura } 27 : 1 :: 40 : x \& x = \frac{40}{27} = 1,4 \text{ de-}$$

grés pour l'augmentation de *température* de 12 livres d'eau occasionnée par la quantité de *calorique* qui a été communiquée par le vaisseau , & qui , préalablement élevoit la *température* de 40 degrés.

Si dans une autre expérience , on n'emploie que huit livres d'eau , on aura d'abord 8 : 12 :: 1 :

$$x \& x = \frac{12}{8} = 1,5 , \& \text{conséquemment si}$$

la *température* du vaisseau s'abaisse de 40 degrés lorsqu'on y verse 8 livres d'eau , on aura 27 : 1,5 ::

$$40 : x \& x = \frac{40 \times 1,5}{27} = 2,22 \text{ degrés pour}$$

l'augmentation de *température* des 8 livres d'eau , occasionnée par la quantité de *calorique* communiquée par le vaisseau , & qui préalablement élevoit la *température* de 40 degrés.

Dans d'autres circonstances , & particulièrement si l'on mêle des corps solides avec l'eau , la correction sera à-peu-près semblable ; en effet , nous avons vu ci-dessus que le vaisseau doit communiquer ou recevoir autant de *calorique* que 7,11 onces d'eau ; il faudra donc ajouter ou retrancher ce nombre de la quantité d'eau employée , & opérer ensuite , comme nous l'avons déjà indiqué.

4°. Il arrive fréquemment que dans certains mélanges la *température* ne devient uniforme qu'au bout de quelques minutes ; il faut alors pour éviter en partie l'erreur qui provient de la quantité de *calorique* communiquée pendant ce temps aux corps environnans , 1°. agiter très-doucement le mélange ; 2°. opérer sur de grandes quantités ; 3°. renfermer , s'il est possible , l'appareil dans une double enveloppe garnie de duvet & recouverte encore avec de la flanelle ; 4°. enfin , faire en sorte que la *température* du mélange ne soit pas beaucoup plus élevée que celle du milieu environnant.

On peut , en prenant la substance froide à une *température* beaucoup plus basse que celle de l'atmosphère , & la substance chaude à une *température* beaucoup plus haute , remplir la dernière des conditions ci-dessus énoncées , & avoir en même temps une très-grande différence dans les *températures* ; il est vrai qu'on retombe alors dans un autre inconvénient , celui de faire traverser l'atmosphère à une substance très-chaude ou très-froide.

5°. Les volumes des substances qu'on veut comparer doivent être égaux , & l'on doit se servir de thermomètres très-sensibles.

Z z z

6°. Nous avons vu ci-dessus que la coïncidence entre la moyenne arithmétique & la température d'un mélange de parties égales de la même substance à différens degrés indiquoit la permanence de capacité de cette substance à tous les degrés compris entre ces deux températures ; mais si les quantités sont inégales, il faut alors pour pouvoir conclure que la capacité est permanente, que, suivant la loi de Richman, la température du mélange soit égale à la somme des produits des quantités par les températures, divisée par la somme des quantités. Si l'on mêle, par exemple, 8 liv. d'un liquide quelconque à 40 d. avec 16 l. du même liquide à 30 degrés, & si la température du mélange est de 33 à 34 degrés, on pourra conclure que la capacité de ce liquide est permanente depuis le 30° degré jusqu'au 40° ; car

$$\frac{8 \times 40 + 16 \times 30}{8 + 16} = 33,34 \text{ degrés.}$$

7°. Nous venons d'annoncer que les volumes des substances comparées doivent être égaux ; mais si les pesanteurs spécifiques ne sont pas semblables, les poids des substances comparées seront différens. Le docteur Irvine a prouvé que dans cette circonstance les capacités sont en raison inverse du produit des changemens de température par les quantités de matières.

Si l'on mêle, par exemple, 22 onces de bled à 30 deg.
avec 20 onces d'eau à 60
& si la température du mélange est de 50
la température de l'eau se trouvera diminuée de 10
& celle du bled se trouvera augmentée de 20

Et alors la capacité de l'eau sera à celle du bled comme $20 \times 22 : 10 \times 20$, ou comme 11 : 5.

En évitant toutes les causes d'inexactitude & en faisant les corrections que je viens d'indiquer, les résultats des différentes expériences coïncideront à-peu-près les uns avec les autres, & les capacités seront déterminées avec un certain degré d'exactitude à tous les degrés compris entre les termes de la congélation & de l'ébullition de l'eau.

Il faut cependant observer qu'un changement de température dans l'air du lieu, le plus ou moins de tems employé à mêler les substances, une différence dans le vaisseau ou dans le degré d'agitation donnée au mélange, & plusieurs autres causes, peuvent faire varier ces résultats.

Cette méthode, d'ailleurs, ne peut servir, ainsi que je l'ai observé ci-dessus, ni pour toutes les substances qui en se combinant changent de capacité, ni pour celles dont le calorique combiné varie soit en plus, soit en moins, pendant le mélange.

Ce sont toutes ces raisons qui doivent faire préférer la méthode de MM. Lavoisier & Laplace à celle du docteur Crawford ; la première

exige très-peu de précautions & est sujette à beaucoup moins d'inconvéniens.

CHAPITRE SECOND.

Résultats des expériences qui peuvent servir à déterminer la capacité de plusieurs solides & de quelques liquides.

Quelques-unes des expériences dont je vais présenter les résultats ont été faites par le docteur Crawford, dans le dessein de déterminer le calorique spécifique des substances par lesquelles il a opéré ; mais comme j'ai démontré dans la première partie, que quant à présent cette détermination est impossible, il est évident que ces résultats ne peuvent indiquer tout au plus que la capacité de certains corps depuis le terme de la congélation de l'eau jusqu'à celui de son ébullition.

Le docteur Crawford, dans le dessein d'attribuer à des résultats exacts, a pris toutes les précautions, & a fait toutes les corrections ci-dessus indiquées.

Capacités de plusieurs solides & de quelques liquides comparées à celles de l'eau prise pour unité, & déterminées d'après les expériences du docteur Crawford.

Eau commune,	1,000
Féverolles,	0,502
Riz,	0,106
Bled,	0,477
Avoine sans pellicule,	0,416
Pois,	0,421
Orge,	0,421
Cuir de bœuf avec le poil,	0,787
Poumons d'une brebis,	0,769
Lait de vache,	0,999
Sang retiré de l'artère d'un chien,	1,030

Or lorsqu'on réduit en poudre quelques-unes de ces substances & qu'on les mêle ensuite avec de l'eau à égalité de température, il se dégage une certaine quantité de calorique ; c'est pour éviter cette source d'erreur que le docteur Crawford ne les pulvérisa pas, parce qu'alors, dit-il, la quantité de calorique dégagé pendant le mélange est très-peu considérable, & ne peut altérer en rien le résultat des opérations.

Il faut encore observer que quelques-unes des substances ci-dessus énoncées variant à l'insu par le desséchement ou par route autre cause, la détermination de leur capacité ne peut à la rigueur servir de base.

Cet inconvénient est malheureusement applicable à presque toutes les substances par lesquelles on peut opérer.

Nous pouvons, quoi qu'il en soit, regarder

los résultats ci-dessus comme des à-peu-près assez exacts; ils sont d'ailleurs précieux en ce qu'ils ont conduit à la théorie de la respiration.

Capacités de quelques solides & de plusieurs liquides, comparées à celle de l'eau prise pour unité, & déterminées d'après les expériences de MM. Lavoisier & Laplace.

Eau commune,	1,0000
Tôle ou fer battu,	0,1099
Cristal,	0,1919
Mercure,	0,0290
Chaux vive,	0,2168
Mélange d'eau & de chaux vive dans le rapport de 9 à 16,	0,4391
Acide sulfurique dont la pesanteur spécifique étoit de 1,87,	0,4345
Mélange de cet acide avec l'eau dans le rapport de 4 à 3,	0,6031
Même mélange dans le rapport de 4 à 5,	0,6631
Acide nitrique dont la pesanteur spécifique étoit de 1,29895,	0,6613
Mélange de cet acide avec la chaux vive dans le rapport de 9 à 1,	0,6189
Mélange d'une partie du nitrate de potasse avec 8 parties d'eau,	0,8167

Il faut encore un grand nombre d'expériences pour compléter cette table; mais les résultats qui y sont contenus sont principalement intéressants en ce qu'ils viennent d'une méthode extrêmement innécessaire, & qu'ils commencent un travail absolument nécessaire à l'explication de beaucoup de phénomènes chimiques.

CHAPITRE TROISIEME.

Observation sur les méthodes dont on peut se servir pour déterminer les capacités des fluides élastiques permanents, & sur les moyens d'éviter & de corriger en partie les sources d'erreurs dans elles sont susceptibles.

Les difficultés qu'on éprouve, lorsqu'on veut déterminer la capacité des fluides élastiques permanents, proviennent principalement, 1°. de la rareté des gaz; 2°. de leur mélange presque inévitable avec d'autres substances; 3°. de leur densité plus ou moins complète; 4°. de l'incertitude qui existe toujours dans la détermination de leur pesanteur spécifique; 5°. enfin, de la nature fugace du colorique.

Ces difficultés sont communes à la méthode du docteur Crawford & à celle de MM. Lavoisier & Laplace; mais la première est en outre susceptible d'un grand nombre de sources d'erreurs que je vais décrire succinctement.

1°. Il est nécessaire de dessécher les fluides dont on veut se servir; si l'on ne peut y parvenir complètement, il faut du moins tâcher qu'ils ne contiennent pas plus d'humidité les uns que les autres: le nitrate de chaux fait avec soin peut servir à cette opération. Il est bon d'observer qu'après leur exposition sur ce sel, les gaz tiennent encore en dissolution une certaine quantité d'eau; cette quantité dépend de leur nature particulière & influe plus ou moins sur la détermination de leur capacité; on est donc obligé dans ces circonstances de regarder l'eau tenue en dissolution comme une de leurs parties constitutives.

2°. Il faut tâcher que les gaz n'éprouvent pas de changement pendant l'expérience.

3°. la température de la substance qui sert de terme de comparaison doit être avant l'expérience un peu au-dessous de celle de l'air du lieu, & il est très-important que dans divers essais cette différence ne varie pas.

4°. Il faut introduire très-prompement le vaisseau qui contient les gaz dans la substance qui sert de terme de comparaison; & dans différentes expériences, le tems nécessaire à cette introduction doit être égal.

5°. Il est nécessaire que les gaz & le liquide qui sert de terme de comparaison acquièrent promptement une température uniforme, & qu'au contraire cette dernière substance se refroidisse très-lentement.

6°. Si l'on se sert d'un vaisseau de cuivre pour contenir les gaz, il faut préalablement déterminer sa capacité pour admettre le calorique entre ses molécules, & déduire de l'augmentation de température de la substance qui sert de terme de comparaison celle qui est occasionnée par le vaisseau: il est de même nécessaire de déterminer la capacité du vase dans lequel on plonge les gaz, & d'ajouter au poids de la substance qui sert de terme de comparaison celui qui est représenté par ce vaisseau.

7°. Afin d'augmenter les différences entre les quantités de calorique communiquées à la substance qui sert de terme de comparaison, il est nécessaire d'élever les gaz à une haute température. Il ne faut pas cependant étendre trop loin ce principe, parce qu'alors une partie de la substance qui sert de terme de comparaison se vaporifieroit pendant l'immersion. Les expériences du docteur Crawford prouvent qu'en général on peut élever avec avantage la température des gaz jusqu'au degré où l'eau se vaporifie.

8°. Dans différentes expériences le thermomètre ne doit point changer de position.

9°. L'augmentation de température de la substance qui sert de terme de comparaison étant très-foible, il est nécessaire que la température de l'air du lieu soit permanente pendant tout le tems de l'opération; il faut donc échauffer les

gaz dans un endroit écarté, ne les apporter qu'au moment de l'expérience, n'avoir ni feu, ni lumière dans la chambre où l'on opère, &c être en très-petit nombre.

10°. Il ne faut pas, pour élever la température des gaz, plonger dans l'eau le vaisseau qui les contient, mais bien dans un autre vase qui doit être échauffé par un bain-marie. Si l'on ne prenoit pas cette précaution, l'eau adhérente à l'extérieur du vaisseau produiroit dans l'expérience une inexactitude très-considérable.

11°. Si pour introduire les gaz dans le vaisseau qui doit les contenir on le remplissoit préalablement d'eau, il en resteroit une certaine quantité dans son intérieur, & cette portion pourroit produire des erreurs très considérables dans les résultats; il faut donc se servir pour cette introduction de la machine pneumatique. Mais le vide n'étant jamais complet, il est nécessaire de l'amener au même degré dans différens essais.

12°. Lorsque les gaz sont élevés à la température désirée, il faut transporter le vaisseau qui les contient dans le vase qui renferme la substance dont on se sert pour terme de comparaison; en passant ainsi au travers de l'atmosphère, les gaz & le vaisseau qui les renferme perdent une partie de leur *calorique*; il faut donc déterminer cette quantité; mais cette détermination est toujours très-arbitraire, &c il est même impossible de la rendre exacte.

13°. Pour éviter en partie l'erreur occasionnée par la quantité de *calorique* communiqué à l'atmosphère après l'introduction du vaisseau qui contient les gaz, il faut recouvrir tout l'appareil avec de la flanelle.

14°. Pour amener promptement toutes les molécules de la substance qui sert de terme de comparaison à une température uniforme, il faut l'agiter légèrement; mais pendant ce temps elle communique à l'atmosphère une certaine quantité de *calorique*; il est vrai qu'on peut éviter en partie cette source d'erreur en l'agitant sans la découvrir, mais malgré cette précaution il existe toujours une perte dont la détermination est très-arbitraire.

15°. Comme la pesanteur spécifique des gaz est bien moins grande que celle de toutes les substances qui peuvent servir de terme de comparaison, &c qu'il faut, ainsi que nous l'avons observé ci-dessus, employer des volumes égaux, l'augmentation de température occasionnée par la quantité de *calorique* communiqué par les gaz est toujours très-peu sensible. Il est cependant évident que cette augmentation dépend en grande partie de la capacité de la substance qui sert de terme de comparaison. La capacité de l'huile étant à celle de l'eau comme 1 est à 2, on peut s'en servir pour terme de comparaison, & alors l'augmentation de température est plus considérable; il paroît cependant, d'après les expériences du docteur Crawford, que

cette augmentation ne suit pas le même rapport; cette différence provient ou de ce que ce rapport n'est point exact, ou des sources d'erreurs ci-dessus décrites: il faut d'ailleurs observer que l'huile acquiert une température uniforme bien plus lentement que l'eau.

16°. Pour déterminer exactement la capacité des gaz, il faudroit les obtenir parfaitement purs; mais comme il est impossible, quant à présent, de remplir cette condition, les corrections qu'on peut faire à ce sujet ne peuvent être considérées que comme des à-peu-près qui dépendent de données inconnues.

17°. Il est encore nécessaire de connoître la pesanteur spécifique des gaz; mais cette détermination dépend de leur degré de pureté; elle est conséquemment très-variable.

18°. Il faut en outre prendre routes les précautions & faire toutes les corrections qui sont indiquées dans le premier chapitre de cette seconde partie.

CHAPITRE QUATRIÈME.

Capacités de différens fluides élastiques permanents déterminées par le docteur Crawford, & comparées à celles de l'eau prise pour unité.

Le docteur Crawford ayant besoin de thermomètre dont les résultats correspondent parfaitement les uns avec les autres, parvint au bout de plusieurs mois à en construire quatre dont chaque degré étoit divisé en 50 parties, & qui, dans toute la longueur de l'échelle de Fahrenheit, ne différoient pas de $\frac{1}{2}$ de degré. Mais malheureusement il n'employa dans chaque expérience que 32 pouces cubes de gaz; & d'ailleurs il nous est impossible de dissimuler que quelques-unes ont été faites dans des circonstances très-défavorables; ses robinets étant trop minces pour fermer exactement, le gaz azote & l'air vital se changeoient pendant l'opération en air commun; le gaz azote éprouvoit un changement plus considérable ou en raison de sa densité, ou en raison de sa plus grande dilatibilité, depuis le 60^r jusqu'au 80^r degré. Il est vrai que s'étant aperçu de cette source d'erreur, il répéta plusieurs autres expériences en prenant des précautions pour la corriger; mais il lui restoit encore à surmonter de bien plus grands obstacles d'autant plus sensibles, qu'il n'employoit qu'une très-petite quantité de gaz; nous pouvons comprendre parmi ces obstacles leur parfaite délicatesse ou du moins leur délicatesse comparable à la grande difficulté de les obtenir parfaitement purs, & conséquemment de déterminer avec exactitude leur pesanteur spécifique; l'évaluation très-arbitraire de la quantité de *calorique* perdue pendant le passage dans l'atmosphère du vaisseau qui contenoit les gaz; l'impossibilité d'élever leur température au-dessus du 80^r degré en se servant

d'un bain-marie, conséquemment la nécessité de n'employer qu'une très-courte échelle; la faible augmentation de température des 20 onces d'eau employées pour servir de terme de comparaison, augmentation qui ne montoit guère qu'à $\frac{1}{2}$ de degré de l'échelle de Fahrenheit; & enfin toutes les précautions & les corrections indispensables ci-dessus indiquées.

Ces raisons sont bien suffisantes pour faire soupçonner que les expériences du docteur Crawford ne peuvent point servir de base pour la détermination des capacités des gaz, & que sa méthode est défectueuse malgré qu'il l'ait perfectionnée autant qu'il est possible de le faire.

Capacités de différens gaz comparées à celles de l'eau prise pour unité & déterminées par le docteur Crawford.

Eau,	1,0000
Gaz azote,	0,7916
Gaz acide carbonique,	1,0454
Air atmosphérique,	1,7900
Air vital,	4,7499
Gaz hydrogène,	21,4000

La méthode qu'employoient MM. Lavoisier & Laplace pour déterminer la capacité des gaz exige beaucoup moins de corrections que celle du docteur Crawford, & fournit de plus l'avantage d'opérer sur de grandes quantités; elle est donc préférable sous ce double point de vue; son utilité est d'ailleurs plus étendue & plus réelle. Il faut cependant convenir qu'elle ne présentera des résultats parfaitement exacts & des bases fixes relativement aux capacités des gaz, que quand on en possédéra de très-purs, qu'on pourra les dessécher complètement ou du moins d'une manière comparable, & qu'enfin on aura déterminé leur pesanteur spécifique avec beaucoup de précision.

CHAPITRE CINQUIÈME.

Comparaison entre les capacités de différens corps avant & après leur combustion ou leur oxidation.

Le docteur Crawford a mêlé avec de l'eau plusieurs métaux & plusieurs oxides minéraux & a déterminé de cette manière leur capacité.

Lorsqu'il vouloit enlever de l'air aux oxides dont il se servoit, il versoit dessus de l'acide nitrique, & exposoit le mélange à une chaleur rouge; il suivoit en cela l'exemple de Schéele (1).

Voici le résultat des expériences qu'il a faites sur ce sujet.

Eau	1,00000
Oxide d'antimoine blanc par le nitre (antimoine diaphorétique)	0,2717
Même oxide, après avoir versé dessus de l'acide nitrique & avoir exposé le mélange à une chaleur rouge	0,16666
Antimoine	0,06451
Oxide jaune de plomb, après l'avoir humecté avec de l'acide nitrique & avoir exposé le mélange à une chaleur rouge (2)	0,06802
Plomb	0,03330
Oxide blanc d'étain	0,10869
Même oxide, après avoir versé dessus de l'acide nitrique & avoir exposé le mélange à une chaleur rouge	0,09909
Étain	0,07042
Rouille de fer (3)	0,25000
Rouille de fer après l'avoir humectée avec de l'acide nitrique & avoir exposé le mélange à une chaleur rouge	0,16666
Fer	0,12696
Oxide de cuivre précipité d'une dissolution de sulfate de cuivre par un alcali, & exposé ensuite avec de l'acide nitrique à une chaleur rouge	0,2717
Cuivre rouge	0,11111
Cuivre jaune	0,11235

(1) Je ne fais qu'elle est dans cette circonstance, l'acceptation que donne le docteur Crawford au mot air; ce qu'il y a de certain, c'est qu'il ne peut être synonyme que des termes air vital & air atmosphérique, puisqu'il est reconnu que combinés avec d'autres gaz, les oxides changent de nature, & doivent être regardés comme des véritables sels. (Il faut cependant excepter le gaz hydrogène & le gaz ammoniacal. Aucune expérience ne prouve que le premier puisse se combiner avec les oxides métalliques; & leur union avec le gaz ammoniacal, forme de nouveaux composés, qui doivent être rangés dans une classe séparée.)

Si donc le docteur Crawford avoit dessein d'enlever de l'oxigène à ses oxides, sa méthode ne pouvoit servir tout au plus que pour ceux qui sont décomposés par la chaleur rouge, & alors l'addition de l'acide nitrique étoit superflue. Quant aux oxides qui ne sont point décomposés par la chaleur rouge, l'addition de l'acide nitrique ne pouvoit que les oxider davantage. Il est vrai qu'en croyant employer des oxides purs, on en emploie quelquefois qui contiennent des carbonates métalliques, l'acide carbonique est alors dégagé par l'acide nitrique; mais cette nouvelle addition, & l'exposition des mélanges à une chaleur rouge, font retomber dans de nouveaux inconvénients; car alors on ajoute de l'oxigène à certains oxides, & on en enlève à d'autres.

(2) Les capacités de l'oxide rouge & de l'oxide jaune de plomb ne diffèrent pas sensiblement.

(3) L'oxide de fer est un véritable sel, & presque tous les oxides, pour peu qu'ils aient été exposés quelque temps à l'atmosphère, se dissolvent en partie en carbonates; il y a donc tout lieu de présumer que les expériences dans lesquelles le docteur Crawford ne s'est point servi d'acide nitrique, ne présentent pas des résultats applicables aux oxides parfaitement purs.

Oxide de zinc précipité d'une dissolution de sulfure de zinc par un alkali, exposé ensuite avec de l'acide nitreux à une chaleur rouge..... 0,13698
Zinc 0,09433

Ces expériences sont malheureusement pour nous d'une utilité bien bornée, puisque même en les supposant parfaitement exactes & faites avec des oxides entièrement purs, leur résultat ne peut servir de base faute d'avoir indiqué le degré d'oxidation de chaque oxide (1).

Le docteur Crawford annonce encore que la capacité de l'alcool est moindre que celle de l'eau, & que la capacité du carbonate de chaux est plus grande que celle de la chaux vive : il s'est servi d'alcool pour déterminer la capacité de cette dernière substance.

Les expériences de M. Kirwan semblent prouver que depuis le terme de la congélation de l'eau jusqu'à celui de son ébullition, les capacités du soufre, de l'acide sulfureux, de l'ammoniaque, de l'acide nitreux & de l'acide sulfurique concentré, sont respectivement moins grandes que celles de l'acide sulfurique, du carbonate d'ammoniaque, de l'acide nitrique & de l'acide sulfurique allongé d'eau.

Le docteur Crawford conclut en général de ces différentes expériences, 1°. que la capacité des corps combustibles est augmentée par l'oxidation; 2°. que l'union de l'acide carbonique & de l'eau avec certains corps augmente leur capacité; 3°. enfin, que cette augmentation de capacité est en quelque façon proportionnelle dans chaque corps à la quantité d'eau, d'acide carbonique & d'oxygène qu'il contient.

Nous devons d'abord observer que les expériences qui tendent à prouver l'augmentation de capacité par l'addition de l'eau ou de l'acide carbonique sont très-peu nombreuses, & qu'il faudroit les multiplier considérablement pour tirer de cette augmentation une conclusion générale.

Examinons maintenant sur quels faits sont fondés les deux autres principes présentés par le docteur Crawford, savoir, que la combustion augmente la capacité des corps combustibles, & que cette augmentation est en quelque façon proportionnelle à la quantité d'oxygène absorbé.

Il pourroit se faire que la première de ces conclusions fût vraie, mais les faits ne sont point encore assez accumulés pour la présenter comme une vérité fondamentale; n'est-il pas possible en effet qu'en les multipliant on rencontre un

très-grand nombre d'anomalies? Quant à la seconde, elle est fondée sur la supposition qu'en humectant les oxides avec de l'acide nitrique & exposant le mélange à une chaleur rouge on leur enlève de l'air, ou, ce qui revient au même, on les désoxide.

Mais comme il est au contraire très-constant que cette opération ne pouvoir qu'oxygéner davantage les oxides dont s'est servi le docteur Crawford, parce qu'ils ne sont pas décomposables par leur exposition à une chaleur rouge, les résultats rapportés dans la table précédente contredisent le principe général énoncé par le docteur Crawford, que l'augmentation de capacité est proportionnelle à l'accroissement d'oxidation.

Nous ne pouvons donc tirer de ces différentes expériences que les conclusions suivantes; 1°. la capacité de certains corps combustibles est respectivement moins grande que celle de leurs oxides oxygénés jusqu'à certains degrés; 2°. passé ces degrés, leur capacité diminue par l'addition d'une nouvelle quantité d'oxygène.

Quant aux autres expériences, elles ne peuvent être considérées que comme des faits intéressants dont on ne peut, quant à présent, tirer aucune conséquence.

Le docteur Crawford a fait encore beaucoup d'autres expériences qui peuvent servir à déterminer avec un certain degré d'exactitude la capacité du bois, du charbon & de leurs cendres.

Eau,	1,00000
Bois de pin,	0,50000
Charbon,	0,16315
Cendres du même charbon,	0,09090
Cendres d'orme,	0,14025
Charbon de terre,	0,27777
Fraisil,	0,16210
Cendres de fraisil,	0,18552

Pour déterminer la capacité de ces substances, le docteur Crawford les réduisit en poudre très-fine, les échauffa dans un vaisseau de fer étamé, versa dessus l'eau froide, & prit en outre toutes les précautions ci-dessus indiquées.

Ces dernières expériences, en les supposant même parfaitement exactes, ne peuvent pas non plus servir de base; car la capacité des bois dépend de leur degré de végétation, celle des charbons dépend de leur formation plus ou moins complète, & nous ne pouvons pas indiquer ces différents degrés.

Le docteur Crawford conclut encore de quel-

(1) La capacité des oxides variant sans cesse, il faudroit la déterminer à chaque degré d'oxidation; mais cette condition exige la possibilité d'oxygéner les métaux à volonté, & d'indiquer des marques invariables propres à caractériser chaque degré d'oxidation. Ne possédant aucuns de ces moyens, les expériences faites sur différents oxides, ne peuvent jamais être comparables entre elles.

ques réductions d'oxides par le gaz hydrogène, & de plusieurs autres expériences, que la *capacité* des corps diminue par leur combinaison avec l'hydrogène; il appuie principalement cette conclusion sur une opinion particulière, savoir, que l'acide sulfurique ne devient acide sulfureux qu'en absorbant du gaz hydrogène; mais il est maintenant bien démontré qu'il suffit d'enlever de l'oxigène à l'acide sulfurique pour en faire de l'acide sulfureux, & que l'hydrogène ne contribue en rien à ce changement. Les expériences du docteur Crawford prouvent, à la vérité, 1°. que la *capacité* du gaz oxigène est diminuée par sa combinaison avec le gaz hydrogène; 2°. que celle du sang artériel est pareillement diminuée par sa combinaison avec ce principe: mais le nombre de ces faits n'est point encore assez considérable pour en tirer une conséquence générale.

CHAPITRE SIXIEME.

Observations sur la détermination du zéro réel.

La solution de ce problème se réduit à déterminer le rapport existant entre la quantité de *calorique* interposé entre les molécules d'un corps à une température quelconque, & celle qu'il faut lui communiquer pour l'augmenter d'un degré.

Je prie d'observer que je ne parle point du tout ici du *calorique* qui peut être combiné avec les molécules; nous avons vu ci-dessus qu'il n'influe en rien sur la température; le zéro réel n'annonce donc pas une privation totale de *calorique spécifique*, mais tout au plus une privation totale de *calorique interposé*. En effet, la température dépendant immédiatement des espaces qui existent entre les molécules, la température est nulle lorsqu'elles se touchent en tous sens; on ne peut cependant pas conclure qu'un corps dont la température est nulle ne contient pas du tout de *calorique*, car il est possible qu'il en entre une certaine quantité dans la composition de chaque molécule; & d'où nous pouvons tirer une première conclusion générale: *le zéro réel n'indique que l'état d'un corps qui seroit presque totalement privé de son calorique interposé.*

Ce premier énoncé nous conduit immédiatement à plusieurs autres conséquences très intéressantes.

1°. Si les *capacités* ne sont pas permanentes tant que les corps ne changent pas d'état, la détermination du zéro réel sera toujours inexacte.

2°. On ne peut déduire le zéro réel que de la comparaison des *capacités* d'un même corps avant & après son changement d'état.

3°. Le mélange des substances qui ne s'échauffent mutuellement qu'en vertu de leur excès de température, & dont conséquemment les *capacités* ne changent pas, ne peut servir à déterminer le zéro réel.

4°. Si pendant un changement quelconque les molécules absorbent ou communiquent du *calorique*, la détermination du zéro réel déduite de cette expérience ne sera point exacte.

5°. Enfin, & par une conséquence qui dérive immédiatement des précédentes, si les déterminations du zéro réel déduites d'un très-grand nombre d'expériences analogues ne diffèrent pas sensiblement, nous pourrions conclure, 10. que le *calorique* ne se combine pas avec les molécules des corps, & conséquemment que l'absorption ou la communication du *calorique* pendant les changements d'état ne proviennent que d'une augmentation ou diminution de *capacité*; 20. que les *capacités* sont permanentes à toutes les températures tant que les corps ne changent pas d'état; 30. enfin, que les *capacités* sont proportionnelles au *calorique spécifique*. Si au contraire ces déterminations ne sont pas constantes, nous pourrions conclure que ces énoncés ne sont pas exacts, ou du moins qu'ils n'existent pas tous les trois à la fois.

Nous devons donc, pour arriver à ces dernières conclusions, rapprocher les expériences dans lesquelles la température observée diffère essentiellement de celle qui est indiquée par le calcul, & voir s'il existe une certaine coïncidence entre les déterminations du zéro réel déduites de leurs résultats; ainsi, la combustion du gaz hydrogène, du phosphore, du carbone, du soufre, & en général toutes les combustions & les oxidations, le mélange de l'eau avec l'acide sulfurique, le gaz ammoniacal, le muriate de soude, le nitrate de potasse, la chaux vive, & généralement toutes les combinaisons dans lesquelles la température diffère de la moyenne arithmétique, & enfin, la comparaison des *capacités* d'un même corps avant & après l'un de ces changements d'état, peuvent servir à cet objet.

Rapprochons donc quelques expériences de ce genre, & voyons si les déterminations du zéro réel qu'on en peut déduire ont entr'elles une certaine coïncidence.

Je rapporterai d'abord l'expérience du docteur Crawford; elle pourra nous servir d'exemple pour un grand nombre des corrections ci-dessus indiquées; je ferai connoître ensuite celles de M. Lavoisier & de Laplace.

PARAGRAPHE PREMIER.

Expérience faite par le docteur Crawford pour déterminer le zéro réel.

Le docteur Crawford regardant comme des vérités démontrées, 10. que les *capacités* sont permanentes tant que les corps ne changent pas d'état; 20. que le *calorique* ne se combine point avec les molécules des corps, & conséquemment que pendant les changements d'état l'absorption

ou la communication du *calorique* ne provient que d'un changement de *capacité* ; 30. enfin, que le *calorique spécifique* est proportionnel aux *capacités*, se fert du raisonnement suivant pour tenter de déterminer le zéro réel.

Désignons par la lettre A un corps quelconque avant son changement d'état, & par la lettre B le même corps lorsqu'il a subi ce changement. Si l'on connoit la *capacité* de A & celle de B, & si l'on fait de combien de degrés la quantité de *calorique* dégagé pendant le changement peut élever la *température* de A, on déterminera par une simple règle de trois, de combien la quantité de *calorique* que contient B peut élever la *température* de A, & la somme de ces deux nombres représentera en degrés du thermomètre la quantité de *calorique* que contient le corps A. Si, par exemple, la *capacité* de A est représentée par le nombre 6, & celle de B par le nombre 1, & si la quantité de *calorique* dégagé pendant le changement d'état peut élever la *température* de A de 500 degrés, il faudra dire, pour savoir de combien de degrés la quantité de *calorique* que contient B peut élever la *température* de A, 6 — 1 : 500 :: 1 : 100 ; & ajoutant 100 à 500, nous aurons le nombre 600, qui représentera en degrés du thermomètre la quantité de *calorique* que contient A, & qui conséquemment indiquera le véritable zéro réel.

Cette manière de raisonner seroit excellente si en effet le *calorique* ne se combinait point avec les molécules, si les *capacités* étoient permanentes tant que les corps ne changent pas d'état, & si les dilatations du mercure étoient proportionnelles aux augmentations de *calorique* dans toute la longueur de l'échelle. Mais nous serons bientôt en état de démontrer que ces énoncés ne sont que des suppositions.

10. Le docteur Crawford fit détonner dans un

vaisseau de cuivre entouré de 16,33 onces d'eau, 11 onces mesures (17,69 pouces cubes français) d'un mélange de gaz hydrogène & d'air vital dans le rapport de 2 à 1 (1).

Les *capacités* réunies de ce vaisseau & de celui qui contenoit l'eau étoient telles, qu'elles communiquoient ou recevoient autant de *calorique* que..... 4,187 onc. d'eau.
Ajoutant les..... 16,330

On a..... 20,517 onces pour la quantité d'eau qu'on est censé avoir employé dans cette expérience.

Le moyen résultat de cette détonation souvent répétée par le docteur Crawford, fut pour l'augmentation de *température* de ces 20,517 onces d'eau, de 1,0667 degrés.

20. La pesanteur spécifique du gaz hydrogène étant, suivant le docteur Crawford, à celle de l'air vital comme 1 : 12,11 & leur mélange étant dans le rapport de 2 à 1, le poids du premier étoit à celui du second comme 2 : 12,11, ou comme 1 : 6,05 (2).

La pesanteur spécifique du composé étoit donc à celle d'un égal volume de gaz hydrogène comme 4,7 : 1 (3).

Mais la pesanteur spécifique du gaz hydrogène est, suivant le docteur Crawford, à celle d'un égal volume d'eau comme 1 est à 9960 ; il en résulte que la pesanteur spécifique du mélange étoit à celle d'un égal volume d'eau comme 1 : 2119 (4).

30. La *capacité* de l'air vital, d'après les résultats rapportés dans le chapitre précédent, est à celle d'un égal poids d'eau comme 4,749 : 1, & celle du gaz hydrogène est à celle d'un égal

(1) Le volume du vaisseau dans lequel se fit la détonation, étoit à-peu-près de 16,33 onces mesures ; mais comme il n'est pas possible de faire un vide parfait, le docteur Crawford ne put employer dans chaque expérience que 11 onces mesures du mélange : tout l'appareil étoit entouré de flanelle.

(2) On doit toujours observer que le rapport entre les pesanteurs spécifiques des gaz est très-variable, & qu'il dépend de leur degré de pureté & de leur dessiccation plus ou moins complète.

(3) Supposons qu'on prenne un pied cube d'air vital, & qu'il pèse 12,11 onces ; les deux pieds cubes de gaz hydrogène pèseront 1 once, & conséquemment le poids du mélange sera de 14,1 onces.

Mais dans cette supposition, trois pieds cubes de gaz hydrogène pèseront trois onces, & conséquemment la pesanteur spécifique d'un mélange d'un pied cube d'air vital & de deux de gaz hydrogène sera à celle d'un égal volume de gaz hydrogène comme..... 14,1 : 3

ou comme..... $\frac{14,1}{3} : 1$

ou enfin comme..... 4,7 : 1

(4) En divisant 9960 par 4,7 on a au quotient 2119 pour la pesanteur spécifique de l'eau comparative-ment à celle d'un égal volume de mélange pris pour unité.

poids d'eau comme 21,4 : 1 ; la capacité d'un poids quelconque du mélange étoit donc à celle d'un égal poids d'eau comme 7,11 : 1 (1).

4°. Le volume du mélange des deux gaz étoit à celui de l'eau comme 11 : 20,517 ; mais nous venons de démontrer qu'à volume égal de pesantier spécifique du mélange étoit à celle de l'eau comme 1 : 2119 ; il en résulte que la pesantier spécifique des 11 onces mesures du mélange étoit à celle des 20,517 onces d'eau comme 1 : 3951 (2).

5°. Nous avons vu ci-dessus qu'à poids égal la capacité du mélange étoit à celle de l'eau comme 7,11 : 1 ; il en résulte que la capacité des 11 onces mesures du mélange étoit à celle

des 20,517 onces d'eau comme $\frac{3951}{7,11} : 1$, ou environ comme 556 : 1.

6°. Mais la température des 20,517 onces d'eau sur élevée par la détonation des 11 onces mesures du mélange de 1,0667 degrés ; nous pouvons en conclure que la même quantité de calorique auroit élevé la température des 11 onces mesures du mélange de $556 \times 1,0667$, ou de 593 degrés à-peu-près (3).

Le dégagement du calorique pendant cette expérience ne provenant, suivant le docteur Crawford, que de la différence qui existe entre la capacité du mélange & celle de l'eau formée, il conclut que la quantité de calorique que contenait ce dernier liquide pouvoit élever celle des 11 onces mesures du mélange de 97 degrés ; car $7,11 - 1 : 593 :: 1 : 97$.

Je n'ai pas besoin d'observer que ce calcul est entièrement fondé sur la supposition que les molécules du gaz hydrogène & de l'air vital ne contiennent pas de calorique, ou du moins qu'elles en contiennent la même quantité que lorsqu'elles constituent le liquide que nous nommons eau.

Je vais très-incessamment prouver, par un rapprochement de résultats exacts, que cette supposition est très-hypothétique.

Quoi qu'il en soit, le zéro réel déduit de cette expérience est à 680 degrés au-dessous de celui qui est marqué sur le thermomètre : car $97 + 593 = 690$, sur quoi il faut ôter 10 degrés pour la température à laquelle l'expérience a été faite.

Rapprochons de cette détermination celles qui dérivent des expériences de MM. Lavoisier &

(1) En supposant toujours qu'un pied cube d'air vital pèse 12,1 onces, & conséquemment que deux pieds cubes de gaz hydrogène pèsent 1 once, la capacité des 12,1 onces d'air vital sera à celle d'un égal poids d'eau comme..... $12,1 \times 4,749 : 12,1 \times 1$

Et celle des 1 onces de gaz hydrogène sera à un égal poids d'eau comme. $1 \times 21,4 : 1 \times 1$
Et conséquemment la capacité de mélange sera à un poids égal d'eau, comme..... $57,462 + 41,8 : 12,1 + 1$

Ou comme..... $100,262 : 14,1$

Ou comme..... $\frac{100,262}{14,1} : 1$

Ou enfin comme..... $7,11 : 1$

(2) La pesantier spécifique des 11 onces mesures du mélange étoit à celle des 20,517 onces d'eau comme..... $11 \times 1 : 2119 \times 20,517$

Ou comme..... $11 : 43473,523$

Ou comme..... $1 : \frac{43473,523}{11}$

Ou enfin comme..... $1 : 3951$

(3) Les rapports que nous venons d'établir sont difficiles à saisir, parce que les uns sont fondés sur l'égalité de volume, & les autres sur l'égalité de poids ; les pesantiers spécifiques sont dans le premier cas, & les capacités sont dans le second. Dans la vue de faciliter l'intelligence de la marche que nous avons suivie pour arriver à notre dernière conclusion, qui indique que la même quantité de calorique qui élève la température de 20,517 onces d'eau de 1,0667 degrés peut élever celle de 11 onces mesures du mélange de 593, je dois rapprocher les conséquences qui nous y ont conduit.

1°. La pesantier spécifique du mélange étoit à celle d'un égal volume d'eau, comme 1 : 2119 ; mais les volumes du mélange & de l'eau étoient dans le rapport de 11 : 20,517, & conséquemment la pesantier spécifique des 11 onces mesures du mélange étoit à celle d'un égal poids d'eau comme 1 : 3951.

2°. La capacité du mélange étoit à celle d'un égal poids d'eau comme 7,11 : 1 ; mais les poids du mélange & de l'eau étoient dans le rapport de 1 : 3951, & conséquemment la capacité des 11 onces mesures du mélange, étoit à celle de 20,517 onces d'eau, comme 556 : 1 ; ainsi, la même quantité de calorique qui élevoit la température des 20,517 onces d'eau de 1,0667 degrés, auroit élevé celle des 11 onces mesures du mélange de 593.

Laplace, afin de voir s'il existe entre elles quelque uniformité.

Je vais d'abord présenter les expériences de MM. Lavoisier & Laplace, & je rapporterai ensuite les résultats plus récents de M. Lavoisier.

S. II.

Expériences faites par MM. Lavoisier & Laplace, pour déterminer le zéro réel.

Je dois observer que les déterminations que je vais présenter sont de même que celles du docteur Crawford, fondées sur les suppositions que les *capacités* sont permanentes & que le *calorique* dégagé ou absorbé pendant un changement d'état quelconque ne provient que d'un changement de *capacité*; ces physiciens avoient très-bien en entreprenant ces recherches, que ces premières données étoient pour le moins très-hypothétiques; mais comme la réalisation de ces suppositions dépend de la coïncidence d'un très-grand nombre de résultats, voyons si nous pourrions tirer quelque lumière de leur rapprochement.

D'après ces expériences, un mélange d'eau & de chaux vive dans le rapport de 9 à 16, fixe le zéro réel à 1537,8 degrés au-dessous du zéro thermométral, c'est-à-dire à 1537,8 deg.

Un mélange d'acide sulfurique & d'eau dans le rapport de 4 à 3, le fixe à 341,9

Le même mélange dans le rapport de 4 à 5, le fixe à 1169,1

Un mélange d'acide nitreux & de chaux dans le rapport de 9 à 1, le fixe à 1889
— 6,01733

La comparaison des *capacités* de l'eau & de la glace qui, suivant les expériences de M. Kirwan, sont dans le rapport de 1 à 0,9, fixe le zéro à 600

La quatrième détermination étant négative, prouveroit, ainsi que l'observent MM. Lavoisier & Laplace, la fausseté des hypothèses dont ils sont partis, si la détermination des *capacités* étoit rigoureusement exacte.

Le peu d'accord qui existe entre ces cinq résultats paroit renverser les suppositions sur lesquelles ils sont fondés. MM. Lavoisier & Laplace observent, à la vérité, qu'une altération très-peu considérable, & tout au plus d' $\frac{1}{10}$ dans les valeurs des *capacités*, suffit pour faire coïncider les résultats; & ils ajoutent qu'ils ne peuvent pas répondre qu'une erreur aussi petite ne s'est pas glissée dans leurs expériences.

Ne pouvant donc pas tirer des conséquences très-directes de ces résultats, rapprochons les expériences publiées par M. Lavoisier dans son abrégé

de chimie, & voyons les conséquences qu'on en peut déduire.

S III.

Déterminations du zéro réel déduites des expériences de M. Lavoisier.

Le but de M. Lavoisier en entreprenant le travail que je vais présenter, a été principalement, 1°. de déterminer à très-peu de chose près la quantité de *calorique* que contient l'air vital; 2°. de prouver que l'eau, même à l'état de glace, contient encore beaucoup de *calorique*, & que l'air vital en conserve une quantité très-considérable en se combinant avec le gaz hydrogène.

Ayant essayé de déterminer les quantités de glace qui se fondent pendant la combustion du phosphore, du charbon & de l'hydrogène, MM. Lavoisier & Laplace avoient obtenu les résultats suivants:

Pour la combustion d'une livre de phosphore 100 liv. de glace.
Pour la combustion d'une livre de carbone 96 S onc.
Pour la combustion d'une liv. de gaz hydrogène 295 9 gros 3 $\frac{1}{2}$ g.

« La substance qui se forme par la combustion du phosphore étant un acide concret, il est probable, observe M. Lavoisier, qu'il reste très-peu de *calorique* dans cet acide, & que par conséquent cette combustion fournit un moyen de connoître à très-peu de chose près la quantité de *calorique* contenue dans le gaz oxygène. »
« Mais quand on voudroit supposer que l'acide phosphorique retient encore une quantité considérable de *calorique*, comme le phosphore en contenoit aussi une portion avant la combustion, l'erreur ne pourroit jamais être que de la différence & par conséquent de peu de valeur. »
Voici quels sont les résultats:

Combustion du phosphore.

Quantité de phosphore brûlé... 1 liv. onc.
Quantité d'air vital nécessaire à la combustion 1 8
Quantité d'acide phosphorique obtenu 1 8

Quantité de *calorique* dégagé pendant la combustion d'une livre de phosphore représentée par la quantité de livres de glace qu'elle peut fondre 100,0000 liv.

Quantité de *calorique* dégagé de chaque livre d'air vital dans la combustion du phosphore... 66,6667

Quantité de *calorique* qui se dégage dans la formation d'une liv. d'acide phosphorique..... 40,00000

Quantité de *calorique* resté dans chaque livre d'acide phosphorique..... 0,00000

On ne peut regarder ce dernier énoncé que comme une véritable supposition.

Combustion du carbone.

liv. onc. g. gra.

Quantité de carbone brûlé..... 1 " " "

Quantité d'air vital absorbé pendant la combustion..... 2.9.1 10

Quantité de gaz acide carbonique formé..... 3.9.1.10

Quantité de *calorique* dégagé pendant la combustion d'une livre de car-

liv. de glace.

bone..... 96,50000

Quantité de *calorique* dégagé de chaque livre d'air vital..... 37,51823

Quantité de *calorique* qui se dégage pendant la formation d'une livre de gaz acide carbonique.... 17,02034

Quantité de *calorique* que conserve une livre d'air vital dans cette combustion..... 29,13844

Quantité de *calorique* nécessaire pour porter une livre d'acide carbonique à l'état de gaz..... 10,97960

Combustion du gaz hydrogène.

liv. onc. gra.

Quantité de gaz hydrogène brûlé..... 1 " " "

Quantité d'air vital employé pour la combustion..... 5 10 5 24

Quantité d'eau formée..... 6.10.5.24

Quantité de *calorique* dégagé pendant la combustion d'une livre de gaz hy-

liv. de glace.

drogène..... 195,58950

Quantité de *calorique* dégagé de chaque livre d'air vital..... 51,16283

Quantité de *calorique* qui se dégage pendant la formation d'une livre d'eau..... 44,33840

Quantité de *calorique* que conserve chaque livre d'air vital

dans cette combustion..... 14,50386

Quantité de *calorique* que conserve une livre d'eau à zéro..... 12,12823

Nous devons observer que les derniers résultats de ces trois combustions peuvent paraître inexactes en ce qu'ils sont fondés sur deux suppositions qu'il est impossible d'admettre; 1°. que dans la combustion du phosphore l'air vital abandonne totalement son *calorique spécifique*; 2°. que le phosphore, le gaz hydrogène & le carbone ne contiennent ni *calorique combiné*, ni *calorique interposé*. M. Lavoisier est bien éloigné d'admettre ces suppositions; on ne peut cependant se dissimuler que la rédaction des trois résultats ci-dessus énoncés peut induire en erreur sur le véritable sens que ce physicien a dû nécessairement y attacher.

Ces expériences n'en sont pas moins d'une très-grande utilité, en ce qu'elles peuvent jeter un grand jour sur le degré de confiance qu'on doit avoir dans les principes fondamentaux du docteur Crawford, & qu'on peut en déduire trois conséquences très-intéressantes.

1°. La quantité de *calorique* que contient une livre d'air vital dont la température est à zéro, peut fondre pour le moins 66,66667 livres de glace!

2°. La quantité de *calorique* que contient une livre de gaz acide carbonique dont la température est à zéro, peut fondre pour le moins 20,979 livres de glace.

3°. La quantité de *calorique* que contient une livre d'eau dont la température est à zéro, peut fondre pour le moins 12,12823 livres de glace.

Ces conséquences très-exactes ne sont que le simple énoncé des faits; elles ne déterminent point le *calorique spécifique* de l'air vital, de l'eau & du gaz acide carbonique lorsque la température de ces substances est à zéro, mais elles prouvent seulement qu'il est pour le moins assez considérable pour fondre les quantités de glace ci-dessus énoncées.

Déduisons maintenant de chacun de ces résultats la détermination du zéro réel, & voyons s'il existe entr'elles quelque coïncidence.

Détermination du zéro réel déduit de la combustion du phosphore.

Nous avons vu ci-dessus que la quantité de *calorique* qui se dégage de chaque livre de gaz oxygène pendant la combustion du phosphore, peut fondre 66,66667 livres de glace, il est très-probable que l'oxygène retient encore une certaine quantité de *calorique*; mais pour ne rien supposer, nous négligerons cette fraction & nous n'établirons notre calcul que sur le résultat de l'expérience.

Si la capacité de l'air vital étoit égale à celle de l'eau, la quantité de *calorique* qui se dégage pendant la combustion du phosphore, d'une livre

A a a a a

d'air vital, pourroit élever sa température de 4500 degrés; car comme il faut pour fondre une livre de glace une quantité de calorique représentée par 60 degrés du thermomètre, la quantité qu'il faut pour fondre 66,6667 livres est représentée par le nombre de 4.07.

Mais, suivant la table du docteur Crawford, la capacité de l'air vital est à celle de l'eau comme 4.743 : 1; divisant donc 4500 par 4.749, on a le nombre 842: ce calcul nous indique que le zéro réel déduit de cette expérience seroit à 842 degrés au-dessous du zéro qui est marqué sur le thermomètre.

* Détermination du zéro réel déduit de la combustion de gaz hydrogène.

La quantité de calorique qui se dégage pendant la formation d'une livre d'eau, fond 44,3384 liv. de glace. Il est bien certain que cette quantité de calorique est fournie en partie par l'air vital & en partie par le gaz hydrogène; mais pour nous restreindre aux simples résultats, admettons que le gaz hydrogène en se liquéfiant ne communique aucune portion de calorique; admettons même si l'on veut, que le gaz hydrogène ne contient point un atome de calorique, & conséquemment que la quantité de calorique dégage pendant la formation de l'eau provient entièrement de l'air vital.

Il entre dans chaque livre d'eau 13 onces 5 gros d'air vital, & puisque la quantité de calorique que contient une livre d'air vital peut fondre pour le moins 66,6667 livres de glace, il en résulte qu'une livre d'eau dont la température est à zéro contient encore assez de calorique pour fondre 12,3182 livres de glace.

Cette détermination qui n'est fondée sur aucune supposition, est beaucoup trop faible, parce que nous négligeons de calculer la quantité de calorique que contient le gaz hydrogène, & cependant malgré cette omission, nous allons démontrer que le zéro réel qui en derive est encore au-dessous de celui qui a été déterminé par l'expérience du docteur Crawford.

Puisqu'une livre d'eau à zéro contient assez de calorique pour fondre 12,3182 livres de glace, & que la quantité de calorique nécessaire pour fondre une livre de glace est égale à celle qui élève la température d'une liv. d'eau de 60 degrés, 12,3182 x 60 ou 739 représente le nombre de degrés dont seroit élevée la température d'une livre d'eau par la quantité de calorique qu'elle contient lorsqu'elle est sur le point de se solidifier. Le zéro réel déduit de cette expérience est donc à 739 degrés au-dessous du zéro qui est marqué sur le thermomètre.

Détermination du zéro réel déduit de la combustion du carbone.

Suivant le docteur Crawford, la capacité du

gaz acide carbonique est à celle de l'eau comme 1,0454 : 1: & puisque M. Lavoisier nous indique qu'une livre de gaz acide carbonique contient assez de calorique pour fondre 12,9796 liv. de glace (nous négligeons encore dans ce calcul la quantité de calorique que contient le carbone), nous pouvons conclure que si la capacité du gaz acide carbonique étoit égale à celle de l'eau, la quantité de calorique qu'il contient lorsque sa température est à zéro pourroit fondre 20,07 livres

de glace, car $\frac{12,9796}{1,0454} = 12,47$; multipliant

ce dernier nombre par 60, nous avons le nombre de degrés dont la température de l'acide carbonique seroit augmentée par la quantité de calorique qu'il contient lorsque sa température est à zéro.

Ce résultat fixe donc le zéro réel à 1204 degrés environ au-dessous du zéro thermométral.

§. I V.

Rapprochement des déterminations du zéro réel, déduites des expériences ci-dessus indiquées.

Le zéro réel déduit de la combinaison de l'eau & de la chaux vive dans le rapport de 9 à 16, est à 1537 degrés au-dessous du zéro thermométral, ci..... — 1537

Mélange d'acide sulfurique & d'eau dans le rapport de 4 à 3..... — 3141

Même mélange dans le rapport de 4 à 5..... — 1169

Mélange d'acide nitreux & de chaux vive dans le rapport de

9 à 1..... — 1839

9 à 1..... — 0,01783

Expérience du docteur Crawford, sur la combustion du gaz hydrogène..... — 680

Expérience de M. Lavoisier, sur la même combustion..... — 739

Expérience de M. Lavoisier, sur la combustion du phosphore..... — 842

Expérience sur la combustion du carbone, par M. Lavoisier..... — 1104

Comparaison des capacités de l'eau & de la glace déterminées par M.

Kirwan..... — 600

Nous pouvons conclure des différences qui

existent entre ces déterminations,

1°. Que le calorique obéit aux lois de l'affinité & se combine dans certaines circonstances avec les molécules des corps.

2°. Que les *caloriques* ne sont pas permanentes.

3°. Que le calorique spécifique n'est point pro-

proportionnel aux *capacités*, ou du moins que les trois suppositions suivantes, savoir, la non combinaison du *calorique* avec les molécules, la permanence des *capacités*, tant que les corps ne changent pas d'état, & le rapport proportionnel entre le *calorique spécifique* & les *capacités*, n'existent pas toutes les trois à la fois. Cette dernière conséquence me parait renverser la théorie du docteur Crawford sur la *chaleur*.

Les déterminations ci-dessus étant déduites d'expériences dans lesquelles il y a dégagement de *calorique combiné*, on pourroit se tromper très-fort en concluant que le zéro réel est au moins à 600 degrés au-dessous du zéro thermométral : il y a lieu de présumer que cette détermination est trop forte, mais rien n'indique encore quelle est la véritable ; il faut pour y parvenir, pouvoir remplir les conditions rapportées au commencement de ce chapitre.

CHAPITRE SEPTIÈME.

Capacité de la vapeur aqueuse déterminée par le docteur Crawford.

Le docteur Crawford admettant toujours la non combinaison du *calorique* avec les molécules, la permanence de *capacité* tant que les corps ne changent pas d'état, & le rapport proportionnel entre le *calorique spécifique* & la *capacité*, conclut que la *capacité* de l'eau dont la température est de 80 degrés, est à celle de la vapeur aqueuse comme le nombre représentant en degrés du thermomètre la quantité de *calorique* que contient l'eau prête à se vaporiser, est à ce même nombre plus celui qui représente de même en degrés du thermomètre la quantité de *calorique* absorbé pendant la vaporisation.

La quantité de *calorique* que contient l'eau lorsque sa température est à zéro, pouvant, suivant le docteur Crawford, augmenter sa température de 680 degrés, & la quantité de *calorique* que l'eau absorbe pendant sa vaporisation pouvant augmenter sa température de 476 degrés (ainsi qu'il résulte des expériences de M. Watt), le docteur Crawford conclut que la *capacité* de l'eau est à celle de la vapeur aqueuse comme $680 + 80 : 760 + 406$, ou environ comme 1 : 1,55.

Cette détermination étant fondée sur trois suppositions, pourroit fort bien ne pas être exacte, on peut se servir de l'appareil à la glace pour la vérifier & pour la déterminer, en cas que celle du docteur Crawford soit éloignée de la vérité.

CALOTTE ou BONNET CÉPHALIQUE. CUCUPHE. DEMI CUCUPHE. COËFFE. (*Pharmacie.*) C'est une espèce de bonnet piqué garni de poudres & d'essences céphaliques, qu'on applique sur la tête des malades pour fortifier le cerveau contre la migraine & autres affections.

Autrefois ces calottes étoient en usage ; l'inconvénient qui résulte de leur emploi est de rendre les malades infiniment sensibles aux changements les plus légers de l'atmosphère. Malgré cela elles peuvent être employées avec succès contre les catarrhes & les maladies de la tête. Il arrive que ces affections ne viennent que du péri-crâne qui est affecté, alors ces topiques externes peuvent offrir de grands secours. Ils ne seront même pas d'une moindre utilité dans les maladies qui dépendent d'une cause interne ; car, si l'on fait attention à la communication des vaisseaux sanguins, il n'y a point de doute que les parties les plus subtiles de ces céphaliques ne pénétrât enfin avec le sang dans l'intérieur du cerveau, & ne puisse lever les embarras & rétablir le ton des fibres.

Schroder donne dans sa pharmacopée les espèces suivantes pour les cucuphes.

Prenez racine d'iris de Florence, demi-once ; de souchet rond, fleurs de lavande & de romarin, de chaque trois gros ; feuilles de basilic, de marjolaine & de menthe, de chacune deux gros ; strax calamite, benjoin, de chacun deux gros & demi ; semence de nielle, de coriandre, sommités de thym, stochas arabique, de chaque un gros ; musc, trois grains ; ambre gris, deux grains. Faites un poudre grossière que vous mêlerez dans du coton & que vous rendrez dans de la toile recouverte de taffetas que vous piquerez. L'on peut couvrir cette espèce de calotte dans un chapeau en forme de coiffe, surtout l'hiver.

Comme le musc & l'ambre gris de cette formule de Schroder, pourroient incommoder par leur trop forte odeur, on peut les supprimer ou se servir des compositions suivantes qui sont plus douces.

Prenez racine d'angelique, une once ; feuilles de marjolaine, de sauge, feuilles & fleurs de romarin, sommités de hysope, de chacune une demi-pognée ; semence de nielle romaine, trois gros ; cloux de girofle, mastic & strax calamite, de chacun un gros. On pulvérisera le tout grossièrement ensemble, & l'on en formera une calotte piquée comme ci-dessus.

Lemerai donne la poudre suivante pour des cucuphes dans sa pharmacopée universelle.

Prenez girofle, canelle, roseau aromatique, jonc odorant, iris, marjolaine, romarin, bétoine, sauge, stochas, de chacun un gros ; baies de laurier, strax, benjoin, gomme taccamahac, de chaque demi-gros.

On pulvérisera grossièrement, & l'on mêlera toutes les drogues à l'accoutumée.

Ce bonnet piqué est propre pour réjouir & fortifier le cerveau, contre l'épilepsie, la l'éthargie, la paralysie, l'apoplexie ; il rafferme par ses parties subtiles qui entrent par les pores du crâne, la pituite trop condensée, & il lui donne

quelquefois ours par le nez ou par la bouche. Quincy traite du bonnet céphalique dans la pharmacopée universelle raisonnée, de la manière suivante.

Prenez de la racine de pivoine, deux gros ; de la racine d'angelique d'Espagne, un gros ; de la résine d'iris de Florence & des fleurs de levain, un demi-gros de chacune ; des fleurs de stœchas arabique, un gros ; des clous de gérache, de la noix muscade, du macis, un scrupule de chacun ; du linza, du Libdinum, du succin & du baume de tolu, un gros de chacun ; de l'huile de romarin, cinq gouttes ; faites en une poulpe grossière que vous mêlerez avec du coton & en ferez comme la fourrure d'un bonnet de soie.

On met ce bonnet toutes les nuits, & le jour autant qu'on le peut ; on trouvera qu'il sera du bien dans les rhumes froids qui sont sujets à se changer en catarrhes, & dans toutes les dispositions des nerfs qui viennent de faiblesse & d'une cause froide qui est dans la tête.

Il faut auparavant l'application de ces aromas céphaliques, raser la tête.

Stehl, Junker, Frédéric Hoffman & autres, conseillent également les cucuphes pour combattre les maladies des nerfs & de la tête.

(M. WILLEMET.)

CAMARA. (Pharmacie.) *Lantana camara*, *Camara malissa folio*, *flore variabilis*. Dill. Eth. 65. C'est un arbrisseau de l'Amérique méridionale, que les curieux cultivent ; les Américains prennent l'infusion des feuilles en guise de thé, contre les fièvres. Ils s'en servent aussi dans les bains aromatiques.

(M. WILLEMET.)

CAMARA PIQUANT. (Pharmacie.) *Lantana aculeata*, *Camara spinosa*, *flore variegata*. Plum. Gen. 32. Cette espèce nous vient également des mêmes contrées, elle est appelée par les Américains, *Saxie des montagnes*. Ils s'en servent encore dans les bains aromatiques.

(M. WILLEMET.)

CAMARINE. (Pharmacie.) *Empetrum nigrum*, *Erica buccifera*. Clus. Pann. 29. C'est un petit arbrisseau qui aime les hautes montagnes du Dauphiné, de l'Auvergne, de l'Autriche, de la Suisse, du Kamtschatka, dont les baies noires en maturité offrent un suc pourpre, propre à la teinture. Ce fruit est rafraîchissant, antiscorbutique, contre les convulsions, les ophtalmies ; dans quelques pays du nord on en compose une boisson délassante.

(M. WILLEMET.)

CAMELÉE. (Pharmacie.) *Cneorum tricoccum*, *Chamaelea*, Cam. Epir. 973. C'est un petit arbrisseau qui croît dans les lieux pierreux des

provinces méridionales de la France, de l'Espagne, de l'Italie.

Il fournit un purgatif très-violent, dont les anciens faisoient usage, mais que l'on a abandonné à cause de sa qualité brûlante & acre. On l'emploie à l'extérieur pour déterger les ulcères anciens.

(M. WILLEMET.)

CAMÉLÉON MINÉRAL. Scheele a indiqué sous ce nom une combinaison qu'il a faite de l'oxide de manganèse avec la potasse, & qui a la singulière propriété de prendre beaucoup de couleurs différentes, suivant sa température, son état de dissolution, son exposition à l'air, &c. On voit que c'est d'après ces changements qu'il a adopté cette dénomination, qui d'ailleurs n'a rien d'exact, & ne doit pas être admise dans une nomenclature méthodique. Le vrai nom de ce composé est manganéfate de potasse. Voyez ce mot ainsi que ceux de MANGANÈSE & OXIDE DE MANGANÈSE.

CAMÉLINE ou **SÉSAME D'ALLEMAGNE.** (Pharmacie.) *Myagrum sativum*, *Chamelinum*, Tab. Plante annuelle que l'on cultive pour exprimer l'huile de sa graine. Cette semence est émolliente, propre aux maux des yeux, elle est recherchée de la plupart des oiseaux granivores. On peut en mêler avec la farine ordinaire dans les années de disette ; son huile est onctive, elle adoucit les âpretés & rugosités de la peau, sert à la nourriture des indigènes, aux assaisonnemens, à éclaircir, & à plusieurs autres usages économiques.

La plante est mangée avidement par les bœufs, les chevaux, chèvres & moutons. Les abeilles aiment la fleur.

(M. WILLEMET.)

CAMÉLINE PERFOLIÉE. (Pharmacie.) *Myagrum perfoliatum*. Cette espèce champêtre, à sa semence, dit-on, qui est émolliente, adoucissante & cosmétique.

(M. WILLEMET.)

CAMERISIER. (Pharmacie.) *Lonicera xylosteum*, *Xylosteum*. Dod. Pempt. 412. Arbrisseau européen des bois & des haies, dont les baies purgent & font vomir : les oiseaux en mangent.

Les Russes retirent du camérisier, une huile empyreumatique, qu'ils emploient intérieurement pour purifier le sang, contre la vérole, le scorbut & la galle ; à l'extérieur contre toutes sortes de tumeurs.

Le bois sert à plusieurs ouvrages économiques. Les feuilles peuvent servir à nourrir les chèvres & les moutons. Le camérisier convient dans les bosquets, ainsi que le suivant.

(M. WILLEMET.)

* CAMERISIER DES ALPES. (*Pharmac.*) *Lonicera alpigena*. *Chamaecrafolus*. *Wefne*. *Fest.* 33. Cette espèce ne se trouve que sur les hautes montagnes des Alpes, des Pyrénées, des Vosges, de la Suisse. On la cultive dans notre jardin botanique.

Ses baies font vomir à la dose de cinq à huit grains.

(M. WILLEMET.)

CAMOMILLE ORDINAIRE. (*Pharmac.*) *Matricaria chamomilla*, *Anthemis vulgaris*. *Lob. Icon.* 770. Plante annuelle champêtre, commune dans toute l'Europe, qui est un très-grand médicament comme fébrifuge, émollient, carminatif, résolutif, stomachique & antispasmodique.

Les fleurs de camomille sont très-efficaces suivant Rivière, dans les douleurs de colique; suivant Hoffman dans la cardialgie; suivant Fernel dans les douleurs qui suivent l'accouchement & dans la suppression des lochies; suivant Scholz dans l'affection hystérique; suivant Trallien contre la syncope. Ces fleurs sont un spécifique contre les fièvres intermittentes, ce qui les a fait employer comme telles depuis Galien jusqu'à nos jours, & méritent assurément une place distinguée dans la matière médicale indigène. Enfin, elles tiennent le premier rang parmi les antispasmodiques, suivant les expériences de Fringlé. Elles rendent l'appétit aux chevaux. On se sert de cette plante en infusion ou décoction, dans les cataplasmes, fomentations, bains, lavemens, pédiluves. L'on en retire une huile essentielle bleue; on en prépare un sirop, une eau distillée, une huile, par la coction. Le codex de médecine donne la préparation d'une teinture spiritueuse de camomille qui entre dans l'eau hystérique. La pharmacopée d'Ausbourg cite l'usage de l'extrait de la même plante.

Le dispensaire de Paris fait entrer les fleurs de camomille dans la décoction aromatique destinée à faire des fomentations, l'onguent martial, l'elixir de vitriol, l'essence carminative de Wedelius, l'eau générale, la décoction vulnérinaire, l'eau vulnérinaire, l'onguent de *Archaniis*, l'emplâtre de grenouilles, celui de melilot composé. Les fleurs de camomille entrent encore dans l'onguent nérvin, dans l'onguent carminatif, l'emplâtre diachylon, dans ceux contre les ruptures & pour la matrice, dans les espèces émollientes & résolutives, dans l'esprit balsamique de Schwerrin, l'eau carminative commune & spiritueuse, l'eau royale, dans l'ancien cerat de Galien, & l'eau contre la colique des enfans.

La camomille peut servir d'ornement à quelques parties de jardins; elle convient à la pâture des bœufs, des moutons & des chevaux; elle est fort nuisible aux champs de seigle.

Nous avons sur cette plante un ouvrage fait

par Scheuze, & un autre par Jean Daniel Scheflier, médecins allemands.

(M. WILLEMET.)

CAMOMILLE ROMAINE. (*Pharmac.*) *Anthemis nobilis* *Chamaemelum romanum*. *Cam. Epir.* 646. C'est une plante pérennelle, odorante, qui mérite d'être cultivée pour ses excellentes propriétés médicinales. Ses vertus sont au moins aussi énergiques que celles de la camomille ordinaire, & nous la préférons pour l'usage intérieur. Elle est en outre balsamique & parégnique; l'on en retire par la distillation une huile d'un beau bleu saphir.

La camomille romaine peut servir à la décoration des parterres.

(M. WILLEMET.)

CAMOMILLE PUANTE ou MAROUTE FÉTIDE. (*Pharmac.*) *Athenis corula*, *Corula fœtida*. *Dod. pempt.* *Chamaemelum fœtidum*. *C. B.* 135. Cette espèce est annuelle, mais puante. On la substitue souvent à la camomille ordinaire; elle a à-peu-près les mêmes qualités. Quelques écrivains la recommandent spécialement contre l'épilepsie, les étranglements de la matrice, les écrouelles, l'asthme. Lobel, dit qu'étant sèche, elle pousse les urines, évacue la bile noire & dégage le poulmon. Zimmermann place son infusion rhéiforme au premier rang après l'opium, pour la vertu de dissiper les douleurs du dysentérie. Elle est un peu épispastique.

La maroute chasse les araignées, les couffes & les guêpes, tandis qu'elle attire les crapauds.

(M. WILLEMET.)

CAMOMILLE CHAMPÊTRE. (*Pharmac.*) *Anthemis arvensis*, *Chamaemelum inodorum*. *T.* 494. Cette espèce est bisannuelle. Ses propriétés sont analogues à celles de la camomille ordinaire; elle est de plus vulnérinaire, peut orner les parterres & servir de fourrage aux bestiaux.

(M. WILLEMET.)

CAMPANULE GANTELEE, ou GANT DE NOTRE-DAME. (*Pharmac.*) *Campanula trachelium*, *Campanula major*. *Fuchs. Icon.* 243. *Trachelium vulgare*. *Chs. Hist.* 2. 170. On trouve cette plante en Europe dans les bois; ses feuilles, ses fleurs & ses racines sont vulnérinaires, astringentes, contre les inflammations de la bouche & de la gorge; ses jeunes pousses & ses racines peuvent se manger en salade comme la raiponce.

(M. WILLEMET.)

CAMPANULE RAIPONCE, PIED DE SAUTERELLE ou RAIPONCE. (*Pharm.*) *Campanula rapuncular*, *Rapunculus esculentus*. *C. B.* 91. Cette campanule est bisannuelle. On la trouve dans les lieux incultes & le long des haies, en France, en An-

glacière, dans l'Helvétie; on la cultive dans les potagers pour manger la racine & ses jeunes pousses en salade au printemps; elle passe pour apéritive; rafraîchissante diurétique, propre à augmenter le lait des nourrices. La campanule inclinée; (*Campanula rapunculoides*.) La campanule graminée; (*Campanula graminifolia*) & la ganteline; (*Campanula glomerata*) offrent les mêmes qualités.

(M. WILLEMET.)

CAMPANULE LIERRETTE. (*Pharmacie.*) *Campanula hederacea*. Plante de nos contrées qui se trouve dans les endroits humides. M. de Saint-Martin a fait insérer dans le journal de médecine, une observation par laquelle il prouve que cette campanule réduite en poudre, détruit totalement les verrues en les frottant souvent.

(M. WILLEMET.)

CAMPANULE LINNÉENNE. (*Pharmacie.*) *Linnaea borealis*. *Campanula serpyllifolia*. C. B. 53. C'est ainsi que Linnéus parle de cette plante, à laquelle Gronovius a donné son nom. « La linnée, dit-il, petite plante de Laponie, rampante, vile, négligée & qui passe promptement comme celui dont elle porte le nom. » Cet acte de modestie du grand Linnéus sera démenti jusques dans les siècles les plus reculés. Quoi qu'il en soit, cette plante, est d'après les expériences de Linnéus, diurétique, adoucissante; prise en guise de thé & coupée avec le lait, elle est excellente contre la sciatique, & Gunnes la expérimenté contre la fièvre scarlatine. Cuite on l'applique avec un très-grand sucécès en cataplasme & en fomentation sur les parties atteintes de rhumatisme. Cette plante se trouve en Poméranie, en Canada & en Suisse.

(M. WILLEMET.)

CAMPHORATES. Le nom de camphorates a été donné dans la nomenclature des chimistes françois aux combinaisons salines neutres de l'acide camphorique, avec les bases terreuses alcalines & métalliques. C'est M. Kosegarten qui, après avoir distillé huit fois de suite de l'acide nitrique sur du camphre, est parvenu à le convertir en un acide particulier. Cet acide camphorique avoir échappé jusque-là aux recherches de tous les chimistes, qui avoient au contraire que le camphre jadis se dissolvait tranquillement dans l'acide nitrique & que cette dissolution, distillée un grand nombre de fois de suite, ne laissoit dans la corpuce que quelques traces bitumineuses. Il est vrai qu'aucun chimiste n'avoit fait cette opération comme M. Kosegarten; aucun n'avoit distillé huit fois de suite de nouvelles quantités d'acide nitrique bien pur sur le camphre; & ce qu'il y a de plus singulier encore, c'est qu'il y a depuis plusieurs années que cette découverte

est publiée, on ne l'a pas confirmée dans les laboratoires avec l'espece d'authenticité & par des succès aussi multipliés qu'on l'a fait pour toutes les autres découvertes modernes. C'est donc de M. Kosegarten lui-même qu'il faut emprunter le peu de lumières acquises sur l'acide camphorique & sur les combinaisons salines; on verra que celles-ci sont bien loin d'être assez connues pour constituer une histoire chimique assez exacte & assez étendue. Rappelons ici que l'acide camphorique obtenu par M. Kosegarten cristallise en parallélépipèdes, qu'il a une saveur amère, & qu'il rougit la teinture des violettes ainsi que celle de tournesol. L'acide camphorique qui, par le mode de sa formation artificielle, semble avoir des analogies avec l'acide oxalique fait par l'art, en diffère singulièrement suivant l'auteur de cette découverte, & par son peu d'assimilé comparée avec la chaux qu'il n'enlève pas à tous les autres acides comme le fait l'acide oxalique, & par son action sur différents corps ainsi que par les propriétés de ses combinaisons.

Quant à ses attractions électives, il ne nous est pas possible de rien dire d'exact à cet égard; les expériences manquent encore pour les constater.

Il est aisé d'apprécier la cause & la nature de la formation de l'acide camphorique, d'après ce qui a été dit jusqu'ici sur la composition de divers acides connus & sur les propriétés des corps combustibles. Le camphre est un composé d'hydrogène, de carbone & d'oxygène. On voit par le dégagement d'acide carbonique, que cette huile est décomposée par l'acide nitrique; une partie du carbone qui entre dans la composition naturelle de ce corps huileux se combine avec une portion de l'oxygène de cet acide; une autre portion de cet oxygène se fixe dans le camphre, privé de la plus grande partie de son carbone, & c'est ce camphre, ainsi oxygéné & décarbonylé, qui constitue l'acide camphorique. Il ne manque à cette explication simple sur la formation de l'acide camphorique, que la connaissance des proportions des principes du camphre, & l'appréciation de ceux qui restent dans l'acide, ainsi que de ceux qui se séparent pendant la formation de l'acide camphorique. C'est sous ce dernier point de vue que les chimistes modernes doivent sur-tout s'occuper de l'analyse du camphre, & de la formation de son acide.

On doit juger par ce qui vient d'être exposé, que l'histoire des camphorates est non-seulement incomplète, mais presque entièrement inconnue, & que nous n'avons qu'un très-petit de chose, souvent même absolument rien à dire sur chacun de ces sels en particulier.

CAMPHORATE D'ALUMINE. Entièrement inconnu.

CAMPHORATE

CAMPHORATE D'AMMONIAQUE. L'acide camphorique s'unit promptement à l'ammoniaque ; il paroît que ce sel est susceptible de cristalliser facilement, puisque M. Kosegarten dit qu'il forme des mailles cristallines, & des cristaux en aiguilles & en prismes. On ne fait rien sur sa forme exacte, sa saveur, sa dissolubilité, sa décomposition par la feu, les terres, les alcalis, les autres acides, &c. Il n'est d'aucun usage, & cette assertion doit être appliquée à tous les autres camphorates.

CAMPHORATE D'ANTIMOINE. Entièrement inconnu. M. Kosegarten n'a rien dit de l'action de l'acide camphorique sur l'antimoine.

CAMPHORATE D'ARGENT. Comme le précédent.

CAMPHORATE D'ARSENIC. L'acide camphorique dissout l'arsenic, suivant l'expression de M. Kosegarten. L'auteur veut sans doute parler de l'oxide d'arsenic. Il ne dit rien au reste des propriétés de ce composé, qui paroît être bien dissoluble.

CAMPHORATE DE BARYTE. Inconnu, quoique ce soit une des combinaisons de l'acide camphorique, qu'il soit le plus nécessaire de bien connoître.

CAMPHORATE DE BISMUTH. Suivant M. Kosegarten, l'acide camphorique dissout le bismuth ; mais les phénomènes de cette dissolution & les propriétés du camphorate de bismuth sont également ignorés.

CAMPHORATE DE CHAUX. Il paroît que M. Kosegarten a fait quelques expériences sur la combinaison de l'acide camphorique avec la chaux, & qu'il a déterminé l'attraction de cet acide pour la terre calcaire moindre que celle des autres acides ; mais comme il ne l'a fait que dans l'intention de trouver & de montrer la différence de l'acide camphorique d'avec l'acide oxalique qui est formé comme on fait par l'acide nitrique, il n'a point examiné les propriétés du camphorate de chaux, en sorte que nous n'avons rien à ajouter sur ce sel.

CAMPHORATE DE COBALT. L'acide camphorique dissout le cobalt, suivant M. Kosegarten. On ne fait rien sur la nature & les propriétés de cette dissolution & du sel qu'elle peut fournir.

CAMPHORATE DE CUIVRE. Ce qu'a dit M. Kosegarten sur l'union du cuivre avec l'acide camphorique, se borne à avoir indiqué l'action de cet acide sur le métal, en assurant qu'il y étoit dissous.

Chimie. Tome II.

CAMPHORATE DE FER. L'acide camphorique dissout le fer, suivant M. Kosegarten, & la dissolution donne une poudre jaunâtre qui est presque insoluble ; ainsi le camphorate de fer paroît résister de s'unir à l'eau, ou bien oxider promptement le fer, & opérer facilement la séparation de cet oxide.

CAMPHORATE D'ÉTAIN. Entièrement inconnu.

CAMPHORATE DE MAGNÉSIE. Uni à la magnésie. L'oxide camphorique forme un sel en poudre blanche, dissoluble, dont les propriétés n'ont pas été suffisamment observées pour être bien connues.

CAMPHORATE DE MANGANÈSE. Il paroît que l'acide camphorique est susceptible de s'unir à l'oxide de manganèse, puisque suivant M. Kosegarten, cette combinaison forme des cristaux à plans parallèles qui imitent les colonnes de basalte. Il n'a point examiné ce sel plus en détail, & il n'a pas reconnu d'autres propriétés.

CAMPHORATE DE MERCURE. On ne fait rien sur la combinaison de l'acide camphorique avec ce métal.

CAMPHORATE DE MOLYBDÈNE. Entièrement inconnu.

CAMPHORATE DE NICKEL. Combinaison encore inconnue.

CAMPHORATE D'OR. Comme les précédents.

CAMPHORATE DE PLATINE. Rien de connu.

CAMPHORATE DE PLOMB. Inconnu.

CAMPHORATE DE POTASSE. M. Kosegarten a dit un mot de ce sel. Suivant ses expériences, la combinaison saturée d'acide camphorique & de potasse se cristallise en prismes hexaèdres réguliers. On ne trouve rien d'ailleurs sur la saveur, la dissolubilité, la cristallinité, la décomposition par d'autres corps, & son altérabilité par le feu, l'air, &c. On voit donc qu'on est bien loin de connoître comme il conviendrait cette espèce de sel neutre.

CAMPHORATE DE SOUDE. Il en est de même de celui-ci. On se contente d'indiquer, d'après les essais de M. Kosegarten, qu'il donne des cristaux irréguliers ; c'est-à-dire qu'il est presque inconnu.

CAMPHORATE DE TUNGSTÈNE. Absolument inconnu.

Bbbb

CAMPHORATE DE ZINC. L'acide camphorique dissout le zinc, suivant M. Kosegarten ; mais on ne fait rien sur les propriétés de cette combinaison.

CAMPHORIQUE. (*Acide*) On nomme acide camphorique celui qui est formé par l'action réciproque du camphre & de l'acide nitrique ; tout ce qu'on fait sur cet acide a été exposé soit à l'article **ACIDES VÉGÉTAUX** du premier volume, soit à celui de **CAMPHORATE** qui précède. Voyez le mot **CAMPHORATE**.

CAMPHRE. *Camphora, Caphura.* Le camphre est un des principes immédiats, ou un des matériaux des végétaux, d'une nature volatile, inflammable, huileux, qui a de grands rapports avec les résines, les huiles volatiles, l'arôme, & qui accompagne constamment ces principes dans les analyses végétales ; il est dans les laboratoires sous la forme d'une matière blanche, concrète, cristalline, transparente, friable, d'une odeur & d'une faveur très-fortes qui lui sont particulières, & d'une volatilité qui permet à ses molécules de s'élever, pendant l'éte, au haut des vases où il est renfermé. Son odeur que les animaux fuient, a donné lieu à ce vers de l'école de Salerne :

Camphora per nares castrea odore maris.

La plupart des auteurs, en parlant de la combustibilité du camphre, disent qu'il est si combustible qu'il brûle dans l'eau. La vérité est qu'il surnage ce liquide, & qu'il brûle à sa surface ; mais il s'éteint lorsqu'on l'y plonge. C'est cette opinion qui a fait dire que le camphre faisait partie du feu grégeois.

Les chimistes, d'après un assez grand nombre d'observations, regardent le camphre comme un principe immédiat & comme appartenant à un grand nombre des végétaux ; ils pensent qu'il existe dans toutes les plantes très-odorantes & qui contiennent de l'huile volatile. On en a en effet retiré des racines de canellier, de zedoaire, du thym, du romarin, de la sauge & de plusieurs labiées, soit par la distillation, soit par la décoloration, comme l'ont observé Cartreuer & Neumann ; mais ce camphre est en très-petite quantité, & il a toujours l'odeur de la plante dont on l'a extrait. Il parait que ce singulier être se trouve combiné avec les huiles volatiles de ces végétaux, puisque Geoffroy a observé que ces dernières dépoient des aiguilles de camphre.

J'ai vu chez M. Joffe, apothicaire de Paris, du véritable camphre retiré de la racine d'*Amomum*. Lorry regardoit le camphre comme un principe très-répandu dans les végétaux, & plaçait son zéro à la tête d'une foule d'odeurs très-éthériques, & dont les effets sur l'économie animale

doivent fixer l'attention des chimistes & des médecins. M. Proust a publié une dissertation, dans laquelle il décrit la manière d'obtenir une assez grande quantité de camphre des huiles de plusieurs plantes aromatiques qui croissent en Turquie ; nous joindrons cette dissertation à cet article.

Le camphre dont on se sert dans les arts & dans la médecine, se retire d'une espèce de laurier qui croit en Chine, au Japon & dans les îles de Bornéo, de Sumatra, de Ceylan, &c. L'arbre qui le produit en contient quelquefois une si grande quantité, qu'il suffit de le fendre pour en retirer des larmes assez grosses & très-pures ; ou l'obtient cependant par la distillation. On met dans un alambic de fer les racines ou les autres parties de l'arbre avec de l'eau ; on les recouvre d'un chapiteau de terre dans lequel sont arrangées des cordes de paille de riz, & on chauffe le tout. Le camphre se sublime en petits grains grisâtres, que l'on réunit en morceaux plus grands. Ce camphre brut est impur. Les Hollandais le purifient en le sublimant dans des espèces de ballons, & en ajoutant, dit-on, une once de chaux par livre de cette substance.

A ces généralités sur l'art d'extraire le camphre, nous ajouterons ici quelques détails congnés dans le dictionnaire de M. Lomare, qui peut être regardé, en quelque sorte comme un témoin oculaire, ou plutôt comme un des auteurs originaux de cette partie de l'histoire du camphre, par les renseignements qu'il a pris sur cette matière chez les Hollandais, qui en font presque exclusivement le commerce. Le camphre, dit cet auteur, découle du tronc & des grosses branches d'un arbre qui croît abondamment dans la patrie occidentale du Japon & dans les îles voisines ; rarement à Bornéo en Asie, ou à Sumatra près de Barras. Cet arbre qui est une véritable espèce de laurier, s'appelle, dans le pays, *caphura* ; il égale en hauteur les tilleuls & le chêne. Étant jeune, son tronc est rond, revêtu d'une écorce lisse & verdâtre ; devenu vieux il est raboteux, & son écorce est couverte de fesses. Son bois, ainsi que celui des racines, est d'un tissu peu serré ; d'abord blanc, ensuite rougeâtre, panaché comme le bois de noyer, & d'une odeur forte & aromatique ; on en fait plusieurs ouvrages. Ses feuilles, semblables à celles du laurier, sont petites à proportion de sa grandeur. Étant froissées elles ont une odeur de camphre, de même que tout le reste de l'arbre. Des aisselles de ces feuilles s'élève un pédoncule long de deux poudres, portant plusieurs petites fleurs blanches en forme de tuyau à neuf étamines garnies de sommets & d'un pistil tendre. A ces fleurs succèdent des baies de couleur pourpre, brillantes, ligneuses, de la grosseur d'un pois, portées chacune sur un calice tres-

court, & d'une saveur tirant du girofle & du camphre , renfermant une amande blanchâtre , huileuse , couverte d'une peau noire , se séparant en deux lobes .

» Le camphrier de Bornéo s'appelle *stadi* : il est plus petit , fongueux comme le tureau , ayant des nœuds comme le roseau , des fruits de la grosseur d'une aveline , & que l'on confit pour en faire usage contre le mauvais air. Cet arbre contient très-peu de camphre ; il s'y trouve en petites larmes concrètes , & le fusil de réduire le bois en petits morceaux comme des alumettes , & de les froisser , pour les retirer au moyen d'un crible. Il parvient très-peu de camphre en Europe ; il est réservé pour les grands du pays , & celui du Japon est moins estimé , au Japon même , puisque les commerçans de cette contrée donnent depuis cent livres jusqu'à six cents livres pesant du lui , pour en avoir seulement une livre de celui de Bornéo .

» Le camphre est dispersé sur toutes les parties de l'arbre *euphor*. *Kemfer* dit que dans les provinces de Sattuma & de Gotoé , les paylans coupent la racine & les bois du camphrier par petits morceaux ; ils les font bouillir avec de l'eau dans un pot de fer fait en vessie , sur lequel ils placent un grand chapeau agileux , pointu & rempli de chaux & de uatte ; le camphre se sublime comme de la suie blanche ; ils le détachent en secouant le chapeau , & ils en font des masses friables , grenelées , jaunâtres , ou blâches comme de la cassonade , remplis d'impuretés. Telle est l'espèce de camphre que les Hollandais nous rapportent des Indes. Ils ont seuls l'art de le raffiner en grand ; & quoique *Pomet* , *Linnæus* & *M. Geoffroy* nous en aient donné le procédé , on a été toujours fort incertain sur la méthode que les Hollandais employent pour y parvenir. L'opinion la plus commune & la plus reçue , est que l'état où nous recevons le camphre purifié , soit un effet de la fusion , & cette opinion étoit fondée sur ce que les huiles essentielles concrètes (comme est le camphre) ne peuvent se fondre qu'à un degré de chaleur semblable à celui de l'eau bouillante , & qu'elles se décomposent à un degré plus fort & qui seroit nécessaire pour opérer la sublimation du camphre ; que le camphre en se rétrouissant , prenoit la forme du fond intérieur du vase où il s'étoit liquéfié. Aussi , disoit-on , le camphre a dû conserver la forme du point de la bouteille .

» Cet objet excita ma curiosité dans un de mes voyages en Hollande. J'entrai dans un laboratoire à tannerie de camphre , & je vins à bout de découvrir une grande partie de l'appareil nécessaire à l'opération. Un corps de fourneaux à hauteur d'appui , par lequel un grand nombre de capsules garnies de sable & d'autant de bouteilles à cul plat , sous des couvercles de ter étamé ,

un feu de tourbe très-gradué , joints à plusieurs autres circonstances , me firent soupçonner que le raffinage du camphre se faisoit par sublimation. La forme des pains de camphre concave d'un côté & convexe de l'autre , avec un ombilic semblable à celui qu'on observe dans les pains de sel ammoniac sublimé , ne favorisoit pas l'idée de la seule fusion. Ainsi je me persuadai que le camphre purifié étoit sublimé .

» De retour à Paris , je voulus m'assurer si mon soupçon étoit fondé , & j'ai fait à ce sujet plusieurs expériences sur divers camphres bruts , tant du Japon que de Bornéo , &c. De ce travail , dont j'ai rendu compte à l'académie des sciences en 1791 , il résulte 1°. que l'axiome adopté généralement , que le camphre chassé au degré de l'eau bouillante , & même au-dessus , ne peut se sublimer sans se décomposer , doit souffrir quelque exception ; 2°. que pour parvenir à la sublimation du camphre , (qui est la purification ,) le feu doit être gradué & assez violent ; 3°. que l'usage d'un vase de verre vert convient moins pour cette opération que le verre blanchâtre , & que ces vases ou bouteilles de verre n'ont point leur fond intérieur convexe , ainsi qu'on le disoit , il est au contraire très-plat ; 4°. que l'usage des couvercles est une manière de réverbère qui , conservant & réfléchissant la chaleur , accélère la fusion du camphre , nécessaire à la purification & à sa sublimation ; 5°. que le contact de l'air extérieur bien ménagé , contribue à faciliter l'opération. Le trait de la trépanale qu'on observe sur les parties extérieures des pains de camphre , ne provient que d'un rétrouissement subit ou très-prompt à l'instant où l'on retire les bouteilles du bain de sable encore chaud , & qu'on les expose à l'air libre ; alors on entend un cliquetis qui produit des lignes ou des raies en tous sens , comme le fait un coup de marteau sur un morceau de cristal ou d'eau convertie en glace ; 6°. que le camphre brut du Japon ne peut que peu ou point de son poids , étant mis seul sur le feu dans un vase sublimatoire ; mais qu'étant mêlé avec le même qui est purifié , il déchet d'un tiers ; 7°. que le camphre purifié , au contraire , étant mis seul à sublimer ne diminue point , tandis que le camphre brut de Bornéo perd un vingtième de son poids ; 8°. que la partie du pain de camphre qui touche immédiatement à la pointe du bouchon (qui est fait de coton ,) au bas intérieur du goulot de la bouteille , & même l'incruste , est communément poreuse , sans consistance & d'un gris rouffâtre. Pour obtenir ces pains , on casse les bouteilles à l'aide d'un petit marteau , ensuite on prend un instrument de fer dont la partie tranchante est cambree , on pare les superficies de chaque pain , notamment celles du côté du verre ; & pour parvenir à retirer tout le coton , on en attache une partie au moyen

des doigts, & l'on en obtient le reste en taillant & perçant la masse de part en part avec le même instrument de fer, de manière à faire un trou qui y reste, &c. qu'on observe au centre des pains de camphre; 8°. enfin, que la manière de purifier le camphre telle que je l'ai exécutée, n'est pas aussi compliquée que celle qu'on lit dans les auteurs, & notamment dans la dissertation de M. Jean-Frédéric Gronovius, qui est insérée dans la matière médicale de M. Goussier, &c. qu'il seroit difficile de répéter. Néanmoins toutes ces espèces de camphre exposées à l'air, s'y sont totalement dissipées à la longue, &c. m'ont entièrement convaincu que le camphre est une substance toute particulière, &c. qui a des caractères qui la distinguent de tous les autres corps du règne végétal ».

Le camphre est beaucoup plus volatile que les huiles essentielles, puisqu'il se sublime à la plus douce chaleur, il se cristallise en lames hexagones attachées à un filet moyen. Si on le chauffe brusquement, il se fond avant de se volatiliser. Il semble n'être pas décomposable par ce moyen; cependant, si on le distille plusieurs fois, il donne un phlegme roussâtre & manifestement acide; ce qui indique qu'en répétant un grand nombre de fois cette opération, on parviendrait à le dénaturer. La seule température de l'été suffit pour le volatiliser; exposé à l'air, il se dissipe entièrement; renfermé dans un vaisseau, il se sublime en pyramides hexagones, ou en cristaux polygones, qui ont été observés & décrits en 1756 par Romieu. Dans la sublimation par le feu, le camphre s'attache au haut des vaisseaux, dit Romieu, sous la forme de flocons, qui ne diffèrent pas des flocons de neige. Il compare aussi la forme du camphre à celle de l'eau gelée, qu'il regardoit déjà comme une véritable cristallisation. Ces flocons détachés du vaisseau & examinés à la loupe, paroissent composés de lames hexagones attachés à un filet. Dans la sublimation qui se fait sans feu & par la seule chaleur de l'atmosphère, dans un petit vaisseau de verre qui touche à un mur par un de ses côtés; après quelques mois, il se forme intérieurement une grande quantité de lames prismes ou pyramides hexagones, qui, s'y joignant ensuite, forment sur les parois du vaisseau, une sorte de végétation. Quelque temps après les prismes ou pyramides isolées deviennent plus grosses: examinées à la loupe, elles paroissent de gros cristaux solides taillés à facettes, &c. l'on voit toujours régner dans ces formes l'affaiblissement des facettes ou lames à s'incliner entr'elles à un angle de 60 degrés, ainsi que les aiguilles d'eau gelée, &c. ainsi que les fillets de camphre cristallisés dans la dissolution alcoolique de ce corps, également observés par Romieu, &c. dont il sera question plus bas.

Le camphre répand une odeur forte & in-

supportable à quelques personnes; il s'enflamme très-rapidement, brûle avec beaucoup de fumée, &c. ne laisse aucun résidu charbonneux. Il seroit très-utile de déterminer avec soin les produits que donne le camphre dans sa combustion, la quantité d'air vital qu'il consomme, celle d'eau d'acide carbonique qu'il fournit, &c. de charbon libre qui s'en dégage en fumée. Cette expérience comparée à la combustion des huiles volatiles, seroit connoître la différence qui existe entr'elles & le camphre, & qui ne paroit considérer que dans la proportion des principes; mais cette expérience n'a point encore été faite, &c. elle ne pourra l'être que lorsqu'on aura perfectionné les machines destinées à la combustion des huiles.

Le camphre ne se dissout pas seulement dans l'eau; il lui communique cependant son odeur, il brûle à sa surface. Romieu a observé que des parcelles de camphre, d'un tiers ou d'un quart de ligne de diamètre, mises sur un verre d'eau pure, se meuvent en tournant, &c. se dissolvent au bout d'une demi-heure. Il soupçonne que ce mouvement est un effet de l'électricité, &c. il remarque qu'il cesse en touchant l'eau avec un corps qui sert de conducteur, comme un fil de fer, &c. qu'il continue, au contraire, si on la touche avec un corps isolant tel que le verre, la résine, le soufre, &c. Voici comme Romieu s'exprime sur ce phénomène. Acad. 1756, pag. 449. « Si on réduit le camphre en petites parcelles d'environ une ligne de diamètre, ou même plus petites, &c. qu'on en jette un petit nombre, par exemple, douze ou quinze sur la surface d'une eau pure contenue dans un vaisseau de verre, elles y sont dans une agitation continuelle jusqu'à ce qu'elles y soient dissoutes, ce qui arrive dans une demi-heure ou environ en été, lorsqu'elles ont un tiers ou un quart de ligne de diamètre ».

« Si la surface de l'eau est toute couverte de parcelles de camphre, on n'y aperçoit aucun mouvement; il faut pour cela qu'elles soient un peu éloignées les unes des autres ».

« Les morceaux de camphre d'environ 4 ou 5 lignes de diamètre & au-dessus, ne sont susceptibles de mouvement que lorsqu'on les enflamme par la partie qui surmante, &c. il se pet des qu'ils viennent à s'étendre ».

« Si la figure des parcelles de camphre est un peu allongée & qu'elles soient fort petites, leur mouvement de rotation qui est tantôt circulaire, tantôt spiral, n'en est que plus vif & plus sensible; comme aussi lorsqu'on a agité l'eau dans le vaisseau qui la contient, ou qu'elle est chaude ».

« On observe souvent entre les parcelles de camphre des mouvements d'attraction &c. de répulsion bien décidés lorsqu'elles viennent à se rencontrer ».

« Si l'on examine attentivement avec une loupe

les parcelles de camphre qui sont en mouvement, sur-tout celles qui sont vers les parois du vaisseau où l'eau se trouve élevée par l'adhésion, on aperçoit un petit enfoncement sur la surface de l'eau tel que le produiroit un courant d'air qui fortiroit de dessous la parcelle ».

« On peut faire cesser tout-à-coup le mouvement des parcelles de camphre, en versant de l'esprit-de-vin dans l'eau, ou bien seulement en touchant la surface de l'eau avec le doigt, avec un fil de fer, de laiton, avec un petit bâton de bois, ce qui n'arrive pas lorsqu'on la touche avec un tuyau de verre ou un bâton de cire d'Espagne ou de soufre ».

« Si l'eau où surnagent les parcelles de camphre est contenue dans un vaisseau de fer ou de cuivre, on n'aperçoit en elles aucun mouvement sensible, elles s'approchent seulement & se rassemblent au milieu de la surface de l'eau par un mouvement insensible, & y restent ensuite immobiles ».

« Enfin si le vaisseau est de verre, de soufre ou de résine, l'expérience réussit très-bien; le mouvement des parcelles de camphre est très-sensible, & reste toujours le même, jusqu'à ce que les parcelles de camphre soient entièrement dissoutes ».

Les terres, les substances salino-terreuses & les alcalis n'ont aucune action sur le camphre; il faut cependant observer qu'on n'a point encore essayé les alcalis caustiques.

Les acides dissolvent le camphre, lorsqu'ils sont concentrés. L'acide sulfurique le dissout à l'aide de la chaleur; cette dissolution est rouge. Le camphre s'y décompose peu-à-peu & rapidement si l'acide est concentré, comme on le verra par le détail des expériences de M. Legendre que nous joindrons à cet article.

L'acide nitrique le dissout tranquillement; cette dissolution est jaune; comme elle surnage l'acide à la manière des huiles, on lui a donné le nom impropre d'*huile de camphre*. M. Kœlgarten a découvert, qu'en distillant huit fois de suite l'acide nitrique sur le camphre on le changeoit en un acide cristallisable qu'il croit d'une nature particulière. Voyez les mots ACIDE CAMPHORIQUE & CAMPHORATES.

L'acide muriatique dans l'état de gaz, dissout le camphre, ainsi que le gaz acide sulfureux & le gaz acide fluorique. Si l'on ajoute de l'eau dans ces dissolutions, elle se trouble, le camphre s'en sépare en flocons qui viennent nager à la surface & qui n'ont point éprouvé d'altération. Les alcalis, les substances salino-terreuses & les matières métalliques précipitent aussi ces dissolutions.

Les sels neutres n'ont aucune action sur le camphre. On ne connoît pas celle du soufre & des bitumes sur cette substance, quoiqu'il soit vraisemblable qu'ils sont susceptibles de s'y unir.

Les huiles fixes & volatiles dissolvent le cam-

phre à l'aide de la chaleur. Ces dissolutions refroidies déposent peu-à-peu des cristaux en végétation, semblables à ceux qui se forment dans les dissolutions du muriate ammoniacal, c'est-à-dire, composés d'une côte moyenne à laquelle sont adhérens des filets très-fins, & placés horizontalement. Ces espèces de barbes de plumes, vues à la loupe, sont très-régulières & présentent un aspect très-agréable. Cette jolie observation est encore due à Romieu. (*Acad.* 1766 p. 448.) La dissolution de camphre dans l'alcool, beaucoup plus connue & plus employée que la précédente a présentée à cet observateur une cristallisation un peu différente qu'il a obtenue par un procédé particulier. Voici ce que Romieu a consigné sur cet objet dans les mém. de l'acad. des sciences pour 1746. p. 448 & suiv.

« La propriété qu'a le camphre dissous dans l'eau-de-vie de donner une très-belle végétation chimique, étoit généralement ignorée; lorsqu'en 1746 le hasard m'en procura la connoissance, j'en communiquai la première découverte à la compagnie cette même année. J'ai depuis examiné avec soin les différentes circonstances qui accompagnent cette végétation, & les principales variétés dont elle est susceptible. Le résultat de mes expériences sur ce sujet sera en partie l'objet de ce mémoire, dans lequel je parlerai aussi de quelques autres propriétés du camphre que j'ai observées ».

« Je ne pensois à rien moins qu'à faire une végétation chimique avec le camphre, lorsqu'ayant laissé évaporer à l'air pendant quelques mois une dissolution de benjoin, de storax & de camphre dans l'eau-de-vie, je m'aperçus un jour qu'il s'étoit formé une petite végétation au fond du vaisseau qui contenoit cette dissolution: je vis bien d'abord que ce n'étoit-là proprement qu'une précipitation ou une cristallisation de ces produits résineux, que le dissolvant affoibli par l'évaporation n'avoit pu soutenir; mais pour m'assurer si cette propriété étoit particulière au mélange de ces produits résineux, ou seulement à quelque'un d'entreux, je fis plusieurs expériences, & je trouvais que le storax, de même que le benjoin dissous dans l'eau-de-vie & précipité par évaporation en y mêlant un peu d'eau, ne donnoit rien que d'informe, qu'au contraire de la dissolution du camphre seul, il résulta une vraie précipitation sous la forme d'une végétation chimique, non-seulement par la plus légère opération, mais même par le plus petit refroidissement ».

« Je cherchai en suite la proportion du camphre à son dissolvant la plus convenable pour le succès de cette opération, & je trouvai que lorsque la chaleur de l'air est au 22. degré du thermomètre de Réaumur, il faut deux gros de camphre & une once d'esprit-de-vin: lorsque la dissolution est faite, on y ajoute six gros d'eau commune qu'on verse de 20 en 20 gouttes en agitant ».

chaque fois le mélange jusqu'à ce que la dissolution reprenne sa limpidité. Si l'on met une semblable dissolution dans un petit vaisseau dont on laisserie le goulot ouvert, & que l'on tiendra dans un lieu où nulle agitation ne soit à craindre, lorsque la chaleur de l'air aura baillé de 4 ou 5 degrés du thermomètre, on verra une belle végétation chimique en *plumes* ou *panaches* de camphre fort déliées, qui s'élevant du fond du vaisseau s'étendront au milieu de la dissolution ».

« Il faut apporter beaucoup d'exactitude dans cette opération si l'on veut y bien réussir; on peut la manquer en employant une trop grande quantité d'eau, alors il n'en résulte qu'une précipitation subite & informe du camphre en une pousière blanche & comme de la neige, semblable à celle qui se fait après la dissolution du camphre dans l'esprit de nitre, selon l'expérience de M. Lennery ».

« Il ne doit pas paroître étonnant que dans le cas dont nous parlons, il n'y ait point de cristallisation. Les substances les plus propres à ce phénomène, comme sont presque tous les sels, ne font paroître qu'une pousière informe si leur précipitation est trop subite. Ce n'est donc qu'au moyen d'une petite quantité d'eau ou d'un léger refroidissement, qu'on peut parvenir à la végétation du camphre; aussi ai-je toujours remarqué que plus le refroidissement a été lent & la quantité du précipité petite, plus les panaches de cette végétation ont été grandes & régulièrement conformées ».

« On peut encore manquer cette opération par le défaut contraire, c'est-à-dire, en employant une trop petite quantité d'eau, ou, ce qui est le même, une trop grande quantité d'esprit-de-vin, ou un esprit-de-vin rectifié. (La gravité spécifique de celui dont je me suis servi dans les expériences précédentes, étoit à celle de l'eau comme 807 est à 995.) Avec un esprit-de-vin trop abondant ou trop rectifié, il ne se fait point de précipitation, le camphre demeure entièrement dissous & ne se sépare point de son dissolvant; quoique la température de l'air vienne à changer de 10 ou 15 degrés du thermomètre. A cette époque, j'ai observé la différence de solubilité du camphre dans l'esprit-de-vin sans aucun mélange d'eau relativement aux différents degrés de chaleur, & je l'ai trouvé très-considérable: une once de cette liqueur qui en dissolvait 6 gros au 5e. degré du thermomètre, en peut dissoudre 7 au 10e. une once au 15e. une once & un gros au 20e. 3 onces au 40e. 4 onces au 60e. & 6 onces à la chaleur de l'eau bouillante. Enfin le camphre n'a plus besoin d'esprit-de-vin pour devenir liquide au 42e. degré du thermomètre de Fahrenheit, ce qui est plus du double de la chaleur de l'eau bouillante. Il se fond à cette chaleur. J'en ai été d'autant plus surpris, qu'elle surpasse de beaucoup celle qui est

suffisante pour fondre, non-seulement la cire, le suif & le beurre qui se fondent à 142e. degré de Fahrenheit, mais même qu'elle égale celle qui est nécessaire pour fondre l'étain ».

Enfin, on peut manquer la végétation chimique du camphre, si la température de l'air du lieu où est le vaisseau est telle qu'elle en fasse précipiter une trop grande quantité par l'assésion de l'eau. La solubilité du camphre varie encore beaucoup à cet égard; au lieu de 6 gros d'eau qu'il falloit sur une once d'esprit-de-vin qui avoit dissous deux gros de camphre lorsque la chaleur de l'air étoit à 25 degrés, il ne faut plus au 15e. degré que 5 gros & demi d'eau, au 10e. degré 5 gros, & au 5e. 4 gros; en sorte que si à ce dernier degré on versoit sur la dissolution du camphre 6 gros d'eau, il se feroit out de suite une abondante précipitation en neige, & au 10e. ou 15e. degré une végétation à panaches très-petites & très-ferrées qu'on ne pourroit distinguer qu'avec peine.

« C'est vraisemblablement cette proportion restreinte dans des limites si étroites, & cependant nécessaires, pour parvenir à la végétation chimique du camphre, qui a empêché qu'on ne la découvrit dans une opération aussi fréquente dans la pharmacie que la dissolution du camphre dans l'eau-de-vie ».

« On peut entièrement supprimer, si l'on veut, le mélange d'eau, & même l'évaporation, en tenant bien bouché le vaisseau qui contient la dissolution. Dans le premier cas, j'ai toujours observé que les panaches de la végétation étoient plus serrées & en plus grande quantité; dans l'autre cas, j'ai remarqué qu'ils étoient plus grands; mais il faut convenir que la végétation n'est jamais aussi distincte & aussi nettement configurée, par la facilité qu'ont les panaches à s'étendre, que lorsque l'esprit-de-vin est affaibli avec de l'eau & qu'on tient le vaisseau bien bouché ».

« En observant exactement tout ce que je viens de rapporter, on obtiendra une très-belle végétation; elle est d'une finesse & d'une régularité qu'on ne voit point dans les autres végétations chimiques: elle est composée d'un assemblage de plumes ou panaches de camphre dont la légèreté & la délicatesse est si grande, qu'il n'est guère possible de remuer le vaisseau qui la contient sans déranger leur première situation toujours perpendiculaire à l'horison. Chaque panache a une tige principale, dont la plus grande hauteur ne m'a jamais paru aller au-delà d'un pouce & demi. Sur cette tige s'élevaient au milieu de la dissolution des branches ou filets exactement parallèles & inclinés sur elle de 60 degrés, & sur ces filets d'autres filets avec la même inclination. La tige, les branches & leurs subdivisions sont ordinairement placées dans un seul & même plan, & forment le panache, quel-

quelquefois dans plusieurs plans inclinés entr'eux. Pour bien distinguer tout cela, je me suis servi d'une petite loupe de 5 lig. de foyer, avec laquelle je voyois ces panaches très-distinctement & fort grossis ».

« La forme de cette végétation est entièrement semblable à celle de la cristallisation de l'eau lors de sa congélation, & n'en diffère absolument qu'en ce que les tiges, les branches & leurs subdivisions sont, 7 à 8 fois plus grosses ; mais l'eau ne prend que cette forme aussi régulièrement que le camphre que lorsqu'elle est bien pure & qu'on la fait geler en partie seulement & fort lentement. L'eau de neige m'a très-bien réussi, j'en ai tiré de grandes feuilles d'un demi-pied de long où il n'y avoit pas la plus petite irrégularité ».

« Il est facile de reconnoître, dans le différent arrangement que prennent les particules du camphre, ou de l'eau congelée, (aussi que la plupart des sels cristallins) qu'elles affectent d'abord de se réunir en ligne droite & de donner une aiguille ou filer ; qu'ensuite tous ces filets se rassemblent dans un même plan & parallèlement entr'eux, pour former une lame ; & c'est de la réunion de toutes ces lames sous certains angles, que résultent les cristaux solides qui ont une forme constante. Ce n'est que dans la sublimation du camphre, comme on le verra bientôt, qu'on voit ces cristaux solides : la végétation chimique n'en donne point ».

« Cette tendance sous un angle constant, attachée à la réunion des particules du camphre, varie suivant le menstrue qui le tient en dissolution ; car après l'avoir dissous dans l'huile éthérée de thérébentine dans une juste proportion, & qui est précisément la même que pour l'esprit-de-vin pur : j'ai vu 7 gros de camphre pour chaque once d'huile éthérée au dixième degré du thermomètre, en prenant les mêmes précautions pour le refroidissement de la dissolution ; j'ai observé une autre végétation chimique qui diffère de celle faite avec l'esprit-de-vin ; 10, par la finesse de ses filets qu'on ne peut pas aussi bien distinguer ; 10, par la situation des filets sur la tige qui y étoient tous attachés perpendiculairement ; & de la même manière que dans la cristallisation du sel ammoniac qui a été très-bien décrite par M. l'ont, & le plus souvent dans deux plans à angles droits ».

A ces détails nous ajouterons un mémoire sur la nature du camphre, donné par M. Legendre, alors élève en pharmacie, à la Salpêtrière, dans le journal de médecine, tome 36, page 247, année 1771.

« De l'aveu de tous les chimistes, dit-il, il n'est jusqu'à ce jour aucun procédé connu, pour obtenir la décomposition du camphre. J'ai été entreprendre cette opération, & je crois y avoir réussi. Voici l'exposé de mon travail ».

« C'est en cherchant à enflammer le camphre par les acides minéraux, que je me suis aperçu qu'on pouvoit parvenir à son analyse ».

« J'ai mis en distillation du camphre, uni séparément avec chacun des acides sulfurique, nitrique & muriatique. De ces trois opérations, celle qui m'a le mieux réussi, c'est la combinaison de parties égales de camphre & d'acide sulfurique concentré ».

« Après avoir mis sur le feu la cornue qui renfermoit ces deux substances, j'ai vu le camphre prendre une couleur brune, laquelle s'augmentoit de plus en plus, suivant que le degré de feu devenoit plus fort, & des vapeurs très-blanches s'élevèrent tout-à-coup, & je crus voir le camphre s'enflammer ; mais je m'étois trompé, & j'en fus bientôt convaincu par l'odeur sulfureuse que répandoient les vapeurs que je reçois dans un vase ou récipient que je lutai à la cornue : j'ai continué le feu sous les vaisseaux, jusqu'à ce que les vapeurs aient cessé & que la distillation ait fini. J'ai laissé refroidir les vaisseaux, & j'ai mis en réserve la liqueur recueillie dans le récipient : ensuite j'ai de nouveau joint les vaisseaux ; & j'ai forcé le feu, pour faire sortir de la cornue tout ce que le résidu pouvoit encore contenir. Il s'est sublimé du soufre ; & il a encore passé un peu de phlogistique faitux ; légèrement acide sulfurique volatil ; après quoi, j'ai continué le feu jusqu'à faire rougir la cornue ; il n'est rien passé de plus. J'ai laissé refroidir les vaisseaux, & j'ai ramené le soufre qui étoit attaché au col de la cornue : je l'ai mis en réserve. J'ai cassé la cornue, pour avoir le charbon qui étoit resté afin de l'examiner. J'ai reconnu qu'il étoit insipide au goût, très-léger, ressemblant en tout à celui que donne la décomposition de l'alcool avec ce même acide. Je l'ai fait tongir dans un creuset à l'air libre : il s'est encore élevé des vapeurs sulfureuses ; & le charbon rendoit une flamme bleuâtre, semblable à celle que donne la combustion du fer mêlé avec le soufre, lorsque le premier est presque réduit en oxide. J'ai tenu le creuset à ce degré de feu, pendant 3 heures. Le charbon n'a rien perdu de la forme : Voyant cela, j'ai retiré le creuset du feu, & j'ai fait plusieurs expériences que j'exposerai, après avoir examiné le premier produit que m'a donné l'opération ».

« J'ai pris les vapeurs sulfureuses condensées en liqueur, sur laquelle flottoit une huile très-blanche & très-subtile, que j'ai fait dissoudre dans l'alcool que j'ai séparé, à la manière ordinaire, en versant de l'eau dessus, laquelle est venue nager à la surface de la liqueur, sans perdre la fluidité qu'elle avoit auparavant ; son odeur diffère un peu de celle du camphre ; elle est plus désagréable & plus subtile qu'elle ; ses vertus sont aussi plus efficaces, d'après les expériences faites dans les maladies hystériques &

dans toutes les maladies spasmodiques. J'ai aussi formé du sel *polychreste* avec l'acide sulfureux qui étoit passé avec l'huile ».

» Ensuite j'ai examiné le soufre & le phlegme laiteux que j'ai retirés dans ma seconde opération : j'ai reconnu au soufre toutes les propriétés du soufre ordinaire ; sa couleur jaune, son odeur désagréable, lorsqu'il est échauffé dans les mains ; son action sur les métaux ; sa combinaison avec les alcalis ; & sa décomposition par son inflammation. Le phlegme laiteux n'étoit qu'un peu de soufre tenu divisé dans l'eau par un peu d'acide sulfureux que j'ai précipité par le moyen d'un peu d'alcali fixe du tartre, (carbonate de potasse) que j'avois étendu dans beaucoup d'eau, & que j'ai retiré après quelques heures de repos ».

J'ai fait ensuite l'examen du charbon, & j'ai vu qu'il étoit très-léger, sans goût, nageant sur l'eau, ne donnant aucun changement aux couleurs rouges & bleues, n'agissant nullement avec les acides, produisant du bleu de la rousse étant exposé au feu dans un creuset avec de l'alcali fixe. Il revivifie très-bien les métaux ; car j'ai remarqué qu'un gros de ce charbon revivifie 2 onces & demie de *minium*, dont on retire 2 onces & un gros & demi de plomb ».

» J'ai aussi remarqué que le camphre étoit dissous par l'acide sulfurique sans aucune action sensible, à froid, & que c'est là tout ce qui le différencie de l'esprit-de-vin. Car, quant à la décomposition, il présente les mêmes phénomènes ; & je crois que cette différence n'a lieu, que parce que le camphre est concret, & qu'il n'entre point d'eau dans sa composition & très-peu d'air ; & j'appuie mon raisonnement sur l'expérience qui va suivre. J'ai remarqué que l'acide sulfurique dissout la glace, la grêle & la neige sans aucun mouvement & sans chaleur, & qu'au contraire il résulte de cette dissolution un froid plus grand, puisque j'ai remarqué que les vapeurs environnoient le vase, & s'y condensaient en forme de givre ».

» J'ai aussi remarqué que l'acide sulfurique échauffoit l'huile de camphre ; ce qui n'a pas lieu, lorsqu'elle est encore camphre, parce qu'elle a acquis une portion d'eau qui lui donne sa fluidité, que l'action du feu lui a combiné d'une manière assez singulière, par le moyen de l'acide sulfurique, & lui donne une propriété capable de le rendre parfaitement soluble dans l'eau ; car, si on met dans un vase l'eau qui aura été battue avec l'huile de camphre, & très-bien séparée par le filtre, & qu'on l'y laisse une heure environ, le fer s'empare de l'acide sulfurique par lequel il sembleroit attaqué ; & le camphre reparaît sous une forme de poudre ou de limon, s'y divise de manière qu'il passe à travers les filtres les plus fins, & le fer se trouve chargé d'une poudre très-noire qui se dépose près de sa surface. C'est un moyen, comme on le voit, très-propre

à le rendre miscible à l'eau, & à être administré dans les différentes maladies où on desireroit l'employer. »

» Il faut aussi remarquer que cette huile est susceptible de se décomposer par une nouvelle distillation avec l'acide sulfurique, & qu'elle présente les mêmes phénomènes, de manière que, si on recontinuoit à la redistiller plusieurs fois avec cet acide, elle se réduiroit toute en acide sulfureux, en soufre & en charbon ».

» L'acide nitrique paroît avoir quelque action sur le camphre, par la distillation, mais en très-petite quantité, de sorte que de 4 onces de camphre & d'acide nitrique fumant après la distillation parfaite, il s'est trouvé environ 4 à 5 grains de charbon très-sensible à celui de l'acide sulfurique, & tout étoit passé dans le récipient ; sous forme d'huile qui se régénère en camphre, lorsqu'on y verse de l'eau. Je crois que cette apparence de décomposition, par l'acide nitrique, n'a lieu que parce que cet acide étant tiré de sa balle par l'intermédiaire de l'acide sulfurique, il y en passe un peu avec : c'est ce qui donne des marques de décomposition. Mais ce n'est toujours que l'acide sulfurique qui agit, & non l'acide nitrique qui paroît ne l'altérer en aucune manière ».

» En donnant les détails des expériences de Legendre, j'ai conservé des explications qui les accompagnent, pour faire connoître l'état de la science à cette époque. On voit combien elle étoit éloignée de la vérité. On ne conçoit pas comment l'action de l'acide nitrique sur le camphre a pu lui échapper ; il avoit la découverte de M. Kosegarten en main ; mais préoccupé de l'idée que l'acide du nitre dissolvait le camphre sans l'altérer, il n'a attribué l'action dont il étoit témoin, qu'à la petite portion d'acide sulfurique contenue dans son acide nitrique. Il est vrai de dire que la portion de charbon qu'il a obtenue, dépendoit de l'acide sulfurique, puisque l'acide nitrique n'est pas capable de la mettre à nud.

» L'acide muriatique n'a par user aucune décomposition : car tout le camphre s'est sublimé à la voute de la cornue ; & l'acide a passé, sans donner aucune marque, qu'il se soit chargé de la moindre partie de camphre ».

» J'ai aussi distillé des alcalis volatils avec le camphre. Le camphre s'est sublimé sous la forme de teuille de fougère, semblable aux cristaux de lune ou à ceux du sel ammoniac. Ce qui m'avoit séduit au premier coup d'œil ; car je crus qu'il s'étoit formé un sel ammoniac. Mais par les épreuves que je fis, en le jetant sur le feu, j'aperçus bientôt que ce n'étoit que du camphre : j'en fis dissoudre dans l'eau : il refluait à la surface. J'en ai aussi dissous dans l'esprit-de-vin, il s'y est très-bien dissous. Il est passé un phlegme un peu laiteux, qui sembleroit être un peu javonneux ».

» J'ai opéré de même sur les alcalis fixes. Il n'en est rien résulté qui mérite d'être rapporté ».

» J'ai

« J'ai opéré du même fur l'huile de camphre avec l'alcali volatil : tout a passé sous une forme de liqueur laiteuse, laquelle étendue dans de l'eau s'y soutint toujours laiche, & sentant le camphre & l'alcali volatil ; & l'alcali fixe n'a rien fait de mieux qu'une masse savonneuse, & le phlegme a passé dans le récipient, aussi un peu chargé de l'odeur du camphre, sans rien autre chose ».

« Il arrive quelquefois que l'huile de camphre semble se figer, ou se régénérer en camphre, lorsqu'on l'a bien lavé avec de l'eau, pour enlever l'acide sulfureux surabondant. C'est bien réellement du camphre qui n'a subi aucune décomposition ; qui est passé avec l'huile qui s'y tient unie, & à qui il donne encore l'odeur du camphre ; car, si on le filtre par un papier gris ou par un coton, le camphre reste en grumeaux, & l'huile passe parfaitement liquide. Le camphre est, en quelque façon, dans un état d'huile fixée ; mais c'est qu'il lui reste encore des parties huileuses qui y sont intimement unies par le rapport qu'elles ont entr'elles, qui n'en diffèrent qu'en fluidité. Cette huile est la même que le camphre, à cette différence qu'elle a reçu de la fluidité par la combinaison d'un peu d'acide sulfureux & d'un peu d'eau. Elle a toutes les propriétés des huiles essentielles. Elles s'étend dans les pores du papier, en lui donnant plus de transparence ; marque certaine de sa fluidité. Elle se dissout dans l'esprit-de-vin, & revient sur la liqueur quand on y joint de l'eau ; elle s'enflamme comme elle. On peut faire avec elle un *oleo saccharum* : l'eau battue avec elle s'en charge, comme je l'ai dit ci-devant ; car il paroît que la décomposition qui se fait pendant l'opération, ne donne rien autre chose que du soufre & de l'acide sulfureux. Le camphre qui n'a pas subi l'action de l'acide, parce qu'il se volatilise avec l'acide sulfureux, le trouvant ensemble, & réduit en vapeurs, il s'y combine, sans souffrir d'autre altération, que de prendre une fluidité qu'il n'avoir pas. Cette fluidité devient néanmoins un moyen propre à employer le camphre sous des formes différentes, & plus faciles à avaler, lorsqu'on en demande dans des potions ; car l'eau seule, où elle a séjourné, en est assez chargée, pour lui donner une vertu très-efficace & très-utile à employer, même pour laver des plaies. On pourroit croire que l'huile de camphre est au camphre ce que l'éther est à l'esprit-de-vin. Quoique le camphre paroisse être plus simple dans sa composition, je crois que, s'il étoit possible de donner une forme concrète à l'éther, il n'en différerait que par l'odeur : car il a les mêmes propriétés, & donne les mêmes produits par sa nature ».

Je n'ai pas besoin de faire observer que dans le mémoire de l'expérience il n'y a que les expériences & les faits qui puissent être comptés pour quelque chose, les explications se selen-

tent de l'état d'incertitude & d'inexactitude même qui régnoit alors dans la théorie chimique. Il n'est pas de même de la dissertation suivante publiée en espagnol & à Ségovie par M. Proust en 1789, & traduite en français par M. Arzula, l'un de mes élèves, actuellement professeur de chimie à Cadix.

Ce mémoire est divisé en deux parties, & la première est subdivisée en neuf sections ; il est précédé d'une préface dans laquelle on fait remarquer que le royaume de Murcie envoioit tant d'huile essentielle de romarin, de marjolaine, de lavande, & de beaucoup d'autres plantes, & qu'on les donne à si bon marché, qu'on ne peut douter de l'extrême abondance des plantes aromatiques qui y croissent, & de la facilité avec laquelle on en extrait l'huile volatile.

PREMIÈRE PARTIE.

SECTION I.

M. Proust observa d'abord dans un facon d'huile essentielle de lavande différentes cristallisations en forme d'arbrisseaux. Le froid & un repos absolu avoient produit ces cristaux, qui la parurent au premier coup-d'œil analogues au camphre ; on sait que ce corps en présente de pareils lorsque sa solution dans l'alcool est assésible par l'eau, de manière à n'y pas produire subitement un précipité.

Ces arbrisseaux composés de branches divergentes s'élevèrent & croissent par des octaèdres implantés les uns sur les autres, si la cristallisation s'opère lentement & tranquillement ; mais au contraire, il se forme des lames hexagones si elle a lieu avec précipitation.

En transvasant cette huile de lavande, une partie du liquide s'étant répandue au-dehors du facon, l'auteur fut étonné de voir au bout de quelques instans une espèce de neige sur toute la surface du facon qui avoit été recouverte d'huile.

Ces faits lui ayant fait découvrir la présence du camphre dans l'huile de lavande de Murcie, il soupçonna bientôt que cette propriété n'étoit pas exclusive à cette huile, & qu'il trouveroit aussi le camphre dans toutes les huiles volatiles, qu'on prépare dans ce pays, comme dans celles de romarin, de marjolaine & de sauge. L'expérience a confirmé ses soupçons.

SECTION II.

En recherchant les moyens propres à séparer le camphre des huiles volatiles, M. Proust a pensé que la seule évaporation à l'air libre lui serviroit pour apprécier le rapport de quantité
Cccccc

qui existe entre ces deux substances; & dans le mois de décembre 1788, il a procédé à ses premières expériences.

Pendant ces évaporations, qui durèrent près de tout le mois de décembre, le thermomètre de Réaumur s'est tenu entre 6 degrés au-dessous de 0 & 10 degrés $\rightarrow$ 0. Il a mis les huiles volatiles de Murcie dans des assiettes de porcelaine très-évasées & d'un diamètre assez considérable; ces vases ont été placés dans un lieu où ils étoient à l'abri de tout mouvement capable de volatiliser de la poussière & d'altérer ses résultats.

Pour bien évaluer la quantité des huiles & leur produit, il s'est servi de poids fictifs & représentatifs d'arobes (25 liv.), avec l'attention de ne pas employer moins d'une livre poids de marc dans chaque expérience.

A mesure que l'évaporation spontanée faisoit déposer des cristaux de camphre, il les retirait avec une écumoire, & il les mettoit sur un entonnoir garni d'une gaze & suspendu sur l'assiette correspondante à chaque huile, afin de perdre le moins possible de camphre. Par ce procédé, il a extrait du camphre de chacune de ces huiles dans les proportions suivantes;

1°. Huile de romarin.

	Camphre.
16 aromes ont donné,	1 arrobe $\frac{1}{11}$

2°. Huile de marjolaine.

9 aromes, 21 liv. & 2 onces,	1 $\frac{1}{11}$
------------------------------	------------------

3°. Huile de sauge.

7 aromes, 13 liv. 1 once,	1 $\frac{1}{11}$
---------------------------	------------------

4°. Huile de lavande.

4 aromes,	1 $\frac{1}{11}$
-----------	------------------

La grande volatilité du camphre, même au degré de zéro du thermomètre de Réaumur, sembloit faire naître quelques objections sur les quantités relatives qui sont assignées dans ce tableau, puisqu'il est constant que l'huile volatile unie intimement avec le camphre, ne peut se volatiliser sans emporter avec elle une portion de celui-ci. D'après cette connoissance, l'auteur ne présente pas ces rapports de poids comme parfaitement exacts, & il avertit qu'il n'a point

déterminé dans cette estimation la portion de camphre qui se sublime.

SECTION III.

Il décrit dans cette section les phénomènes qu'il a observés pendant l'évaporation des huiles.

L'huile de lavande, celle qui a le plus mérité son attention, parce qu'elle est celle qui contient la plus grande quantité de camphre, donne son premier produit au bout de vingt-quatre heures; celui-ci présente des lames entrelacées les unes dans les autres, & qui se déposent obliquement au fond de l'assiette: ces lames mises dans l'entonnoir, laissent couler très-facilement la portion d'huile qui les mouille. L'huile de lavande donne de semblables cristaux jusqu'à ce qu'elle soit réduite à la quantité d'une drame.

Dans une atmosphère de 15 degrés au-dessus de zéro, on voit son premier produit au bout de douze heures: cette cristallisation rapide annonce que l'huile de lavande n'est pas loin de la saturation.

Les suc huileux volatils des plantes étant plus abondants dans les années dont la chaleur a été grande & suivie, dans lesquelles il n'y a pas eu beaucoup de pluie, le camphre a paru suivre les mêmes variations. L'huile de ces années, qui, à un degré de chaleur de 10 à 15° au-dessus de zéro, emporte avec elle tout le camphre qu'elle peut tenir en dissolution à ces degrés, en laisse déposer une partie en se refroidissant, & les distillateurs de Murcie doivent avoir vu plus d'une fois ce phénomène (1).

Pour déterminer si l'huile volatile tirée de Murcie, est éloignée de la saturation, M. Proust a fait l'expérience suivante.

Dans une quantité donnée d'huile de lavande, il a mis $\frac{1}{11}$ de camphre retiré d'une autre portion d'huile de cette plante. Par une douce chaleur, il s'est dissous; mais en laissant refroidir cette huile à la température de 6 à 7 degrés au-dessus de zéro (température à laquelle l'huile de lavande, telle qu'elle arrive de Murcie, ne laisse point précipiter de son camphre), il s'est cristallisé du camphre dont la quantité excédoit d'un quart celle qui avoit été dissoute.

Cette expérience démontre que l'huile de lavande de Murcie est entièrement saturée de camphre, & que la portion dissoute artificiellement, en se précipitant, a entraîné avec elle une partie de celui qui appartient naturellement à cette huile.

L'huile volatile de sauge laissa déposer ses

(1) Un apothicaire de Madrid m'a assuré que depuis long-temps, on retiroit à Murcie le camphre des huiles volatiles, & qu'on le vendoit dans le commerce jusqu'à 30 sols la livre, mais je ne peux garantir la vérité de ce fait.

Note de M. de Saussure.

cristaux plus tard que celle de lavande ; mais ceux-ci ont le même arrangement & la même figure. Cette huile, moins fluide que la précédente, se sépare plus difficilement de son camphre, & il faut l'exprimer. Avant que l'huile de sauge soit réduite au quart de son volume ; elle cesse de donner du camphre : le résidu est épais comme un sirop.

L'huile volatile de marjolaine présente à peu de chose près les mêmes phénomènes que la précédente ; avec la différence cependant que son camphre se dépose plus tard, & qu'il s'égoutte plus facilement ; parce que cette huile conserve plus de fluidité ; elle semble tenir le milieu entre les deux précédentes.

Celle de romarin, comme étant la moins chargée de toutes, dépose son camphre plus tard, & continue à le donner en petite quantité jusqu'à ce qu'elle soit réduite par l'évaporation à la cinquième ou sixième partie de son volume ; son camphre s'égoutte avec difficulté, & l'expression est nécessaire pour le dépouiller de toute son huile.

Les différents cristaux de ce camphre ramassés & séchés dans le papier Joseph, étoient presque pulvérulens, secs au toucher, brillans comme de la neige & presque aussi blancs ; malgré la différence des huiles qui les avoient fournis, on avoit de la peine à reconnoître par leur odeur celles auxquelles ils appartenoient.

SECTION IV.

La chimie s'étant toujours servie du feu pour séparer les principes d'un corps, quand la volatilité de ses principes est inégale ; & l'évaporation spontanée ayant appris à l'auteur que dans les huiles essentielles il y a un principe plus volatil qu'un autre, il a eu recours à ce moyen pour les séparer. Comme entre la volatilité du camphre & de son dissolvant, c'est-à-dire, l'huile essentielle, il n'y a qu'une petite différence, il faut opérer avec précaution pour séparer ces substances, & voici comment on doit y procéder.

On prend un alambic garni de son chapiteau & de son bain-marie ; on met la cucurbitre sur le feu avec de l'eau, & on fait chauffer jusqu'à l'ébullition. Le bain-marie qui doit être plus large que profond, contient la quantité d'huile qu'on veut mettre en distillation ; on place le bain-marie dans la cucurbitre, de manière que l'eau de celle-ci ne le touche pas ; on le couvre de son chapiteau & on adapte un ballon ; on ôte presque tout le feu, & on ne laisse la chaleur se répandre qu'entre la cucurbitre & le bain-marie ; on maintient la chaleur près de l'ébullition, mais sans jamais arriver à ce degré, par le moyen des cendres chaudes qu'on met de temps en temps sous l'alambic.

La distillation doit être continuée jusqu'à ce qu'on ait retiré un tiers de l'huile employée ; on laisse refroidir l'appareil pendant deux heures, on le délute ensuite, & on retire du bain-marie, par le moyen d'une écumoire, les cristaux de camphre qui se sont précipités ; on les laisse égoutter sur du papier Joseph, ou sur un tamis de crins, ou bien on les soumet à l'effort léger d'une presse. On remet le résidu avec de nouvelle huile, & on procède à la distillation avec les précautions énoncées plus haut.

Si l'on veut extraire par la distillation plus d'un tiers de l'huile mise dans le bain-marie, le camphre se sublime dans le chapiteau de l'alambic ; il arrive la même chose si l'eau de la cucurbitre bout.

La première distillation, conduite avec les précautions annoncées, donne la moitié du camphre que l'huile contient ; & avec trois distillations, on l'en dépouille entièrement.

L'auteur s'attendoit à extraire, par ce moyen, un quart du poids du total, comme il l'avoit obtenu par les évaporations spontanées ; mais jamais il ne lui a été possible d'en tirer plus d'un cinquième : il attribue ce déficit à la grande volatilité du camphre.

Pour savoir si le résidu contenoit encore du camphre, M. Proust en a mis 71 parties dans un plat de porcelaine couvert d'une grande cloche de verre, située de manière qu'elle permît l'accès de l'air extérieur. Au bout de quelques jours, l'huile s'est volatilisée, & il a resté sur le plat de petits cristaux de camphre, qui, séchés, pesoient 7.

Les huiles distillées obtenues par un feu conduit avec ménagement, & de telle manière que l'eau de la cucurbitre n'ait pas bouilli, ont donné par l'évaporation spontanée, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, & jamais plus. La différence de l'évaporation spontanée à celle de la distillation, réduit son produit à $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, au lieu de $\frac{1}{2}$ qui ont été obtenus par l'évaporation à l'air libre ; & comme dans le travail en grand on ne peut porter la même exactitude que dans l'analyse en petit, M. Proust pense que le produit ne passera pas $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, ou peut-être $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, c'est-à-dire, que de 72 arrobes d'huile de lavande, on pourra obtenir 12 à 15 arrobes de camphre, au lieu de 18 qu'on a par l'évaporation à l'air libre.

SECTION V.

Le degré de chaleur auquel le camphre se fond est très-moderé, & ne suffit pas pour brûler les matières étrangères qu'il contient ; ainsi, tout l'art de raffiner le camphre se réduit à maintenir la chaleur dans ce degré avec la plus grande égalité ; car si la chaleur est augmentée jusqu'à faire brûler les corps impurs qu'il contient, la suite charbonnée de ces corps altère son bril-

lant, sa pureté. L'expérience suivante a découvert ces vérités à l'auteur.

En faisant sublimer une portion du camphre séparée de l'huile volatile de lavande sans aucun intermède, il a observé des phénomènes qui répandent beaucoup de jour sur sa purification.

Il a exposé à la chaleur du bain de sable une fiole contenant 24 parties de camphre, & il s'en est sublimé 22 parties; ce camphre étoit blanc & solide. A la fin de l'opération, la partie inférieure de la fiole a pris une couleur rouge, due au résidu qui avoit lui-même cette couleur. Ayant cessé l'opération & cassé la fiole, le résidu pesoit $\frac{1}{12}$, & il y avoit $\frac{1}{12}$ de perte; mais le camphre ne peut point avoir la couleur rouge indiquée dans le résidu, puisqu'il se sublime avant que d'acquies la chaleur nécessaire pour se colorer; quelle est donc la matière qui a pris cette couleur? ce doit-elle celle dont la fixité pourra souffrir un degré de chaleur capable de la colorer fortement; le résidu étoit presque du camphre pur, comme nous le disons dans l'infant.

L'alcool a dissous très-facilement ce résidu. Cette dissolution précipitée par l'eau, a donné une portion de camphre & une espèce de résidu poreux, tenace & rougeâtre, qui n'étoit autre chose qu'une résine molle, ductile, à demi-brûlée; c'est cette résine qui empêchoit les dernières portions du camphre de se sublimer, & qui lui donnoit la couleur rouge. Cette matière résineuse a été formée par la combinaison de l'huile volatile restée entre les lames du camphre avec la base de l'air: la perte que le camphre ainsi sublimé a éprouvée, est due à une petite quantité d'huile, qui, n'ayant pas été convertie en résine, s'est volatilisée avant lui, & l'a entraînée en vapeurs dans l'atmosphère. Il a été bien prouvé par les expériences précédentes, que l'huile atomatique est plus volatile que le camphre.

Quelques écrivains modernes assurent qu'il est indispensable d'employer quelque intermède pour purifier le camphre & pour lui donner de la blancheur & du brillant; quelques-uns indiquent à cet effet la chaux à la dose d' $\frac{1}{12}$, & d'autres d' $\frac{1}{12}$ ou d' $\frac{1}{12}$.

Quoique M. Proust ait éprouvé quelque inconvenient dans l'usage de la chaux, sur-tout parce que cette substance donne aux huiles volatiles une couleur rougeâtre, l'expérience lui a cependant prouvé qu'elle étoit propre à purifier ce nouveau camphre; & de chaux suffit pour cette purification: la quantité peut varier; suivant que le camphre est plus ou moins gras ou impur. En le raffinant de cette manière, il devient blanc & sec; mais il perd toujours $\frac{1}{12}$. La même perte a eu lieu dans tous les cas où la

chaux a été employée: quelle qu'ait été la dose de cette terre alcaline.

N'ayant pas trouvé de craie, l'auteur a quelquefois mêlé le camphre de Murcie avec d'autres terres; avec $\frac{1}{12}$ de cendre lavée, il a toujours été bien purifié, & la perte a été également d' $\frac{1}{12}$: sublimé avec de l'argile blanche, il y a eu la même perte; mais les effets ont été absolument différents que ceux que M. Proust attendoit; le camphre étoit d'un couleur jaunâtre, due à la matière huileuse qui s'étoit volatilisée avec lui, son odeur étoit fortement bitumineuse & semblable à celle que donne le succin par la distillation. L'argile qu'il a employée n'ayant pu lui fournir rien d'étranger, il a cru devoir examiner la cause d'une action aussi extraordinaire. Mais il renvoie le résultat de cet examen à une autre circonstance.

Ces expériences démontrent la nécessité d'un intermède pour raffiner le camphre, & celle de se servir pour cet objet des matières terreuses, en exceptant l'argile; mais il faut qu'elles soient sèches, car si elles contenoient de l'eau, elles bouillent dans le fond du vase lorsque le camphre est fondu, elles font sauter le mélange jusqu'en haut de la cornue, & le sublimé n'est pas pur. Cet accident est arrivé en employant la chaux éteinte & les cendres lavées, sans avoir eu soin de les dessécher auparavant avec toute l'attention possible.

La propriété de ces intermèdes paroît être de diviser la petite portion de matière résineuse qui alègre le camphre en la séparant de manière qu'elle est mise à l'abri de l'activité du feu. Quant à la manipulation pour l'obtenir aussi dense, aussi sec & aussi transparent que celui de lavande, ce n'est pas, suivant l'auteur, une chose absolument difficile, quoiqu'elle exige une certaine précision de la part de l'opérateur.

Le feu plus ou moins fort & la différente forme des vaisseaux, donne au sublimé une consistance & une transparence diverses; quand le feu n'est pas assez fort, le camphre se sublime en espèce de cristaux légers & fins, que les chimistes nommoient autrefois des fleurs. Cette sorte de sublimé a peu de consistance & se divise facilement entre les doigts. Il faut une forte chaleur & un vaisseau plat comme celui que M. Jars a décrit pour avoir un sublimé consistant, transparent & semblable à celui des Hollandais; si le vaisseau est sphérique, la partie inférieure du sublimé est dense & transparente; mais la partie supérieure reste spongieuse, parce que les vapeurs n'y arrivent pas aussi chaudes qu'à la partie inférieure; & si l'on augmente beaucoup la chaleur, la partie inférieure se fond & tombe dans la masse fondue. Les vases que décrit M. Jars étant tous aplatis, le camphre sublimé arrive aussi chaud au milieu du fond que sur

les côtes, & il est par ce moyen uniformément dense, transparent & solide dans toute son étendue.

Dans la sublimation du camphre, il faut employer beaucoup plus de chaleur qu'on ne le croiroit nécessaire à une matière aussi volatile; il n'y a aucun risque de faire bouillir le camphre, & le degré de chaleur le plus favorable pour avoir ce produit solide & en masse homogène, transparente, est celui qui approche de l'ébullition. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on peut faire bouillir le camphre sans qu'il forte d'un vase dont il occupe un quart de la capacité.

Ainsi, tout le mystère de la purification hollandoise consiste à employer des vaisseaux plats & à donner pendant toute la sublimation un degré de chaleur capable de rendre le camphre transparent & massif; c'est pour cela qu'on peut percer l'intérieur des vaisseaux, comme l'a fait observer M. Jars.

Lorsque le camphre sublimé est refroidi, il se resserre fortement sur lui-même & se fend dans différens endroits; ces fentes détruisent une partie de la transparence de celui du commerce; mais dans son intérieur, le sublimé se trouve uni & transparent. Quand on veut l'avoir avec sa forme, on casse le vaisseau à sa partie intérieure & on retire le camphre en un seul pain. Cette espèce de sublime diffère de celui qui est spongieux, en ce qu'il se sépare de lui-même du fond du vaisseau, tandis que celui-ci y adhère & ne s'en détache point facilement.

S E C T I O N V I.

M. Proult présente dans cette section plusieurs résultats très-importans pour l'établissement de l'extraction du camphre de l'huile de lavande dans la province de Murcie.

La livre d'huile de lavande de Murcie vaut à Madrid 10 réaux (1), celle de camphre 16 réaux; cela posé, nous pourrions dire,

1°. Que l'huile de lavande vaut tout au plus 1 réaux la livre.

2°. Le camphre, dans les ports de mer & même à Murcie, ne coûte pas moins de 14 réaux.

3°. L'extraction du camphre par le procédé décrit ci-dessus, n'est pas trop dispendieuse, & les frais par arrobre monteront tout au plus à 16 réaux.

4°. Le raffinage établi près d'une verrerie n'ira pas à plus de 2 réaux par livre, puisque l'étranger paie cette somme aux Hollandois pour la purification d'une pareille quantité; par consé-

quent il faut supposer le prix de ces objets dans l'ordre suivant,

L'huile de lavande, l'arrobre,	125
Camphre la livre	24
Frais de l'extraction du camphre de chaque arrobre d'huile,	16
Frais de l'ainiége pour chaque livre de camphre,	2

D'après cette table que nous supposons exacte dans le moment, cherchons le gain qu'il y auroit à extraire le camphre de l'huile volatile de lavande de Murcie. Comme le déchet de la distillation est entre $\frac{1}{2}$ & $\frac{1}{3}$, nous calculerons les produits d'après ces deux données.

Produit d'une distillation de l'huile de lavande, en supposant le déchet de $\frac{1}{2}$ ou $\frac{1}{3}$.

Quatre arrobes d'huile de lavande, à 1 reaux la livre, font,	500
Frais de l'extraction du camphre de cette quantité d'huile,	60
Raffinage du camphre,	47
Valeur de 22 liv. 10 onces de camphre purifié,	543
Valeur de 22 liv. 9 onces d'huile volatile pendant la distillation, qu'on doit rabattre des 4 arrobes qui ont été employés,	120

De-là nous pouvons représenter les frais & le bénéfice par $500 - 120 + 543 - 60 - 47 = 1043 - 127 = 816$; & en descendant de 816 à 500, valeur des 4 arrobes d'huile, le nombre 316 contenu entre ces deux termes sera le bénéfice, c'est-à-dire, 63 par 100.

Nous devons avertir que si dans cette table, comme dans les suivantes, nous avons négligé quelque fraction, ce n'a pas été en faveur de notre calcul.

Produit d'une distillation de la même huile, en supposant le déchet de $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$.

Quatre arrobes d'huile de lavande à 1 reaux la livre,	500
Frais d'extraction,	60
Raffinage du camphre,	46
Valeur de 22 liv. 11 onces de camphre raffiné,	520
Valeur de 22 liv. d'huile,	116

Donc nous aurons pour frais & pour béné-

(1) Un réal d'Espagne vaut 5 sols de France.

fice les sommes suivantes, 500 — 115 + 520 — 60 = 46 = 1020 — 211 = 799; & en parant de ce dernier nombre pour revenir à 500, valeur des arrobes d'huile, nous trouverons 299 pour bénéfice, c'est-à-dire, 60 par 100.

Le produit moyen est facile à déterminer, puisqu'il se trouve entre les extrêmes que nous venons de considérer.

SECTION VII.

Après l'huile de lavande, c'est celle de sauge qui donne le plus de camphre; mais en distillant cette huile pour en extraire le camphre, il faut n'en retirer qu'un quart, parce que, comme elle est plus épaisse que la précédente, elle acquiert un degré de chaleur qui fait monter le camphre; on le sépare du résidu par la pression, afin de le bien sécher. Le produit de cette huile par l'évaporation spontanée est de $\frac{1}{17}$; mais la distillation cause un déchet qui va de $\frac{1}{2}$ jusqu'à $\frac{1}{6}$.

Pour extraire un arrobe de camphre par la distillation de l'huile de sauge, il en faut 188 livres 4 onces. Cette huile vaut à Madrid 16 réaux la livre, & elle ne vaut en Murcie que 8 réaux; les frais prélevés, on gagnera donc de 12 à 13 par 100.

SECTION VIII.

L'huile de marjolaine ressemble assez à celle de lavande par la facilité avec laquelle elle donne son camphre, tant par l'évaporation que par la distillation. La portion d'huile distillée est parfaitement blanche, comme les précédentes; le déchet que la distillation cause dans ce camphre, va aussi entre $\frac{1}{4}$ & $\frac{1}{6}$. On peut de 246 livres d'huile de marjolaine, extraire un arrobe de camphre; le prix de cette huile à Madrid est de 12 réaux, & de 6 à Murcie. Le bénéfice qu'on en aurait eu en retirant le camphre, seroit de 10 à 11 par 100.

SECTION IX.

L'huile de romarin donne son camphre plus tard que les autres, & par l'évaporation spontanée & par la distillation, parce qu'elle ne contient que $\frac{1}{4}$ de cette matière. On peut distiller jusqu'à retirer la moitié de l'huile, & le résidu ne donne point encore de camphre par le refroidissement, parce qu'il ne se trouve que dans la proportion d' $\frac{1}{11}$; il faut distiller une seconde fois. Cette huile vaut à Madrid 12 réaux, & 6, à ce qu'on croit, à Murcie, & c'est d'après ce prix qu'est établi le calcul suivant.

Il faut 16 arrobes d'huile volatile de romarin pour extraire 224 livres 14 onces 5 gros de camphre raffiné; & le bénéfice qu'on auroit à

séparer de cette matière de l'huile de romarin, seroit de 4 à 5 pour 100.

Le camphre qu'on retire des huiles volatiles, conserve toujours l'odeur de la plante dans laquelle il s'est formé; ce qui pourroit présenter quelques objections sur son usage en médecine; mais ces objections seroient faciles à lever.

M. Proust décrit ici des expériences comparatives qu'il a faites sur ce camphre & sur celui du commerce. Il a mis dans un matras à long col 400 grains de camphre retiré de l'huile de lavande, avec une égale quantité d'acide nitrique très-concentré, & dans un autre matras, une dose pareille de camphre du commerce & du même acide; après avoir laissé ces matières en contact pendant trois jours, il les a chauffées en les tenant dans la main & en observant scrupuleusement les mêmes circonstances pour l'un & pour l'autre matras; le liquide qui surgeoit dans le premier matras, immédiatement après la dissolution du camphre, étoit un peu plus jaunâtre que dans le second: cette couleur venoit immédiatement d'une petite portion d'huile de lavande que conservoit le camphre de Murcie. Ces dissolutions, versées dans des quantités égales d'eau, le camphre s'est séparé; il a été ramassé & lavé sur un filtre, pour lui enlever l'eau qu'il auroit pu retenir; ces deux précipités séchés à la même température, étoient du même poids, & chacun avoit perdu 35 par 100.

La couleur jaunâtre s'est conservée dans le précipité du camphre retiré de l'huile de lavande; mais pour l'usage de la médecine, l'odeur & la couleur de ce camphre ne seront pas des obstacles à son administration; car, en supposant qu'il reste 1 partie d'huile sur 400 de camphre ou $\frac{1}{400}$ sur 100, il suivra de là qu'un médecin qui en administrera 10 grains, n'aura à craindre qu'un d'huile volatile: ce qui ne peut faire naître d'objection valable.

La perte de 35 par 100, que le camphre éprouve par l'acide nitrique, est digne d'être remarquée, puisqu'elle démontre une action de la part de cet acide, quoiqu'il ne se présente point de vapeurs rouges ni de gaz nitreux; & quoique le mélange ne s'échauffe pas. Il paroît que c'est à l'acidification du camphre qu'il faut attribuer cette perte. M. Proust n'a point suivi cet objet sous ce point de vue.

SECONDE PARTIE.

Dans cette seconde partie, l'auteur fait une histoire du camphre; il cite beaucoup de chimistes qui ont trouvé le camphre dans les huiles volatiles des racines de diverses plantes; il dit qu'il seroit peut-être utile de planter en Murcie l'arbre dont on retire le camphre, parce que le climat de cette province est, à peu de chose

près, semblable à celui des îles où on cultive le camphrier, dont il donne la description d'après Brennius & les usages auxquels on pourroit l'employer; il passe ensuite à l'examen des principes & de la nature des huiles essentielles. Voici quelle est son opinion.

Dans toutes les huiles essentielles, on doit distinguer, suivant lui, deux substances différentes qui tendent routes deux à se combiner avec la base de l'air vital ou oxygène, mais avec des forces inégales; une de ces substances doit être considérée comme une résine conditionnelle ou comme le radical d'une résine, & l'autre comme le radical d'un acide. Le radical de la résine s'empare avec rapidité de l'oxygène, & beaucoup plus promptement que la base acidifiable; de manière que celle-ci ne se joine à la base de l'air, que quand le radical résineux est saturé. Il observe que la première altération que souffrent les huiles essentielles, c'est de s'épaissir & de se rapprocher de l'état des résines; au contraire, les concrétions salines ne se laissent apercevoir dans ces huiles que très-tard & au bout de plusieurs années. Ces concrétions salines se présentent plus ou moins tard, suivant que les huiles volatiles ont été gardées plus ou moins long-temps, & qu'elles ont eu plus ou moins le contact de l'air de l'atmosphère. La quantité plus ou moins abondante du radical acide qu'elles contiennent, influe aussi sur l'époque de la formation de ces cristaux.

Les huiles volatiles ne peuvent avoir un contact fréquent avec l'air commun, sans donner quelque marque d'acidité, & on ne peut les distiller plusieurs fois, sans qu'elles s'acidulent en même temps qu'une partie s'épaissit. M. Proust a fait souvent cette observation, non-seulement sur les huiles qui sont le sujet de son travail, mais encore sur beaucoup d'autres. Quant à la tendance qu'ont ces huiles pour se combiner à l'oxygène & se convertir en résine, quand même les expériences de Schéele ne nous le démontreroient pas, il suffiroit d'observer avec attention la manière dont les arbres laissent couler leur résine, à on voir que, lorsque cette substance sort par l'incision, elle est liquide, sans que l'arbre qui la fournit, jouisse dans son intérieur d'une température plus haute que celle du milieu où il croît; on voit aussi qu'elle perd la fluidité qu'elle avoit incontestablement dans le tissu de l'arbre, en le combinant au principe atmosphérique qui est la cause de sa solidité.

Par l'effet de cette absorption, on découvre l'acide résineux entièrement élaboré dans un grand nombre de résines, le storax, le benjoin, le baume du Pérou, ainsi que dans la vanille & dans le sucin, substances qui avoient la liquidité des huiles essentielles, avant qu'elles aient été converties en résines.

Si les résines sèches n'ont pas d'action sur l'air

que nous respirons, c'est que leur tendance pour l'oxygène est entièrement satisfaite; telle est l'origine des cristaux que l'on trouve dans les anciennes huiles volatiles; & les expériences faites sur beaucoup d'entre elles par Cartheuser, ne laissent aucun doute sur leurs qualités salines. On doit mettre dans cette classe le prétendu camphre que Sclarc a trouvé dans une huile volatile qui avoit vingt ans, celui que trouva Ludovic dans une cannelle très-ancienne, celui que découvrit Kunkel dans les huiles d'anis & de romarin, qui s'étoient épaissies avec le temps. Les cristaux salins que remarqua Cruger dans l'huile de marjolaine gardée vingt-sept ans, ceux qu'a vus Geoffroy dans l'huile de térébenthine, sont de la même nature. Ceux qui ont été découverts en 1781, dans les huiles de salafra, de pouillot, de *dracocephalum moldavicum* & de marjolaine gardées pendant quarante-deux ans, ceux qui ont été observés dans une huile de cannelle distillée en 1720, sont aussi de la même espèce.

M. Proust croit qu'on doit ranger dans la même ordre les cristaux que Boyle a vus se sublimer pendant les 36 distillations qu'il a eu la patience de faire sur une huile d'anis; telle lui paroît aussi l'origine des sels neutres qu'ont toujours données les huiles de genièvre & de térébenthine réduites à l'état de savon par l'alcali fixe.

Ces observations le conduisent à reconnoître dans toutes les huiles volatiles un radical acidifiable qui attend seulement la base de l'air ou l'oxygène, pour devenir acide; il fait observer que ce radical seul n'est pas l'huile volatile, parce que, s'il en étoit ainsi, les huiles se convertiroient en entier en un acide, & c'est ce qui n'a pas lieu, puisqu'il en passe une portion constamment à l'état de résine. D'après tous ces faits, M. Proust pense que les résines sont des huiles volatiles, plus la base de l'air pur ou l'oxygène; comme l'acide phosphorique n'est que le phosphate plus cette même base. Ce fait positif, suivant lui, est la première base de la connoissance des résines; il ne manque que l'appréciation des quantités dans lesquelles se trouvent combinées les huiles volatiles & la base de l'air vital. Les variations dans les propriétés que présentent ces substances, dépendent de ce que la nature a uni ces deux principes dans des proportions diverses.

Les baumes tiennent évidemment le milieu entre les huiles volatiles & les résines; ils n'ont pas reçu de l'atmosphère l'élément nécessaire pour les convertir complètement en résines; enfin, la métamorphose des huiles volatiles en résines, n'est pas l'effet d'une perte, comme on l'avoit cru, mais bien celui d'une addition qui augmente leur poids, comme cela a lieu pour un radical acidifiable qui s'unit à la base de l'air, & se convertit en acide.

Dans les latitudes de chaleur artificielle que le camphre est susceptible d'éprouver, & à éprou-

vées réellement dans les expériences précédentes, il ne décompose pas l'air vital ; & si , quand l'aggrégation ne s'oppose pas à la combinaison, celle-ci ne s'opère pas, il est clair qu'à la température naturelle, le camphre ne pourra pas décomposer l'air de l'atmosphère. Malgré ces assertions, l'auteur ne prétend pas nier que le camphre ait de l'attraction pour la base de l'air, puisqu'il l'enlève à l'acide nitrique ; son altération par cet acide, tient sans doute à ce que dans cette substance il peut trouver plus de chaleur, & se prêter plus facilement à la combinaison, que lui offre, pour-ainsi-dire, l'oxygène.

Par tout ce qui précède, on voit clairement que le camphre diffère beaucoup des huiles volatiles, & qu'il ne peut pas être rangé parmi les huiles concrètes ; on voit de plus que le camphre est le radical d'un acide qui ne décompose pas l'air vital, tandis que les huiles volatiles absorbent, réduisent l'air atmosphérique à l'état mephytique, & se convertissent en résines.

En continuant la comparaison du camphre avec les huiles volatiles, M. Proust remarque que les médecins l'emploient à l'intérieur comme un des calmans les plus puissans, dans les cas où les huiles volatiles produiroient un effet incendiaire. Le camphre, semblable à l'éther sulfurique qui doit son origine à des-matières acres & inflammantes, n'a rien de commun avec les huiles volatiles dans lesquelles il s'est formé ; d'ailleurs, c'est une combinaison complexe qui n'attend plus rien de la nature, parce qu'elle est fort parfaitement achevée du travail de la végétation.

L'auteur se fait ensuite la question suivante.

Puisque le camphre s'unit à la base de l'air vital, à la faveur de certaines circonstances, comme celle de l'acide nitrique, ne pourroit-il pas arriver que dans le nombre d'années nécessaires à la production des cristaux salins au fond des huiles volatiles, le camphre que celles-ci contiennent originairement, vint à s'acidifier & à être la matière de ces cristaux ? Il avoue que, pour décider cette question, il faudroit avoir des cristaux de cette espèce, afin de reconnoître par l'analyse s'ils sont ou non de l'acide camphorique.

Le camphre, poursuit M. Proust, a, comme Cartheuser l'a démontré, des propriétés qui ne se trouvent dans aucun autre principe immédiat des végétaux ; il a des caractères qui nous forcent de le regarder comme une substance unique dans le règne végétal.

Il seroit très-important de savoir si, pendant que les plantes croissent & s'élèvent progressivement à l'état de maturité, on ne pourroit pas découvrir en elles le camphre simplement en embryon & dans un état moyen qui pourroit procurer plus de connoissance sur ses principes, que n'en fournissent les faits observés sur le camphre formé complètement & perfectionné ; si dans le cours de la végétation, il n'y a pas un temps

plus favorable qu'un autre à la production du camphre, si les plantes sèches ne le fournissent pas avec plus de facilité & d'abondance, & enfin si entre les plantes aromatiques de Murcie & d'autres provinces méridionales, il n'y auroit pas une espèce qui le donnât entièrement pur, & sans être mêlé aux huiles volatiles, comme cela a lieu dans le vrai laurier camphrier.

CAMPBRE. (Pharmacie.) Tout ce qui est dit dans l'article précédent appartient à la pharmacie comme aux autres arts où l'on emploie le camphre ; celui-ci est seulement destiné à faire connoître l'emploi du camphre dans la préparation des médicamens, les manières diverses de l'administrer sous forme solide ou liquide.

Il est reconnu que le camphre est un des plus puissans remèdes que possède la médecine. Appliqué sur les tumeurs inflammatoires, il les dissipe en peu de temps ; on l'emploie comme antispasmodique & antiseptique dans les maladies routageuses ; dans la fièvre maligne, & dans toutes les affections compliquées de symptômes nerveux & putrides. Dans la plupart des pays on a reconnu qu'on le doinoit, il y a quelque temps, à une dose trop foible ; on la poussa aujourd'hui jusqu'à celle de plusieurs gros par jour. A l'intérieur, dit Spriman, on le donne pour calmer à un demi-gros, comme antiseptique à un scrupule, dans les maladies inflammatoires à la dose de trois grains par prise, joint à un fagon sous la forme de poudre, de pilules, d'émulsion, de julep. A l'intérieur on le mêle aux fomentations, aux épithèmes fecs, aux cataplasmes.

Lorsqu'on veut mêler le camphre dans des poudres on le bat avec quelques matières végétales sèches, on y ajoute quelques gouttes d'alcool pour le rendre plus cassant, plus friable ; on ne doit les préparer que pour peu de doses, parce qu'elles perdent promptement leur camphre à la température de l'été. Pour faire entrer le camphre dans les électuaires ou les pilules, on le bat avec les extraits de plantes ; on y ajoute du jaune d'œuf pour le rendre plus miscible à ces matières végétales & pour le partager plus exactement entre elles. Quand on veut mêler le camphre dans les émulsions, les potions, les juleps, on le triture avec les jaunes d'œufs, le sucre, l'alcool, l'éther, & il reste alors uni aux liquides aqueux. Souvent on l'ajoute à ces médicamens dans l'état d'huile de camphre, ou de dissolution par l'acide nitrique, mais la plupart du temps cette dissolution se décompose ; & le camphre se précipite sous la forme de grumeaux qui viennent nager à la surface des potions. Il en est de même de la dissolution alcoolique qu'on n'emploie le plus souvent qu'à l'extérieur & seule à cause de cet inconvénient. J'ai plusieurs fois employé avec succès comme calmant, de l'eau

distillée

brûlée avec du camphre, ou qui a séjourné quelque temps sur cette substance; elle contacte une faveur & une odeur camphrées qui prouvent qu'elle tient du camphre en dissolution; & quoique la quantité dissoute soit très-foible, elle suffit cependant pour produire une action très-sensible sur l'économie animale. Il en est de même de l'eau à la surface de laquelle on a fait brûler du camphre, quoique peut-être celle-ci contient elle quelque autre matière que le camphre même, & de celle par laquelle on a précipité l'alcool camphré. Il est si vrai que l'eau dissout le camphre très-divisé, que suivant la remarque déjà ancienne de Romieu, si l'on jette goutte à goutte la dissolution alcoolique de camphre dans une grande masse d'eau, on ne voit point de précipité permanent, & le louché qui se forme d'abord s'éclaircit promptement par l'agitation. On n'a point assez songé à cette manière d'employer le camphre, elle mérite toute l'attention des médecins, & je ne saurois trop leur recommander de la soumettre à leur propre expérience.

Le camphre entre dans le vinaigre antiseptique ou des quatre voleurs, les trochisques blancs de Rhazès, ceux de myrthe, la poudre lénifiante, le collyre fortifiant, les eaux prophylactiques, hystériques, thériacale camphrée, l'essence antihystérique, le baume de Leytour, le baume hypnotique, la thériacale céleste, le baume nervin, l'opodeldoch, l'onguent blanc de Rhazès, l'onguent dessiccatif rouge, l'emplâtre de savon, l'emplâtre camphré, le diabatatum, l'emplâtre styptique, l'emplâtre odontalgique, l'emplâtre de Nuremberg, la pierre divine ou ophtalmique.

CAMPBRE. (*Pharmacie.*) **CAMPBORA.** C'est une résine blanche, solide, onctueuse, friable, transparente, légère, concrète, très-volatile, étherée, fort odorante, inflammable, fumageant à l'eau, d'un goût très-amer & piquant, qui paroît avoir beaucoup d'analogie avec les huiles essentielles. On la retire d'un arbre appelé par Linne, *laurus camphora*; & par Gaspard Bauhin, *camphora officinarum*. Ce laurier se trouve au Japon, à la Chine, dans les îles voisines, à Sumatra, à Bornéo, Ceylan, dans le Malabar & ailleurs. Le camphre étoit connu dans le siècle des arabes. Nous connoissons plus de quatre-vingt auteurs qui se sont occupés du camphre en particulier, & qui ont écrit sur ses qualités & sur son histoire, raison impérieuse pour nous circoncrire à son égard. Les curieux qui voudront connoître les objets essentiels concernant cette drogue, n'auront qu'à consulter l'article de *l'apparatus medicamentum* du célèbre M. Murray de Goringue. Tom. IV. page 445.

Plusieurs plantes contiennent du camphre, notamment la grande famille des labiées; les sciacins d'aune, du canellier, du gingembre en

fournissent aussi, ainsi que plusieurs autres plantes. M. Thunberg assure qu'il existe encore une autre espèce de camphre que celui de nos officines, qui est diaphane comme le verre, surpassant de beaucoup poids égal en vertu & en valeur, de manière qu'à la pesantur il est estimé le centuple. C'est un arbre qui ressemble au *laurus camphrier* qui le fournit; mais il est totalement ignoré des botanistes.

Le camphre est calmant, sédatif, antipuerido, résolutif, antihystérique, contre l'épilepsie, l'asthme convulsif. Il réussit merveilleusement dans les affections du genre nerveux; il est d'un grand secours dans les fièvres malignes, purides, accompagnées de délire, d'insomnie, d'exanthèmes & autres; dans les petites véroles, purides, accompagnées de blâmes, les gonorrhées & dissout superbement les engorgements inflammatoires; il est utile contre la rétro-pulsion des éruptions, les érépselles. Il est fort employé à l'extérieur. Porté en amulette, il préserve, dit-on, de la contagion, des airs mephitiques, des fièvres, de la variole, & autres maladies pestilentielles. Quelques personnes prétendent que le camphre détruit les feux de l'amour. C'est en un mot, suivant les pharmacographes, la panacée universelle contre toutes les maladies. On le donne depuis deux grains jusqu'à dix; on le joint souvent au nitre. Il est très-utile dans les épi-zooties.

Le camphre entre dans le julep qui porte son nom; l'on prépare avec une huile liquide & une butyrase, des émulsions, élixirs, fleurs, trochisques, eaux, électuaires, esprits, essences, & emplâtres.

Le camphre entre encore dans l'elixir parégorique, le vinaigre antiseptique, l'eau hystérique, l'eau thériacale, l'eau prophylactique, les trochisques de mirthe, de roses, blancs de Rhazès, l'essence antihystérique, l'huile bezoardique, les baumes hypnotique, nervin, opodeldoch, de Leytour, la thériacale céleste, la confection d'hyacinthe, le mélange de tribus, ou le diaphorétique dans les maladies aiguës; la poudre pannonique, la poudre de trai de grenouilles de Crollius, les pillules hystériques de Charas, la mixture simple de Ludovic, les boules contre les érépselles, l'essence alexitère de Benzél, l'antidote de Florence & de Bologne, la poudre réjouissante, l'eau vitriolique, l'eau ophtalmique de Saint-Yves, le liniment savonneux, l'onguent blanc, celui de césure, le dessiccatif rouge, l'égyptiac, celui de Turhie, le collyre fortifiant, le cérat des lantax, le cérat ophtalmique, les emplâtres diabatatum, de Nuremberg, de savon, styptique, odontalgique; celui pour les ganglions, le défensif rouge, vésicatoire, contre les loupes, la poudre fumigatoire athritique, & enfin la pierre divine.

On a proposé depuis quelque tems de joindre le camphre à l'onguent mercuriel, dont on

Dddd

se sert en friction pour le traitement des maladies vénériennes, dans la vue d'empêcher la salivation qui suit ordinairement l'usage du mercure, & enfin d'ancrer ce mal sans exciter aucune excrétion : le camphre est aussi regardé comme le correctif des mouches cantharides. Le camphre peut servir à l'artificier pyrotechnicien.

(M. WILLEMET.)

CAMPFREE (*Odeur*). on se sert quelquefois en chimie de l'expression *odeur camphrée*, pour désigner l'odeur du camphre que présentent quelques substances végétales, & en particulier la plante connue à cause de cette propriété sous le nom de *camphorata monspeliaca*, & plusieurs huiles volatiles retirées des labiacées. On emploie aussi l'expression de camphré en pharmacie pour désigner une composition dans laquelle entre le camphre ; c'est ainsi qu'on dit potion camphrée, émulsion camphrée, onguent camphré, &c.

En étudiant les végétaux avec plus de soin & d'attention, qu'on ne l'a encore fait, en faisant des analyses plus exactes des plantes & de leurs divers produits, on trouvera certainement plus fréquemment qu'on ne l'a pensé l'odeur camphrée. Voyez le mot CAMPHRE.

CAMPHRÉE. (*Pharmacie*.) *Camphorata monspeliaca*, *Camphorata Monspeliensis* J. B. B. 379. C'est un sous arbrisseau rameux, commun dans les lieux sablonneux du Languedoc, aux environs de Montpellier, en Provence, en Espagne, en Sibérie, en Tartarie. Il est dans notre jardin des plantes. Il passe pour vulnérable, apéritif, céphalique, sudorifique, expectorant, antispasmodique ; contre les fleurs blanches, les vers, le scorbut, pour exciter les mois, pour retarder les progrès de la phlogose pulmonaire, pour guérir les obstructions comae-gantes. On l'emploie fréquemment à Montpellier dans l'hydropisie, l'asthme, & autres maladies chroniques. On prend la camphrée en infusion théiforme. Elle est encore vantée contre les fluxions des yeux ; elle fait partie de la nomenclature des médicaments simples de la pharmacopée de Paris.

(M. WILLEMET.)

CANNELLE. (*Pharmacie*.) *Cinnamomum*. C'est une écorce mince, roulée en petits tuyaux, d'une substance ligneuse, un peu fibreuse, cassante, unie, d'un jaune rougeâtre, d'une faveur acre, piquante, aromatique, mais agréable, d'une odeur douce très-pénétrante. Il faut la choisir en beaux morceaux, point trop épais, ni pesans, ni ligneux. C'est la seconde écorce d'un arbre nommé par Linné, *laurus cinnamomum*, & par Gaspard Bauhin, *cinnamomum*, *sive canella zeylanica*, qui croît spontanément en abondance dans l'île de Ceylan.

La cannelle est un des aromats le plus doux,

nervin, cordial, céphalique, stimulant, échauffant, sudorifique, comménagogue, apéritif, stomachique.

La cannelle se donne en substance à cinq, six, dix, même quinze grains. On la fait infuser à la dose de deux gros dans une chopine de bon vin, & on en fit des rôties pour corroborer & rétablir les personnes alfoibles & languissantes qui sont convalescentes, & qui ont souffert de grandes maladies. Ce vin cordial est recommandable dans toutes les fièvres éruptives, miliaires, rougeoles, varioles, poupries. La cannelle convient dans toutes les maladies de la tête & des nerfs provenant de relâchement, guérit les flux de ventre, le vomissement, la leucorrhée. A l'extérieur la cannelle est bonne dans les paralysies, les tremblemens & soiblesses des parties. Elle est d'un grand usage pour la cuisine ; entre dans les pâtilles, dragées, confitures & liqueurs.

Son huile essentielle est un excellent remède dans les caries rebelles, pour l'épine soible des enfans qui commencent à se nouer, dans les douleurs de dents & d'oreilles. L'on prépare avec la cannelle des eaux distillées simples & spiritueuses, une teinture, un baume, un sirop, une confécion, des espèces, un sel suivant la pharmacopée de l'odovic, un magistère selon la pharmacopée de Schroder.

La cannelle entre dans la poudre cordiale de Zell, celles de roses, d'arum composée, arthritique, purgative, de bol & de fené composées du dispensaire de Londres, les espèces aromatiques, les pâtilles impériales, pour les accouchemens, pour les palpitations de cœur, la thériaque d'Andromaque, le Mithridate, l'orviétan, le *philonium* romain, l'opiate de Salomon, le disacordium, le diaphœnic, le *requiem* de Nicolas, l'hère pierre, l'hère de coloquinte, les confécions d'hyacinthe & d'alkermès, les tablettes absorbantes & fortifiantes, celles de Mats, les stomachiques, les trochisques de *cyphos*, d'*hélicroï*, les pillules angeliques, celles de *radix*, d'acier, & de cinglossé, le dentifricque, la poudre d'acier, celles d'ambre & hydragogue, les pâtilles odorantes fumigatoires, le laudanum liquide, les élixirs de vitriol, de vie, de mathiolo & le cordial, le baume apocryptique, celui de Fioraventi, les eaux de menthe composées, de mélisse composée, confortative perle, thériaque, pour les gencives par infusion & distillation, impériale, cordiales froide & tempérée de Zwelfer, les sirops de coings, de nerprun & scillitique, l'huile de scorpion composée, l'esprit de lavande composé, le volatil aromatique huileux de Sylvius & le carminatif, le vinaigre des quatre-voleurs, le vin hippocrat, l'essence d'absinthe composée, la confécion cardiaque, les espèces pour cucuphes, & les aromatiques, le sirop d'absinthe composé, ceux de *stochas*, d'ac-

moïse, de vipères, de chicorée, magistral aftringent & antiscorbutique, l'emplâtre stomachique, la confection hamée.

Plus de vingt écrivains ont traité de la cannelle en particulier.

Les Hollandais ont envahi le commerce exclusif de la cannelle.

Toutes les parties du laurier cannellier sont utiles, son écorce, sa racine, son tronc, ses festiges, ses feuilles, ses fleurs & son fruit.

(M. WILLEMET.)

M. Vauquelin a trouvé dans l'eau distillée de cannelle un sel acide, que quelques autres pharmaciens, (MM. Deyeux & Pelletier) avoient déjà découvert, mais sur la nature duquel ils ne s'étoient pas expliqués. « En examinant avec attention des bouteilles qui contenoient de l'eau de cannelle, dit M. Vauquelin, j'y ai vu des cristaux bien distincts que j'ai bientôt reconnus pour de l'acide benzoïque. Je ne savois trop d'abord à quel attribuer cet acide, mais je me suis bientôt assuré qu'il est tout formé dans la cannelle; que cet acide monte avec l'eau dans la distillation; enfin, que l'eau distillée de cannelle est une dissolution saturée d'acide benzoïque ».

M. Pelletier m'a dit qu'il avoit observé un sel cristallisé dans l'eau de cannelle ancienne, & que M. Deyeux en montrait depuis plusieurs années une assez grande quantité dans ses cours au collège de chirurgie.

CANNELLE BLANCHE. (Pharmacie.) *Cortex Winteranus.* C'est l'écorce d'un arbre exotique, nommé *winterania canella* par Linné, & *canella cubana* par Jonston; elle doit être plus épaisse que la cannelle ordinaire, lisse, blanche, d'un goût acre, piquant, brûlant, aromatique, roulée, point vermoulue.

La cannelle blanche peut servir à assaisonner les ragoûts & les alimens, on peut la mettre dans les ratafais; les épiciers en frotent les fines épices. Elle est stimulante, pénétrante, antiscorbutique, fondante, stomachique, carminative, elle convient dans les hémorragies, la paralysie de la langue, dans les maladies comateuses, la cachexie & autres affections chroniques. On la donne en substance depuis vingt jusqu'à quarante grains.

La cannelle blanche entre dans l'orviétan, l'opiate de Salomon, l'hière picro, la teinture sacrée; l'on en retire une eau distillée selon la pharmacopée de Paris.

C'est en 1578 que le capitaine Winter, anglais, rapporta cette écorce en Europe, des terres Magellaniques.

Il y a encore une autre écorce de Winter, qui provient d'un arbre commun à la terre du Feu, que Linné elle appelle *winteria aromatica*, & par Forster, *dirmys winteri*.

(M. WILLEMET.)

CANNELLE GÉROFLÉE. (Pharmacie.) *Myrtus caryophyllata.* *Cassia caryophyllata.* Pison. C'est l'écorce d'un arbre indigène des Indes, de la Martinique, de la Grenade, de la Guadeloupe & de l'île du Cuba. Cette écorce doit être d'un roux foncé, roulée, d'une saveur de gérofle. Elle est propre à fortifier le cerveau, l'estomac, le cœur, & propre pour résister à la malignité des humeurs.

(M. WILLEMET.)

CANNE ou ROSEAU. (Pharmacie.) *Arundo donax.* *Arundo vulgaris palustris.* J. B. Ce roseau se trouve en Espagne, en Provence, en Italie, en Languedoc. Sa racine est inodore, insipide; elle est en usage dans les dépôts laiteux, elle est encore, dit-on, apéritive, alexipharmaque. La dose est de demi-once dans huit onces d'eau.

Cette plante fait partie de l'énumération des médicamens simples du dispensaire de Paris.

(M. WILLEMET.)

CANNE A SUCRE ou CANNAMELLE. (Pharmacie.) *Saccharum officinale.* *Arundo saccharifera.* C. B. 4. Ce roseau précieux, croît naturellement dans les Indes, aux îles Canaries & dans les pays chauds de l'Amérique; il se plaît dans les terrains gras & humide. C'est lui qui nous offre avec profusion le sucre, ce mets délicieux, d'un usage si multiplié; car il est étonnant de voir combien l'on consomme de sucre dans les cuisines & en pharmacie; il n'y a point d'alimens agréables, s'ils ne sont assaisonnés de sucre, surtout dans les desserts; c'est ce qui a donné naissance à un nouveau genre d'artilles, (les confiseurs) inconnus aux anciens.

Le sucre est un sel essentiel, très-doux; considéré médicalement, il adoucit ce qui est acre, émouffe les acides, rend plus doux ce qui est âpre; son usage modéré engraisse, facilite la digestion, préserve les hommes du scorbut & les fruits de la corruption. Le sucre fondu dans l'eau-de-vie est vulnéraire, résiste à la pourriture. Le sucre candi réduit en poudre, soufflé dans les yeux, dissipe la taie de la cornée.

Il est constant que les médecins ont beaucoup écrit sur la nature & les vertus des amers; mais ils ont négligé les doux, qui cependant ne sont pas indignes de leur attention, puisqu'ils entrent dans une grande partie de nos alimens. Un jeune docteur allemand a publié depuis peu une dissertation intéressante sur la nature & les vertus des doux; le sucre comme on peut le croire, tient le premier rang parmi eux, il en fait l'analyse chimique, considère les diverses substances dont on peut le retirer, il s'étend sur la canne à sucre, & indique les végétaux qui en fournissent aussi. M. Pehrén, auteur de cet écrit,

D d d d d 2

examine spécialement les vertus des *doux*; c'est toujours le sucre qui l'occupe principalement. Il en approuve fort l'usage, & croit qu'il ne nuit qu'à ceux qui en abusent excessivement. Il cite pour exemples. *Coffus*, juriscônseulte hollandais, qui parvint à l'âge de quatre-vingt-dix ans, usant plus de sucre qu'il n'en falloit à cinq ou six autres personnes; le duc de Beaufort en prenoit tous les jours environ une livre, il n'en a pas moins vécu plus de soixante & dix ans, sans que ses dents & ses viscères en aient été endommagés; le célèbre Hoffmann confirmoit par sa conduite, les louanges qu'il donne au sucre dans plusieurs de ses écrits; il en supputoit presque tous ses aliments, & en ajoutoit à toutes ses boissons. Le sucre est, sans contredit, l'un des vieillards & des poitrinaires. Il entre dans les sirops, marmelades, conserves, tablettes, électuaires, liqueurs, ratafats & gelées; dans la décoction blanche, les pâtes pectorales, la café cuit, la pulpe de tamarins, la poudre pectorale, la poudre anodine, la poudre absorbante pour les enfans, les poudres sternutatoires diverses, les espèces pour la décoction d'avoine, les pilules mercurielles, la teinture d'absynthe composée, le collyre tonique, la poudre d'iris, la poudre de Zell, le looch blanc de Paris, l'émulsion commune, l'elixir de vie de Matthioli, l'hydromel pour les enfans, l'infusion ou teinture de pavot rouge, la pulpe de prunes, les boules musquées rouge & blanche de pharmacopée de Virmberg, les tablettes de magnanimité, la poudre panonique de Charas & les pilules stides.

Le codex de Paris donne la préparation d'un sucre vernissé. L'on retire du sucre une eau-de-vie nommée *T. 371*. Le célèbre chimiste Bergmann a découvert l'acide saccharin.

Plusieurs végétaux contiennent du sucre; c'est un délicat très-doux.

(M. WILLEMET.)

CANNE DE RIVIÈRE. (*Pharmacie.*) *Coffus arabeus*. *Alpinia spicata*. Jacq. *Amer.* 1. T. 1. La décoction du chaume & de la racine de cette plante arundinacée, selon M. Jacquin, offre un puissant rafraîchissant contre la gonorrhée & d'autres maladies.

Le suc exprimé de la racine, s'emploie avec succès dans le pays pour la guérison des cancers.

Cette canne se trouve dans l'Amérique méridionale, & à l'entrée des forêts humides de la Guiane.

(M. WILLEMET.)

CANNERBERGE ou COUSSINET DES MARAIS. (*Pharmacie.*) *Vaccinium oxycoccos*. *Vitis idæa palustris*. C. B. 471. C'est une plante borsale rampante, qui naît dans les lieux tourbeux, marécageux de la France, de la Suisse

& de l'Allemagne; les feuilles, les fleurs & les baies sont rafraîchissantes, détersives, astringentes, l'on en prescrit l'usage en décoction dans les fièvres ardentes & malignes, pour apaiser le flux de ventre bilieux, les dysenteries, pour ranimer l'estomac affaibli. C'est sur-tout les baies qui dénotent, par leur saveur acide, un caractère d'astringence propre à calmer le bouillonnement des humeurs, qui est exalé par une bile âcre & brûlante, ainsi l'on en donne la décoction avec succès dans les maladies que nous venons de désigner. Les baies sont comestibles, on les vend à Pétersbourg lorsque la gelée les a amorties; dans l'Ingrie l'on fait infuser ce fruit dans l'eau, jusqu'à ce qu'elle soit d'un beau rouge de vin de Bourgogne, ce qui fait une boisson acidulée. En Suède, on confit les baies de canneberge, ou l'on en prépare un rob, qui, délayé dans une certaine quantité d'eau bouillante, offre une excellente boisson, propre à éteindre la soif des fébricitans. Le baron de Haller, dans son histoire des plantes de la Suisse, rapporte que les Américains envoient en Angleterre & en Allemagne des baies de canneberge pour confire au sucre; M. Clerc dit qu'en Russie l'on fait fermenter ce fruit dans l'hydromel, qui en devient d'un meilleur goût. Les habitans de la forêt noire en font de la compote au vinaigre, pour les malades; ils en donnent dans les affections pituiteuses de la poitrine. Les baies de la canneberge sont rouges, elles servent encore à nettoyer & blanchir l'argenterie.

(M. WILLEMET.)

CANONS. Ce sont des tubes de fer, de cuivre, de porcelaine, de verre, &c.; ces instrumens peuvent servir à une foule d'opérations, dont on a fait connoître les principales au mot *APPAREIL*, pour la décomposition de l'eau, page 347.

Leur usage peut être infiniment multiplié, & il est vraisemblable que par la suite ils seront plus fréquemment employés. Ils sont très-utiles pour faire subir une grande chaleur aux corps, en leur offrant pour ainsi dire, un passage de feu, lorsqu'ils ont été préalablement eux-mêmes, fortement chauffés.

Souvent sans doute les corps subissent dans ces tubes des altérations qui feront connoître leur nature ou quelque nouvelle propriété.

(M. VAUQUELIN.)

CANTHARIDES. (*Chimie & Pharmacie.*) Parmi la classe des insectes, dont un grand nombre de produits, tels que la soie, la cire, le miel, la lacque, sont utiles dans les arts & dont la chimie s'est occupée avec succès, il n'en est pas qui paroissent présenter des faits plus intéressans dans leur analyse que les cantharides. On verra à l'article des *FOURMIS* & des *VERS A SOIE*

que la chimie à déjà découvert de très-grandes propriétés à ces insectes ; elle y a trouvé plusieurs acides nouveaux. L'ordre de ces animaux présentera quelque jour un vaste champ à ses recherches. Les cantharides ont déjà été examinées par quelques chimistes, quoique ce que possède la science à leur égard ne doit encore être regardé que comme une légère esquisse.

Au langage de Cartheuser sur la nature de ces insectes médicamenteux, on jugera de l'état où étoit la chimie à l'époque où ce médecin écrivoit (il y a près de 30 ans.) les cantharides contiennent, dit-il, peu de partie résineuse, plus de gélativeuse & beaucoup de terreuse, puisque dans une once de ces insectes, on trouve un gros & demi de gelatine, un demi-scriptule seulement de résine, & que le reste est formé par la terre. Ces expressions fe rapportent à l'analyse par l'eau & par l'alcool, dont l'action successive n'enlève qu'un gros quarante-huit grains sur une once, & le résidu, la partie non dissoute, étoit toujours rapportée à la terre comme dans l'analyse des végétaux. On fait aujourd'hui quelle grosse erreur on faisoit en nommant ainsi terre, tout ce qui ne se dissolvait ni dans l'eau ni dans l'alcool. Cartheuser continue ainsi : la partie résineuse quoique très-peu abondante est celle où réside l'acreté caustique & la vertu des cantharides, en y ajoutant un principe salin qui l'augmente pour ainsi dire. La nature de ce sel est encore inconnue ; les uns le disent acide & les autres alcalin ; on n'a pas encore pu le séparer convenablement : il reste enveloppé dans la résine qu'on en extrait par l'alcool. On tire bien des cantharides un sel volatil, un esprit urinaire & une huile fétide par la cornue ; mais ces principes, dit-il, sont altérés par le feu & ne peuvent pas répandre de jour par la véritable nature des cantharides ; il croit cependant que le sel est un acide par l'analogie avec les autres insectes, par son existence avec la résine, & par l'activité des vésicatoires qu'il dit être augmentée par les acides. Voilà à quoi je réduis l'analyse de Cartheuser ; c'est d'après ces essais informes qu'il raisonne sur les vertus des cantharides. M. Thouvenel a fait quelques expériences plus exactes sur les insectes : nous allons en présenter ici le tableau.

L'émanation des cantharides vivantes reçue en certaine quantité, est très-fétide & nuisible ; quoiqu'elle ne soit pas sensiblement acide comme celle des fourmis, elle est beaucoup plus corrosive. Elle agit comme irritant sur les nerfs & même sur la vessie de ceux qui s'y exposent.

L'analyse a démontré dans une once de cantharides séchées ; 1°. à-peu-près 4 gros de parenchyme ; 2°. 3 gros de matière extractive jaune-rougeâtre, d'une amertume piquante, qui ne diffère de celle des fourmis que parce qu'elle n'en a pas la légère acidité ; 3°. 60 grains d'une ma-

tière grasse, de couleur verte, d'un goût âcre, mat, peu développé ; 4°. 12 grains d'une matière jaune, moins formée en couleur que l'extrait, presque insipide.

Ces substances sont confondues dans l'animal, & y paroissent même assez intimement unies ; en sorte qu'on n'en obtient pas d'abord une séparation exacte, par l'application des différents dissolvans aqueux & alcooliques. Si on emploie l'eau la première, elle enlève les deux matières jaunes, un peu de la matière verte qui se trouve unie à la seconde matière jaune, & un peu de la matière extractive. On obtient bien à part chacune de ces trois substances par l'évaporation ; mais elles ne sont pas encore parfaitement pures, & il faut recourir à l'éther sulfurique qui n'attaque que la partie verte. Si on applique le mentruum sur les cantharides entières, il ne dissout pas en totalité la matière verte qui est toujours en partie défendue de son action par les deux autres substances.

L'extrait aqueux des cantharides donne à la distillation un phlegme légèrement acide ; puis un sel volatil concret, ou du carbonate d'ammoniaque.

Cet extrait contient un sel à base terreuse, & un autre à base d'alcali fixe végétal, ou de (potasse.) Ces deux bases, dont la première est constamment la plus abondante, sont unies à un acide qui présente le caractère de l'acide phosphorique. Ces sels y sont en petite quantité & très-difficiles à retirer. M. Thouvenel n'a pas suffisamment fait connoître les expériences qui l'on conduit à ce résultat, & il n'a rien dit de la terre, base de l'un de ces sels.

La partie extractive jaune paroît être analogue à ce qu'on appelle la cire brute des abeilles, c'est-à-dire à la poussière des étamines non élaborées. Elle est peut-être la cause de la couleur jaune dorée des cantharides entières, qui en sont privées en grande partie par l'alcool seul, & qui deviennent alors d'un bleu d'azur léger. Cette matière jaune appliquée sur la peau à des doses décuplées de celles de la partie verte, n'exerce aucune irritation ; elle ne paroît pas influer dans les effets médicinaux des cantharides.

C'est dans la matière grasse verte que réside principalement l'odeur singulière des cantharides entières ; c'est en elle que le principe stimulant existe. Cette substance, quoique beaucoup moins âcre que les autres, cause seule, lors de la degustation des extraits aqueux & spiritueux de ces insectes, des cloches ou de petits ulcères sur la langue & les lèvres, & l'effet en est toujours d'autant plus prompt & plus sensible, que la proportion de cette matière est plus grande. Elle est donc la seule caustique, & celle qui mérite le plus de fixer l'attention.

Elle produit à la distillation des produits sem-

blables à ceux de la cire des abeilles, savoir : une huile d'une odeur empyreumatique très-piquante ; un flegme acré, acide ; une huile concrète, connue sous le nom de beurre de cire. Cette substance paroît donc être une nouvelle espèce de cire demi-fluide, & non pas une résine, comme le disent tous les auteurs qui en ont parlé ; en effet, elle doit sa naissance à une huile *grasse* ou fixe, & non à une huile *essentielle* ou volatile, comme les résines.

M. Thouvenel, d'après beaucoup d'essais, indique le moyen suivant pour obtenir plus facilement une certaine quantité de la première matière extractive des cantharides, ou de l'extract proprement dit, & de la partie verte grasse.

Il emploie un mélange à parties égales d'eau & d'alcool. En faisant évaporer cette dissolution dans un appareil distillatoire, l'alcool que l'on retire conserve une légère odeur de cantharides. A mesure qu'il monte, la partie grasse se sépare & vient nager à la surface, sous la forme d'une huile verte : elle ne prend que fort peu de consistance par le refroidissement. En continuant l'évaporation, la partie cireuse jaune se précipite & s'attache aux parois du vase, jusqu'à ce que la matière extractive ait acquis une consistance sirupeuse. En redissolvant cette dernière dans une plus grande quantité d'eau & en la faisant évaporer de nouveau, il s'en sépare encore un peu de la même manière jaune. Enfin, si on emploie l'éther, on parvient à séparer entièrement ces substances : c'est avec ce dissolvant que M. Thouvenel est parvenu à retirer de la cire verte du précipité jaune, & de la cire jaune du précipité vert.

Il indique ensuite la manière de séparer le plus exactement possible, toute la matière verte, c'est-à-dire la partie la plus importante de l'extract.

L'alcool le plus rectifié, épuisé difficilement les cantharides de toute la partie verte ; 40 onces de ce dissolvant suffisent à peine, même avec le secours de la chaleur, pour une once de ces insectes ; tandis que moitié d'un mélange à parties égales d'eau & d'alcool rectifié, est plus que suffisant. Mais alors même, s'il n'y a d'alcool que la quantité suffisante pour dissoudre, à l'aide de la digestion, toute la partie verte, il s'en sépare une portion par le refroidissement.

Il falloit donc trouver le moyen, & de dissoudre entièrement cette matière, & d'en éviter la précipitation pendant le refroidissement.

Plusieurs tentatives lui ont fait trouver le procédé suivant, auquel il s'en est tenu.

Il a pris pour terme moyen, une eau de-vie, dont la pinte, mesure de Paris, pesoit 28 onces, & qui marquoit 28° à l'aréomètre. Il a mis dans cette quantité, demi-once de cantharides entières, (passées auparavant sur un ta-

mis grossier, pour en séparer la poudre jaune dont elles sont recouvertes.) Il a fait digérer ce mélange pendant 24 heures dans un matras sur un bain de sable à une douce chaleur, & il a obtenu une teinture jaune verdâtre, dont il ne s'est rien séparé par le refroidissement. 8 onces de nouvelle eau-de-vie, mise sur le marc & tenues en digestion comme la première fois, n'ont presque donné que de la matière jaune.

La teinture de cantharides ou la dissolution de cette substance animale dans l'alcool, est employée en médecine par l'application topique, à titre d'épispatique. Ce remède est un stimulant extrêmement énergique ; ses effets sont irritants, résolutifs, évacuans, révolusifs ; on s'en sert avec succès dans les maladies aiguës & chroniques. Les médecins François intimidés par la violence de son action, n'ont pas encore osé en ordonner l'usage intérieur. Mais on en donne ailleurs à la dose de quelques gouttes dans des boissons adoucissantes, pour les difficultés d'uriner & même dans les suppressions d'urines, dans les gonorrhées anciennes, dans les hydrophiques, &c. On l'emploie aussi avec succès à l'extérieur, pour appeler dans le lieu qu'on en frotte, le spasme qui occupe des parties plus importantes à la vie ; c'est ainsi qu'on frotte de teinture de cantharides, les mallesoles & le cou de pied, pour détourner le spasme de la gorge, de la tête, de la poitrine & de l'estomac.

Le plus fréquent usage des cantharides est relatif à leur mixture en poudre dans les emplâtres vésicatoires. Les anciens, d'après l'avis d'Hippocrate, vouloient qu'on en ôtât la tête & les pattes, parce que ces parties, suivant eux, contenoient les pointes les plus dures & les plus piquantes ; ils attribuent les vertus de ces insectes aux pointes dont ils les croyoient hérissés ; aussi dans cette opinion recommandoient-ils de ne pas trop pulvériser les cantharides, de peur d'atténuer & même d'annuler leurs vertus ; mais l'expérience a prouvé directement le contraire. La pommade épispatique de l'hierri, apothicaire à Caën, dont on connoît les propriétés, & qui est généralement employée pour entretenir la suppuration des vésicatoires, & même pour les établir, n'est autre chose qu'un mélange exact de cantharides en poudre très-tendue & d'un onguent acré. On y démontre la présence de la poussière de cantharides, en le fondant sur un linge très-ferré ou sur un papier Joseph ; la poudre reste sur le filtre après que l'onguent fondu a passé.

CAOUT-CHOU. Le caout-chouc, nommé improprement gomme élastique ou résine élastique, est une des substances sur la nature desquelles il est difficile de prononcer. Quoique la propriété combustible, dont on tire parti en Amé-

rique, pour s'éclaircir, semble la rapprocher des résines, son élasticité, sa mollesse, son indissolubilité dans les liquides qui dissolvent ordinairement ces dernières, sont autant de caractères qui l'en éloignent.

L'arbre qui la fournit croît dans plusieurs endroits de l'Amérique. On fait des incisions en large sur son écorce, & on a soin qu'il les pénétrant jusqu'au bois; on reçoit dans un vaisseau le suc blanc & plus ou moins fluide qui en découle, pour en former différens ustensiles; on l'applique par couches sur des moules de terre; on le laisse sécher au soleil ou au feu; on y fait, à l'aide d'une pointe de fer, des dessins très-variés; on expose ces ustensiles à la fumée, & lorsqu'ils sont bien secs, on casse les moules. Telle est la manière dont on fabrique les bouteilles & les différens ustensiles de gomme élastique qu'on envoie en Europe.

Les vases qui sont faits de cette matière peuvent contenir de l'eau & différens fluides qui n'ont pas d'action sur elle. Si on la coupe en lanières, & qu'on applique ses bords récemment coupés, ils se rejoignent & se recollent assez bien. J'ai examiné le suc du caout-chouc qu'on m'avait envoyé de Madagascar. Ce suc étoit blanc comme du lait, d'une odeur fétide insupportable. Il contenoit une matière blanche, concrète, spongieuse, qui occupoit le milieu de la bouteille dont elle avoit pris la forme, & qui étoit élastique. En chauffant la lionne, il s'est bientôt formé à sa surface une pellicule blanche de vraie résine élastique; l'alcool mêlé au suc, en a séparé des flocons de cette singulière résine. Au reste, les détails de cette analyse seront exposés plus bas.

Exposé au feu le caout-chouc sec, & tel qu'on l'envoie en Europe, se ramollit, se boursouffle, exhale une odeur fétide & brûle en se retirant.

La résine élastique n'est pas dissoluble dans l'eau; on ignore l'action des matières salines sur cette substance. Macquer, qui a essayé de la dissoudre dans différens menstrues, s'est convaincu que l'alcool n'avoit aucune action sur elle, comme l'avoient déjà annoncé M. de la Condamine & Fresneau (*Académie, année 1751*), mais que les huiles la dissolvent à l'aide de la chaleur. Cependant, comme son intention étoit de la mettre dans un état liquide, de sorte qu'elle pût être employée, & reprendre ses propriétés par l'évaporation du dissolvant, il a été obligé d'avoir recours à un autre menstrue que les huiles, parce que ces matières, quelques volatiles qu'elles fussent, altéroient toujours la résine élastique, & y restoiént fixées de manière à lui enlever son élasticité & sa force. L'éther très-rectifié dans lequel il est parvenu à dissoudre facilement cette substance, a rempli entièrement son objet par son évapo-

tabilité (*Académie, année 1768*), & quoique cette liqueur soit fort chère, il a cru devoir indiquer ce moyen de faire des ustensiles très-utiles, tels que les sondes, en appliquant sur un moule de cire des couches incassives de cette dissolution jusqu'à ce qu'elles aient l'épaisseur qu'on leur désire. Lorsque la sonde est sèche, on la plonge dans l'eau bouillante qui liquéfie la cire, & on la sépare ainsi du moule. La mollesse & l'élasticité de cet instrument le rendent très-utile pour les personnes qui sont forcées de le porter continuellement. Nous reviendrons plus bas sur la dissolubilité du caout-chouc dans l'éther.

Telles étoient les connoissances acquises sur la résine élastique, lorsqu'en mois d'avril 1784, M. Berniard, connu par l'exactitude de ses travaux, fit insérer dans le Journal de physique un très-bon mémoire sur cette singulière substance. Ce chimiste conclut de ses recherches, que la résine élastique est une espèce d'huile grasse particulière, colorée par une matière dissoluble dans l'alcool, & falsifiée par la suite de la fumée à laquelle on expose chaque couche de cette résine pour la dessécher. L'eau ne l'altère point; l'alcool la décolore à l'aide de l'ébullition. L'alcali fixe caustique n'a aucune action sur elle. L'acide sulfurique concentré la réduit à l'état charbonneux, & se noircit lui-même en prenant l'odeur & la volatilité de l'acide sulfureux. L'acide nitrique ordinaire ou foible agit sur cette résine comme sur le liège, & la jaunit. L'acide nitrique très-concentré la détruit très-prompement. L'acide muriatique ne l'altère en aucune manière. L'éther sulfurique rectifié ne l'a point dissoute. Ce fait doit paroître singulier, comme le dit l'auteur, à tous ceux qui connoissent l'exactitude & la véracité de Macquer. L'éther nitrique l'a dissoute. Cette dissolution est jaune, & donne par l'évaporation une substance transparente, friable, dissoluble dans l'alcool; en un mot, une vraie résine, formée, suivant l'auteur, par l'action de l'acide nitreux sur le caout-chouc élastique. L'huile volatile de lavande, celles d'aspic & de térébenthine l'ont dissoute à l'aide d'une légère chaleur; mais elles ont formé des fluides collans, qui possèdent plus ou moins les mains, & qui, conséquemment, ne peuvent être d'aucun usage. Une dissolution de résine élastique par l'huile d'aspic, mêlée avec de l'alcool, a déposé des flocons blancs insolubles dans l'eau chaude, qui ont nagé à la surface de ce fluide, & sont devenus blancs & solides comme de la cire, par le refroidissement; en un mot, une véritable huile fixe, concrécible. L'huile de camphre dissout la résine élastique par la simple macération. En évaporant cette dissolution, le camphre s'est volatilisé, & il est resté dans la capsule une matière ambrée, d'une consistance ferme, & presque pas gluante.

qui se dissout bien dans l'alcool. Les huiles fixes bouillies sur la résine élastique la dissolvent ; la cire la dissout aussi. Cette substance ne se fond point au degré de l'eau bouillante ; mais exposée au feu dans une cuiller d'argent , elle se réduit en une huile noire épaisse ; elle répand des vapeurs blanches ; elle reste ensuite grasse & collante , quoiqu'exposée à l'air pendant plusieurs mois , & ne reprend point la siccité & l'élasticité qui sont si utiles pour les usages auxquels on la destine. Enfin , M. Bernard a terminé ses recherches par l'analyse à feu nu de la résine élastique. Il a obtenu d'une once de cette matière très-peu de phlegme , une huile d'abord claire & légère , ensuite épaisse & colorée , & de l'ammoniaque dont il ne désigne pas la quantité. Il est resté un charbon pesant douze grains , semblable à celui des résines. Ce chimiste attribue l'ammoniaque à la suie qui colore la gomme élastique.

Nous ferons observer sur cette analyse , qu'elle ne démontre pas très-exactement la nature de la résine élastique , puisque l'action des acides sur cette substance ne ressemble pas à celle qu'ils exercent sur les huiles grasses , & qui est beaucoup plus rapide ; puisque les alkalis caustiques ne la mettent point dans l'état savonneux ; puisqu'elle ne se fond qu'à une chaleur beaucoup plus forte que celle qui est nécessaire pour faire couler les huiles fixes les plus solides ; puisqu'aucune huile fixe ne devient élastique & ne sèche jamais comme elle , &c. &c. D'ailleurs l'auteur avance dans la quinzième expérience , que cette gomme est composée de deux substances distinctes qu'il ne démontre pas , & il finit par la regarder comme un produit de l'industrie humaine. De toutes ces réflexions , & de beaucoup d'autres qu'il seroit possible d'ajouter sur le travail , d'ailleurs très-bien fait , de M. Bernard , nous pensons qu'il reste encore beaucoup à faire , comme il l'a dit lui-même , pour connoître les propriétés de cette substance , & pour décider positivement sur sa nature.

L'industrie européenne a trouvé dans cette matière une ressource de plus pour fabriquer des instrumens de chirurgie qui pussent contenir quelques parties sans opérer une compression trop forte , & en se pliant à tous les mouvemens , à toutes les flexions que ces parties exécutent. C'est ainsi qu'on fabrique des bandages , des sondes , &c. de caout-chouc. Les mécaniciens & les physiciens tirent aussi un grand parti de cette substance ; elle fait aujourd'hui fonction de ressort dans les machines ; on l'étend sur les étoffes de fil & de soie qu'elle défend de l'impression de l'eau , en leur conservant la flexibilité.

Jusqu'à actuellement on n'a reçu cette matière que sous la forme solide , & il a fallu trouver les moyens de la ramollir , de la dissoudre , pour

la faire servir à un plus grand nombre d'usages. On fait que presque toujours c'est aux dépens de ses propriétés qu'on lui a fait subir ces changemens. Il y a plus de dix ans que pour connoître s'il ne seroit pas possible de l'employer ici comme on le fait dans nos colonies d'Afrique & d'Amérique , j'ai demandé qu'on me l'envoyât liquide & telle qu'elle découle des arbres qui la fournissent. J'en ai obtenu il y a huit ans une pintre par les soins de M. Melon , ancien commissaire national à l'île de Bourbon , & j'ai reconnu dès-lors que mes vœux pourroient être remplis quelque jour. La société d'agriculture en ayant reçu une bouteille au mois de juillet de cette année , & m'ayant chargé d'en examiner les propriétés , j'ai repris les expériences que j'avois faites auparavant sur cette matière , & j'ai eu occasion de confirmer mes premiers résultats que j'avois déjà obtenus ; c'est de ces résultats immédiatement applicables aux arts que je m'occuperai ici. Car on verra que je suis bien éloigné d'avoir complété l'analyse de cette substance singulière ; il auroit fallu en avoir une beaucoup plus grande quantité , & il m'est permis de l'espérer quelque jour du zèle des voyageurs instruits qui parcourent aujourd'hui nos colonies.

En débouchant les bouteilles qui contenoient le suc de l'*Hevea Guianensis* d'Aublet , ou du *Jatropa elastica* de Linnæus , il s'est répandu une odeur fétide très-forte , mêlée de celle du gaz hydrogène sulfuré & de fail pourri. La plus grande partie du suc étoit liquide , blanche & opaque comme du lait ; mais dans l'une & l'autre bouteille , il y avoit une masse concrète très-blanche , ayant la forme de la bouteille entière dans l'une , & seulement celle de son goulot & de sa partie évasée dans l'autre , parce que celle-ci avoit été tenue renversée pendant le voyage. Sur 2 livres 1 once 1 gros $\frac{1}{2}$ de matière contenue en totalité dans la bouteille du dernier envoi à la société d'agriculture , on a retiré en la cassant 3 onces 1 gros 36 grains de gomme élastique concrète blanche & pure. La liqueur blanche avoit une faveur un peu fucrée , quoiqu'elle fût en même-temps âcre & désagréable. En la chauffant doucement dans des vaisseaux fermés , elle ne s'est point coagulée ; mais en la chauffant dans un vase large & avec le contact de l'air , elle a présenté un phénomène très-important pour la connoissance de la gomme élastique. Il s'est formé à la surface de la liqueur une pellicule blanche , demi-transparente , très-élastique , qui avoit toutes les propriétés de la gomme. Après avoir enlevé cette première pellicule , il en a paru successivement plusieurs autres ; une livre de cette liqueur a fourni près d'un demi-gros de gomme élastique. Après qu'elle n'en donnoit plus , le lait d'*Hevea* étoit devenu transparent ; en l'évaporant jusqu'à

la consistance presque syrupeuse, il a déposé par le refroidissement une grande quantité de cristaux rayonnés d'une couleur jaune, d'une saveur sucrée & légèrement acide. Nous parlons plus bas de cette matière particulière ; il faut continuer ici l'examen de la liqueur laireuse & de la gomme élastique qui s'en étoit séparée.

Exposée à l'air au dessus du mercure, cette liqueur absorbe peu-à-peu l'air vital, la gomme élastique s'en fêpe & vient s'élever à sa surface ; dans cette expérience comme dans l'évaporation, la fixation de l'oxygène opère la concrétion de la matière élastique ; aussi les acides versés dans la liqueur en séparent-ils la portion de gomme élastique qui est en suspension ; cette gomme prend d'abord la forme de flocons qui bientôt se rapprochent & s'unissent en une seule masse cohérente. L'acide muriatique oxygéné produit très-prompement cette précipitation de la gomme, & la perte de son odeur prouve que c'est à la fixation de son oxygène qu'il faut attribuer ce phénomène ; de sorte que dans cette expérience comme dans toutes celles que l'on fait avec l'acide muriatique oxygéné, cet acide produit dans un temps très-court, ce que le contact de l'air ne produit qu'à la longue.

Les alcalis agissent d'une manière inverse sur le lait de l'*Arceuthobium* ; ils opèrent une combinaison plus intime de la matière élastique avec le liquide, & s'opposent à sa séparation par l'oxygène atmosphérique. En dissilant quatre onces de ce suc laiteux par une chaleur très-douce, on a obtenu une liqueur claire comme de l'eau, d'une odeur analogue à celle du jasmin, odeur bien différente assurément de celle du gaz hydrogène sulfuré ; cette eau étoit légèrement acide, mais sa petite quantité a empêché qu'on ne pût en déterminer la nature.

La gomme élastique déposée dans le col de la bouteille qui lui avoit en quelque sorte servi de moule, & qui pèsait plus de 3 onces & gros, comme il a déjà été dit, étoit parfaitement blanche, d'un tissu fin & serré, douce au toucher, entièrement élastique ; exposée à l'air, elle a pris une couleur fauve qui a passé au brun, en la dissilant on en a retiré beaucoup d'ammoniac & d'huile ; les alcalis caustiques & liquides ne lui ont fait éprouver aucune altération, pas même à l'aide d'une assez forte chaleur. L'éther sulfurique l'a ramollie & en partie dissoute. L'huile volatile de térébenthine l'a également & bien plus facilement dissoute que l'éther. Cette dissolution chauffée long-temps à un feu doux & par le contact de l'air a laissé déposer une portion de la gomme dans son état élastique & pur. En traitant cette gomme élastique pure par l'acide nitrique, on en a obtenu du gaz azote de l'acide carbonique, du gaz acide prussique & de l'acide oxalique. Toutes ces expé-

riences ont été faites en même-temps sur la gomme élastique du commerce, & elles ont présenté absolument les mêmes résultats.

La matière cristalline & de saveur sucrée que le suc d'*Arceuthobium* avoit fournie après la séparation des pellicules de gomme élastique, étoit très-dissoluble dans l'eau ; cette dissolution rougissait les papiers teints par le tournesol. L'alcool dissout très-facilement cette matière, & prend dans cette opération une couleur rouge ; en laissant cette dissolution s'évaporer spontanément à l'air, il s'en sépare des cristaux blancs allongés & minces, il reste une matière colorante dans la dernière portion d'alcool ; les mêmes cristaux précipités de l'alcool & séparés de la matière colorante qui les attire, sont promptement & facilement dissolubles dans l'eau, ils ne précipitent point les dissolutions nitriques d'argent & de mercure, ils ne forment point un sel insoluble avec l'eau de chaux ; ils ont encore la saveur sucrée que les dissilés lorsqu'on les examine immédiatement après l'évaporation du suc d'*Arceuthobium*. Le suc se décompose & en dégage de l'acide pyromarqueux & du gaz acide carbonique sans apparence d'huile ; ils ne font point éprouver d'altération aux carbonates alcalins, ils paraissent être formés par la substance sucrée qui commence à prendre des caractères acides, & sans être encore entièrement converti en matière saline, ce qui paroit dépendre d'une plus grande proportion d'oxygène qu'il n'y en a dans le sucre.

Cet essai d'analyse que nous aurions désiré de poursuivre & d'étendre bien plus loin, si nous avions eu à notre disposition une plus grande quantité de suc qui fournit la gomme élastique, nous permet d'offrir quelques résultats nouveaux & utiles, soit pour une connoissance plus parfaite de la nature de ce singulier végétal, soit pour tirer un plus grand parti des propriétés de cette matière : nous plaçons dans la première classe les faits suivans :

1°. La gomme élastique est dissoute ou suspendue dans un suc laiteux, d'où elle se sépare peu-à-peu par le contact de l'air, mais non pas par la seule évaporation.

2°. L'absorption de l'oxygène est la principale cause de cette séparation & de la concrétion de la gomme élastique.

3°. La gomme élastique se colore en fauve & en brun par le contact de l'air, & la suite n'est pas la cause de la coloration de ce produit.

4°. La gomme élastique donne par sa nature même, & non pas en raison de la suite qu'elle contient, de l'ammoniac à la distillation ; c'est à la présence de l'azote dans cette substance qu'il faut attribuer la production de cet alcali.

5°. La gomme élastique est dissoluble dans l'éther, quand on la met en fragmens très-minces dans l'éther sulfurique.

6°. Parmi les principes immédiats des végé-

E c c c c

taux auxquels on a comparé la gomme élastique, ce n'est ni des huiles grasses concrètes, ni des résines qu'elle paroit se rapprocher entièrement, mais c'est à la matière glutineuse qu'elle ressemble le plus par son élasticité, sa propriété de donner de l'ammoniaque & une huile fétide à la distillation, & par celle de fournir du gaz azoté & de l'acide prussique par l'acide nitrique.

Quoique nous comparions la gomme élastique au gluten, il ne faut pas regarder ces deux matières comme parfaitement identiques, la gomme élastique semble être plus huileuse, & contenir plus d'hydrogène que le gluten.

Quant aux résultats utiles aux arts qui paroissent découler naturellement des expériences que nous avons décrites, nous serons remarquer qu'outre la propriété que paroît avoir la gomme élastique blanche & pure de se dissoudre fort bien dans l'huile volatile de térébenthine, & la possibilité de se servir de cette dissolution pour enduire différens corps, & les reconvrir d'une pellicule élastique que l'huile volatile laisse en se réduisant en vapeur, c'est plus particulièrement sur le suc de l'*Hevea* que nous avons cru devoir porter toute notre attention. Dans le produit des deux envois que nous avons eu occasion d'examiner, la plus grande partie de la gomme ou plutôt du gluten élastique, s'en étoit séparé sous forme solide pendant le voyage, & il n'en restoit pas le trentième dans la liqueur; cette portion de gluten élastique encore dissous, peut en être séparée soit lentement par l'exposition à l'air, soit un peu plus vite par la chaleur réunie à l'action de l'air, soit enfin rapidement par l'addition des acides; mais il étoit plus important de trouver des moyens de maintenir la gomme élastique toute entière en dissolution, & de l'empêcher de se précipiter; il falloit en même-temps que ce moyen n'altérât pas la matière élastique, & permit de la retrouver & de l'obtenir à part lorsqu'on le désireroit. Sans doute pour réussir dans l'exécution de cette idée, il seroit utile d'examiner dans son pays natal le suc de l'*Hevea*, & de le mêler avec différens réactifs, car ce que nous avons pu faire à cet égard, n'a eu lieu que sur ce suc déjà privé de la plus grande partie de son gluten; de sorte qu'il restera de l'incertitude sur ce point, tant que l'expérience n'aura pas confirmé notre procédé sur le suc entier d'où il ne se fera rien encore précipiter. L'alcali fixe, soit potasse, soit soude, nous ayant paru augmenter très-sensiblement l'attraction & l'adhérence de la gomme élastique pour le suc, c'est ce sel que nous recommanderons de mêler au suc de l'*Hevea*, dans l'instant où il sera tiré du végétal. On peut espérer que cette addition empêchera la gomme de précipiter pendant le voyage, & que nous aurons ainsi le suc entier sans décomposition; alors il sera facile d'en séparer à volonté la gomme élastique en abfor-

bant l'alcali au moyen d'un acide foible, & de lui donner à l'aide de moules toutes les formes & toutes les épaisseurs que l'on désirera. Alors on ne risquera plus d'altérer ce produit dans sa nature, en le dissolvant & en le combinant avec des corps qui diminuent son élasticité, qui le rendent gros & poisseux, ou sec & cassant. Il seroit superflu de détailler ici tous les avantages qui résulteront de ce procédé, parce qu'ils seront facilement prévus par toutes les personnes qui emploient la gomme élastique & qui connoissent les arts multipliés auxquels elle est utile. Il ne nous reste qu'à donner aux naturalistes, aux voyageurs & aux cultivateurs de nos colonies d'Amérique & d'Afrique, connoissance du procédé que nous proposons; leur zèle & leurs lumières nous répondant qu'ils voudront bien la répéter sur le suc de l'*Hevea* au moment même qu'il sera tiré, & l'envoyer en France avec cette addition dans des bouteilles bien bouchées, en joignant à leur envoi la note de la quantité de ce suc, une légère description de ses propriétés, de sa pesanteur spécifique, de sa saveur, de son odeur avant le mélange d'alcali, ainsi que la date de son extraction. La même expérience devra être faite sur le suc des diverses espèces du genre de l'*Hevea*, & sur-tout de l'*Hevea caoutchouc* & de l'*Hevea guianensis*, ainsi que sur ceux du *Jatropha elastica*, du *Eccecoria peltata*, du *Stylos indica*, & de tous les autres végétaux connus ou inconnus des botanistes, mais d'où l'on fait que l'on peut obtenir un suc analogue au véritable caoutchouc.

Je joindrai à ces détails, un mémoire sur les moyens de faire des instrumens de gomme élastique avec les bouteilles qui nous viennent du Brésil, lu à l'académie de Dijon, dans une de ses séances publiques, le 28 août 1791, par M. Grosselet (Virly).

Le caoutchouc ou gomme élastique est une substance qui, depuis qu'elle est connue, a attiré l'attention des savans. Son élasticité singulière, sa flexibilité, le peu d'altération qu'elle éprouve de la plupart des corps, l'ont fait regarder comme précieuse pour une infinité d'usages, sur-tout dans l'art de la chirurgie; mais jusqu'à présent il a été impossible aux artistes de se procurer des instrumens de cette matière, parce que presque tout le caoutchouc qu'on a en Europe, nous vient du Brésil façonné en bouteilles, oiseau & autres figures qui en rendent l'usage très-circonscrit. On fait qu'elles sont faites dans le pays par le moyen de moules avec le suc d'un arbre de la famille des euphorbes (*Hevea caoutchouc*, Lin.) On l'en tire par incision, & il se coagule comme les résines. Il seroit aisé, si on l'avoit ici dans l'état liquide, de lui donner toutes les formes sous lesquelles il pourroit nous être utile; mais les communications avec le Brésil sont très-difficiles pour presque toute l'Europe.

& la nécessité de traverser la ligne pour le transporter dans nos pays, est encore un obstacle à ce que ce suc nous parvienne en état d'être approprié à nos usages : en effet, il se décompose par la chaleur à-peu-près comme le lait ; il exhale alors une fétidité extrême, & n'est plus doué des mêmes propriétés. M. le chevalier Banks, président de la société royale de Londres, si connu par le voyage que son amour pour les sciences lui a fait entreprendre autour du monde, m'a dit en avoir eu une bouteille non altérée, mais qui, peu après, s'étoit décomposée ; depuis il n'a pas pu s'en procurer de Lisbonne, quoiqu'il ait offert jusqu'à la valeur de cinquante louis-d'or pour en avoir une seconde.

La plupart des savans à qui on en a envoyé, soit de Cayenne, soit de l'île-de-France (où on a aussi reconnu l'arbre qui produit ce suc), ne l'ont reçu que décomposé. J'en ai moi-même eu quelque temps une demi-bouteille en cet état : elle m'avoit été donnée par M. d'Arcet, à qui on en avoit envoyé de l'île-de-France. Elle a passé quelques hivers dans une chambre non échauffée, mais après les froids rigoureux de 1788 à 1789, je trouvai la bouteille cassée. Je crois utile de consigner cette observation, parce qu'elle n'aura probablement pas encore été faite. Je ne peux indiquer ni à quel degré de température cette liqueur décomposée passe à l'état solide, ni quelle cristallisation elle affecte ; parce que je ne l'ai rentrée dans le lieu où elle étoit, que lorsque la température de l'atmosphère étoit très-adoücée.

On voit la difficulté d'avoir dans nos pays ce suc non altéré ; l'éloignement des lieux où l'arbre croît, la nécessité d'y avoir des commissionnaires pour faire exécuter ce dont on auroit besoin, le temps immense qu'il faudroit attendre pour recevoir ses commandes ; tout a fait desirer aux savans & aux artistes qu'on pût employer ici les bouteilles de caoutchouc que l'on a en abondance, & en faire les divers ouvrages dont on peut avoir besoin. Plusieurs personnes s'en sont occupées, mais il n'est pas à ma connoissance qu'aucune ait encore réussi.

On avoit reconnu d'abord que l'on ne pouvoit pas employer la liquéfaction par le feu ; le caoutchouc s'y fond bien comme les résines ; mais en refroidissant il reste liquide & collant. L'alcool ou esprit-de-vin dissolvait des résines n'agissoit pas sur lui, & il n'étoit pas dissous dans l'eau comme les gommes : on a donc essayé sa dissolution dans les huiles rendues siccatives, & on a vu qu'à l'aide de la chaleur le caoutchouc s'y dissolvait, & formoit un très-bon vernis, souple, imperméable à l'air & à l'eau, résistant assez long-temps aux acides : MM. Charles & Robert en ont enduit leurs ballons. Un artiste ingénieux, M. Bernard, & depuis les frères Durand, en ont fait divers instrumens

utiles en chirurgie. On emploie beaucoup de ses sondes qui sont connues sous le nom de sondes de gomme élastique ; elles sont flexibles avec assez de ressort, mais elles ne sont qu'un enduit sur raftetas d'une dissolution de gomme élastique dans une huile siccatif, qui après quelque temps d'usage se gerce : l'enduit en tombe par écailles, & elles sont hors de service ; elles n'ont pas la propriété de s'allonger & de reprendre les mêmes dimensions comme un tube de caoutchouc : peut-être est-il des cas où par cette raison même, ces instrumens peuvent être préférables à ceux qui seroient de gomme élastique pure ; mais enfin ils n'en sont pas.

Macquer a fait des recherches sur l'objet dont nous nous occupons, & il a reconnu, je crois le premier, que l'éther dissolvait le caoutchouc sans le dénaturer ; il a indigné de l'étendre couche par couche, & de faire évaporer ; ce moyen étoit trop long & trop dispendieux pour être d'un grand usage ; d'ailleurs, le fait même de la dissolution étoit contesté par plusieurs savans qui n'avoient pas osé à répéter les expériences de Macquer sur lesquelles aujourd'hui il n'y a plus le moindre doute, quoiqu'on n'ait pas encore déterminé d'où provenoit la différence des résultats de ceux qui s'en étoient occupés. Un fait connu peut mettre fin la voie ; on en doit la publication à M. Cavallo. L'éther qui, avant d'être lavé gonfle seulement le caoutchouc, le dissout très-bien après avoir été lavé à grande eau. Il perd nécessairement dans cette opération l'acide dont souvent on trouve des indices, & il s'y sature d'eau. Quoi qu'il en soit, il est facile aujourd'hui d'avoir par ce procédé une dissolution qui, après l'évaporation du dissolvant, est de la gomme élastique pure : ce moyen possible est encore presque impraticable, est très-dispendieux par la perte de l'éther qui s'évapore & de celui qui est pris par l'eau. Il est aussi très-incommode de manier la dissolution concentrée de caoutchouc, parce qu'elle s'attache à tout, & que l'air s'incarcère facilement dans les pellicules de gomme élastique qui se reforment par l'évaporation de l'éther.

Plusieurs huiles volatiles, telles que celles de térébenthine & de lavande, attaquent le caoutchouc, même à froid : mais en employant avec elles les moyens ci-dessus détaillés, on réussiroit encore moins que par l'éther à obtenir de la gomme élastique pure, & en former des instrumens : aussi M. Fourcroy, dans un mémoire lu en décembre 1790 à la société royale d'agriculture, où il repasse les faits connus à l'égard du caoutchouc, & ajoute plusieurs expériences intéressantes, forme-t-il des vœux & donne-t-il des vues pour que le suc de caoutchouc nous parvienne sans altération. Le désir d'un savant aussi recommandable, & le peu de probabilité de voir ses souhaits exaucés, m'ont

E c c c c 2

fait reprendre quelques idées que j'avois sur ce sujet, & j'ai réussi à faire avec des bouteilles de gomme élastique des tubes qui sont sous vos yeux. Mon travail est très-imparfait; mais certain que mon idée connue acquerra plutôt entre les mains des artistes la perfection dont elle est susceptible, je ne retarderai pas, par amour-propre, la connoissance d'un procédé qui peut être utile dans beaucoup d'arts.

Voici la marche que j'ai suivie & les moyens que j'ai employés. Il sera facile d'en substituer de meilleurs: ceux dont je vais rendre compte auront toujours l'avantage d'épargner quelques tentatives inutiles à ceux qui voudront s'en occuper.

Il m'a paru dès mes premiers essais, que c'étoit passer le but & se donner une peine inutile que de chercher à dissoudre complètement la gomme élastique toute formée pour la reformer ensuite. J'ai pensé qu'il seroit plus simple de chercher pour ainsi-dire à la souder, & à n'agir sur elle qu'autant qu'il seroit nécessaire pour que ses parties ramollies pussent être réunies. L'expérience m'a fait reconnaître qu'une forte pression, commencée sur deux morceaux de caoutchouc amenés à cet état de mollesse, & continuée jusqu'à siccité entière, leur faisoit contracter une adhérence telle que, le morceau tiré jusqu'à rupture, se cassoit souvent à côté des parties réunies.

L'éther m'a d'abord servi à faire des tubes; le moyen qui m'a paru réussir le mieux est de découper circulairement une bouteille en une spirale de quelques lignes de largeur. Il est facile de découper une bouteille de manière à n'en former qu'une lanière, & ce sont des soudures évitées.

On plonge toute la lanière dans l'éther, jusqu'à ce qu'elle soit gonflée suffisamment; ce qui arrive plus ou moins promptement, suivant la qualité de l'éther sulfureux que l'on emploie. Une demi-heure suffit souvent; mais j'ai déjà observé qu'il y a une grande différence dans la manière dont agissent les divers éthers, & dont la cause n'a pas, à ma connoissance, encore été déterminée.

On retire la lanière, on prend une des extrémités qu'on tourne d'abord sur elle-même autour du bas du tube en la pressant; puis on continue de la tourner en spirale le long du moule, ayant soin de rabattre & de comprimer avec la main chaque bord l'un contre l'autre, de sorte qu'il n'y ait aucun intervalle, & que tous les bords joignent exactement: on serre le tout avec une tresse d'un pouce de large, qu'on a soin de tourner dans le même sens que l'a été la lanière de caoutchouc. On ficelle par-dessus la tresse, en sorte que chaque révolution joignant l'autre, on donne à toutes les parties une pression égale: on laisse sécher, & le tube est fait.

On ôte le ruban avec précaution, pour ne pas laisser l'épiderme du tube dans les vides de la tresse dont le caoutchouc prend l'empreinte. Je conseille de mettre d'abord un ruban, parce que, sur-tout dans les tubes minces, on courroit risque de couper le caoutchouc avec la ficelle appliquée directement.

Il est aisé de retirer le tube de gomme élastique formé sur un moule solide, & d'une pièce; si ce moule est un peu conique, on le fait glisser par le côté le moins fort; au surplus, on en vient facilement à bout en le faisant tremper dans l'eau chaude, il se ramollit à la chaleur & se distend; sans cette précaution, il seroit quelquefois difficile de le retirer étant sec, parce qu'ayant été appliqué sur le tube lorsqu'il avoit un volume augmenté par l'interposition de l'éther, les parties du caoutchouc se sont rapprochées par l'évaporation du corps interposé.

On voit la grande aisance de ces deux corps par le temps qu'y reste l'odeur, malgré la grande volatilité de l'éther, & quoique la sécheresse apparente du tube semble indiquer qu'il n'y en reste plus; cependant après un certain temps l'odeur disparoit entièrement. Un des tubes qui sont sous vos yeux, & qui a été fait avec l'éther de la manière que je viens de décrire, ne conserve aucune trace de l'odeur du dissolvant. On sent qu'il est facile de faire des tubes aussi minces & aussi épais que l'on juge à propos.

Quoique le procédé que je viens de décrire soit peu dispendieux, j'ai cherché à substituer d'autres dissolvans à l'éther, parce qu'on n'en trouve pas par-tout, & qu'il demande des soins pour être conservé. J'ai employé avec quelque succès les huiles volatiles de lavande & de térébenthine. Toutes deux gonflent promptement le caoutchouc, & ne font pas d'un grand prix. L'odeur désagréable de la térébenthine est peut-être moins incommode à la longue que celle de la lavande: celle-ci est plus chère, mais la différence n'est pas aussi grande qu'elle paroît d'abord; car on pourroit tirer parti de toute l'huile volatile de lavande employée, si on en avoit le débit: en plongeant dans l'alcool le caoutchouc préparé avec la lavande, l'alcool s'en charge, & on a de très-bonne eau-de-vie de lavande, comme on en seroit directement en versant de l'essence de lavande dans de l'esprit-de-vin. L'immeasurable dans ce liquide est même un moyen de hâter la dessiccation des instrumens de caoutchouc préparé par les huiles volatiles. J'ai fait des tubes avec celles de térébenthine, & de lavande: toutes deux sont beaucoup plus lentes à s'évaporer que l'éther: la térébenthine sur-tout m'a paru laisser toujours quelque chose de gluant, & je ne fais pas encore si on peut parvenir à en dissiper l'odeur: mais il est un dissolvant qui n'a pas cet inconvénient; il est moins cher & à la portée de tout le monde:

ce dissolvant c'est l'eau. Je conçois qu'il peut paroître étrange de donner comme dissolvant du caoutchouc, l'eau à laquelle on le regarde comme imperméable; j'ai résisté moi-même à cette idée; mais réfléchissant sur ce que l'éther saturé d'eau dissout mieux la gomme élastique, & sur ce que le caoutchouc plongé dans l'eau chaude, prenoit un peu de transparence sur ses bords, je présurai que cet effet n'étoit pas dû seulement à la dilatation du volume par la chaleur: je pensai qu'à cette température il pouvoit bien y avoir une affinité, & qu'une ébullition long-tems continuée, me donneroit un résultat plus sensible.

Je n'ai pas été trompé dans mon attente, & un de ces tubes a été préparé sans autre dissolvant que l'eau & la chaleur combinées. J'ai procédé de même qu'avec l'éther: le caoutchouc ne se gonfle que très-peu dans l'eau bouillante, il y devient blanchâtre, mais il reprend sa couleur en s'échant à l'air & à la lumière; il suffit pour l'employer qu'il ait été un quart-d'heure dans l'eau bouillante, alors ses bords sont un peu diaphanes: on le tourne en spirale autour du moule de la manière que nous avons décrite, on le replonge souvent dans l'eau bouillante pendant qu'on est occupé à l'arranger, afin que les bords soient disposés à adhérer ensemble. Quand la tour est ficelée, on la tient plusieurs heures dans l'eau bouillante; puis on la fait sécher toujours ficelée. Si on veut être plus assuré qu'il n'y ait aucune solution de continuité, on peut doubler la spirale; il faut alors éviter de mettre l'une contre l'autre les surfaces extérieures des lanières, parce que cette surface est la partie du caoutchouc qui résiste le plus aux dissolvans. Cette précaution seroit moins utile avec l'éther, à cause de sa plus grande affinité.

On pourroit craindre que l'action de l'eau sur le caoutchouc ne rendit nuls les avantages que l'on a lieu d'en attendre; mais on sera rassuré en pensant que les affinités diffèrent suivant les températures; que ce n'est qu'à une température très-élevée que l'eau exerce la sienne sur le caoutchouc d'une manière sensible: je puis assurer qu'à 120 degrés de Réaumur, cette affinité n'est pas telle que l'eau puisse donner la forme liquide au caoutchouc, & il ne paroît pas que nous ayons rien à redouter dans l'usage d'une combinaison entre ces deux corps, qui est à la vérité une vraie dissolution, mais qui ne s'exerce sensiblement qu'à une haute température.

Il est donc aujourd'hui facile de faire en caoutchouc tout ce qu'il peut être avantageux d'avoir, une substance flexible, souple, élastique, imperméable à l'eau, à la température de notre atmosphère, résistant aux acides ainsi qu'à la plupart des dissolvans. Quant à la durée, peu de substances présenteroient plus d'avantage, car

on ne seroit que resoudre la partie endommagée. On peut en recouvrir des tissus: il faut seulement qu'ils soient de nature à ne pas être altérés lorsque la préparation, soit par l'éther, soit par l'eau bouillante, car ces deux agens sont à ce qu'il me semble ceux qui méritent la préférence. Les artistes trouveront souvent de l'avantage à employer l'éther, parce qu'il demande moins de temps, & que l'on peut le même jour avoir le tube dont on a besoin: la dépense de l'éther sera très-peu de chose, puisqu'il ne faut que disposer le caoutchouc à adhérer, & le caoutchouc une fois dissout peut être conservé dans un flacon bien fermé: on diminuera encore la dépense de l'éther, si au lieu de laver à grande eau, on y ajoute seulement la quantité dont il peut se saturer.

CAPILLAIRE BLANC. (*Pharmac.*) *Poly-podium rhaticum, Filicula fontana major, flos asanthum album, filicis folio.* C. B. 318. Cette filicée commune dans le pays des Grisons, est rangée au nombre des capillaires. Elle entre dans l'electuaire de Effilio.

(M. WILLETET.)

CAPILLAIRE COMMUN. (*Pharmac.*) *Aplonium asanthum nigrum. Adiantum nigrum.* Cette espèce est commune dans les départemens des Vosges & de la Meurthe. Elle entre dans le sirop de guimauve de Fernel.

(M. WILLETET.)

CAPILLAIRE DE CANADA. (*Pharmac.*) *Adiantum pedatum, Adiantum Canadense, Cod. Par. V.* Ce beau capillaire se trouve non-seulement au Canada, mais bien encore au Japon & dans la Virginie. Il entre dans la décoction pectorale & le sirop de Vêlat composé.

(M. WILLETET.)

CAPILLAIRE DE MONTPELLIER. (*Pharmac.*) *Adiantum capillus Veneris, Capillus Veneris, Triller p.* Pierre Formis a fait imprimer à Montpellier un gros volume uniquement sur ce capillaire, & cela en 1644, dans lequel il relève si tort les vertus de cette plante, qu'il semble en faire une vraie panacée, un véritable remède universel.

En général, les capillaires sont d'un grand usage, non-seulement dans les maladies chroniques, mais bien encore dans les aigües; ils sont placés parmi les tempérans, les béchiques & les aperitifs; par leur douce attrition, ils resserrent les fibres des parties, incitent les fluides épais, aident à expectorer la pituite visqueuse qui s'opprime dans la poitrine, guérissent la toux opiniâtre, l'asthme, la difficulté de respirer, détachent les humeurs épaisses attachées dans les vésicules, qui produisent des obstructions. Ils sont utiles dans la jaun-

milie, lèvent les embarras du foie, du mésentère, font couler les règles des femmes : l'on en prend l'infusion ou la décoction.

Tout le monde connoît l'usage du sirop capillaire. Quelques auteurs prescrivent l'eau distillée & la conserve de capillaire.

Cette plante entre dans le sirop composé du dispensaire d'Ausbourg & de Brandebourg, dans ceux de l'antius, de jujubes, de tussilage composé ou antiasthmatique de Charas, de chicorce composée, le chalibé apéritif purgatif, l'anti-phrénétique du même auteur, le looch de poumons de renard & l'électuaire lenitif.

M. Thunberg fait mention dans une dissertation qu'il a publiée sur la médecine des Africains, que les habitants de cette chaude contrée font un usage fréquent d'un capillaire qui est nommé par Linnéus *Adiantum asiaticum* avec beaucoup de succès contre diverses maladies. Le même auteur a rencontré cette plante au Japon.

(M. WILLEMET.)

CAPRIER. (*Pharm.*) *Capparis spinosa*. C'est un arbrisseau épineux, sarmenteux, rampant, branchu, magnifique, lorsqu'il est en fleurs. Le caprier est cultivé dans plusieurs jardins botaniques de l'Europe. Il paroît être un arbrisseau exotique des pays chauds, puisque les gelées trop fortes le font périr en France. Il croît spontanément dans le Levant, en Arabie, en Afrique, dans la Lybie, en Espagne, en Italie, aux environs de Kistat, en Sibérie, dans la Carniole, dans l'Europe méridionale, en France, principalement dans le Languedoc, en Provence, aux environs de Toulon & d'Hières. L'on recueille beaucoup de capres dans la Pouille. Le caprier abonde sur-tout dans les provinces de Murcie, de Valence & d'Andalousie.

Les capres fournissent à nos mets un assaisonnement très-agréable par l'acrimonie douce qu'elles excitent ; elles sollicitent par-là l'appétit, facilitent la digestion, augmentent le mouvement péristaltique ; c'est un puissant stimulant qui débilitue le foie & la rate ; les capres sont aussi antiscorbutiques, fébrifuges, toniques, antispasmodiques.

Ses succédanés sont les boutons de fouci d'eau ; (*Calthapaloftris*) les jeunes pousses du genêt commun ; (*Spartium scoparium*) ; les tendres boutons des fleurs de sureau (*sambucus nigra*). Les Allemands substituent aujourd'hui les germes de capucine aux capres dans leurs saucés. Les habitants d'Astacan préparent leurs capres avec le *tygophyllum fabago*, qui est le *Capparis fabago*, que nous pouvons nommer caprier & feuilles de pourpier. Tous ces succédanés se préparent avec le vinaigre.

* L'écorce du caprier offre un médicament apéritif, très-tenommé, propre à exciter les mois aux femmes ; à dissoudre les tumeurs, à purifier

les ulcères, à dépuré les humeurs viciées, à dissiper les vapeurs, les obstructions, les douleurs de dents. Elle est aussi détergative, antiaithrétique, diurétique ; si l'on en fait usage conjointement avec l'eau des forgerons, elle guérit les maladies de la rate. Il faut que cette écorce soit soigneusement détachée de la racine, qu'elle n'en contienne aucune partie ligneuse, qu'elle soit charnue, épaisse, coriace, blanchâtre ou grise, roulée, marquée de quelques lignes & de rides, de la grosseur d'une plume d'oie, ayant une saveur un peu amère, acerbe, âcre, aromatique. Elle paroît être douée d'un principe astringent, puisque la solution de la couperose verte noircit sa décoction. L'on obtient un extrait salin, amer, roux, avec son infusion aqueuse, qui est d'une couleur citrine foncée, légèrement âcre ; la dose de l'écorce de la racine de caprier en poudre, est d'un gros. En substance, c'est une once, en décoction ou en infusion dans de l'eau ou du vin. Dans la médecine vétérinaire, on prescrit aux animaux cette écorce, à la dose de trois onces, infusée dans du vinaigre, & demi-once en poudre.

La racine de caprier fait partie des cinq apéritives mineures. Il faut la choisir blanche, sans être cariée. Elle est longue, sarmenteuse, nombreuse, s'emploie quelquefois dans les tisanes apéritives. Cette racine a donné le nom aux trochisques de capres : elle entre dans la composition du sirop hydragogue de Charas, dans l'huile de scorpion de Meisue, dans les espèces pour la décoction apéritive, dans la poudre de marrube de Nicolas d'Alexandrie. L'apharmacopée de Copenhague donne la manière de préparer un extrait avec la racine de caprier. L'on prépare encore une huile de caprier.

Sa semence cuite dans du vinaigre apaise les maux de dents.

Le suc des feuilles, des fleurs & des fruits étoit estimé des anciens, pour guérir les maladies des oreilles.

Les feuilles pilées passent pour ôter les inflammations, & pour mûrir les abcès.

A Saint-Domingue, le caprier est un excellent pâturage pour les bœufs. Il nourrit un puceron qui lui est particulier, & il fait partie des végétaux de la liste des médicaments simples de la pharmacopée de Paris.

CAPSULES. Ce sont des vases de nature & de forme différentes ; leur destination la plus ordinaire est de contenir des liquides dont on veut faire évaporer une partie, au moyen de la chaleur.

Leur grandeur est toujours subordonnée aux masses de matières sur lesquelles on opère ; de-là il peut y avoir des capsules de tous les étages ; ceci n'est point une simple spéculation. Il existe réellement de ces vases, depuis la contenance d'une

once jusqu'à celle de plusieurs quintaux de livres. Celles qui servent aux essais des chimistes, & celles qui sont en usage dans les travaux en grand, forment ces deux extrêmes, il en est ici comme pour les travaux métallurgiques, où l'on voit des creusets destinés à contenir quelques grains seulement de ces matières, & d'autres dans lesquels plusieurs livres sont fondus.

La matière des capsules mérite une grande attention. C'est d'elle que dépend leur bonté. La plupart du tems, elles ne sont point faites d'une matière simple; celles de terre particulièrement sont formées de plusieurs substances; mais c'est leur division extrême, leur proportion & leur alliage intime qui en font tout le mérite. L'alumine & la silice sont la base de ces vaisseaux; mais nous n'avons point de données exactes sur la proportion la plus convenable de ces matières. Les personnes qui sont chargées de ce genre de travail, ayant point mis assez de précision dans leurs opérations, & ayant toujours suivi une routine aveugle, nous n'avons pu recueillir que des connoissances vagues. Cela fait voir la nécessité d'un homme instruit à la tête des grands établissemens publics, qui chercheront la nature & les proportions des matières qui y sont employées. Il est vrai qu'il étoit plus simple de se servir des matériaux tout disposés par la nature dans la fabrication des vases nécessaires à la vie, & dans plusieurs départemens de la république, ces compositions naturelles existent. Mais il est d'autres lieux où la nature n'offre point ces combinaisons, ou ne les présente pas dans des proportions convenables. On pourroit alors les former de toutes pièces, en mêlant des terres simples ou peu altérées, & composer par ce moyen une matière susceptible de servir à la fabrication de bons vases.

Parmi les capsules, celles de porcelaine méritent la préférence; elles sont cependant attaquées par les acides & les alcalis, inconvénient assez grave. Celles de verre ne sont que légèrement attaquées par ces matières; mais elles sont extrêmement fragiles, & demandent un grand menagement dans l'administration de la chaleur. Elles ont un grand défaut, c'est d'avoir 4 protubérances à leur fond, qui augmente encore leur fragilité.

La forme des capsules est aussi variée que leur nature. Il y en a qui sont des sections de cylindre creux & fermé par un bout. Cette forme est la plus mauvaise pour l'évaporation aidée par la chaleur artificielle. Aussi ne sont-elles communément destinées qu'aux évaporations lentes, dans lesquelles on a dessein de réunir une grande quantité de liqueur, pour la faire évaporer doucement & sans agitation. Il y a de ces capsules qui tiennent plus de 50 pintes.

D'autres capsules sont des sections de sphère plus ou moins grandes: celles-ci sont plus avantageuses pour l'évaporation, en raison de leur

grande ouverture qui permet un contact étendu entre l'air & la liqueur.

Les meilleures capsules de verre sont les culs de cornues & de matras cassés, parce qu'elles n'ont pas de pontils, & qu'elles ne sont pas si sujettes à casser par la chaleur; mais il est nécessaire d'en fonder les bords à la lampe de l'émailleur; sans cette précaution, elles se fendent d'un bout à l'autre, par l'effet de la chaleur ou par un léger effort. M. Lavoisier a indiqué un très-bon moyen de couper les cornues & les ballons cassés, pour en faire des capsules; il se sert d'un anneau de fer, figure 21, classe V, foudés à une tige de fer A B, garni d'un manche de bois. On voit figure 21, même classe, cet instrument portant un matras; on fait rongir l'anneau de fer, & on pose dessus la corne ou le matras que l'on veut couper. Quand on voit que le verre est suffisamment chaud, on jette dessus quelques gouttes d'eau, & il se casse ordinairement juste dans l'endroit où le fer a touché.

On fait depuis quelque tems des capsules de cuivre doublées en or, qui sont d'une grande utilité dans beaucoup d'opérations, parce qu'elles ne sont altérées que par peu de matières, & qu'elles ne cassent point. On en fait aussi en platine, qui réunissent à-peu-près les mêmes propriétés que celles d'or. Au reste, tous les métaux peuvent servir au même usage. Il s'agit seulement de discerner les matières qui ont de l'action sur elles.

Leur forme est celle d'une section de sphère. Les tetrines de grès sont quelquefois employées comme des capsules évaporatoires; mais leur pâte grossière ne permet pas de s'en servir à des opérations délicates, parce qu'il s'y introduit toujours une portion de la matière. Elles ne peuvent donc servir qu'à des travaux grossiers & dans lesquels on ne cherche point de rapports.

Les cornues, les phioles à médecines sont souvent employées aux mêmes usages que les capsules; mais nous reviendrons sur ces vases & sur leur emploi à leur article.

La figure 22, classe V, représente une capsule de verre sphérique.

La figure 23, classe V, représente une capsule de verre cylindrique.

La figure 18, classe V, représente une capsule ou jatte de porcelaine.

La figure 19, classe V, autre jatte de porcelaine pour le même usage.

Nous n'avons point donné de figure des capsules de métal, parce qu'elle est la même que celle des capsules de verre sphérique. La capsule de grès sera décrite & figurée ailleurs. (Voyez TETRINES).

(M. VAUQUELIN.)

CAPUCINE GRANDE ou CRESSON D'INDE. (*Pharm.*) *Tropaeolum majus*. *Nasturtium Indicum majus*. C. B. 306. C'est une belle

plante originaire du Péron, où elle est vivace, qui a été transportée en Europe, en 1684. Elle est maintenant commune dans nos jardins où on la cultive pour sa beauté. Elle est antiscorbutique, résolutive, diurétiq. L'on s'en sert quelquefois contre la galle. Le suc de ses feuilles est fort salutaire contre la peste. On confit ses boutons de fleurs, & même ses jeunes fruits dans le vinaigre, pour s'en servir comme de capres. Ses fleurs servent à l'ornement & à la garniture des salades. Mademoiselle Linnéus a tiré ses fleurs des éclairs dans un temps chaud, serin, vers la fin du jour.

Le célèbre Cartheuser a fait imprimer en 1755 un opuscule sur la capucine & ses vertus. La petite capucine, (*tropaeolum minus*) possède les mêmes propriétés.

L'une & l'autre sont placées dans l'énumération des médicamens simples du dispensaire de Paris.

(Nl. WILLEMET.)

« **CAPUT MORTUUM.** Nom latin que les anciens chimistes ont donné aux résidus fixes & épuisés qui restent dans les cornues après les distillations : ce mot signifie en français *tête morte*. On s'en sert encore, mais plus communément en latin qu'en français, pour désigner ces mêmes résidus ».

« Comme ces résidus sont de nature très-différente, suivant les substances qui ont été distillées, & suivant le degré de feu qu'elles ont éprouvé, il vaut mieux les spécifier d'une manière plus particulière, en leur donnant la qualification qui leur convient ; & dire, par exemple, *résidu terreux, résidu charbonneux, résidu féculin*, &c. Cela est plus exact & plus clair, & c'est aussi le parti que prennent les chimistes modernes ».

Telle est la manière dont Macquer définit dans son dictionnaire de chimie l'expression singulière de *caput mortuum*, ou tête morte, dont il n'annonce pas assez la singulière signification, & qu'il propose avec raison de remplacer par celle de résidu de telle ou de telle nature. Mais il est nécessaire d'ajouter ici quelques réflexions qui ont échappé à Macquer & que peut-être il a négligées avec invention, son dictionnaire n'ayant point été destiné à donner des connoissances exactes sur l'histoire de la science & les différentes époques de la chimie. Les mots singuliers de *caput mortuum* qu'on a quelquefois traduits en français par ceux de *tête morte*, mais qu'on a beaucoup plus employés dans leur idiome latin en les francisant, tiennent essentiellement à cette époque obscure de la chimie, où l'on empruntoit toutes les comparaisons les plus erronées, où l'on avoit recours aux sympathies & aux signatures qui déshonoroient également les autres sciences physiques, & où l'on employoit à dessin des expressions mystiques, figu-

tées, emblématiques, pour voiler des opérations simples par elles-mêmes, ou pour donner à de fausses théories quelque apparence scientifique. Dans un temps où les chimistes s'étoient attribué la prérogative de créer des élémens nouveaux, d'admettre des principes chimiques, en s'écartant de la doctrine des écoles où les quatre élémens d'Aristote sembloient irrévocablement fixés, dans une époque où l'homme étoit un petit monde, un *microcosme*, où tous les phénomènes s'accumuloient comme dans le grand, où les viscéres & les membres sympathisoient avec les planètes, il étoit sans doute permis aux philosophes par le feu de comparer les produits quelconques de leurs opérations avec les parties du corps humain ; tout ce qui se volatilisait dans les distillations, étoit un esprit en général, & lorsque la matière mise en distillation avoit perdu toute sa partie volatile, elle étoit comme un corps sans ame ; c'est pour ainsi dire une tête humaine d'où les esprits s'étoient envolés à l'instant de la mort. De là l'expression de *caput mortuum*. C'est assez dire qu'on ne peut plus rappeler ces mots sans rappeler en même-temps les erreurs de l'ancienne chimie, & pour ne point revenir à ces temps de mystère & d'obscurité, les chimistes ont renoncé, il y a déjà long-temps, à ces expressions devenues ridicules d'après les progrès que la science ne cesso de faire depuis un demi-siècle.

Dans la première édition de l'encyclopédie, Vaucler avoit déjà fait voir l'absurdité des mots *caput mortuum*. Je crois devoir finir cet article en insérant ici celui de ce célèbre chimiste, tel qu'il l'a donné dans le premier dictionnaire encyclopédique.

Les chimistes ont désigné par l'expression de *caput mortuum*, le produit le plus fixe des analyses ordinaires, faites par le moyen de la distillation, ou la partie du corps analysé qui a été épuisée par le feu, (poussé au plus haut degré, auquel ils avoient coutume de l'élever dans les distillations), & qui restent encore, après l'opération, au fond du vaisseau dans lequel les matières à distiller ont été exposées au feu.

Le *caput mortuum* étoit un des principes prétendus des anciens chimistes, ou plutôt un des cinq produits des anciennes analyses chimiques. Ces cinq produits étoient l'esprit ou mercure, le phlegme, l'huile ou soufre, le sel & la terre dammée, *caput mortuum*. Voyez PRINCIPES.

C'est avec raison qu'on commence à bannir l'expression *caput mortuum* du langage chimique, & de lui substituer le mot générique & indéterminé de *résidu*. La première dénomination est absolument fautive ; car on pourroit regarder sur la foi du nom, les matières qu'elle désigne, comme dépouillées de tout principe actif, comme indéterminables, ou ne donnant

rien

prise à aucun agent naturel; en un mot, comme une pure terre exactement simple, & par conséquent connu autant qu'il est possible par l'art, ou du moins peu digne d'un examen ultérieur; & c'est-là l'idée que plusieurs chimistes s'en étoient faite.

Mais ces matières ne sont rien moins que simples & inaltérables; elles contiennent le plus souvent des substances salines, soit neutres, soit alcalines, qu'on en sépare très-facilement. Voyez LIXIVIATION. Les résidus charbonneux contiennent au moins du *phlogistique*, qui en est très-séparable aussi. Voyez INCINERATION & CHARBON.

D'ailleurs, l'examen ultérieur du résidu des distillations que j'appellerai *analytique*, (de celles qu'on pousse à grand feu, car ce n'est que de celles-là dont il s'agit dans cet article), entre nécessairement dans la suite des opérations d'un procédé régulier. Il est même telle de ces opérations qu'on n'exécute que pour ce produit, pour le résidu; comme si on distillait, par exemple, une huile minérale avec de l'alcali fixe, ou un savon de Starke préparé avec une huile essentielle, dans laquelle on soupçonne l'acide vitriolique ou le marin, pour vérifier ce soupçon.

La nouvelle analyse ou l'analyse par combinaisons, exige sans contredit cet examen; & c'est même, sans doute, la méthode de cette analyse étendue aux distillations des substances regardées comme *uniques* ou *homogènes*, comme celle d'une plante, d'une gomme, d'une graisse, &c. qui a réveillé l'attention sur l'abus de négliger les résidus de ces dernières opérations. Mais on sera bien plus fondé à n'en négliger aucune, & à généraliser la loi de les étudier avec soin, si on fait réflexion que la plupart des sucs des distillations analytiques ordinaires sont des composés ou des mélanges naturels qui portent en eux-mêmes des principes de réaction, qui n'ont besoin que d'être mis en jeu par le feu pour produire de nouvelles combinaisons; & que ce n'est qu'à la faveur de ces nouvelles combinaisons, dont on retrouve les produits dans les résidus, qu'on obtient les produits plus mobiles, les substances qui passent ou qui s'élèvent dans la distillation. Voyez L'ISTILLATION & ANALYSE VEGETALE, à l'article VEGETAL.

CHARACTERES. On a désigné par ce nom en chimie, les signes ou figures par lesquels on distinguait, soit les substances simples ou composées dont on se sert ou qu'on traite dans cette science, soit les opérations que l'on fait pour les diverses espèces d'analyses ou de synthèses, soit enfin les instruments, & jusqu'au temps qu'on emploie dans les expériences. On trouve les premières traces de ces caractères chimiques dans les plus anciens auteurs. On les

trouve tenté de croire qu'ils ont la même origine que les hiéroglyphes des Egyptiens, & que les figures des langues orientales, connues d'un très-petit nombre de ceux qui les parlent, & manifestement imaginées pour soustraire à la multitude les idées & les faits que ces signes représentent. Il n'est pas douteux que l'intention des caractères chimiques qui remontent à une très-haute antiquité, n'a eu pour objet que de cacher les expériences & les résultats aux curieux, & de couvrir les opérations de la chimie, du voile du mystère. Aussi est-ce dans les livres des alchimistes que les caractères ont été employés avec profusion, & qu'ils ont eu la tournure mystérieuse & emblématique qu'on retrouve dans les ouvrages de ces hommes. On imagine aisément, d'après ces premières observations, que les caractères chimiques doivent se ressentir des idées exagérées, mystiques & même folles, dont les alchimistes ont rempli & surchargé leurs livres, & dont la chimie s'est malheureusement ressentie si long-temps; par-tout ce sont des emblèmes, des analogies entre les arts, les vices, les vices, les objets physiques & moraux les plus disparates & les plus éloignés, des sympathies, des rapports qui n'existent que dans l'imagination exaltée de leurs inventeurs.

Lorsque la chimie épurée de ces premières folies a commencé d'être une science exacte, & a reculé son langage en reculant son raisonnement, on auroit pu espérer qu'elle auroit abandonné les caractères absurdes ou faux qui lui auroient servi jusque-là, puisqu'elle n'avoit plus de raison pour masquer son idiome & envelopper ses expériences, puisqu'elle vouloit au contraire être aussi claire & aussi exacte qu'elle avoit été autrefois obscure & vague. Cependant une routine ancienne a continué à être employée; au lieu de renoncer aux anciens caractères, on les a copiés dans tous les livres de chimie; & on s'en est servi sur-tout depuis le tiers de notre siècle pour exprimer les degrés d'attraction des différents corps les uns pour les autres, dans les tables d'affinités. Geoffroy, en exécutant la belle idée de ses tableaux d'affinités, n'a pas eu le courage d'abandonner les signes mystérieux & emblématiques dont on s'étoit servi jusque-là pour désigner les différents corps naturels. Bergman même, plus de quarante ans après Geoffroy, & trouvant la chimie entichée d'une foule de découvertes qui en requièrent la marche plus certaine & la théorie beaucoup plus claire & beaucoup plus exacte, au lieu de proposer une réforme dans les caractères chimiques, s'est servi des anciens, & en a imaginé plusieurs fondés sur les mêmes principes, ou pour mieux dire, aussi peu fondés en principes que les anciens. S'il n'étoit pas nécessaire de faire connaître tous les détails & toutes les époques de la science chimique

F I N

dans ce dictionnaire, j'aurais cru en dire assez sur cet objet, en traçant quelques lignes sur l'absurdité des opinions qui ont fait imaginer les caractères chimiques & qui les ont fait varier dans différens temps. Je me serois contenté après avoir fait connoître les idées folles qui ont dirigé les premiers chimistes dans la construction de ces caractères, de renvoyer aux gravures où ces caractères seroient représentés avec leur explication.

Mais l'usage qu'on a fait de ces figures, & le système nouveau qu'on a présenté il y a quelques années, sur cet objet, pour les remplacer par des signes qui fissent disparaître les erreurs anciennes, m'engagent à insérer ici les mémoires des citoyens Hassenfratz & Adet, publiés avec la nouvelle nomenclature en 1787.

PREMIER MÉMOIRE,

Sur de nouveaux caractères à employer en chimie. —
Par Hassenfratz & Adet.

Si depuis les découvertes des chimistes modernes, l'ancienne nomenclature de la chimie nous présentait souvent des erreurs au lieu de vérités; si elle se trouvoit trop circonscrite pour rendre les nouvelles idées que nous avions acquises; si, en un mot, elle exigeoit la réforme qu'y ont faite Guyton, Morveau, Lavoisier, Berthollet & Fourcroy; les caractères dont se sont servis les chimistes, n'étoient pas plus exempts de reproches que la nomenclature, & méritoient les corrections que nous prescrivait l'état actuel de nos connoissances. Les savans dont nous venons de parler, avoient senti dans leurs conférences, auxquelles ils nous avoient permis d'assister, combien il seroit essentiel de corriger les caractères; ils ont bien voulu nous abandonner ce travail, & nous éclairer de leurs lumières. Ce n'est qu'après avoir soumis à leur jugement ce que nous avoient fait sur les caractères, que nous avons osé présenter à l'académie le résultat de nos travaux.

En nous servant des caractères en chimie, nous ne devons pas nous proposer le même but que les anciens. Ceux-ci cherchoient tous les moyens de dérober leur connoissance aux yeux du vulgaire; nous devons faire au contraire tous nos efforts pour les répandre. Il doit en être des caractères chimiques, s'ils deviennent uniformes chez tous les chimistes, comme de l'écriture de quelques peuples, tels que les habitans de la Chine, du Tongking & du Japon. Quoique dans leur langage ils se servent de sons différens pour rendre leurs idées, ils ont cependant un signe commun pour les exprimer, de manière que la diversité de leur langage ne les empêche pas d'entendre ce qu'ils écrivent, & de se communiquer par ce moyen

les nouvelles combinaisons d'idées qui leur surviennent. Il doit en être de même que des caractères de l'Algèbre, qui, désignant les opérations de l'esprit, facilitent aux géomètres de tous les pays les moyens de s'entendre.

Cette considération suffit pour faire voir combien il est nécessaire d'avoir en chimie des caractères qui soient communs à tous les chimistes. Nous n'entrerons pas dans de plus longs détails pour le prouver, & nous nous contenterons de chercher de quelle manière doivent être faits les caractères chimiques pour pouvoir subvenir à tous les besoins de la science dans l'état où elle se trouve aujourd'hui.

On peut considérer la chimie comme une science qui nous apprend quel est dans un composé, le nombre, la nature, le rapport des substances regardées comme simples, & quelle est l'action réciproque qu'exercent les unes sur les autres les substances simples ou composées.

Il suit de-là que les caractères chimiques devroient exprimer le nombre, la nature, le rapport de quantité de substances simples qui forment un mixte pour leur réunion, & indiquer en même-temps de quelle manière ces diverses substances agissent les unes sur les autres; mais nous ne pouvons pas espérer de donner encore aux caractères chimiques ce dernier degré de perfection; nous n'avons pas assez de lumière sur l'action réciproque des différens corps, pour peindre les effets de cette action des corps à l'aide de nos caractères; d'après cela nous sommes obligés de nous borner à la solution du problème suivant : *Etant donné le nombre des substances simples connues, & en outre les rapports principaux qu'elles ont entr'elles, quelle sorte de caractères leur donnera-t-on, afin que combinés les uns avec les autres, ils puissent former des caractères composés qui indiquent le nombre & la nature des substances simples qui entreroient dans le mixte? & quel doit être l'arrangement des caractères simples qui forment le caractère composé, de manière que les chimistes puissent, à l'inspection du caractère d'un mixte, déterminer le rapport de quantité des substances simples qui le constituent?*

Avant d'indiquer la manière dont nous avoient résolu ce problème, nous croyons qu'il ne sera pas inutile de rappeler à l'académie les signes dont se sont servis les anciens chimistes, afin de lui faire voir de quel usage ils pouvoient être. Il paroît qu'on ignore dans quel temps les chimistes ont commencé à se servir des caractères. Les recherches que nous avons entreprises sur cet objet, se sont réduites à nous faire connoître d'après quelles vues les anciens avoient ordonné les signes des substances métalliques, dans la persuasion où ils étoient, que les corps célestes avoient une influence sensible sur tous les corps animés & inanimés du globe terrestre. Ils avoient distingué les métaux en métaux solaires ou colorés,

en métaux lunaires ou blancs. Les métaux de ces deux classes se subdivisoient ensuite en métaux parfaits, demi-parfaits & imparfaits. La perfection étoit exprimée par un cercle, *fig. 1*, (*caract. chimiques*) ; la demi-perfection, si nous pouvions nous servir de ce terme, par un demi-cercle, *figure 2*, & l'imperfection par une croix ou par un dard, *fig. 3*. Ainsi l'or qui étoit le métal solaire par excellence, étoit représenté par un cercle seul, *fig. 4*. Cette figure étoit commune aux métaux de la même classe, tels que le cuivre, *fig. 5*, le fer, *fig. 6*, & l'antimoine, *fig. 7* ; mais elle s'y trouvoit combinée avec le signe de l'imperfection, la croix ou le dard. L'argent qu'ils regardoient comme un métal lunaire, demi-parfait, étoit indiqué par un demi-cercle, *fig. 2* : l'étain, *fig. 8*, & le plomb, *fig. 9* avoient aussi le demi-cercle pour signe, comme appartenant à la même classe ; mais ils étoient distingués de l'argent, par la croix ou par le dard. Enfin, le mercure qui étoit un métal imparfait, tout à la fois solaire & lunaire, portoit les marques distinctives de ces deux classes, & étoit désigné par un cercle surmonté d'un demi-cercle auquel on ajoutoit une croix, *fig. 10*. C'est ordinaire que les anciens chimistes avoient mis dans leurs caractères, & qu'on remarqua avec plaisir, quoiqu'il soit dérivé purement d'idées alchimiques, fut bientôt oublié. A mesure que les chimistes découvrirent de nouvelles substances, ils leur assignèrent de nouveaux caractères, & ne consultèrent que leurs caprices ou que des loix qui émanoiént de leur hypothèse favorite. Mais en introduisant de nouveaux caractères déterminés d'après des vues différentes de celles des anciens chimistes, ils faisoient subsister ceux dont ces derniers avoient fait usage, de manière qu'il régna dans les caractères chimiques une confusion & une incohérence dont on peut avoir l'idée, en voyant les tables des caractères qu'on a employés depuis Geoffroy jusqu'à Berzélius, qui s'en sont servis pour leurs tables d'affinités. Ce seroit fatiguer l'Académie de détails superflus, que de lui présenter les conséquences qu'on remarque dans les différentes tables du caractères. Ainsi nous nous bornerons à faire voir celles qui sont répandues dans les tables de signes chimiques les plus nouvelles, c'est à-dire, dans celle de Berzélius. Ce savant chimiste a employé comme caractères généraux un triangle, un cercle, une espèce de couronne & une croix. La figure triangulaire, modifiée de différentes manières, est le signe des quatre éléments & des substances inflammables, telles que le phosphore, le soufre. L'espèce de couronne désigne les substances métalliques ; le cercle appartient aux sels, & avec quelques modifications, sert aussi de caractère aux alcalis ; la croix enfin n'a d'autre objet, que de désigner les substances qui sont acides.

Nous ne nous permettrons aucune réflexion sur

ces signes généraux, & nous passerons rapidement à l'examen des caractères que Berzélius a employés, pour désigner les différentes substances dont les caractères que nous venons d'énoncer, indiquent les classes. On croiroit, d'après ce que nous avons dit, que le caractère de la terre, en général, qui est un triangle renversé, traversé d'une ligne horizontale, doit servir avec quelques modifications à toutes les terres. Berzélius néanmoins n'a employé la figure triangulaire, que pour représenter la terre siliceuse ; la terre argileuse ; la chaux, *fig. 12*, la magnésie, *fig. 13*, & la terre pesante, *fig. 14*, qui ont cependant toutes les propriétés des terres dans un degré éminent, sont représentées chacune par un signe qui n'a aucune analogie avec celui qui avoit affecté à la terre en général. La croix qu'il dans son système caractérise spécialement les acides, se trouve combinée avec les signes d'une infinité de substances qui sont bien éloignées d'avoir les propriétés acides, tels que la chaux, *fig. 12*, le cuivre, *fig. 5*, l'étain, *fig. 8*, le soufre, *fig. 15*, l'antimoine, *fig. 7*, la gomme, *fig. 16*, le mercure, *fig. 10*. Berzélius n'a point fait usage en outre, pour désigner les substances métalliques, du caractère qu'il avoit employé, pour les représenter en général. Il leur a donné pour signes caractéristiques, des croix, des cercles & des demi-cercles ; mais le cercle étoit réservé à la classe des sels. Avoit-il l'intention de rapprocher les métaux des substances salines ? Ce seroit faire une injure à la mémoire du savant professeur d'Upsal, que de supposer qu'il ait pu avoir une idée aussi bizarre. On seroit tenté de croire, en poursuivant l'examen de son tableau, qu'il existe une analogie entre la chaux & les oxides. En effet, lorsqu'il a voulu présenter un métal à l'état d'oxide, il a toujours joint à son caractère celui de la chaux.

Il est aisé de voir, d'après ce court examen des caractères modernes, qu'il y avoit entre eux trop d'incohérence & de confusion, pour que nous puissions nous en servir ; aussi avons-nous pris le parti d'en former de nouveaux.

Les corps dont l'examen est l'objet de la chimie, peuvent être divisés en deux grandes classes, en simples & en composés. On entend par le mot de corps simples, ceux sur qui l'analyse n'a pu encore avoir de prise ; les corps composés au contraire sont ceux dont l'art peut unir ou dissoudre les principes constituants. D'après cela, on voit qu'il doit exister deux grandes classes de caractères, les uns destinés à représenter les corps simples, qui forment les corps composés par leurs diverses combinaisons. Ces corps exeroient des caractères qui fussent simples, & à l'aide desquels on pût rendre les caractères des corps composés. Nous espérons réunir ce double avantage dans les caractères que nous avons l'honneur de présenter à l'Académie.

Les travaux des chimistes modernes nous ont

fffff 2

appris que la classe des 54 substances connues jusqu'à présent, pouvoit se diviser en 6 genres.

1°. En substances qui paroissent entrer dans la composition du plus grand nombre des corps.

2°. En substances alcalines & terreuses.

3°. En substances inflammables.

4°. En substances métalliques, qui par leurs propriétés se rapprochent du genre précédent.

5°. En substances acidifiables qu'on a tout lieu de soupçonner formées de plusieurs principes, & dont la décomposition peut déjà se prévoir; telles sont, par exemple, les bases des acides végétaux.

6°. Enfin, en substances composées, dont on ne connoit pas encore les composants.

Chacun de ces genres se divise ensuite en un nombre d'espèces plus ou moins considérable.

Cette division des corps simples exigeoit que chaque genre eût un signe qui lui fût propre, & qui pût avec quelques modifications être employé à désigner les espèces de ce genre; aussi ne nous sommes-nous point écarts de ce plan.

Nous avons affecté au premier genre des corps simples une ligne droite, au deuxième un triangle, au troisième un demi-cercle, au quatrième un cercle, au cinquième un quarré, & au sixième enfin un quarré, la pointe en haut. Une fois ces signes déterminés, il ne s'agissoit plus que de les varier, de manière qu'appartînt à chaque espèce, ils pussent aisément se distinguer des autres. C'est ce que nous avons fait de la manière suivante.

La ligne droite qui est le caractère du premier genre, peut avoir quatre positions bien distinctes; elle peut être verticale, horizontale, inclinée de droite à gauche ou de gauche à droite; mais en ordant la ligne droite & plaçant cette ligne dans les mêmes positions où peut se trouver la ligne droite, on obtient à l'aide de cette ligne seulement huit caractères parfaitement distincts, fig. 17, les uns des autres: or comme nous n'avons que quatre espèces du premier genre de connues; savoir, la lumière, le calorique, l'oxygène & l'azote, il reste quatre signes que les chimistes pourroient employer, s'il arrivoit qu'ils découvrisseient quelques nouvelles espèces de corps simples.

Le demi-cercle qui sert à désigner les substances inflammables, a, de même que la ligne droite, quatre positions absolument différentes. Il peut être ouvert en haut ou en bas, & à droite ou à gauche, fig. 18. Ces quatre positions en demi-cercle, nous ont fourni des caractères pour les quatre espèces de corps du second genre; mais comme on peut doubler ce demi-cercle, & former par ce moyen un caractère assez simple, le placer dans des positions semblables à celles du demi-cercle, fig. 19, il s'ensuit qu'il reste encore quatre caractères, dont on pourra faire usage, s'il se présente des corps du genre des substances inflammables.

Le triangle que nous avons employé, pour servir de signe caractéristique aux substances alcalines & terreuses, ne nous présentoit que deux positions différentes; il ne peut avoir sa pointe qu'en haut ou en bas. Il falloit donc trouver un moyen de former des caractères pour toutes les substances alcalines & terreuses, à l'aide de ces deux positions de triangle. C'est ce que nous avons fait, en affectant le triangle, dont la partie est en haut aux alcalis, & le triangle renversé aux terres, & en inscrivant dans ce triangle, qui doit indiquer chaque espèce d'alcali ou de terre, la première lettre du nom latin de cette substance. Ainsi, par exemple, la potasse est représentée par un triangle dont la pointe est en haut, au milieu duquel se trouve un P. Ainsi la chaux est désignée par un triangle renversé, qui renferme un C entre ses côtés.

La figure circulaire que nous avons prise, pour distinguer les substances métalliques, ou le quatrième genre, présentoit pour les modifications les mêmes difficultés que le triangle. Nous les avons vaincues de la même manière, en inscrivant dans chacun des cercles destinés à désigner chacune des espèces de ce genre, la lettre initiale du nom latin de ces substances métalliques, ayant soin cependant de représenter l'or par un cercle, au milieu duquel se trouva un point, afin de conserver l'ancien caractère. Nous nous sommes servi de la lettre initiale latine, parce que les noms latins sont connus de tous les savans.

Nous avons modifié de la même manière le quarré que nous avons adopté pour le cinquième genre, ou celui qui renferme les substances acidifiables, qu'on soupçonne formées de plusieurs principes, & dont la décomposition peut déjà se prévoir; chaque quarré porte entre ses côtés la première lettre du nom latin de la substance qu'il doit désigner. Il en est de même du quarré la pointe en haut, employé pour désigner les mixtes non décomposés. Avant de distinguer nos triangles par des lettres, nous nous étions servis de lignes & de points. Les lignes avant déjà une signification déterminée, les caractères où il s'en trouvoit, avoient l'air de composés; les points étoient une distinction trop minutieuse & difficile à retenir. Ces deux inconvénients nous ont fait adopter les lettres, d'autant plus qu'elles servent des lettres, on n'éprouve aucun embarras. Il s'est trouvé dans l'exécution de notre projet, à l'aide des lettres, un léger obstacle que nous avons surmonté aisément; il arrive souvent que deux substances d'un même genre se trouvent avoir la même lettre initiale. C n les distingue aisément l'une de l'autre, en inscrivant dans la figure qui doit désigner une substance, la lettre initiale du nom de cette substance, & dans l'autre figure, la lettre initiale du nom de la seconde substance unie à la consonne, qui établit le plus

de différence entre les deux noms. Ainsi, par exemple, l'argent qui commence par un *a*, comme l'arsenic, est représenté par un cercle au milieu duquel est un *a*, tandis que le signe de l'arsenic est un cercle qui renferme un *a* & une *f* liés ensemble.

Nous terminerons ce premier mémoire par le tableau des caractères des substances simples que nous avons l'honneur de présenter à l'académie. Nous nous proposons de déterminer dans un second la manière dont on peut parvenir à la solution du problème que nous avons énoncé dans ce mémoire.

SECOND MÉMOIRE

Sur de nouveaux caractères à employer en chimie, & l'arrangement que doivent avoir ces nouveaux caractères, afin de leur faire exprimer le rapport de quantité des substances simples, contenues dans les mixtes. — Par Hassenfratz & Adet.

Nous avons déterminé dans notre premier mémoire les caractères des substances simples, il ne s'agit plus que d'indiquer des loix d'après lesquelles on doit former les caractères des mixtes, pour parvenir à la solution complète du problème que nous nous étions proposé.

Les composés résultants de la combinaison des substances simples, leurs caractères, comme nous l'avons déjà dit, doivent aussi résulter de la réunion des lignes de ces mêmes substances simples. Ainsi la première loi qu'il faudra suivre pour former les caractères des mixtes, est de lier ensemble les caractères des substances simples, deux à deux pour représenter des composés de deux substances; trois à trois pour représenter un mixte composé de la réunion de trois substances simples; quatre à quatre pour exprimer les substances qui résultent de la combinaison de quatre substances simples; & d'où l'on voit que les caractères des mixtes seront d'autant plus composés qu'il y aura plus de principes qui concourront à les former.

On n'auroit point pour la formation des caractères composés, d'autres loix à suivre que celles que nous venons d'indiquer, si le rapport de quantité étoit toujours le même entre les principes d'un mixte, & si par conséquent ce mixte se présentoit constamment dans le même état avec les mêmes propriétés; mais nous l'avons que quoique deux substances puissent avoir un

point de saturation réciproque, il existe cependant pour elles des combinaisons en diverses proportions, où elles forment des composés sensiblement différens de celui qui résulte de leur réunion avec leur saturation réciproque. Ainsi une masse considérable de soufre, par exemple, vaporisée dans une petite quantité de gaz oxygène, produit un oxide de soufre, ou une combinaison de soufre & d'oxygène qui n'a aucun caractère des acides (1). Si à cette combinaison on ajoute une nouvelle quantité d'oxygène, on a un composé acide qui n'est autre chose que de l'acide sulfureux; & ce même acide sulfureux se change bientôt en acide sulfurique, si on lui fournit tout l'oxygène qui lui est nécessaire pour passer à ce dernier état. On voit donc de-là que le soufre & l'oxygène unis ensemble, ont des manières d'être bien différentes suivant leurs diverses proportions de combinaisons. D'où il suit qu'à l'aide des deux caractères qui, liés ensemble, représentent la combinaison du soufre & de l'oxygène, il faut exprimer les trois états dans lesquels cette combinaison peut se trouver.

On y parvient en faisant varier les positions respectives des signes de l'oxygène & du soufre.

Deux caractères liés ensemble (il est nécessaire que les caractères des composés le soient, pour qu'on ne confonde pas les caractères de deux composés qui seroient voisins), deux caractères liés ensemble peuvent avoir huit positions différentes: savoir deux verticales, deux obliques à droite & deux obliques à gauche. Ainsi ces deux caractères fig. 10, peuvent être combinés comme on le voit fig. 11. Mais les positions obliques ne présentent point de distinctions assez frappantes, & pourroient occasionner quelque confusion dans une suite de caractères s'ils n'étoient pas bienfaits. Nous avons donc réservé ces quatre positions obliques; il ne nous restoit plus que quatre positions dont nous puissions faire usage: savoir deux horizontales & deux verticales; mais dans les composés de deux substances, peu importe qu'une des deux substances soit placée à droite ou à gauche (2). Ainsi les deux positions horizontales se réduisent donc à une seule, d'où il suit que les deux caractères dont il est question n'auront que trois positions; savoir une horizontale & deux verticales; la position des deux caractères sur une même ligne horizontale indiquera que la saturation est réciproque, qu'il y a égalité de proportions entre

(1) Voyez Lavoisier, *différentia de principis forilli*, page 41.

(2) Il n'en seroit pas de même dans les composés de plusieurs corps; car si les affinités des corps les uns pour les autres, étoient bien différentes, on pourroit représenter dans un composé où il y auroit plusieurs principes, le degré de tendance qu'auroit un de ces principes pour les autres, en variant les caractères de ceux-ci d'autant plus sur la gauche, qu'ils auroient moins d'affinité pour le principe mentionné. Si, par exemple, on avoit une combinaison d'acide sulfurique, de potasse & de fer, telle qu'il existât une saturation réciproque entre les corps, on pourroit indiquer que l'acide sulfurique a plus d'attraction pour la potasse que pour le fer, en écartant la combinaison dont l'attraction commune il est le plus éloigné.

les principes du mixte qu'elles représentent ; les positions verticales au contraire exprimeront qu'il n'existe pas de saturation réciproque ou d'égalité de proportions entre les composans du mixte, de manière que le caractère qui sera inférieur nous fera connoître que la substance qu'il désigne est en excès sur l'autre. Eclaircissons ceci par un exemple.

Supposons que nous ayons une combinaison de soufre & de potasse, il peut arriver que dans un cas, le soufre & la potasse soient également saturés, & que dans un autre cas, un des deux principes de ce composé se trouve en excès sur l'autre ; il est aisé d'après nos loix de déterminer ces trois états. En effet, le signe de la potasse étant fig. 23, celui du soufre fig. 24, on exprimera la combinaison du soufre & de la potasse où il y a saturation réciproque, fig. 25, la combinaison de ces deux substances où le soufre est en excès, sera indiquée par la fig. 26, & enfin cette combinaison de soufre & de potasse, où la dernière substance prédomine, aura le caractère représenté fig. 27.

Cette loi sera la même pour tous les mixtes, quelle que soit leur nature. Nous serons cependant obligés d'y déroger dans les deux cas que nous allons exposer.

La chaleur suivant son degré d'intensité fait varier l'état des corps : on fait qu'en raison de la quantité de calorique avec laquelle les corps sont combinés, ils sont, ou solides, ou liquides, ou aëriiformes. On peut donc considérer la combinaison du calorique avec les différens corps dans trois états bien distincts ; mais comme tous les corps de la nature sont toujours unis avec une portion quelconque de calorique, nous sommes convenus, pour ne pas trop répéter le signe qui indique le calorique, de l'exclure toutes les fois que nous voudrions indiquer un corps à l'état solide, & de ne l'employer que pour désigner la liquidité ou la fluidité élastique ; ayant soin, d'après la loi que nous avons posée plus haut de mettre le signe du calorique au-dessus du signe des corps quand nous voudrions représenter l'état de liquidité, & au-dessous quand nous voudrions indiquer la fluidité élastique. Ainsi, par exemple le signe du plomb étant fig. 28, & celui du calorique fig. 29, le plomb à l'état solide sera fig. 28, à l'état liquide fig. 30, & à l'état de fluide élastique fig. 31 : le calorique sera donc exception à la loi générale, & n'aura dans ses combinaisons que deux positions au lieu de trois. Voyez le 11e tableau.

L'oxygène dans son union avec les substances acidifiables, peut former la seconde exception à la loi générale. En effet, l'oxygène uni aux diverses substances acidifiables en différen-

proportions, donne naissance à des composés dont les propriétés sont trop marquées pour qu'on puisse les confondre. On le voit produire, 1°. des oxides, 2°. des acides où la base acidifiable prédomine, 3°. des acides où il y a saturation réciproque, 4°. enfin s'il se combine de nouveau avec un composé dont les deux principes sont réciproquement saturés, il produit un composé qui ne paroît plus jouir des propriétés caractéristiques des acides, mais alors les liens qui le retiennent dans cette nouvelle combinaison sont si faibles, que l'action de quelques rayons de lumière suffit pour le mettre en liberté & lui rendre la forme élastique. Ce dernier produit des combinaisons de l'oxygène, n'est bien connu que dans l'acide muriatique oxygéné, tandis que le soufre, l'acide sulfureux & l'acide sulfurique nous présentent des exemples des autres composés dont nous venons de parler. L'oxygène néanmoins, dans ses combinaisons avec l'azote, paroît offrir les quatre composés dont il vient d'être question. Le gaz nitreux, ou l'oxide d'azote est la combinaison de l'oxygène & de l'azote où les propriétés acides ne sont point encore développées. L'acide nitreux qui laisse dégager du gaz nitreux, est la combinaison de l'oxygène & du gaz azotique où la base acidifiable est en surabondance. L'acide nitrique qui est blanc, & qui ne laisse point dégager de gaz nitreux, quand on l'unit avec l'eau, est la combinaison d'azote & d'oxygène, où il y a saturation réciproque ; & l'espèce d'acide nitrique que M. Monge nous a dit avoir obtenu paroît être l'acide nitrique oxygéné. Or puisque l'oxygène uni à une substance acidifiable, peut former dans quelques cas quatre composés bien distincts, le caractère de l'oxygène doit donc avoir quatre positions différentes ; nous lui avons donné ces quatre positions en plaçant au haut du signe de la base acidifiable, le caractère de l'oxygène, pour indiquer la combinaison qui n'est point acide ; au milieu du caractère de la base acidifiable, pour exprimer la combinaison où il y a saturation réciproque entre les deux principes, & enfin en le plaçant au bas du caractère de la base acidifiable, & en le dérachant un peu, pour faire voir que l'oxygène est en surabondance dans le composé dont il est question, & qu'il faut peu de forces pour l'en dégager. Ainsi, si on vouloit désigner la combinaison de l'oxygène & de l'azote, le caractère de l'azote étant fig. 32, celui de l'oxygène fig. 33, le signe du gaz nitreux sera fig. 34, celui de l'acide nitreux fig. 35, celui de l'acide nitrique fig. 36, & celui de l'acide nitrique oxygéné fig. 37.

Il est probable que plusieurs des acides végétaux que l'on n'a pu encore décomposer d'une manière assez exacte pour connoître les rapports de leurs principes, ont une même base & doivent

leurs propriétés acides à l'oxygène (1) ; mais comme il paroît que la différence de ces acides, dépend des différentes proportions qui existent entre les composés de la base acidifiable & l'oxygène, & que les proportions de l'oxygène & des principes de la base acidifiable varieront dans chacun de ces acides, il suit de-là qu'il faut pour indiquer ces diverses espèces d'acides, trouver des moyens différens de ceux que nous avons déjà mis en usage, puisqu'ils ne pourroient dans ce cas-ci servir à nos besoins. Or, comme ces acides paroissent avoir pour principe du carbone, de l'hydrogène & de l'oxygène, on pourra les représenter aisément en unissant ensemble les signes de ces trois substances de la manière qui sera indiquée par leur rapport de quantité, & écrivant au-dessus du signe de l'oxygène, la lettre initiale du nom latin de l'acide ; soient, par exemple, l'acide tartareux & l'acide oxalique dont il faille donner les signes. Supposons que dans le premier il y ait dix parties de carbone, cinq d'hydrogène & dix d'oxygène, & que dans le second il y ait neuf parties de carbone, six d'hydrogène & dix d'oxygène, il suivroit, d'après nos principes, que ces deux acides doivent être écrits de même, puisque dans les deux cas, le carbone se trouve en excès sur l'hydrogène, de manière que l'acide tartareux seroit fig. 38, & l'acide oxalique fig. 39. On ne pourroit donc pas indiquer que l'hydrogène, d'après notre supposition, se trouve en plus grande quantité dans l'acide oxalique que dans l'acide tartareux, & que par conséquent on doit avoir deux acides différens ; mais il est aisé de prévenir l'équivoque en écrivant, d'après ce que nous venons de dire, l'acide tartareux de la manière qu'il est représenté fig. 40, & l'acide oxalique fig. 41. Cet exemple suffit pour faire voir que si on a un jour un grand nombre d'acides dont les bases soient composées de même, on pourra par ce moyen exprimer les différentes espèces d'acides qui pourroient résulter des combinaisons dans des proportions trop petites pour qu'il soit facile de les représenter d'après les loix générales que nous avons posées.

Le tableau des matières simples nous offre six caractères généraux. A l'aide des 5 premiers, nous avons fait 54 caractères particuliers ; nous ne parlerons pas de ceux de la sixième espèce, parce que les substances qu'ils représentent sont déjà trop composées. Ces 54 caractères com-

posés deux à deux, doivent former $\frac{54 \times 53}{2} =$

1431 combinaisons ; ce nombre multiplié par

trois, cat nous pouvons exprimer trois états de combinaisons, donne 4293 combinaisons deux à deux, sans y comprendre les combinaisons de l'oxygène qui peut se trouver sous quatre états.

Si, d'après nos loix, deux caractères peuvent avoir trois positions, trois caractères liés ensemble sont susceptibles de 13 combinaisons bien distinctes, fig. 42. En effet, on peut avoir une combinaison de trois caractères sur une ligne horizontale, trois combinaisons de deux caractères unis placés au-dessus du troisième, & enfin six combinaisons de trois caractères sur une ligne verticale. Ainsi, nos cinquante-quatre caractères combinés trois à trois, produisent

$$\frac{54 \times 53 \times 52}{2 \times 3} = 24,804 \text{ combinaisons, ce}$$

nombre, multiplié par 13, qui exprime le nombre des positions que peuvent prendre ces trois caractères, donne 322,452 combinaisons différentes que peuvent donner les cinquante-quatre caractères, combinés trois à trois.

Nous ne pousserons pas plus loin ce calcul que tout le monde peut faire ; c'est assez d'avoir prouvé que le système de nos caractères suffit à toutes les combinaisons connues, & à celles que nous pouvons espérer de découvrir par l'analyse.

Nous terminerons ce mémoire en faisant un court résumé de notre travail.

Nous avons employé six caractères généraux pour les six classes des corps simples, ou non décomposés ; la ligne droite sert à désigner la première classe où les substances qui paroissent entrer dans la composition du plus grand nombre des corps ; le triangle, les terres & les alcalis ; le demi cercle, les substances inflammables ; le cercle, les substances métalliques ; le carré enfin, les radicaux acides qui nous font encore inconnus, & dont on espère découvrir la nature ; & le carré la pointe en haut, les substances composées non acidifiables, & dont on ne connoît point encore les composés.

En combinant ces caractères deux à deux & trois à trois, nous avons trouvé le moyen d'indiquer, d'une manière constante & uniforme, tous les composés que nous connoissons, & de donner, d'après nos loix générales, la facilité de faire les signes des mixtes que l'art nous mettra un jour à portée de connoître.

Enfin, par la position respective des caractères d'un mixte, nous sommes parvenus à faire connoître les rapports de quantité des substances qui concourent à sa formation. Telle est la marche que nous avons suivie pour rendre le problème qui se présente naturellement dans

(1) Cette thèse qui n'a encore été développée dans aucun ouvrage, se trouve appuyée par des expériences qui nous paraissent particulières, & dont nous espérons rendre compte incessamment.

la formation des caractères chimiques. *Etant donné la somme des substances simples, & en outre les rapports qu'elles ont entr'elles, quelle sorte de caractères leur assignerai-t-on, afin que combinés les uns avec les autres, ils puissent former des caractères composés qui indiquent le nombre & la nature des substances simples qui entrent dans un mélange, & quel doit être l'arrangement des caractères simples qui forment le caractère composé, de manière que les chimistes puissent, à l'inspection du caractère d'un mélange, déterminer le rapport de quantité des substances simples qui composent ce mélange. (Voyez les planches des caractères chimiques.)*

CARACTERES. On sait que par le mot caractères, les botanistes & les zoologistes désignent les propriétés constantes, perçues ordinairement dans la structure, la forme, &c. des végétaux & des animaux, à l'aide desquelles ils distinguent les classes, les ordres, les genres & les espèces qu'ils admettent parmi ces êtres. On sait que depuis Linnéus ces propriétés constantes ou caractères ont servent à reconnaître & à caractériser véritablement les corps auxquels on les applique, sans exprimées dans des phrases courtes, expressives, dont les mots tous adjectifs représentent des idées précises, & évitent toutes les équivoques. Cette méthode linnéenne est un trait de génie du naturaliste Suédois, qui a bien senti la nécessité d'abandonner les longues descriptions qu'on avoit faites avant lui, & de réduire le tableau des productions immenses de la nature dans un cadre qui pût les comprendre toutes, sans les laisser échapper à l'œil de l'observateur. En effet, si l'on avoit continué à décrire les corps naturels, comme Jolinsson, Aldrovande, Gesner & l'usson lui-même le faisoient, si l'on n'avoit pas cherché le moyen de distinguer à l'aide d'une inspection prompte, d'un examen facile, la multitude d'êtres que les observations & les voyages accumuloient sans cesse, comment auroit-on pu espérer de parvenir à faire connoître vingt-cinq à trente mille plantes, sept à huit cents quadrupèdes, quatre ou cinq mille oiseaux, & sur-tout trente ou quarante mille insectes ? comment auroit-on présenté aux étudiants cette innombrable foule de minéraux, de végétaux & d'animaux ? comment leur auroit-on appris à se reconnaître dans ce cahos dont ils sembloient être accablés ? Il n'est pas étonnant que cette grande conception de Linnéus, exposée dans son système de la nature, ait frappé tous les bons esprits, & que sa méthode ait été employée généralement par tous les hommes qui se sont occupés depuis lui de l'étude de la nature.

Mais si la multiplicité des objets à décrire, a été la véritable source de cette utile méthode, & si c'est d'après cette multiplicité, que Linnéus a cru devoir imaginer une méthode nouvelle &

courte de les caractériser, toutes les sciences naturelles, où les faits & les observations se multiplient tellement, qu'ils exigent d'immenses détails pour être présentés, ne doivent-elles pas suivre la même marche, & adopter le même système d'écriture ? Dès 1776, j'avois conçu ce projet pour l'anatomie des animaux dont j'embrassois alors tout l'ensemble sous le nom d'anatomie comparée. Je commençois avec ardeur l'exécution de ce projet, en aidant dans les grands travaux l'anatomiste Vicq d'Azyr, dont j'avois depuis plusieurs années suivi les cours, & dont le plan, pour un ouvrage complet d'anatomie, occupoit alors toutes mes pensées, lorsque d.s circonstances impérieuses m'engagèrent à cultiver la chimie qui présentait à cette époque l'espérance d'une heureuse révolution très prochaine. En 1778, lorsque je préparai par la lecture de tous les ouvrages des chimistes célèbres les matériaux pour mes premiers cours, tout plein des phrases du langage & des ingénieuses descriptions de Linnéus, & accablé en quelque sorte par l'immense quantité d'expériences & de propriétés chimiques que je cherchois à classer avec plus d'ordre & de méthode que n'en avoient fait les auteurs dont je composois tous les écrits, je songai à la possibilité d'exprimer par des phrases courtes & limonnées les propriétés chimiques des différents corps ; mais les lacunes qui existoient alors dans la science, m'empêchèrent d'aller bien avant dans cette nouvelle carrière ; & sans renoncer à mon projet, je reconnus qu'il étoit absolument impossible de le mettre à exécution. Cependant les découvertes chimiques, les nouvelles propriétés trouvées dans les fluides élastiques, dans leur production & leur fixation, se succédèrent avec une grande rapidité. Scheele, Berzélius & Priestley découvraient sans cesse de nouveaux corps, & l'école française profitoit de tous ces travaux, pour élever un édifice que la Suède & l'Angleterre qui en avoient fourni les premiers matériaux, n'avoient pas conçu même la possibilité de construire. La chimie dépouillée de toutes les hypothèses qui en avoient fait jusque-là une science en quelque sorte incertaine & fabuleuse, sortoit toute neuve, toute entière & avec une nouvelle forme des laboratoires de Paris ; les combinaisons inconnues jusqu'alors de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'azote, multiplioient à l'infini les nouveaux composés, & créoient de nouvelles attractions, de nouveaux phénomènes chimiques. A mesure que les matériaux innombrables qu'on découvroit de toutes parts en Europe par une ardeur inouïe pour les travaux chimiques qui occupoient presque tous les esprits, s'arrangeoient & formoient un ensemble important par les soins des chimistes français, on ne pouvoit plus employer la langue de l'ancienne chimie, sans être révolté par les chimères qu'elle expelloit encore, & par les absurdités qu'elle offroit. Les noms donnés aux corps nouvellement découverts, se

sentent

sentoient de cette choquante incohérence entre les idées exactes qu'on acquéroit, & les folies qu'on avoit en quelque sorte consacrées par les anciennes dénominations, on sentoit la nécessité d'une réforme, on en proposoit tous les jours quelques exemples, lorsque nous conçûmes, en 1784, le plan de refondre entièrement la nomenclature de la chimie, & d'accorder sa langue avec ses nouveaux principes. L'esprit dans lequel nous conçûmes & nous exécutâmes ce projet, fut analogue à celui qui avoit dirigé Linnéus, & nous porta même plus loin que lui. Nous voulûmes exprimer dans les noms les principales propriétés des corps chimiques, attacher pour-ainsi-dire leurs premiers caractères, leurs qualités essentielles aux mots destinés à les représenter à l'imagination, & diminuer ainsi la difficulté & la longueur de l'étude, en liant aux noms la nature des corps qu'ils désignoient. On trouve donc dans la nomenclature chimique moderne une marche semblable à celle qui a été adoptée dans l'histoire naturelle. On y reconnoît une assidue prononcée des caractères qui doivent distinguer les corps considérés chimiquement. Mais cela ne suffit point encore; on peut espérer de pousser cette idée beaucoup plus loin. Les descriptions des composés faits par la nature ou par l'art, disposées méthodiquement par classes, ordres, genres & sortes, peuvent être faites à la manière de Linnéus. On peut trouver dans leurs propriétés chimiques comparées des moyens de les distinguer & de les faire reconnoître promptement & facilement. Les classes, les ordres, les genres de composés chimiques peuvent être caractérisés par des propriétés principales & communes, exprimés en termes simples & courts. Sans avoir uniquement & strictement suivi cette méthode dans mes élémens de chimie; sans avoir entièrement réduit l'exposé des faits chimiques à des descriptions linnéennes, ce qui auroit paru trop court & trop précis aux étudiants, auxquels mes élémens sont destinés, je n'ai cependant négligé nulle part de me servir de sa méthode pour la disposition générale des articles & pour la classification des idées. Peut-être avant qu'il soit peu, faudra-t-il partager les élémens de chimie en deux grandes parties, la théorie & la pratique. La première pourra être faite absolument, suivant la méthode descriptive de Linnéus, & elle sera très-courte. Ce sera un exposé des caractères chimiques de tous les corps, & une division fondée sur leur décomposition réciproque. La seconde contiendra la description de toutes les expériences & la manière de les faire. Voyez un essai de la première, au mot AXIOMES.

CARACTÈRES. (*Pharmacie.*) Les signes employés par les chimistes pour désigner les différentes matières naturelles ou composées artistielles.

Les signes employés par les médecins, pour représenter les substances médicamenteuses, soit dans l'intention de rendre les formules plus courtes, soit dans celle de cacher aux malades ou à ceux qui les entourent les remèdes dont ils font usage; mais l'une & l'autre de ces vues n'a que de très-foibles avantages, & le procédé qu'on met en pratique pour les remplir peut avoir les plus grands inconvénients. En effet un signe incertain & mal écrit peut être pris pour un autre, & l'apothicaire peut commettre de dangereux qui-proquos. D'ailleurs ces signes sont plus ou moins différens dans les divers formulaires où on les a employés, & l'on sent d'après cela que les erreurs peuvent être plus fréquentes & plus préjudiciables par cette seule cause. Si l'on calcule d'ailleurs le foible avantage d'un peu de temps gagné dans l'écriture des formules, & si l'on se représente les dangers qui peuvent naître des erreurs commises dans la reconnaissance de ces caractères, on sera bientôt décidé à ne point faire usage de ces signes hiéroglyphiques dans un art où tout doit être parfaitement énoncé, où il ne doit y avoir aucune espèce de doute ou d'ambiguïté. On doit donc d'après cet exposé, & les réflexions simples qu'il fait naître, non-seulement ne pas employer de caractères chimiques pour exprimer les remèdes, mais même ne pas le permettre d'abréviations, & au contraire écrire en toutes lettres le plus corréctement possible le nom des médicamens qui composent les formules. Cet avis est d'une grande importance, & les médecins ne sauroient y donner une trop sérieuse attention. (*Voyez* le mot FORMULE & ART DE FORMULER, dans le dictionnaire de médecine.)

CARAGNE. (GOMME OU RÉSINE DE) (*Pharmacie.*) *Carumna.* Linn. *Mat. med.* 557. C'est une masse endurcie, gomme-résineuse, tenace lorsqu'elle est fraîche, ductile comme la poix; dure lorsqu'elle est vieille, sifiable, d'un gris brun, ou d'un jaune ferrugineux, d'une odeur pénétrante & assez gracieuse lorsqu'on l'allume, d'une saveur visqueuse résineuse, légèrement balsamique & un peu amère. Elle vient de l'Amérique, & sur-tout de la Nouvelle-Espagne; on l'apporte en masses, enveloppées dans des fenilles de jonc. L'arbre, par les incisions d'où cette gomme découle, est nommé par Monard, caranna. Cet arbre, n'est point décrit par nos botanistes modernes. Cette gomme-résine, distillée donne une huile essentielle éthérée de couleur jaune, d'une odeur gracieuse, aromatique, d'une saveur âcre & amère. L'on fait rarement prendre intérieurement la caragne; elle entre simplement dans les emplâtres traumatiques, nervins, antispasmodiques & résolatifs, pour les blessures des nerfs & des tendons, la faiblesse des articulations, les tumeurs, le spasme de l'estomac;

la lienterie, le vomissement, la douleur de dents. On l'ajoute aussi quelquefois aux fumigatoires utérins & fortifiants. Lorsqu'on trouve à propos d'en faire usage pour les affections rhumatismales, catarrhales, spasmodiques & convulsives, car elle fortifie puissamment les nerfs, on peut la donner depuis quelques grains jusqu'à un demi-scrupule. Cette pomme-résine entre dans l'eau générale du codex de Paris, & dans la composition du faux vernis de la Chine.

(M. WILLEMET.)

CARAMBOLIER AXILLAIRE. (Pharm.)

Averrhoa carambola, *Prunum peltatum*. Rumph. *Ans.* 1. P. 119. T. 35. C'est un petit arbre des Indes orientales. Ses fruits se mangent crus, ont un goût agréable, excitent l'appétit. On les confit au sucre. On les ordonne contre les fièvres bilieuses, les dysenteries, & pour réjouir le cœur.

(M. WILLEMET.)

CARAMBOLIER CYLINDRIQUE. (Pharmac.)
Averrhoa bilimbi. C'est un arbrisseau des Indes orientales. On confit ses fruits au sucre, au vinaigre ou au sel. On en fait un sirop qui est recommandé dans les maladies du foie & dans l'intempérie inflammatoire du sang. On l'emploie aussi dans les fièvres ardentes & continues.

(M. WILLEMET.)

CARAMBOLIER A FRUITS Ronds. (Pharm.)
Averrhoa acida. C'est encore un arbrisseau des Indes orientales. On mange ses fruits avec délices, parce qu'ils ont une acidité agréable; comme ils sont très-rafraichissants, on les prescrit dans les fièvres continues pour apaiser l'ardeur de la soif. Sa racine est émétique & laxative. La décoction de ses feuilles est ordonnée comme sudorifique, pour fortifier la petite-vérole.

(M. WILLEMET.)

Fin du second volume.

646293



